

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.7°C

■ 요약

67세 여성 환자로 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상 악화, 온찜질과 수면 시 증상 완화됨. 흑색변, 다한, 하지 부종, 사지 무력감, 기억력 저하, 활맥이 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 환자는 요통의 강도를 3/10으로 표현하며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다고 한다. 오래 서 있을 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 호전되는 경향이 있다. 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주를 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량으로 복만/복통을 3/5로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 멍이 잘 드는 경향이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 설체는 얇다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부대