

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 83kg
- 활력징후: BP 146/90 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.4°C

■ 요약

36세 여성 환자로 1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원, 고혈압 병력 있으며 흡연력 존재

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 83kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소한다. 요통은 뻣뻣한 느낌과 함께 시작되었으며, 움직일 때 통증이 심해지는 양상을 보인다. 통증 강도는 2/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 띠며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 간헐적으로 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며 굳고 딱딱한 편이다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 9회 정도 보며, 야간뇨는 1회 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/90 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.4°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 부어있는(大) 설이다.
- 설태: 백색의 얇은 태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥