

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 61kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.2°C

■ 요약

37세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발병한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 고혈압이 있으며 혈압약 복용 중. 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 악화되었고 습한 환경과 음주 시 악화됨. 오한, 무한, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 61kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 요통이 발생하여 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔중하고, 움직일 때 심해지며, 쉬는 듯한 느낌이 있고, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며 따뜻하게 하면 호전되는

양상을 보인다. 습한 환경과 음주 시 통증이 악화된다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통(4/5)을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색으로, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)을 보인다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 4/10)을 호소하며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 백색 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭