

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 68kg
- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 112/분, 체온 36.6°C

■ 요약

47세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 골프/테니스 스윙 중 허리 통증 발생. 수면 시 완화되나, 오래 서있을 시 악화됨. 오한, 수족냉증, 전신 부종, 가려움, 사지 무력감, 침세맥, 강홍/자설, 백태 등의 소견 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 182cm, 체중은 68kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛),

유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띤다. 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화되며, 수면 시에도 호전된다고 한다. 환자는 발열은 없으나 오한을 느끼며, 수족냉증을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통이 간헐적으로 나타난다 (1/5). 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 자주 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띤다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 비교적 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 36.6℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증을 동반한다. 이명은 거의 없으며 (0/5), 난청은 경미한 수준이다 (1/5). 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침세