

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 59kg
- 활력징후: BP 168/101 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.3°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 요통을 주소로 내원. 계단에서 미끄러진 후 발생한 통증이며, 스트레스, 무거운 짐, 찬바람에 의해 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 59kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 6개월 이상 지속되었으며, 호전 중이다. 통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때

악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 스트레스, 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통(4/5)이 있으며, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(입안이 씹) 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 168/101 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 설태의 두께는 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥