

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 61kg
- 활력징후: BP 107/71 mmHg, 맥박 120/분, 체온 37.6°C

■ 요약

49세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 계단에서 미끄러진 후 증상이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 152cm, 체중은 61kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 스트레스를 받을 시 증상이 악화되며, 스트레칭이나 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 통증은 주로 무겁게 느껴지며,

이동하는 듯한 양상, 찌르는 듯한 통증이 동반되고 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때, 냉기에 노출될 때 악화되며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통을 느끼며 (4/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간 정도이나, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (0/5) 및 중도각성 (0/5)은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 무거운 느낌, 이동하는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는 경향을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 전신 부종이 있고 멍이 잘 드는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/71 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않고 가려움증은 없다. 전신 부종이 관찰된다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다 (0/5). 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 허의 크기는 작다 (소).
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다 (회태, 박태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥