

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 93kg
- 활력징후: BP 111/75 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.7°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 가족력으로 중풍이 있다. 장시간 운전 후 허리가 뻣뻣해지는 증상이 발현되었고, 변비와 소화불량을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 93kg, BMI는 32.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 약 6개월에서 1년 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 요통은 지속적으로 나타나며, 증상의 강도는

오르내림을 반복한다. 수면 시에는 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 통증 양상은 묵직한 느낌이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/75 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 2/5이다.
- 면색: 황색을 띈다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 혀가 크다.
- 설태: 백태가 두텁게 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 84kg
- 활력징후: BP 130/85 mmHg, 맥박 104/분, 체온 38.0°C

■ 요약

41세 남성, 1년 전 장거리 비행 후 발생한 요통과 소화불량을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 84kg, BMI는 34.5이다.

【주소증】

1년 이상 된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 지속적으로 불편감을 느껴왔다. 최근 소화불량 증상이 악화되어 내원하였다. 환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 2/10으로 둔하고 무거운 느낌 (重痛)이 있다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만, 복통 (2/5), 오심, 구토 증상을 호소한다. 부패취가 나는 트림과 신물이 올라오며, 입이 쓰다고 (口苦) 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠을 알게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10, 重痛)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/85 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 38.0°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 (5/5)과 경미한 난청 (1/5)이 있다. 어지럼증은 호소하지 않는다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다 (大).
- 설태: 회색, 두껍다 (厚).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 69kg
- 활력징후: BP 109/64 mmHg, 맥박 60/분, 체온 35.2°C

■ 요약

50세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거 계단에서 낙상 후 증상 발현되었으며, 흡연과 냉기에 의해 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 69kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 묵직한 느낌과 함께 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 흡연 시 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 최근

증상이 점차 악화되고 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 하루 1회, 묽은 변을 본다. 대변 색은 황갈색이다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회 소변을 보며, 혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 움직이는 듯한 통증이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/64 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 35.2℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 45kg
- 활력징후: BP 130/89 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.3°C

■ 요약

51세 남성 환자로, 1주-1개월 이내 무거운 물건을 들다가 시작된 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 피로감, 전신 부종, 소화불량, 수면 장애, 야간 발한, 수족냉증을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 45kg, BMI는 12.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔중한 양상으로 나타나며, 움직일 때 악화되는 유주통의 양상을 보인다. 온찜질 및 스트레칭 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만, 복통(3/5), 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1일 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 5회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 아침에 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(4/5), 중도각성(3/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이며, 둔중하고 움직이는 듯한 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/89 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 회태, 박태하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 복합맥상으로는 대활맥이 관찰된다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 65kg
- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.2°C

■ 요약

53세 남성, 1개월 전부터 요통을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 흡연력이 있음. 피로감, 수족냉증, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 65kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며, 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 과로 시 악화되며, 식이 조절과 따뜻하게 찜질 시 완화된다고 한다. 소화불량 증상으로

복만, 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 잦다 (5회).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 둔하고 무거운 느낌의 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움을 호소한다 (3/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 84kg
- 활력징후: BP 114/64 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.6°C

■ 요약

57세 남성, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있으며, 오랜 시간 앉아있는 업무 후 허리 통증이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 84kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 찬바람에 노출될 경우 증상이 악화되는 경향을 보인다. 통증은 중통(重痛)과 유주통(遊走痛)의 양상을 띠며, 강도는 4/10으로 평가된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 복만 및 복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기의 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통(重痛)과 유주통(遊走痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/64 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 큰 대설(大舌)이다.
- 설태: 백태가 薄(박)하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)

- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 홍대(洪大)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 85kg
- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.8°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었다고 함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 85kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 무거운 느낌과 함께 이동하는 양상을 보이며, 강도는 4/10으로 평가된다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 장시간 앉아 있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통(Heavy), 유주통(Moving)의 양상을 보인다. 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.8°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5로 경미하다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 大하다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 34kg
- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.5°C

■ 요약

10세 남환, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 34kg, BMI는 16.6이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 통증은 주로 무겁고, 움직이는 듯한 양상이며, 찢는 듯하고 야간에 심해지는 경향을 보인다. 흡연과 습한 환경에 의해 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절을 통해 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 하루에 0개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 야간에 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 피곤하거나 차가워지는 느낌이 있다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 65kg
- 활력징후: BP 136/87 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.6°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 65kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속되고 있다. 통증은 묵직하며(重痛), 마치 이동하는 듯한 양상(遊走痛)을 보이고, 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 느껴진다. 특히 야간에 통증이 심해지는 경향을 보인다. 찬바람이나 냉기에 노출될 경우, 스트레스를 받을 경우 증상이 악화되는 것을 호소한다. 과거

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 흡연했으나 현재는 금연 중이다. 중강도의 운동을 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 잠들기 어렵고(5/5), 중도각성은 없다(0/5). 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직함(重), 이동하는 듯함(遊走), 찌르는 듯함(刺)과 같은 다양한 양상을 보인다. 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/87 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 설대(舌大)
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沉脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:54:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 80세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 54kg
- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.2°C

■ 요약

80세 남성, 1년 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 54kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

1년 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 안정 시 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동은 고강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색 변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕은 보통이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지무력감은 없으며, 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기는 대(Enlarged)하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 90kg
- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.1°C

■ 요약

40세 남성, 1개월 이상 3개월 이내 요통을 호소하며, 이사 중 허리 빼끗한 경험. 흡연, 장시간 앉기, 냉기에 악화되고 스트레칭과 식이조절에 완화됨. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 전신 부종, 이명, 난청 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 90kg, BMI는 30.8이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빼끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 빼끗한 이후 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증은 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 양상을 보인다. 흡연, 장시간 앉기, 찬바람/냉기에 의해 악화되며, 스트레칭과

식이조절을 통해 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 황색의 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 38세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 68kg
- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 82/분, 체온 38.1°C

■ 요약

38세 여성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거 이상지질혈증 병력이 있으며, 최근 골프/테니스 중 허리 통증이 발생하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 68kg, BMI는 30.6이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 골프 또는 테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 3/10 정도로, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다고 한다. 스트레칭 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5 이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 3/10, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화되는 양상이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 38.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥, 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 85세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 63kg
- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.1°C

■ 요약

85세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작됨. 변비, 혈뇨, 수면 문제, 다한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 63kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 장시간 운전 후 갑작스럽게 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 3/10 정도이다. 통증의 양상은 묵직한 느낌(重痛), 이동하는 듯한 느낌(遊走痛), 찌르는 듯한 느낌(刺痛)이 동반된다. 특히

야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 휴식을 취하면 다소 완화되는 듯하다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 장시간 앉아있는 습관이 있으며, 기름진 음식을 즐겨 섭취한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루에 한 번 규칙적으로 하는 편이나 소화불량을 자주 호소하며, 복만감과 복통을 느낀다. 신물이 올라오고, 구역감이 있으며, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다. 부패취가 나는 트림을 자주 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 붉은색을 띠며 혈뇨가 나타난다. 주간에는 4회, 야간에는 3회 정도 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면 장애(5/5)가 있으며, 중도 각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고, 이동하는 듯하며, 찌르는 듯한 통증이 있다. 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 많으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색 또는 자색을 띠며, 크기가 크다 (Enlarged).

- 설태: 회색 또는 얇은 백색 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 142/91 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.3°C

■ 요약

42세 여성, 1주-1개월 전부터 요통을 호소하며 내원. 흡연, 장시간 앉기, 스트레스가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3일 전부터 발생한 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고 움직일 때마다 심해지는 양상을 보이며, 밤에 더욱 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화된다고 한다. 흡연, 장시간 앉기, 스트레스가 악화 요인으로 작용하는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 한다. 소화는 보통이며, 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하지만, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 편이다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 밤에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않고 의욕이 없는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/91 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색을 띠며, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 58kg
- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증 병력 있으며, 가족력 상 고혈압, 당뇨, 중풍 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 158cm, 체중은 58kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 요통의 통증 강도는 4/10으로 보고되었다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전 장거리 비행 후 요통이 발생했으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다고 한다. 오래 서 있을 때 통증이 악화된다고 호소한다. 이상지질혈증으로 약물 복용

중이다.

【과거력】

이상지질혈증 진단을 받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압, 당뇨, 중풍 등의 질환이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심, 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 박태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 71kg
- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.3°C

■ 요약

51세 남성, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 삐끗한 후 발생. 피로감, 흑색변, 혈뇨, 다한, 이명, 어지럼 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 71kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 도중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하여 지속 중이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다고 호소한다. 찬바람, 기름진 음식, 수면 부족

시 증상 악화되며, 현재 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 복만과 복통이 있다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소, 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5).
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐. 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗), 야간/도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 69kg
- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 고혈압 및 중풍 가족력이 있으며, 흡연력이 있고, 땀이 많고 오한을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 69kg, BMI는 22.3이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소하며, 통증은 점차 악화되는 양상이다. 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 요통의 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)이 있으며, 야간에 심해지고 오래 서

있을수록 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 길지만, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 더운 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많고, 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 39세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 75kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.6°C

■ 요약

39세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 과로 시 증상 악화, 온찜질 및 스트레칭 시 증상 완화를 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 75kg, BMI는 33.8이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 점차 악화되는 추세이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우에도 악화된다고 한다.

온찜질과 스트레칭 시에는 통증이 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압 및 중풍의 병력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회 황갈색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 2회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 심하고 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 비대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 58kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.4°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압 가족력이 있으며, 다한, 수족냉증, 피로감, 기억력 저하, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 58kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10 정도이며, 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되는 경향이 있다. 온열 찜질 시

통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 특별한 통증은 없다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.4℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증을 동반한다. 부종은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색, 자색 설, 크기가 큰 편이다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 58kg
- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.0°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 58kg, BMI는 26.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1주일 전 장거리 비행 후 요통이 발생했으며, 통증은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 찬바람/냉기, 장시간 앉아있거나 무거운 짐을 들 때 악화되며, 안정을 취하거나 스트레칭을 하면 완화된다. 통증 강도는 3/10이며,

중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통의 양상을 보이고, 오래 서 있을 경우 악화된다. 소화불량 증상으로 복만/복통이 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 5개피/일 흡연한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 대변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 회태, 박태가 껴있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 부대맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 99kg
- 활력징후: BP 108/74 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.7°C

■ 요약

52세 남성, 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 고혈압 기왕력 있으며, 찬바람에 악화되는 양상 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 99kg, BMI는 34.3이다.

【주소증】

1년 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 1년 이상 지속되었으며, 현재 호전 중인 상태이다. 악화 요인으로는 찬바람/냉기(冷氣)에 노출되는 것을 꼽았다. 통증 양상은 중통(Heavy) - 습, 유주통(Moving)

- 담음, 자통(Stabbing) - 어혈, 야간통(Worse at Night) - 어혈, 오래 서있으면 악화 - 기의 양상을 보인다. 통증 강도는 4/10 정도로 보고된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회, 규칙적으로 하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증(Cold Limbs) - 허, 구역/구토(Nausea) - 습열, 부패취(Foul Belching) - 식적, 신물(Acid Reflux) - 간/식, 구고(Bitter Taste) - 열 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/74 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 이며, 어지러움은 없다(0/5).
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)하다.

- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 83kg
- 활력징후: BP 158/98 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.4°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 1주일 이내 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 심장병 가족력. 변비, 혈뇨, 수면 불량, 다한, 전신 부종, 사지 무력감, 가려움, 이명, 어지럼증, 홍조, 요통, 소화불량 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 83kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 3/10이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서있으면 악화되며, 습한 환경에서

통증이 심해지고 온찜질 시 완화된다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만, 복통 (3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소하며, 피부 가려움증이 있다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/98 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피로감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 59kg
- 활력징후: BP 112/71 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.9°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 흡연, 저강도 운동 습관을 가지고 있음. 피로감, 하지 부종, 수족냉증을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 59kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소하며, 시간이 지날수록 악화되는 양상을 보인다. 요통은 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는

경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 25개피/일 흡연한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/71 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.9°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 82kg
- 활력징후: BP 151/93 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.1°C

■ 요약

48세 여성, 6개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원. 이상지질혈증 및 고혈압 가족력 있으며, 스트레스, 흡연, 냉기에 악화되고 온찜질에 완화됨. 변비, 혈뇨, 다한, 수면장애, 사지무력감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 82kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되고, 온찜질 시 완화된다고 한다.

찬바람/냉기에 노출되거나 스트레스를 받을 시 통증이 악화되며, 흡연 또한 증상 악화에 영향을 미친다고 진술한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 복만감 및 복통이 2/5 정도 나타나며, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/93 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 45kg
- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.9°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 45kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 통증이 지속적으로 나타났으며, 통증의 강도는 3/10 정도로 둔하고 무거운 느낌이 들 때도 있고, 찌르는 듯한 통증이 느껴지기도 한다고 호소하였다. 특히 밤에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 경우 통증이 악화된다고 한다. 따뜻하게 찜질을 하면 통증이 다소

완화되는 느낌이 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루에 한 끼 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1일 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소에 더위를 타는 편은 아니며, 수족냉증은 없다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀이 나는 경우가 있고, 땀을 흘린 후에는 열감이 느껴진다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 둔하고 무거운 느낌, 찌르는 듯한 통증이 나타나며, 강도는 3/10 정도이다. 밤에 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.9℃, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍은 정상이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 76kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.2°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거 데드리프트 운동 중 허리 통증 발생, 과로 및 흡연 시 악화되며, 소화불량, 수면 문제, 전신 무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 76kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 데드리프트 운동 중 발생했으며, 이후 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다.

오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다. 과로와 흡연 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감을 호소하며, 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없으며, 땀은 없는 편이나, 두부에서 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗), 두부에서 땀이 나면 열감을 호소한다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.2℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 66kg
- 활력징후: BP 152/93 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.7°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 스트레스와 기름진 음식 섭취 시 악화, 식이 조절 시 호전을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 66kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/

Warmth)의 양상을 보인다. 스트레스 및 기름진 음식 섭취 시 통증이 악화되며, 식이 조절 시 호전을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연량은 5개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위 통증을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 152/93 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 2/5 강도로 나타난다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 큰 편이다 (대, Enlarged).
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 85kg
- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.5°C

■ 요약

44세 남성 환자로 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환이 있으며, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 건망 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직에 종사하는 자이다. 신장은 170cm, 체중은 85kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

발현 시점 1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 지속적으로 통증을 호소하고 있다. 통증은 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이

악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만감 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 구역, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 1회의 빈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠들기 어렵고, 자다가 자주 깨며, 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이거나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.5℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 황태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥꼭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 강력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 침긴(沈緊)하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 82kg
- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.8°C

■ 요약

47세 남성, 6개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증이 있으며, 습한 환경과 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 82kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 요통이 시작되었으며, 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고(重痛), 옮겨 다니는 양상(遊走痛)을 보이며, 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 호소한다. 습한 환경과 기름진 음식을 섭취할 경우 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만감 및 복통(3/5)을 호소한다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물 오름, 쓴맛을 느끼는 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않으나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 보통으로 나지만, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이며, 묵직하고 옮겨 다니며 찌르는 듯한 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 저하되었다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다(大).
- 설태: 백태, 박태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 56kg
- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.1°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이상지질혈증을 앓고 있으며, 수면 부족, 기름진 음식 섭취, 흡연 등의 악화 요인이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 56kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고

호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 알고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 무기력함을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 43kg
- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.2°C

■ 요약

11세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원. 과거 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었으며, 찬바람, 수면 부족 시 악화되는 경향을 보임. 흑색변, 혈뇨, 다한, 전신부종, 사지무력감, 홍조 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 43kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

발현 시점은 6개월 이상-1년 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 무거운 물건을 들다가 시작되었으며, '뚝' 소리가

났다고 한다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 수면이 부족할 경우 통증이 악화되는 경향을 보인다. 통증은 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠을 얹게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 없으며, 중도 각성도 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 전신 부종 및 사지 무력감을 호소한다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/92 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.

- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 144/93 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.7°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내 발현된 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압 가족력이 있으며, 흡연력이 있고, 수면의 질이 좋지 않음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 3개월 이내부터 요통이 발생하였으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 찬바람/냉기(冷氣), 장시간 앉기(久坐), 과로(過勞) 시 악화되고, 식이조절(食餌調節)과 온찜질(溫熱敷) 시 완화된다고 한다. 통증은

중통(重痛), 유주통(moving), 자통(stabbing), 야간통(worse at night)의 양상을 보이며, 오래 서있으면 악화되고, 냉기에 노출되면 심해지며, 따뜻하게 하면 나아지는 경향이 있다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠이 얕고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/93 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.7℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태이며, 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)이다.
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)이다.
- 맥력: 무력(無力)하다.
- 맥상: 활맥(滑脈)이다.
- 복합맥상: 미약(微弱)하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 78세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 57kg
- 활력징후: BP 166/102 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.9°C

■ 요약

78세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 57kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통이 지속되고 있으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 통증은 묵직하고(重痛), 옮겨 다니며(遊走痛), 찌르는 듯한 양상(刺痛)을 보이며, 밤에 심해지는 경향(夜間痛)이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동은 비교적 강도 높게 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간에 12회, 야간에 5회 소변을 본다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5번 중 1번 정도 있으며, 중도 각성은 5번 정도 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증을 호소하며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 166/102 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 73kg
- 활력징후: BP 121/87 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.5°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리 통증이 시작되었으며, 소화불량, 수면장애, 전신 부종, 열감, 수족냉증을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 73kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 5일 전부터 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10으로 묵직한 느낌, 움직일 때 심해지는 경향, 찌르는 듯한 통증, 밤에 심해지는 양상을 보인다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 식이 조절 시

통증 완화 효과가 있다. 또한, 복만감과 복통이 4/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중간 정도이다. 폐경이 되었으며, 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 호소
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (3/5), 중도각성 (2/5)
- 한열: 열감 호소, 더위 탐, 열수를 선호, 수족냉증 동반
- 땀: 무한 (無汗), 야간/도한, 땀 흘린 후 상쾌함 느낌
- 통증: 요통 (4/10), 묵직한 느낌, 움직일 때 심해지는 경향, 찌르는 듯한 통증, 밤에 심해지는 양상, 오래 서 있으면 악화, 따뜻하게 하면 완화
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 능력 저하

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/87 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 잘 드는 경향
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 44kg
- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.5°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 심장병 가족력이 있으며, 변비, 수면의 질 저하, 전신 부종, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 홍조, 무한, 소화불량 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 44kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 요통이 발생하여 내원하였다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서있으면 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향이 있다. 환자는 발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 코막힘, 코 가려움 등의 증상은 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀이 나지 않으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나지 않는다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 작다.

- 설태: 회색의 다테이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 65kg
- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.6°C

■ 요약

50세 남성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 삐끗한 후 발생. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 과거력. 오한, 무한, 흑색변, 혈뇨, 얇은 수면, 무기력, 암색 면색, 황후태, 부맥, 세맥, 활맥 등을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 65kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 짐을 나르다 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우

통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 듯하다. 환자는 냉기에 노출되면 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받아 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 심장병 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량과 함께 복만, 복통을 3/5 정도로 호소한다. 구역감, 신물, 구고, 부패취를 동반한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 건조하며 각질이 있다. 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태를 보이며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 71kg
- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압 및 이상지질혈증 병력이 있으며, 수면 부족을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 71kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3개월 이상 6개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타났다가 사라지기를 반복하며, 주로 무거운 느낌, 움직일 때의 통증, 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다. 혈압약과 이상지질혈증약을 복용하고 있다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 25일로 불규칙하며, 생리통은 거의 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 가끔 오심 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색을 띠고 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 배뇨한다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하지만, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 가끔 있으며(1/5), 중도각성은 거의 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 전신에서 땀이 나지만, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.2℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명은 3/5 정도 강도로 나타나며, 난청은 4/5 정도이다. 어지럼증은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크고 혀에 이빨자국이 있다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 74kg
- 활력징후: BP 114/65 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.7°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1주일 이내 발현한 요통을 주소로 내원. 과거 흡연력 있으며, 흑색변 및 혈뇨, 잦은 소변, 수면의 질 저하, 사지무력감, 피부 가려움 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 164cm, 체중은 74kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전부터 요통을 호소하며, 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있으며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구역감이 있으며, 썩은 냄새가 나는 트림을 하고, 신물이 올라온다. 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 보통의 굳기이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간에 12회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 없으나 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 더위나 추위를 타지 않으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 묵직하고, 움직일 때 심해지는 양상이다. 야간에 심해지며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 저하된 상태이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/65 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.7°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 76세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 49kg
- 활력징후: BP 112/77 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.0°C

■ 요약

76세 여성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 발현됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 165cm, 체중은 49kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 요통이 발생하여, 증상이 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다고 호소한다. 통증은 묵직하고, 움직일 때 심해지며, 찌르는 듯한 양상을 띄고 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게

하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통이 3/5 정도이다. 구역감, 신물, 부패취, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/77 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 회색이고, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 144cm / 43kg
- 활력징후: BP 110/74 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.5°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 찬바람, 장시간 앉기, 습한 환경에서 악화되며, 스트레칭과 안정 시 완화된다. 변비, 수면 불량, 야간 도한, 전신 부종, 이명, 난청, 홍조 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 43kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있으며 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다. 찬바람을 쐬거나 장시간 앉아있을 때, 습한 환경에 노출될 때 통증이 심해지는 것을 호소한다. 스트레칭이나 안정 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통(2/5)이 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦)를 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(True/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 야간에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/74 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.5°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상적으로 건조하고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크고 태가 있다.

- 설태: 황색 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 67kg
- 활력징후: BP 104/69 mmHg, 맥박 55/분, 체온 36.1°C

■ 요약

45세 남성, 1년 이상 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있으며 흡연, 음주 습관이 있음. 안정 시 완화, 오래 앉아있을 시 악화되는 양상.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 67kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증은 지속적으로 나타나며 강도는 오르내림이 있다. 주로 앉아있을 때 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 성격을 띠며 야간에 심해지는

경향이 있다. 또한, 냉기에 노출되거나 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

과거 이상지질혈증 및 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 특이 가족력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 하루에 0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 간헐적으로 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 정도 수면을 취하지만, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 2점, 중도각성은 5점 만점 중 1점이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나는 경우가 있으나 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 10점 만점 중 2점 정도이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력 또한 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/69 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 36.1℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 84kg
- 활력징후: BP 177/106 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.0°C

■ 요약

47세 여성, 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨 진단 과거력 있으며, 스트레스와 과로 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 84kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이

악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 환자는 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다. 스트레스와 과로 시 증상이 악화된다고 하며, 휴식 시 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨 진단받고 혈압약 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하고 있으며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고 보통 정도의 양이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 두부에서 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 1/10 정도의 강도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 177/106 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색 설태, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 54kg
- 활력징후: BP 110/78 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.1°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원하였으며, 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리 통증이 시작되었다. 고혈압, 이상지질혈증의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 54kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 이상 6개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 냉기에 노출되거나

습한 환경에서 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 환자는 현재 증상이 악화 중이라고 진술하였다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 25개피의 흡연을 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량으로 복만 및 복통(4/5)을 호소한다. 구역, 구토 증상이 있고, 부패취의 트림을 하며, 신물이 올라오고, 입이 쓰다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증 외 사지 무력감을 느낀다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 저하된 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/78 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청 4/5, 어지러움 2/5 이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 77kg
- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

19세 여성, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족이 증상을 악화시키는 요인으로 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 164cm, 체중은 77kg, BMI는 28.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 오랜 시간 책상에 앉아 업무를 본 후 3일 전부터 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전부터 요통을 호소하였다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 양상이다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 평소 이상지질혈증으로 약물을

복용 중이다. 수면 부족과 장시간 앉아있는 자세가 통증을 악화시키는 요인으로 작용하는 것으로 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 35개피를 피운다. 운동은 중간 강도로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복부팽만과 복통이 가끔 나타난다. 구역감, 신물 오름, 쓴 맛을 느끼기도 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고, 잠들기 어려움(2/5)과 중간에 깨는 증상(1/5)이 있다. 기상 시 개운함을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 양상이다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색을 띄며, 혀의 크기는 크다.

- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 100kg
- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.7°C

■ 요약

20세 남성, 6개월 이상-1년 이내 허리 통증을 주소로 내원. 뻣뻣함과 함께 아침에 통증 심화. 평소 고강도 운동, 변비, 수족냉증, 전신 부종, 잦은 피로감 및 피부 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 100kg, BMI는 36.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 아침에 심하며, 활동 시에는 약간 완화되는 경향을 보인다. 통증의 양상은 묵직하고 무거운 느낌과 함께 칼로 찌르는 듯한 통증, 이동하는 듯한 통증을 동반하며,

야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간에 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많지 않으나, 수족냉증이 있으며 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 머리에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 묵직하고 이동하는 듯하며 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색을 띠며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:59:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 56kg
- 활력징후: BP 116/68 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.1°C

■ 요약

57세 남성 환자로 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원, 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 최근 증상 악화를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 176cm, 체중은 56kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

발현 시점 3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보이며, 찌르는 듯한 통증과 함께 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을수록 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소 완화된다고

한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 경미(1/5)하게 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)를 호소하며, 중도 각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 간혹 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 강도는 1/10이다. 통증은 움직일 때 심해지고, 밤에 악화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/68 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 작다(小).
- 설태: 백태가 얇게 덮여있다(薄苔).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부색(浮)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 47kg
- 활력징후: BP 155/94 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.1°C

■ 요약

46세 여성, 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 및 기름진 음식 섭취 시 악화되는 양상 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 156cm, 체중은 47kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 악화되는 양상을 보였다. 통증은 주로 무겁고 찌르는 듯하며, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고

호소한다. 과로하거나 기름진 음식을 섭취할 경우 통증이 더욱 심해진다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중강도로 꾸준히 하고 있다. 생리주기는 30일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간에 4회 정도 본다. 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 가끔 (1/5) 있으며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 더위를 타는 경향은 아니며, 수족냉증은 없다. 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 보통으로 나는 편이며, 특히 머리에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 무겁고 찌르는 듯한 통증이 나타난다. 오래 서 있을 때 악화되고 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 없고 무기력함을 느낀다. 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/94 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5 정도이며, 난청은 5/5로 심한 편이다. 어지럼증은 경미하다 (1/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다 (Enlarged).
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 83세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 88kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.6°C

■ 요약

83세 여성 환자로 1년 이상 요통을 호소하며, 과거 골프 스윙 중 허리 통증 발생. 변비, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 사지무력감, 피부건조 및 가려움, 이명, 난청, 무기력감, 창백한 면색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 88kg, BMI는 33.9이다.

【주소증】

1년 이상 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과거 골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 통증은 시간이 지남에 따라 비슷하거나 오르내림을 반복하는 양상을 보이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 띤다. 오래 서

있을 경우 통증이 악화되며, 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다. 통증 강도는 1/10으로 경미하다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 즐기는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상이 나타난다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애와 중도각성은 없는 편이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 다한(多汗) 증상이 있으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 없고 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부허(浮虛)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.7°C

■ 요약

67세 여성 환자로 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상 악화, 온찜질과 수면 시 증상 완화됨. 흑색변, 다한, 하지 부종, 사지 무력감, 기억력 저하, 활맥이 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 환자는 요통의 강도를 3/10으로 표현하며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다고 한다. 오래 서 있을 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 호전되는 경향이 있다. 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주를 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량으로 복만/복통을 3/5로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 멍이 잘 드는 경향이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 설체는 얇다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 83kg
- 활력징후: BP 146/90 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.4°C

■ 요약

36세 여성 환자로 1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원, 고혈압 병력 있으며 흡연력 존재

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 83kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소한다. 요통은 뻣뻣한 느낌과 함께 시작되었으며, 움직일 때 통증이 심해지는 양상을 보인다. 통증 강도는 2/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 띠며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 간헐적으로 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며 굳고 딱딱한 편이다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 9회 정도 보며, 야간뇨는 1회 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/90 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.4°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 부어있는(大) 설이다.
- 설태: 백색의 얇은 태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 61kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.2°C

■ 요약

37세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발병한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 고혈압이 있으며 혈압약 복용 중. 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 악화되었고 습한 환경과 음주 시 악화됨. 오한, 무한, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 61kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 요통이 발생하여 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔중하고, 움직일 때 심해지며, 쉬는 듯한 느낌이 있고, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며 따뜻하게 하면 호전되는

양상을 보인다. 습한 환경과 음주 시 통증이 악화된다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통(4/5)을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색으로, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)을 보인다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 4/10)을 호소하며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 백색 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:00:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 68kg
- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 112/분, 체온 36.6°C

■ 요약

47세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 골프/테니스 스윙 중 허리 통증 발생. 수면 시 완화되나, 오래 서있을 시 악화됨. 오한, 수족냉증, 전신 부종, 가려움, 사지 무력감, 침세맥, 강홍/자설, 백태 등의 소견 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 182cm, 체중은 68kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛),

유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띤다. 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화되며, 수면 시에도 호전된다고 한다. 환자는 발열은 없으나 오한을 느끼며, 수족냉증을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통이 간헐적으로 나타난다 (1/5). 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 자주 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띤다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 비교적 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 36.6℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증을 동반한다. 이명은 거의 없으며 (0/5), 난청은 경미한 수준이다 (1/5). 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 59kg
- 활력징후: BP 168/101 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.3°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 요통을 주소로 내원. 계단에서 미끄러진 후 발생한 통증이며, 스트레스, 무거운 짐, 찬바람에 의해 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 59kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 6개월 이상 지속되었으며, 호전 중이다. 통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때

악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 스트레스, 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통(4/5)이 있으며, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(입안이 씹) 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 168/101 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 설태의 두께는 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 78kg
- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 96/분, 체온 38.4°C

■ 요약

56세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 발생했으며, 온찜질로 완화됨. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 78kg, BMI는 29.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 무겁게 느껴지는 중통, 이동하는 듯한 유주통, 찌르는 듯한 자통의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있으며, 해당 질환으로 인해 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 가족력은 특이사항 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 경미하게 나타난다 (1/5).
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간에 4회, 야간에는 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5 정도이며, 중도각성은 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한은 보통 정도이며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 여러 양상 (중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력이 감퇴된 느낌을 받고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 38.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명은 1/5 정도의 강도로 들리며, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 설질은 담홍색이고 정상 크기이다.

- 설태: 설태는 회색을 띄며, 두꺼운 편이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 64kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.4°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 고혈압이 있으며, 가족력상 당뇨가 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 64kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 10점 만점 중 4점으로, 묵직한 느낌, 이동하는 느낌, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 찜질하면

완화된다고 한다. 찬바람에 통증이 악화되는 경향이 있다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통(4/5), 구역감, 부패취의 트림, 신물, 쓴맛을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠들기 어렵고(4/5), 자다가 자주 깬다(3/5). 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움(2/5)을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 69kg
- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.4°C

■ 요약

20세 남성, 1주일 이내 이사 중 허리 삐끗 후 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 69kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였으며, 증상이 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 특히 밤에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화되며, 습한 환경에서 불편감이 증가한다. 스트레칭 시 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 정도이며, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10 정도이며, 둔중한 통증과 함께 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 밤에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 건망이 있고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.4°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조한 편이고 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 61kg
- 활력징후: BP 107/71 mmHg, 맥박 120/분, 체온 37.6°C

■ 요약

49세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 계단에서 미끄러진 후 증상이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 152cm, 체중은 61kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 스트레스를 받을 시 증상이 악화되며, 스트레칭이나 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 통증은 주로 무겁게 느껴지며,

이동하는 듯한 양상, 찌르는 듯한 통증이 동반되고 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때, 냉기에 노출될 때 악화되며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통을 느끼며 (4/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간 정도이나, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (0/5) 및 중도각성 (0/5)은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 무거운 느낌, 이동하는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는 경향을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 전신 부종이 있고 멍이 잘 드는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/71 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않고 가려움증은 없다. 전신 부종이 관찰된다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다 (0/5). 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 허의 크기는 작다 (소).
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다 (회태, 박태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 70kg
- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.6°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 흡연 및 음주 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 70kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 뻣뻣하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 환자는 과거

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 걸쳐 나타난다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 몸이 차가워진다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 뻣뻣하고 무거운 느낌이 있다. 움직일 때 심해지고, 야간에 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 면색은 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:01:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 50kg
- 활력징후: BP 122/85 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.5°C

■ 요약

12세 남환, 1주일 전 이사 중 허리 삐끗한 후 발생한 요통을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 50kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 환자는 쭈시는 듯한 통증과 함께 움직일 때 통증이 심해진다고 호소한다. 온찜질 시 통증이 경감되는 것을 확인하였다. 악화 요인으로 흡연, 습한 환경, 장시간 앉아있는 자세 등을 언급하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피 정도이다. 평소 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 쏘시는 듯한 통증, 움직일 때 심해지는 통증, 밤에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 차가운 기운에 노출 시 심해지는 통증을 호소한다. 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/85 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명은 없으며, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 72세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 56kg
- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 91/분, 체온 38.1°C

■ 요약

72세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 고혈압이 있으며, 흡연 및 기름진 음식 섭취가 악화 요인으로 작용함. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생한 이후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 175cm, 체중은 56kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생했으며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 경우, 한(寒)에 노출될 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 경감된다고 한다. 고혈압을 앓고 있으며 혈압약을 복용 중이다. 감기 증상으로 발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한 증상은 없다. 콧물은 없고, 기침을 빈번하게 한다. 비염 증상으로는 재채기, 코막힘, 코 가려움은 없다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 38.1℃, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 70kg
- 활력징후: BP 109/71 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.5°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1개월 이상에서 3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스와 흡연이 악화 요인으로 작용한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 164cm, 체중은 70kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 호전 중이다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 1/10이다. 통증 양상은 중통(Heavy) - 습, 유주통(Moving) - 담음, 자통(Stabbing) - 어혈, 야간통(Worse at Night) - 어혈, 오래 서있으면 악화 - 기, 한통(Cold Pain) - 한, 득온즉감(Better w/ Warmth) -

한의 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 30일로 규칙적이나, Menopause 상태이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만/복통은 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 특별한 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/71 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.5°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 명이 절로 생긴다. 피부는 각질이 있고 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 140cm / 39kg
- 활력징후: BP 129/86 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.0°C

■ 요약

10세 남환, 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통으로 내원. 습한 환경, 음주, 흡연 시 악화되며, 수족냉증, 다한, 잦은 소변, 어지럼증, 건망 등의 증상 동반

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 39kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

환자는 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 습한 환경, 음주, 흡연 시 악화되는 경향을 보인다. 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며 오래 서있으면 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화되는

듯하다. 통증 강도는 3/10으로 평가된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회, 불규칙하며, 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다. 구역감과 신물 오름이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 비교적 길지만, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 더위, 추위를 심하게 타지 않으나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 특별한 통증은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/86 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 61kg
- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.8°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 6일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 스트레스와 과로 시 증상 악화를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 61kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6일 전부터 요통을 호소하며, 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 스트레스나 과로 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 야간에 통증이 심하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 목이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 활맥이다.
- 복합맥상: 침세맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 85세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 85kg
- 활력징후: BP 137/85 mmHg, 맥박 74/분, 체온 36.7°C

■ 요약

85세 여성 환자로, 1주-1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 잦은 음주와 흡연을 하며, 수족냉증과 다한, 소화불량 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 85kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증은 둔하고 무거운 느낌(重痛)이며, 때때로 허리 주변을 옮겨 다니는 양상(遊走痛)을 보인다. 또한 칼로 찌르는 듯한

통증(刺痛)이 있으며, 야간에 심해지는 경향을 보인다(夜間痛). 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

가끔 음주를 하고, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통(2/5)을 호소한다. 구역감, 신물, 구고(쓴맛) 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 흑색 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5)가 있으며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/85 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없다. 멍은 정상이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 작다.

- 설태: 백태, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 76kg
- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.0°C

■ 요약

58세 남성 환자로, 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 변비와 흑색변, 전신 부종, 사지무력감을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 76kg, BMI는 22.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 이어지고 있으며, 휴식을 취하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서

있을수록 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다고 호소한다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 2/5 정도로 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦) 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 72kg
- 활력징후: BP 107/60 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.3°C

■ 요약

77세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 스트레스, 무거운 짐, 수면 부족 시 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 72kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있거나 스트레스를 받거나 무거운 짐을

들거나 수면이 부족할 때 악화되며, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 또한, 한랭한 환경에서 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토 증상이 있고, 부패취의 트림을 하며, 신물이 올라오고, 구고(입안이 쓴 증상)를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗)이 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10), 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해진다. 오래 서 있거나, 한랭한 환경에서 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/60 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.3℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 어지러움을 호소한다 (5/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 117/분, 체온 36.4°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 혈압약 복용 중. 오래 앉아 일한 후 허리 통증이 시작되었고, 통증은 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night)의 양상을 보인다. 오래 서 있으면 통증이

심해지고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 심장병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통이 있다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다. 음수량은 0.5L 미만이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 더운 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이며, 어지러움이 5/5로 심한 편이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크고 부어있다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 58kg
- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.1°C

■ 요약

69세 남성, 6개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 58kg, BMI는 18.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다고 한다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화되는 경향이 있다. 과로하거나 찬바람을 쐬면 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 간헐적으로 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간에 9회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 5회 중 1회 있다.
- 한열: 평소 더위를 타는 경향은 아니며, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 오히려 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 둔하고 무거운 느낌이다. 움직일 때 통증이 심해지고, 야간에 악화된다. 냉기에 노출되거나 오래 서 있을 때 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이며, 기억력은 다소 감퇴되었으나, 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신에 부종은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 81kg
- 활력징후: BP 136/82 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.2°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력상 고혈압 및 심장병 가족력이 있으며, 흡연 습관과 불규칙한 식사, 수면 부족을 호소한다. 肥滿 체형이며, 寒熱 왕래, 땀, 소화 불량, 疲勞 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 81kg, BMI는 35.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 때로는 심해지기도 한다. 찬바람을 쐬거나 기름진 음식을 섭취하거나 과로하면 악화되고, 안정하거나 수면을 취하면 완화된다고 한다. 통증

양상은 묵직하고, 이동하며, 찌르는 듯하며, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 나아진다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일이나 불규칙하며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며 묽거나 연변이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다. 통증은 묵직하고, 이동하며, 찌르는 듯하며, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 나아진다고 한다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/82 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 69kg
- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.7°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 당뇨를 앓고 있으며, 흡연과 음주를 한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 69kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하는 양상을 보인다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

요통은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 띠며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고,

따뜻하게 하면 완화된다. 한기를 느끼는 통증이다. 환자는 통증 강도를 1/10으로 표현했다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 앓고 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루 5개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 규칙적이다. 복만/복통은 1/5 정도로 경미하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.7℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 호소하지 않으며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움을 3/5 정도 느낀다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 크다.
- 설태: 백색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 70kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.2°C

■ 요약

54세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨 현병력. 1주-1개월 이내 발현, 악화 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 70kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생했으며, 이후 통증이 악화되는 양상을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상으로 나타나며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을

경우 통증이 악화되며 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 악화 요인으로는 음주와 무거운 짐을 드는 행위가 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으나 절로 멍이 드는 경향이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청 5/5, 어지러움 0/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 46kg
- 활력징후: BP 114/72 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.8°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 추운 날씨에 야외 작업을 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 46kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1개월 이상-3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회 배뇨하고 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로 나며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/72 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부가 건조하고 가렵다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 활맥, 부삭맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 64kg
- 활력징후: BP 105/63 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.8°C

■ 요약

49세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 빠긋한 경험 있으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 64kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빠긋하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 통증 강도는 1/10으로

경미하다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력과 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/63 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.8℃, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 86kg
- 활력징후: BP 116/70 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.1°C

■ 요약

50세 남성, 1주일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 당뇨병 과거력, 잦은 음주 습관, 전신 부종 및 무력감, 변비, 다한, 오한, 수족냉증, 기억력 저하 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 86kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 묵직하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 특히 밤에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다고 호소한다. 온찜질 시

통증이 경감되는 것을 확인했다. 환자는 요통 외에도 전신 부종과 무력감을 호소하며, 피부 건조와 가려움증을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨병으로 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨병, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취한다. 소화는 보통이다. 구역감이 간혹 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠들기 어렵고 자다가 자주 깬다 (입면장애 5/5, 중도각성 5/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 묵직하고 움직일 때 심해지며, 밤에 악화된다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/70 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가렵다. 이명(2/5)과 난청(4/5)이 있다. 어지러움(3/5)을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 56kg
- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 82/분, 체온 36.1°C

■ 요약

81세 남성 환자로, 1주일 이내 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 묽은 변, 혈뇨, 두부 다한, 열감, 심한 난청, 침세활긴맥, 황박태 등의 소견을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 56kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고,

따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 붉은색의 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 36.1℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없으나, 피부 건조증과 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 65kg
- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.6°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 수면 부족과 음주가 악화 요인이며, 녹색의 묽은 변을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 65kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

발현 시점 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 정도 있다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.5°C

■ 요약

54세 남성 환자로 3개월 이상 6개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 시작. 수면 부족과 음주 시 악화되며, 스트레칭과 온찜질 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

발현 시점은 3개월 이상 6개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 2시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 둔중하고 움직이는 듯한 양상을 보이며, 찌르는 듯한 느낌도 동반된다. 특히 밤에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화된다. 차가운 환경에 노출되면 통증이 심해지나

따뜻하게 하면 완화된다. 수면 부족과 음주시 통증이 악화되는 경향을 보이며, 스트레칭이나 온찜질 시 통증이 경감된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림이 있고 신물이 올라오며, 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.5℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 73kg
- 활력징후: BP 158/95 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.7°C

■ 요약

60세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 발생, 습한 환경, 스트레스, 과로 시 악화되는 경향을 보임. 이상지질혈증으로 약물 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 73kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 습한 환경, 스트레스, 과로 시에 악화되는 경향을 보인다. 통증의 강도는 4/10으로, 중통, 유주통, 자통,

야간통의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 4/5, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변, 보통의 형태를 보인다.
- 소변: 맑은 색으로, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/95 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥, 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 61kg
- 활력징후: BP 119/66 mmHg, 맥박 82/분, 체온 37.7°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 잠을 잘못 잔 후 발생한 허리 뻣뻣함과 통증을 호소하며, 스트레스, 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아있는 경우 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 61kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 잠을 잘못 잔 후 발생했으며, 뻣뻣함과 함께 나타난다. 환자는 통증이 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는

경향이 있다고 한다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 환자는 스트레스, 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아있는 경우 증상이 악화된다고 호소하며, 식이 조절과 수면을 통해 일부 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 자주 한다. 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않으며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 땀이 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/66 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지럼증은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(enlarged)하다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 54kg
- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.1°C

■ 요약

54세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 계단에서 미끄러진 후 허리 통증이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 54kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

스트레스가 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가렵다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 62kg
- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.6°C

■ 요약

69세 남성 환자로, 3개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 병력 있으며, 흑색변, 혈뇨, 다한, 어지럼증, 이명 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 62kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

3개월 이상에서 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 점차 심해지는 양상을 보였다. 요통은 목직하게 누르는 듯한 중통(重痛)의 양상과 함께 이동하는 듯한 유주통(遊走痛), 찌르는 듯한 자통(刺痛)을 동반하며, 야간에 심해지는 경향을

보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되고, 따뜻하게 찜질하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 신물(酸水)이 올라오고 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 변의 상태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간에 9회, 야간에는 배뇨가 없다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5점 만점 중 2점, 중도각성은 5점 만점 중 1점이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 다한(多汗) 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.6℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 50kg
- 활력징후: BP 123/67 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.0°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 3개월 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 혈압약을 복용 중이다. 찬바람에 요통이 악화되고, 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 대변은 흑색 연변을 보이며, 오한을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 50kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 찬바람에 노출 시 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 현재 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 하는 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 23일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 1회 있다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 5점 만점에 True이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/67 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 약간 있으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 황태, 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 52kg
- 활력징후: BP 102/76 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.7°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 호소하며 내원. 과거력 및 가족력은 특이사항 없음. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출, 흡연 시 악화됨. 휴식 및 수면 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 168cm, 체중은 52kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 3/10 강도로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게

해주면 완화된단. 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출, 흡연 시 통증이 심해진다. 특별한 외상 병력은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0.0개피 정도 한다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 세끼 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 있다.
- 대변: 하루에 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리지만, 야간에 땀을 흘리는 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 둔하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 강도는 3/10 정도이다. 통증은 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/76 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 어지럼증을 호소한다 (4/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 32kg
- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.8°C

■ 요약

11세 남환, 1개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 허리 통증 시작되었으며, 습한 환경에서 악화되고 식이조절과 수면으로 완화됨. 오한, 잦은 땀, 수족냉증을 동반하며, 흑색변 및 소화불량 증상 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 32kg, BMI는 15.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 3/10 정도이다. 통증 양상은 무겁고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 느낌도 동반된다. 특히 밤에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며,

따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 습한 환경에서 통증이 심해지는 경향을 보이며, 식이조절과 충분한 수면 시에는 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만, 복통을 호소한다. 오심, 구역감이 있으며, 부패취의 트림을 하고 신물이 올라오며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 찬 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 통증 양상은 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 특온즉감의 특징을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.

- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 23세 / 남
- 신장/체중: 191cm / 63kg
- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.1°C

■ 요약

23세 남성 환자로, 3개월 전 이사 중 허리 부상 이후 발생한 요통과 소화불량을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 191cm, 체중은 63kg, BMI는 17.3이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였으며, 점차 악화되는 추세이다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향이 있다. 또한, 소화불량을 호소하며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다. 악화 요인으로는 기름진 음식과 음주가 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통의 성질을 가진다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력함을 느끼고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움을 느끼며, 면색은 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설.
- 설태: 백태, 후태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 63kg
- 활력징후: BP 109/63 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.0°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 현장직에 종사.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 63kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 요통이 지속되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지며, 찌르는 듯한 양상을 보이고 야간에 악화된다. 오래 서 있으면 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 병력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상, 신물, 구고(입이 씹), 부패취가 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤하거나 차가워진다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/63 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 65kg
- 활력징후: BP 113/76 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 소화불량, 수족냉증, 잦은 기침, 이명, 난청, 어지럼증을 동반하고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 65kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하였으며, 점차 호전되는 경과를 보이고 있다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이

악화되고 온찜질이나 스트레칭 시 완화된다. 습한 환경, 스트레스, 음주 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 매일 음주를 한다. 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통(2/5)이 있다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴맛을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘려도 상쾌한 느낌이 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/76 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.7℃, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 든다. 피부는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 56kg
- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 86/분, 체온 36.1°C

■ 요약

32세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원함. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 경직이 시작되었으며, 이상지질혈증을 앓고 있고 관련 약물을 복용 중임. 변비, 야간 도한, 오한 등의 증상을 동반하고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 56kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯한 양상(刺痛)을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되고, 온찜질이나 휴식을 취하면 완화된다.

환자는 또한 이상지질혈증을 앓고 있으며 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 목직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯한 양상이다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 71kg
- 활력징후: BP 115/70 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.6°C

■ 요약

47세 남성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 습한 환경과 음주 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 71kg, BMI는 24.3이다.

【주소증】

발현 시점은 3개월 이상에서 6개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다. 현재 호전 중인 상태이다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 요통을 호소하며, 통증은 주로 허리 부위에 나타난다. 통증의 양상은 무겁게 느껴지는 중통, 이동하는 듯한 유주통, 찌르는 듯한 자통, 밤에 심해지는 야간통의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 습한 환경과 음주 시 증상이 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/70 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하며, 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 황태와 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 78kg
- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.7°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 불규칙한 식습관, 수면의 질 저하, 잦은 녹색변, 전신 부종, 이명, 홍조 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 78kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증은 둔하고 무거운 느낌(重痛)이 있으며, 옮겨 다니는 양상(遊走痛), 칼로 찌르는 듯한 통증(刺痛)을 동반한다. 야간에 심해지는

경향을 보이며(夜間痛), 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다(得溫則減). 환자는 요통 외에도 하지냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 구고 등의 증상을 호소하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 더위를 타는 경향은 아니지만, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나(無汗), 야간에 땀이 나며(盜汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되었다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이다. 사지 무력감은 없으며, 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥, 허대맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 69kg
- 활력징후: BP 161/103 mmHg, 맥박 106/분, 체온 38.0°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1주일 이내 골프/테니스 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 과거력, 고혈압 가족력, 불규칙한 생리, 녹색 변, 혈뇨, 수족냉증, 이명, 어지럼, 암색 면색 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 69kg, BMI는 29.9이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 점차 악화되는 추세이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되며 따뜻하게

하면 완화되는 경향을 보인다. 찬바람/냉기 노출, 장시간 앉아있는 자세, 음주 시 통증이 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 구역/구토 증상이 간헐적으로 나타나며, 부패취와 신물이 올라오고 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나지만 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 161/103 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 38.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 57kg
- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.6°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 평소 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 기름진 음식 섭취, 과로, 수면 부족 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 57kg, BMI는 20.9이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 환자는 요통의 강도를 1/10으로 표현하며, 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)과 유사하고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우

통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 과거 흡연력이 있으며 현재는 하루 15개피의 담배를 피운다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 복만 및 복통은 1/5 정도로 경미하다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간에 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.6℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태이며, 약간 끈적한 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 침실(沈實)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 78kg
- 활력징후: BP 100/77 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.5°C

■ 요약

24세 남성, 1주일 전 골프/테니스 중 허리 통증 발생. 휴식 시 완화되나 오래 서있을 시 악화. 오한, 사지무력감, 피부건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지럼 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 178cm, 체중은 78kg, BMI는 24.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 운동 중 스윙 동작 시 갑작스러운 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 3/10 정도로 묵직하고 칼로 찌르는 듯하며, 쉬는 양상을 보인다. 특히 밤에 심해지는 경향이 있고,

오래 서 있을 경우 악화된다고 호소한다. 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 또한, 통증 부위가 이동하는 듯한 느낌을 받으며, 오한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지럼 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동은 주 3회, 1시간씩 하는 중등도 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 머리에서 땀이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고, 찌르는 듯하며, 쑤시는 통증이 있다. 통증 강도는 3/10 정도이며, 밤에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으며, 기억력과 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/77 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.5℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 절로 멍이 잘 든다. 부종은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 84kg
- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.4°C

■ 요약

66세 남성, 3개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과로, 장시간 좌위, 무거운 물건을 들 때 악화되며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력 및 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 무력감, 피부건조, 이명, 어지럼증, 황색 면색 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 84kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 뻣뻣하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지고, 찌르는 듯한 통증이 야간에 심화되는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

통증 강도는 1/10 정도로 경미한 수준이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 보통이다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에서 나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 뻣뻣하고 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 유주통, 찌르는 듯한 자통, 야간통, 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 따뜻하게 하면 완화되는 한통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 57kg
- 활력징후: BP 169/105 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.8°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 이사 중 허리 삔끗 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 잦은 기침, 소화불량, 수면 장애, 하지 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 냉수 선호, 잦은 대변, 무한 등의 증상을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 57kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삔끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삔끗한 이후 요통이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 장시간 앉아있을 때 악화되며, 안정을 취할 때 완화된다고 한다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에

심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때, 냉기에 노출될 때 통증이 심해지며 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 복만감 및 복통이 경미하게 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦) 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 경미하며, 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후 오히려 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 169/105 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.8°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 체질이다. 피부는 건조하며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지럼증은 경미하다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다(大舌).

- 설태: 황색의 후태(厚苔)가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 침세맥(沈細脈)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 50kg
- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.9°C

■ 요약

30세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 수면 부족과 불규칙한 식습관을 가지고 있으며, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 50kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

1개월 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소하며, 통증은 무거운 짐을 들거나 수면이 부족할 때, 기름진 음식을 섭취했을 때 악화되는 경향을 보인다. 통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 특징을 보이며, 야간에

심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 해주면 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste)가 있다. 부패취(Foul Belching)이 있다
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 12회, 야간 5회 빈뇨를 보인다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하지만, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도 각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.9℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(小).
- 설태: 회색, 니태(膩苔)를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 미약(微弱)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 150cm / 45kg
- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.8°C

■ 요약

13세 남환으로 1주-1개월 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 변비, 수족냉증, 전신 부종, 무력감, 이명, 어지러움, 소화불량 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 45kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있거나 찬바람에

노출될 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 2회 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 구토, 신물, 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.8℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 있으며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 65kg
- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.1°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1주-1개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압이 있으며, 장시간 앉아있거나 무거운 짐을 들 때, 음주시 통증이 악화되고 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 65kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 호전된다. 환자는 또한

수족냉증을 호소하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통을 겪고 있으며, 구역, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 과거 흡연력이 있으나 현재는 금연 중이다(0.0개피/일). 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 신물, 부패취, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 아침에 일어나면 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수(熱水)를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 56kg
- 활력징후: BP 115/67 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

69세 여성 환자로 1개월 이상-3개월 이내 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 56kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

발현 시점은 1개월 이상-3개월 이내이며 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 6일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무거운 물건을 들거나 흡연 시 악화되는 경향을 보인다. 온찜질이나 안정 시에는 통증이 완화된다고 한다. 통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 성격을 띠며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 나아지는 양상을

보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 구역/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림을 하고 신물이 올라오며, 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕은 높은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/67 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 79kg
- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.3°C

■ 요약

80세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증이 있으며, 수면 부족 및 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 79kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 잠을 잘못 잔 후 발생. 통증은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 경감된다고 호소한다. 음주, 수면 부족, 기름진 음식

섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

과거 흡연력이 있으며, 현재는 0.0개피/일 흡연한다. 음주는 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도 각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 73kg
- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 172cm, 체중은 73kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

온찜질 시 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있으며, 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있다. 부패취가 나는 트림을 하고, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5 정도이며, 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있는 편이다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 강도는 4/10 정도이다. 밤에 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없으며, 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 크고 붓는 듯한 느낌이 있다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 69kg
- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 118/분, 체온 35.3°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원함. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 흡연력이 있고, 찬바람에 악화되며 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보임. 피로감, 건망, 수족냉증을 동반하고, 침세완맥이 확인됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 69kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 2일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지며, 찌르는 듯한 양상으로 밤에

악화되는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 찬바람에 노출되면 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 15개피/일 흡연한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 4회/일 하며, 복만감과 복통이 간헐적으로 나타난다 (1/5). 구역감, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 음료는 따뜻한 것을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (1/10)이 있으며, 목직하고 움직일 때 심해지며 찌르는 듯한 양상으로 밤에 악화되는 경향이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 35.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 회색의 얇은 태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 63kg
- 활력징후: BP 114/80 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.5°C

■ 요약

57세 남성, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압을 가지고 있으며, 잦은 음주 습관이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 63kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소하며, 증상은 악화되는 추세이다. 요통은 주로 허리 부위에 나타나며, 뻣뻣함과 함께 통증을 동반한다. 통증은 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 양상, 찌르는 듯한 느낌, 밤에 심해지는 경향을 보이며,

오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증과 고혈압을 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

환자는 가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 잠이 얕고 아침에 일어나면 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 수면 중 자주 깬다(5회).
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리지만, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후에는 피곤하고 차가워지는 느낌이 든다.
- 통증: 허리 부위에 통증 강도는 4/10이며, 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 양상, 찌르는 듯한 느낌, 밤에 심해지는 경향을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/80 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍색을 띠며, 설체가 작다.

- 설태: 황색의 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 96kg
- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.3°C

■ 요약

31세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 병력 있으며, 습한 환경과 과로 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 96kg, BMI는 37.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 습한 환경과 과로 시 통증이 심해지는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취, 소화불량 증상으로 복만/복통(1/5)을 호소, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 5회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 알고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (1/10), 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth).
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.3°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 어지러움(5/5), 이명(3/5), 난청(1/5) 증상을 호소한다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 71kg
- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.5°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 가족력, 불규칙한 식습관, 얇은 수면, 다한, 수족냉증 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 162cm, 체중은 71kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있고, 오래 서 있을 때 악화된다고 한다. 온찜질 시 통증이

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 편이며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.5℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설(小舌)이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥꼭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 미약(微弱)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 63kg
- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.8°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 1주일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압이 있으며, 흡연력이 존재한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 63kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전부터 요통이 발생했으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 휴식 및 수면 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 특징을 보인다. 소화불량 증상으로

복만/복통(4/5)이 있으며, 수족냉증(Cold Limbs), 구역/구토(Nausea), 부패취(Foul Belching), 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste) 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 복만, 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 허리 부위 통증, 강도는 4/10, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통 등)을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/98 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.8℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 느끼지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 71kg
- 활력징후: BP 97/81 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.0°C

■ 요약

65세 남성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 발생했으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 71kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 착륙 시 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 묵직한 느낌과 함께 움직일 때 심해지는 경향을 보인다. 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 환자는

스트레스, 음주, 수면 부족 시 통증이 악화된다고 진술하였다. 식이조절과 충분한 수면은 통증 완화에 도움이 된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 중풍 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 한다. 복만, 복통을 호소하며, 구역감과 신물, 부패취가 느껴진다고 한다. 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간에는 배뇨하지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이며, 묵직하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 느껴진다. 오래 서있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있고 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 97/81 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명은 거의 없으며, 난청은 경미한 수준이다. 어지러움을 가끔 느낀다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기

- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 54kg
- 활력징후: BP 136/85 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.2°C

■ 요약

44세 남성, 1주일 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원. 평소 수면 부족, 찬바람 노출 시 악화되며, 소화불량, 흑색변, 혈뇨, 전신 부종, 오한, 잦은 피로감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 54kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프 스윙 중 요통이 발생한 이후 통증이 지속되고 있다고 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때마다 심해지는 양상을 보이며, 야간에 더욱 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며 따뜻하게

찜질하면 다소 완화되는 느낌이라고 한다. 환자는 평소 수면 부족을 느끼며 찬바람에 노출되면 통증이 심해진다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 자주 느낀다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 가끔 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 정도 소변을 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 잠자리가 얇고 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 잘 느끼며, 손발이 차갑고 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 목직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 야간에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/85 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.2°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증을 느낀다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태

- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 53kg
- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.1°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 1개월 이상 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 혈압약을 복용 중이다. 최근 장시간 앉아있거나 과로 시 증상이 악화되며, 안정 시 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 53kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전, 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통,

자통의 양상을 보이고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 장시간 앉아있거나 과로 시 증상이 악화되며, 안정 시 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 0회, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통, 유주통, 자통의 양상이다. 통증 강도는 3/10, 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 87kg
- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.5°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압, 당뇨 가족력이 있으며, 변비, 수면 장애, 전신 무한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 176cm, 체중은 87kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 점차 악화되는 양상이다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 계단에서 낙상 후 요통이 발생하였으며, 통증 강도는 4/10으로 보고하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게

하면 완화된다고 호소한다. 또한, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 복만/복통을 호소한다. 오심/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 12회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있으며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않는 무한(無汗)이며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 67kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.0°C

■ 요약

59세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 허리 통증 시작. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 스트레스 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 67kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 통증강도는 3/10이다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있으면 악화된다. 냉기에 노출되면 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 완화된다.

스트레스에 의해 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍의 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 복만/복통 3/5를 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태를 보인다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 2회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗)이 나타나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍들은 정상이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 83kg
- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.8°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 고혈압 및 당뇨 병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 83kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 허리 부위의 뻣뻣함과 통증이 발생하였다고 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 무거운 짐을 들거나 음주 시 통증이 심해진다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역이나 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠자리가 얇으며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 찬 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많이 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지럼증이 4/5 정도로 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기가 크다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 26세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 75kg
- 활력징후: BP 152/91 mmHg, 맥박 54/분, 체온 37.1°C

■ 요약

26세 여성 환자로, 현장직에 종사하며, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 굳어짐을 호소하며, 고혈압 병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 75kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

발현 시점은 1개월 이상-3개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다. 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다. 스트레스와

무거운 짐을 드는 것이 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

고혈압 병력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 구역/구토 증상이 나타날 수 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠이 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5점 만점 중 1점, 중도 각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 152/91 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 37.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 74kg
- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 장거리 비행 후 허리 통증이 시작되었으며, 이상지질혈증 및 고혈압 병력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 74kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(True/5)와 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 다한(多汗) 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 70kg
- 활력징후: BP 103/62 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.6°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 1년 전 이사 중 허리 부상 이후 발생한 요통을 주소로 내원. 수면 부족이 악화 요인이며, 따뜻하게 하거나 수면 시 완화됨. 소화불량, 녹색변, 빈뇨, 야간뇨, 무한, 오한, 수족냉증, 기억력 저하, 이명, 어지럼 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 153cm, 체중은 70kg, BMI는 29.9이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 무겁고 움직이는 듯하며 찌르는 듯한 양상을 보이고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다. 수면 부족 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 확인되지 않았다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

음주를 자주 하고, 흡연은 25개피/일, 고강도 운동을 한다. 폐경 상태이며, 생리 주기는 21일로 불규칙하고, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 수족냉증을 동반한다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴 맛을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 2회 빈뇨를 호소하며, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 깊은 잠을 자지 못하고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 잦다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 쭈시는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/62 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.6°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이며, 어지럼을 4/5 정도로 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 64kg
- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.8°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 당뇨 병력 있으며, 오래 앉아있는 습관과 습한 환경에서 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 64kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 시작되었으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 오래 앉아있거나 습한 환경에서 통증이 악화되고, 휴식을 취하거나 식이 조절을 하면 완화되는 경향을 보인다. 통증은 묵직하고 움직이는

듯하며 찌르는 듯한 양상을 띠고, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 호전되는 양상이다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만감과 복통이 3/5 정도이다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있으나 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지고, 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 백태, 박태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 60kg
- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.3°C

■ 요약

52세 여성 환자로 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 묽은 변, 다한, 기억력 저하, 어지럼증, 소화불량 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 60kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

3개월 이상에서 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 발생한 요통으로 내원하였으며, 통증 강도는 4/10으로 보고하였다. 통증은 무겁고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되며,

찬 기운에 노출되면 악화된다고 호소하였다. 환자는 또한 전신 부종과 사지 무력감을 동반하고 있다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루에 15개피의 담배를 피우는 흡연자이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 묽은 변 또는 연변을 보며, 색은 황갈색이다.
- 소변: 주간 4회 소변을 보며, 야간뇨는 없다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다고 호소한다.
- 통증: 요통을 주소로 하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이다. 피로감을 호소한다.
- 면색: 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 설질은 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 32kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.2°C

■ 요약

11세 남환, 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 32kg, BMI는 15.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 약 1주-1개월 전 장시간 운전 후 차에서 내리면서 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 지속적으로 나타났다고 전하며, 주로 허리 부위에 나타난다. 통증의 양상은 무겁고 쑤시는 듯하며, 칼로 찌르는 듯한 통증도 동반된다고 한다. 야간에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 찜질하면 통증이

완화된다고 한다. 요통 외에 다른 증상은 호소하지 않았다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간에 2회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 더위와 추위를 잘 타지 않는다. 찬 음료보다는 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 식은땀을 흘리는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다. 통증은 무겁고, 쑤시고, 칼로 찌르는 듯하며, 야간에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 64kg
- 활력징후: BP 102/72 mmHg, 맥박 62/분, 체온 38.3°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력으로 이상지질혈증 및 고혈압이 있으며, 다한, 열감, 소화불량 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 64kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 환자는 감기 증상, 비염 증상은 호소하지

않았다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 깊은 잠을 자지만 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한하며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처는 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/72 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 38.3℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조한 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지러움은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(Enlarged).
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 133cm / 34kg
- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 58/분, 체온 37.5°C

■ 요약

10세 남자 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 호소하며 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 변비와 잦은 소변, 수면 부족, 다한, 사지 무력감, 피부 가려움 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남 환자로 학생이다. 신장은 133cm, 체중은 34kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

요통은 3개월 전 장시간 운전 후 발생하였으며, 점차 호전되는 경과를 보인다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화되는 양상을 보이며, 따뜻하게 하면 경감되는 경향이

있다. 한냉(寒冷)에 노출 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있으며, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 12회, 야간 3회로 빈뇨 경향을 보인다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있고, 냉수를 선호한다. 땀을 많이 흘리는 다한(多汗) 증상이 있으며, 전신에서 나타나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 69kg
- 활력징후: BP 113/74 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.2°C

■ 요약

48세 남성, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 69kg, BMI는 20.2이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 장거리 비행 후 요통이 발생했으며, 통증은 지속적으로 나타났다. 통증의 양상은 묵직하고 움직일 때마다 심해지는 양상을 보이며, 야간에 더욱 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고 따뜻하게 해주면 완화되는 느낌이 있다고 한다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍 등의 질환이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며, 깊게 자는 편이나 기상 시 몸이 무겁다. 입면 및 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소에 더위를 타는 편은 아니며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 특히 머리에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직하고 쑤시는 듯한 통증이 나타난다. 오래 서 있을수록 악화된다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 다소 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/74 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 48kg
- 활력징후: BP 106/77 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.7°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 흑색변, 잦은 배변, 오한, 어지러움, 창백한 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 48kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 5시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 호소한다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타나며, 특히 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고

한다. 감기, 비염 증상은 보이지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다. 수면 시간이 5시간으로 부족하며, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 경미(1/5)하게 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/77 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 어지러움을 4/5 강도로 느끼며, 이명은 3/5, 난청은 1/5 강도로 나타난다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)

- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 58kg
- 활력징후: BP 101/78 mmHg, 맥박 71/분, 체온 38.0°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 2-3일 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 저체온, 변비, 수족냉증, 이명, 어지럼 등을 동반하고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 현장직에 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 58kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 계단에서 미끄러진 후 요통이 발생하였으며, 현재 호전 중이다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain),

득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증(Cold Limbs), 구역/구토(Nausea), 부패취(Foul Belching), 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste) 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/78 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 38.0℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍은 정상이다. 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지럼을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 강력이다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 부대이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 76kg
- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.4°C

■ 요약

45세 여성, 1일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 76kg, BMI는 34.2이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

요통은 잠을 잘못 잔 후 발생했으며, 악화되는 경과를 보인다. 무거운 짐을 들 때 악화되고, 안정하거나 스트레칭을 하면 완화된다고 한다. 이상지질혈증 및 고혈압의 현병력이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이고 오래 서있으면 악화되며 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 없다. 저체온 증상을 보인다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 32세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 59kg
- 활력징후: BP 117/70 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.4°C

■ 요약

32세 여성 환자로, 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증이 있으며, 찬바람에 악화되고 스트레칭 시 완화되는 양상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 59kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원하였다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지는 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 찬바람에 노출 시 악화되며, 스트레칭 시 통증이 경감된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 저강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 5시간 정도 자며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 둔중하고 움직일 때 심해지며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력은 좋고 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/70 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 98kg
- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.9°C

■ 요약

53세 남성, 1일 전부터 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있으며, 오래 앉아있는 자세로 인해 증상 발생. 흑색변, 혈뇨, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 난청, 홍조, 침세삼맥, 담홍색 대니태 설진 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 98kg, BMI는 32.7이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며 오래 서 있을 경우 악화된다. 온찜질 시

통증이 경감되는 양상을 보인다. 환자는 찬바람에 노출될 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 치료 중이다. 복용 약물로는 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약이 있다.

【가족력】

가족력 상 당뇨병력이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루 0개피이며, 운동은 고강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 복만감 및 복통을 호소한다. 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 구고(口苦)를 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 비교적 깊게 자는 편이나, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.9℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 크다(大/태).
- 설태: 황색의 니태(膩苔)를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 현긴(弦緊)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 59kg
- 활력징후: BP 117/64 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.8°C

■ 요약

48세 여성 환자로, 1일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 스트레스와 냉기에 증상이 악화되고, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 59kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 찬바람에 노출되거나

스트레스를 받으면 증상이 악화되며, 식이 조절 시 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 23일이며 불규칙하고, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감과 구토 증상이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있다. 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 굵기이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 손발이 차고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 보통 정도로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하된 상태이다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/64 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지럼증은 경미한 수준 (1/5)이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 66kg
- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.9°C

■ 요약

35세 여성, 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 66kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1일 전, 무거운 물건을 들다가 허리에서 '뚝' 소리가 난 후 요통이 발생하였다. 통증은 점차 악화되는 추세이며, 주로 무겁고 짓누르는 듯한 통증(重痛), 이동하는 듯한 통증(遊走痛), 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 나타난다. 특히 야간에 통증이 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 때 통증이 악화된다고 한다. 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고

호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리 주기는 불규칙하며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이지만, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 3/10 정도의 강도이며, 묵직하고, 찌르는 듯하며, 이동하는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 비교적 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명은 1/5 강도, 난청은 2/5 강도로 나타난다. 어지럼증은 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 황색 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 61kg
- 활력징후: BP 138/83 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.8°C

■ 요약

58세 여성 환자로, 1일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 무거운 짐을 들거나 과로, 음주 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 61kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 무거운 짐을 들거나 음주, 과로 시 악화되며, 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는

경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 정도 있다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽거나 연변의 양상을 보인다.
- 소변: 맑은 색으로 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 특별한 오한이나 발열은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/83 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.8℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 72kg
- 활력징후: BP 119/78 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.9°C

■ 요약

77세 여성 환자로, 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 습한 환경에서 통증이 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 72kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 특히 야간과 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 습한 환경에서 통증이 심해지고 온찜질 시

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 0점이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많은 편이며, 발한 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 10점 만점에 1점 강도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/78 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.9℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지무력감은 없다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 작다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 46kg
- 활력징후: BP 153/97 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.6°C

■ 요약

36세 여성 환자로, 1일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 46kg, BMI는 16.9이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 골프/테니스 스윙 중 급작스럽게 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/97 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 체질이다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 없다. 어지러움을 3/5 정도 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 55kg
- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.8°C

■ 요약

81세 남성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력상 고혈압이 있으며, 변비, 혈뇨, 수족냉증, 전신부종, 기억력 저하, 식사 불규칙, 수면 장애 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 55kg, BMI는 16.6이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 금일 오전부터 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯한 느낌이 있으며, 찌르는 듯한 양상도 동반한다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 통증이 다소

완화된다고 한다. 과거에도 유사한 통증이 간헐적으로 있었으나, 이번에는 증상이 지속되어 내원하였다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 술은 마시지 않으며, 담배는 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간에 12회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5이며, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 머리에서 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않는다 (無汗). 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상도 동반한다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며 스트레스에 대한 대처 능력이 낮다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/81 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.8°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다/태하다.

- 설태: 황색이고 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 76kg
- 활력징후: BP 143/99 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.5°C

■ 요약

40세 여성 환자로 2-3일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 평소 고강도 운동을 즐기며, 최근 피로감과 전신 부종, 피부 가려움, 소화불량, 변비 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 76kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하거나 오르내림이 있다. 온찜질 및 수면 시 통증이 완화되는 경향을 보인다. 통증의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을

보이고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 특징이 있다. 환자는 감기 증상으로 발열, 오한, 콧물, 기침은 호소하지 않으며, 비염 증상으로 재채기, 코막힘, 코 가려움 또한 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만/복통을 3/5로 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 대변을 보통 정도의 굳기로 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 땀이 나는 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 기억력은 양호하며 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/99 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 백태, 다테이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 96kg
- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.6°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 1일 전 이사 중 짐을 나르다 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 148cm, 체중은 96kg, BMI는 43.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리 부위에 급작스러운 통증을 느껴 내원하였다. 통증은 지속적으로 나타나며, 강도는 4/10 정도로 환자는 호소한다. 통증의 양상은 무겁게 짓누르는 듯한 중통(重痛), 이동하는 듯한 유주통(遊走痛), 찌르는 듯한 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면 장애(5/5) 및 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 오히려 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 지속적인 통증이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 스스로 평가한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/72 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명(3/5)과 난청(4/5)을 호소하며, 어지럼증(4/5)이 있다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 60kg
- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 52/분, 체온 36.1°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1일 전 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 흡연, 스트레스, 장시간 앉아있는 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 60kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 것이 발병의 원인이 되었다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리 부위의 좌섬(挫閃)으로 인해 요통이 발생하였다. 통증은 중통(重痛)의 양상을 보이며, 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)이 동반된다. 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되며, 온찜질 시

통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 소화는 보통이다. 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 대변을 보통 정도의 양으로 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요부에 중통, 유주통, 자통이 나타나며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 52회/분, 체온 36.1°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크고 팽대한 설(大/胎)이다.
- 설태: 회색의 니태(膩苔)가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)

- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부긴실(浮緊實)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 74kg
- 활력징후: BP 144/94 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.3°C

■ 요약

64세 남성, 2-3일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소하며 내원. 오한, 다한, 땀은 변, 혈뇨, 무기력, 피부 가려움, 이명, 난청, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 74kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 장시간 운전 후 갑작스럽게 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)과 같이 묵직하고 무거운 느낌이 있으며, 유주통(遊走痛)의 양상으로 옮겨 다니는 듯한 느낌이 동반된다. 또한,

자통(刺痛)과 같이 찌르는 듯한 통증이 나타나며, 특히 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 찬바람이나 냉기에 노출될 경우에도 악화된다. 따뜻하게 찜질하거나 스트레칭을 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 과거에 소량 흡연하였으나 현재는 금연 중이다. 평소 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만감과 복통이 경미하게 나타난다. 구역감, 신물, 구고, 부패취가 동반된다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 다소 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/94 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지에 부종이 있으며, 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:12:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 48kg
- 활력징후: BP 101/71 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.8°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 1일 전부터 요통을 주소로 내원. 흡연력 있으며, 오래 앉아있는 자세 후 요통 발생. 변비, 다한, 오한, 사지무력감, 이명, 어지러움, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 48kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌(重痛)이며, 위치가 이동하는 양상(遊走痛)을 보인다. 또한 칼로 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 있고, 밤에 심해지는 경향(夜間痛)을 보인다. 오래 서 있을수록 악화되고,

따뜻하게 하면 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고
- 대변: 변비, 흑색변, 보통
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 12시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 오한, 추위탐, 온수 선호, 수족냉증 없음
- 땀: 다한, 야간/도한, 땀 흘린 후 상쾌함
- 통증: 요통 (3/10, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감)
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 능력 낮음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/71 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.8°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면부종, 피부 건조도 정상, 가려움증, 사지무력감
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 77kg
- 활력징후: BP 158/96 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.3°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 기저질환으로 가지고 있으며, 땀, 소화불량, 수면 문제, 무력감 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 77kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 환경에서 야외 작업 후 요통이 발생했으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 호전된다고 한다. 습한 환경에서

증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만감과 복통이 있다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 없으나 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/96 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.3℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움이 2/5 정도 있다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 薄하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 80kg
- 활력징후: BP 114/73 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.2°C

■ 요약

69세 남성 환자로 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 80kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 무거운 물건을 들다가 허리 부위에서 '뚝'하는 소리와 함께 요통이 발생했다고 한다. 통증은 지속적으로 나타나며, 쉬는 듯한 느낌과 함께 칼로 찌르는 듯한 통증을 동반한다고 호소한다. 특히 밤에 통증이 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 경우 통증이 악화된다고 한다. 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화되는 느낌이 있다고 한다.

찬바람이나 냉기에 노출되면 통증이 악화되는 것을 느낀다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 중풍 병력이 있는 것으로 확인되었다.

【사회력】

환자는 술은 마시지 않으며, 담배는 하루에 0개피를 피운다고 한다. 평소 중간 강도의 운동을 규칙적으로 한다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 세 끼 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 변의 상태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간에 9회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠을 깊게 못 자고 기상 시 피곤함을 느낀다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 더위나 추위를 심하게 타지 않으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌한 느낌이 든다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 쑤시는 듯하고 칼로 찌르는 듯한 통증이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다. 통증은 밤에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하된 상태이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/73 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신에 무력감이 있으며, 부종은 없고 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 끈적한 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 79kg
- 활력징후: BP 126/87 mmHg, 맥박 112/분, 체온 36.4°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 1일 전 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 수면 부족, 야간 도한, 녹색변, 혈뇨 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 79kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게

하면 다소 완화되는 양상을 보인다. 통증 강도는 1/10으로 평가된다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 구역감과 신물, 쓴맛을 호소한다. 부패취가 나는 트림이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 하루 3시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증이 있으며, 쑤시는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/87 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 51kg
- 활력징후: BP 154/98 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.0°C

■ 요약

52세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중이다. 허리 통증은 잠을 잘못 잔 후 아침부터 시작되었고, 뻣뻣한 느낌과 함께 통증이 동반된다. 소화불량, 수족냉증, 흑색변, 혈뇨 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 51kg, BMI는 14.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 허리 부위에 집중되며, 뻣뻣한 느낌과 함께 나타난다. 통증의

강도는 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 기름진 음식을 섭취하거나 무거운 짐을 들 때 통증이 심해진다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압, 심장병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위 통증이 있으며, 강도는 3/10이다. 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/98 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.0℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5이며, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)

- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 72kg
- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.0°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 1일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 72kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생하였으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다. 또한, 발열은 없으나 저체온 상태이며, 오한은 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

매일 음주를 하고, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 있으나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 2/10 강도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력함을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/73 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 36kg
- 활력징후: BP 131/82 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.5°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 2-3일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력은 없으며, 가족력으로 고혈압이 있다. 흑색변을 2-3회/일 배변하며, 다한, 열감, 얇은 잠, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 어지럼 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 36kg, BMI는 16.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 골프/테니스 스윙 중 요통이 발생한 이후 증상이 악화되는 양상을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 성격을 가지며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하거나 수면을

취하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 복만/복통을 4/5 강도로 호소하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감과 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/82 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.5℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 51kg
- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.6°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 호소하며 내원. 과거력 상 중풍 가족력이 있으며, 스트레스, 장시간 앉아있는 습관, 음주 등이 악화 요인으로 작용. 식이 조절과 따뜻하게 하는 것으로 통증 완화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 51kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 요통을 호소하였다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보였다. 오래 서 있을 때와 스트레스, 음주 시 통증이 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통은 4/5 강도이다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않는 편이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통으로 땀이 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다. 이명은 0/5, 난청은 2/5 강도이다. 어지러움은 1/5 강도이다.
- 면색: 정상 면색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍설 또는 자설, 큰 설(대설)이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 71세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 90kg
- 활력징후: BP 119/68 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.1°C

■ 요약

71세 남성, 1일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 90kg, BMI는 32.7이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)의 양상과 함께 움직일 때 심해지는 유주통(moving pain)의 특징을 보인다. 또한 자통(stabbing pain)과 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 흡연하였으나 현재는 금연 중이다. 운동은 규칙적으로 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 간헐적으로 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 주로 전신에서 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 2/10 강도의 통증이 있으며, 묵직하고 쑤시는 듯한 느낌이다. 오래 서 있을 때 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/68 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상적인 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5로 심한 편이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 64kg
- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.7°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압 및 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 장시간 앉아 일한 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 64kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 통증을 1/10 강도로 호소하며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain), 야간통, 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(cold pain), 득온즉감(better with warmth)의 특징을 보인다고 진술하였다.

【발병 에피소드】

환자는 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 요통을 호소하며, 증상은 악화 중이다. 통증은 묵직하고, 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상을 보이며 밤에 심해진다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 통증의 강도는 1/10 정도이다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통, 오심/구토는 1/5 정도이다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 5회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 오한 증상은 전혀 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않고 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 52kg
- 활력징후: BP 113/73 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.5°C

■ 요약

15세 남성 환자로 2-3일 전 계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찢은 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 52kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찢은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하거나 오르내림을 보인다. 과로 및 음주 시 악화되는 경향이 있다. 통증 양상은 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 통증 강도는 2/10으로 보고된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호하며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 허리 부위 통증이 있으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 성질을 가진다. 통증 강도는 2/10이고, 빈도는 지속적이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/73 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 건조하며 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 63kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.6°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 2-3일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 63kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 과로 시 통증이 심해진다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 한다. 복만감과 복통이 있으며, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 얇은 잠을 자며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다. 입면장애는 없으나 중도각성이 잦다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수보다 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 어지럼증을 가끔 느낀다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 회색의 얇은 설태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 68kg
- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.9°C

■ 요약

52세 남성, 2-3일 전 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 및 고혈압 병력 있으며, 음주 습관이 있고, 변비 및 수족냉증을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 68kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 것이 발병의 원인으로 추정된다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 이사 작업 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 심하지 않으나 (2/10), 중통(重痛)의 양상을 보이며, 움직일 때 통증 부위가 변하는 유주통(遊走痛)의 특징을 보인다. 또한, 찌르는 듯한

자통(刺痛)과 야간에 심해지는 야간통(夜間痛)을 호소하며, 오래 서 있을 경우 통증이 악화된다고 한다. 온찜질 및 수면 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압으로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (상기 기술).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/90 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띠며, 혀의 크기는 크고 태가 많다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 침실(沈實)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 70kg
- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.4°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스와 음주가 악화 요인으로 작용한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 70kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 요통을 호소하며, 증상이 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동하는 듯하며(遊走痛), 찌르는 듯한 양상(刺痛)을 띠고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면

호전되는 양상을 보인다. 환자는 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 음주와 스트레스가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 안정과 스트레칭 시 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증을 느낀다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움이 2/5 정도 있다. 면색은 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 65kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.1°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 야간 다한, 열감, 소변 이상 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 168cm, 체중은 65kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 후 발생한 요통을 호소하며, 통증은 점차 악화되는 양상이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면

통증이 악화되고 따뜻하게 해주면 완화된다고 한다. 동반 증상으로 야간 다한, 열감, 적색뇨를 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하고, 흡연은 25개피/일로 25년 이상 흡연하였다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통(1/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.1°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없다. 이명(4/5), 난청(3/5), 어지럼(3/5)이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 48kg
- 활력징후: BP 113/60 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.8°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 호소하며 내원. 장시간 앉아있는 습관과 과로가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 48kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 앉아있는 자세에서 악화되고 온찜질이나 휴식으로 완화된다고 한다. 통증의 양상은 무겁고, 움직이는 듯하며, 찌르는 듯하고, 밤에 심해지는 경향이

있으며, 오래 서있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/60 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 형태는 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 85kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.7°C

■ 요약

58세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 음주와 흡연을 한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 85kg, BMI는 38.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

1년 이상 요통이 지속되었으며, 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 밤에 더 심해지는 경향이 있으며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 오래 서있으면 악화된다고

한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

직업은 현장직이며, 음주를 가끔 하고, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 있으나 구토는 하지 않는다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회 정도 소변을 보고, 야간뇨는 없다. 소변 색깔은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 나며 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 어지럼을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 80kg
- 활력징후: BP 113/77 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 이사 중 허리 부상 이후 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 음주력 있으며, 흑색변, 혈뇨, 무한, 오한, 수족냉증, 사지무력감, 가려움, 이명, 난청, 창백한 안색 등의 증상을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 80kg, BMI는 36.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생했으며, 통증은 지속적으로 오르내리는 양상을 보인다. 환자는 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)을 호소하며, 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

또한, 냉기에 노출될 때 통증이 심해지며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 평소 중간 강도의 운동을 한다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 전혀 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/77 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍은 정상이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다(大).
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다(厚苔).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 78kg
- 활력징후: BP 116/79 mmHg, 맥박 111/분, 체온 36.8°C

■ 요약

77세 남성 환자로 3개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있으며, 다한, 변비, 수면장애, 전신부종, 사지무력감, 기억력 감퇴 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 78kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 띠고 야간에 심해지는 경향이 있다.

오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 습한 환경에서 통증이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 진단받았으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 복만감과 복통이 있다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/79 mmHg, 맥박 111회/분, 체온 36.8℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이며, 어지럼증은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 22세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 73kg
- 활력징후: BP 170/108 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.2°C

■ 요약

22세 남성 환자로, 3개월 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압 및 당뇨 가족력이 있으며, 평소 기름진 음식을 즐기고 불규칙한 식습관을 가지고 있다. 변비, 다한, 오한, 수족냉증을 동반하며, 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 73kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 계단에서 미끄러진 후 요통이 발생하여 점차 심해지는 양상이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 경향을 보인다. 특히 밤에 심해지며, 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면

통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 구역감이 있고 신물이 올라온다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굵기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이지만 잠자리가 얇고, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 중도 각성이 잦다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 묵직하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있고 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/108 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느낀다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 박태가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 59kg
- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.3°C

■ 요약

45세 여성 환자로 1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거 당뇨 및 중풍 가족력이 있으며, 소변에서 혈뇨 증상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 59kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 1/10 정도이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서있을 경우 악화되고 온찜질이나 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 변의 상태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.3°C, 호흡 19회/분이다.
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설(小舌)이다.
- 설태: 황태, 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이다.
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)이다.
- 맥력: 무력(無力)하다.

- 맥상: 삼맥(滯脈)이다.
- 복합맥상: 부허(浮虛)하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 64kg
- 활력징후: BP 120/88 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.5°C

■ 요약

25세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 최근 책상에 오래 앉아 일한 후 증상이 악화되었으며, 고혈압 및 이상지질혈증 병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 64kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 최근 증상이 악화되었다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있으면 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 환자는 찬바람/냉기(冷氣), 수면부족(睡眠不足), 과로(過勞) 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 32일로 규칙적이며, 기간은 7일이다. 생리통은 8/10 정도로 심한 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화불량 증상을 호소한다. 복만/복통은 2/5 강도이다. 구역/구토, 부패취(腐敗臭), 신물(酸水), 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠들기 어렵고, 자다가 자주 깨며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/88 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상

- 설태: 백태, 다테

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 152cm / 52kg
- 활력징후: BP 105/72 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.0°C

■ 요약

14세 남학생, 1주-1개월 전부터 발생한 요통으로 내원. 수면 부족, 스트레스, 무거운 짐 등으로 악화되며, 소변 이상 (혈뇨, 빈뇨), 전신 땀, 오한, 사지무력감, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 152cm, 체중은 52kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 수면 부족 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감된다고

한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 한다. 복만, 복통 (4/5), 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 5회 빈뇨가 있다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5)를 호소한다. 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/72 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 생긴다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 61kg
- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.4°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스윙 중 허리 통증이 발생한 이후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 61kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 골프 또는 테니스를 치던 중 스윙 동작에서 허리에 통증이 발생한 이후로, 약 1개월에서 3개월 동안 요통이 지속되고 있다고 호소하였다. 통증은 주로 무겁게 느껴지는 중통, 옮겨 다니는 유주통, 찌르는 듯한 자통의

양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 찬바람이나 냉기에 노출되면 증상이 악화되는 것을 느낀다고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다. 복용 약물에 대한 구체적인 정보는 확인되지 않았다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다(0개피/일). 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루에 한 번 불규칙하게 하며, 오심 및 구토 증상은 있다.
- 대변: 하루에 한 번 흑색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없으며, 땀을 흘리지 않는 무한 경향을 보이고, 야간에 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통)으로 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 71kg
- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.0°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 1년 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원. 잦은 묶은 변, 혈뇨, 다한, 오한, 어지러움, 사지무력감 등을 동반하며, 스트레스에 취약하고 기름진 음식과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 180cm, 체중은 71kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 통증 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이고, 오래 서 있을 때와 차가운 기운에 노출될 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다. 요통과 함께 잦은 묶은 변,

혈뇨, 다한, 오한, 어지러움, 사지무력감, 피부 각질 및 가려움증을 동반한다. 기름진 음식 섭취 및 수면 부족 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 5개피/일, 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화는 보통, 오심 및 구토 증상은 경미(1/5)하게 있다. 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증 외 다른 부위 통증은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.0℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 어지러움(4/5)과 사지무력감을 호소한다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 大하다.
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 66kg
- 활력징후: BP 110/62 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.2°C

■ 요약

20세 여성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 굳어짐을 호소한다. 당뇨병 과거력이 있으며, 녹색 변, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명 및 난청을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 66kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 5시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 2/10이다. 통증 양상은 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing),

야간통, 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다. 환자는 현재 호전 중이라고 진술하였다.

【과거력】

당뇨병 과거력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하다. 소화불량 증상으로 복만/복통 2/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 3회이다.
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 두부에 땀이 많고, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조 및 가려움이 있다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/62 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명은 정상이다. 이명 강도 4/5, 난청 5/5, 어지러움 0/5.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 134/86 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.9°C

■ 요약

26세 남성, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압 및 심장병 가족력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

발현 시점 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상에서 1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있다. 통증 양상은 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다. 통증 강도는 2/10으로 보고되었다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화 상태는 보통이며, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/86 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.9°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부에 가려움이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.

- 맥상: 삽맥이다. 복합맥상으로 미약하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 58kg
- 활력징후: BP 174/105 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

16세 여성 환자로, 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압 및 당뇨 가족력이 있으며, 찬바람, 음주, 습한 환경에 의해 악화되고 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 163cm, 체중은 58kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 허리 부위의 통증이 발생하였으며, 이후 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 둔중하고 움직일 때 심해지는 경향이 있으며, 야간에 더욱 심해지는 자통의 양상을 띤다. 찬바람을 쐬거나 음주

후, 습한 환경에서 통증이 악화되며, 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색을 띠고 보통 굳기이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 둔중하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 있으며, 야간에 심해지고 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 나쁘고 의욕이 없다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 174/105 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명은 1/5 강도이며, 난청은 없다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 75kg
- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.2°C

■ 요약

53세 여성, 1주일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 75kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 무거운 물건을 들다가 허리에서 '뚝' 하는 소리와 함께 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만감과 복통을 4/5로 호소한다. 구역감, 부패취의 트림, 신물 올라옴, 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색 변을 보통 정도로 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색 설이며, 혀가 크다(enlarged).
- 설태: 황색 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 193cm / 64kg
- 활력징후: BP 170/101 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.0°C

■ 요약

41세 남성 환자로, 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 묽은 변, 잦은 소변, 불면, 전신 무력감, 피부 가려움, 이명, 소화불량 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 193cm, 체중은 64kg, BMI는 17.2이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 특히 두부에서 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되고, 온찜질 시 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/101 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 완맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 66kg
- 활력징후: BP 117/72 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.2°C

■ 요약

63세 남성, 1주일 이내 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 66kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생하였으며, 이후 통증이 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 환자는 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)을 호소하며, 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을

경우 악화된다고 한다. 냉기에 노출되면 통증이 심해지며, 온찜질이나 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/72 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 어지러움을 호소하며, 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 61kg
- 활력징후: BP 106/67 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.0°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 61kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 양상, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 과거력 상 이상지질혈증,

고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 스트레스와 습한 환경에 의해 증상이 악화되며, 안정을 취하면 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 약물 복용 중.

【가족력】

당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동강도는 높음.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 땀을 흘리는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 무거운 느낌, 움직이는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌이 있고, 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/67 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.0℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 피부가 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 백태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 136cm / 36kg
- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.8°C

■ 요약

11세 여자 환자로, 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며 내원. 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리 통증이 시작되었고, 스트레칭과 온찜질 시 증상 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여자 환자로 학생이다. 신장은 136cm, 체중은 36kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 5일 전부터 발생한 요통을 호소하며, 통증 강도는 1/10이다. 통증 양상은 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을

보인다. 스트레칭과 온찜질 시 증상이 완화된다. 음주와 수면 부족 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙적이며, 복만/복통은 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리에 통증이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/66 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 46kg
- 활력징후: BP 113/75 mmHg, 맥박 117/분, 체온 37.0°C

■ 요약

76세 남성 환자로 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소하며 내원함. 과거 당뇨 가족력, 잦은 기침, 경변, 혈뇨, 오한, 무기력, 건조한 피부, 이명, 어지러움 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 46kg, BMI는 15.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통이 간헐적으로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다. 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/75 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 37.0°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 87kg
- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 54/분, 체온 36.4°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 기름진 음식 섭취 및 무거운 짐을 들 때 악화된다. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 무력감, 이명 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로, 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 87kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 요통은 장시간 운전 후 차에서 내릴 때 시작되었으며, 점차 악화되는 양상이다. 기름진 음식 섭취 및 무거운 짐을 들 때 악화되며, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 두부에서만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 36.4°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황색의 니태(膩苔)를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 삼맥(澁脈)
- 복합맥상: 부색(浮)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 74kg
- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.5°C

■ 요약

61세 남성 환자로, 3개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 흑색변 및 혈뇨, 다한, 어지럼증, 이명, 사지무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 74kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 6시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 야외 작업 후 발생한 요통으로 내원하였다. 요통은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 온찜질이나 수면 시에는 완화되는

양상을 보인다. 환자는 요통 외에도 흑색변 및 혈뇨, 다한(多汗), 어지럼증, 이명, 사지무력감 등을 호소하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통(3/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움을 느낌, 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 열감/더위탐, 냉수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗), 야간/도한, 땀 흘린 후 열감을 느낌.
- 통증: 요통(3/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 생김, 사지무력감, 피부 건조도는 정상, 가려움은 없음
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 139cm / 41kg
- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 63/분, 체온 36.6°C

■ 요약

12세 남학생, 6개월 이상-1년 이내 요통을 호소하며, 오래 앉아있는 후 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 41kg, BMI는 21.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 2일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상에서 1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서있을 때 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 스트레스 대처 능력은 보통이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/90 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 63kg
- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.2°C

■ 요약

47세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 7일 전부터 허리 통증이 시작되었다. 무거운 짐을 들거나 과로, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 63kg, BMI는 24.6이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 통증은 7일 전부터 더욱 심해졌다.

【발병 에피소드】

최근 장시간 책상에 앉아 업무를 본 후 7일 전부터 허리 부위에 통증이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증의 강도는 2/10 정도이다. 통증은 묵직하며, 이동하는 듯한 느낌이 있고, 찌르는 듯한 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지며, 오래 서 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 냉기에 노출되면 통증이 심해지고,

따뜻하게 하면 다소 완화된다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 낮에 6회 정도 소변을 보며, 야간뇨는 없다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애 및 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 몸이 차가운 편이며, 특히 손발이 차갑다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 드물게 머리에서 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 전신에 무력감을 느끼며, 피부가 건조하고 가려운 증상이 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 감퇴되었다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/61 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 쉽게 멍이 든다. 전신에 피로감을 호소한다.
- 면색: 정상.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 부어 있다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 60kg
- 활력징후: BP 95/60 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.1°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 요통과 함께 소화불량, 잦은 기침, 이명, 어지러움 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 60kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

발현 시점 1주-1개월 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는

경향을 보인다. 환자는 요통 외에도 잦은 기침, 이명, 어지러움, 소화불량 등의 증상을 동반하고 있다. 발열은 없으나 저체온(35도 이하)을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않는 무한(無汗) 증상을 보인다.
- 통증: 요통은 2/10 강도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 95/60 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.1℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소한다. 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 70kg
- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.3°C

■ 요약

29세 여성 환자로, 3개월 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 스트레스와 과로 시 악화되며, 온찜질과 식이 조절로 완화됨. 소화불량, 수면 장애, 수족냉증, 오한 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 149cm, 체중은 70kg, BMI는 31.5이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 3개월 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때

더욱 악화된다. 한기를 느끼는 통증으로, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다. 스트레스와 과로 시 통증이 심해진다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있다. 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (5/5)를 호소하며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없는 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 (3/5) 및 난청 (5/5)을 호소한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기

- 설태: 백태, 다테

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 66kg
- 활력징후: BP 123/88 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.9°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 3개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 이사 중 허리 부상 이후 발생했으며, 과로, 음주, 스트레스에 의해 악화됨. 동반 증상으로 사지무력감, 소화불량, 잦은 땀, 오한 등이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 66kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

발현 시점 3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 요통은 이사 중 허리를 삐끗한 이후 발생했으며, 호전되는 듯하다가 과로, 음주, 스트레스 상황에서 악화되는 양상을 보인다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain),

자통(stabbing pain), 야간통(worse at night)의 양상을 보이고, 오래 서있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통 4/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/88 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.9℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 66kg
- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.3°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 1년 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 음주와 수면 부족 시 악화되는 경향을 보임. 변비와 혈뇨를 동반하고, 무한증과 수족냉증을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 66kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소하며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 음주 및 수면 부족 시 증상이

악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하루에 0개피, 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 가끔 호소한다. 부패취의 트림과 신물이 올라오며, 구고(口苦)를 느끼기도 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색이며 혈뇨를 보인다. 주간 6회, 야간에는 소변을 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 음료를 선호한다. 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않는다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명은 2/5 강도이며, 난청은 1/5 강도이다. 어지러움은 2/5 강도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍(絳紅) 및 자설(紫舌)이며, 크기는 대(大)하다.

- 설태: 황태(黃苔)이며, 두께는 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부대(浮大)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 73kg
- 활력징후: BP 105/64 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.2°C

■ 요약

50세 여성 환자로 3개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 73kg, BMI는 25.3이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 현재 호전 중이라고 진술하였다.

【발병 에피소드】

환자는 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있으면 악화되는 경향이 있다. 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증과 고혈압으로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

환자의 가족력으로는 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 구역/구토 증상이 있으며, 신물과 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 땀이 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/64 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.2°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 73kg
- 활력징후: BP 122/85 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.9°C

■ 요약

84세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 허리 통증 시작. 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환 있으며, 습한 환경, 무거운 짐, 찬바람에 통증 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 73kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 습한 환경, 무거운 짐을 들 때, 찬바람에 노출될 때 악화되는 경향을 보이며, 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 때

악화된다고 한다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 복만, 복통을 호소한다. 구역, 구토 증상이 있으며 부패취가 나는 트림을 하고 신물이 올라온다고 한다. 또한, 입에서 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나 수면이 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5)가 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 쏘시는 듯한 통증, 칼로 찌르는 듯한 통증, 무거운 느낌의 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/85 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 63kg
- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 55/분, 체온 36.5°C

■ 요약

77세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 습한 환경과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 63kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 환자는 요통의 강도를 3/10으로 표현하며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain), 야간통이 동반된다고 한다. 오래 서있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이

경감되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나 복만감과 복통(3/5)을 호소한다. 구역감, 신물, 구고(쓴맛) 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에서 땀이 나며, 발한 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 36.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰된다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명(4/5)과 난청(3/5)을 호소하며, 어지러움(1/5)이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 65kg
- 활력징후: BP 139/86 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.8°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 1주-1개월 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압 병력 있으며, 음주와 습한 환경에서 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 65kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 계단에서 미끄러진 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 둔중하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 양상을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 온찜질 시

완화되는 경향을 보인다. 음주 및 습한 환경에 노출 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 35개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 23일이며 불규칙하고, 생리 기간은 0일, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림을 하고, 신물이 올라오며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색이며 혈뇨가 관찰된다. 주간 12회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/86 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 81kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.5°C

■ 요약

39세 남성, 1개월 전 골프 스윙 중 발생한 요통으로 내원. 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 녹색변, 얇은 수면, 오한, 암색 면색 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 81kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 경우 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

고혈압 및 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【과거력】

고혈압, 당뇨

【가족력】

특이 가족력 없음

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만, 복통 3/5, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색변, 보통.
- 소변: 맑은 소변, 주간 4회, 야간 1회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 4/5, 중도각성 3/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낌. 야간/도한 발생.
- 땀: 보통.
- 통증: 요통.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지무력감은 호소하지 않음. 피부는 건조하고 각질이 있음.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 64kg
- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 86/분, 체온 38.3°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 64kg, BMI는 22.9이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 전부터 요통을 호소하며, 통증은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 환자는 통증 강도를 1/10으로 표현했다.

【과거력】

고혈압과 이상지질혈증을 앓고 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 신물, 구고(口苦), 부패취(腐敗臭)가 느껴질 때가 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 묽게 또는 연변으로 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 38.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 91kg
- 활력징후: BP 172/106 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.1°C

■ 요약

55세 남성, 1주-1개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 시 악화되고 스트레칭 시 완화되는 양상.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 91kg, BMI는 31.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10으로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

과로 시 통증이 악화되며, 스트레칭 시 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

현장직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 5개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하게 하며, 복만/복통이 2/5 정도 있다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타난다. 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 172/106 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.1℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 작다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 72kg
- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.2°C

■ 요약

51세 남성 환자로 6개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 당뇨가 있으며, 스트레스 및 습한 환경에서 증상 악화, 스트레칭 및 식이 조절 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 176cm, 체중은 72kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)의 양상과 함께 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)을 동반한다. 야간에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을

때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다. 스트레스 및 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되며, 스트레칭 및 식이 조절을 통해 일부 완화되는 것을 확인하였다. 또한, 수족냉증과 소화불량 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주를 자주 하고 흡연은 하루 0개피를 피운다. 평소 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만, 복통을 호소한다. 구역감과 구고(口苦)를 느끼며, 신물(酸水)이 올라오기도 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색이고 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간에 9회, 야간에는 배뇨를 하지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간에 도한(盜汗)이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/74 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 어지럼증을 호소한다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태(膩苔)를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이 나타난다.
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)이 나타난다.
- 맥력: 무력(無力)하다.
- 맥상: 완맥(緩脈)이 나타난다.
- 복합맥상: 세약(細弱)하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 78세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 63kg
- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.4°C

■ 요약

78세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증 및 고혈압이 있으며, 수면의 질 저하, 오한, 수족냉증, 소화불량 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 63kg, BMI는 22.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 또한 오한, 수족냉증, 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통이 2/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 9회, 야간 3회 빈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종과 멍이 쉽게 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설(Enlarged tongue)이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 140cm / 32kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.2°C

■ 요약

10세 여자 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 32kg, BMI는 16.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 5일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 양상을 보인다. 장시간 앉아있거나 스트레스를 받을 때, 찬바람에 노출될 때 악화되며, 스트레칭이나 휴식을 취하면 완화된다고 한다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고, 차가운 기운에 노출되면

심해지며(寒痛), 따뜻하게 하면 다소 완화되는(得溫則減) 양상을 보인다. 현재 감기, 비염 증상은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 보통 형태이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 한통(寒痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감은 없으며, 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 보통이다.
- 설태: 황색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 80kg
- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.7°C

■ 요약

73세 남성 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 수면 부족 시 악화되며, 소화불량과 함께 적색 혈뇨를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 80kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면

호전된다고 한다. 최근 수면 부족으로 증상이 악화되었다고 진술하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 0.0개피/일 하였다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애(0/5), 중도각성(0/5).
- 한열: 열감/더위탐, 열수를 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗), 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 3/10), 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth).
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕은 보통, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 63kg
- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.4°C

■ 요약

61세 남성 환자로, 1주-1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 평소 이상지질혈증 및 고혈압으로 약물 복용 중이며, 과로 시 증상 악화, 수면 시 증상 완화 경향을 보인다. 대변은 묽은 편이며, 땀이 많고 오한을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 178cm, 체중은 63kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다.

통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 또한, 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 경우에도 악화된다고 호소한다. 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있고, 부패취가 나는 트림을 하며 신물이 올라온다고 한다. 또한, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5일 중 1번 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 피로감과 함께 몸이 차가워지는 느낌이 든다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 3/10 강도의 통증을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯한 느낌이며, 찌르는 듯한 통증이 야간에 심해진다. 오래 서 있을수록 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 황색, 두껍다(후태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 83kg
- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 118/분, 체온 37.8°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1주-1개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거 고혈압 가족력이 있으며, 스트레스와 음주 시 증상이 악화된다. 평소 다한 증상과 수족냉증을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 83kg, BMI는 36.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전, 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 무거운 느낌이며(重痛), 부위를 옮겨 다니는 양상(遊走痛)을 보인다. 또한 찌르는 듯한 통증(刺痛)과 야간에 심해지는 경향을 보이며(夜間痛), 오래 서

있을 경우 악화된다고 한다. 따뜻하게 하면(得溫) 통증이 완화되는 경향을 보인다(得溫則減). 스트레스 및 음주 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 복만 및 복통이 2/5 정도이다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에는 보지 않으며, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 정도 잠을 자지만, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 37.8℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 78kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.6°C

■ 요약

69세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 음주, 장시간 앉기, 수면부족이 악화 요인으로 작용함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 현장직에 종사하는 분이다. 신장은 166cm, 체중은 78kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 4시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 둔중하고 움직일 때 심해지며, 칼로 찌르는 듯한 통증이 야간에 더욱 심해지는 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 음주,

장시간 앉아있는 자세, 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다. 식이 조절 및 스트레칭 시 증상이 완화되는 것을 느낀다고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증 약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루 15개피의 흡연력이 있다. 운동은 중간 강도로 하고 있다. 폐경이 되었으며, 과거 생리 주기는 28일로 규칙적이었고, 생리통은 심하지 않았다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 묽은 변을 보며, 황갈색을 띤다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애는 가끔 있으며(1/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 둔중하고, 움직이는 듯하며, 칼로 찌르는 듯한 양상을 보인다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 붉고 자줏빛을 띠며, 혀의 움직임은 정상이다.

- 설태: 백색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 68kg
- 활력징후: BP 129/83 mmHg, 맥박 114/분, 체온 37.8°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 기름진 음식과 장시간 앉는 습관이 있으며, 녹색 변과 수족냉증을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 68kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 이동하는 듯한 양상을 보이고, 찌르는 듯한 통증이 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때

통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에는 보지 않는다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠이 얕고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/83 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 37.8°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 어지럼증을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.

- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다. 복합맥상으로 허대맥이 나타난다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 33kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66/분, 체온 38.4°C

■ 요약

10세 남환, 1년 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 주소로 내원. 오한, 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 전신에 멍, 무력감, 가려움, 이명, 어지럼 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 33kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보이며, 특별한 악화 또는 완화 요인은 없다. 통증 강도는 2/10으로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게

하면 완화되는 경향이 있다. 동반 증상으로 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통이 2/5 정도 있다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 True/5 이다.
- 한열: 오한/추위를 심하게 타며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 전신에 땀을 흘리며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (상기 현병력 참고).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 없는 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 38.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 절로 멍이 생기는 경향이 있고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 99kg
- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.4°C

■ 요약

40세 남성, 현장직, 3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 호소하며 내원. 고혈압 병력 있으며, 과로 및 기름진 음식 섭취 시 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 99kg, BMI는 36.8이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 3개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)의 양상과 함께 움직일 때 심해지는 유주통(moving pain)의 특징을 보인다. 야간에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을

경우에도 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량을 가끔 호소하며, 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste), 부패취(Foul Belching) 증상 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변, 보통의 굳기.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않는 편이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘리는 도한(盜汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10. 중통 (Heavy) - 습, 유주통 (Moving) - 담음, 자통 (Stabbing) - 어혈, 야간통 (Worse at Night) - 어혈, 오래 서있으면 악화 - 기, 한통 (Cold Pain) - 한, 득온즉감 (Better w/ Warmth) - 한.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이나, 건망이 다소 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 48kg
- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 107/분, 체온 38.3°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생했으며, 수면 부족과 무거운 짐을 드는 행위로 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 48kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 지속적으로 악화되는 양상을 보였다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서

있을 경우 더욱 악화된다고 호소하였다. 온찜질 시 통증이 경감되는 양상을 보인다. 수면 부족과 무거운 짐을 드는 행위가 악화 요인으로 작용하며, 휴식과 안정을 취할 경우 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 발생하며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 심하고 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 38.3℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 회태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 93kg
- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.9°C

■ 요약

55세 남성, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 스트레스와 과로 시 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 181cm, 체중은 93kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 장거리 비행 후 요통이 발생하였으며, 점차 악화되는 추세이다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 야간에 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 오래 서 있으면 통증이

악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취한다. 복만감과 복통이 있으며, 구역감과 신물 올라옴, 부패취의 트림, 구고가 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 발한 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 저하되었고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 절로 멍이 잘 든다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 51kg
- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.5°C

■ 요약

13세 남성 환자로 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었으며, 흑색변, 혈뇨, 오한, 잦은 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 156cm, 체중은 51kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내 전, 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우

악화되는 경향을 보인다. 냉기에 노출될 때 통증이 심해지고 온찜질이나 수면 시에는 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 술은 마시지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통 (2/5)을 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 동반한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5)를 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 다양한 양상(중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감)으로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이나, 건망 증세가 있고, 사지무력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.5℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 생기는 편이고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움 (2/5)을 호소한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 55kg
- 활력징후: BP 126/88 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.6°C

■ 요약

54세 남성, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 스트레칭과 휴식으로 완화됨. 과거력으로 이상지질혈증, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 55kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 장시간 운전 후 악화되고 스트레칭과 휴식으로 다소 완화되는 경향을 보인다. 통증은 2/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때, 추위에 노출될 때

악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 2/5 정도이고, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소하며, 입면장애 2/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있고, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보임. 통증 강도는 2/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어지고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/88 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태(膩苔)가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥(澁脈), 현긴(弦緊)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 81kg
- 활력징후: BP 107/70 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.9°C

■ 요약

67세 남성 환자로, 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있으며, 수면 부족을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 178cm, 체중은 81kg, BMI는 25.6이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻐뻐해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다. 수면 부족 시

증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 현병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 묽은 변 또는 연변을 보며, 황갈색이다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 혈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/70 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 90kg
- 활력징후: BP 142/94 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.9°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 이사 중 허리 삔끗 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압 가족력, 흡연, 수면 부족 등의 악화 요인 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 169cm, 체중은 90kg, BMI는 31.5이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삔끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삔끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(流走痛), 찌르는 듯하고(刺痛), 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화된다(得溫則減).

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점이며, 중도각성이 있다(5회).
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/94 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.9℃, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지럼증은 0/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다(大舌).
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다(薄苔).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 63kg
- 활력징후: BP 173/104 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.2°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1주일 이내 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압 및 당뇨 가족력, 스트레스, 불규칙한 식습관, 변비, 혈뇨, 수면 장애, 다한, 오한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 어지러움 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 63kg, BMI는 24.3이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1주일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생했으며, 증상은 점차 악화되는 양상이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(游走痛), 자통(刺痛)의 성격을 띠며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게

하면 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감과 구토 증상이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라온다고 한다. 구고(口苦) 또한 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고, 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색이며 혈뇨를 보인다. 주간에 12회 소변을 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도 각성은 5회 발생한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타난다. 오래 서있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망 증세가 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 173/104 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기

- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 67kg
- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.5°C

■ 요약

49세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 찬바람 노출 시 악화되는 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 67kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 지속적으로 나타났다가 사라지기를 반복하며, 찬바람에 노출 시 악화되고 스트레칭이나 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 통증의 양상은

무겁고 쑤시는 듯하며, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다. 흡연 시 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피 정도이며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만, 복통이 느껴지며, 구역감이 있고 신물이 올라온다고 한다. 부패취가 나는 트림을 하며, 입이 쓰다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 야간에 땀을 흘리는 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 무겁고 쑤시는 듯하며 칼로 찌르는 듯한 통증이 있다. 밤에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/97 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 회색을 띄며, 끈적한 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 72세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.4°C

■ 요약

72세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 계단에서 미끄러진 후 증상이 시작됨. 장시간 앉거나 과로 시 악화되고, 온찜질이나 휴식 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 요통으로 내원하여, 통증 강도는 4/10으로 보고됨. 통증은 묵직한 느낌(重痛)과 함께 움직이는 듯한 양상(遊走痛)을 보이며, 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며,

따뜻하게 찜질하면 다소 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 35개피/일로 확인된다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물 오름, 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 아침에 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 찬 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 통증은 묵직하고 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 다소 저하되었으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 체질이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 일어난다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지럼증은 경미하게 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍색/자색 설질이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.5°C

■ 요약

53세 여성 환자로, 3개월 전 골프 스윙 중 발생한 요통을 주소로 내원. 흡연, 과로, 무거운 짐을 드는 행위가 악화 요인이며, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 골프 스윙 중 요통이 발생한 이후 증상이 악화되고 있다. 통증은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우에도 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루에 0개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통이 2/5 정도 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 사지무력감을 느끼고, 피부 건조와 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍은 없다. 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 니태(膩苔)가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부긴실(浮緊實)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 152cm / 46kg
- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.6°C

■ 요약

12세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 시작되었으며, 고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 152cm, 체중은 46kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과거 무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띠고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때

통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.6℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 절로 생기는 경향이 있다. 사지 무력감은 없으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(大)
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 73kg
- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.1°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1개월에서 3개월 사이 발현된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 73kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 이내에 발생한 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되고 있다고 한다. 요통은 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 흡연 및 장시간 앉아있는 자세가 통증을 악화시키는 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 고강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다. 구역감이 있으며, 부패취가 느껴지고, 신물이 올라오며, 입에서 쓴맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛)의 양상이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕이 낮고, 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.1°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가렵다. 사지 무력감을 호소하며, 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 없다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태이고, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 81kg
- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.3°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 1주-1개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 가족력으로 고혈압, 중풍이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 81kg, BMI는 32.4이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프/테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain), 야간통의 양상을 보인다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는

경향이 있다. 환자는 통증을 '습(濕)', '담음(痰飲)', '어혈(瘀血)', '기(氣)', '한(寒)'과 연관지어 설명한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 적이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 1/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타는 경향이 있으며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 두부에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요부에 1/10 강도의 통증이 있으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있는 편이며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.3℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 이명은 2/5 강도이며, 난청은 5/5이다. 어지러움은 5/5 강도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 48kg
- 활력징후: BP 98/65 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.8°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 1주일 이내 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 현재 혈압약을 복용 중임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 48kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전 무거운 물건을 들다가 요통이 발생하였으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는

양상을 보인다. 환자는 찬바람/냉기(冷氣)에 노출 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일, 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통(1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 12회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 오한/추위를 잘 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타나며, 강도는 1/10이다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 98/65 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설/태설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 48kg
- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.7°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리가 뻣뻣해지기 시작했으며, 기름진 음식 섭취, 음주, 수면 부족 시 악화되고 온찜질 및 휴식 시 완화되는 양상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 48kg, BMI는 18.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때마다 통증 부위가 바뀌는 유주통의 양상을 보인다. 또한 찌르는 듯한 통증이 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을

때 악화되고 따뜻하게 찜질하면 완화된다. 환자는 통증 강도를 1/10으로 표현하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있고, 부패취가 나는 트림을 하며, 신물이 올라오고, 쓴 맛을 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회 소변을 보며, 적색 혈뇨를 호소한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있으며, 다한 증상이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 뜨거운 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 다한 증상을 호소한다.
- 통증: 요통이 있으며, 둔하고 무거운 느낌, 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 따뜻하게 하면 완화되는 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5로 확인되었다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황색의 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.5°C

■ 요약

20세 여성, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 79kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10으로 평가된다. 통증은 묵직한 느낌(重痛)과 함께 이동하는 양상(遊走痛)을 보이며, 찌르는 듯한 통증(刺痛)과 야간에 심해지는 경향(夜間痛)이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 냉기에 노출 시 통증이 심해지고 따뜻하게 찜질하면 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다. 과로, 습한 환경,

음주 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동은 중강도로 꾸준히 하고 있다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (1/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심, 구토 증상이 있고, 부패취의 트림을 하며, 신물이 올라오고, 입이 쓰다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 묽거나 무른 변을 보는 경향이 있다.
- 소변: 소변 색깔이 붉고 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 식은땀을 흘리고, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 경미하다 (1/5).
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(小).

- 설태: 회색을 띄며, 끈적한 니태(膩苔)가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 허대(虛大)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 44kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.2°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 요통을 주소로 내원. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 과로, 장시간 앉기, 찬바람에 악화되고 스트레칭과 식이 조절로 완화됨. 흑색변, 잦은 대변 횟수, 수족냉증, 야간 도한, 창백한 면색, 침세약완맥 등이 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 44kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 호소한다. 요통은 장시간 운전 후 발생했으며, 과로, 장시간 앉기,

찬바람에 노출 시 악화되는 경향을 보인다. 스트레칭과 식이 조절을 통해 통증이 완화된다고 한다. 통증 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 구역/구토 증상이 있고, 부패취와 신물이 올라온다. 구고(口苦) 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변을 보며, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수(熱水)를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간/도한이 있다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 면색은 창백하다. 난청이 있다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 회색이고 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 79kg
- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.2°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 과로, 수면 부족, 찬바람/냉기에 의해 증상이 악화되고, 수면 및 스트레칭으로 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 79kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내부터 요통이 발생하였으며, 장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래

서있으면 악화되는 양상, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 특징을 보인다. 과로, 수면 부족, 찬바람/냉기에 의해 증상이 악화되며, 수면 및 스트레칭으로 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병을 앓는 사람이 있다.

【사회력】

현장직에 종사하며, 음주를 자주 하고, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통 2/5, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 굳음/경변
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회
- 수면: 3시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움을 느끼며, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 절로 생기며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 58kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.2°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 1주일 이내 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 수면 부족, 스트레스, 무거운 짐으로 인해 악화되고, 식이 조절과 수면으로 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 151cm, 체중은 58kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 무거운 물건을 들다가 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 4/10 강도로 나타나며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다.

평소 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이며, 수면 부족, 스트레스, 무거운 짐을 드는 행위가 악화 요인으로 작용하고, 식이 조절과 충분한 수면이 완화 요인으로 작용한다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만/복통 4/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 깊게 잠들지 못하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간에 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통, 유주통, 자통의 양상이고, 강도는 4/10 이다. 오래 서 있을 때 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5, 어지러움은 0/5 이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 회태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 132cm / 31kg
- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.2°C

■ 요약

10세 여자 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 132cm, 체중은 31kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 점차 악화되는 양상이다. 통증은 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 호전되는 양상이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않고, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 배변하며, 녹색 변을 보고 묽거나 연변의 형태를 보인다.
- 소변: 소변 색깔은 적색 또는 혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 다한(多汗) 증상이 있으며, 특히 야간에 도한(盜汗)이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍(絳紅) 또는 자설(紫舌)이며, 설체가 크다.
- 설태: 회태(灰苔) 또는 니태(膩苔)가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)

- 맥력: 무력(無力)

- 맥상: 완맥(緩脈)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 71kg
- 활력징후: BP 103/65 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.7°C

■ 요약

81세 남성 환자로 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 잠을 잘못 잔 후 허리 뻣뻣함과 통증을 호소하며, 과거 고혈압 및 당뇨 가족력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 71kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소하였다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보이며, 밤에 더 심해지는 경향이 있다. 온찜질 시 통증이 완화된다고 한다. 환자는 발열은 없으나

오한을 느끼며, 땀은 거의 나지 않고 땀을 흘린 후에는 오히려 열감을 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동은 고강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 붉은색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간 정도이나 깊게 잠들지 못하고, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증이 있으며, 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 나타난다. 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/65 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 61kg
- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.8°C

■ 요약

51세 남성, 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기저질환과 혈압약, 이상지질혈증약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 61kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있으면 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이고, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.8℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설(大舌)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 68kg
- 활력징후: BP 132/86 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.5°C

■ 요약

36세 여성 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 잦은 녹색 변과 다한, 오한을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 68kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보이며, 칼로 찌르는 듯한 통증과 함께 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을

때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 느낌이 있다. 환자는 기름진 음식을 섭취 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통이 간헐적으로 나타난다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 긴 편이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고 움직이는 듯한 통증, 칼로 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 따뜻하게 하면 완화되는 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/86 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없으며, 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 황색의 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 67kg
- 활력징후: BP 118/73 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 67kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 요통이 발생했으며, 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보였다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 때 악화된다고 호소한다. 냉기에 노출될 때 통증이 심해지는 경향이 있으며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 안정 및 휴식 시 통증이 완화되는 것을 확인했다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 하루에 0개피 정도 한다. 평소 운동 강도는 중간 정도이다. 여성력으로는 생리 주기가 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점으로 거의 없다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통은 4/5 정도로 불편하며, 구역감이 간헐적으로 나타난다. 부패취의 트림이 있고 신물이 올라오기도 하며, 간혹 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 4회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠들기 어려움(3/5)과 자다가 자주 깨는 증상(중도각성, True/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도로 묵직하고, 움직일 때 심해지며, 야간에 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/73 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 명이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 78kg
- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 54/분, 체온 37.5°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 빠긋한 이후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 잦은 소화불량, 수면 문제, 오한, 무한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 78kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빠긋하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 빠긋한 이후 요통이 발생하여 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지고 야간에 더욱 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이

완화된다고 호소한다. 또한, 환자는 수족냉증을 동반하며, 잦은 소화불량을 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 심장병력이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 중등도의 운동을 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 뭉거나 연변의 형태를 보인다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 둔통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띄며, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 백태가 박하게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 67kg
- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.7°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증 및 고혈압이 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중임. 변비, 다한, 오한, 어지러움, 사지무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 67kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 발생하여 내원하였다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 온찜질 시 통증이 완화된다고 한다. 환자는

또한 오한, 어지러움, 사지무력감을 호소한다. 감기, 비염 증상은 호소하지 않으며, 발열 증상은 전혀 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 1/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 얹고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 1/5, 중도각성 5회.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 중통, 유주통, 자통이 나타나며, 강도는 1/10이다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화되며, 온찜질 시 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도 1/5, 난청 0/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 80kg
- 활력징후: BP 134/87 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.6°C

■ 요약

40세 여성, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 주소로 내원. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 경직 발생. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 80kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

발현 시점은 3개월 이상 6개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무거운 물건을 들거나 오래 서 있을 때 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 듯하다. 통증 양상은 묵직하고 쑤시는

뒹하며, 칼로 찌르는 듯한 통증도 간헐적으로 느껴진다고 한다. 특히 밤에 통증이 심해지는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일이나 불규칙하며, 생리 기간은 0일이고, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색이고 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1일 정도 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 높으나 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/87 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍은 정상 범위 내이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 없다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 47kg
- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.9°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 장거리 비행 후 발생하였으며, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 47kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이며, 밤에 더 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화는 보통이다. 구역감과 구토감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얇게 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 밤에 더 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없는 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 황태와 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 50kg
- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.0°C

■ 요약

24세 여성 환자로 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압, 당뇨 가족력, 불규칙한 식습관, 수면의 질 저하, 변비, 냉수 선호, 수족냉증, 전신 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명, 잦은 멍, 황색 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 50kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 3개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 유사한 강도로 지속되거나 오르내림이 있으며, 무거운 물건을 들 때 악화되고 휴식 및 스트레칭 시 완화된다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛),

야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 고강도이다. 여성력으로 생리주기는 23일로 규칙적이나, 생리 기간은 0일이며 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통(1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.0℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 피부는 각질이 있으며 가렵다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 77kg
- 활력징후: BP 129/82 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.6°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생하였으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 77kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 1/10이며, 중통(Heavy)의 습(濕)의 성격, 유주통(Moving)의 담음(痰飲)의 성격, 자통(Stabbing) 및 야간에 심해지는 어혈(瘀血)의

성격, 오래 서 있을 때 악화되는 기허(氣虛)의 성격, 한통(寒痛)의 한(寒)의 성격, 따뜻하게 하면 완화되는 한(寒)의 성격을 보인다. 환자는 따뜻하게 하는 것과 식이조절로 증상이 호전된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 폐경 상태이며, 생리통은 과거에 10점 만점에 0으로 거의 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 복만/복통이 1/5 정도이며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통 형태이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 1/10 강도의 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/82 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍은 정상이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 가렵다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 작다.

- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 78kg
- 활력징후: BP 175/102 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.1°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 변비, 수면장애, 다한, 오한, 사지무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 78kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 요통이 점차 악화되는 추세이며, 통증 강도는 1/10 정도로 경미하다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을

보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력으로는 폐경이 되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 배변 활동은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 175/102 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없고 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5로 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 크다.
- 설태: 백태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 56kg
- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.2°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 흡연력이 있음. 요통은 스윙 동작 중 발생했으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보임. 오한을 느끼며, 수족냉증을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 56kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통으로 내원하였다. 통증은 지속적으로 나타나며, 중통(Heavy),

유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night)의 양상을 보이고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연력은 0.0개피/일 이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 3/5, 중도각성 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있고, 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 93kg
- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.4°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있으며, 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 얇은 수면, 전신 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 93kg, BMI는 38.7이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 한다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 복만감과 복통이 2/5 정도 있다. 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀을 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (상기 현병력 참조).
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명(1/5), 난청(1/5), 어지러움(2/5)이 있다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 79kg
- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.5°C

■ 요약

56세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 수면 부족과 다한, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 79kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 호소하며, 증상은 악화 중이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 뻣뻣하고 무거운 느낌과 함께 움직일 때 통증이 심해지는 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지며, 따뜻하게 찜질을

하면 통증이 완화된다고 한다. 오래 서 있으면 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

현장직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이며, 소화는 불량한 편이다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 허리 부위에 3/10 강도의 통증을 호소하며, 뻣뻣하고 무거운 느낌과 함께 쑤시는 듯한 통증이 동반된다. 야간에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백색의 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 84kg
- 활력징후: BP 128/89 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압의 기왕력이 있으며, 오래 앉아있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 84kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

1주에서 1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지는 양상을 보이고, 칼로 찌르는 듯한 통증과 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 하였으나 현재는 금연 중이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 복만감과 복통(2/5)을 호소한다. 오심/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림을 하고 신물이 올라온다고 한다. 또한, 입이 쓰다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이며, 둔중하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 128/89 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 명이 잘 드는 편이며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 어지럼증(4/5)을 호소하며, 이명(3/5), 난청(2/5)이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 77kg
- 활력징후: BP 123/85 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.8°C

■ 요약

40세 여성 환자로 1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 과거력 있으며, 과로, 음주, 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 77kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 환자는 하지 부종과 함께 전신 무력감을

동반하고 있다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통은 3/5 강도이며, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감과 함께 몸이 차가워지는 느낌을 받는다.
- 통증: 요통 외 피부 건조감 및 가려움이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5로 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/85 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 78kg
- 활력징후: BP 103/63 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.7°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1주일 이내 이사 중 허리 삐끗 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 변비, 수족냉증, 어지럼증, 피로감을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 187cm, 체중은 78kg, BMI는 22.3이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다. 환자는 발열은 없으나

오한을 느끼며, 어지럼증과 피로감을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 평소 운동강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 간헐적으로 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에서 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 쑤시는 듯한 통증과 찌르는 듯한 통증이 동반된다. 오래 서 있으면 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/63 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 73kg
- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.5°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증 과거력, 잦은 녹색변, 야간 다뇨, 심한 수족냉증, 무력감, 건조하고 가려운 피부, 이명 및 난청, 암색의 안색을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 73kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다고 한다. 통증은 4/10 정도로, 묵직하고 움직이는 듯하며 찌르는 듯한 느낌이 있고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게

하면 다소 완화된다고 한다. 또한, 수족냉증, 구역감, 신물, 쓴맛을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만 및 복통이 있다. 부패취의 트림과 신물이 올라온다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 보며, 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 없고, 중도각성도 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 심하다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 묵직하고 움직이며 찌르는 듯한 양상이다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.5°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지럼증은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 58kg
- 활력징후: BP 155/90 mmHg, 맥박 107/분, 체온 37.8°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력상 고혈압이 있으며, 무거운 물건을 들다가 발생한 허리 통증을 호소한다. 오한, 수족냉증을 동반하고 소화불량 증상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 58kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1개월 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전, 무거운 물건을 들다가 허리 통증이 발생한 이후, 통증이 지속적으로 나타났다. 통증의 양상은 묵직하고, 움직일 때마다 통증 부위가 바뀌는 듯한 유주통의 양상을 보인다. 또한 칼로 찌르는 듯한 자통이

있으며, 밤에 심해지는 야간통을 호소한다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 34일이며, 폐경이 되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 구역감과 신물이 올라오는 증상이 있으며, 가끔 쓴 맛을 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다. 입면 장애는 가끔 (1/5) 있으며, 중도 각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 주로 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 묵직하고 찌르는 듯한 통증이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다. 오래 서 있으면 악화된다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 다소 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/90 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신에 특별한 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으며 가려움은 없다.
- 면색: 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 혀가 다소 비대(Enlarged)하다.

- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 79kg
- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

■ 요약

85세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 온찜질과 휴식 시 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 79kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고 움직일 때마다 심해지며, 밤에 더욱 심해지는 양상을 보인다. 온찜질과 휴식을 취하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 요통 외에 수족냉증과 다한

증상을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽거나 연변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회 소변을 보며, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 찬 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 주로 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 목직하고 움직일 때 심해지며, 밤에 악화된다. 차가운 환경에서 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설(Enlarged)
- 설태: 회색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 78kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 습한

환경에서 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 당뇨와 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만, 복통(4/5)을 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로, 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 설체가 크고, 치흔이 있다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 80kg
- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.4°C

■ 요약

47세 남성 환자로, 3개월에서 6개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중임. 최근 수면 부족과 추운 날씨에서의 야외 작업 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 80kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무겁고 찢르는 듯한 양상을 띠고, 밤에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 온찜질이나 안정을

취하면 다소 완화된다고 한다. 환자는 요통 외에도 수족냉증, 소화불량, 잦은 대변(흑색변), 피로감, 기억력 감퇴, 의욕 저하를 호소한다. 감기 증상이나 비염 증상은 보이지 않는다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 흡연하였으나 현재는 금연 중이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 수면시간 3시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 명이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하고 각질이 있는 상태이다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이며, 어지러움이 3/5 정도 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태하다.
- 설태: 회색, 후태하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 59kg
- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.4°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 1주일 이내에 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압 및 심장병 가족력이 있으며, 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 경직이 시작됨. 잦은 음주 습관이 있고, 대변이 묽으며, 혈뇨 증상을 보임. 오한을 느끼고, 수족냉증을 호소하며, 전신 부종과 절로 생기는 멍이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 59kg, BMI는 24.6이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 2시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 1주일 전 야외 작업 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을

보이고, 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 복만/복통 2/5, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않는다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 절로 생기는 멍이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 61kg
- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.8°C

■ 요약

64세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 찬바람과 무거운 짐을 들 때 증상이 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 61kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

발현 시점은 6개월 이상-1년 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서있을 때 악화된다. 찬바람이나 무거운 짐을 들 때 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 호전되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있고 부패취와 신물이 올라온다고 호소하며 구고(입이 씹) 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 본다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 49kg
- 활력징후: BP 139/84 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.0°C

■ 요약

47세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발현한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다. 추운 날씨에 야외 작업을 한 후 허리가 굳어지기 시작했으며, 과로 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 49kg, BMI는 17.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 환자는 또한 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 복만/복통이 4/5로 느껴진다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색의 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다. 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/84 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있다. 이명은 없으며 난청이 2/5 정도 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 48kg
- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.5°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 굳어짐을 호소. 오한, 전신 부종, 무력감, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 48kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다. 환자는 스트레스에 의해 증상이

악화된다고 진술하며, 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나면 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.5℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 74kg
- 활력징후: BP 98/75 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.3°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 수면 부족 및 습한 환경에서 악화되는 양상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 74kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화된다고 한다. 한랭한 환경에서 통증이 심해지며, 따뜻하게 하면

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 복만 및 복통이 3/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 황갈색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 황색 소변을 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 5번 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 98/75 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 53/분, 체온 37.6°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 수면 부족과 무거운 물건을 드는 행위가 악화 요인이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 무겁고 움직이는 듯한 양상을 보이며, 찌르는 듯한 느낌과 함께 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 느낌이

있다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화 상태는 보통이다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 53회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 부종은 없다. 어지럼증은 3/5 강도이다. 이명은 거의 없으며, 난청은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 크기가 큰 편이다.
- 설태: 회색의 끈적한 태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 57kg
- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 116/분, 체온 36.2°C

■ 요약

45세 남성, 1년 이상 요통을 호소하며, 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작됨. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 57kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1년 이상 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

1년 전 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 현재 호전 중이다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며 야간에 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다. 득온즉감(得溫則減)하며

한통(寒痛)의 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 복만/복통이 1/5 정도 발생한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 116회/분, 체온 36.2℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 120/83 mmHg, 맥박 119/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 과거 고혈압 및 이상지질혈증 병력이 있으며, 잦은 음주와 흡연 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 약 6개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증은 지속적으로 악화되고 있으며, 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다고

한다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보이며, 냉기에 노출될 경우 증상이 악화된다. 환자는 통증 강도를 3/10으로 표현하였다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 진단받아 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주를 자주 하고 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감
- 정신/정서: 건망 증세가 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/83 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 36.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 137/81 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.1°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증, 가족력으로 고혈압 및 당뇨가 있으며, 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 발현 및 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

요통은 1주일 전 추운 환경에서 작업 후 발생했으며, 이후 점차 악화되는 양상이다. 통증은 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 또한, 감기

증상으로 저체온을 보이며 잦은 기침을 호소하고, 소화불량으로 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고, 중도 각성도 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 무기력하며 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/81 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.1℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 쉽게 드는 경향이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 83kg
- 활력징후: BP 124/85 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.4°C

■ 요약

46세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 가족력이 있으며, 수면 부족 및 장시간 앉아있는 습관이 악화 요인으로 작용함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 174cm, 체중은 83kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통으로 내원하였다. 요통은 잠을 잘못 잔 후 발생했으며, 이후 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 환자는 수면 부족과 장시간 앉아있는 자세가 통증을 악화시키며, 따뜻하게 하면 통증이

완화된다고 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 특징을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질은 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/85 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰된다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 63kg
- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.6°C

■ 요약

44세 여성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이사 중 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 후 발생하였으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 63kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다고 한다. 통증 강도는 3/10으로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면

완화되며, 한(寒)으로 인한 통증으로 느껴진다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 복만감과 복통이 3/5 정도로 느껴진다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 특히 두부에서 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하거나 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통 외에 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움은 없다. 이명은 없으며, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀가 작다 (소)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 102/61 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.4°C

■ 요약

67세 남성 환자로, 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 장시간 운전 후 갑작스러운 요통을 호소한다. 환자는 통증 강도를 2/10으로 표현하며, 통증 양상은 무겁고 움직이는 듯하며 찌르는 듯하고 야간에 심해지는 경향을 보인다고 한다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게

하면 완화되는 양상을 보인다. 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 바 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오며, 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 있으며 빈도는 5회이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/61 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.4℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 76kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.7°C

■ 요약

58세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 1개월 이상 지속되었으며 악화 중. 과거력 상 고혈압 가족력이 있고, 음주와 과로 시 악화, 스트레칭과 수면 시 완화되는 경향을 보임. 소변에 혈뇨 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 76kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

발현 시점 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 통증 강도를 4/10으로 호소한다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 요통을 호소하며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 회태이고, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 141cm / 55kg
- 활력징후: BP 101/72 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 과거 무거운 물건을 들다가 발생했으며, 찬바람, 장시간 앉기, 습한 환경에 악화되고 수면과 온난에 완화됨. 변비, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지럼증, 무기력, 황색 안색 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 55kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증은 무거운 느낌, 움직이는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌, 야간에 심해지는

양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 또한 찬바람, 장시간 앉기, 습한 환경에서 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않고, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리 주기는 28일이며, 불규칙하고, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색이고, 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이고, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠을 깊게 자지 못하고, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 특히 머리에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후에 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 무거운 느낌, 움직이는 듯한 느낌, 찌르는 듯한 느낌이 있고, 야간에 심해지며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/72 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍은 정상적으로 나타난다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가렵다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 55kg
- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 남학생으로, 1주일 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 55kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1주일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지고 밤에 더욱 심해지는 경향을 보인다. 또한 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 있다 (2/5).
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 둔하고 무거운 통증을 호소하며, 통증 강도는 2/10이다. 통증은 움직일 때 심해지고 밤에 더욱 심해진다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이며 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 회색의 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 70kg
- 활력징후: BP 155/95 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.8°C

■ 요약

47세 여성 환자로 3개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있으며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위가 증상을 악화시키는 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 70kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있으며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 장시간 앉아있는 자세, 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위 시 통증이 악화되는 경향을 보인다. 요통의 양상은 묵직하고 무거운

느낌(重痛)과 함께 움직일 때 통증이 나타나는 유주통(流注痛), 칼로 찌르는 듯한 자통(刺痛)이 동반되며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루 5개피의 담배를 흡연한다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있고, 신물과 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 거의 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 묵직한 느낌, 움직일 때 나타나는 통증, 칼로 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 따뜻하게 하면 호전되는 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/95 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.8°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 4/5이다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 님태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 65kg
- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.3°C

■ 요약

58세 여성 환자로 1주-1개월 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증 발생. 이상지질혈증, 고혈압 병력 있으며, 묶은 변, 혈뇨, 수족냉증, 다한, 홍조, 건망, 사지무력감 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 65kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압을 진단받고 혈압약과 이상지질혈증 약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 66kg
- 활력징후: BP 149/90 mmHg, 맥박 82/분, 체온 37.4°C

■ 요약

31세 여성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이사 중 허리를 삐끗한 후 증상이 시작되었으며, 흡연과 과로로 인해 악화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 66kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

발현 시점 3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였으며, 3개월 이상 지속되고 있다. 흡연과 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 통증 강도는 4/10으로 보고되었다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛),

야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때와 차가운 환경에서 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며 매일 음주를 하고, 흡연은 하루에 0개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/90 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 37.4℃, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 57kg
- 활력징후: BP 145/92 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.5°C

■ 요약

32세 남성, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 부상 이후 발생. 변비, 오한, 전신 부종, 무기력감 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 57kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 이사 도중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 지속 중이다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 경우 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 것을 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 정도 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧은 편이나 깊게 자는 편이다. 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 정도이며, 묵직하고 쑤시는 듯한 통증이 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 자주 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/92 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있다. 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 부어 있다.
- 설태: 백색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 135cm / 32kg
- 활력징후: BP 115/76 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.7°C

■ 요약

11세 남환, 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 잠을 잘못 잔 후 아침부터 허리 뻣뻣함과 통증을 호소하며, 오한, 수족냉증, 흑색변, 잦은 야간뇨 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 135cm, 체중은 32kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 요통은 주로 아침에 심하며, 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 통증 양상은 묵직하고,

이동성이 있으며, 찌르는 듯한 느낌이 있고, 야간에 심해지는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만/복통을 1/5 정도로 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 3회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고, 이동성이 있고, 찌르는 듯한 느낌이 있으며, 야간에 심해진다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/76 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 없다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.

- 설태: 백태, 님태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 64kg
- 활력징후: BP 134/80 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.6°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1주-1개월 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 최근 뉘는 변, 혈뇨, 다한, 수면 문제, 건망, 사지무력감 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 170cm, 체중은 64kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10 정도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 온찜질을 하면

통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 복만감과 복통(3/5)을 호소한다. 구역감이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있다. 입에서 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 외에 특별한 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/80 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.6°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지럼증은 경미(1/5)하다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)한 경향을 보인다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 68kg
- 활력징후: BP 120/85 mmHg, 맥박 114/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 3개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 최근 증상 악화 추세이며, 변비, 수면 장애, 다한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 68kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 장시간 앉아있거나 습한 환경, 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 특별한 완화 요인은 없다. 요통은 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을

보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서있을 경우에도 악화되며, 냉기에 노출되면 심해지고 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 매일 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경(Menopause) 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 복만/복통은 1/5 정도이며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 짧고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간에 도한(盜汗)이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/85 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 37.8℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 느끼며, 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 59kg
- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.3°C

■ 요약

59세 여성 환자로 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 기저질환으로 가지고 있으며, 변비, 잦은 소변, 무한, 오한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 59kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통으로 내원하였다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/

Warmth)의 양상을 보인다. 오래 앉아있으면 증상이 악화된다고 호소한다. 현재는 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압과 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가렵다. 부종은 없다. 멍이 잘 든다. 어지러움이 3/5 강도로 나타난다. 이명은 거의 없으며(0/5), 난청은 경미한 수준(1/5)이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 76kg
- 활력징후: BP 109/73 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.2°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다. 소화불량 증상과 전신 부종, 사지 무력감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 169cm, 체중은 76kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생하였으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은

중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 온찜질 시 통증이 경감되는 듯하다. 소화불량 증상으로 복만(腹滿) 및 복통(腹痛)을 호소하며, 수족냉증(手足冷症), 구역(嘔逆), 부패취(腐敗臭), 신물(酸水), 구고(口苦) 등의 증상이 동반된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/73 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(大)하다.
- 설태: 백태, 니태(膩苔)하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 87kg
- 활력징후: BP 170/105 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.7°C

■ 요약

45세 남성 환자로 1년 이상 요통을 호소하며, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리 통증이 발생한 이후 증상이 악화되었다. 고혈압, 당뇨 병력이 있으며 과로, 무거운 짐, 습한 환경에서 악화되고 휴식과 수면으로 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 87kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 주로 무겁고 찌르는 듯하며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는

양상을 보인다. 환자는 과로, 무거운 짐을 들거나 습한 환경에 노출될 경우 통증이 심해진다고 호소한다. 휴식을 취하거나 수면을 취하면 통증이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 진단을 받았으며, 현재 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 신물과 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화되는 통증, 한통의 양상을 보인다. 온찜질 시 통증이 경감된다고 한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/105 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 58kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 114/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1년 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 평소 흡연을 하며, 변비, 수족냉증, 얇은 수면, 기억력 저하 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 171cm, 체중은 58kg, BMI는 19.8이다.

【주소증】

발현 시점으로부터 1년 이상 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통이 지속적으로 나타나고 있다고 호소한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 야간에 통증이 심해지며, 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 오래 서

있을 경우 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 하루에 1.5개피 정도 흡연한다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역이나 구토 증상은 가끔 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고, 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑고, 주간에 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있으며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 36.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 36kg
- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.2°C

■ 요약

12세 남환, 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통으로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 36kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 호전 중이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 흡연, 스트레스 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 섭취하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 대(大), 태(胎)하다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.

- 매력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 54kg
- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.2°C

■ 요약

13세 남성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 골프/테니스 스윙 중 발생한 요통이며, 무거운 짐, 과로, 음주 시 악화되고 수면 시 완화됨. 잦은 땀, 오한, 수족냉증, 피로감을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 54kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

골프 또는 테니스를 치다가 스윙하는 순간 허리에 통증이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 요통은 골프나 테니스 스윙 중 발생했으며, 무거운 짐을 들거나 과로, 음주시 악화되는 경향을 보인다. 수면 시에는 통증이 다소 완화된다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain),

자통(stabbing pain)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다. 환자는 또한 수족냉증을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만감 및 복통(1/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽거나 연변의 형태를 보인다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간으로 수면 시간이 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요부에 통증이 있으며, 통증 강도는 1/10이다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.2℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움(2/5)을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 61kg
- 활력징후: BP 124/88 mmHg, 맥박 119/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 스트레스가 심하며, 따뜻하게 하거나 안정을 취하면 통증이 완화됨. 오한, 잦은 땀은 변, 다한, 수족냉증, 전신 부종, 무력감, 이명, 난청 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로, 학생이다. 신장은 176cm, 체중은 61kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 통증은 묵직하고,

이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통이 4/5 정도로 나타난다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 잠을 자며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 0/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯한 통증이 나타나고, 야간에 심해지며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/88 mmHg, 맥박 119회/분, 체온 36.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 29세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 76kg
- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 51/분, 체온 36.4°C

■ 요약

29세 남성 환자로 1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 병력 있으며, 스트레스, 무거운 짐, 음주 시 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 76kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 4일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 무거운 물건을 들거나 스트레스를 받을 때 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 통증이 완화된다고 한다.

통증의 양상은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서있으면 악화되며, 냉기에 노출되면 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 다소 완화된다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만, 복통(4/5), 구역감 호소, 부패취가 나는 트림을 하며 신물이 올라온다고 한다. 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며 주간 12회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이며, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 51회/분, 체온 36.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 설소
- 설태: 회색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 79kg
- 활력징후: BP 124/66 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.6°C

■ 요약

22세 여성, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 습한 환경, 수면 부족, 기름진 음식 섭취 시 악화되며, 변비, 혈뇨, 다한, 오한, 이명, 난청, 홍조 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 79kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생한 이후 지속적인 요통을 호소한다. 통증은 3/10 강도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며 오래 서 있을 때 악화된다. 습한

환경, 수면 부족, 기름진 음식 섭취 시 통증이 심해지는 경향을 보인다. 온찜질 시 통증이 경감되는 듯하다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압, 당뇨

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 25개피/일이다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 발한 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 3/10 강도로, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나, 건망이 있다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/66 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.6℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기를 보인다.
- 설태: 회태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 68kg
- 활력징후: BP 104/60 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

67세 여성, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원. 득온즉감(得溫卽減)하며, 변비, 수족냉증, 어지러움, 사지무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 68kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 요통이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 허리 부위에서 '뚝' 소리가 나는 것과 동시에 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면

통증이 악화되고, 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 완화된다고 한다. 환자는 요통 외에도 수족냉증, 어지러움, 사지무력감을 호소하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통은 1/5 정도이며, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦) 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 황색을 띠고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 5회 정도로 빈뇨가 있다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나 수면이 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/60 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다. 어지러움은 5/5 정도이다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 73kg
- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.6°C

■ 요약

62세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 기름진 음식 섭취 및 습한 환경에서 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 73kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증은 묵직하고 무거운 느낌이며, 이동하는 듯한 양상도 나타난다. 쉬는 듯한 통증과 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다. 기름진 음식을

섭취하거나 습한 환경에 노출되면 증상이 악화된다고 한다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 현재 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경되었으며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 생리통은 심하지 않았다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 묵직하고 이동하는 듯하며 쭈시는 듯한 통증이 있고, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 없으며 무기력하다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이다. 어지럼증은 없다. 환자는 저체온을 보이며, 발열 증상은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥