

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 69kg
- 활력징후: BP 113/74 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.2°C

■ 요약

48세 남성, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 69kg, BMI는 20.2이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 장거리 비행 후 요통이 발생했으며, 통증은 지속적으로 나타났다. 통증의 양상은 묵직하고 움직일 때마다 심해지는 양상을 보이며, 야간에 더욱 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고 따뜻하게 해주면 완화되는 느낌이 있다고 한다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍 등의 질환이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 가끔 구역감이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며, 깊게 자는 편이나 기상 시 몸이 무겁다. 입면 및 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소에 더위를 타는 편은 아니며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 특히 머리에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직하고 쑤시는 듯한 통증이 나타난다. 오래 서 있을수록 악화된다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 다소 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/74 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥