

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:10:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 48kg
- 활력징후: BP 106/77 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.7°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 흑색변, 잦은 배변, 오한, 어지러움, 창백한 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 48kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 5시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 날씨에 장시간 야외 작업 후 요통이 발생하였다고 호소한다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타나며, 특히 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고

한다. 감기, 비염 증상은 보이지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다. 수면 시간이 5시간으로 부족하며, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 경미(1/5)하게 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/77 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 어지러움을 4/5 강도로 느끼며, 이명은 3/5, 난청은 1/5 강도로 나타난다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)

- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실