

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:11:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 66kg
- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.9°C

■ 요약

35세 여성, 1일 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 66kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1일 전, 무거운 물건을 들다가 허리에서 '뚝' 소리가 난 후 요통이 발생하였다. 통증은 점차 악화되는 추세이며, 주로 무겁고 짓누르는 듯한 통증(重痛), 이동하는 듯한 통증(遊走痛), 찌르는 듯한 통증(刺痛)이 나타난다. 특히 야간에 통증이 심해지는 경향을 보이며, 오래 서 있을 때 통증이 악화된다고 한다. 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고

호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리 주기는 불규칙하며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이지만, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 3/10 정도의 강도이며, 묵직하고, 찌르는 듯하며, 이동하는 듯한 통증이 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 비교적 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명은 1/5 강도, 난청은 2/5 강도로 나타난다. 어지럼증은 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 황색 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥