

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:13:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 51kg
- 활력징후: BP 154/98 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.0°C

■ 요약

52세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중이다. 허리 통증은 잠을 잘못 잔 후 아침부터 시작되었고, 뻣뻣한 느낌과 함께 통증이 동반된다. 소화불량, 수족냉증, 흑색변, 혈뇨 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 51kg, BMI는 14.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 허리 부위에 집중되며, 뻣뻣한 느낌과 함께 나타난다. 통증의

강도는 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 기름진 음식을 섭취하거나 무거운 짐을 들 때 통증이 심해진다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압, 심장병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 허리 부위 통증이 있으며, 강도는 3/10이다. 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/98 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.0℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5이며, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)

- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세