

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 71세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 90kg
- 활력징후: BP 119/68 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.1°C

■ 요약

71세 남성, 1일 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 90kg, BMI는 32.7이다.

【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)의 양상과 함께 움직일 때 심해지는 유주통(moving pain)의 특징을 보인다. 또한 자통(stabbing pain)과 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 흡연하였으나 현재는 금연 중이다. 운동은 규칙적으로 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 간헐적으로 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 주로 전신에서 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 2/10 강도의 통증이 있으며, 묵직하고 쑤시는 듯한 느낌이다. 오래 서 있을 때 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/68 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상적인 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5로 심한 편이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색