

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:13

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 64kg
- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

28세 여성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압 및 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 장시간 앉아 일한 후 증상 악화.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 64kg, BMI는 25.3이다.

### 【주소증】

1일 전부터 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 통증을 1/10 강도로 호소하며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain), 야간통, 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(cold pain), 득온즉감(better with warmth)의 특징을 보인다고 진술하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1일 전부터 요통을 호소하며, 증상은 악화 중이다. 통증은 묵직하고, 움직이는 듯하며, 찌르는 듯한 양상을 보이며 밤에 심해진다. 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 통증의 강도는 1/10 정도이다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통, 오심/구토는 1/5 정도이다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 5회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 오한 증상은 전혀 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않고 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약