

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:20

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 52kg
- 활력징후: BP 113/73 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

15세 남성 환자로 2-3일 전 계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 발생한 요통을 주소로 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 52kg, BMI는 18.0이다.

### 【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하였으며, 통증은 비슷하거나 오르내림을 보인다. 과로 및 음주 시 악화되는 경향이 있다. 통증 양상은 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 통증 강도는 2/10으로 보고된다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호하며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 허리 부위 통증이 있으며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 성질을 가진다. 통증 강도는 2/10이고, 빈도는 지속적이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/73 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 건조하며 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 백태, 니태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 홍삭