

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:14:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 70kg
- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.4°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스와 음주가 악화 요인으로 작용한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 70kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 7일 전부터 허리가 아프기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 요통을 호소하며, 증상이 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동하는 듯하며(遊走痛), 찌르는 듯한 양상(刺痛)을 띠고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면

호전되는 양상을 보인다. 환자는 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 음주와 스트레스가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 안정과 스트레칭 시 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증을 느낀다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움이 2/5 정도 있다. 면색은 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥