

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 93kg
- 활력징후: BP 111/75 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.7°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 가족력으로 중풍이 있다. 장시간 운전 후 허리가 뻣뻣해지는 증상이 발현되었고, 변비와 소화불량을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 93kg, BMI는 32.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 약 6개월에서 1년 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 요통은 지속적으로 나타나며, 증상의 강도는

오르내림을 반복한다. 수면 시에는 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 통증 양상은 묵직한 느낌이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/75 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 2/5이다.
- 면색: 황색을 띈다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 혀가 크다.
- 설태: 백태가 두텁게 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색