

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 58kg
- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.2°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증 병력 있으며, 가족력 상 고혈압, 당뇨, 중풍 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 158cm, 체중은 58kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 요통의 통증 강도는 4/10으로 보고되었다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전 장거리 비행 후 요통이 발생했으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다고 한다. 오래 서 있을 때 통증이 악화된다고 호소한다. 이상지질혈증으로 약물 복용

중이다.

【과거력】

이상지질혈증 진단을 받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압, 당뇨, 중풍 등의 질환이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심, 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 박태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대