

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:55:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 69kg
- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 고혈압 및 중풍 가족력이 있으며, 흡연력이 있고, 땀이 많고 오한을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 69kg, BMI는 22.3이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소하며, 통증은 점차 악화되는 양상이다. 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 요통의 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)이 있으며, 야간에 심해지고 오래 서

있을수록 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 길지만, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 더운 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많고, 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10 이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대