

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 58kg
- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.0°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 58kg, BMI는 26.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1주일 전 장거리 비행 후 요통이 발생했으며, 통증은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 찬바람/냉기, 장시간 앉아있거나 무거운 짐을 들 때 악화되며, 안정을 취하거나 스트레칭을 하면 완화된다. 통증 강도는 3/10이며,

중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통의 양상을 보이고, 오래 서 있을 경우 악화된다. 소화불량 증상으로 복만/복통이 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 5개피/일 흡연한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 대변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 회태, 박태가 껴있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 부대맥이다.