

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:56:44

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 59kg
- 활력징후: BP 112/71 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.9°C

## ■ 요약

69세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 흡연, 저강도 운동 습관을 가지고 있음. 피로감, 하지 부종, 수족냉증을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 59kg, BMI는 20.7이다.

### 【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소하며, 시간이 지날수록 악화되는 양상을 보인다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는

경향을 보인다.

## 【과거력】

고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

비음주자이며, 25개피/일 흡연한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/71 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.9°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭