

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 56kg
- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.1°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이상지질혈증을 앓고 있으며, 수면 부족, 기름진 음식 섭취, 흡연 등의 악화 요인이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 56kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고

호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 알고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 무기력함을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약