VPLYV KLIMATICKÝCH PODMIENOK NA DOJIVOSŤ A KVALITU OVČIEHO MLIEKA PRODUKOVANÉHO POČAS PASTEVNEJ SEZÓNY

THE INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS ON MILK YIELD AND QUALITY OF SHEEP MILK PRODUCED DURING THE GRAZING SEASON

Zuzana Lacková[1], Zuzana Kubišová[1], František Zigo[1], Zuzana Farkašová[1], Mária Vargová[2]

[1]Katedra výživy a chovu zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská Republika
[2]Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská Republika

Cieľom tejto štúdie bolo porovnať mliečnu úžitkovosť a kvalitu produkovaného mlieka počas pastevnej sezóny so zvýšeným tepelným stresom v letných mesiacoch na troch ovčích farmách v okolí Banskej Bystrice, ktoré majú odlišné plemenné zastúpenie chovaných oviec.

Praktická časť štúdie:

- tri ovčie farmy so zameraním produkcie mlieka a výrobou mliečnych produktov
- oblasť stredného Slovenska neďaleko Banskej Bystrice
- apríl – september
- Farma 1 – extenzívny spôsob chovu, vysokohorská oblasť, plemeno cigája
- Farma 2 – polo-intenzívny spôsob chovu, podhorská oblasť, plemeno Lacaune
- Farma 3 – polo-extenzívny spôsob chovu, plemená cigája, zošľachtená valaška a ich kríženci s Lacaune a Slovenskou dojnou ovcou
- zaznamenávané priemerné množstvo nadojeného mlieka z ranného a večerného pôdoja s odberom bazénových vzoriek sledovaných salašov pre kvalitatívne stanovenie zložiek v mlieku ako sú tuk, bielkoviny, laktóza a beztuková sušina (SNF) podľa metodík Záhumenská a kol. (2024).
- zaznamenávané klimatické zmeny počas sledovaného obdobia, ktoré zahŕňali najmä teplotu a zrážky (SHMU)

Výsledky

Obrázok 1 Porovnanie mliečnej úžitkovosti oviec



Poznámka: Farma 1 – extenzívny spôsob chovu, Farma 2 – polo-intenzívny spôsob chovu, Farma 3 – polo-extenzívny spôsob chovu; [a, b] – rôzne písmená nad stĺpcami označujú štatisticky významné rozdiely (P<0,05).

Obrázok 2 Porovnanie priemernej dennej produkcie mlieka oviec z monitorovaných fariem v závislosti od pastevnej sezóny



Poznámka: Farma 1 – extenzívny spôsob chovu, Farma 2 – polo-intenzívny spôsob chovu, Farma 3 – polo-extenzívny spôsob chovu.

Tabuľka 1 Hodnotenie základných ukazovateľov ovčieho mlieka v závislosti od jednotlivých mesiacov

Parameter	Ovčia farma	Monitorované obdobie					Mean±SD
		Máj	Jún	Júl	August	September	
Tuk %	1	8.78	8.01	8.51	7.51	9.97	8.56±0.71[a]
	2	6.77	7.63	7.98	7.85	8.91	7.83±0.85[a]
	3	9.12	8.12	8.72	9.93	11.17	9.41±0.52[b]
Laktóza %	1	4.65	4.87	4.65	4.74	4.42	4.67±0.37
	2	4.93	4.9	4.81	4.69	4.47	4.76±0.54
	3	4.87	4.99	4.76	4.58	4.35	4.71±0.28
Bielkoviny %	1	5.66	5.55	6.01	6.97	7.43	6.32±0.55
	2	5.45	5.53	5.77	6.19	7.15	6.01±0.64
	3	5.52	5.46	5.72	6.4	8.07	6.23±0.78
SNF %	1	10.96	11.42	11.56	12.94	12.86	11.97±1.07
	2	11.17	11.29	11.45	11.79	12.6	11.66±0.86
	3	11.25	11.3	11.35	11.92	13.48	11.86±0.45

Poznámka: Farma 1 – extenzívny spôsob chovu, Farma 2 – polo-intenzívny spôsob chovu, Farma 3 – polo-extenzívny spôsob chovu, [a, b] – rôzne písmená označujú štatisticky významné rozdiely (P<0,05); SNF – beztuková sušina

Záver

Aj keď najvyššia dojnosť bola zaznamenaná na ovčej farme 2 u plemena Lacaune, kvalitatívne zloženie mlieka bolo bohatšie na farmách s kombinovanými plemenami, kde bola dojnosť výrazne nižšia s vyššou výťažnosťou pri výrobe syra. Dôležité je sa zamerať, ktoré plemená oviec je vhodné zvoliť do vybranej oblasti a či je možné poskytnúť požadované podmienky pri čoraz častejších klimatických výkyvov. Klimatické zmeny si vyžadujú potrebu aplikovať na rôznych úrovniach stratégiu zlepšovania adaptability a prispôsobovania, využívajúc pritom vhodné nástroje v oblasti manažovania chovov, v oblasti prevencie a zdravia, ako aj v oblasti šľachtenia a selekcie.

Poďakovanie: Túto prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-22-0457.