# 農学・生態学

2026 年 03 月 16 日

## 目次


農学・生態学——3 つの「縁」が一領域に揃います 2

1. この領域の調査の目的 . . . . . 2
2. 調査方法 . . . . . 2
3. 5 段階モデルの概要 . . . . . 2
4. 調査結果 . . . . . 3
5. 5 段階との対応 . . . . . 5
6. この領域からの洞察 . . . . . 5
7. 未解決の問い . . . . . 6
8. まとめ . . . . . 6

# 農学・生態学——3 つの「縁」が一領域に揃います

## 1. この領域の調査の目的

本報告書は、農学・生態学の主要な理論・実践体系を対象に、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応関係を調査した結果を報告するものです。

農学と生態学は、撹乱と回復、管理と再評価の循環が前提となる領域です。生態系がどのように変化し、安定し、また変化するのか。人間はその過程にどう介入するのか。この循環的な構造に、5 段階モデルがどのように対応するかを検証することが本調査の目的です。

なお、本報告書は調査結果の報告であり、農学の入門書でも、5 段階モデルの証明書でもありません。対応が見つかった箇所と、対応が弱い箇所の双方を報告します。

## 2. 調査方法

本調査では、農学・生態学領域から 10 の理論・実践体系を候補として選定し、5 段階モデルとの構造対応を評価しました。

**選定基準**: 生態学の基礎理論（遷移、レジームシフト、自己組織化）から農学的管理実践（IPM、窒素管理、レンジランド管理）まで幅広くカバーし、特に「境界」「閾値」「フィードバック」に関する理論を重点的に含めました。

**評価手法**: 各候補について、3 つの評価レンズを設定しました。第一に、縁がどのタイプで実装されているか（閾値型・境界型・関係型）です。第二に、フィードバック（渦）が明示的に存在するかです。第三に、農学的管理介入との接続があるかです。複数の AI による多角的評価と、独立したレビューとの突き合わせを実施しました。

**判定基準**: 5 段階の各段階に対応が確認でき、縁の 3 条件（関係網・未決定性・渦への接続）のうち 2 つ以上が高強度の場合を「強い対応」としました。

## 3. 5 段階モデルの概要

本調査で用いた 5 段階モデルを概説します。

**場（ば）**——未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっていない初期条件にあたります。

**波（なみ）**——複数の方向性が発散し、競合する探索の段階です。差異が顕在化し、揺れが生まれます。

**縁（えん）**——対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。複数の関係が交差し、単純な二者択一では解消できません。この段階に留まれるかどうかが、創造の質に深く関わります。

**渦（うず）**——緊張の中から、新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。それまでになかった構造が創発します。

**束（たば）**——形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。束は次の場の前提条件となり、循環が続きます。

ここまでの定義に違和感を覚えるとしたら、それ自体が調査の重要な観点です。違和感を持ったまま読み進めることも、ここで一度立ち止まることも、どちらも意味があります。

## 4. 調査結果

### 全体像

農学・生態学領域から評価した 10 件の候補は、全件が採用と判定されました（Accept 10 件）。縁との対応の強度では、5 件が最高評価、5 件が中程度の評価でした。

この領域の際立った特徴は、縁が 3 つの異なるタイプで現れることです。閾値型（分岐点としての縁）が 4 件、境界型（界面としての縁）が 3 件、関係型（ネットワークとしての縁）が 2 件、複合型が 1 件でした。一つの領域内でこれだけ多様な縁の実装が揃うのは、30 領域の中でも稀です。

### 閾値型の縁——「分岐点」としての縁

**レジームシフト**は、縁を理論の核心に据えた最も直接的な事例です。生態系は条件の変化に対して連続的に変わるだけでなく、閾値（tipping point）を境に別の安定状態へ急激に移行します。湖沼が透明な水から濁った水へ突然転換する現象は、その典型です。

閾値を超えるとヒステリシス（非可逆性）により元の状態に戻りにくくなります。この構造は 5 段階の「縁」——対立する要素が共存する緊張状態——を、「越えると戻れない分岐点」として具現化しています。閾値の正確な位置は事前に確定しにくく、臨界点の接近に伴う統計的兆候（分散の上昇、自己相関の増大）が「早期警告シグナル」として研究されています。

**総合的病害虫管理（IPM）**は、閾値を管理ツールとして制度化した例です。害虫密度が経済的被害水準（EIL）を超えた場合にのみ介入するという意思決定モデルでは、閾値が「いつ介入するか」を定量的に定義する形式的な分岐点として機能します。レジームシフトが「系に内在する閾値」に当たるのに対し、IPM は「人間が設定した閾値」です。この対比は、縁が発見されるものなのか、それとも設計されるものなのかという問いを浮かび上がらせます。

**景観コネクティビティとパーコレーション閾値**は、空間構造における閾値を扱います。生息地の量や配置がわずかに変わるだけで、生物の移動成功や個体群応答が不連続に急変します。物理学のパーコレーション理論を生態学に適用したこの枠組みは、「つながり」と「分岐点」の二重性を持っています。森が少し減っただけで動物が突然いなくなるという現象は、閾値近傍の非線形性を鮮やかに示しています。

### 境界型の縁——「界面」としての縁

**生態学的境界理論（エコトーン）**は、縁を理論の中心概念として正面から扱います。境界を「パッチ間コントラスト」「フローの種類」「境界の性質」で一般化するこの枠組みでは、境界は単なる線ではなく、フローを変換し相互作用を編成する「機能的要素」として扱われます。

「縁は線ではなく機能的要素である」という主張は、5 段階の「縁」を静的な区切りではなく、場と場をつなぎ変換する動的な装置として理解する手がかりになります。境界の透過性という概念は、他の領域にも構造的な示唆を持ちます。

**生態系エンジニアリング**は、生物が境界条件そのものを構築するという視点を提供します。ビーバーがダムを作り、水系の境界条件を物理的に再配置することで、新たなハビタットが創造されます。他の理論が「既に存在する縁」を分析するのに対し、この理論は「縁が作られる」過程を扱います。縁は所与ではなく構築されうるという視点は、5 段階の理解を動的に拡張します。

### 関係型の縁——「ネットワーク」としての縁

**植物-土壌フィードバック**では、根圏（rhizosphere）が植物と土壌生物を結合する「関係の結節点」として機能します。植物が土壌生物群集を変化させ、変化した土壌が次の植物成長に正または負の影響を返す——この循環的な枠組みにおいて、縁は閾値や界面ではなく、関係のネットワークとして現れます。

フィードバックの符号（正か負か）が異なる帰結を生む点は重要です。正のフィードバックは特定種の優占を、負のフィードバックは種の共存を促進します。渦の方向性が束を決定するこの構造は、農学では連作障害（負のフィードバック）と輪作効果（フィードバック方向の管理的操作）として実践に直結します。

### 視覚的に「見える」5 段階——乾燥地の自己組織化

**乾燥地植生の自己組織化パターン**は、5 段階の全過程が単一の現象内で完結し、しかも衛星画像で文字通り「見える」稀有な事例です。水の制限下で、植生が縞模様や斑点状の規則的パターンを自発的に形成します。局所的な促進と遠距離の抑制というスケール依存フィードバックによる自己組織化が、均質な状態（場）から規則的パターン（束）への変換を駆動します。

この理論は渦（自己組織化フィードバック）が中心にあり、化学の Belousov-Zhabotinsky 反応や物理の散逸構造と数理的に同型（チューリング不安定性）です。領域を超えて同じ数理構造が繰り返し現れることは、5 段階の構造対応が特定の領域に固有ではない可能性を示唆しています。

## 5. 5 段階との対応

### 場——撹乱後の初期条件

農学・生態学における「場」は、撹乱後の裸地（生態遷移)、土壌中の窒素プール（窒素循環)、景観のモザイク構造（パーコレーション)、均質な環境条件（乾燥地植生）など、探索や変化が始まる前の初期条件として現れます。多くの場合、前のサイクルの束が崩れた状態、あるいは新たな条件が設定された状態です。

### 波——揺らぎと差異の顕在化

先駆種の侵入と資源競争（生態遷移)、温度・水分変動による窒素形態の偏り（窒素循環)、害虫個体群の増減（IPM)、環境条件の変動による系の不安定化（レジームシフト）——いずれも、初期条件の中から差異や揺らぎが顕在化する段階です。

### 縁——3 タイプの多様な実装

前節で詳述したとおり、農学・生態学では 3 つの異なるタイプの縁が確認されました。閾値型は分岐点として、境界型は界面として、関係型はネットワークとして、それぞれ異なる構造で「縁」を実装しています。この多様性は、5 段階の「縁」という概念が単一の現象を指すのではなく、複数の構造的パターンを包含する概念だということを示唆します。

### 渦——フィードバックによる秩序の形成

全 10 件でフィードバック（渦）が明示的に確認されました。特に、レジームシフトの自己強化フィードバック、乾燥地植生のスケール依存フィードバック、植物-土壌相互作用の正負フィードバックの 3 件では、渦が理論の核心部分を占めています。IPM と状態-遷移モデルでは、管理サイクル（介入→生態系の応答→再評価）として渦が現れます。

### 束——安定状態と管理の制度化

極相群集構造 (生態遷移)、収量水準と残留窒素量 (窒素循環)、地域標準的な IPM プロトコル (IPM)、新たな安定状態（レジームシフト)、規則的な空間パターン（乾燥地植生）——束は安定した構造として確定します。農学においては、束が管理指針やガイドラインとして制度化される場面が多くあります。USDA が状態-遷移モデルを草地管理指針に採用した例は、束の制度化を端的に示しています。

## 6. この領域からの洞察

### 縁の 3 タイプ

農学・生態学が本調査全体に提供する最も重要な洞察は、縁が少なくとも 3 つの異なるタイプで実装されうるという発見です。

- **閾値型**——系がある条件を超えると質的に異なる状態へ移行する分岐点です（レジームシフト、パーコレーション閾値、IPM の経済閾値、状態-遷移モデルの遷移条件）。
- **境界型**——異なる系の間でフローを変換し相互作用を編成する界面です（エコトーン、根圏の物質界面、生態系エンジニアの構造物）。
- **関係型**——複数の要素を結合するネットワークの結節点です（種間相互作用、植物-土壌フィードバックの宿主特異性）。

この分類は他の領域にも適用可能な枠組みを提供します。

### 「発見される縁」と「設計される縁」

IPM（人間が設定した閾値）とレジームシフト（系が内在する閾値）の対比、そして生態系エンジニアリング（生物が境界を構築する）の知見は、「縁は発見されるものか、それとも設計されるものか」という問いを浮かび上がらせます。この問いは保持論点として残します。

### スケール横断のフラクタル

根圏の分子界面（窒素循環）→個体群レベルの種間関係（生態遷移）→景観レベルのパッチ間接続（パーコレーション）→地域・地球規模のレジームシフト——「関係の構造」が異なるスケールで同じパターンを繰り返す傾向が確認されました。

## 7. 未解決の問い

- **縁の 3 タイプの統合**: 閾値型・境界型・関係型は独立した概念なのか、それとも一つの構造の異なる側面なのかは、まだ結論が出ていません。
- **「設計される縁」の射程**: 生態系エンジニアリングや IPM の知見は、「縁は構築できる」ことを示唆します。しかし、構築可能な縁と構築不可能な縁の境界がどこにあるのかは未解決です。
- **管理介入と 5 段階の関係**: 農学的管理が 5 段階のどの段階に作用するのか、管理介入が 5 段階の循環を促進する場合と阻害する場合の条件は何か、という点は未整理です。
- **「非連続的変化」と 5 段階**: レジームシフトが示す非連続的な変化が、5 段階の連続的な循環モデルとどう整合するかは未解決です。この緊張は認識されていますが、解消されていません。

## 8. まとめ

農学・生態学は、5 段階モデルとの構造対応が非常に高い領域です。10 件の候補すべてが採用と判定され、そのうち 5 件が縁との対応で最高強度の評価を得ました。

この領域の最も重要な貢献は、縁が 3 つの異なるタイプ（閾値型・境界型・関係型）で実装されうることを示した点です。この多様性は、5 段階モデルの「縁」が単一の現象ではなく、複数の構造的パターンを包含する概念だということを示唆しています。

ただし、これらの対応の一部は解釈を含みます。特に、生態遷移や窒素循環における縁は、レジーム

シフトや境界理論ほど明確な構造を持ちません。また、「非連続的変化」と「5 段階の循環」の関係は未解決の問いとして残されています。

本調査は、農学・生態学が 5 段階モデルの構造——とりわけ「縁の多様性」——を理解するための豊かな基盤を提供することを確認しました。同時に、対応の強弱には明確な差があり、すべてが同じ確度で成り立つわけではないことも報告します。