農学・生態学

2026 年 03 月 31 日

目次

農学・生態学 2

1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 3
3. モデルの概要 3
4. 調査結果: 全体像 4
5. 調査結果: 主要な知見 5
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 11
8. 結論 12

Colophon 12

農学・生態学

立ち位置明示 本稿は、農学・生態学の主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい。

1. 調査の目的と問い

図 1　農学・生態学 — 調査概要インフォグラフィック

本調査は、農学・生態学における撹乱と回復、管理と再評価のプロセスが「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」と構造的に対応するかどうかを検討するものです。

農学・生態学は、生態系の動態から農業の管理実践まで、自然の自律過程と人間の介入が交差する領域です。先駆種の侵入から極相群集への到達、湖沼のレジームシフト、乾燥地に自然に現れる植生パターン、病害虫の管理判断、牧草地の状態遷移など、この領域の現象には段階的な変容の構造が繰り返し現れます。

本調査では、こうした農学・生態学のプロセスに 5 段階モデルの構造が認められるかを、以下の問いを軸に検証しました。

- 生態系の動態や農学的管理プロセスは、5 段階モデルの構造と対応するか

- 生態学的な「閾値」「境界」「フィードバック」は、5 段階モデルのどの段階と接続するか
- 人間が設計した管理閾値と、系が内在する自然の閾値は、構造的にどう区別されるか
- 個体群スケールから景観スケールまでの階層横断において、共通する構造は見出せるか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査は、以下の手順で進められました。

まず、農学・生態学の各分野から 5 段階モデルとの構造的類似が期待される理論・概念を選定し、一次文献・教科書級文献に基づいて生態学・農学的事実を確認しました（Phase 1-2）。次に、各理論について複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました（Phase 3-4）。

判定基準は以下のとおりです。

- **強い対応**: 生態学・農学のプロセスが 5 段階の全順序と直接一致し、複数の独立した文献系統で支持されるもの
- **部分的な対応**: 一部の段階に明確な対応が確認されるが、全 5 段階にわたる対応は限定的であるもの
- **条件付きの対応**: 対応は示唆されるが、特定条件下でのみ成立するもの

その後、Phase 5（論拠監査）で既存 10 件の強度分類とギャップ分析を実施し、Phase 6（構造再読）で各エントリの 5 段階対応を 4 軸（正確な対応・怪しい対応・破綻箇所・見えていなかった構造）で再評価しました。Phase 7（横断統合）で領域内の横断パターンを抽出しました。

調査の限界

本調査は生態学の群集動態・景観生態学と、農学の病害虫管理・牧草地管理を軸としており、農業経済学、品種改良のプロセス、土壌肥沃度の長期変動といった農学固有の重要概念は調査対象に含まれていません。10 件のうち生態学寄りのエントリが多数を占めており、この選択がドメイン全体の代表性に影響している可能性があります。5 段階モデルとの対応は構造的類似の検討であり、農学・生態学の理論と 5 段階モデルが同一であるという主張ではありません。

方法論的開示（S60）

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく 確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーション があり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを 含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造プロセスを 5 つの段階で記述する枠組みです。

場（ば）は、未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、潜在的な可能性を含む初期条件にあたります。農学・生態学の文脈では、撹乱後の裸地、土壌中の窒素プール、景観モザイク、均質な環境条件がこの段階に対応します。場は固定的な「所与の前提」ではなく、生態系エンジニアの活動（ビーバーのダム建設など）によって動的に構築されたり、束からの回帰（撹乱後の生態遷移）によって更新されたりします。

波（なみ）は、場の中に差異が生まれ、複数の方向性が発散・競合する段階です。農学・生態学では、先駆種の侵入、温度や水分の変動による窒素形態の偏り、微小なノイズが均質な環境を不安定化させる現象がこの段階にあたります。波は「外から加わる単なる撹乱」ではなく、「場に差異を刻む力」としてはたらきます。

縁（えん）は、対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。農学・生態学では、3 つの異なるタイプの縁が確認されました。第 1 に、レジームシフトの臨界点やパーコレーション閾値のように系のダイナミクスから自然に生じる閾値型の縁。第 2 に、総合的病害虫管理（IPM）の経済閾値や状態遷移モデル（STMs）のように人間が管理目的で設定する設計的な縁。第 3 に、エコトーンや生態系エンジニアリングのように物理的に構築される境界型の縁です。この 3 タイプの縁が一つの領域内に揃うことが、農学・生態学の大きな特徴です。

渦（うず）は、縁での緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。農学・生態学では、各安定状態を維持する自己強化フィードバック、乾燥地植生のスケール依存フィードバック（局所促進と遠距離抑制の同時作用）、植物と土壌の間の正負のフィードバックがこの段階にあたります。注目すべきは、渦には方向性があるという点です。正のフィードバック（収束・強化）は優占という束を、負のフィードバック（分散・抑制）は共存という束を生みます。渦の方向が束の性質を決定する構造は、この領域の重要な知見です。

束（たば）は、形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。農学・生態学では、極相群集、IPM プロトコルの制度化、USDA ガイドラインの標準化、衛星画像で確認できる乾燥地の空間パターンがこの段階に対応します。束には「自然過程の束」（生態学的安定状態）と「制度化された束」（管理プロトコル・ガイドライン）の両方が存在します。また、束から場への回帰には連続的な回復が容易なもの（生態遷移）から、ヒステリシスにより元の状態への回帰が困難なもの（レジームシフト）まで、スペクトラムが存在します。

4. 調査結果: 全体像

本調査では農学・生態学から 10 の理論・概念を評価し、5 段階モデルとの構造対応を検討しました。

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
1	生態遷移	Clements (1916), Connell & Slatyer (1977)	場→波→縁→渦→束の全過程	部分的な対応
2	農地窒素循環	Robertson & Vitousek (2009)	場→波→縁→渦→束の全過程	部分的な対応

#	理論/概念	提唱者	主な対応段階	判定
3	総合的病害虫管理（IPM）と経済閾値	Stern et al. (1959), Pedigo et al. (1986)	縁が特に強い	強い対応
4	レジームシフト／複数安定状態	Scheffer et al. (2001)	縁・渦が特に強い	強い対応
5	生態学的境界理論（エコトーン）	Cadenasso et al. (2003)	縁が理論の中心	強い対応
6	景観コネクティビティとパーコレーション閾値	With & Crist (1995)	縁が特に強い	強い対応
7	乾燥地植生の自己組織化パターン	Klausmeier (1999), Rietkerk et al. (2002)	渦・束が特に強い	部分的な対応
8	植物-土壌フィードバック	Bever (1994), Klironomos (2002)	縁→渦→束の連鎖	条件付きの対応
9	生態系エンジニアリング	Jones et al. (1994)	縁の構築性	条件付きの対応
10	状態-遷移モデル（STMs）	Westoby et al. (1989)	縁が特に強い	部分的な対応

温度帯の分布は、強い対応が 4 件、部分的な対応が 4 件、条件付きの対応が 2 件でした。全 10 件のうち、「縁」との対応が特に充実しており、閾値型（分岐点としての縁）、境界型（界面としての縁）、関係型（ネットワークとしての縁）の 3 タイプが揃いました。「渦」（フィードバック）は全 10 件で明示されています。「束」の記述はやや薄く、制度化された束（IPM、STMs）と空間パターンとしての束（乾燥地植生）が具体的である一方、他のエントリでは抽象的な記述にとどまる傾向がありました。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 生態遷移（Clements, Connell & Slatyer, Holling）

事実として: 撹乱後の生態系では先駆種が侵入し、種間競争を経て極相群集へと遷移します。Clements（1916）が古典的な遷移モデルを提示し、Connell & Slatyer（1977）が促進・耐性・阻害の 3 つのメカニズムを区別しました。Holling（1973）はレジリエンス概念を定義し、撹乱からの回復能力を定量化する枠組みを提供しました。

読み取りとして: ここでは、撹乱後の裸地から極相群集に至る段階的な変化のプロセスを読み取りま

図 2　農学・生態学 — 理論 ×5 段階対応マトリクス

す。類似の水準はプロセスであり、「撹乱→先駆種侵入→種間競争→群集形成→極相」という順序構造に着目します。ただし、Connell & Slatyer の 3 メカニズム（促進・競争・捕食）がすべて「縁」に包摂される点には注意が必要です。促進は「縁が波を増幅する」機能、競争は「縁が選別する」機能、捕食は「縁が除去する」機能であり、一つの段階に異質な機能が含まれています。

解釈として:「撹乱後の裸地（場）→先駆種の侵入（波）→種間相互作用（縁）→群集パターンの形成（渦）→極相群集（束）」という 5 段階の対応が成立します。撹乱による束から場への回帰も自然に観察されるため、循環構造を備えた生態学的な体現といえます。ただし、歴史偶発性（どの種が先に到着するか）が遷移経路を分岐させる点は、5 段階の決定論的な順序構造とは本質的に異なる要素であり、この差異は未解決の問いとして残ります。

5.2 農地窒素循環（Robertson & Vitousek）

事実として: 農地の窒素循環は、施肥・硝化・脱窒・植物吸収・溶脱が連結した物質循環系です。Robertson & Vitousek（2009）は、収量最大化と環境負荷低減の二目的最適化が農学的に核心であることを示しました。物質収支として定量的に評価可能であり、各段階の流量が計測できます。

読み取りとして: ここでは、物質循環における段階的な変換プロセスを読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、窒素が異なる化学形態に変換されながら系内を循環する流れに着目します。根

圏・微生物・土壌粒子の三者が出会う界面が、物質的な「縁」として機能しています。

解釈として:「土壌中の窒素プール（場）→温度・水分変動による窒素形態の偏り（波）→根圏の界面での変換反応（縁）→作物吸収と微生物変換のフィードバック（渦）→収量水準と残留窒素量としての安定化（束）」という対応が成立します。物質収支としての裏付けは堅固ですが、「束」の記述が抽象的であり、精密農業における窒素管理基準の制度化など、より具体的な安定構造の記述が求められます。

5.3 総合的病害虫管理（IPM）と経済閾値（Stern, Pedigo）

事実として: IPM は、害虫密度・天敵動態・被害閾値を統合し、経済的被害水準（EIL）を超えた場合にのみ介入する意思決定モデルです。Stern et al.（1959）が統合的防除の概念を提唱し、Pedigo et al.（1986）が EIL（経済的被害水準）と ET（経済閾値）を定式化しました。EIL は害虫による経済的損失と防除コストが釣り合う密度であり、ET は EIL に到達する前に措置を開始すべき水準です。農林水産省も IPM 実践指針を整備しています。

読み取りとして: ここでは、閾値に基づく意思決定の分岐構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「EIL/ET という数値的に定義された閾値を境に Go/No-Go が決まる」という分岐の構造に着目します。この分岐構造は、5 段階モデルの「縁」概念の最も明示的な制度的実装の一つです。

解釈として:「圃場の初期条件（場）→環境変化による害虫個体群の増減（波）→ EIL/ET による意思決定の分岐点（縁）→統合的防除戦略の運用（渦）→ IPM プロトコルの制度化（束）」という対応が成立します。モニタリング→閾値判定→介入→再評価の循環管理モデルとして、5 段階の循環構造を制度的に体現しています。特筆すべきは、ここでの「縁」が系が内在する自然の閾値ではなく、人間が管理目的で設計した閾値であるという点です。

5.4 レジームシフト／複数安定状態（Scheffer, Carpenter）

事実として: 生態系は条件変化に対して連続的に変わるだけでなく、閾値（tipping point）を境に別の安定状態へ急激に移行します。Scheffer et al.（2001）がレジームシフトの理論的枠組みを整理しました。レジームシフト後はヒステリシスにより元の状態へ戻りにくく、管理・復元の考え方が連続モデルとは根本的に異なります。Carpenter & Brock（2006）は、臨界点接近に伴う統計的兆候（分散上昇、自己相関増大）が「早期警告シグナル」として機能する可能性を示しました。

読み取りとして: ここでは、閾値を境にした非連続的な状態変化の構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「閾値を超えると不可逆的に系の状態が変化する」という分岐と固定化の構造に着目します。ヒステリシスの存在は、「縁を越えると束が不可逆に変わる」という 5 段階固有の制約として読むことができます。

解釈として:「外生条件（場）→条件変動・ノイズによる不安定化（波）→閾値の超過（縁）→自己強化フィードバックによる新状態の維持（渦）→新たな安定状態への収束（束）」という対応が成立します。理論の核が閾値（縁）そのものであり、5 段階との対応は最も直接的です。早期警告シグナル（波の性質が変わることで縁の接近が予測できる）は、5 段階間の遷移が前兆を持つ可能性を示唆す

る重要な知見です。

5.5 生態学的境界理論（Cadenasso）

事実として: Cadenasso et al.（2003）は、生態学的境界を「パッチ間コントラスト」「フローの種類（生物・物質・エネルギー・情報）」「境界の性質」で一般化する枠組みを提示しました。境界は単なる線ではなく、フローを変換し相互作用を編成する「機能的要素」として扱われます。

読み取りとして: ここでは、理論の中心概念そのものが「縁」に対応する構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「境界が選択的にフローを透過・変換するフィルターとして機能する」という配置関係に着目します。他の理論が「理論の中に縁を見出す」のに対し、境界理論は「縁そのものを理論化した」ものであり、対応の直接性が際立ちます。

解釈として:「景観モザイク（場）→フローの時間的揺らぎ（波）→境界面の性質・透過性・変換能（縁）→境界がフローを変換し環境を変え境界機能をさらに変える循環（渦）→境界機能の安定化（束）」という対応が成立します。「境界の透過性」という概念は、5 段階の縁を「全てを通すか全てを遮断するかの二値」ではなく「選択的に変換するフィルター」として精密に定式化する手がかりとなります。

5.6 景観コネクティビティとパーコレーション閾値（With & Crist, Taylor）

事実として: 景観内の生息地の量や配置がわずかに変わるだけで、個体の移動成功や個体群の応答が不連続に急変する「臨界閾値」が存在します。With & Crist（1995）はパーコレーション理論を用いてこの閾値的挙動を評価し、Taylor et al.（1993）は連結性を景観構造全体の創発特性として捉えました。

読み取りとして: ここでは、パーコレーション理論の臨界閾値を読み取ります。類似の水準は構造であり、「接続と分岐が同一の臨界点で同時に起こる」という構造に着目します。パーコレーション理論のユニバーサリティ（系の詳細に依存しない普遍的挙動）は、5 段階が領域を横断して出現する理論的基盤の候補となります。

解釈として:「生息地モザイク（場）→局所的な損失・撹乱（波）→パーコレーション閾値（縁）→移動成功と個体群存続の循環的強化・弱化（渦）→連結ネットワークまたは断絶クラスターとしての安定化（束）」という対応が成立します。「つながりの縁」（接続の成立）と「分岐点の縁」（状態の変化）の二重性は、5 段階の「縁」概念が二つの異なる機能を同時に担えることを示しています。

5.7 乾燥地植生の自己組織化パターン（Klausmeier, Rietkerk）

事実として: 水制限下の生態系で、植生が縞模様や斑点状の規則的空間パターンを示します。Klausmeier（1999）がこの現象の数理モデルを提示し、Rietkerk et al.（2002）がスケール依存フィードバック（局所促進と遠距離抑制）で自己組織化が生じるメカニズムを示しました。von Hardenberg et al.（2001）は、降水量変化に応じて裸地→斑点→迷路→縞→均質植生と多様なパターンが出現することを報告しました。

読み取りとして: ここでは、5 段階の全過程が単一の現象で完結し、「束」が衛星画像で直接観察できるという稀有な構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、均質な状態から自己組織化を経て規則パターンに至る一連の流れに着目します。ただし、理論の重心は「渦」（自己組織化フィードバック）にあり、「縁」は二重の役割（分岐条件とパッチ境界）を担っています。

解釈として:「均質な環境条件（場）→微小ノイズ・降雨変動（波）→均質状態が不安定化する臨界条件（縁）→スケール依存フィードバックによる自己組織化（渦）→縞・斑点・迷路状の安定パターン（束）」という対応が成立します。降水量というパラメータに応じて複数の異なるパターン（束）が選択される構造は、5 段階が線形に進行するモデルではなく、場の条件に依存して束が分岐する構造であることを示唆します。

5.8 植物-土壌フィードバック（Bever, Klironomos）

事実として: 植物は土壌生物群集（病原菌・共生菌・分解者）を変化させ、変化した土壌が次の植物成長に正または負の影響を返します。Bever（1994; 1997）がこの循環的枠組みを提示し、Klironomos（2002）が希少種と侵入種でフィードバックの方向が異なることを実証しました。負のフィードバックは種の共存を促進し、正のフィードバックは優占を促進します。

読み取りとして: ここでは、フィードバックの正負の方向が群集の帰結を決定する構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、「正のフィードバックが優占を、負のフィードバックが共存を生む」という方向性のあるダイナミクスに着目します。根圏（rhizosphere）が異なる系を結合する「関係の結節点」として機能する点も重要です。

解釈として:「土壌の物理化学条件と既存の微生物群集（場）→土壌生物の揺らぎ（波）→根圏での結合（縁）→正負フィードバックの循環（渦）→共存構造または優占状態（束）」という対応が成立します。ただし、「波」の記述が抽象的であり、どのような揺らぎが具体的に差異を生むのかについてさらなる具体化が望まれます。

5.9 生態系エンジニアリング（Jones）

事実として: 生物が捕食や競争ではなく、環境を物理的に改変することで他種の資源利用可能性を変え、ハビタットを創造・維持します。Jones et al.（1994; 1997）がこの概念を提示し、ビーバーのダム、ミミズの土壌改変、サンゴの礁形成など多様な例が報告されています。

読み取りとして: ここでは、「縁は所与ではなく構築される」という視点を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、生物が物理的な構造物を通じて境界条件を再配置するプロセスに着目します。ただし、構造物が「縁」として機能するのは、異なるフロー間の界面として作用する場合に限られ、「新しい場を作っている」と読むほうが自然なケースも存在します。

解釈として:「改変前の物理環境（場）→エンジニアの個体群変動（波）→構造物による境界条件の再配置（縁）→環境改変と生物存続の循環（渦）→再編されたハビタットの安定化（束）」という対応が成立します。しかし、この理論は同時に「場の構築性」をも含意しており、5 段階の出発点である場そのものが生物によって内生的に決まる可能性を示唆しています。

5.10 状態-遷移モデル／ STMs（Westoby, Briske）

事実として: 単線的遷移モデルでは捉えにくいレンジランドの変化を、「複数の状態」と「状態間の遷移」のカタログとして表現する枠組みです。Westoby et al.（1989）が提唱し、Briske et al.（2003）が閾値を越えると元に戻りにくい遷移の非可逆性を議論しました。USDA が草地管理指針に STMs を採用し、管理ツールとして制度化されています。

読み取りとして: ここでは、レジームシフトの理論を管理ツールに変換する制度化プロセスを読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「状態・遷移・閾値」というモデル要素が 5 段階の場・縁・束に直接対応する構造に着目します。レジームシフト理論（5.4）の管理実装版として位置づけられます。

解釈として:「サイトの基礎条件（場）→降雨変動・火入れ・放牧圧（波）→閾値と遷移条件（縁）→状態ごとの自己維持フィードバック（渦）→特定状態への定着（束）」という対応が成立します。IPM（5.3）と並んで「閾値を制度化して管理に組み込む」という構造を持ち、両者を比較すると「縁の制度化」という共通パターンが浮かび上がります。

6. 横断的パターン



図 3　農学・生態学 — 横断的パターン図

本調査で農学・生態学の 10 理論を検討した結果、以下の横断的パターンが浮かび上がりました。

6.1 縁の三起源

農学・生態学には、縁の起源が異なる 3 つのモードが共存しています。第 1 は「内在的縁」であり、系のダイナミクスから自然に出現する閾値です（レジームシフトの臨界点、パーコレーション閾値、乾燥地植生の不安定化条件）。第 2 は「設計的縁」であり、人間が管理目的で設定する閾値です（IPM の経済閾値、STMs の遷移条件）。第 3 は「構築的縁」であり、生物活動によって物理的に構築される境界です（エコトーン、生態系エンジニアリング）。

この三分法は、他領域でも適用可能かもしれません。工学（設計的縁が主）、物理学（内在的縁が主）、進化生物学（構築的縁としてのニッチ構築）との対応が予測されますが、これは仮説段階にとどまります。

6.2 渦の方向性

複数のエントリで、渦から束への遷移に方向性があることが確認されました。植物-土壌フィードバックでは正のフィードバックが優占を、負のフィードバックが共存をもたらします。レジームシフトでは自己強化フィードバックが新レジームを固定します。乾燥地植生では局所促進（正）と遠距離抑制（負）の同時作用がパターンを決定します。

5 段階モデルの現在の定義では、渦は「まとまりが回転しながら維持される」動的構造とされていますが、その回転の方向（正・負・正負同時）が束の性質を決定するという視点は含まれていません。渦の方向性パラメータの導入は、5 段階モデルの渦→束遷移の記述を精緻化する可能性があります。

6.3 管理介入の挿入点

農学・生態学は、管理介入が 5 段階のどの段階に作用するかを明示できる稀有な領域です。場への介入（施肥、土地利用変更）、波への介入（火入れ、灌漑）、縁への介入（経済閾値の設定、バッファーゾーン設計）、渦への介入（輪作による負のフィードバック利用）、束への介入（IPM プロトコル、USDA ガイドライン）と、5 段階の各段階に対応する介入が具体的に同定されています。

6.4 束から場への回帰のスペクトラム

10 件のエントリ内で、「束が場に回帰する容易さ」に連続的なスペクトラムが存在することが確認されました。生態遷移では撹乱後の連続的回復が容易であるのに対し、レジームシフトではヒステリシスにより回帰が困難です。STMs では管理介入なしには望ましい状態を維持できず、回帰コストが障壁となります。5 段階モデルが循環構造を持つなら、この「回帰のレジリエンス」は完全な記述に不可欠なパラメータと考えられます。

7. 未解決の問い

本調査では、以下の問いに対する結論が得られていません。

- **渦と束の区分**: レジームシフトの「安定状態の自己維持」は渦（動的維持）なのか束（安定的定着）なのかが曖昧です。自己強化フィードバックで維持される安定状態は両方の性質を持ちます。この区分問題は農学・生態学に限らず、5 段階モデル全体に関わる構造的問題です。
- **縁の三起源の一般性**: 農学・生態学で確認された「内在的・設計的・構築的」という縁の三分法が、他の領域でも成立するかは未検証です。
- **渦の方向性パラメータの導入**: 渦の正負の方向が束の性質を決定するという知見を、5 段階モデルの定義に組み込むべきかどうかは、さらなる検討が必要です。
- **5 段階は離散的段階か連続的ランドマークか**: 早期警告シグナル（波の性質変化が縁の接近を示す）の存在は、段階間の遷移が前兆を持つことを示唆します。これが全ドメインで普遍的に成立するかは未確認です。
- **場の構築性**: 生態系エンジニアリングは「場そのものが生物によって構築される」ことを示唆しますが、5 段階モデルは既存の場から出発する前提に立っています。場の出発点が内生的に決まる場合、モデルの前提をどう修正すべきかは対立する見解が残っています。

8. 結論

結びの温度開示 本調査の知見は確定から仮説までの温度帯に分布しています。

農学・生態学は、5 段階モデルとの構造対応が広範かつ多層的に確認された領域です。10 件の理論・概念すべてにおいて何らかの構造対応が認められ、うち 4 件（IPM、レジームシフト、境界理論、パーコレーション閾値）では特に強い対応が確認されました。

この領域の最大の特徴は、「縁」の多様性です。閾値型・境界型・関係型という 3 タイプの縁が一つの領域内に揃い、さらに縁の起源が「内在的・設計的・構築的」の三分法で整理できることが示されました。また、渦の方向性が束の性質を決定するという知見、管理介入が 5 段階の各段階に具体的に挿入できるという発見は、この領域に固有の重要な示唆です。

ただし、これらの対応は「農学・生態学の理論が 5 段階で記述できること」を示すものであり、「なぜそうなるか」を説明するものではありません。記述的適合と因果的説明の区別は維持されなければなりません。また、あらゆる生態学的相互作用を「縁」と呼ぶ過適合のリスク、渦と束の区分の曖昧さ、農学寄りエントリの不足といった限界は、今後の調査で対処すべき課題として残っています。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-18
generator_model	claude-opus-4-6
evidence_count	10 件（強い対応: 4, 部分的対応: 4, 条件付き対応: 2）
source_evidence	evidence-D12-agriculture.md

項目	値
source_dr	DR-D12-agriculture-ecology.md
reader_rules	reader-rules-creation v2.2
template	domain-report-template v1.0