

# La fonction exponentielle

1<sup>re</sup> Spécialité mathématiques  
Analyse - Cours

## I. Généralités sur la fonction exponentielle

### 1. Introduction

#### Définition et propriété admise :

Il existe une unique fonction  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

Cette fonction est appelée fonction exponentielle et se note  $\exp$ .

Ainsi, pour tout réel  $x$ , on a  $\exp'(x) = \exp(x)$  et  $\exp(0) = 1$ .

### 2. Propriétés algébriques

#### Lemme :

Pour tout réel  $x$ , on a  $\exp(x) \neq 0$ .

#### Propriétés :

1. Pour tous réels  $x$  et  $y$ , on a  $\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$ .  
Cette relation s'appelle relation fonctionnelle.

2. Pour tous réels  $x$  et  $y$ , on a :

- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
- $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$
- $\exp(nx) = \exp(x)^n$

### 3. La notation $e^x$

#### Définition :

L'image de 1 par la fonction  $\exp$  est le nombre noté  $e$ , appelé constante d'Euler.

Ainsi,  $\exp(1) = e$ .

**Remarque :** La fonction  $\exp$  possède les mêmes propriétés algébriques que les fonctions puissances. On notera donc  $\exp(x) = e^x$  ( $e \approx 2,7182\dots$ ).

#### Propriété :

Pour tous réels  $x$  et  $y$ , on a :

- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $(e^x)^n = e^{nx}$

#### 4. Lien avec les suites géométriques

**Propriété :**

Soit  $a$  un réel. Soit  $u$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = e^{na}$ .  
Alors la suite  $u$  est une suite géométrique.

## II. Étude et applications de la fonction exponentielle

### 1. Signe de la fonction exponentielle

**Propriété :**


La fonction  $\exp$  est strictement positive sur  $\mathbb{R}$ .  
Autrement dit : pour tout nombre réel  $x$ ,  $e^x > 0$ .

### 2. Variations de la fonction exponentielle

**Propriété :**


La fonction  $\exp$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

On résume dans le tableau de variation suivant :

$x$	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	
Variations de $f(x) = e^x$		

### 3. Courbe de la fonction exponentielle

$x$	$e^x$
-2	$\approx 0,13$
-1,5	$\approx 0,22$
-1	$\approx 0,37$
-0,5	$\approx 0,61$
0	1
0,5	$\approx 1,65$
1	$\approx 2,72$
1,5	$\approx 4,48$
2	$\approx 7,39$



### 4. Fonctions définies par $f(t) = e^{kt}$ avec $k \in \mathbb{R}$

**Propriété :**

Pour  $k > 0$ , la fonction  $f$  définie par  $f(t) = e^{kt}$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .  
Pour  $k < 0$ , la fonction  $f$  définie par  $f(t) = e^{kt}$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$ .

## 5. Fonctions du type $f : x \mapsto e^{ax+b}$

### Propriété :

Pour  $a$  et  $b$  fixés, la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{ax+b}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = a \times e^{ax+b}$ .

## 6. Équations et inéquations

### Propriété :

Pour tous réels  $a$  et  $b$ , on a :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

### Exemples :

- On résout dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $e^{2x+1} = e^{x-3}$  :

$$\begin{aligned} e^{2x+1} &= e^{x-3} \\ \Leftrightarrow 2x+1 &= x-3 \\ \Leftrightarrow x+1 &= -3 \\ \Leftrightarrow x &= -4 \\ \Leftrightarrow S &= \{-4\} \end{aligned}$$

- On résout dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $e^{x-3} < 1$  :

$$\begin{aligned} e^{x-3} &< 1 \\ \Leftrightarrow e^{x-3} &< e^0 \\ \Leftrightarrow x-3 &< 0 \\ \Leftrightarrow x &< 3 \\ \Leftrightarrow S &= ]-\infty; 3[ \end{aligned}$$