


# Trigonométrie

1<sup>re</sup> Spécialité mathématiques  
Analyse - Cours

## I. Lecture sur le cercle trigonométrique



### 1. Le cercle trigonométrique

#### Définition :

Dans un repère orthonormé  $(O, I, J)$ , le cercle trigonométrique de centre  $O$  est le cercle qui a pour rayon 1 et qui est muni d'un sens direct, le sens trigonométrique.

### 2. Longueur d'un arc et radian

#### Propriété :



Sur un cercle trigonométrique, la longueur de l'arc de cercle  $\widehat{IM}$  (exprimé dans l'unité de longueur du repère), est proportionnelle à la mesure de l'angle  $\widehat{IOM}$  exprimé en degrés.

En effet, le périmètre du cercle est  $P = 2\pi R = 2\pi$ .

On a donc

$2\pi$	$360^\circ$
$\widehat{IM}$	$\widehat{IOM}$

car  $\widehat{IM} = \frac{2\pi}{360} \times \widehat{IOM} = \frac{\pi}{180} \times \widehat{IOM}$



#### Définition :

Soit  $U$  le point du cercle trigonométrique tel que l'arc  $\widehat{IU}$  ait pour longueur 1 (exprimé dans l'unité de la longueur du repère).


On définit un radian, noté 1 rad, comme étant la mesure de l'angle  $\widehat{IOU}$ .

Exemples :

Mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ en degrés	360	180	90	270	30	45	60	1	$\frac{180}{\pi}$
Longueur de l'arc $\widehat{IM}$	$2\pi$	$\pi$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{180}$	1
Mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ en radians	$2\pi$	$\pi$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{180}$	1

## II. Enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique


Sur le cercle trigonométrique, on choisit un point comme origine et on enroule la droite des réels sur le cercle.



### Propriétés :

- En enroulant la droite des réels sur le cercle trigonométrique, on associe à tout réel  $x$  un unique point  $M$  sur le cercle.  
On dit alors que  $M$  est l'image de  $x$  sur le cercle  $C$ .
- Réciproquement, à tout point  $M$  du cercle trigonométrique correspondent une infinité de valeurs qui peuvent être considérés comme les abscisses des points de la droite.  
Si  $x$  est l'un d'entre eux, les autres abscisses sont  $x + 2\pi$ ,  $x + 4\pi$ ,  $x - 2\pi$ ,  $x - 4\pi \dots$

Schéma d'un cercle trigonométrique avec des valeurs remarquables :



### III. Cosinus et sinus d'un nombre réel

#### 1. Définitions

##### Définitions :

$C$  est le cercle trigonométrique de centre  $O$  et  $(O, I, J)$  un repère orthonormé direct.  $x$  est un nombre réel et  $M$  est le point image du réel  $x$  sur le cercle trigonométrique.


Le cosinus de  $x$ , noté  $\cos x$ , est l'abscisse de  $M$  dans le repère  $(O, I, J)$ .

Le sinus de  $x$ , noté  $\sin x$ , est l'ordonnée de  $M$  dans le repère  $(O, I, J)$ .

##### Propriétés :

Pour tout réel  $x$  et tout entier relatif  $k$ , on a :

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$
- $-1 < \cos x < 1$
- $-1 < \sin x < 1$



#### 2. Valeurs remarquables du cosinus et du sinus

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$
$\cos x$	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin x$	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

#### 3. Lien avec le cosinus et sinus dans un triangle rectangle

On considère le cercle trigonométrique et la tangente  $D$  au cercle.

Soit  $x \in ]0; \frac{\pi}{2}[$  et  $M$  son point image.

Soit  $H$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(OI)$ .


Soit  $H'$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(OJ)$ .

On a alors :

$$\cos(\widehat{IOM}) = \frac{\text{côtés adjacents}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OH}{OM} = \frac{OH}{1} = OH = \cos x$$

$$\sin(\widehat{IOM}) = \frac{\text{côtés opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{HM}{OM} = \frac{HM}{1} = HM = \sin x$$

La notion de cosinus et de sinus d'un réel de l'intervalle  $]0; \frac{\pi}{2}[$  coïncident avec les notions de cosinus et sinus d'angle aigu vues aux collèges.



## IV. Fonctions cosinus et sinus

### Définitions :

On appelle fonction cosinus la fonction notée  $\cos$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\cos : x \mapsto \cos x$ .

On appelle fonction sinus la fonction notée  $\sin$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\sin : x \mapsto \sin x$ .

### Propriété :

Pour tout réel  $x$ ,  $\cos(-x) = \cos x$ . Ainsi, la fonction cosinus est paire.

Pour tout réel  $x$ ,  $\sin(-x) = -\sin x$ . Ainsi, la fonction sinus est impaire.

### Conséquences graphique :

- La courbe représentative de la fonction  $\cos$  est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- La courbe représentative de la fonction  $\sin$  est symétrique par rapport à l'origine du repère.

### Propriété :

Pour tout réel  $x$ ,  $\cos x = \cos(x + 2\pi)$ .

Pour tout réel  $x$ ,  $\sin x = \sin(x + 2\pi)$ .

On dit que les fonctions cosinus et sinus sont des fonction périodiques de période  $2\pi$ .


### Conséquence graphique :

La courbe représentative de la fonction cosinus et sinus se reproduisent identiques à elles-mêmes sur un intervalle de longueur  $2\pi$ .

### Propriété (*variations des fonctions cosinus et sinus*):

Les deux propriétés précédentes nous permettent de réduire l'intervalle d'étude des deux fonctions  $\cos$  et  $\sin$  à l'intervalle  $[0; \pi]$ .

$x$	0	$\pi$
Variations de $\cos x$	1	-1



$x$	0	$\pi$
Variations de $\sin x$	0	-1

