

예제 3-1 행렬 용어

주어진 행렬에 대하여 다음 물음에 답하라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad C = [-4 \ 9], \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 4 \\ 4 & 8 & 3 & 1 \\ 7 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Tip

앞에서 설명한 행렬 용어를 참고한다.

- (a) 어떤 행렬이 정방행렬인가?
- (b) B 의 크기는 얼마인가?
- (c) C 의 크기는 얼마인가?
- (d) D 의 (2, 3) 성분은 무엇인가?
- (e) A 의 두 번째 행벡터는 무엇인가?
- (f) D 의 세 번째 열벡터는 무엇인가?

정의 3-2 행렬의 합

같은 크기의 행렬 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 과 $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ 의 **합**^{sum}인 행렬 $C = [c_{ij}]_{m \times n}$ 의 성분 c_{ij} 는 대응하는 성분들의 합 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ 이다.

➤ 동일 크기 행렬의 성분 간의 합

예제 3-2 행렬의 합

다음 행렬 A 와 B 의 합 $C = A + B$ 를 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Tip

[정의 3-2]를 이용한다.

풀이

$$\begin{aligned} C = A + B &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2+1 & 3+2 & 4-2 \\ 1+4 & 4+5 & 2+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 5 & 9 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

정의 3-4 행렬의 스칼라배

스칼라 k 를 행렬 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 에 곱하는 행렬의 **스칼라배** scalar multiplication kA 는 $kA = [ka_{ij}]_{m \times n}$ 으로, A 의 각 성분을 k 배한 것이다.

➤ 성분별 스칼라배

예제 3-4 행렬의 스칼라배

다음 행렬 A 에 대하여 $3A$ 를 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Tip

[정의 3-4]를 이용한다.

풀이

$$3A = \begin{bmatrix} 3 \times 2 & 3 \times 3 & 3 \times 4 \\ 3 \times 1 & 3 \times 4 & 3 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 & 12 \\ 3 & 12 & 6 \end{bmatrix}$$

예제 3-6 행렬의 곱

다음 행렬 A 와 B 의 곱 AB 를 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Tip

[정의 3-5]를 이용한다.

풀이

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 2 & 2 \times 2 + 3 \times 3 & 2 \times 3 + 3 \times 4 \\ 3 \times 1 + 1 \times 2 & 3 \times 2 + 1 \times 3 & 3 \times 3 + 1 \times 4 \\ 4 \times 1 + 5 \times 2 & 4 \times 2 + 5 \times 3 & 4 \times 3 + 5 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 13 & 18 \\ 5 & 9 & 13 \\ 14 & 23 & 32 \end{bmatrix}$$

예제 3-7 행렬의 곱

다음 행렬 A 와 열벡터 v 의 곱 Av 를 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Tip

행렬 곱의 정의를 이용하여 계산한다.

예제 3-8 행렬의 곱

주어진 행렬에 대하여 다음을 계산하라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 6 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \ 0 \ 1], \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tip

행렬 곱의 정의를 이용하여 계산한다.

(a) AB

(b) CA

(c) CI

(d) IB

예제 3-9 행렬의 곱

주어진 행렬에 대하여 다음 계산이 가능한지 판정하고, 가능한 경우 계산 결과로 만들어지는 행렬의 크기를 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 5 & 4 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = [-4 \ 2 \ 3]$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 4 \\ 4 & 8 & 3 & 1 \\ 7 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

(a) AF (b) CD (c) FB (d) BF (e) DF (f) BC

Tip

행렬의 곱 AB 는 A 의 열의 개수와 B 의 행의 개수가 같을 때 수행할 수 있다.

예제 3-10 행렬의 거듭제곱

행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 에 대해 다음 행렬의 거듭제곱을 구하라.

Tip

[정의 3-6]을 이용한다.

- (a) A^0 (b) A^2 (c) A^3

풀이

$$(a) \quad A^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 54 \\ 81 & 118 \end{bmatrix}$$

예제 3-11 행렬 연산의 성질

A, B, C 는 $n \times n$ 행렬이고, 0 이 $n \times n$ 영행렬일 때, 다음 중 옳은 것을 찾으라.

Tip

행렬 연산의 성질을 이용한다.

- ① $AB = BA$
- ② $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$
- ③ $A(B+C) = AB + AC$
- ④ $AB = 0$ 이면, $A = 0$ 또는 $B = 0$ 이다.

예제 3-12 역행렬

다음 행렬 A 와 B 가 서로 역행렬인지 보여라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tip

$AB = BA = I_2$ 인지 확인한다.

풀이

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

➔ A 와 B 는 서로 역행렬

예제 3-13 가역행렬

다음 행렬 A 가 가역행렬인지 보여라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tip

$AB=I$ 가 가능한지 확인한다.

• 비가역행렬의 예

임의의 3×3 행렬 B 에 대한 AB

$$\Rightarrow AB = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

예제 3-14 역행렬

다음 행렬이 가역행렬인지 판정하고, 가역행렬인 경우 역행렬을 구하라.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \quad (b) B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad (c) C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Tip

[정리 3-7]의 역행렬 공식을 이용한다.

예제 3-15 역행렬

주어진 행렬 A 와 B 에 대하여 다음 물음에 답하라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

- (a) A 와 B 의 역행렬을 구하라.
- (b) AB 의 역행렬을 구하라.
- (c) $4A$ 의 역행렬을 구하라.
- (d) A^2 의 역행렬을 구하라.

Tip

2×2 행렬의 역행렬 계산 공식과 [정리 3-8]의 성질을 이용한다.

예제 3-16 역행렬을 이용한 행렬방정식의 풀이법

행렬 A 와 B 가 다음과 같다고 하자.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

A^{-1} 를 사용하여 $AX = B$ 를 만족하는 2×2 행렬 X 를 구하라.

Tip

2×2 행렬의 역행렬 계산 공식을 이용해 A 의 역행렬을 구하고, 역행렬을 행렬 방정식 양변 앞에 곱한다.

❖ 전치행렬

정의 3-9 전치행렬

행렬 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 의 행과 열을 바꾸어 놓은 행렬을 **전치행렬** transpose matrix이라 하고, A^T 로 나타낸다. 전치행렬 $A^T = [a'_{ij}]_{n \times m}$ 의 성분 a'_{ij} 는 A 의 a_{ji} 와 같다. A^T 는 ‘ A 의 전치행렬’ 또는 ‘ A transpose’라고 읽는다.

예제 3-17 전치행렬

다음 행렬의 전치행렬을 구하라.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Tip

[정의 3-9]를 이용한다.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

예제 3-18 전치행렬

주어진 행렬 A , B 에 대하여 다음 물음에 답하라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Tip

행렬의 행과 열을 바꾼 것이 전치행렬임을 이용한다.

- (a) $(A^T)^T$ 를 구하여 A 와 같은지 확인하라.
- (b) $(A+B)^T$ 와 A^T+B^T 가 같은지 확인하라.
- (c) $(AB)^T$ 와 $B^T A^T$ 가 같은지 확인하라.
- (d) $(3A)^T$ 와 $3A^T$ 가 같은지 확인하라.
- (e) $(A^T)^{-1}$ 와 $(A^{-1})^T$ 가 같은지 확인하라.

예제 3-20 대칭행렬과 반대칭행렬의 합

행렬 A 를 대칭행렬과 반대칭행렬의 합으로 나타내라.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

Tip

[정리 3-10]을 이용한다.

풀이

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}(A + A^{\top}) + \frac{1}{2}(A - A^{\top}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \right) + \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 10 & 5 & 3 \\ 5 & 12 & 11 \\ 3 & 11 & 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

예제 3-22 대각행렬의 연산

주어진 행렬 A , B , C 에 대하여 다음 행렬의 연산 결과를 구하라.

$$A = \text{diag}(3, 4, 5, 2), \quad B = \text{diag}(1, 3, 2, 5), \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) $A + B$

(b) AB

(c) AC

Tip

[정리 3-11]과 [정리 3-12]
를 이용한다.

예제 3-23 대각합의 성질

행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ 과 $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 에 대해

$tr(AB) = tr(BA)$ 임을 보여라.

Tip

[정의 3-12]를 이용하여 대각합을 구한다.

예제 3-24 대각합의 성질

n 차 정방행렬 A, B, C 에 대하여, 다음 각 관계식의 참, 거짓을 판정하라.

(a) $tr(B^{-1}AB) = tr(A)$

(b) $tr(ABC) = tr(ACB)$

Tip

[정리 3-13]을 이용한다.

정리 3-14 삼각행렬의 곱

- (1) 상삼각행렬과 상삼각행렬의 곱은 상삼각행렬이다.
- (2) 하삼각행렬과 하삼각행렬의 곱은 하삼각행렬이다.

증명

**예제 3-25 삼각행렬**

상삼각행렬 A 와 B 를 곱하고, 그 결과가 상삼각행렬인지 확인하라.

Tip

[정리 3-14]를 이용한다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

풀이

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 23 \\ 0 & 6 & 15 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

예제 3-26 블록행렬

다음과 같이 분할된 행렬 A 와 B 가 있다고 하자.

$$A = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ 4 & 5 & 1 \\ \hline 3 & 0 & 2 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$B = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ \hline 5 & 0 & 3 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

Tip

[정리 3-15]를 이용한다.

$A + B = C$ 인 C 를 다음과 같이 동일한 형태로 분할한 경우의 부분행렬들을 구하라.

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

풀이

$$C_{11} = A_{11} + B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = A_{12} + B_{12} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$C_{21} = A_{21} + B_{21} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_{22} = A_{22} + B_{22} = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$

예제 3-27 블록행렬

다음과 같이 분할된 행렬 A 와 B 에 대해, 블록행렬의 곱으로 AB 를 구하라.

Tip

[정리 3-17]을 이용한다.

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 5 & -2 & 3 & -1 \\ \hline 0 & -4 & -2 & 7 & -1 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \left[\begin{array}{cc} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \\ \hline -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix}$$

풀이

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 14 & -18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -12 & 19 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

예제 3-28 행렬 곱의 표현

다음과 같은 행렬 A 와 B 의 곱 AB 를 직접 계산한 것과, A 의 열벡터와 B 의 행벡터의 곱들의 합으로 계산한 것을 비교하라.

Tip

[정리 3-19]의 행렬 곱의 계산 방법을 이용한다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

풀이

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 14 & 20 \\ 16 & 28 & 40 \end{bmatrix}$$

$$a_1 b_1^\top + a_2 b_2^\top = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} [2 \ 4 \ 6] + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} [3 \ 5 \ 7] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 10 & 14 \\ 12 & 20 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 14 & 20 \\ 16 & 28 & 40 \end{bmatrix}$$