

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ

БИОСИНТЕЗ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КОРЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ













^{*} частота проявления (средняя арифметическая) в %.


СИНДРОМ ИЦЕНКО - КУШИНГА (ятрогенный, пациентке 15 лет)


















ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАДПОЧЕЧНИКОВ




ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

ВТОРИЧНОЙ (ГИПОТАЛАМО - ГИПОФИЗАРНОЙ)


ОПУХОЛИ,
КРОВОИЗЛИЯНИЯ,
ИШЕМИЯ
ГИПОТАЛАМУСА

ОБЛУЧЕНИЕ
В ОБЛАСТИ
ГИПОФИЗА И/ИЛИ
ГИПОФИЗА И/ИЛИ
ГИПОФИЗА
ГИПОФИЗА



"Бронзовая" болезнь при надпочечниковой недостаточности

(гиперпигментация кожи и слизистых)





дисбаланс ионов в миоцитах ГИПОГЛИКЕМИЯ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МИОЦИТОВ

ГИПОТРОФИЯ МИОЦИТОВ, ДИСТРОФИЯ ИХ



