## ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ




КИШЕЧНИКА


ОСТЕОПАТИИ


**НОВООБРАЗОВАНИЯ** 

ГИПЕРПЛАЗИЯ

**АДЕНОМЫ** 









## НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРВИЧНОГО (ЖЕЛЕЗИСТОГО) ГИПОПАРАТИРЕОЗА

ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОРАЗВИТИЕ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ

СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ АУТОАГРЕССИИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ И/ИЛИ ИННЕРВАЦИИ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ ФАКТОРАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

