



Manuel Di Agostino
manuel.diagostino@studenti.unipr.it

UniPR
Università di Parma

4 novembre 2025

Tutorato di Logica

1 Funzioni

- Definizioni
- Esercizi

1 Funzioni

■ Definizioni

■ Esercizi

Definizione (Funzione)

Una **funzione** $f : A \rightarrow B$ è una relazione su A, B

- ▶ **ovunque definita:** $\forall x \in A. \exists y \in B : (x, y) \in f$
- ▶ **funzionale:** $\forall x \in A. \exists \text{al più } y \in B : (x, y) \in f$

Proprietà (iniettività)

Una funzione $f : A \rightarrow B$ è **iniettiva** sse

$$\forall x_1 \in A. \forall x_2 \in A. (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2) \equiv$$

$$\forall x_1 \in A. \forall x_2 \in A. (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$$

Proprietà (suriettività)

Una funzione $f : A \rightarrow B$ è **suriettiva** sse

$$\forall y \in B. \exists x \in A : y = f(x)$$

Proprietà (biettività)

Una funzione $f : A \rightarrow B$ è **biettiva** (biunivoca) sse

$$\forall y \in B. \exists! x \in A : y = f(x)$$

Proprietà

Due insiemi A, B si dicono **equipotenti** sse esiste una funzione $f : A \rightarrow B$ biunivoca.



1 Funzioni



■ Definizioni

■ Esercizi

Esercizio 1

Si classifichino (in termini di iniettività, suriettività e biettività) le seguenti relazioni da A a B.





Esercizio 2

Si classifichino (in termini di iniettività, suriettività e biiettività) le seguenti funzioni da \mathbb{N} in \mathbb{N} .

1 $f(n) = 42$

2 $f(n) = 2n$

3 $f(n) = 2n + 1$

4 $f(n) = n^2$

Esercizio 3

Siano $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ due funzioni.

Si supponga che **sia f che g siano biettive**.

Si consideri la funzione composta $g \circ f: A \rightarrow C$, definita come:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Dimostrare che la funzione composta $g \circ f$ è anch'essa **biettiva**.

Soluzione dell'esercizio 3

Iniettività:

- ▶ Siano $x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 \neq x_2$
- ▶ Per iniettività di f

$$f(x_1) \neq f(x_2)$$

Soluzione dell'esercizio 3

Iniettività:

- ▶ Siano $x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 \neq x_2$
- ▶ Per iniettività di f

$$f(x_1) \neq f(x_2)$$

- ▶ Visto che $f(x_1), f(x_2) \in B$, possiamo applicare g a entrambi gli elementi

Soluzione dell'esercizio 3

Iniettività:

- ▶ Siano $x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 \neq x_2$
- ▶ Per iniettività di f

$$f(x_1) \neq f(x_2)$$

- ▶ Visto che $f(x_1), f(x_2) \in B$, possiamo applicare g a entrambi gli elementi
- ▶ Per iniettività di g si ottiene che

$$g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$$

ossia $g \circ f$ è iniettiva.

Suriattività:

- Per ipotesi g, f sono suriettive, ossia

$$\forall b \in B. \exists a \in A : f(a) = b$$

$$\forall c \in C. \exists b \in B : g(b) = c$$

Suriettività:

- Per ipotesi g, f sono suriettive, ossia

$$\forall b \in B. \exists a \in A : f(a) = b$$

$$\forall c \in C. \exists b \in B : g(b) = c$$

- Consideriamo ora un elemento $c \in C$. Per suriettività di g esiste un certo elemento $b \in B$ per cui $g(b) = c$
- Analogamente, per suriettività di f si ha che esiste un certo $a \in A$ per cui $f(a) = b$

Suriettività:

- ▶ Per ipotesi g, f sono suriettive, ossia

$$\forall b \in B. \exists a \in A : f(a) = b$$

$$\forall c \in C. \exists b \in B : g(b) = c$$

- ▶ Consideriamo ora un elemento $c \in C$. Per suriettività di g esiste un certo elemento $b \in B$ per cui $g(b) = c$
- ▶ Analogamente, per suriettività di f si ha che esiste un certo $a \in A$ per cui $f(a) = b$
- ▶ Ma allora

$$\forall c \in C. \exists a \in A : g(f(a)) = c$$

ossia $g \circ f$ è suriettiva.



Esercizio 4 Appello del 10/07/2023

Sia $i \in \mathbb{N}$ fissato. Si consideri la seguente funzione:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^i \end{aligned}$$

Supponiamo che i sia pari, ovvero che $\exists n : i = 2n$. Stabilire se:

- ▶ f è iniettiva,
- ▶ f è suriettiva,
- ▶ f è biunivoca.

Soluzione dell'esercizio 4

- f è iniettiva?
- Ricordiamo la definizione di iniettività:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}. (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

- Per dimostrare che f *non* è iniettiva, dobbiamo trovare un controesempio che soddisfi la negazione:

$$\exists x_1, x_2 \in \mathbb{R} : (f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1 \neq x_2)$$

- › Scegliamo ad esempio $x_1 = 2, x_2 = -2$
- › Osserviamo che:

$$f(x_1) = (x_1)^i \stackrel{(i \text{ pari})}{=} (x_1)^{2n} = (2^2)^n = 4^n$$

- › Analogamente:

$$f(x_2) = (x_2)^i \stackrel{(i \text{ pari})}{=} (x_2)^{2n} = ((-2)^2)^n = 4^n$$

- › Scegliamo ad esempio $x_1 = 2, x_2 = -2$
- › Osserviamo che:

$$f(x_1) = (x_1)^i \stackrel{(i \text{ pari})}{=} (x_1)^{2n} = (2^2)^n = 4^n$$

- › Analogamente:

$$f(x_2) = (x_2)^i \stackrel{(i \text{ pari})}{=} (x_2)^{2n} = ((-2)^2)^n = 4^n$$

Quindi f **NON** è iniettiva.

- f è suriettiva?
- Ricordiamo la definizione di suriettività:

$$\forall y \in \mathbb{R}. \exists x \in \mathbb{R} : y = f(x)$$

- Per dimostrare che f *non* è suriettiva, dobbiamo trovare un controesempio che soddisfi la negazione:

$$\exists y \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}. f(x) \neq y$$

➤ **f è suriettiva?**

- Ricordiamo la definizione di suriettività:

$$\forall y \in \mathbb{R}. \exists x \in \mathbb{R} : y = f(x)$$

- Per dimostrare che f *non* è suriettiva, dobbiamo trovare un controesempio che soddisfi la negazione:

$$\exists y \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}. f(x) \neq y$$

- Essendo i pari, necessariamente $\forall x \in \mathbb{R}. x^i \geq 0$
- Ossia l'immagine di f è l'insieme dei reali non negativi

► **f è suriettiva?**

- Ricordiamo la definizione di suriettività:

$$\forall y \in \mathbb{R}. \exists x \in \mathbb{R} : y = f(x)$$

- Per dimostrare che f *non* è suriettiva, dobbiamo trovare un controesempio che soddisfi la negazione:

$$\exists y \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}. f(x) \neq y$$

- Essendo i pari, necessariamente $\forall x \in \mathbb{R}. x^i \geq 0$
- Ossia l'immagine di f è l'insieme dei reali non negativi
- Allora basta scegliere $y = -1$: non esiste alcun $x \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) = x^i = -1$.

› f è suriettiva?

- › Ricordiamo la definizione di suriettività:

$$\forall y \in \mathbb{R}. \exists x \in \mathbb{R} : y = f(x)$$

- › Per dimostrare che f *non* è suriettiva, dobbiamo trovare un controesempio che soddisfi la negazione:

$$\exists y \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}. f(x) \neq y$$

- › Essendo i pari, necessariamente $\forall x \in \mathbb{R}. x^i \geq 0$
- › Ossia l'immagine di f è l'insieme dei reali non negativi
- › Allora basta scegliere $y = -1$: non esiste alcun $x \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) = x^i = -1$.

Quindi f **NON** è suriettiva.

Esercizio 5

Si consideri la funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (la funzione **Fattoriale**, solitamente indicata con $n!$) definita ricorsivamente nel seguente modo:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Si risponda alle seguenti domande:

- ▶ Quanto vale $f(4)$?
- ▶ Quanto vale $f(7)$?

Soluzione dell'esercizio 5

► Calcoliamo $f(4)$:

$$\begin{aligned}f(4) &= 4 \cdot f(3) \\&= 4 \cdot 3 \cdot f(2) \\&= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot f(1) \\&= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot f(0) \\&= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \\&= 24\end{aligned}$$

Soluzione dell'esercizio 5

► Calcoliamo $f(4)$:

$$\begin{aligned}f(4) &= 4 \cdot f(3) \\&= 4 \cdot 3 \cdot f(2) \\&= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot f(1) \\&= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot f(0) \\&= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \\&= 24\end{aligned}$$

► Calcoliamo ora $f(7)$:

$$\begin{aligned}f(7) &= 7 \cdot f(6) \\&= 7 \cdot 6 \cdot f(5) \\&= 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot f(4) \\&= 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 24 \\&= 5040\end{aligned}$$

Esercizio 6 Appello del 14/02/2023

Sia $a \in \mathbb{N}$ un numero naturale arbitrario e sia $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funzione definita ricorsivamente nel seguente modo:

$$f(n) = \begin{cases} a & \text{se } n = 0 \\ \frac{f(n-1)}{2} & \text{se } f(n-1) \text{ è pari} \\ 3f(n-1) + 1 & \text{se } f(n-1) \text{ è dispari} \end{cases}$$

Si risponda alle seguenti domande:

- Se $f(0) = 6$, quanto vale $f(10)$?
- Se $f(0) = 52$, quanto vale $f(10)$?
- Se $f(0) = 2048$, quanto vale $f(10)$?

► **Caso** $f(0) = 6$:

$$f(0) = 6 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(1) = \frac{f(0)}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ (dispari)}$$

$$\Rightarrow f(2) = 3(f(1)) + 1 = 3(3) + 1 = 10 \text{ (pari)} \quad (*)$$

$$\Rightarrow f(3) = \frac{f(2)}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ (dispari)}$$

$$\Rightarrow f(4) = 3(f(3)) + 1 = 3(5) + 1 = 16 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(5) = \frac{f(4)}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ (pari)}$$

\vdots

► **Caso** $f(0) = 6$ (continua):

$$\Rightarrow f(6) = \frac{f(5)}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(7) = \frac{f(6)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(8) = \frac{f(7)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ (dispari)}$$

$$\Rightarrow f(9) = 3(f(8)) + 1 = 3(1) + 1 = 4 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow \mathbf{f(10)} = \frac{f(9)}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

► **Caso** $f(0) = 52$:

$$f(0) = 52 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(1) = \frac{f(0)}{2} = \frac{52}{2} = 26 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(2) = \frac{f(1)}{2} = \frac{26}{2} = 13 \text{ (dispari)}$$

$$\Rightarrow f(3) = 3(f(2)) + 1 = 3(13) + 1 = 40 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(4) = \frac{f(3)}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(5) = \frac{f(4)}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ (pari)}$$

I passaggi successivi da $f(5) = 10$ sono uguali a quelli fatti da (*), quindi **$f(10) = 2$** .

► **Caso** $f(0) = 2048$:

$$f(0) = 2048 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(1) = \frac{f(0)}{2} = 1024 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(2) = \frac{f(1)}{2} = 512 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(3) = \frac{f(2)}{2} = 256 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(4) = \frac{f(3)}{2} = 128 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(5) = \frac{f(4)}{2} = 64 \text{ (pari)}$$

► **Caso** $f(0) = 2048$ (continua):

$$\Rightarrow f(6) = \frac{f(5)}{2} = 32 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(7) = \frac{f(6)}{2} = 16 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(8) = \frac{f(7)}{2} = 8 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow f(9) = \frac{f(8)}{2} = 4 \text{ (pari)}$$

$$\Rightarrow \mathbf{f(10)} = \frac{f(9)}{2} = \mathbf{2}$$

Esercizio 7

Siano A, B due insiemi non vuoti tali che $|A| = n$ e $|B| = k$. Si dimostri che il numero di funzioni $f : A \rightarrow B$ è k^n .

- Dobbiamo dimostrare che l'insieme

$$\{f \in \mathcal{F} \mid "f \text{ funzione da } A \text{ a } B", |A| = n, |B| = k\}$$

è equipotente ad un insieme con k^n elementi.

- › Dobbiamo dimostrare che l'insieme

$$\{f \in \mathcal{F} \mid "f \text{ funzione da } A \text{ a } B", |A| = n, |B| = k\}$$

è equipotente ad un insieme con k^n elementi.

- › Possiamo identificare una funzione in base a come vengono mappati i valori da A in B :

$$\begin{array}{ccc} a_1 & \mapsto & b_1 \\ a_2 & \mapsto & b_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & \mapsto & b_1 \\ \hline & & f_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a_1 & \mapsto & b_2 \\ a_2 & \mapsto & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & \mapsto & b_2 \\ \hline & & f_2 \end{array}$$

In questo esempio f_1, f_2 sono funzioni costanti che mappano tutti gli elementi di A in b_1 , rispettivamente in b_2 .

- ▶ Quindi posso identificare una funzione tramite una tupla di n elementi che rappresenta come sono stati mappati i valori

a_1, \dots, a_n :

$$f_1 = (b_1, b_1, \dots, b_1)$$

$$f_2 = (b_2, b_2, \dots, b_2)$$

$$f_3 = (b_1, b_2, \dots, b_2)$$

\vdots

- ▶ Quindi posso identificare una funzione tramite una tupla di n elementi che rappresenta come sono stati mappati i valori a_1, \dots, a_n :

$$f_1 = (b_1, b_1, \dots, b_1)$$

$$f_2 = (b_2, b_2, \dots, b_2)$$

$$f_3 = (b_1, b_2, \dots, b_2)$$

$$\vdots$$

- ▶ Il nuovo problema da risolvere è trovare la cardinalità dell'insieme:

$$\{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in B, \dots, x_n \in B\} = B \times \dots \times B = B^k$$

- › Quindi posso identificare una funzione tramite una tupla di n elementi che rappresenta come sono stati mappati i valori a_1, \dots, a_n :

$$f_1 = (b_1, b_1, \dots, b_1)$$

$$f_2 = (b_2, b_2, \dots, b_2)$$

$$f_3 = (b_1, b_2, \dots, b_2)$$

$$\vdots$$

- › Il nuovo problema da risolvere è trovare la cardinalità dell'insieme:

$$\{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in B, \dots, x_n \in B\} = B \times \dots \times B = B^k$$

- › Banalmente, $|B^k| = k^n$.

