

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 23)

- ♣ พบผู้ป่วย 12,152 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.00 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 685 ราย
- ♣ มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดสระบุรี) เป็นเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ให้ผลบวกเชื้อ Enterovirus 71
- ♣ อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 1 ปี (28.77 %) 2 ปี (26.52 %) 3 ปี (16.36 %)
- ♣ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 10 อันดับแรก คือ

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. น่าน | 6.นครสวรรค์ |
| 2. พะเยา | 7.แม่ฮ่องสอน |
| 3. เชียงราย | 8.สิงห์บุรี |
| 4. เลย | 9.ภูเก็ต |
| 5. สมุทรปราการ | 10.สุราษฎร์ธานี |



- ♣ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 24.83 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 19.20 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 16.94 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16.36 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์มีการเพิ่มมา 2 เหตุการณ์ คือ

- จังหวัดกรุงเทพฯ ผู้ป่วยเพศชายอายุ 1 ปี 3 เดือน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กแห่งหนึ่ง จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติมพบมีประวัติสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยโรคมือเท้าปากรายก่อนหน้า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลบวกเชื้อ EV71 และวินิจฉัยตรวจพบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- จังหวัดเชียงราย พบการระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนที่นั่งรถตู้โดยสารรับส่ง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จำนวน 22 ราย ใน ต.โรงช้าง เพศชาย 1 ราย หญิง 21 ราย อายุระหว่าง 1-5 ปี เฉลี่ย 3 ปี กลุ่มผู้ป่วยเป็นนักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถม ในโรงเรียน 3 แห่ง ของตำบลโรงช้าง ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

ในช่วงฤดูฝนของทุกปี (พฤษภาคม – สิงหาคม) จะเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของโรคมือ เท้า ปาก อีกทั้งยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของสถานศึกษาที่เด็กจะเข้ามาอยู่รวมกันจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นสถานที่แพร่กระจายของโรคเป็นอย่างดี หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด จะสามารถป้องกันควบคุมโรค ลดการป่วยและการเสียชีวิตของเด็กในสถานที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาตรการในการดำเนินงาน

- ♣ การตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า
- ♣ แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน
- ♣ หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน
- ♣ ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งสัมผัสสิ่งสกปรก ปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม ก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
- ♣ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก
- ♣ หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที



*** ควรดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน