Investigación de Operaciones

TEC Tecnológico de Costa Rica

Programación Lineal

Ingeniería en Computación PhD. Francisco Torres-Rojas II Semestre 2017

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez

8 de noviembre de 2017

Problema 3.1-6

La empresa Whitt Windows tiene solo tres empleados que hacen dos tipos de ventanas a mano: con marcos de madera y con marcos de aluminio. La ganancia es de \$60 por cada ventana con marco de madera y de \$30 por cada una con marco de aluminio. Doug hace hace marcos de madera y puede terminar 6 al día. Linda hace 4 marcos de aluminio por día. Bog forma y corta el vidrio y puede hacer 48 pies cuadrados al día. Cada ventana con marco de madera usa 6 pies cuadrados de vidrio y cada una de aluminio 8 pies cuadrados.

La compañía



desea determinar cuántas ventanas de cada tipo producir al día para maximizar la ganancia total.

2 of 106

Variables de Decisión

Marco de madera = X_1 Marco de Aluminio = X_2

Función Objetivo

Maximizar

$$Z = 60X_1 + 30X_2$$

Restricciones

$$6X_1 + 8X_2 \le 48$$

$$X_1 \le 6$$

$$X_2 \le 4$$

Modelo Completo

Maximizar


$$Z = 60X_1 + 30X_2$$

Sujeto a:


$$6X_1 + 8X_2 \le 48$$

$$X_1 \le 6$$

$$X_2 \le 4$$



7 of 106



8 of 106

Solución Final

$$Z = 405,0000$$

$$X_1 = 6,0000$$

$$X_2 = 1,5000$$

Problema 3.1-7

La compañía Word Light produce dos dispositivos para las lámparas (productos 1 y 2) que requieren partes de metal y componentes eléctricas. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto fabricar para maximizar la ganancia.



10 of 106

Problema 3.1-7

Por cada unidad del producto 1 se requieren 1 unidad de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricas, por cada unidad del producto 2 se requieren 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricas, la compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricas, cada unidad del producto 1 da una ganancia de \$ 1 y cada unidad de producto 2, hasta 60 unidades da una ganancia de \$ 2, cualquier exceso de 60 unidades no tiene ganancia por lo que fabricar más de 60 está fuera de consideración.

Variables de Decisión

$$P_1 = producto1$$

$$P_2 = producto2$$

Función Objetivo

Maximizar:

$$Z = P_1 + 2P_2$$

Restricciones

$$P_1 + 3P_2 \le 200$$

 $2P_1 + 2P_2 \le 300$
 $P_2 \le 60$

Modelo Completo


Maximizar:

$$Z = P_1 + 2P_2$$

Sujeto a:


$$P1 + 3P2 \le 200$$

 $2P1 + 2P2 \le 300$
 $P2 \le 60$



16 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal



17 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal

Solución Final

$$Z = 175,0000$$

$$P_1 = 125,0000$$

$$P_2 = 25,0000$$

Problema 3.1-8



La compañía de seguros primos está en proceso de introducir dos nuevas líneas de productos: seguro de riesgo especial e hipotecas. La ganancia esperada es \$5 por el seguro de riesgo especial y \$2 por unidad de hipoteca. La administración debe establecer las

cuotas de ventas de las nuevas líneas para maximizar la ganancia total esperada. Los requerimientos de trabajo son los siguientes

Problema 3.1-8

•	Horas-hombre por unidad		Horas-hombre
Deto	Riesgo Especial	Hipoteca	Disponibles
Suscripciones	3	2	2400
Administración	0	1	800
Reclamaciones	2	0	1200

Variables de Decisión

$$X_1 = seguroderiesgoespecial$$

 $X_2 = hipoteca$

Función Objetivo

Maximizar:

$$Z=5X_1+2X_2$$

Restricciones

$$3X_1 + 2X_2 \le 2400$$
 $X_2 \le 800$
 $2X_1 \le 1200$
 $X_1, X_2 > 0$


Modelo Completo

Maximizar:

$$Z=5X_1+2X_2$$


Sujeto a :

$$3X_1 + 2X_2 \le 2400$$
 $X_2 \le 800$
 $2X_1 \le 1200$
 $X_1, X_2 > 0$



25 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal



26 of 106

Solución Final

$$Z = 3600,0000$$

$$X_1 = 600,0000$$

$$X_2 = 300,0000$$

Problema 3.1-9

Weenies and Buns es una planta procesadora de alimentos que fabrica hotdogs y pan para hotdogs. Muelen su propia harina para el pan a una tasa máxima de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 libras. Tiene un contrato con Pigland Inc, que especifica la entrega de 800 libras de producto de puerco cada lunes.



28 of 106

Problema 3.1-9

Cada hotdog requiere 0.25 libras de producto de puerco. Se cuenta con suficiente cantidad del resto de los ingredientes de ambos productos. Por último, la mano de obra consiste en 5 empleados de tiempo completo (40 horas por semana). Cada hotdog requiere 3 minutos de mano de obra y cada pan requiere 2 minutos de mano de obra. Cada hotdog proporciona una ganancia de \$0.20 y cada pan de \$0.10. Weenies and Buns desea saber cuántos hotdogs y cuántos panes deben producir cada semana para lograr la ganancia más alta posible.

Variables de Decisión

$$P = cantidaddepanesparahotdog$$

 $H = cantidaddehotdog$

Función Objetivo

Maximizar:

$$Z = 0.2H + 0.1P$$

Restricciones

$$0.1P \le 200$$

$$0.25H \le 800$$

2P + 3H <= 1200, y que esta mos en minutos, por lo tantos on 5 empleados que trades en minutos de la complexación de la compl

Modelo Completo

Maximizar:


$$Z = 0.2H + 0.1P$$

sujeto a:

$$0.1P \le 200$$


$$0.25H \le 800$$

2P + 3H <= 1200, y que esta mos en minutos, por lo tantos on 5 empleados que trades en minutos a su construcción de la constr



34 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal



35 of 106

Solución Final

$$Z = 760,0000$$

$$H = 3200,0000$$

$$P = 1200,0000$$

Hoy es un día de suerte. Acaba de ganar un premio de \$10.000. Dedicara \$4.000 a impuestos y diversiones, pero ha decidido invertir los otros \$6.000.

Al oír las nuevas, dos amigos le han ofrecido una oportunidad de convertirse en socio en dos empresas distintas, cada una planeada por cada uno de ellos. En ambos casos, la inversión incluye dedicar parte de su tiempo el siguiente verano y dinero en efectivo. Para ser un socio completo en el caso del primer amigo debe invertir \$ 5000 y 400 horas, y su ganancia estimada (sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo) seria \$ 450.

Las cifras correspondientes para el segundo caso son \$ 4000 y 500 horas, con una ganancia estima de \$ 4500. Sin embargo, ambos amigos son flexibles y le permitirían participar con cualquier fracción de participación que quiera. Si elige una participación parcial, todas las cifras dadas para sociedad completa (inversión de dinero y tiempo, y la ganancia) se pueden multiplicar por esta fracción. Como de todas formas usted busca un trabajo de verano interesante (máximo 600 horas), a decidido participar en una o ambas empresas en alguna combinación que maximice su ganancia total estimada. Usted debe resolver el problema de encontrar la mejor combinación.

Variables de Decisión

$$P_1 = participaci \acute{o}n Amigo 1$$

$$P_2 = participaci\'on Amigo 2$$

Función Objetivo

Maximizar

$$Z = 4500P_1 + 4500P_2$$

Restricciones

$$5000P_1+4000P_2 <= 6000$$
 inversióntotal $400P_1+5000P_2 <= 600$ horasdisponible $P_1,P_2>0$

Modelo Completo


Maximizar

$$Z = 4500P_1 + 4500P_2$$

Sujeto a:


$$5000P_1+4000P_2 <= 6000$$
 inversión total $400P_1+5000P_2 <= 600$ horas disponible $P_1,P_2>0$

Solución LINGO



43 of 106

Solución LINGO



44 of 106

Solución Final

$$Z = 6000,0000$$

$$P_1 = 0,6666667$$

$$P_2 = 0,6666667$$

La carne con papas es el plato favorito de Ralph Edmund. Por eso decidió hacer dieta continua de sólo estos dos alimentos (más algunos líquidos y suplementos de vitaminas) en todas las comidas. Ralph sabe que ésa no es la dieta más sana y quiere asegurarse de que toma cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. Cuenta con la siguiente información.



Ingrediente	Gramos por porción		Requerimientos diarios			
	Res	Papa				
Carboidratos	5	15	ز= 50			
Proteínas	20	5	ز= 40			
Grasa	15	2	j= 60			
Costo Por Porción	\$14	\$2	•			

Ralph requiere determinar el número de porciones diarias (pueden ser fraccionarias) de res y papas que cumplirían con estos requerimientos a un costo mínimo.

Variables de Decisión

 $x_1 = Gramosporporci\'ondeRes$

 $x_2 = Gramosporporci \acute{o}nde Papa$

Función Objetivo

Minimizar

$$Z=4x_1+2x_2$$

Restricciones

$$5x_1 + 15x_2 >= 50$$

 $20x_1 + 5x_2 >= 40$
 $15x_1 + 2x_2 <= 60$
 $x_1, x_2 >= 0$

Modelo Completo

Minimizar


$$Z=4x_1+2x_2$$

Sujeto a:

$$5x_1 + 15x_2 >= 50$$


 $20x_1 + 5x_2 >= 40$
 $15x_1 + 2x_2 <= 60$
 $x_1, >= 0$

Solución LINGO



52 of 106

Solución LINGO



53 of 106

Solución Final

$$Z = 10,90909$$

$$X_1 = 1,2727$$

$$X_2 = 2,909091$$

Web Mercantile vende muchos productos para el hogar mediante un catálogo en línea. La compañía necesita un gran espacio para almacenar los productos. En la actualidad planea rentar espacio para los siguientes 5 meses. Se sabe cuánto espacio necesitará cada mes, pero como el mismo varía mucho, puede ser más económico rentar sólo la cantidad de necesaria cada mes con contratos mensuales.



Por otro lado, el costo adicional de rentar espacio para meses adicionales es menor que para el primero, y puede ser menos costoso rentar el espacio máximo lo 5 meses. Otra opción es el enfoque intermedio de cambiar la cantidad total de espacio rentado (con un nuevo contrato y/o terminación del anterior) al menos una vez pero no cada mes.

El espacio requerido si los costos de arrendamiento son los siguientes:

Mes	Espacio Requerido	Periodo	Costo por ft ² arrendado
1	30000	1	\$65
2	20000	2	\$100
3	40000	3	\$135
4	10000	4	\$160
5	50000	5	\$190

El objetivo es minimizar el costo total de arrendamiento para cumplir con los requerimientos.

Análisis

Debemos pensar en los .meses que vamos a arrendar, podemos arrendar el espacio máximo por los cinco meses, esto permite inferir que debemos alquilar al menos el espacio indicado en la tabla del problema. Además tenemos que considerar o clasificar los meses que afectan cada uno de los contratos.

Variables de Decisión

 $A_1 = \text{Espacio a arrendar el primer mes por el periodo de 1 mes}$ A_2 = Espacio a arrendar el primer mes por el periodo de 2 meses A_3 = Espacio a arrendar el primer mes por el periodo de 3 meses A_4 = Espacio a arrendar el primer mes por el periodo de 4 meses A_5 = Espacio a arrendar el primer mes por el periodo de 5 meses $B_1 = \text{Espacio a arrendar el segundo mes por el periodo de 1 mes}$ B_2 = Espacio a arrendar el segundo mes por el periodo de 2 meses $B_3 = \text{Espacio a arrendar el segundo mes por el periodo de 3 meses}$ B_4 = Espacio a arrendar el segundo mes por el periodo de 4 meses B_5 = No tiene sentido, no se puede C_1 = Espacio a arrendar el tercer mes por el periodo de 1 mes C_2 = Espacio a arrendar el tercer mes por el periodo de 2 meses C_3 = Espacio a arrendar el tercer mes por el periodo de 3 meses C_4 y C5 = No tiene sentido, no se puede. 59 of 106 Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal nes

D. Fanada a amandan al ananta masa nan al naniada da O masasa

Función Objetivo

Minimizar

$$Z = 65A_1 + 100A_2 + 135A_3 + 160A_4 + 190A_5 + 65B_1 + 100B_2 + 135B_3 + 160B_4 - 100B_2 + 100B_2 + 100B_3 + 100B_4 +$$

Restricciones

$$MES1: A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 >= 30,000$$

$$MES2: A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + B_1 + B_2 + B_3 + B_4 >= 20,000$$

$$MES3: A_3 + A_4 + A_5 + B_2 + B_3 + B_4 + C_1 + C_2 + C_3 >= 40,000$$

$$MES4: A_4 + A_5 + B_3 + B_4 + C_2 + C_3 + D_1 + D_2 >= 10,000$$

$$MES5: A_5 + B_4 + C_3 + D_2 + E_1 = 50,000$$

Modelo Completo

Minimizar

$$Z=65A_1+100A_2+135A_3+160A_4+190A_5+65B_1+100B_2+135B_3+160B_4$$
 Sujeto a :

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 >= 30,000$$


$$A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + B_1 + B_2 + B_3 + B_4 >= 20,000$$

$$A_3 + A_4 + A_5 + B_2 + B_3 + B_4 + C_1 + C_2 + C_3 >= 40,000$$

$$A_4 + A_5 + B_3 + B_4 + C_2 + C_3 + D_1 + D_2 >= 10,000$$


$$A_5 + B_4 + C_3 + D_2 + E_1 = 50,000$$

Solución LINGO



63 of 106

Solución LINGO



64 of 106

Solución Final

$$Z = 7650000$$

$$A_1 = 0,0000$$

$$A_2 = 0,0000$$

$$A_3 = 0.0000$$

$$A_4 = 0.0000$$

$$A_5 = 30000,00$$

$$B_1 = 0.0000$$

$$B_2 = 0.0000$$

$$B_3 = 0.0000$$

$$B_4 = 0.0000$$

 $C_{2} = 0.0000$

65 of 106

Oxbridge University tiene una computadora grande para uso de académicos, estudiantes de doctorado y ayudantes de investigación. Durante las horas hábiles debe haber un trabajador para operador y dar mantenimiento a la computadora y realizar algunos servicios de programación. Beryl Ingram, director del centro de cómputo, coordina la operación.



Al principio del semestre de otoño , Beryl se enfrenta al problema de asignar horas de trabajo distintas a sus operadores. Debido a que éstos son estudiantes de la universidad, están disponibles para el trabajo solo un número limitado de horas al dia, como se muestra en la tabla.

•	•	Máximo de horas disponibles					
Operador	Salarios	Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	
K.C.	\$10.00/hora	6	0	6	0	6	
D.H.	\$10.10/hora	0	6	0	6	0	
H.B.	\$9.90/hora	4	8	4	0	4	
S.C.	\$9.80/hora	5	5	5	0	5	
K.S.	\$10.80/hora	3	0	3	8	0	
N.K.	\$11.30/hora	0	0	0	6	2	

Hay seis operadores (cuatro de licenciatura y dos de posgrado). Todos tienen salarios diferentes según su experiencia con computadoras y su aptitud para programar. La tabla muestra estos salarios junto con el número máximo de horas al día que cada uno puede trabajar.

Se garantiza a cada operador un número mínimo de horas de trabajo a la semana que lo mantendrán con un conocimiento adecuado de la operación. Este nivel se estableció de modo arbitrario en 8 horas por semana para licenciatura (K.C., D.H., H.B. y S.C.) y 7 horas por semana para posgrado (K.S. y N.K.).

El centro de computo debe abrir de 8 am a 10 pm de lunes a viernes con un operador de guardia en este horario. Sábados y domingos, otras personas lo operan. Debido al presupuesto reducido, Beryl tiene que minimizar el costo. Ella quiere determinar el número de horas que debe asignar a cada operador cada día.



Análisis

Se requiere minimizar el costo de las horas de cada operador en cada día. Para ello, podemos ver como una "matriz" X_{ij} , donde i es cada operador, y j es el día de la semana (i = KC, DH, HB, SC, KS, NK; j = lu, ma, mi, ju, vi). Z = costo (salario * tiempo max disponible por trabajador * horas asignadas)

Variables de Decisión

 $x_{11} = Horasasignadasaloperador KCellunes$

 $x_{12} = Horasasignadasaloperador KCelmartes$

 $x_{13} = Horasasignadasaloperador KCelmi ércoles$

 $x_{14} = Horasasignadasaloperador KCeljueves$

 $x_{15} = Horasasignadasaloperador KCelviernes$

Variables de Decisión

Lo mismo para el operador 2 DH

```
x_{21} = Horasasignadasaloperador DHellunes
```

 $x_{22} = Horasasignadasaloperador DHelmartes$

 $x_{23} = Horasasignadasaloperador DHelmi \'ercoles$

 $x_{24} = Horasasignadasaloperador DHeljueves$

 $x_{25} = Horasasignadasaloperador DHelviernes$

. . .

Lomismoparaeloperador6NK

 $X_{61} = HorasasignadasaloperadorNKellunes$

 $X_{62} = HorasasignadasaloperadorNKelmartes$

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal

Función Objetivo

Minimizar

$$Z = 10,00(x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15})$$

$$+10,10(x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25})$$

$$+9,90(X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} + X_{35})$$

$$+9,80(X_{41} + X_{42} + X_{43} + X_{44} + X_{45})$$

$$+10,80(X_{51} + X_{52} + X_{53} + X_{54} + X_{55})$$

$$+11,30(X_{61} + X_{62} + X_{63} + X_{64} + X_{65})$$

/* Restricciones de mínimo número de horas a la semana K.C., D.H., H.B. y S.C. = 8, K.S. y N.K. = 7. */

$$x_11 + x_{12} + x_13 + x_14 + x_15 >= 8$$

 $x_21 + x_{22} + x_23 + x_24 + x_25 >= 8$
 $X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} + X_{35} >= 8$
 $X_{41} + X_{42} + X_{43} + X_{44} + X_{45} >= 8$
 $X_{51} + X_{52} + X_{53} + X_{54} + X_{55} >= 7$
 $X_{61} + X_{62} + X_{63} + X_{64} + X_{65} >= 7$

/* El centro de cómputo abre de 8 am hasta 10 pm (14 horas), donde siempre hay un operador, esto para toda la semana*/

Lunes =>
$$x_{11} + x_{21} + X_{31} + X_{41} + X_{51} + X_{61} = 14$$

Martes => $x_{12} + x_{22} + X_{32} + X_{42} + X_{52} + X_{62} = 14$
Miercoles => $x_{13} + x_{23} + X_{33} + X_{43} + X_{53} + X_{63} = 14$
Jueves => $x_{14} + x_{24} + X_{34} + X_{44} + X_{54} + X_{64} = 14$
Viernes => $x_{15} + x_{25} + X_{35} + X_{45} + X_{55} + X_{65} = 14$

/* Horas disponibles por día, para cada trabajador*/
Operador 1

$$x_{11} \le 6$$

 $x_{12} = 0$
 $x_{13} \le 6$
 $x_{14} = 0$
 $x_{15} \le 6$

Operador 2

$$x_{21} = 0$$

 $x_{22} <= 6$

76 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal



Operador 3

$$X_{31} <= 4$$

$$X_{32} <= 8$$

$$X_{33} <= 4$$

$$X_{34} = 0$$

$$X_{35} <= 4$$

Operador 4

$$X_{41} <= 5$$

$$X_{42} <= 5$$

$$X_{43} <= 5$$

Operador 5

$$X_{51} <= 3$$

 $X_{52} = 0$

$$X_{53} = 0$$

$$X_{54} <= 8$$

$$X_{55} = 0$$

Operador 6

$$X_{61} = 0$$

$$X_{62} = 0$$

$$X_{63} = 0$$

78 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal

Minimizar

$$Z = 10,00(x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15})$$

$$+10,10(x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25})$$

$$+9,90(X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} + X_{35})$$

$$+9,80(X_{41} + X_{42} + X_{43} + X_{44} + X_{45})$$

$$+10,80(X_{51} + X_{52} + X_{53} + X_{54} + X_{55})$$

$$+11,30(X_{61} + X_{62} + X_{63} + X_{64} + X_{65})$$

Sujeto a:

$$\begin{array}{c} x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}+x_{15}>=8\\ x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24}+x_{25}>=8\\ X_{31}+X_{32}+X_{33}+X_{34}+X_{35}>=8\\ X_{41}+X_{42}+X_{43}+X_{44}+X_{45}>=8\\ X_{51}+X_{52}+X_{53}+X_{54}+X_{55}>=7\\ X_{61}+X_{62}+X_{63}+X_{64}+X_{65}>=7\\ x_{11}+x_{21}+X_{31}+X_{41}+X_{51}+X_{61}=14\\ x_{12}+x_{22}+X_{32}+X_{42}+X_{52}+X_{62}=14\\ x_{13}+x_{23}+X_{33}+X_{43}+X_{53}+X_{63}=14\\ \end{array}$$

^15 T ^25 T ^35 T ^45 T ^55 T ^65 — 17

$$x_{11} <= 6$$
 $x_{12} = 0$
 $x_{13} <= 6$
 $x_{14} = 0$
 $x_{15} <= 6$
 $x_{21} = 0$
 $x_{22} <= 6$
 $x_{23} = 0$
 $x_{24} <= 6$


$$X_{31} <= 4$$
 $X_{32} <= 8$
 $X_{33} <= 4$
 $X_{34} = 0$
 $X_{35} <= 4$
 $X_{41} <= 5$
 $X_{42} <= 5$
 $X_{43} <= 5$
 $X_{44} = 0$
 $X_{45} <= 5$


$$X_{51} <= 3$$
 $X_{52} = 0$
 $X_{53} = 0$
 $X_{54} <= 8$
 $X_{55} = 0$
 $X_{61} = 0$
 $X_{62} = 0$
 $X_{63} = 0$
 $X_{64} <= 6$
 $X_{65} <= 2$


```
INGO - LINGO Model - LINGO1
                                                                                                                                - ø ×
File Edit LINGO Window Help
INGO Model - LINGO1
                                                                                                            - - - X
 min = 10.00 * (X11 + X12 + X13 + X14 + X15)
      + 10.10 * (X21 + X22 + X23 + X24 + X25)
      + 9.90 * (X31 + X32 + X33 + X34 + X35)
      + 9.80 * (X41 + X42 + X43 + X44 + X45)
      + 10.80 * (X51 + X52 + X53 + X54 + X55)
      + 11.30 * (X61 + X62 + X63 + X64 + X65);
      X31 + X32 +X33+X34 +X35 > 8; X41 + X42 + X43 + X44 + X45 > 8;
      X51 + X52 +X53+X54 +X55 > 7; X61 + X62 + X63 + X64 + X65 > 7;
       X11 + X21 + X31 + X41 + X51 + X61 = 14; X12 + X22 + X32 + X42 + X52 + X62 = 14;
      X15 + X25 + X35 + X45 + X55 + X65 = 14; X11 < 6;
       X12 = 0; X13 < 6; X14 = 0; X15 < 6; X21 = 0; X22 < 6;
       X23 = 0; X24 < 6; X25 = 0; X31 < 4; X32 < 8; X33 < 4;
      X34 = 0; X35 < 4; X41 < 5; X42 < 5; X43 < 5; X44 = 0;
X45 < 5; X51 < 3; X52 = 0; X53 = 0; X54 < 8; X55 = 0;
X61 = 0; X62 = 0; X63 = 0; X64 < 6; X65 < 2;
                                                                                                                            Ln 6, Col 47 3:59 am
```

84 of 106

Samantha Arburola, Izcar Muñoz, Jonathan Rodríguez - Programación Lineal







$$Z = 709,7000$$

$$X_{11} = 2$$

$$X_{12} = 0$$

$$X_{13} = 5$$

$$X_{14} = 0$$

$$X_{15} = 3$$

$$X_{21} = 0$$

$$X_{22} = 3$$

$$X_{23} = 0$$

$$X_{24} = 5$$

$$X_{25} = 0$$

$$X_{31} = 4$$

$$X_{32} = 6$$

$$X_{33} = 4$$

$$X_{34} = 0$$

$$X_{35} = 4$$

$$X_{41} = 5$$

$$X_{42} = 5$$

$$X_{43} = 5$$

$$X_{44} = 0$$

 $X_{45} = 5$
 $X_{51} = 3$

$$X_{52} = 0$$

$$X_{53} = 0$$

$$X_{53} = 4$$

$$X_{54} = 0$$

$$X_{55} = 0$$

$$X_{61} = 0$$

$$X_{62} = 0$$

 $X_{63} = 0$

$$\zeta_{63} = 0$$

$$X_{64} = 5$$

$$X_{64} = 5$$

 $X_{65} = 2$

Joyce y Marvin tienen una guardería.

Ellos intentan decidir qué dar a los niños
de almuerzo. Desean mantener costos bajos, pero
también deben cumplir los requerimientos nutritivos
para niños. Ya decidieron darles sándwiches
de mantequilla de maní y mermelada y alguna
combinación de galletas, leche y jugo de naranja. El contenido
nutritivo de cada alimento y su costo se presenta en la siguiente
tabla:

Λ1:	C	Taxal	\/:+ C()	Dustalas	C+-(¢)
Alimento	Grasa	Total	Vit.C(mg)	Proteínas	Costo(\$)
Pan	10	70	0	3	5
Mantequilla de maní	75	100	0	4	4
Galleta	20	60	0	1	8
Mermelada	0	50	3	0	7
Leche	70	150	2	8	15
Jugo	0	100	120	1	35

Los requerimientos nutritivos son los siguientes. Cada niño debe recibir de 400 a 600 calorías. No más de 30 % de las calorías totales debe venir en grasas. Cada niño debe consumir al menos 60 mg de vitamina C y 12 g de proteína. Todavía más, por razones prácticas, cada niño necesita justo 2 rebanadas de pan (para un sandwich), al menos el doble de mantequilla de maní que de mermelada y al menos una taza de líquido (leche y/o jugo de naranja). Joyce y Marvin desean seleccionar las opciones de alimento para cada niño que minimice el costo mientras cumple con los requerimientos establecidos.

Análisis

Se requiere cubrir los requerimientos de la forma más barata posible. Como en el problema de la dieta visto en clases.

Variables de Decisión

 $x_1 = Rebanadasdepan$

 $x_2 = Cucharadas de mante quillas de maní$

 $X_3 = Cucharadas de fresa de mermela da$

 $X_4 = Unidades de Galletas integrales$

 $X_5 = Tazasdeleche$

 $X_6 = Tazasdejugo$

Función Objetivo

Minimizar

$$Z = 5x_1 + 4x_2 + 7X_3 + 8X_4 + 15X_5 + 36X_6$$

Calorías mínimas:

$$70x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 60x_4 + 150x_5 + 100x_6 > = 400$$

Calorías máximas:

$$70x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 60x_4 + 150x_5 + 100x_6 <= 600$$

Grasa:

$$-11x_1 + 45x_2 - 15x_3 + 2x_4 + 25x_5 - 30x_6 \le 0$$

Vitamina C:

$$3x_3 + 2x_5 + 120x_6 > = 60$$

Proteínas:

$$3x_1 + 4x_2 + x_4 + 8x_5 + x_6 > = 12$$

Pan:

$$x_1 = 2$$

Doble mantequilla de maní que mermelada:

$$x_2 - 2x_3 >= 0$$

Líquidos:

$$x_5 + x_6 > = 1$$

Triviales

Minimizar

$$Z = 5X_1 + 4X_2 + 7X_3 + 8X_4 + 15X_5 + 36X_6$$

Sujeto a :

$$70x_{1} + 100x_{2} + 50x_{3} + 60x_{4} + 150x_{5} + 100x_{6} >= 400$$

$$70x_{1} + 100x_{2} + 50x_{3} + 60x_{4} + 150x_{5} + 100x_{6} <= 600$$

$$-11x_{1} + 45x_{2} - 15x_{3} + 2x_{4} + 25x_{5} - 30x_{6} <= 0$$

$$3x_{3} + 2x_{5} + 120x_{6} >= 60$$


$$3x_{1} + 4x_{2} + x_{4} + 8x_{5} + x_{6} >= 12$$

$$x1 = 2$$

$$x_{2} - 2x_{3} >= 0$$

```
INGO - LINGO Model - LINGO1
                                                                                                                                        - ø ×
File Edit LINGO Window Help
UNGO Model - LINGO1
                                                                                                                  ---
 min = 5 * X1 + 4 * X2 + 7 * X3 + 8 * X4 + 15 * X5 + 36 * X6;
  70 * X1 + 100 * X2 + 50 * X3 + 60 * X4 + 150 * X5 + 100 * X6 > 400;
 70 * X1 + 100 * X2 + 50 * X3 + 60 * X4 + 150 * X5 + 100 * X6 < 600;
 -11 * X1 + 45 * X2 - 15 * X3 + 2 * X4 + 25 * X5 - 30 * X6 < 0:
 3 * X3 + 2 * X5 + 120 * X6 > 60;
 3 * X1 + 4 * X2 + X4 + 8 * X5 + X6 > 12:
 X1 = 2;
 X2 - 2 * X3 > 0;
 X5 + X6 > 1;
 X1 > 0;
 X2 > 0;
 X3 > 0;
 X4 > 0:
 X5 > 0;
 X6 > 0:
                                                                                                                                    Ln 16, Col 3 4:12 am
For Help, press F1
```







$$Z = 47,79485$$

$$X_1 = 2,0000$$

$$X_2 = 0.5747508$$

$$X_3 = 0.2873754$$

$$X_4 = 1.039452$$

$$X_5 = 0.5157807$$

$$X_6 = 0.4842193$$



Maureen Laird es directora de inversiones de Alva Electric Co., empresa importante en el medio oeste. La compañía ha programado la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas a 5, 10, y 20 años, para satisfacer las necesidades de la creciente población en la región servida por la empresa. Para cubrir por lo menos los costos de construcción, Maureen tiene que invertir parte del dinero de la empresa para cubrir estas necesidades futuras de liquidez. Maureen Sólo puede comprar tres tipos de activos financieros, cada uno cuesta \$ 1 millón por unidad.



Unidades fraccionarias pueden ser comprados. Los activos que produzcan ingresos de 5, 10 y 20 años a partir de ahora, y que los ingresos se necesitan para cubrir al menos el flujo de efectivo mínimo las necesidades de estos años. (Cualquier excedente de ingresos por encima del mínimo obligación de que cada período de tiempo se aprovechará para aumentar el pago de dividendos a los accionistas en lugar de guardarlo para ayudar a cumplir con el requisito mínimo de liquidez en el próximo período de tiempo.)La siguiente tabla muestra los ingresos generados por cada unidad de cada activo y el mínimo de ingresos necesarios para cada uno de los periodos futuros cuando una nueva central hidroeléctrica se construirá.



	In	Flujo de efectivo		
Año	Acción 1	Acción 2	Acción 3	requerido
5	\$2 millones	\$1 millón	\$0.5 millones	\$400 millones
10	\$0.5 milones	\$0.5 millones	\$ 1 millón	\$100 millones
20	0	.5 millones	\$2 millones	\$300 millones



Maureen desea determinar la mezcla de inversiones en estas acciones que cubrirá los requerimientos de efectivo y que minimizará la cantidad total invertida.



Análisis

Se quiere determinar la mezcla de inversiones para las acciones, que cumplan con los requerimientos y que minimice la cantidad total invertida, que sea el óptimo. Es decir, que me diga la cantidad que debo invertir en el activo 1, cuánto debo invertir en el activo 2 y cuánto debo invertir en el activo 3.



Variables de Decisión

 $X_1 = Lacantidaddeinversi \'on paraelactivo 1$

 $X_2 = Lacantidaddeinversi \'on paraelactivo 2$

 $X_3 = Lacantidaddeinversi \'on paraelactivo 3$



Función Objetivo

Minimizar

$$Z = X_1 + X_2 + X_3$$



$$2X_1 + 2X_2 + 0.5X_3 >= 400$$

 $0.5X_1 + 0.5X_2 + X_3 >= 100$
 $1.5X_1 + 3X_3 >= 300$
 $X_1, X_2, X_3 >= 0$




Minimizar:

$$Z = X_1 + X_2 + X_3$$


Sujeto a:

$$2X_1 + X_2 + 0.5X_3 >= 400$$

 $0.5X_1 + 0.5X_2 + X_3 >= 100$
 $1.5X_2 + 2X_3 >= 300$
 $X_1, X_2, X_3 >= 0$









$$Z = 300,0000$$

$$X_1 = 100,0000$$

$$X_2 = 200,0000$$

$$X_3 = 0,0000$$

