



调和与分析学习笔记

作者：UN

机构：北京师范大学数学科学学院

日期：2023.12.30 起著

封面：<https://www.pixiv.net/artworks/98651471>

模板来源：<https://github.com/ElegantLaTeX>



其分也，成也；其成也，毁也。——《齐物论》

目录

第一部分 经典 Fourier 分析笔记	1
第一章 预备知识	2
1.1 补充: (实) 调和分析概览	3
1.2 测度论的必要知识	4
1.2.1 σ 代数	4
1.2.2 测度	7
1.2.3 外测度与 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度	8
1.3 拓扑群	10
1.4 一些重要的不等式和插值结果	11
1.4.1 Hölder 不等式	11
1.4.2 Minkowski 不等式	14
1.4.3 Young 不等式	16
1.4.4 (相对初等的) 嵌入与插值	17
1.5 拟赋范 Lebesgue 空间	19
第二章 Fourier 级数与积分	22
2.1 Fourier 系数与级数	22
2.2 点态收敛的判别法	25
2.3 连续函数的 Fourier 级数	37
2.4 依范数收敛	41
2.5 补充: L^p 空间的进一步讨论	46
2.5.1 L^p 空间之间的包含关系	46
2.5.2 L^p 范数极限	50
2.6 求和法	53
2.7 补充: 高维 Fourier 级数	58
2.8 L^1 函数的 Fourier 变换	61
2.9 Schwartz 空间	69
2.9.1 Schwartz 空间的定义与其上的拓扑	69
2.9.2 Schwartz 空间在 Lebesgue 空间中的稠密性	77
2.9.3 Schwartz 函数的 Fourier 变换	79
2.10 缓增分布空间	83
2.10.1 缓增分布空间的定义	83
2.10.2 缓增分布空间上的 Fourier 变换与其它线性算子	85
2.11 补充: 分布与紧支分布	93
2.12 补充: 一些特殊的分布	98
2.12.1 支在一点的分布	98
2.12.2 Laplace 算子	99
2.12.3 齐次分布	100
2.13 $L^p(1 < p \leq 2)$ 上的 Fourier 变换	106
2.14 Fourier 积分的收敛性与求和法	113

2.15 补充: L^p 上的卷积算子与乘子	116
2.15.1 平移可换算子	116
2.15.2 线性算子的转置和伴随	119
2.15.3 平移可换有界线性算子空间 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$	120
2.15.4 $\mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画	122
2.15.5 Fourier 乘子空间 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$	124
2.16 补充: 振荡积分	126
2.16.1 无驻点的相位	126
2.16.2 下水平集估计与 Van der Corput 引理	128
第三章 Hardy-Littlewood 极大函数	133
3.1 恒等逼近定理	133
3.2 弱型不等式与几乎处处收敛	134
3.3 Marcinkiewicz 插值定理	136
3.4 Hardy-Littlewood 极大函数	140
3.5 二进极大函数	144
3.6 极大函数的弱 $(1,1)$ 型不等式	147
3.7 加权范数不等式	150
3.8 补充: 弱 L^p 空间与 Lorentz 空间	151
3.8.1 弱 L^p 空间	151
3.8.1.1 弱 L^p 空间的基本介绍	151
3.8.1.2 弱 L^p 空间的收敛性	155
3.8.1.3 弱 L^p 空间上的一个初等插值	156
3.8.1.4 弱 $L^p(p > 1)$ 空间的可赋范性	157
3.8.1.5 弱 L^p 空间上的不等式	159
3.8.2 Lorentz 空间	161
3.8.2.1 递降重排	161
3.8.2.2 Lorentz 空间的定义与性质	164
3.8.2.3 Lorentz 空间的共轭空间	170
3.8.2.4 某些重要结果在 Lorentz 空间上的推广	179
3.9 补充: Orlicz 空间	182
3.10 一个外插值定理	183
第四章 卷积型奇异积分算子	185
4.1 Hilbert 变换与 Riesz 变换	185
4.1.1 Hilbert 变换的定义和基本性质	185
4.1.2 Hilbert 变换与解析函数的联系	188
4.1.3 Hilbert 变换的 L^p 有界性	189
4.1.4 Riesz 变换	197
4.2 齐次奇异积分与旋转法	201
4.2.1 齐次奇异积分与极大奇异积分	201
4.2.2 齐次奇异积分的 L^2 有界性	204
4.2.3 旋转法	206
4.2.4 补充: 任意自一维算子出发的旋转法	208
4.2.5 具偶积分核的奇异积分	209

4.2.6 偶积分核的极大奇异积分	215
4.3 Calderón-Zygmund 分解与奇异积分	222
4.3.1 Calderón-Zygmund 分解	222
4.3.2 一般奇异积分	224
4.3.3 从 L^p 有界性到弱 $(1, 1)$ 型有界性	226
4.3.4 对极大奇异积分的讨论	229
4.3.5 从极大奇异积分的强 $(2, 2)$ 型有界性到弱 $(1, 1)$ 型有界性	232
4.4 L^p 有界性的充分条件	236
4.4.1 奇异积分 L^p 有界性的充分条件: Calderón-Zygmund 定理	236
4.4.2 满足充分条件的一个例子	239
4.4.3 消失性条件的必要性	239
4.4.4 极大奇异积分算子 L^p 有界性的充分条件	240
4.5 向量值不等式	244
4.5.1 线性算子的 l^2 值延拓	244
4.5.2 线性算子 l^r 值延拓的应用	247
4.5.3 一般 Banach 值延拓	249
4.5.3.1 补充: Banach 值函数的测度与积分	249
4.5.3.2 Banach 值函数的 Lebesgue 空间	253
4.5.4 补充: Banach 值函数空间的插值	258
4.6 向量值奇异积分	267
4.6.1 Banach 值奇异积分算子	268
4.6.2 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理的应用	273
4.6.3 极大函数的向量值估计: Fefferman-Stein 不等式	276
4.7 补充: 概率论引论	279
4.7.1 概率空间, 独立性	279
4.7.2 Rademacher 函数的相关结论	280

第五章 Littlewood-Paley 分解与乘子 284

5.1 Littlewood-Paley 理论	284
5.1.1 向量版本的阐述	293
5.1.2 平方函数二进和的 L^p 估计	294
5.1.3 L^p 上的正交性损失	300
5.1.4 两个乘子定理	302
5.1.4.1 $\mathbb{R}$ 上的 Marcinkiewicz 乘子定理	302
5.1.4.2 $\mathbb{R}^n$ 上的 Marcinkiewicz 乘子定理	305
5.1.4.3 $\mathbb{R}^n$ 上的 Mihlin-Hörmander 乘子定理	310
5.1.5 Littlewood-Paley 定理的应用	316
5.1.5.1 极大算子的估计	316
5.1.5.2 具粗糙核的奇异积分的估计	317
5.1.5.3 L^p 上的几乎正交原理	320
5.1.6 Haar 系统, 条件期望与鞅	321
5.1.6.1 条件期望与二进鞅差	321
5.1.6.2 二进鞅差与 Haar 函数的关系	323

第二部分 现代 Fourier 分析与 Fourier 分析基础笔记	326
第六章 光滑性与函数空间	327
6.1 光滑函数与缓增分布	327
6.1.1 模多项式的缓增分布空间	327
6.1.2 Calderón 再现公式	329
6.1.3 Laplace 算子, Riesz 势与 Bessel 势	331
6.1.3.1 Riesz 势	331
6.1.3.2 Bessel 势	334
6.1.4 Sobolev 空间	337
6.1.4.1 一般 Sobolev 空间的定义与基本性质	337
6.1.4.2 非齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画	340
6.1.4.3 齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画	343
6.1.5 Lipschitz 空间	345
6.1.5.1 Lipschitz 空间简介	345
6.1.5.2 齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画	349
6.1.5.3 非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画	354
第七章 有界平均振荡	358
7.1 有界平均振荡函数的基本性质	358
7.2 John-Nirenberg 定理	362
7.3 二进极大函数与二进 BMO	366
7.4 sharp 极大函数	369
7.5 关于 BMO 的插值	373
第八章 Hardy 空间	377
8.1 光滑性与消失性	377
8.2 Hardy 空间的定义和预备估计	379
8.3 H^p 原子	382
8.4 grand 极大函数	385
8.5 开集的 Whitney 分解	389
8.6 H^1 的原子分解	393
8.7 Hardy 空间 H^1 上的奇异积分	397
8.8 H^1 与 BMO 之间的对偶性	399
第三部分 现代调和分析及其应用讲义笔记	404
第九章 Hardy-Littlewood 极大函数: 一些回顾与串讲	405
9.1 Hardy-Littlewood 定理与算子族点态收敛定理	405
9.2 应用: 非切向极限与椭圆边值问题	407
9.3 应用: Carleson 极大函数	408
第十章 A_p 权理论及其应用	410
10.1 A_p 权的定义	410

第四部分 拟微分算子和 Nash-Moser 定理笔记	421
第十一章 拟微分算子与 Nash-Moser 定理	422
11.1 拟微分算子	422
11.1.1 导论	422
11.1.1.1 Fourier 变换的运用	422
11.1.1.2 变系数算子	424
11.1.1.3 调和分析的两个角度 (坐标空间 x 和频率空间 ξ)	425
11.1.2 象征	426
11.1.2.1 定义和例子	426
11.1.2.2 象征的逼近	427
11.1.2.3 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$ 中的渐近和式与古典拟微分象征	427
11.1.3 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{S}'$ 中的拟微分算子	429
11.1.3.1 $\mathcal{S}$ 上的作用	429
11.1.3.2 算子的核函数与共轭	430
第五部分 Banach 空间上的分析笔记	432
第十二章 Bochner 空间	433
12.1 可测性	433
12.1.1 可测空间 $(S, \mathcal{A})$ 上的函数	433
12.1.2 测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 上的函数	439
12.1.3 算子值函数	442
12.2 积分	443
12.2.1 Bochner 积分	443
12.2.2 Bochner 空间 $L^p(S; X)$	449
12.2.3 Pettis 积分	455
12.3 Bochner 空间的共轭	460
12.3.1 初等共轭结果	460
12.3.2 共轭性与 Radon-Nikodým 性质	466
12.3.3 关于 Radon-Nikodým 性质的更多介绍	472
第十三章 Bochner 空间上的算子	481
13.1 L^p 延拓定理	481
13.1.1 T 为正算子时 $T \otimes I_X$ 的有界性	483
13.1.2 $T \otimes I_H$ 在 Hilbert 空间 H 中的有界性	486
13.1.2.1 Gauss 核随机变量	486
13.1.3 一些反例	490
13.2 Bochner 空间的插值	493
13.2.1 经典插值理论回顾: 复插值与实插值	493
13.2.2 Riesz-Thorin 插值定理	515
13.2.3 Marcinkiewicz 插值定理	516
13.2.4 $L^p(S; X)$ 的复插值	520
13.2.5 $L^p(S; X)$ 的实插值	524
13.3 Hardy-Littlewood 极大算子	526

13.3.1 Lebesgue 点与微分	528
13.3.2 卷积与逼近	529
13.4 Fourier 变换	531
13.4.1 反演公式与 Plancherel 定理	532
13.4.2 Fourier 型	534
13.4.3 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$	534
13.4.4 缓增分布空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$	536
13.5 Sobolev 空间与可微性	538
13.5.1 弱导数	538
13.5.2 Sobolev 空间 $W^{k,p}(D; X)$	539
13.5.3 a.e. 可微性	540
13.6 条件期望	545
13.6.1 唯一性	548
13.6.2 存在性	550
13.6.3 条件极限定理	552
13.6.4 条件期望满足的不等式与等式	553
第十四章 鞅	559
14.1 定义与基本性质	559

第一部分

经典 Fourier 分析笔记

第一章 预备知识

首先回顾一些曾经的课程中学过的内容, 这里就只作列举不再证明了.

一般来说之后进行的讨论都是在 $\mathbb{R}^n$ 上的, 欧氏空间范数记作 $|\cdot|$. 若 $x \in \mathbb{R}^n, r > 0$, 则用

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| < r\}$$

表示球心在 x , 半径为 r 的球. $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度记作 dx , $\mathbb{R}^n$ 中的单位球 S^{n-1} 上的面测度记作 $d\sigma$. 若 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 E 的 Lebesgue 测度记作 $|E|$, 其示性函数记作 χ_E :

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

几乎处处或对几乎所有的 x 指代一个性质在忽略零测集的意义下成立, 它们分别记作 a.e. 和 a.e. x .

若 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 则

$$\partial^a f = \frac{\partial^{|a|}}{\partial x_1^{a_1} \dots \partial x_n^{a_n}},$$

其中 $|a| = a_1 + \dots + a_n, x^a = x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$.

设 (X, μ) 是测度空间, 则 $L^p(X, \mu) (1 \leq p < \infty)$ 表示由从 X 到 $\mathbb{C}$ 的全体 p 次可积函数构成的 Banach 空间, $f \in L^p(X, \mu)$ 的范数为:

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

$L^\infty(X, \mu)$ 表示由从 X 到 $\mathbb{C}$ 的全体本性有界函数构成的 Banach 空间. 也就是说, 函数 $f \in L^\infty(X, \mu)$ 总满足

$$\exists C > 0 (\mu(\{x \in X : |f(x)| > C\}) = 0). \quad (1.1)$$

f 的范数记作 $\|f\|_{L^\infty}$, 它表示满足(1.1)式的 C 的下确界. 通常来说, X 都会取成 $\mathbb{R}^n$ 或其子集, $d\mu = dx$, 这种情况下一般简记空间为 L^p . 对一般的测度空间来说简记为 $L^p(X)$. 如果 μ 绝对连续, 且 $d\mu = w dx$, 就记空间为 $L^p(w)$. p 的共轭指数记为 p' :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

L^p 上的三角不等式根据 Minkowski 不等式是有积分形式的. 给定 σ 有限测度空间 $(X, \mu), (Y, \nu)$, 这个积分形式的不等式表为

$$\left(\int_X \left| \int_Y f(x, y) d\nu(y) \right|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \leq \int_Y \left(\int_X |f(x, y)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} d\nu(y).$$

$\mathbb{R}^n$ 上两个函数 f, g 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x - y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) g(y) dy,$$

其中右式积分至少需要是有意义的.

测试函数空间表示紧支无穷可微函数空间, 记作 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$; Schwartz 函数空间记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Schwartz 函数表示在无穷远处速降的无穷可微函数 (更精确地来讲, Schwartz 函数与其任意阶导数都比任意多项式的衰减速度要快). 在给定合适的拓扑后, 它们的对偶空间 (亦即共轭空间) 分别称为分布空间与缓增分布空间. 分布与测试函数的卷积定义为: 如果 $T \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)^*, f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(T * f)(x) = \langle T, \tau_x \tilde{f} \rangle,$$

其中 $\tilde{f}(y) = f(-y), \tau_x f(y) = f(x + y)$. 注意如果 T 是局部可积函数, 那么这个定义与前面的经典卷积定义就一样了. 类似可以取 $T \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)^*$ 与 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 来定义卷积.

最后, 式子中的 C 统一表示常数项, 这个常数项可能随着式子的推导而发生改变, 不过为了符号简便这里就统一记了.

1.1 补充: (实) 调和分析概览

本节选译自 Terence Tao Fourier Analysis 的课程讲义 **Note 0: Overview of harmonic analysis**.

一般来说, 分析倾向于围绕经典的函数 (一般来说是实值函数或复值函数) 与算子 (以一个或多个函数作为输入, 以另外的一些函数作为输出) 展开研究. 调和分析¹特别关注这些函数的量化性质, 以及这些量化性质在不同的 (通常很精确的) 算子下怎么变动. 量化性质的例子有: $f(x)$ 在一致有界时刻画它上确界的 M , 或者在平方可积时的 L^2 范数上界 A (也就是说 $\int |f(x)|^2 dx \leq A$). 调和分析的一个典型问题是: 如果函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 平方可积, 且其梯度 ∇f 存在且也平方可积, 那么 f 是否一致有界? ($n=1$ 时成立, $n>2$ 时不成立, 而 $n=2$ 时几乎是不成立的. 这是 Sobolev 嵌入定理的一个特殊情况, 而 Sobolev 嵌入定理是 PDE 分析中的基本要点.) 如果这件事成立, 能否对一致上界有更精确的估计?

实函数或复函数, 比如单变量实值函数 $f(x) (x \in \mathbb{R})$, 远在高中时就在数学课程中很常见了. 在许多情况下, 我们会主要去处理特殊的函数: 多项式函数, 指数函数, 三角函数, 还有其它确定的函数. 这些函数有丰富的代数和几何结构, 在数学的诸多领域中也有很多技术能给出关于这些函数的问题的确切解答.

相反地, 分析关注的更多是一般的函数类: 具有一些定性性质的函数, 比如可测性, 有界性, 连续性, 可微性, 光滑性, 解析性, 可积性, 衰减性等等, 但这些函数没有确切的表达式, 于是它们也不再有那么多的代数和几何结构. 这类一般函数在譬如常或偏微分方程的研究中是很常见的, 因为这些方程的解通常没有确切的代数表达式, 而这并不妨碍它们具有一些例如可微性等等的共同定性性质. 也有可能一个函数有确切的表达式和结构, 但是出于一些原因, 用纯代数方法研究这些结构很困难, 于是研究者必须 (至少在一定程度上) 依靠更多的分析工具. 一个典例是 Airy 函数 $\text{Ai}(x) := \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(x\xi + \xi^3)} d\xi$, 它有确切的积分表达式, 但要理解诸如 $\text{Ai}(x)$ 是否是收敛积分, $x \rightarrow \pm\infty$ 时这个积分是否趋零等等这些基本问题, 最简单的方法就是用调和分析的工具. 在这个例子里, 我们就可以用驻相估计原理同时回答这两个问题, 答案可能还很出人意料: Airy 函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时有指数级衰减, 但在 $x \rightarrow -\infty$ 时仅有多项式级衰减.

调和分析作为分析的一个子领域, 特别关注函数的各种定量的界的研究. 比如调和分析关注函数 f 的界是多少, 而不是仅仅去假设 f 有界, 也就是去问满足对全体 (或几乎全体的) $x \in \mathbb{R}$ 而言 $|f(x)| \leq M$ 的最优的 $M \geq 0$ 是多少. 这个量称作 f 的确界范数或 L^∞ 范数, 记作 $\|f\|_{L^\infty}$. 或者, 如果假设 f 绝对可积, 研究者就可以量化这个性质, 引入 L^1 范数 $\|f\|_{L^1} := \int |f(x)| dx$; 更一般地, 研究者可以量化 $0 < p < \infty$ 时的 p 次可积性, 引入 L^p 范数 $\|f\|_{L^p} := (\int |f(x)|^p dx)^{\frac{1}{p}}$. 类似地, 上面提到的其余量化性质也可以被不同的范数所量化, 而范数本身是用非负数 (或 $+\infty$) 去表示给出的函数, 这套方法也给出了用数量去研究函数某个性质的思路. 另外, 作为纯调和分析的一个重点来说, 这些范数的量化估计在应用数学, 例如数值算法的误差估计中也是很有用的.

函数有无穷的可能, 从而围绕函数可以定义的范数不出意外也有无穷多种; 研究者可以用很多方法刻画一个函数究竟有多“大”. 这些范数之间可能还有惊人的差别, 比如可能函数 f 的 L^∞ 范数非常大, 但 L^1 范数很小 (想像一个非常尖的函数, 它在很小的集合上取大值, 而在其余地方取零), 或反过来有很小的 L^∞ 范数和很大的 L^1 范数 (想像一个定义域很广的函数, 它本身取值很小, 但它在很大的集合上都非零). 研究者可以类似地把 L^2 范数与 L^1 范数或 L^∞ 范数作比较. 但我们发现在某种意义上 L^2 范数是在 L^1 范数和 L^∞ 范数“之间”的, 也就是说如果同时控制了 L^1 范数和 L^∞ 范数, 那么就自动地控制了 L^2 范数. 从直观上讲, 关键点在于 L^∞ 控制了尖型函数的出现, 而 L^1 控制了广分布函数的出现, 剩下的函数在它们中间的 L^2 范数下就有很好的表现. 从量化的角度看, 有下述不等式成立

$$\|f\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^1}^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^\infty}^{\frac{1}{2}},$$

这是代数上 $|f(x)| \leq M \Rightarrow |f(x)|^2 \leq M|f(x)|$ 这件事的一个简单推论. 上面的不等式是 Hölder 不等式的一个特殊情况, 而 Hölder 不等式是调和分析中的一个基本不等式. 控制两个“极端”范数, 进而自动得到“中间”范数的控制的思想可以被大幅一般化, 导出插值理论中的一系列强大又方便的方法, 而插值理论本身也是调和分析的另一基本工具.

¹作者注: 严格来说, 这个词指向的是实调和分析. 抽象调和分析是另外一个领域, 它主要关注怎么用诸如平移或旋转的对称算子去研究 (在常见定义域上的) 实值或复值函数 (例如 Fourier 变换算子与其逆算子); 这个领域本身自然和实调和分析有关, 但它可能在本质上更接近表示论与泛函分析, 这里就不作讨论了.

对单个函数与其所有范数的研究有时显得很乏味. 数学的很多其他领域把关注点更多放在研究者不再考虑单个孤立对象 (函数), 而是引入从一个对象到另一个对象的映射的情形. 这些映射把单个 (或多个) 函数作为输入, 把另外的函数作为输出, 它们通常叫做算子或变换. 算子更像是更复杂的数学对象, 毕竟它们的输入和输出都是函数, 而函数本身的输入和输出都只是通常的数. 不过算子可以表示对函数的很多处理, 比如微分算子

$$f(x) \mapsto \frac{d}{dx} f(x)$$

与它广为人知的逆算子: 积分算子

$$f(x) \mapsto \int_{-\infty}^x f(y) dy.$$

一个不直观但是很重要的例子是 Fourier 变换

$$f(x) \mapsto \hat{f}(x) := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i xy} f(y) dy.$$

有两个或更多输入的算子也是可以关注的点, 这样的算子典例有点态乘积

$$(f(x), g(x)) \mapsto f(x)g(x)$$

与卷积

$$(f(x), g(x)) \mapsto (f * g)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)dy.$$

当然, 调和分析也会关注其他的一些算子. 在历史上, 调和分析首先是研究与 Fourier 分析, 实分析和复分析有关的算子; 而在当代, 调和分析方法已经被用来研究更加广泛的算子. 这些技术在理解线性与非线性偏微分方程的解时 (如果把解看成应用在初值上的算子) 尤其有用, 它们也被用在解析和组合数论的理解中, 比如很多表达式中振荡项 (比如指数项) 的处理就源于此. 调和分析同样被应用在解析算子论中, 后者在几何测度论, 概率论, 遍历论, 数值分析与微分几何中都有出现.

调和分析的首要任务是同时得到量化性质与不同算子应用到函数上时的量化信息. 一个量化估计的典例就是不等式 $\|f * g\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2} (\forall f, g \in L^2)$, 这是 Young 不等式的一个特殊情况, 用 Cauchy-Schwarz 不等式就可以证明; 利用它我们可以得到一个量化结论: 两个 L^2 函数的卷积是连续函数 (这是因为连续函数空间在 L^∞ 中闭, 而 L^2 函数能被光滑紧支函数以任意精度逼近).

1.2 测度论的必要知识

本节选自 [FL], 旨在为后文预备测度论的相关定义与结论.

1.2.1 σ 代数

定义 1.1 (集代数, σ 代数)

设 X 是非空集合, 称 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集代数, 如果 $\mathcal{A}$ 是由 X 的某些子集构成的非空集族, 且其在有限并运算和补运算下封闭. 也就是说, 若 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{A}$, 则 $\bigcup_{j=1}^n E_j \in \mathcal{A}$; 另若 $E \in \mathcal{A}$, 则 $E^c \in \mathcal{A}$. σ 代数指的是在可数并运算下封闭的代数.



因为 $\bigcap_j E_j = (\bigcup_j E_j^c)^c$, 故代数 (或 σ 代数) 在有限 (或可数) 交运算下同样封闭. 另外, 如果 $\mathcal{A}$ 是代数, 则 $\emptyset \in \mathcal{A}, X \in \mathcal{A}$. 这是因为若 $E \in \mathcal{A}$, 则 $\emptyset = E \cap E^c \in \mathcal{A}, X = E \cup E^c \in \mathcal{A}$. 需要注意如果代数 $\mathcal{A}$ 只在可数不交并下封闭, 它也是 σ 代数. 这是因为设 $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{A}$, 取

$$F_k = E_k \setminus \left[\bigcup_{j=1}^{k-1} E_j \right] = E_k \cap \left[\bigcup_{j=1}^{k-1} E_j \right]^c,$$

则 $F_k \in \mathcal{A}$ 两两不交, 且 $\bigcup_{j=1}^\infty E_j = \bigcup_{k=1}^\infty F_k \in \mathcal{A}$, 因而 $\mathcal{A}$ 是 σ 代数. 这种将集列替换成不交集列的方法在后面会经常用到.

下面给出一些 σ 代数的例子. 任取集合 X , 显见其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 与平凡子集族 $\{\emptyset, X\}$ 均为 σ 代数. 另若 X 不可数, 则

$$\mathcal{A} = \{E \subset X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 不可数}\}$$

是 σ 代数, 称之为可数集或余可数集的 σ 代数².

容易验证 X 上任意 σ 代数的交依旧是 σ 代数, 进而若 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{P}(X)$ 中的任意子集, 则存在一个最小的 σ 代数 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 包含 $\mathcal{E}$, 此即包含 $\mathcal{E}$ 的全体 σ 代数之交. 称 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 为 $\mathcal{E}$ 生成的 σ 代数, 关于它有下列引理:

引理 1.1

若 $\mathcal{E} \subset \mathcal{M}(\mathcal{F})$, 则 $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{M}(\mathcal{F})$.



证明 因为 $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ 代数, 故它参与了与其它包含 $\mathcal{E}$ 的 σ 代数作交得到 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 的运算, 进而 $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{M}(\mathcal{F})$. $\square$

如果 X 是测度空间, 或更一般的拓扑空间, 则由 X 中的开集族生成的 σ 代数称为 X 上的 Borel σ 代数, 记作 $\mathcal{B}_X$, 其中的元素称为 Borel 集. $\mathcal{B}_X$ 因此包含开集, 闭集, 开集的可数交, 闭集的可数并等集合. 其中对于可数交和可数并有一套标准的表示法: 我们称开集的可数交为 G_δ 集; 称闭集的可数并为 F_σ 集; 称 G_δ 集的可数并为 $G_{\delta\sigma}$ 集; 称 F_σ 集的可数交为 $F_{\sigma\delta}$ 集, 以此类推.

$\mathbb{R}$ 上的 Borel σ 代数将在后文发挥非常重要的作用. 在实变函数中已经证明了下述命题:

命题 1.1

$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 能被下述集族生成:

- (i) 开区间族: $\mathcal{E}_1 = \{(a, b) : a < b\}$,
- (ii) 闭区间族: $\mathcal{E}_2 = \{[a, b] : a < b\}$,
- (iii) 半开半闭区间族: $\mathcal{E}_3 := \{(a, b] : a < b\}, \mathcal{E}_4 = \{[a, b) : a < b\}$,
- (iv) 单边无穷开区间族: $\mathcal{E}_5 = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}, \mathcal{E}_6 = \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$,
- (v) 单边无穷闭区间族: $\mathcal{E}_7 = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}, \mathcal{E}_8 = \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$.



设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是非空集族, $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$, $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ 是坐标映射. 如果对每个 α 而言, $\mathcal{M}_\alpha$ 都是 X_α 上的 σ 代数, 则 X 上的乘积 σ 代数是由集族

$$\{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha, \alpha \in A\}$$

所生成的 σ 代数. 记该 σ 代数为 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$ (若 $A = \{1, \dots, n\}$, 则记之为 $\bigotimes_{j=1}^n \mathcal{M}_j$ 或 $\mathcal{M}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{M}_n$).

命题 1.2

若 A 可数, 则 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$ 是由 $\{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha\}$ 所生成的 σ 代数.



证明 若 $E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha$, 则有 $\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) = \prod_{\beta \in A} E_\beta \in \mathcal{M}(\{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha\})$, 其中³ $\beta \neq \alpha$ 时 $E_\beta = X$, 故由引理 1.1 知 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha \subset \mathcal{M}(\{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha\})$. 另一方面, $\prod_{\alpha \in A} E_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} \pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) \in \bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$, 故同样由引理 1.1 知 $\mathcal{M}(\{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha\}) \subset \bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$. 命题至此即证. $\square$

命题 1.3

设 $\mathcal{M}_\alpha$ 由 $\mathcal{E}_\alpha$ 生成, 其中 $\alpha \in A$. 则 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$ 由 $\mathcal{F}_1 = \{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha, \alpha \in A\}$ 生成. 另若 A 可数且对任意 α 均有 $X_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha$, 则 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$ 由 $\mathcal{F}_2 = \{\prod_{\alpha \in A} E_\alpha : E_\alpha \in \mathcal{E}_\alpha\}$ 生成.



证明 显见 $\mathcal{F}_1 \subset \{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha, \alpha \in A\}$, 故 $\mathcal{F}_1 \subset \bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$, 从而由引理 1.1 知 $\mathcal{M}(\mathcal{F}_1) \subset \bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha$. 另

²因为可数集的可数并依旧可数, 故这里定义的 $\mathcal{A}$ 确为 σ 代数.

³这个结论可以从 $A = \{1, \dots, n\}$ 的情况出发来理解, 此时设 $(a, b) \in \mathcal{M}_1$, 则 $\pi_1^{-1}((a, b)) = \{(t, x_2, \dots, x_n) : t \in (a, b), x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$, 这可以表为 $(a, b) \times \prod_{j=2}^n \mathbb{R}$.

一方面, 对每个 α , 集族 $\{E \subset X_\alpha : \pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathcal{M}(\mathcal{F}_1)\}$ 显然是 X_α 上包含 $\mathcal{E}_\alpha$ 的 σ 代数, 进而它也包含 $\mathcal{M}_\alpha$. 也就是说对任意 $E \in \mathcal{M}_\alpha, \alpha \in A$ 均有 $\pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathcal{M}(\mathcal{F}_1)$, 因此 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha \subset \mathcal{M}(\mathcal{F}_1)$. 因此 $\bigotimes_{\alpha \in A} \mathcal{M}_\alpha = \mathcal{M}(\mathcal{F}_1)$. 命题第二个结论由第一个结论与前述命题结论即得. $\square$

命题 1.4

设 $X_1, \dots, X_n$ 是度量空间, $X = \prod_{j=1}^n X_j$ 装备有乘积度量, 则 $\bigotimes_{j=1}^n \mathcal{B}_{X_j} \subset \mathcal{B}_X$. 另若 X_j 均为可分空间, 则 $\bigotimes_{j=1}^n \mathcal{B}_{X_j} = \mathcal{B}_X$.

证明 由命题 1.3 知 $\bigotimes_{j=1}^n \mathcal{B}_{X_j}$ 由 $\{\pi_j^{-1}(U_j) : U_j \text{ 在 } X_j \text{ 中开}, 1 \leq j \leq n\}$ 生成, 又因为 X 装备乘积度量, 故 $\pi_j^{-1}(U_j)$ 在 X 中也为开集, 进而由引理 1.1 知 $\bigotimes_{j=1}^n \mathcal{B}_{X_j} \subset \mathcal{B}_X$. 现设 C_j 是 X_j 中的可数稠密子集, 设 $\mathcal{E}_j$ 是 X_j 中球心属于 C_j , 半径为有理数的球所构成的集列, 则 X_j 中的每个开集都是 $\mathcal{E}_j$ 中元素的并 (事实上因为 $\mathcal{E}_j$ 本身是可数集族, 故它们还是可数并). 另外, 集合 $\{x = (x_1, \dots, x_n) \in X : x_j \in C_j, 1 \leq j \leq n\}$ 是 X 的可数稠密子集⁴, 且 X 中半径为 r 的球正是 X_j 中半径为 r 的球的乘积. 因此 $\mathcal{B}_{X_j}$ 由 $\mathcal{E}_j$ 所生成, $\mathcal{B}_X$ 由 $\{\prod_{j=1}^n E_j : E_j \in \mathcal{E}_j\}$ 生成, 故由命题 1.3 知 $\mathcal{B}_X = \bigotimes_{j=1}^n \mathcal{B}_{X_j}$.

推论 1.1

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} = \bigotimes_{j=1}^n \mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$

我们用一个之后会用到的技巧上的结果来结束本小节.

定义 1.2 (初等族)

若 X 的子集族 $\mathcal{E}$ 满足

- (i) $\emptyset \in \mathcal{E}$,
 - (ii) 若 $E, F \in \mathcal{E}$, 则 $E \cap F \in \mathcal{E}$,
 - (iii) 若 $E \in \mathcal{E}$, 则 E^c 是 $\mathcal{E}$ 中有限个不交元素的并,
- 则称 $\mathcal{E}$ 是一个初等族.

命题 1.5

若 $\mathcal{E}$ 是初等族, 则由 $\mathcal{E}$ 中有限个不交元素之并所组成的集族 $\mathcal{A}$ 是集代数.

证明 要说明 $\mathcal{A}$ 是集代数, 就是要说明 $\mathcal{A}$ 在有限并运算和补运算下封闭. 若 $A, B \in \mathcal{E}$, 设 $B^c = \bigcup_{j=1}^J C_j (C_j \in \mathcal{E} \text{ 两两不交})$, 则 $A \setminus B = \bigcup_{j=1}^J (A \cap C_j)$, $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, 其中并运算涉及的几何均两两不交, 故它们都是 $\mathcal{E}$ 中元素的有限不交并, 进而 $A \setminus B \in \mathcal{A}, A \cup B \in \mathcal{A}$. 下面用归纳法说明若 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E}$, 则 $\bigcup_{j=1}^n A_j \in \mathcal{A}$. 根据归纳假设, 可设 $A_1, \dots, A_{n-1}$ 两两不交, 注意到

$$\bigcup_{j=1}^n A_j = A_n \cup \bigcup_{j=1}^{n-1} (A_j \setminus A_n),$$

可见 $\bigcup_{j=1}^n A_j$ 同样可写成有限不交并的形式, 因此 $\bigcup_{j=1}^n A_j \in \mathcal{A}$. 至此即得 $\mathcal{A}$ 对有限并封闭. 对于补运算, 设 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E}$, 因为 $\mathcal{E}$ 中每个元素的补都能表成 $\mathcal{E}$ 中元素的有限不交并, 故可记 $A_m^c = \bigcup_{j=1}^{J_m} B_m^j$, 其中 $B_m^1, \dots, B_m^{J_m} \in \mathcal{E}$ 两两不交. 进而

$$\left(\bigcup_{m=1}^n A_m \right)^c = \bigcap_{m=1}^n \left(\bigcup_{j=1}^{J_m} B_m^j \right) = \bigcup_{\substack{1 \leq j_n \leq J_n \\ 1 \leq m \leq n}} (B_1^{j_1} \cap \dots \cap B_n^{j_n}).$$

上右式作为有限不交并在 $\mathcal{A}$ 中, 故上左式也在 $\mathcal{A}$ 中, 因此 $\mathcal{A}$ 对补运算封闭. $\square$

⁴ C_j 本身是可数集, 故这个集合当然可数.

1.2.2 测度

定义 1.3 (测度)

设 X 是装备了 σ 代数 $\mathcal{M}$ 的集合, $\mathcal{M}$ 上的测度 (或 $(X, \mathcal{M})$ 上的, 在 $\mathcal{M}$ 无歧义时也可以说 X 上的) 是函数 $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$, 其满足

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$,
- (ii) 若 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{M}$ 中两两不交的集合, 则 $\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$.



上述定义中 (ii) 称为可数可加性, 它蕴含了有限可加性:

- (ii') 若 $E_1, \dots, E_n$ 是 $\mathcal{M}$ 中两两不交的集合, 则 $\mu(\bigcup_{j=1}^n E_j) = \sum_{j=1}^n \mu(E_j)$.

前者蕴含后者是因为可以在 $j > n$ 时取 $E_j = \emptyset$. 满足 (i), (ii') 但不满足 (ii) 的函数 μ 称为有限可加测度.

定义 1.4 (可测空间, 可测集, 测度空间)

若 X 是集合, $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$ 是 σ 代数, 则 $(X, \mathcal{M})$ 称为可测空间, $\mathcal{M}$ 中的元素称为可测集. 若 μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的测度, 就称 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间.



对于测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$, 有一套标准程序来判断测度 μ 的“大小”. 若 $\mu(X) < \infty$ (这蕴含了对任意 $E \in \mathcal{M}$ 都有 $\mu(E) < \infty$, 因为 $\mu(X) = \mu(E) + \mu(E^c)$), 则称 μ 是有限测度; 若 $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, 其中对全体 j 均有 $E_j \in \mathcal{M}, \mu(E_j) < \infty$, 则称 μ 是 σ 有限测度. 更一般地, 若 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, 其中对全体 j 均有 $E_j \in \mathcal{M}, \mu(E_j) < \infty$, 则称 E 在 μ 下 σ 有限⁵. 如果对每个 $E \in \mathcal{M}$, 只要 $\mu(E) = \infty$, 就存在 $F \in \mathcal{M}$ 满足 $F \subset E, 0 < \mu(F) < \infty$, 则称 μ 是半有限测度.

容易说明每个 σ 有限测度都是半有限测度, 但反之不然. 幸运的是, 实际证明中用到的绝大多数测度都是 σ 有限测度, 这是因为非 σ 有限测度会有一些反直觉的行为. 下面列举一些典型的测度:

- 设 X 是任意非空集, $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$, f 是 $X \rightarrow [0, \infty]$ 的任意函数, 则 f 定义了 $\mathcal{M}$ 上的一个测度:

$$\mu(E) := \sum_{x \in E} f(x).$$

其中在 E 不可数时, 求和定义为

$$\sum_{x \in E} f(x) := \sup \left\{ \sum_{x \in F} f(x) : F \subset E, F \text{ 有限} \right\}.$$

可以说明 μ 是半有限测度当且仅当对任意 $x \in X$ 均有 $f(x) < \infty$, μ 是 σ 有限测度当且仅当 μ 是半有限测度, 且 $\{x : f(x) > 0\}$ 是可数集. 这种测度中, 有两个例子尤为重要: 若对任意 x 均有 $f(x) = 1$, 则 μ 称为计数测度; 若存在 $x_0 \in X$ 使得 $f(x_0) = 1$, 且 $x \neq x_0$ 时 $f(x) = 0$, 则 μ 称为 x_0 处的点质量或 Dirac 测度.

- 设 X 是不可数集, $\mathcal{M}$ 是可数集或余可数集的 σ 代数. 若定义 $\mathcal{M}$ 上的函数 μ 为

$$\mu(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ 1, & E \text{ 余可数}, \end{cases}$$

则 μ 显然是一个测度.

- 设 X 是无限集, $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$, 定义

$$\mu(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 有限}, \\ \infty, & E \text{ 无限}, \end{cases}$$

则 μ 是有限可加测度, 但它不是测度.

下面的定理总结了测度的基本性质.

⁵ E 有 σ 有限测度这个说法是对的, 但会引起一点歧义.

定理 1.1

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间.

- (i) (单调性) 若 $E, F \in \mathcal{M}, E \subset F$, 则 $\mu(E) \leq \mu(F)$.
- (ii) (次可加性) 若 $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{M}$. 则 $\mu(\bigcup_{j=1}^\infty E_j) \leq \sum_{j=1}^\infty \mu(E_j)$.
- (iii) (下连续性) 若 $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{M}, E_1 \subset E_2 \subset \dots$, 则 $\mu(\bigcup_{j=1}^\infty E_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(E_j)$.
- (iv) (上连续性) 若 $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{M}, E_1 \supset E_2 \supset \dots, \mu(E_1) < \infty$, 则 $\mu(\bigcap_{j=1}^\infty E_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(E_j)$.

证明 (i) 若 $E \subset F$, 则 $\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geq \mu(E)$.

(ii) 设 $F_1 = E_1, k > 1$ 时 $F_k = E_k \setminus (\bigcup_{j=1}^{k-1} E_j)$, 则 F_k 两两不交, 且对任意 n 均有 $\bigcup_{j=1}^n F_j = \bigcup_{j=1}^n E_j$. 则由 (i) 知

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^\infty F_j\right) = \sum_{j=1}^\infty \mu(E_j).$$

(iii) 设 $E_0 = \emptyset$, 则

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) = \sum_{j=1}^\infty \mu(E_j \setminus E_{j-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \mu(E_j \setminus E_{j-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

(iv) 设 $F_j = E_1 \setminus E_j$, 则 $F_1 \subset F_2 \subset \dots, \mu(E_1) = \mu(F_j) + \mu(E_j)$, 且 $\bigcup_{j=1}^\infty F_j = E_1 \setminus (\bigcap_{j=1}^\infty E_j)$. 由 (iii) 即知

$$\mu(E_1) = \mu\left(\bigcap_{j=1}^\infty E_j\right) + \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(F_j) = \mu\left(\bigcap_{j=1}^\infty E_j\right) + \lim_{j \rightarrow \infty} [\mu(E_1) - \mu(E_j)].$$

又因为 $\mu(E_1) < \infty$, 故移项即得欲证. $\square$

对于测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$, 若 $E \in \mathcal{M}$ 满足 $\mu(E) = 0$, 则称 E 为**零测集**. 根据次可加性可知零测集的任意可数并都是零测集. 如果关于点 $x \in X$ 的命题在除去某零测集后成立, 就称该命题**几乎处处成立** (简称为 a.e.). 若 $\mu(E) = 0$ 且 $F \subset E$, 则只要 $F \in \mathcal{M}$, 根据次可加性就有 $\mu(F) = 0$, 但一般来说未必有 $F \in \mathcal{M}$. 定义域囊括了全体零测子集的测度称为**完备测度**. 完备性有时可以规避技术上的麻烦, 通常我们用下述定理获得完备测度:

定理 1.2 (测度与 σ 代数的完备化)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间, 记 $\mathcal{N} = \{N \in \mathcal{M} : \mu(N) = 0\}, \overline{\mathcal{M}} = \{E \cup F : E \in \mathcal{M} \text{ 且 } \exists N \in \mathcal{N} (F \subset N)\}$. 则 $\overline{\mathcal{M}}$ 是 σ 代数, 且在 $\overline{\mathcal{M}}$ 上有 μ 的唯一完备延拓 $\bar{\mu}$.

证明 因为 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 都对可数并封闭, 故 $\overline{\mathcal{M}}$ 也对可数并封闭. 若 $E \cup F \in \overline{\mathcal{M}}$ (其中 $E \in \mathcal{M}, F \subset N \in \mathcal{N}$), 则可设 $E \cap N = \emptyset$ (否则把 F 和 N 换成 $F \setminus E$ 与 $N \setminus E$), 从而 $E \cup F = (E \cup N) \cap (N^c \cup F)$, 进而 $(E \cup F)^c = (E \cup N)^c \cup (N \setminus F)$. 又因为 $(E \cup N)^c \in \mathcal{M}, N \setminus F \subset N$, 故 $(E \cup F)^c \in \overline{\mathcal{M}}$, 亦即 $\overline{\mathcal{M}}$ 是 σ 代数.

现在在 $\overline{\mathcal{M}}$ 上延拓 μ . 仿照上述过程设 $E \cup F \in \overline{\mathcal{M}}$, 取 $\bar{\mu}(E \cup F) = \mu(E)$, 下面说明 $\bar{\mu}$ 良定义. 若 $E_1 \cup F_1 = E_2 \cup F_2$ (其中 $F_j \in N_j \in \mathcal{N} (j = 1, 2)$), 则 $E_1 \subset E_2 \cup N_2$, 从而 $\mu(E_1) \leq \mu(E_2) + \mu(N_2) = \mu(E_2)$, 类似可证 $\mu(E_2) \leq \mu(E_1)$, 故 $\mu(E_1) = \mu(E_2)$, 亦即 $\bar{\mu}$ 良定义. 显见 $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{M}}$ 上完备, 且容易说明 $\bar{\mu}$ 是 μ 在 $\overline{\mathcal{M}}$ 上的唯一延拓, 命题至此即证. $\square$

称定理 1.2 中提到的测度 $\bar{\mu}$ 为 μ 的完备化, 提到的 σ 代数 $\overline{\mathcal{M}}$ 称为 $\mathcal{M}$ 关于 μ 的完备化.

1.2.3 外测度与 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度

本小节是 [ZMQ] 已经介绍过的, 故在此只阐述内容, 不作证明.

定义 1.5 (外测度)

称非空集合 X 上的函数 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ 为外测度, 如果其满足

- (i) $\mu^*(\emptyset) = 0$,

- (ii) 若 $A \subset B$, 则 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$,
 (iii) $\mu^*(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j)$.



最常见的得到外测度的方法是从初等集出发: 首先约定初等集上的测度, 再用初等集通过可数并”从外侧”逼近任意集合. 下述命题是这个过程的准确表述:

命题 1.6 (外测度的构造)

设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$, $\rho: \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty]$ 满足 $\emptyset \in \mathcal{E}$, $X \in \mathcal{E}$, $\rho(\emptyset) = 0$. 对任意 $A \subset X$, 定义

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \rho(E_j) : E_j \in \mathcal{E}, A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right\}.$$

则 μ^* 是外测度.



从外测度到测度的基本步骤如下: 设 μ^* 是 X 上的一个外测度, 称 $A \subset X$ 是 μ^* 可测的, 如果

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c), \quad \forall E \subset X.$$

显见不等式 $\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$ 对任意 A 与任意 E 均成立, 故为了证明 A 是 μ^* 可测集, 只需证明反向不等式即可. 反向不等式中 $\mu^*(E) = \infty$ 的情况又是平凡的, 故 A 是 μ^* 可测集当且仅当

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c), \quad \forall E \subset X, \mu^*(E) < \infty$$

μ^* 可测性这一定义的动机在于如果 E 是一个”表现良好”的集合, 那么在 $E \supset A$ 时等式 $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$ 表明 A 的外测度 $\mu^*(A)$ 等于其”内测度” $\mu^*(E) - \mu^*(E \cap A^c)$. 从包含 A 的”表现良好”集到 X 中的任一子集这一鸿沟由下述重要定理跨越:

定理 1.3 (Carathéodory)

若 μ^* 是 X 上的外测度, 则 μ^* 可测集构成的集族 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数, 且 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是完备测度.



现在对于 $\mathbb{R}$ 来说, 我们想在其上构造一个满足区间的测度恰为其长度的测度. 更进一步, 我们来构造定义在 Borel σ 代数 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上的测度, 这样的测度称为 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

命题 1.7

设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是右连续的递增函数, $\mathcal{A}$ 是由半开半闭区间的有限不交并构成的集代数. 若 $(a_j, b_j] (j = 1, \dots, n)$ 是不交的半开半闭区间, 记

$$\mu_0 \left(\bigcup_{j=1}^n (a_j, b_j] \right) = \sum_{j=1}^n [F(b_j) - F(a_j)],$$

并令 $\mu_0(\emptyset) = 0$, 则 μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的预测度.



定理 1.4

若 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是右连续的递增函数, 则在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一 Borel 测度 μ_F 使得对任意 a, b 均有 $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$. 若 G 也是这样的函数, 则 $\mu_F = \mu_G$ 当且仅当 $F - G$ 是常数. 反之, 若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度, 其在全体有界 Borel 集上均有限, 且定义

$$F(x) = \begin{cases} \mu((0, x]), & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\mu((-x, 0]), & x < 0, \end{cases}$$

则 F 是右连续的递增函数, 且 $\mu = \mu_F$.



可以说明对任意右连续递增函数 F , 不仅仅是 Borel 测度 μ_F , 还有一个完备测度 $\bar{\mu}_F$ 的定义域也囊括了 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

事实上, $\bar{\mu}_F$ 正是 μ_F 的完备化, 且可以证明其定义域总是严格大于 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 我们同样记该测度为 μ_F , 称之为 F 诱导的 **Lebesgue-Stieltjes 测度**.

1.3 拓扑群

拓扑群的研究多用在抽象调和与分析中, 但其中的一些结论在实调和与分析中出乎意料地有用, 这里补充 [LG1] 中介绍的拓扑群.

定义 1.6 (拓扑群)

拓扑群 G 指的是关于对应法则

$$(x, y) \mapsto xy \quad (1.2)$$

成群的 Hausdorff 空间, 且映射 $(x, y) \mapsto xy$ 与 $x \mapsto x^{-1}$ 均连续. 拓扑群的 (唯一) 单位元记为 e , 其满足 $\forall x \in G (xe = ex = x)$.



对 $A, B \subset G$ 约定

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B\}, \quad A^{-1} = \{a^{-1} : a \in A\},$$

可以验证 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. 每个拓扑群在单位元 e 处都存在一个对称⁶邻域构成的开拓扑基. 称拓扑群为局部紧群, 如果存在包含单位元的开集 U 满足 $\bar{U}$ 是紧集. 通过局部紧的性质可知群内的每个点都有具紧支集的开邻域.

定义 1.7 ((左)Haar 测度)

设 G 是局部紧群, 若由 G 中 Borel 集导出的正测度 λ 满足 λ 在全体非空开集上均非负, 在全体紧集上均有限, 且满足左不变性质, 即:

$$\lambda(tA) = \lambda(A) \quad (1.3)$$

对任意可测集 $A \subset G$ 与任意 $t \in G$ 均成立, 就称 λ 是 G 上的一个 (左)Haar 测度.



若把左不变性质改为右不变性质, 即

$$\lambda(At) = \lambda(A)$$

对任意可测集 $A \subset G$ 与任意 $t \in G$ 均成立, 其余条件不变, 就可得到 G 上的右 Haar 测度定义. 可以说明 Haar 测度在正常数倍的意义下是唯一的. 若 G 是交换群, 则其上的任意左 Haar 测度都是右 Haar 测度的常数倍. 另外由可数紧集之并构成的局部紧群是在左或右 Haar 测度下的 σ 有限测度空间. 下面介绍一些局部紧群的例子.

例 1.1 (欧氏空间, 格点, n 维环) 局部紧群的最经典例子就是 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{Z}^n$ 赋通常拓扑与 n 元组的通常加法了. 另外若定义 n 维环 $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ 为

$$\mathbb{T}^n = \underbrace{[0, 1) \times \cdots \times [0, 1)^n}_{n \text{ 次}},$$

若在其上赋通常拓扑与群法则:

$$(x_1, \cdots, x_n) + (y_1, \cdots, y_n) = ((x_1 + y_1) \bmod 1, \cdots, (x_n + y_n) \bmod 1),$$

则 $\mathbb{T}^n$ 同样是局部紧群.

例 1.2 设 $G = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 赋通常乘法. 显见测度 $\lambda = \frac{dx}{|x|}$ 在乘法运算下不变:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(tx) \frac{dx}{|x|} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{dx}{|x|}, \quad \forall f \in L^1(G, \mu), \forall t \in \mathbb{R}^*,$$

于是 $\frac{dx}{|x|}$ 是 Haar 测度.

⁶亦即满足 $U = U^{-1}$ 的开集 U .

例 1.3 类似于上例, 在乘法群 $G = \mathbb{R}^+$ 中 $\frac{dx}{x}$ 也是一个 Haar 测度.

局部紧群与 Haar 测度理论在实调和分析中主要用于导出各种各样的不等式, 后面的内容中总是设出现的局部紧群可表为紧集的可数并. 在这一理论框架下可定义一般的卷积:

定义 1.8 (卷积)

若 $f, g \in L^1(G)$, 则 $f * g$ 定义为

$$(f * g)(x) = \int_G f(y)g^{y^{-1}x}d\lambda(y). \quad (1.4)$$



1.4 一些重要的不等式和插值结果

本节主要参考 [ZMQ], [HJR], [LG1], 旨在 (作为字典地) 介绍 L^p 空间理论中常见的不等式与 (相对初等的) 插值定理, 这些内容会在之后广泛用到. 下设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是测度空间.

1.4.1 Hölder 不等式

二指标 Hölder 不等式一般指下述定理:

定理 1.5 ((指标为 (p, q) 的)Hölder 不等式^{ZMQ})

若 $f \in L^p(X, \mu), g \in L^{p'}(X, \mu)$, 则

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p}\|g\|_{L^{p'}}, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$



证明 当 $p = 1$ 或 ∞ 时, 欲证式显然成立.

当 $\|f\|_{L^p} = 0$ 或 $\|g\|_{L^{p'}} = 0$, 知 $f(x)g(x) = 0$ 对 $x \in X$ 是 μ 几乎处处成立的, 欲证式进而成立.

当 $\|f\|_{L^p} > 0, \|g\|_{L^{p'}} > 0, p, p' < +\infty$, 回忆 Young 不等式

$$a^{\frac{1}{p}}b^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}, \quad a > 0, b > 0$$

代入 $a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_{L^p}^p}, b = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{L^{p'}}^{p'}}$ 得到

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^{p'}}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_{L^p}^p} + \frac{1}{p'} \cdot \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{L^{p'}}^{p'}},$$

两边积分有

$$\frac{\|fg\|_{L^1}}{\|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^{p'}}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{\|f\|_{L^p}^p}{\|f\|_{L^p}^p} + \frac{1}{p'} \cdot \frac{\|g\|_{L^{p'}}^{p'}}{\|g\|_{L^{p'}}^{p'}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1,$$

因而

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^{p'}}.$$

□

从二指标 Hölder 不等式可推知下述三指标 Hölder 不等式:

推论 1.2 ((指标为 (p, q, r) 的)Hölder 不等式^{HJR})

设 p, q, r 满足:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}, \quad (p, q, r) \in [1, \infty]^3$$

若 $f \in L^p(X, \mu), g \in L^q(X, \mu)$, 则

$$\|fg\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}.$$



证明 对于 $(p, q, r) = (1, \infty, 1), (\infty, q, q), (p, q, 1), (\infty, \infty, \infty)$ 的情况, 利用 L^∞ 范数的定义或指标为 (p, q) 的 Hölder 不等式可证. 下面设 $(p, q, r) \in (1, \infty)^3$, 根据 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ 知 $\frac{1}{r} > \max\{\frac{1}{p}, \frac{1}{q}\}$, 于是 $1 < r < \min\{p, q\}$, 得到 $\min\{\frac{p}{r}, \frac{q}{r}\} > 1$, 这便有

$$1 = \frac{r}{p} + \frac{r}{q} = \frac{1}{\frac{p}{r}} + \frac{1}{\frac{q}{r}}.$$

故

$$\begin{aligned} \|fg\|_{L^r}^r &= \int_X |f(x)|^r \cdot |g(x)|^r d\mu = \left(\int_X |f(x)|^{r \cdot \frac{p}{r}} d\mu \right)^{\frac{r}{p}} \left(\int_X |f(x)|^{r \cdot \frac{q}{r}} d\mu \right)^{\frac{r}{q}} \\ &= \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{r}{p}} \left(\int_X |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{r}{q}}, \end{aligned}$$

两边取 $\frac{1}{r}$ 次幂为

$$\|fg\|_{L^r} \leq \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_X |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

□

更一般地, 有下述多指标 Hölder 不等式成立:

推论 1.3 ((指标为 $(p_1, p_2, \dots, p_k, p)$ 的)Hölder 不等式^{LG1})

设 $p_1, p_2, \dots, p_k, p$ 满足:

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k}, \quad (p_1, p_2, \dots, p_k, p) \in [1, \infty]^{k+1}$$

若 $f_i \in L^i(X, \mu) (i = 1, 2, \dots, k)$, 则

$$\|f_1 \cdots f_n\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \|f_2\|_{L^{p_2}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

♡

证明 用归纳法, 当 $k = 2$ 时, 已知 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}$, 欲证即推论 1.2. 设 k 时命题成立, 对 $k + 1$, 在 $p, p_1, \dots, p_{k+1}$ 中任意一者为 ∞ 时, 命题都是显见的, 故可设 $(p, p_1, \dots, p_{k+1}) \in (1, \infty)^{k+2}$, 进而

$$\frac{p}{p_1} + \dots + \frac{p}{p_k} + \frac{p}{p_{k+1}} = 1, \quad \left(\frac{p}{p_1}, \dots, \frac{p}{p_k}, \frac{p}{p_{k+1}} \right) \in (0, 1)^{k+2}.$$

不妨设

$$\frac{1}{P_k} = \frac{p}{p_1} + \dots + \frac{p}{p_k}, \quad P_k > 1,$$

知

$$\frac{1}{P_k} + \frac{p}{p_{k+1}} = 1 \Rightarrow P_k = \left(\frac{p_{k+1}}{p} \right)',$$

进而:

$$\begin{aligned} \left(\int_X |f_1(x) \cdots f_{k+1}(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} &= \left(\int_X |f_1(x) \cdots f_k(x)|^p \cdot |f_{k+1}(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\left(\int_X |f_1(x) \cdots f_k(x)|^{p \cdot P_k} d\mu \right)^{\frac{1}{P_k}} \cdot \left(\int_X |f_{k+1}(x)|^{p \cdot \frac{p_{k+1}}{p}} d\mu \right)^{\frac{p}{p_{k+1}}} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\int_X |f_1(x) \cdots f_k(x)|^{p \cdot P_k} d\mu \right)^{\frac{1}{p \cdot P_k}} \cdot \|f_{k+1}\|_{L^{p_{k+1}}}. \end{aligned}$$

注意

$$\frac{1}{p \cdot P_k} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k},$$

记 $P = p \cdot P_k$, 则对 $P, p_1, \dots, p_k$ 用归纳假设的 Hölder 不等式有:

$$\|f_1 \cdots f_k\|_{L^P} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}},$$

亦即

$$\left(\int_X |f_1(x) \cdots f_k(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_X |f_1(x) \cdots f_k(x)|^{p \cdot P_k} d\mu \right)^{\frac{1}{p \cdot P_k}} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

从而

$$\left(\int_X |f_1(x) \cdots f_{k+1}(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}} \cdot \|f_{k+1}\|_{L^{p_{k+1}}}.$$

故 $k+1$ 情况成立, 命题即证. □

特别注意对于指标为 (p, p') 的 Hölder 不等式, 可以证明它在一些情况下是最优的, 此即下述定理:

定理 1.6 (指标为 (p, p') 的 Hölder 不等式的最优性^{HJR})

设 $p \in [1, \infty]$, 实值函数 f 在 (X, μ) 上可测, 若

$$\sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X |f(x)g(x)| d\mu < \infty,$$

则 $f \in L^p(X, \mu)$, 且

$$\|f\|_{L^p} = \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x) d\mu.$$

证明 注意若 $f \in L^p(X, \mu)$, 则根据指标为 (p, p') 的 Hölder 不等式 1.5:

$$\int_X f(x)g(x) d\mu \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}} \Rightarrow \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x) d\mu \leq \|f\|_{L^p},$$

故只需证明

$$\|f\|_{L^p} \leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x) d\mu.$$

首先考虑 $p = \infty$ 的情况, 设 $\lambda > 0$ 满足 $\mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) > 0$, 记

$$E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\},$$

考虑 $L^1(X, \mu)$ 中的非负紧支函数 g_0 , 其支集为 E_λ , 且 $\|g_0\|_{L^1} = 1$, 定义

$$g(x) = \frac{f(x)}{|f(x)|} g_0(x),$$

则根据 g_0 的紧支性显见 g 紧支, 从而 $g \in L^1(X, \mu)$, 进一步 fg 是紧支的, 且 $fg \in L^1(X, \mu)$, 有

$$\int_X f(x)g(x) d\mu = \int_X \frac{f^2(x)}{|f(x)|} g_0(x) d\mu = \int_{E_\lambda} \frac{|f(x)|^2}{|f(x)|} g_0(x) d\mu = \int_{E_\lambda} |f(x)| g_0(x) d\mu \geq \lambda \int_{E_\lambda} g_0(x) d\mu = \lambda.$$

这便说明对任意满足 $\mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) > 0$ 的 $\lambda > 0$, 总有

$$\lambda \leq \int_X f(x)g(x) d\mu.$$

取这些 λ 的上确界 $\|f\|_{L^\infty}$, 得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq \int_X f(x)g(x) d\mu.$$

此时命题即证.

现在对于一般的 $p \in (1, \infty)$, 考虑 X 中的有限测度不降列 $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 满足 $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k = X$, 取

$$f_k(x) = \chi_{E_k \cap \{x \in X : |f(x)| \leq k\}} \cdot f(x),$$

显见对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, f_k 的支集都是有限测度的, 因而 $\forall k \in \mathbb{N} \forall p \in (1, \infty) (f_k \in L^p(X, \mu))$, 进而设

$$g_k(x) = \frac{f_k(x) \cdot |f_k(x)|^{p-1}}{|f_k(x)| \cdot \|f_k\|_{L^p}^{\frac{p}{p'}}},$$

得

$$\|g_k\|_{L^{p'}}^{p'} = \frac{1}{\|f_k\|_{L^p}^p} \int_X |f_k(x)|^{(p-1)p'} d\mu = \frac{1}{\|f_k\|_{L^p}^p} \int_X |f_k(x)|^p d\mu = 1.$$

由 f_k, g_k 的构造知

$$\begin{aligned}\int_X f_k(x)g_k(x)d\mu &= \int_X \frac{f_k^2(x)|f_k(x)|^{p-1}}{|f_k(x)| \cdot \|f_k\|_{L^p}^{\frac{p}{p'}}} d\mu = \int_X \frac{|f_k(x)|^2|f_k(x)|^{p-1}}{|f_k(x)| \cdot \|f_k\|_{L^p}^{\frac{p}{p'}}} d\mu \\ &= \left(\int_X |f_k(x)|^p d\mu \right) \|f_k\|_{L^p}^{-\frac{p}{p'}} = \|f_k\|_{L^p}^p \|f_k\|_{L^p}^{-\frac{p}{p'}} = \|f_k\|_{L^p},\end{aligned}$$

故有

$$\|f_k\|_{L^p} \leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f_k(x)g(x)d\mu.$$

因为

$$\sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X |f(x)g(x)|d\mu < \infty,$$

故由 Lebesgue 控制收敛定理, 在式子两边令 $k \rightarrow \infty$ 得到

$$\|f\|_{L^p} \leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x)d\mu.$$

最后, 对于 $p = 1$ 的情况, 考虑由下式定义的函数列 $\{g_k\}_{k \in \mathbb{N}}$:

$$g_k(x) = \chi_{\{x \in X: f_k(x) \neq 0\}}(x) \cdot \frac{f_k(x)}{|f_k(x)|}.$$

显见 $\|g_k\|_{L^\infty} = 1$, 且

$$\begin{aligned}\int_X f(x)g_k(x)d\mu &= \int_X f(x) \cdot \chi_{\{x \in X: f_k(x) \neq 0\}}(x) \cdot \frac{f_k(x)}{|f_k(x)|} d\mu \\ &= \int_X f_k(x) \cdot \frac{f_k(x)}{|f_k(x)|} d\mu = \int_X \frac{|f_k(x)|^2}{|f_k(x)|} d\mu = \int_X |f_k(x)| d\mu.\end{aligned}$$

又因为

$$\sup_{\|g\|_{L^\infty} \leq 1} \int_X |f(x)g(x)|d\mu < \infty,$$

故由 Lebesgue 控制收敛定理, 在式子两边令 $k \rightarrow \infty$ 得到

$$\int_X |f(x)|d\mu = \|f\|_{L^1} \leq \sup_{\|g\|_{L^\infty} \leq 1} \int_X f(x)g(x)d\mu.$$

命题即证. □

注 Hölder 不等式的最优性 1.6 同时可以从共轭空间算子范数的角度去理解, 具体参见泛函分析的相关内容.

1.4.2 Minkowski 不等式

Minkowski 不等式有两个形式, 但它们的本质是统一的.

定理 1.7 ((加和形式的)Minkowski 不等式^{ZMQ})

若 $f, g \in L^p(X, \mu) (1 \leq p \leq \infty)$, 则

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

证明 当 $p = 1$ 时, 欲证式即三角不等式. 当 $p = \infty$ 时, 根据本性上确界的定义有

$$|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}, |g(x)| \leq \|g\|_{L^\infty}, \mu\text{-a.e. } x \in X,$$

故

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_{L^\infty} + \|g\|_{L^\infty}, \mu\text{-a.e. } x \in X,$$

从而 $\|f + g\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\infty} + \|g\|_{L^\infty}$, 欲证式成立.

当 $1 < p < +\infty$, 有

$$\begin{aligned}
 \int_X |f(x) + g(x)|^p d\mu &\leq \int_X |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x) + g(x)| d\mu \\
 &\leq \int_X |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| d\mu + \int_X |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |g(x)| d\mu \\
 &\leq \left(\int_X |f(x) + g(x)|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} d\mu \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\quad + \left(\int_X |f(x) + g(x)|^{(p-1) \cdot \frac{p}{p-1}} d\mu \right)^{\frac{p-1}{p}} \cdot \left(\int_X |g(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &= \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p} + \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p}.
 \end{aligned}$$

当 $\|f + g\|_{L^p} \neq 0$ 时, 这便是

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \Rightarrow \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

而当 $\|f + g\|_{L^p} = 0$, 原式显然成立. $\square$

定理 1.8 ((积分形式的)Minkowski 不等式^{HJR})

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, f 是 $(X, \mu) \times (Y, \nu)$ 上的非负可测函数. 则对任意的 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 有

$$\| \|f(x, y)\|_{L^p(Y, \nu(y))} \|_{L^q(X, \mu(x))} \leq \| \|f(x, y)\|_{L^q(X, \mu(x))} \|_{L^p(Y, \nu(y))}.$$

证明 当 $q = \infty$ 时, 欲证式显然成立, 下设 q 有限. 设 $r = (\frac{q}{p})'$, 有:

$$\begin{aligned}
 \| \|f(x, y)\|_{L^p(Y, \nu(y))} \|_{L^q(X, \mu(x))} &= \left(\int_X \left(\int_Y f^p(x, y) d\nu(y) \right)^{\frac{q}{p}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int_X \left(\int_Y f^p(x, y) d\nu(y) \right)^{\frac{q}{p}} d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q} \cdot \frac{1}{p}} \\
 &\leq \left\| \int_Y f^p(x, y) d\nu(y) \right\|_{L^{\frac{q}{p}}(X, \mu(x))}^{\frac{1}{p}} = \left\| \int_Y f^p(x, y) d\nu(y) \right\|_{L^{r'}(X, \mu(x))}^{\frac{1}{p}} \\
 &\stackrel{(i)}{=} \left(\sup_{\|g\|_{L^r(X, \mu(x))} \leq 1} \int_X \left(\int_Y f^p(x, y) d\nu(y) \right) g(x) d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\stackrel{(ii)}{=} \left(\sup_{\|g\|_{L^r(X, \mu(x))} \leq 1} \int_{X \times Y} f^p(x, y) g(x) d\nu(y) d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\stackrel{(iii)}{=} \left(\sup_{\substack{\|g\|_{L^r(X, \mu(x))} = 1 \\ g \geq 0}} \int_{X \times Y} f^p(x, y) g(x) d\nu(y) d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\stackrel{(iv)}{\leq} \left(\int_Y \left(\sup_{\substack{\|g\|_{L^r(X, \mu(x))} = 1 \\ g \geq 0}} \int_X f^p(x, y) g(x) d\mu(x) \right) d\nu(y) \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\stackrel{(v)}{\leq} \left(\int_Y \left(\sup_{\substack{\|g\|_{L^r(X, \mu(x))} = 1 \\ g \geq 0}} \|f^p(x, y)\|_{L^{\frac{q}{p}}(X, \mu(x))} \cdot \|g\|_{L^{(\frac{q}{p})'}(X, \mu(x))} \right) d\nu(y) \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\stackrel{(vi)}{=} \left(\int_Y \|f^p(x, y)\|_{L^{\frac{q}{p}}(X, \mu(x))} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &= \left(\int_Y \left(\int_X |f(x, y)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{p}} = \| \|f(x, y)\|_{L^q(X, \mu(x))} \|_{L^p(Y, \nu(y))},
 \end{aligned}$$

其中 (i) 是 Hölder 不等式的最优性 1.6, (ii) 是 Fubini 定理 (定理条件需要 X, Y 的 σ 有限性), (iii) 参见 [ZGQ] 第二章习题 2.1.2, (iv) 是放大不等式 (积分后取上确界小于等于取上确界后积分), (v) 是 Hölder 不等式 1.5, (vi) 是代入了 $r = (\frac{q}{p})'$ 与上确界中 $\|g\|_{L^r} = \|g\|_{L^{(\frac{q}{p})'}} = 1$ 的条件. $\square$

1.4.3 Young 不等式

在估计卷积时, Young 不等式是非常强大的工具.

定理 1.9 (Young 不等式^{LG1})

设 $(p, q, r) \in [1, \infty]^3$ 满足

$$1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}, \quad (1.5)$$

并设 $f \in L^p(X, \mu), g \in L^q(X, \mu)$, 则 $f * g \in L^r(X, \mu)$, 且

$$\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

证明 当 $r = \infty$, 知

$$\|f * g\|_{L^1} = \int_X |f(y)g(x-y)| d\mu(y) \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}} = \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

下面考虑 $r < \infty$, 知

$$\begin{aligned} |f * g|(x) &\leq \int_X |f(y)g(x-y)| d\mu(y) \\ &= \int_X |f(y)|^{\frac{r}{r+1}} |g(x-y)|^{\frac{1}{r+1}} |f(y)|^{\frac{1}{r+1}} |g(x-y)|^{\frac{r}{r+1}} d\mu(y). \end{aligned}$$

注意(1.5)式可写成 $\frac{r}{r+1}(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}) = 1$, 故对上式应用 Hölder 不等式有:

$$\begin{aligned} |f * g|(x) &\leq \left(\int_X (|f(y)|^{\frac{r}{r+1}} |g(x-y)|^{\frac{1}{r+1}})^{\frac{(r+1)p}{r}} d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)p}} \cdot \left(\int_X (|f(y)|^{\frac{1}{r+1}} |g(x-y)|^{\frac{r}{r+1}})^{\frac{(r+1)q}{r}} d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)q}} \\ &= \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^{\frac{p}{r}} dy \right)^{\frac{r}{(r+1)p}} \cdot \left(\int_X |f(y)|^{\frac{q}{r}} |g(x-y)|^q dy \right)^{\frac{r}{(r+1)q}}. \end{aligned}$$

对左边的因子再应用 Hölder 不等式有

$$\begin{aligned} &\left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^{\frac{p}{r}} d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)p}} \\ &= \left(\int_X |f(y)|^{p(1-\frac{p}{rq})} \cdot |f(y)|^{p \cdot \frac{p}{rq}} |g(x-y)|^{\frac{p}{r}} d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)p}} \\ &\leq \left(\int_X |f(y)|^{p(1-\frac{p}{rq}) \cdot \frac{1}{1-\frac{p}{rq}}} d\mu(y) \right)^{(1-\frac{p}{rq}) \cdot \frac{r}{(r+1)p}} \cdot \left(\int_X |f(y)|^{p \cdot \frac{p}{rq} \cdot \frac{rq}{p}} |g(x-y)|^{\frac{p}{r} \cdot \frac{rq}{p}} d\mu(y) \right)^{\frac{p}{rq} \cdot \frac{r}{(r+1)p}} \\ &= \left(\int_X |f(y)|^p d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)p} - \frac{1}{q(r+1)}} \cdot \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{1}{q(r+1)}} \\ &\leq \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{1}{q(r+1)}} \cdot \|f\|_{L^p}^{\frac{r}{r+1}(1-\frac{p}{qr})}. \end{aligned}$$

同样对右边的因子应用 Hölder 不等式有

$$\begin{aligned} &\left(\int_X |f(y)|^{\frac{q}{r}} |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)q}} \\ &= \left(\int_X |f(y)|^{\frac{q}{r}} |g(x-y)|^{q \cdot \frac{q}{rp}} \cdot |g(x-y)|^{q(1-\frac{q}{rp})} d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)q}} \\ &\leq \left(\int_X |f(y)|^{\frac{q}{r} \cdot \frac{rp}{q}} |g(x-y)|^{q \cdot \frac{q}{rp} \cdot \frac{rp}{q}} d\mu(y) \right)^{\frac{q}{rp} \cdot \frac{r}{(r+1)q}} \cdot \left(\int_X |g(x-y)|^{q(1-\frac{q}{rp}) \cdot \frac{1}{1-\frac{q}{rp}}} d\mu(y) \right)^{(1-\frac{q}{rp}) \cdot \frac{r}{(r+1)q}} \\ &= \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{1}{p(r+1)}} \cdot \left(\int_X |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{r}{(r+1)q} - \frac{1}{p(r+1)}} \\ &\leq \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{1}{p(r+1)}} \cdot \|g\|_{L^q}^{\frac{r}{r+1}(1-\frac{q}{pr})}. \end{aligned}$$

代回得到

$$|f * g|(x) \leq \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{1}{r+1}(\frac{1}{p} + \frac{1}{q})} \cdot \|f\|_{L^p}^{\frac{r}{r+1}(1-\frac{p}{qr})} \cdot \|g\|_{L^q}^{\frac{r}{r+1}(1-\frac{q}{pr})},$$

两边同取 r 次幂:

$$(|f| * |g|)^r(x) \leq \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right)^{\frac{r}{r+1} \cdot \frac{r+1}{r}} \cdot \|f\|_{L^p}^{\frac{r}{r+1}(r-\frac{p}{q})} \cdot \|g\|_{L^q}^{\frac{r}{r+1}(r-\frac{q}{p})}. \quad (1.6)$$

注意

$$\begin{aligned} \frac{r}{r+1} \left(r - \frac{p}{q} \right) &= \frac{pq}{p+q} \left(r - \frac{p}{q} \right) = \frac{pq}{p+q} \left(\frac{pq}{p+q-pq} - \frac{p}{q} \right) = \frac{pq}{p+q} \frac{p(q-1)(p+q)}{q(p+q-pq)} \\ &= p \cdot \frac{1-\frac{1}{q}}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1} = p \cdot \frac{\frac{1}{p} - \frac{1}{r}}{\frac{1}{r}} = r - p, \end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{r}{r+1} \left(r - \frac{q}{p} \right) = r - q,$$

故(1.6)式即

$$(|f| * |g|)^r(x) \leq \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right) \cdot \|f\|_{L^p}^{r-p} \cdot \|g\|_{L^q}^{r-q}.$$

两边对 x 积分有:

$$\begin{aligned} \int_X (|f| * |g|)^r(x) d\mu(x) &\leq \int_X \left(\int_X |f(y)|^p |g(x-y)|^q d\mu(y) \right) d\mu(x) \cdot \|f\|_{L^p}^{r-p} \cdot \|g\|_{L^q}^{r-q} \\ &\stackrel{(i)}{=} \int_X |f(y)|^p \left(\int_X |g(x-y)|^q d\mu(x) \right) d\mu(y) \cdot \|f\|_{L^p}^{r-p} \cdot \|g\|_{L^q}^{r-q} \\ &= \|f\|_{L^p}^p \|g\|_{L^q}^q \|f\|_{L^p}^{r-p} \|g\|_{L^q}^{r-q} = \|f\|_{L^p}^r \|g\|_{L^q}^r. \end{aligned}$$

最后两边同取 $\frac{1}{r}$ 次幂即得:

$$\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}.$$

$r < \infty$ 的情况得证. □

特别令 $r = p, q = 1$ 可得卷积的 Minkowski 不等式, [LG1] 中给出了下述在局部紧群中的结果:

定理 1.10 (局部紧群上关于卷积的 Minkowski 不等式)

若 G 是局部紧群, λ 是其上的左不变 Haar 测度, $1 \leq p \leq \infty, f \in L^p(G), g \in L^1(G)$, 则 $g * f$ 是 λ 几乎处处存在的, 且

$$\|g * f\|_{L^p(G, \lambda)} \leq \|g\|_{L^1(G, \lambda)} \|f\|_{L^p(G, \lambda)}. \quad (1.7) \quad \heartsuit$$

1.4.4 (相对初等的) 嵌入与插值

[ZMQ] 中曾介绍过一些初等的嵌入和插值结果, 它们无需引入泛函分析即可得证, 本节对这些结果作介绍.

定理 1.11 (一般集合上 $[p, \infty]$ 的插值)

设 $0 < p \leq q \leq \infty$, 若 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $f \in L^q(\mathbb{R}^n)$. ♥

证明 当 $q = p$ 或 $q = \infty$, 命题显然成立, 现设 $q \in (p, \infty)$, 知

$$\int_X |f(x)|^q dx = \int_X |f(x)|^p \cdot |f(x)|^{q-p} dx \leq \|f\|_{L^\infty} \int_X |f(x)|^p dx.$$

两边同时取 $\frac{1}{q}$ 次幂有

$$\|f\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^\infty}^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^p}^{\frac{p}{q}} < \infty.$$

命题即证. □

定理 1.12 (有限测度集上指标为 (p, q) 的嵌入)

若 $E \subset \mathbb{R}^n, m(E) < \infty, 0 < p < q \leq \infty$, 则 $L^q(E) \subset L^p(E)$, 且

$$\|f\|_{L^q} \leq m(E)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_{L^p}.$$

证明 当 $q = \infty$ 时命题显然成立, 下设 $q < \infty$, 取 $r = \frac{q}{p}$, 则 $r > 1$, 有:

$$\int_E |f(x)|^p dx = \int_E |f(x)|^p \cdot 1 dx \leq \left(\int_E |f(x)|^{p \cdot r} dx \right)^{\frac{1}{r}} \left(\int_E 1^{r'} dx \right)^{\frac{1}{r'}} = (m(E))^{\frac{1}{r'}} \left(\int_E |f(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{r}}.$$

两边同时取 $\frac{1}{p}$ 次幂有

$$\|f\|_{L^p} = m(E)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \left(\int_E |f(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = m(E)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_{L^q}.$$

命题即证. □

注 上述结果即 $L^q(E) \hookrightarrow L^p(E)$, 亦即 $L^q(E)$ 可以连续嵌入 $L^p(E)$.

定理 1.13 (L^p 范数的对数凸性^{ZMQ})

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^q(\mathbb{R}^n)$, 且令 $0 < p < q \leq \infty$, 则对任意 $\lambda \in (0, 1)$, 设

$$\frac{1}{r} = \frac{\lambda}{p} + \frac{1-\lambda}{q},$$

则有 $p < r < q$, 且

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\lambda \|f\|_{L^q}^{1-\lambda}.$$

证明 $p < r < q$ 容易说明, 知

$$1 = \frac{\lambda r}{p} + \frac{(1-\lambda)r}{q}.$$

当 $p < q < \infty$ 时, 有:

$$\begin{aligned} \int_X |f(x)|^r dx &= \int_X |f(x)|^{\lambda r} |f(x)|^{(1-\lambda)r} dx \\ &\leq \left(\int_X |f(x)|^{\lambda r \cdot \frac{p}{\lambda r}} dx \right)^{\frac{\lambda r}{p}} \left(\int_X |f(x)|^{(1-\lambda)r \cdot \frac{q}{(1-\lambda)r}} dx \right)^{\frac{(1-\lambda)r}{q}} \\ &= \|f\|_{L^p}^{\lambda r} \|f\|_{L^q}^{(1-\lambda)r}. \end{aligned}$$

当 $p < q = \infty$ 时, 知 $r = \frac{p}{\lambda}$, 于是:

$$\int_X |f(x)|^r dx = \int_X |f(x)|^{r-p} |f(x)|^p dx \leq \|f\|_{L^\infty}^{r-p} \int_X |f(x)|^p dx = \|f\|_{L^\infty}^{r(1-\lambda)} \|f\|_{L^p}^{r\lambda}.$$

命题即证. □

注 在上述命题中, 若令 $\lambda \rightarrow 1$ 或 $\lambda \rightarrow 0$, 可得 $p < r < q \leq \infty$ 时有

$$\|f\|_{L^r} \leq \max\{\|f\|_{L^p}, \|f\|_{L^q}\}.$$

这说明 $L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^q(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^r(\mathbb{R}^n)$.

定理 1.14 (加和空间的插值^{ZMQ})

设 $0 < p < r < q < \infty, f \in L^r(\mathbb{R}^n)$, 则对任意的 $t > 0$, 存在分解 $f(x) = g(x) + h(x)$, 其满足

$$\|g\|_{L^p}^p \leq t^{p-r} \|f\|_{L^r}^r,$$

$$\|h\|_{L^q}^q \leq t^{q-r} \|f\|_{L^r}^r.$$

证明 对 $t > 0$, 作函数

$$g(x) = \begin{cases} 0, & |f(x)| \leq t, \\ f(x), & |f(x)| > t, \end{cases}, \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

有

$$\|g\|_{L^p}^p = \int_X |g(x)|^p dx = \int_X |g(x)|^{p-r} |g(x)|^r dx \stackrel{(i)}{\leq} t^{p-r} \int_X |g(x)|^r dx \leq t^{p-r} \int_X |f(x)|^r dx = t^{p-r} \|f\|_{L^r}^r,$$

其中 (i) 是因为根据 g 的构造知在 $\text{supp } g$ 中总有 $|g(x)| \geq t$, 而 $p-r < 0$, 于是 $|g(x)|^{p-r} \leq t^{p-r}$.

对另一式, 根据 h 的构造知在 $\text{supp } h$ 中总有 $|h(x)| \leq t$, 于是

$$\|h\|_{L^q}^q = \int_X |h(x)|^q dx = \int_X |h(x)|^{q-r} |h(x)|^r dx \leq t^{q-r} \int_X |h(x)|^r dx \leq t^{q-r} \int_X |f(x)|^r dx = t^{q-r} \|f\|_{L^r}^r.$$

命题即证. □

注 在上述结果中, 若取 $t = 1$, 并定义 $L^p(\mathbb{R}^n) + L^q(\mathbb{R}^n)$ 的范数为 $\|g+h\|_{L^p+L^q} = \|g\|_{L^p} + \|h\|_{L^q}$ ($g \in L^p(\mathbb{R}^n), h \in L^q(\mathbb{R}^n)$), 则有

$$L^r(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^n) + L^q(\mathbb{R}^n).$$

1.5 拟赋范 Lebesgue 空间

在 [ZMQ], [ZGQ] 或 PDE 的研究中, 对 Lebesgue 空间 L^p 的研究大多集中在 $1 \leq p \leq \infty$ 的情形. [LG1] 中介绍了 $0 < p < 1$ 这一空缺的情况, 这类 Lebesgue 空间中诸多寻常的结论会略微发生改变, 本小节旨在简要介绍该空间. 设 X 是测度空间, μ 是其上的测度.

类似于 $1 \leq p < \infty$ 的情形, 在 $0 < p < 1$ 时同样记

$$\|f\|_{L^p(X, \mu)} = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}},$$

但此时 $\|\cdot\|_{L^p(X, \mu)}$ 不再是范数, 事实上有下述命题:

定理 1.15 (反向 Hölder 不等式)

若 $0 < p < 1$, 则对任意 $f \in L^p(X, \mu), g \in L^{p'}(X, \mu)$ 有

$$\int_X |f(x)g(x)| dx \geq \|f\|_{L^p(X, \mu)} \|g\|_{L^{p'}(X, \mu)}.$$



证明 不妨设 $fg \in L^1(X, \mu)$, 记 $\bar{p} = \frac{1}{p} > 1$, 则

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(X, \mu)} &= \left(\int_X |f(x)g(x)|^{\bar{p}} \cdot |g(x)|^{-\bar{p}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{\bar{p}}} \\ &\leq \left(\int_E |f(x)g(x)|^{\bar{p}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{\bar{p}} \cdot \frac{1}{\bar{p}}} \left(\int_X |g(x)|^{-\bar{p}\bar{p}'} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{\bar{p}} \cdot \frac{1}{\bar{p}'}} \\ &= \frac{1}{\|g\|_{L^{p'}(X, \mu)}} \int_X |f(x)g(x)| d\mu(x). \end{aligned}$$

此即欲证. □

定理 1.16 (反向 Minkowski 不等式)

若 $0 < p < 1$, 则对任意 $f, g \in L^p(X, \mu)$ 有

$$\|f+g\|_{L^p(X, \mu)} \geq \|f\|_{L^p(X, \mu)} + \|g\|_{L^p(X, \mu)}.$$



证明 不妨设 $\|f\| + \|g\|_{L^p(X, \mu)} > 0$, 由反向 Hölder 不等式 1.15 知

$$\begin{aligned}\|f\| + \|g\|_{L^p(X, \mu)}^p &= \int_X (|f(x)| + |g(x)|)^{p-1} (|f(x)| + |g(x)|) d\mu(x) \\ &\geq \left(\int_X (|f(x)| + |g(x)|)^{p'(p-1)} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p'}} (\|f\|_{L^p(X, \mu)} + \|g\|_{L^p(X, \mu)}) \\ &= \|f\| + \|g\|_{L^p(X, \mu)}^{\frac{p}{p'}} (\|f\|_{L^p(X, \mu)} + \|g\|_{L^p(X, \mu)}).\end{aligned}$$

此即欲证. □

归纳即得下述一般定理:

定理 1.17 (反向 Minkowski 不等式)

若 $0 < p < 1$, 则对任意 $f_1, \dots, f_n \in L^p(X, \mu)$ 与 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{j=1}^N \|f_j\|_{L^p(X, \mu)} \leq \left\| \sum_{j=1}^N f_j \right\|_{L^p(X, \mu)}.$$

不过在 $0 < p < 1$ 时, $\|\cdot\|_{L^p(X, \mu)}$ 将成为拟范数, 这由下述命题展现:

命题 1.8 ($\|\cdot\|_{L^p(X, \mu)} (0 < p < 1)$ 是拟范数)

若 $0 < p < 1$, 则对任意 $f_1, \dots, f_n \in L^p(X, \mu)$ 与 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$\left\| \sum_{j=1}^N f_j \right\|_{L^p(X, \mu)} \leq N^{\frac{1-p}{p}} \sum_{j=1}^N \|f_j\|_{L^p(X, \mu)}.$$

证明 首先证明对 $\{a_j\}_{j=1}^N \subset \mathbb{R} (N \in \mathbb{N})$ 有

$$\left(\sum_{j=1}^N |a_j| \right)^\theta \leq \sum_{j=1}^N |a_j|^\theta, \quad \forall 0 \leq \theta \leq 1. \quad (1.8)$$

这是因为当 $a_j = 0 (j = 1, \dots, N)$ 时命题显见, 当 $\{a_j\}_{1 \leq j \leq N}$ 中至少有一项非零时设 $\{a_j\}_{1 \leq j \leq N} \in l^1(\mathbb{R}) \cap l^\theta(\mathbb{R})$, 则只需证明 $\|\{a_j\}_{1 \leq j \leq N}\|_{l^1(\mathbb{R})} = 1$ 的情况即可. 此时往证

$$\sum_{j=1}^N |a_j|^\theta \geq 1,$$

但因为 $\|\{a_j\}_{1 \leq j \leq N}\|_{l^1(\mathbb{R})} = 1 \Rightarrow \forall 1 \leq j \leq N (|a_j| \leq 1)$, 故 $\forall 1 \leq j \leq N (|a_j| \leq |a_j|^\theta)$, 因而

$$\sum_{j=1}^B |a_j|^\theta \geq \sum_{j=1}^N |a_j| = 1.$$

欲证成立. 另根据 Jensen 不等式知

$$\left(\sum_{j=1}^N a_j \right)^\theta \leq N^{\theta-1} \sum_{j=1}^N a_j^\theta, \quad \forall 1 \leq \theta < \infty. \quad (1.9)$$

现令 $\theta = \frac{1}{p}, a_j = \|f_j\|_{L^p(X, \mu)}^p$ 知

$$\left(\sum_{j=1}^N \int_X |f_j(x)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \leq N^{\frac{1-p}{p}} \sum_{j=1}^N \|f_j\|_{L^p(X, \mu)}.$$

再由 (1.8) 式知

$$\left(\sum_{j=1}^N |f_j(x)| \right)^p \leq \sum_{j=1}^N |f_j(x)|^p.$$

于是

$$\left(\int_X \left(\sum_{j=1}^N |f_j(x)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{j=1}^N \int_X |f_j(x)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \leq N^{\frac{1-p}{p}} \sum_{j=1}^N \|f_j\|_{L^p(X, \mu)}.$$

此即欲证. $\square$

上述命题表明 $L^p(X, \mu)$ 在 $0 < p < 1$ 时是拟赋范线性空间. 下面说明关于 Lebesgue 空间完备性的一般结论:

定理 1.18

$L^p(X, \mu) (0 < p < \infty)$ 是拟赋范 Banach 空间.

证明 当 $p > 1$ 时, 设 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p(X, \mu)$ 是基本列, 根据定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall m, n > N (\|f_n - f_m\|_{L^p(X, \mu)} < \varepsilon),$$

故可选取 n_1 使得 $n > n_1$ 时 $\|f_{n_1} - f_n\|_{L^p(X, \mu)} < \frac{\varepsilon}{2}$, 进一步可选取 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的子列 $\{f_{n_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$ 使得对任意 $m \geq 0$ 都有 $\|f_{n_j} - f_{n_{j+m}}\|_{L^p(X, \mu)} < \frac{\varepsilon}{2^j}$. 取 $f = f_{n_1} + \sum_{j=1}^{\infty} (f_{n_{j+1}} - f_{n_j})$, 往证 $f \in L^p(X, \mu)$, 这便只需证明 $\sum_{j=1}^{\infty} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}| \in L^p(X, \mu)$. 根据 Fatou 引理知:

$$\int_X \left(\sum_{j=1}^{\infty} |f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)| \right)^p d\mu(x) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X \left(\sum_{j=1}^k |f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)| \right)^p d\mu(x).$$

于是

$$\begin{aligned} \left(\int_X \left(\sum_{j=1}^{\infty} |f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)| \right)^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_X \left(\sum_{j=1}^k |f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)| \right)^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\stackrel{(i)}{\leq} \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \|f_{n_{j+1}} - f_{n_j}\|_{L^p(X, \mu)} < \varepsilon, \end{aligned}$$

其中 (i) 基于积分形式的 Minkowski 不等式 1.8, 因而

$$\|f - f_{n_k}\|_{L^p(X, \mu)} = \left\| \sum_{j=k}^{\infty} (f_{n_{j+1}} - f_{n_j}) \right\|_{L^p(X, \mu)} < \frac{\varepsilon}{2^{k-1}},$$

这说明 $f_{n_j} \rightarrow f (L^p(X, \mu))$, 根据基本列的性质即知 $f_n \rightarrow f (L^p(X, \mu))$.

当 $0 < p < 1$ 时, 同样设 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p(X, \mu)$ 是基本列, 根据定义知可选取子列 $\{f_{n_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\|f_{n_j} - f_{n_{j+m}}\|_{L^p(X, \mu)} < \left(\frac{\varepsilon}{2^j} \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall m \geq 0.$$

由 Fatou 引理与 (1.8) 式知

$$\begin{aligned} \int_X \left(\sum_{j=1}^{\infty} |f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)| \right)^p d\mu(x) &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X \left(\sum_{j=1}^k |f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x)| \right)^p d\mu(x) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \|f_{n_{j+1}} - f_{n_j}\|_{L^p(X, \mu)}^p < \varepsilon. \end{aligned}$$

于是

$$\|f - f_{n_k}\|_{L^p}^p = \left\| \sum_{j=k}^{\infty} (f_{n_{j+1}} - f_{n_j}) \right\|_{L^p(X, \mu)}^p < \frac{\varepsilon}{2^{k-1}}.$$

这说明 $f_{n_j} \rightarrow f (L^p(X, \mu))$, 同样由基本列的性质即知 $f_n \rightarrow f (L^p(X, \mu))$. $\square$

第二章 Fourier 级数与积分

2.1 Fourier 系数与级数

设 f 为定义在直线 $\mathbb{R}$ 或其区间上的函数, J. Fourier 于 1807 年为用分离变量的方法求解热传导方程自然地提出了将函数 f 表示成三角级数的求和形式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \quad (2.1)$$

其中 $\{a_k, b_k\}_{k=0}^{\infty}$ 为常数.

课堂笔记 (2024.2.19)

- J. Fourier 于 1807 年向巴黎科学院提交了关于热传导的基本论文《热的传播》, 但被 Lagrange, Laplace 和 Legendre 给拒了; 1811 年他又提交了一个修改版本, 该版本获巴黎科学院大奖, 却未正式发表; Fourier 在此书中推导出著名的热传导方程, 并在求解该方程时发现其解可以用三角函数构成的级数形式表示, 从而提出任意函数都可以展开成三角函数的无穷级数. Fourier 分析由此创立.
1822 年, Fourier 终于出版了他的著名专著《热的解析理论》[Fou]. 在该专著中, J. Fourier 将 L. Euler(1777 年), D. Bernoulli(19 世纪中期, 即 1750 年左右) 等人在一些特殊情形下应用的三角级数方法发展成内容丰富的一般理论, 也就是现在称之为的 Fourier 分析.
- 为什么 Fourier 分析又称为调和分析呢?
 - (i) 分析包含着“分”与“析”, 就是通过对事物内部适当的分析达到增进对其本质理解的目的.
 - (ii) Fourier 分析主要研究把“任意函数”通过一定的分解表示为正弦和余弦函数的线性组合的形式, 而正弦和余弦函数在物理上是被充分研究而相对简单的函数类. 该想法与化学上的原子理论想法极其相似: 无穷多不同种类的物质均是由有限多种不同的原子构成的.
 - (iii) 正弦和余弦函数对应于物理中的谐波, 其英文名为 harmonic wave. 因此, Fourier 分析又称为 harmonic analysis, 中文译为调和分析, 其实译为“谐波分析”可能更为恰当.
 - (iv) 调和分析的一个主要研究思想就是: 把所要研究的数学对象(如函数, 分布, 算子等)分解成一些更简单的课题(即所谓“原子”)(这些简单个体具有某些特殊的局部化(如紧支集), 消失性(积分为 0)和尺寸条件(如其 L^∞ 范数被支集的体积的幂次所控制)), 单独地分析这些简单的个体, 然后把所得的局部信息以一种整体和相关的方式组织起来, 从而得出所要研究的数学对象的结论.
 - (v) 国际数学联盟前主席, Wolf 奖和 Abel 奖得主 L. Carleson 在文章 *Thomas H. Wolff(1954-2000)*^a 中指出: 调和分析在数学中的地位相当于原子理论在物理学中的地位.
- 2023 年 2 月 7 日 Wolf 奖官网公布的 2023 年年度 Wolf 奖得主 Ingrid Daubechies, 其研究工作主要是小波分析及其应用. 小波分析就源自于 Fourier 分析, 特别是调和分析中原子分解思想的进一步推广. 不同于 Fourier 分析只在研究重复(周期)信号中才能发挥最强大的作用, 小波分析对于处理具有不规则特征(比如峰值等)的非周期信号具有明显优势, 至今已在信号分析, 语音合成, 图像识别, 计算机识别, 数据压缩, 地震勘探, 大气与海洋波分析等方面的研究中都取得了十分有科学意义和应用价值的成果.

^a<https://www.ams.org/journals/notices/200105>

现在回过头来仔细观察一下(2.1)式. 注意到(2.1)右式是周期为 2π 的函数, 因此若要(2.1)式成立, 则 f 也必须是周期为 2π 的函数. 因此, 为了研究(2.1)式, 我们只需考虑定义在一个长度为 2π 的区间上的函数 f : 利用 Euler 公式

$$e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx),$$

我们能够用 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$ 替代(2.1)式中的 $\{\sin(kx), \cos(kx)\}_{k=0}^{\infty}$. 更进一步, 为方便起见, 替代周期为 2π 的函数, 我们将考虑周期为 1 的函数. 因此相应地, 我们将修改函数系 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$ 为 $\{e^{i2\pi kx} : k \in \mathbb{Z}\}$, 因为后者的周期为 1.

我们现在来详细推导出(2.1)式关于函数系 $\{e^{i2\pi kx} : k \in \mathbb{Z}\}$ 的形式, 为此先推导出(2.1)式关于函数系 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$ 的形式. 注意到对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 和 $x \in \mathbb{R}$ 有:

$$\begin{cases} e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx), \\ e^{-ikx} = \cos(kx) - i \sin(kx), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos(kx) = \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2}, \\ \sin(kx) = \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i}. \end{cases}$$

从而由(2.1)式知

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(a_k \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} + b_k \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a_k}{2} + \frac{b_k}{2i} \right) e^{ikx} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a_k}{2} - \frac{b_k}{2i} \right) e^{-ikx} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{a_k}{2} + \frac{b_k}{2i} \right) e^{ikx} + \sum_{k=-\infty}^0 \left(\frac{a_{-k}}{2} - \frac{b_{-k}}{2i} \right) e^{ikx}. \end{aligned}$$

因此, 若令

$$c_k := \begin{cases} \frac{a_k}{2} + \frac{b_k}{2i}, & k \in \mathbb{N} := \{1, 2, \dots\}, \\ a_0, & k = 0, \\ \frac{a_{-k}}{2} - \frac{b_{-k}}{2i}, & k \in \{-1, -2, \dots\}, \end{cases}$$

则

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}. \quad (2.2)$$

注意到对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 有 $e^{ik(x+2\pi)} = e^{ikx}$, 故 f 必为周期为 2π 的函数.

现对周期为 2π 的函数 f , 令 $g(x) := f(2\pi x)$, 则 g 必为周期为 1 的函数, 从而由(2.2)式有

$$g(x) = f(2\pi x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi kx}.$$

因此可把(2.1)式中的问题归结为研究下述问题: 设 f 为周期为 1 的函数, 是否成立

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi kx} \quad (2.3)$$

观察到对任意 $k, m \in \mathbb{Z}$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx} dx &= \int_0^1 e^{i2\pi(k-m)x} dx \\ &= \int_0^1 \cos(2\pi(k-m)x) dx + i \int_0^1 \sin(2\pi(k-m)x) dx \\ &= \begin{cases} 0, & k \neq m, \\ 1, & k = m. \end{cases} \end{aligned} \quad (2.4)$$

若设(2.3)右式的级数是一致收敛到 f 的, 则由此与(2.4)式有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) e^{i2\pi mx} dx &= \int_0^1 \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx} dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx} dx \end{aligned}$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N c_k \int_0^1 e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx} dx$$

$$\stackrel{(B)}{=} c_m,$$

其中 (A) 蕴含的极限号与积分号交换需要用到 Lebesgue 控制收敛定理, 这就需要说明序列 $\{\sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx}\}_{N \in \mathbb{N}}$ 能被某 $L^1[0, 1]$ 函数控制. 事实上若设 $f \in L^1[0, 1]$ 且 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi kx}$ 一致收敛到 f , 则根据一致收敛的定义有

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall N \geq N_0 \left(\left| \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} - f(x) \right| \leq 1 \right),$$

据此知 $N \geq N_0$ 时有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx} \right| &= \left| \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} - f(x) \right| + |f(x)| \\ &< 1 + |f(x)|. \end{aligned}$$

而 $N \in \{1, 2, \dots, N_0 - 1\}$ 时另有

$$\left| \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx} \right| \leq \left| \sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} \right| \leq \sum_{k=-N_0}^{N_0} |c_k| < \infty,$$

据此可以构造 $L^1[0, 1]$ 函数

$$h(x) = \max \left\{ 1 + |f(x)|, \sum_{k=-N_0}^{N_0} |c_k| \right\}$$

使得对任意 $N \in \mathbb{N}$ 均有 $|\sum_{k=-N}^N c_k e^{i2\pi kx} e^{-i2\pi mx}| \leq h(x)$, 再应用 Lebesgue 控制收敛定理即得 (A). 而 (B) 基于 (2.4) 式. 因此在一定的条件下, (2.3) 右式的系数是由 f 唯一确定的, 且有上述明确的表达式.

用 $\mathbb{T}$ 表示一维环面, 即实数模 1 的加法群, 具体即

$$\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z} := \{[x] : x \in [0, 1], y \in [x] \Leftrightarrow y = x + k, k \in \mathbb{Z}\},$$

通常将 $\mathbb{T}$ 简记为 $\mathbb{T} := [0, 1]$. 因此称一个函数 f 在 $\mathbb{T}$ 上有定义, 就是指 $f(x) = f(x + k)$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 与任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均成立, 亦即 f 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数.

定义 2.1 (函数的 Fourier 系数与 Fourier 级数)

对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 称 $\{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 为 f 的 Fourier 系数, 其中对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 都有

$$\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-i2\pi kx} dx. \quad (2.5)$$

由这些系数组成的三角级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(k) e^{i2\pi kx} \quad (2.6)$$

称为 f 的 Fourier 级数.



现在要研究的问题是: 在什么条件和什么意义下, 级数 (2.6) 等于 f ?

2.2 点态收敛的判别法

记级数(2.6)的第 N 个部分和为 $S_N f(x)$, 亦即

$$S_N f(x) = \sum_{k=-N}^N \widehat{f}(k) e^{i2\pi kx}.$$

这同时也表示(2.1)右式的第 N 个部分和.

为了研究 $S_N f(x)$, 我们需要考虑一个可操作的表达式, 为此需要下述引理:

引理 2.1

若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则对任意 $a \in \mathbb{R}$ 均有

$$\int_a^{a+1} f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt. \quad (2.7)$$

证明 若 $a = 0$, 则(2.7)式显然成立. 现设 $a \in (0, 1)$, 则

$$\int_a^{a+1} f(t) dt = \int_a^1 f(t) dt + \int_1^{a+1} f(t) dt.$$

在上右式第二项中令 $t := 1 + \tilde{t}$, 知 $t \in (1, a+1) \Leftrightarrow \tilde{t} \in (0, a)$, 于是根据 f 周期为 1 知

$$\int_1^{a+1} f(t) dt = \int_0^a f(1 + \tilde{t}) d\tilde{t} = \int_0^a f(\tilde{t}) d\tilde{t} = \int_0^a f(t) dt.$$

因此

$$\int_a^{a+1} f(t) dt = \int_a^1 f(t) dt + \int_0^a f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt.$$

(2.7)式因而成立.

若 $a \in (-\infty, 0) \cup [1, \infty)$, 设 $[a]$ 是不超过 a 的最大整数, 则 $a - [a] \in [0, 1)$, 令 $t := [a] + \tilde{t}$ 知 $t \in [a, a+1] \Leftrightarrow \tilde{t} \in [a - [a], a - [a] + 1]$, 于是根据 f 周期为 1 知

$$\int_a^{a+1} f(t) dt = \int_{a-[a]}^{a-[a]+1} f([a] + \tilde{t}) d\tilde{t} = \int_{a-[a]}^{a-[a]+1} f(\tilde{t}) d\tilde{t} = \int_{a-[a]}^{a-[a]+1} f(t) dt.$$

根据 $a - [a] \in [0, 1)$ 与上述结论即得

$$\int_a^{a+1} f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt.$$

命题至此得证. □

利用引理2.1有:

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{k=-N}^N \int_0^1 f(t) e^{-i2\pi kt} dt \cdot e^{i2\pi kx} = \int_0^1 f(x) \sum_{k=-N}^N e^{i2\pi k(x-t)} dt \\ &= - \int_x^{x-1} f(x-t) \sum_{k=-N}^N e^{i2\pi kt} dt = \int_{x-1}^x f(x-t) \sum_{k=-N}^N e^{i2\pi kt} dt \\ &= \int_0^1 f(x-t) \sum_{k=-N}^N e^{i2\pi kt} dt =: \int_0^1 f(x-t) D_N(t) dt, \end{aligned}$$

其中 D_N 表示 Dirichlet 核:

$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{i2\pi kt}, \quad t \in [0, 1].$$

进一步, 利用幂级数求和公式与 Euler 公式有

$$D_N(t) = e^{-i2\pi Nt} \frac{1 - e^{i2\pi(2N+1)t}}{1 - e^{i2\pi t}} = \frac{e^{-i2\pi Nt} - e^{i2\pi(N+1)t}}{1 - e^{i2\pi t}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^{i\pi t}(e^{-i\pi(2N+1)t} - e^{i\pi(2N+1)t})}{e^{i\pi t}(e^{-i\pi t} - e^{i\pi t})} \\
&= \frac{-2i \sin(\pi(2N+1)t)}{-2i \sin(\pi t)} = \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)}.
\end{aligned} \tag{2.8}$$

另外对 Dirichlet 核有下述估计:

(i) $\int_0^1 D_N(t) dt = 1;$

(ii) $\forall \delta \leq |t| \leq \frac{1}{2} (|D_N(t)| \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)}).$

其中 (i) 是因为

$$\int_0^1 D_N(t) dt = \int_0^1 \sum_{k=-N}^N e^{i2\pi kt} dt = 1 + \int_0^1 \sum_{k=-N}^{-1} e^{i2\pi kt} dt + \int_0^1 \sum_{k=1}^N e^{i2\pi kt} dt = 1,$$

(ii) 是因为 $\forall \delta \in (0, \frac{1}{2}] (\sin(\pi\delta) > 0)$, 于是

$$|D_N(t)| = \frac{|\sin(\pi(2N+1)t)|}{\sin(\pi t)} \leq \frac{1}{\sin(\pi t)} \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)}, \quad \delta \leq |t| \leq \frac{1}{2}.$$

对于 Fourier 级数收敛性的研究, 我们首先需要确定 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x)$ 对怎样的 x 存在, 得到存在性后再去谈它是否等于 $f(x)$. 下面给出两个点态收敛的审敛法:

定理 2.1 (Dini 审敛法)

对 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 若 $x \in \mathbb{T}$ 满足 Dini 条件: 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty, \tag{2.9}$$

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x).$$



定理 2.2 (Jordan 审敛法)

若 f 是 x 某邻域内的有界变差函数^a, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)].$$

^a回忆有界变差函数的定义: 设 f 是定义在区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的一个函数, 记 $[a, b]$ 的任意一个分划 Δ 为:

$$a =: x_0 < x_1 < \cdots < x_n := b$$

如果

$$\bigvee_a^b(f) := \sup_{\Delta} \sum_{i=1}^m |f(x_i) - f(x_{i-1})| < \infty$$

其中 Δ 取遍 $[a, b]$ 的一切分划, 则称 f 为 $[a, b]$ 上的有界变差函数.



课堂笔记 (2024.2.26)

(1) Dini 审敛法 2.1 的关键点在于 Dini 条件(2.9)能够将几乎处处的条件升级为点态的条件: Dini 审敛法 2.1 的结论是点态成立的, 但 Lebesgue 积分本身不关心零测集上函数取值的变动, 这表明 Dini 条件本身就足以保证函数在每一点取值唯一. 下面两条结果能将这件事阐述清楚:

(a) 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 且 f 在 x 点满足 Dini 条件(2.9), 那么 $|f(x)| < \infty$. 这是因为设 $|f(x)| = \infty$, 由 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 知 $|f(t)| < \infty$ 对几乎处处的 $t \in \mathbb{T}$ 均成立, 于是 $|f(x+t)| < \infty$ 对几乎处处的 $|t| < \delta$ 均成立. 现由 $|f(x)| = \infty$ 知 $\left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| = \infty$ 对几乎处处的 $|t| < \delta$ 均成立, 于是

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt = \infty,$$

这与条件矛盾! 断言因而成立.

(b) 若 f 在 x 点满足 Dini 条件(2.9), 则 f 在 x 点处取值唯一, 亦即不能修改 f 在 x 点的值使其在该

点处仍满足 Dini 条件. 这是因为若设 $f(x) = a_1$ 与 $f(x) = a_2$ 均满足 Dini 条件, 且 $a_1 \neq a_2$, 则根据 Dini 条件知存在 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ 使得

$$\infty = \int_{|t|<\delta} \frac{|a_1 - a_2|}{|t|} dt \leq \int_{|t|<\delta} \left| \frac{a_1 - f(x+t)}{t} \right| dt + \int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - a_2}{t} \right| dt < \infty,$$

左右两式矛盾! 故 $a_1 = a_2$, 断言因而成立.

(2) Dini 条件(2.9)中 δ 的大小与结果是没有关系的, 只需要 $\delta > 0$ 即可. 也就是说若 $\delta_1, \delta_2 \in (0, 1)$, 则

$$\int_{|t|<\delta_1} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty \Leftrightarrow \int_{|t|<\delta_2} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty.$$

这是因为不妨设 $\delta_1 < \delta_2$, 则显见 $\int_{|t|<\delta_2} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty \Rightarrow \int_{|t|<\delta_1} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty$. 现知

$$\begin{aligned} \int_{|t|<\delta_2} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt &= \int_{|t|<\delta_1} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt + \int_{\delta_1 \leq |t| < \delta_2} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt \\ &\leq \int_{|t|<\delta_1} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt + \frac{1}{\delta_1} \int_{\delta_1 \leq |t| < \delta_2} |f(x+t) - f(x)| dt \\ &\leq \int_{|t|<\delta_1} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt \\ &\quad + \frac{1}{\delta_1} \left(\int_{\delta_1 \leq |t| < \delta_2} |f(x+t)| dt + 2|f(x)|(\delta_2 - \delta_1) \right) \\ &\leq \int_{|t|<\delta_1} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt + \frac{2}{\delta_1} (\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} + |f(x)|(\delta_2 - \delta_1)), \end{aligned}$$

由 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 与上一条笔记 (a) 即得 $\int_{|t|<\delta_2} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty$, 断言因而成立.

(3) Jordan 审敛法 2.2 的结果暗示了某点邻域内的有界变差函数在该点的左右极限必存在. 这是因为实变函数论的课程中已经有结论: 有界变差函数是两个单增函数之差, 而单增函数在定义域内的左右极限必定存在.

(4) Dini 审敛法 2.1 与 Jordan 审敛法 2.2 实际上是互不蕴含的. 下面给出两例:

(a) 存在 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 与 $x \in \mathbb{T}$ 使得 f 在 x 处的左右极限均不存在, 但 f 在 x 处依旧满足 Dini 条件: 令

$$f(x) := \begin{cases} |x|, & x \in [-1/2, 1/2] \setminus \{\pm 1/n : n \in \mathbb{N}\}, \\ \frac{1}{2}, & x \in [-1/2, 1/2] \cap \{\pm 1/n : n \in \mathbb{N}\}, \end{cases}$$

对 f 作周期为 1 的延拓, 显见 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 且 f 在 0 处的左右极限均不存在. 同时因为在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上几乎处处有 $f(t) = |t|$, 故

$$\int_{|t|<\frac{1}{2}} \left| \frac{f(t) - f(0)}{t} \right| dt = \int_{|t|<\frac{1}{2}} \frac{|f(t)|}{|t|} dt = \int_{|t|<\frac{1}{2}} \frac{|t|}{|t|} dt = 1 < \infty.$$

于是 f 在 0 点满足 Dini 条件. 另外, 将全变差的分割点取为 $\pm \frac{1}{n}$ 显见 f 并不是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的有界变差函数, 这说明 f 不满足 Jordan 审敛法的条件.

(b) 存在 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 与 $x \in \mathbb{T}$ 使得 f 在 x 的某邻域内是有界变差函数, 但 f 在 x 处并不满足 Dini 条件: 令

$$f(x) := \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x \in [-1/2, 0) \cup (0, 1/2], \end{cases}$$

对 f 作周期为 1 的延拓, 显见 $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\bigvee_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(f) = 2$, 故 f 是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的有界变差函数. 另一方面对任意 $\delta > 0$ 有:

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(0+t) - f(0)}{t} \right| dt = \int_{|t|<\delta} \frac{1}{|t|} dt = \infty,$$

于是 f 在 0 点不满足 Dini 条件.

注 为使结构更为清晰, 在此单开一注继续课堂笔记. 关于 Fourier 级数点态收敛的第一个正面结果是由 P. G. Dirichlet 于 1829 年取得的:

定理 2.3 (Dirichlet 审敛法)

若 f 是 $\mathbb{T}$ 上的一个有界, 分段连续且只有有限个极大值点与极小值点的函数, 则对任意 $x \in \mathbb{T}$, $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x)$ 均存在, 且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)].$$

可以证明 Dirichlet 审敛法 2.3 是 Jordan 审敛法 2.2 的一个推论, 为此只需证明若 f 满足 Dirichlet 审敛法的条件, 那么 f 是有界变差函数即可. 这里先回忆分段连续函数的定义:

定义 2.2 (分段连续函数^{Z0})

实值或复值函数 f 称为闭区间 $[a, b]$ 上的分段连续函数, 如果在该区间上存在有限的一组点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得函数 f 在每一个开区间 (x_{j-1}, x_j) ($j = 1, \cdots, n$) 上有定义, 连续, 并且在它的两个端点有单侧极限.

要说明 Jordan 审敛法蕴含 Dirichlet 审敛法, 就是证明下述命题:

命题 2.1

若 f 是 $[0, 1]$ 上的有界, 分段连续且只有有限个极大值点与极小值点的函数, 则 f 必为 $[0, 1]$ 上的有界变差函数.

证明 因为 f 是有界函数, 故存在常数 $M > 0$ 使得对任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $|f(x)| \leq M$. 又因为 f 是分段连续函数, 不妨设 f 的间断点为 $\{a_k\}_{k=1}^n$, 其中

$$0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_n \leq 1.$$

不妨记 $a_0 := 0, a_{n+1} := 1$, 则由实变函数的结论知

$$\bigvee_0^1(f) = \sum_{i=0}^n \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(f).$$

下证对任意 $i \in \{0, \cdots, n\}$ 有 $\bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(f) < \infty$, 为此令

$$\tilde{f}_i(x) := \begin{cases} f(a_i + 0), & x = a_i, \\ f(x), & x \in (a_i, a_{i+1}), \\ f(a_{i+1} - 0), & x = a_{i+1}, \end{cases}$$

则 $\tilde{f}_i$ 是 $[a_i, a_{i+1}]$ 上的连续函数. 再令

$$g_i(x) := \begin{cases} f(a_i) - f(a_i + 0), & x = a_i, \\ 0, & x \in (a_i, a_{i+1}), \\ f(a_{i+1}) - f(a_{i+1} - 0), & x = a_{i+1}, \end{cases}$$

则在 $[a_i, a_{i+1}]$ 上有 $f = \tilde{f}_i + g_i$, 根据全变差的定义显见

$$\bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(f) \leq \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(\tilde{f}_i) + \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(g_i).$$

又知

$$\begin{aligned} \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(g_i) &= |g_i(a_i)| + |g_i(a_{i+1})| \\ &= |f(a_i) - f(a_i + 0)| + |f(a_{i+1}) - f(a_{i+1} - 0)| \\ &\leq 4M < \infty. \end{aligned}$$

现要说明 f 是有界变差函数, 就只需说明对任意 $i \in \{0, \dots, n\}$ 有 $\bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(\tilde{f}_i) < \infty$. 因为 f 只有有限个极值点, 故 $\tilde{f}_i$ 也只有有限个极值点. 设 $\tilde{f}_i$ 在 (a_i, a_{i+1}) 有 m_i 个极值点, 记作 $\{b_j^{(i)}\}_{j=1}^{m_i}$, 且 $a_i < b_1^{(i)} < \dots < b_{m_i}^{(i)} < a_{i+1}$. 现记 $b_0^{(i)} := a_i, b_{m_i+1}^{(i)} := a_{i+1}$, 则对给定的 $i \in \{0, \dots, n\}$ 与 $j \in \{0, \dots, m_i\}$ 知 $\tilde{f}_i$ 必在 $(b_j^{(i)}, b_{j+1}^{(i)})$ 上单调, 这是因为若 $\tilde{f}_i$ 在 $(b_j^{(i)}, b_{j+1}^{(i)})$ 上不单调, 则必存在 $b_j^{(i)} < x_1 < x_2 < x_3 < b_{j+1}^{(i)}$ 使得 $\tilde{f}_i(x_1) < \tilde{f}_i(x_2) > \tilde{f}_i(x_3)$ 或 $\tilde{f}_i(x_1) > \tilde{f}_i(x_2) < \tilde{f}_i(x_3)$, 于是 $\tilde{f}_i$ 必在 $(x_1, x_3) \subset (b_j^{(i)}, b_{j+1}^{(i)})$ 上有新的极值点, 这与假设矛盾! 因此 $\tilde{f}_i$ 必在 $(b_j^{(i)}, b_{j+1}^{(i)})$ 上单调, 从而根据全变差的性质¹知

$$\bigvee_{b_j^{(i)}}^{b_{j+1}^{(i)}}(\tilde{f}_i) = |\tilde{f}_i(b_{j+1}^{(i)}) - \tilde{f}_i(b_j^{(i)})| < \infty,$$

于是

$$\bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(\tilde{f}_i) = \sum_{j=0}^{m_i} \bigvee_{b_j^{(i)}}^{b_{j+1}^{(i)}}(\tilde{f}_i) = \sum_{j=0}^{m_i} |\tilde{f}_i(b_{j+1}^{(i)}) - \tilde{f}_i(b_j^{(i)})| < \infty,$$

因此 $\sum_{i=0}^n \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(\tilde{f}_i) < \infty$, 故

$$\bigvee_0^1(f) = \sum_{i=0}^n \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(f) \leq \sum_{i=0}^n \left[\bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(\tilde{f}_i) + \bigvee_{a_i}^{a_{i+1}}(g_i) \right] < \infty.$$

于是 f 是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数. □

这两个审敛法乍一看会很出乎意料, 因为它们的结果是局部的, 但同时如果对函数作轻微改动, f 的 Fourier 系数全都会变, 这似乎在暗示 $S_N f(x)$ 的收敛性应该是函数的整体性质. 事实上, Fourier 级数的收敛性确实是一个局部性质, 而且如果函数的改动是在 x 的某邻域之外的, 那么 x 处 Fourier 级数的收敛性就不会变². 下述定理精确地描述了这个事实:

定理 2.4 (Riemann 局部化原理)

若 f 在 x 的某邻域内恒为零, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0.$$



Riemann 局部化原理的等价表述是说: 如果两个函数在 x 的某邻域相等, 那么它们在 x 处的 Fourier 级数就应该相等. 具体来说, 设 $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{T})$ 在 x 的一个邻域内相等, 则若令 $g := f_1 - f_2$, 知 g 在 x 的一个邻域内为 0, 从而 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N g(x) = 0$. 又因为 $S_N g(x) = S_N f_1(x) - S_N f_2(x)$, 故

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f_1(x) - \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f_2(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N g(x) = 0,$$

因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f_1(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f_2(x)$, 即 f_1, f_2 的 Fourier 级数在 x 处表现相同.

根据 Fourier 系数的定义(2.5)立即可得

$$|\hat{f}(k)| = \left| \int_0^1 f(x) e^{-i2\pi kx} dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx = \|f\|_{L^1(\mathbb{T})},$$

但事实上有下列更强的估计, 该估计会用于证明前面的结论:

¹ 若 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则 $\bigvee_a^b(f) = |f(a) - f(b)|$.

² 这样的“出乎意料”在恒等逼近定理中会系统讨论. 尽管 Dirichlet 核本身并非好核, 但 Dini 条件所附加的对 f 性质的改良抵消了这一点.

引理 2.2 (Riemann-Lebesgue)

若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0.$$



注

- 根据 Riemann-Lebesgue 引理 2.2 可推知 $\{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 有界, 但单靠该引理没法保证其界为 $\|f\|_{L^1(\mathbb{T})}$.
- 为证 Riemann-Lebesgue 引理 2.2, 需要下述引理作为铺垫:

引理 2.3

对任意 $f \in L^1[0, 1]$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个具有紧支集的连续函数 g , 使得 $\text{supp } g \subset (0, 1)$ 且 $\|f - g\|_{L^1[0, 1]} < \varepsilon$. 其中 $\text{supp } g := \overline{\{x : g(x) \neq 0\}}$.



证明 在实变函数中已知: 对 $f \in L^1[0, 1]$ 而言, 存在简单函数列³ $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得对任意 $x \in [0, 1]$ 均有

$$|\varphi_k(x)| \leq |f(x)| \text{ 且 } \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x).$$

由此及 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\varphi_k - f\|_{L^1[0, 1]} = 0.$$

根据极限定义知对给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|\varphi_{k_0} - f\|_{L^1[0, 1]} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

显见 E 上的简单函数 φ_{k_0} 必有界, 不妨设其界为 M , 因而 φ_{k_0} 至少是处处有限的. 又因为 $[0, 1]$ 是有界可测集, 根据 [ZMQ] 中 Lusin 定理的推论及其证明知存在 $\mathbb{R}$ 上具有紧支集的连续函数 $\tilde{h}$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $|\tilde{h}(x)| \leq M$, 且

$$|\{x \in [0, 1] : \varphi_{k_0}(x) \neq \tilde{h}(x)\}| < \frac{\varepsilon}{6M}.$$

下面将 $\tilde{h}$ 的支集限定在 $(0, 1)$ 中, 令 $h := \tilde{h}\chi_{[\frac{\varepsilon}{12M}, 1 - \frac{\varepsilon}{12M}]}$, 则对任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $|h(x)| \leq M$, 且

$$\text{supp } h = \text{supp } \tilde{h} \cap \left[\frac{\varepsilon}{12M}, 1 - \frac{\varepsilon}{12M}\right] \subset (0, 1).$$

现将 h 作连续延拓, 定义为 $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{24M}{\varepsilon} \left(x - \frac{24M}{\varepsilon}\right) h\left(\frac{\varepsilon}{12M}\right), & x \in [\varepsilon/24M, \varepsilon/12M) \\ h(x), & x \in [\varepsilon/12M, 1 - \varepsilon/12M] \\ -\frac{24M}{\varepsilon} \left(x - 1 + \frac{\varepsilon}{24M}\right) h\left(1 - \frac{\varepsilon}{24M}\right), & x \in (1 - \varepsilon/12M, 1 - \varepsilon/24M] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $|g(x)| \leq M$, 且 $\text{supp } g \subset [\frac{\varepsilon}{24M}, 1 - \frac{\varepsilon}{24M}] \subset (0, 1)$, g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且

$$\begin{aligned} \|\varphi_{k_0} - g\|_{L^1[0, 1]} &\leq \|\varphi_{k_0} - \tilde{h}\|_{L^1[0, 1]} + \|\tilde{h} - g\|_{L^1[0, 1]} \\ &\leq 2M|\{x \in [0, 1] : \varphi_{k_0}(x) \neq \tilde{h}(x)\}| + 2M|\{x \in [0, 1] : \tilde{h}(x) \neq g(x)\}| \\ &< 2M \cdot \frac{\varepsilon}{6M} + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{12M} \cdot 2 = \frac{2}{3}\varepsilon, \end{aligned}$$

于是

$$\|f - g\|_{L^1[0, 1]} \leq \|f - \varphi_{k_0}\|_{L^1[0, 1]} + \|\varphi_{k_0} - g\|_{L^1[0, 1]} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

引理至此得证. □

下面证明 Riemann-Lebesgue 引理 2.2.

³这里简单函数指有限个特征函数的线性组合.

证明 注意到

$$\begin{aligned}\widehat{f}(k) &= \int_0^1 f(x)e^{-i2\pi kx} dx = - \int_0^1 f(x)e^{-i2\pi kx} e^{-\pi i} dx \\ &= - \int_0^1 f(x)e^{-i2\pi k(x+\frac{1}{2k})} dx = - \int_0^1 f\left(t - \frac{1}{2k}\right) e^{-i2\pi kt} d\left(t - \frac{1}{2k}\right) \\ &= - \int_{\frac{1}{2k}}^{1+\frac{1}{2k}} f\left(t - \frac{1}{2k}\right) e^{-i2\pi kt} dt \stackrel{(A)}{=} - \int_0^1 f\left(x - \frac{1}{2k}\right) e^{-i2\pi kx} dx.\end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $e^{i2\pi x}$ 的周期为 1. 故

$$\begin{aligned}\widehat{f}(k) &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x)e^{-i2\pi kx} dx - \int_0^1 f(x)e^{-i2\pi kx} e^{-\pi i} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[f(x) - f\left(x - \frac{1}{2k}\right) \right] e^{-i2\pi kx} dx.\end{aligned}$$

若 f 连续, 则显见 $f(x - \frac{1}{2k}) \rightarrow f(x) (|k| \rightarrow \infty)$, 因而根据 Lebesgue 控制收敛定理得

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = \frac{1}{2} \int_0^1 \lim_{|k| \rightarrow \infty} \left[f(x) - f\left(x - \frac{1}{2k}\right) \right] e^{-i2\pi kx} dx = 0.$$

现对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 由引理 2.3 知存在 $\mathbb{T}$ 上具紧支集连续函数 g 使得 $\|f - g\|_{L^1(\mathbb{T})} < \frac{\varepsilon}{2}$, 又根据上述讨论知 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{g}(k) = 0$, 故对前述 $\varepsilon > 0$ 知存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$|k| > k_0 \Rightarrow |\widehat{g}(k)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此与引理 2.3 知 $|k| > k_0$ 时有

$$|\widehat{f}(k)| \leq |(f - g)^\wedge(k)| + |\widehat{g}(k)| \leq \|f - g\|_{L^1(\mathbb{T})} + |\widehat{g}(k)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

因此 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0$, Riemann-Lebesgue 引理 2.2 证毕. $\square$

下面证明 Riemann 局部化原理 2.4.

证明 设在 $(x - \delta, x + \delta)$ 上有 $f(t) = 0$, 往证 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0$. 知

$$\begin{aligned}S_N f(x) &= \int_0^1 f(x - t) \frac{\sin(\pi(2N + 1)t)}{\sin(\pi t)} dt \stackrel{(A)}{=} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x - t) \frac{\sin(\pi(2N + 1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &\stackrel{(B)}{=} \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} f(x - t) \frac{\sin(\pi(2N + 1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &\stackrel{(C)}{=} \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} \frac{f(x - t)}{\sin(\pi t)} \frac{e^{i\pi(2N+1)t} - e^{-i\pi(2N+1)t}}{2i} dt \\ &= \int_0^1 \frac{f(x - t)\chi_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}}(t)}{2i \sin(\pi t)} e^{i\pi t} e^{-i\pi 2(-N)t} dt - \int_0^1 \frac{f(x - t)\chi_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}}(t)}{2i \sin(\pi t)} e^{-i\pi t} e^{-i\pi 2Nt} dt \\ &= (g(\cdot)e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - (g(\cdot)e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N),\end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $f(x - t) \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)}$ 是关于 t 的周期为 1 的函数, (B) 是因为在 $(x - \delta, x + \delta)$ 上 $f(t) = 0$, (C) 是 Euler 公式, 最后

$$g(t) = \frac{f(x - t)\chi_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}}(t)}{2i \sin(\pi t)}$$

现在只要 f 满足 $\int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} |f(x - t)| dt < \infty$, 就有

$$\int_0^1 |g(t)| dt \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)} \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} |f(x - t)| dt < \infty$$

于是 $g \in L^1(\mathbb{T})$, 进而 $g(\cdot)e^{i\pi(\cdot)} \in L^1(\mathbb{T})$, 因而由 Riemann-Lebesgue 引理知 $\lim_{N \rightarrow \infty} (g(\cdot)e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) = 0$, 同理 $\lim_{N \rightarrow \infty} (g(\cdot)e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N) = 0$, 于是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} (g(\cdot)e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - \lim_{N \rightarrow \infty} (g(\cdot)e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N) = 0$$

$\square$

最后来证明两个审敛法, 首先证明 **Dini 审敛法 2.1**:

证明 已知对给定的 x , 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty,$$

往证 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$. 设 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ 待定, 令

$$g_1(t) := \frac{f(x-t) - f(x)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{|t|<\delta\}}(t),$$

$$g_2(t) := \frac{f(x-t) - f(x)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}\}}(t).$$

类似于 **Riemann 局部化原理 2.4** 的证明, 利用 $\int_0^1 D_N(t) dt = 1$ 与引理 2.1 知

$$\begin{aligned} S_N f(x) - f(x) &= \int_0^1 (f(x-t) - f(x)) D_N(t) dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (f(x-t) - f(x)) D_N(t) dt \\ &= \int_{|t|<\delta} (f(x-t) - f(x)) D_N(t) dt + \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} (f(x-t) - f(x)) D_N(t) dt \\ &=: I_1 + I_2. \end{aligned}$$

再利用 (2.8) 式与 Euler 公式可得:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{|t|<\delta} (f(x-t) - f(x)) \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &= \int_{|t|<\delta} (f(x-t) - f(x)) \frac{e^{i\pi(2N+1)t} - e^{-i\pi(2N+1)t}}{2i \sin(\pi t)} dt \\ &= \int_{|t|<\delta} (f(x-t) - f(x)) \frac{e^{i\pi t}}{2i \sin(\pi t)} e^{i2\pi N t} dt - \int_{|t|<\delta} (f(x-t) - f(x)) \frac{e^{-i\pi t}}{2i \sin(\pi t)} e^{-i2\pi N t} dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g_1(t) e^{i\pi t} e^{i2\pi N t} dt - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g_1(t) e^{-i\pi t} e^{-i2\pi N t} dt \\ &= (g_1 e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - (g_1 e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} (f(x-t) - f(x)) \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &= \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} (f(x-t) - f(x)) \frac{e^{i\pi(2N+1)t} - e^{-i\pi(2N+1)t}}{2i \sin(\pi t)} dt \\ &= (g_2 e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - (g_2 e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N). \end{aligned}$$

因为 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = 1$, 故存在 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ 充分小, 使得当 $|t| < \delta$ 时有

$$\left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} - 1 \right| < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} < \frac{3}{2}.$$

于是当 $|t| < \delta$ 时⁴ $|\sin(\pi t)| \sim \pi|t|$, 由此及 Dini 条件可知⁵

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |g_1(t)| dt &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{|f(x-t) - f(x)|}{2|\sin(\pi t)|} \chi_{\{|t|<\delta\}}(t) dt \\ &\sim \int_{|t|<\delta} \frac{|f(x-t) - f(x)|}{|t|} dt < \infty. \end{aligned}$$

⁴ $f \sim g$ 表示存在正常数 $C \in [1, \infty)$ 使得 $\frac{1}{C}g \leq f \leq Cg$.

⁵ 由这部分推导可以看出, Dini 审敛法 2.1 中的 Dini 条件 $\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x-t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty$ 完全等价于条件 $\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x-t) - f(x)}{\sin(\pi t)} \right| dt < \infty$.

又由函数 $x \mapsto \sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的单增性与引理 2.1 知

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |g_2(t)| dt &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{|f(x-t) - f(x)|}{2|\sin(\pi t)|} \chi_{\{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}\}}(t) dt \\ &= \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} \frac{|f(x-t) - f(x)|}{2\sin(\pi|t|)} dt \\ &\leq \int_{\delta \leq |t| < \frac{1}{2}} \frac{|f(x-t) - f(x)|}{2\sin(\pi\delta)} dt \\ &\leq \frac{1}{2\sin(\pi\delta)} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt + |f(x)| \right) < \infty. \end{aligned}$$

又显见 $\{g_k(\cdot)e^{\pm i\pi(\cdot)}\}_{k=1}^2$ 均可延拓为周期为 1 的函数⁶, 故 $\{g_k(\cdot)e^{\pm i\pi(\cdot)}\}_{k=1}^2 \subset L^1(\mathbb{T})$, 于是根据 Riemann-Lebesgue 引理 2.2 知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (S_N f(x) - f(x)) = \sum_{k=1}^2 \lim_{N \rightarrow \infty} ((g_k e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - (g_k e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N)) = 0.$$

因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$, 至此 Dini 审敛法 2.1 证毕. □

为证明 Jordan 审敛法 2.2, 需要引入下述两条引理:

引理 2.4 (有界变差函数的 Jordan 分解)

$f \in BV[a, b]$ 当且仅当 $f = g - h$, 其中 g, h 是 $[a, b]$ 上的单调上升 (实值) 函数. ♡

引理 2.5 (积分第二中值定理)

设 $\phi \in C[a, b]$, h 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $c \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b h(x)\phi(x)dx = h(b-0) \int_c^b \phi(x)dx + h(a+0) \int_a^c \phi(x)dx. \quad \text{♡}$$

课堂笔记 (2024.3.11)

中值定理 2.5 实际上并非标准的积分第二中值定理, 标准定理中两个单侧极限本应是两个单点值. 事实上, 中值定理一方面可以从 [TMA] 中记录的一个定理直接推知: 设 $g \in C[a, b]$, f 在 $[a, b]$ 上单调上升, 且 $A, B \in \mathbb{R}$ 满足 $A \leq f(a+0), B \geq f(b-0)$, 则存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = A \int_a^{x_0} g(x)dx + B \int_{x_0}^b g(x)dx.$$

特别地, 若 $f(x) \geq 0$ 对全体 $x \in [a, b]$ 均成立, 则有^a

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = B \int_{x_0}^b g(x)dx, \quad x_0 \in [a, b].$$

另一方面, 回忆标准的积分第二中值定理: 对 $g \in R[a, b]$ 与在 $[a, b]$ 上单调的 f , 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^\xi g(x)dx + f(b) \int_\xi^b g(x)dx,$$

设

$$\tilde{h}(x) := \begin{cases} h(a+0), & x = a, \\ h(x), & x \in (a, b), \\ h(b-0), & x = b, \end{cases}$$

⁶这个延拓未必连续, 但连续性在这里无关紧要, 我们只关注 Riemann-Lebesgue 引理 2.2 在这里能不能用, 也就是只关注延拓得到的函数在一个周期上可不可积.

则 $\tilde{h}$ 依旧是单调函数, 且因为 Riemann 积分不因有限个点的改变而改变, 知

$$\int_a^b \tilde{h}(x)\phi(x)dx = \int_a^b \tilde{h}(x)\phi(x)dx.$$

现根据标准的积分第二中值定理知存在 $c \in [a, b]$ 使得

$$\begin{aligned} \int_a^b h(x)\phi(x)dx &= \int_a^b \tilde{h}(x)\phi(x)dx = \tilde{h}(a) \int_a^c \phi(x)dx + \tilde{h}(b) \int_c^b \phi(x)dx \\ &= h(a+0) \int_a^c \phi(x)dx + h(b-0) \int_c^b \phi(x)dx. \end{aligned}$$

^a这一断言又称为 Bonnet 定理.



下面证明 Jordan 审敛法 2.2:

证明 已知 f 在 x 的某邻域内 (不妨设为 $[x-\delta, x+\delta]$, 其中 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$) 是有界变差函数, 往证

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)].$$

根据 Jordan 分解 2.4, 不妨设 f 在 $[x-\delta, x+\delta]$ 内是单调的. 设 $\tilde{f}(x-t) := f(x-t)\chi_{[-\delta, \delta]}(t)$, 则因为 $\tilde{f}(t) \neq 0 \Rightarrow x-t \in [-\delta, \delta] \Leftrightarrow t \in [x-\delta, x+\delta]$ 且 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 可知 $|x+\delta - (x-\delta)| = 2\delta < 1$, 于是 $\text{supp } \tilde{f} \subset [x-\delta, x+\delta]$. 注意到 $[x-\delta, x+\delta]$ 的区间长度严格小于 1, 且当 $t \in [x-\delta, x+\delta]$ 时显见 $\tilde{f}(t) = f(t)$, 故由 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 知 $\tilde{f}$ 可以延拓成为直线上周期为 1 的 Lebesgue 可积函数, 亦即 $\tilde{f} \in L^1(\mathbb{T})$, 另由 f 的单调性知 $\tilde{f}$ 在 $[x-\delta, x+\delta]$ 上单调. 现因为 $\tilde{f} = f$ 在 $[x-\delta, x+\delta]$ 上成立, 由 Riemann 局部化原理 2.4 知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f - \tilde{f})(x) = 0,$$

亦即 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \tilde{f}(x)$. 至此为证 Jordan 审敛法 2.2, 只需证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_N \tilde{f}(x) = \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]. \quad (2.10)$$

为此, 由 (2.8) 式知 $D_N(x)$ 为偶函数, 据此与引理 2.1 知

$$\begin{aligned} S_N \tilde{f}(x) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \tilde{f}(x-t) D_N(t) dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x-t) \chi_{[-\delta, \delta]}(t) D_N(t) dt \\ &= \int_0^\delta f(x-t) D_N(t) dt + \int_{-\delta}^0 f(x-t) D_N(t) dt \\ &= \int_0^\delta f(x-t) D_N(t) dt - \int_\delta^0 f(x+t) D_N(t) dt \\ &= \int_0^\delta [f(x-t) + f(x+t)] D_N(t) dt. \end{aligned} \quad (2.11)$$

令 $g_\pm(t) := f(x \pm t) \chi_{[0, \delta]}(t)$, 则 $g_\pm \in L^1(\mathbb{T})$, $g_\pm$ 在 $[0, \delta]$ 上单调, 且 $g_\pm(0+0) = f(x \pm 0)$. 现在要证明结论, 只需证明对任意 $g \in L^1(\mathbb{T})$, 只要 g 在 $[0, \delta]$ 上单调, 就有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{2}} g(t) D_N(t) dt = \frac{1}{2} g(0+0). \quad (2.12)$$

不妨设 g 在 $[0, \delta]$ 上单增, 否则考虑 $-g$ 即可. 另外可设 $g(0+0) = 0$, 这是因为由 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(t) dt = 1$ 与 $D_N(t)$ 作为偶函数可知 $\int_0^{\frac{1}{2}} D_N(t) dt = \frac{1}{2}$, 于是

$$\int_0^{\frac{1}{2}} g(t) D_N(t) dt - \frac{1}{2} g(0+0) = \int_0^{\frac{1}{2}} [g(t) - g(0+0)] D_N(t) dt. \quad (2.13)$$

现取 $\tilde{g}(t) := g(t) - g(0+0)$ 即知 $\tilde{g} \in L^1(\mathbb{T})$, $\tilde{g}$ 在 $[0, \delta]$ 上单增且 $\tilde{g}(0+0) = 0$, 故若 (2.12) 式对 $\tilde{g}$ 成立, 则由 (2.13) 式知 (2.12) 式对 g 也应成立. 因此, 现在只需证 (2.12) 式对于在 $L^1(\mathbb{T})$ 中, 满足在 $[0, \delta]$ 上单增且在 0 的右极限为 0 这

样的 g 成立即可.

现对任意 $\varepsilon > 0$, 因为 g 单增且 $g(0+0) = 0$, 故可取 $\tilde{\delta} \in (0, \delta]$ 充分小, 使得 g 在 $[0, \tilde{\delta}]$ 内单增, 且对任意 $t \in (0, \tilde{\delta}]$ 均有 $0 = g(0+0) < g(t) < \frac{\varepsilon}{2C}$, 从而 $g(\tilde{\delta}-0) \leq \frac{\varepsilon}{2C}$, 其中 C 为不依赖于 $\varepsilon, \tilde{\delta}, \delta$ 的待定正常数. 对该 $\tilde{\delta}$ 有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} g(t) D_N(t) dt = \int_0^{\tilde{\delta}} g(t) D_N(t) dt + \int_{\tilde{\delta}}^{\frac{1}{2}} g(t) D_N(t) dt =: I_1 + I_2,$$

往证 $\lim_{N \rightarrow \infty} (I_1 + I_2) = 0$, 首先证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} I_2 = 0. \quad (2.14)$$

事实上, 完全类似于 Riemann 局部化原理 2.4 的证明, 利用 Euler 公式与引理 2.1 知

$$I_2 = (\tilde{g}e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - (\tilde{g}e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N),$$

其中

$$\tilde{g}(t) := \frac{g(t)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{\tilde{\delta} < t < \frac{1}{2}\}}(t).$$

事实上, $\tilde{g}e^{\pm i\pi t}$ 可以延拓成周期为 1 的可积函数, 这是因为由 $\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的单增性, 有:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |\tilde{g}(t)| dt = \int_{\tilde{\delta}}^{\frac{1}{2}} \frac{|g(t)|}{2 \sin(\pi t)} dt \leq \frac{1}{2 \sin(\pi \tilde{\delta})} \int_{\tilde{\delta}}^{\frac{1}{2}} |g(t)| dt \leq \frac{1}{2 \sin(\pi \tilde{\delta})} \|g\|_{L^1(\mathbb{T})} < \infty.$$

现由 Riemann-Lebesgue 引理 2.2 知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} I_2 = \lim_{N \rightarrow \infty} ((\tilde{g}e^{i\pi(\cdot)})^\wedge(-N) - (\tilde{g}e^{-i\pi(\cdot)})^\wedge(N)) = 0,$$

至此 (2.14) 式得证.

再估计 I_1 , 因为 g 在 $[0, \tilde{\delta}]$ 上单调, 且 $g(0+0) = 0$, 故由积分第二中值定理 2.5 知存在 $v \in [0, \tilde{\delta}]$ 使得

$$I_1 = g(\tilde{\delta}-0) \int_v^{\tilde{\delta}} D_N(t) dt.$$

下面估计 $\int_v^{\tilde{\delta}} D_N(t) dt$, 由 (2.8) 式知

$$\begin{aligned} \left| \int_v^{\tilde{\delta}} D_N(t) dt \right| &= \left| \int_v^{\tilde{\delta}} \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt \right| \\ &\leq \left| \int_v^{\tilde{\delta}} \sin(\pi(2N+1)t) \left(\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right) dt \right| + \left| \int_v^{\tilde{\delta}} \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt \right| \\ &\leq \int_v^{\tilde{\delta}} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + \left| \int_0^{\tilde{\delta}} \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt - \int_0^v \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt \right| \\ &\leq \int_v^{\tilde{\delta}} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + 2 \sup_{M > 0} \left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| =: I_{1,1} + I_{1,2}, \end{aligned}$$

往证 $\lim_{N \rightarrow \infty} (I_{1,1} + I_{1,2}) = 0$. 为了估计 $I_{1,1}$, 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi t - \sin(\pi t)}{\pi t \sin(\pi t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi - \pi \cos(\pi t)}{\pi \sin(\pi t) + \pi^2 t \cos(\pi t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi^2 \sin(\pi t)}{\pi^2 \cos(\pi t) + \pi^2 \cos(\pi t) - \pi^3 t \sin(\pi t)} = 0, \end{aligned}$$

故根据极限定义知存在 $\delta_1 > 0$ 使得当 $t \in (0, \delta_1]$ 时有

$$\left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| < 1. \quad (2.15)$$

若 $\delta_1 \geq \tilde{\delta}$, 则

$$I_{1,1} \leq \int_0^{\delta_1} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt < \delta_1.$$

若 $\delta_1 < \tilde{\delta}$, 则由 $\sin x$ 在 $x \in [0, \frac{1}{2}]$ 上的单增性知

$$I_{1,1} \leq \int_0^{\delta_1} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + \int_{\delta_1}^{\tilde{\delta}} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt < \delta_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin(\pi \delta_1)} + \frac{1}{\pi \delta_1} \right).$$

对于 $I_{1,2}$, 因为

$$\int_0^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt = \int_0^1 \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt + \int_1^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt,$$

而 $|\sin(\pi t)| \leq |\pi t|$, 故

$$\left| \int_0^1 \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| \leq 1.$$

又因为 $\frac{1}{\pi t}$ 在 $[1, \infty)$ 上随着 $t \rightarrow \infty$ 而单调趋零, 且

$$\int_1^M \sin(\pi t) dt = -\frac{1}{\pi} (1 + \cos(M\pi))$$

在 $M \in [1, \infty)$ 时有界, 故由 Dirichlet 审敛法⁷知 $\int_1^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt$ 收敛, 于是

$$\left| \int_0^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| < \infty. \quad (2.16)$$

现由(2.16)式知

$$\infty > \left| \int_0^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| = \left| \lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right|,$$

故根据极限定义知存在 $M_1 \in (0, \infty)$ 使得当 $M > M_1$ 时有

$$\left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| \leq 1 + \left| \int_0^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right|.$$

而当 $M \in (0, M_1]$ 时, 由 $|\sin x| \leq x$ 知

$$\left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| \leq \int_0^{M_1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt \leq M_1,$$

于是

$$I_{1,2} \leq 2 \max \left\{ M_1, 1 + \left| \int_0^\infty \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt \right| \right\} =: \tilde{c}.$$

综上所述可知

$$\left| \int_v^{\tilde{\delta}} D_N(x) dx \right| \leq \delta_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin(\pi \delta_1)} + \frac{1}{\pi \delta_1} \right) + \tilde{c} =: c.$$

显见 c 是一个不依赖于 $\varepsilon, \tilde{\delta}$ 和 δ 的正常数, 从而

$$|I_1| \leq cg(\tilde{\delta} - 0) < \frac{\varepsilon}{2},$$

又由(2.14)式知对上述给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ 使得当 $N > N_0$ 时有

$$\left| \int_0^{\frac{1}{2}} g(t) D_N(t) dt \right| < |I_1| + |I_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

于是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{2}} g(t) D_N(t) dt = 0 = g(0+0).$$

至此(2.12)式得证, 定理因而得证. □

注 Jordan 审敛法2.2的结论是有意义的, 即在保持有界变差性不变的前提下, 改变 f 在 $[x - \delta, x + \delta]$ 中一个零测集上的值 (包括 f 在 x 点的值), 均不会改变 $f(x+0)$ 和 $f(x-0)$. 这是因为记改变值后的函数为 $\tilde{f}$, 因为 $f, \tilde{f}$ 都是

⁷ 设函数 f, g 在 $[a, \omega)$ 上有定义, 若 $f(x)$ 随着 $x \rightarrow \omega^-$ 单调趋零, 且 $G(x) := \int_a^x g(t) dt$ 在 $x \in [a, \omega)$ 上有界, 那么广义积分 $\int_a^\omega f(x)g(x)dx$ 收敛.

$[x - \delta, x + \delta]$ 上的有界变差函数, 故 $f(x \pm 0)$ 和 $\tilde{f}(x \pm 0)$ 均存在. 又因为 $\tilde{f}$ 和 f 本身只相差一个零测集, 故对任意 $\delta < \frac{1}{n}$, 总存在 $x_n^- \in [x - \delta, x]$ 和 $x_n^+ \in [x, x + \delta]$ 使得

$$f(x_n^-) = \tilde{f}(x_n^-), f(x_n^+) = \tilde{f}(x_n^+).$$

注意当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $x_n^- \rightarrow x - 0, x_n^+ \rightarrow x + 0$, 于是

$$f(x \pm 0) = \tilde{f}(x \pm 0).$$

此即欲证.

2.3 连续函数的 Fourier 级数

如果 f 在 x 的某邻域内满足 Lipschitz 型条件, 亦即存在 $a > 0, \delta > 0$ 使得 $|t| < \delta$ 时有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^a$, 则 f 必在 x 的同一个邻域内满足 Dini 审敛法 2.1 的 Dini 条件, 这是因为

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt \lesssim \int_{|t|<\delta} |t|^{a-1} dt \sim \int_0^\delta t^{a-1} dt \sim \delta^a < \infty.$$

然而, 在 x 的一个邻域里的连续函数未必满足在 x 点的一个邻域里的 Dini 条件. 例如取 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 并令

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{\log|x - \frac{1}{2}|}, & x \in (\delta, 1 - \delta), \\ 0, & x = 1/2, \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{\log|x - \frac{1}{2}|} = 0 = f\left(\frac{1}{2}\right),$$

故 f 在 $x = \frac{1}{2}$ 的邻域 $(\delta, 1 - \delta)$ 内连续, 由此及 $|t| < \frac{1}{2} - \delta \Leftrightarrow \frac{1}{2} + t \in (\delta, 1 - \delta)$ 进一步知

$$\begin{aligned} \int_{|t|<\frac{1}{2}-\delta} \left| \frac{f(t+1/2) - f(1/2)}{t} \right| dt &= \int_{|t|<\frac{1}{2}-\delta} \frac{1}{|t \log|t||} dt = -2 \int_0^{\frac{1}{2}-\delta} \frac{1}{t \log t} dt \\ &= -2 \int_0^{\frac{1}{2}-\delta} \frac{d \log t}{\log t} = -2 \log \log t \Big|_{t=0}^{t=\frac{1}{2}-\delta} = \infty \end{aligned}$$

故 f 在 $x = \frac{1}{2}$ 的邻域 $(\delta, 1 - \delta)$ 内不满足 Dini 条件.

另外, 前面已经说明过就算 f 在 x 点的一个邻域内满足 Dini 条件, f 也未必在 x 点连续, 所以 f 在 x 点连续与 f 在 x 点的一个邻域里满足 Dini 条件这两件事没有包含关系.

同样地, 显见有界变差函数未必连续⁸, 而连续函数也未必是有界变差函数⁹, 下面的定理与 Jordan 审敛法 2.2 联合起来也可以说明这一点.

定理 2.5 (P. du Bois-Reymond)

存在某连续函数, 其 Fourier 级数在某点发散.



Bois-Reymond 直接构造了满足该性质的一个函数, 不过下面我们用另一种方式断言这个连续函数的存在性, 即采用一致有界原理 (共鸣定理).

引理 2.6 (一致有界原理)

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范线性空间, $\{T_a\}_{a \in A}$ 是一族从 X 到 Y 的有界线性算子, 则要么

$$\sup_{a \in A} \|T_a\|_{X \rightarrow Y} < \infty$$

⁸但由有界变差函数的 Jordan 分解 2.4 知有界变差函数有至多可列个不连续点, 且由命题 2.1 知若 f 为有界, 分段连续且只有有限个极值点, 则其为有界变差函数.

⁹参见 [WL].

要么存在 $x \in X$ 使得

$$\sup_{a \in A} \|T_a x\|_Y = \infty.$$



回忆算子范数定义为 $\|T_a\|_{X \rightarrow Y} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|T_a x\|_Y$, 上述引理的证明在诸多泛函分析教科书中都能找到, 这里就不证明了. 下面开始证明 **Bois Reymond** 的结果 2.5:

证明 设 $X = (C(\mathbb{T}), \|\cdot\|_{L^\infty})$, $Y = \mathbb{C}$. 定义

$$T_N : X \rightarrow Y, f \mapsto T_N f = S_N f(0) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) D_N(t) dt.$$

定义 Lebesgue 数 L_N 为

$$L_N = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(t)| dt,$$

则对任意 $f \in X$ 均有

$$|T_N f| = \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) D_N(t) dt \right| \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(t)| |D_N(t)| dt \leq \left[\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(t)| dt \right] \|f\|_X = L_N \|f\|_X.$$

因此

$$\|T_N\|_{X \rightarrow Y} \leq L_N. \quad (2.17)$$

为证不等式 (2.17) 的反向不等式, 就需要对任意 $\varepsilon > 0$ 构造某个特定的 f 使得 $|T_N f| \geq L_N \|f\|_X - \varepsilon$. 观察到

$$D_N(t) = 0 \Leftrightarrow \pi(2N+1)t = k\pi (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \Leftrightarrow t = \frac{k}{2N+1} (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}).$$

因此

$$t = \frac{k}{2N+1} \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq \frac{k}{2N+1} \leq \frac{1}{2} (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \Leftrightarrow k \in \{-N, \dots, -1, 1, \dots, N\}.$$

这说明对每个给定的 $N \in \mathbb{N}$ 而言, $D_N(t)$ 只有 $2N$ 个零点, 将其重记为 $\{t_i\}_{i=1}^{2N}$. 观察到 $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 只在 $D_N(t)$ 的零点处不连续, 故为将其连续化, 取 $\delta > 0$ 充分小, 使得 $\{(t_k - \delta, t_k + \delta)\}_{k=1}^{2N}$ 互不相交且均含于 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 中, 在 $t_k - \delta$ 和 $t_k + \delta$ 处用直线将 $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 连接, 记依此构造的新函数为 f (见图 2.1), 则显见 f 连续且 $\|f\|_X = 1$.




图 2.1: $f(t)$ 示意图

进一步有

$$\begin{aligned} |T_N f| &= \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) D_N(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [\operatorname{sgn} D_N(t)] D_N(t) dt + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f(t) - \operatorname{sgn} D_N(t)] D_N(t) dt \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\geq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(t)| dt - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(t) - \operatorname{sgn} D_N(t)| |D_N(t)| dt \\
&= L_N - \sum_{k=1}^{2N} \int_{t_k-\delta}^{t_k+\delta} |f(t) - \operatorname{sgn} D_N(t)| |D_N(t)| dt \\
&\geq L_N - 4\delta MN,
\end{aligned} \tag{2.18}$$

其中 $M > 0$ 是 $|D_N(t)|$ 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的最大值, 其依赖于¹⁰ N . 因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta \in (0, \frac{\varepsilon}{4MN})$ 即可由(2.18)式得

$$\|T_N\|_{X \rightarrow Y} \geq |T_N f| \geq L_N - 4\delta MN > L_N - \varepsilon,$$

再由 ε 的任意性知

$$\|T_N\|_{X \rightarrow Y} \geq L_N.$$

由此及(2.17)式知 $\|T_N\|_{X \rightarrow Y} = L_N$. 因此只要能证明 $L_N \rightarrow \infty (N \rightarrow \infty)$, 就有

$$\sup_{N \in \mathbb{N}} \|T_N\|_{X \rightarrow Y} = \infty.$$

于是由一致有界原理2.6知存在 $f \in X$ 使得

$$\sup_{N \in \mathbb{N}} |T_N f| = \sup_{N \in \mathbb{N}} |S_N f(0)| = \infty.$$

从而存在 $\mathbb{N}$ 中的序列 $\{N_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 使得当 $j \rightarrow \infty$ 时 $N_j \rightarrow \infty$, 且

$$\lim_{j \rightarrow \infty} |S_{N_j} f(0)| = \infty.$$

由此及上极限的性质可知

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} |S_N f(0)| = \infty.$$

因此 f 在 0 点的 Fourier 级数必发散. 现在只需证明下述引理即可:

引理 2.7

对任意 $N \in \mathbb{N}$ 均有 $L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1)$, 这里 $O(1)$ 表示存在一个与 N 无关的正常数 C 使得 $|O(1)| \leq C$. 

这是因为本身有

$$\begin{aligned}
L_N &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(t)| dt \\
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right| dt \\
&= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right| dt,
\end{aligned}$$

又由(2.15)式知存在 $\delta_1 > 0$ 使得当 $t \in (0, \delta_1]$ 时有

$$\left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| < 1.$$

若 $\delta_1 \geq \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned}
&\left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right| dt - \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt \right| \\
&\leq \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \sin(\pi(2N+1)t) \left[\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right] \right| dt \\
&\leq \int_0^{\delta_1} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt < \delta_1,
\end{aligned}$$

¹⁰这个最大值是肯定存在的, 因为对每个固定的 N 而言, $D_N(t)$ 都是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的连续函数.

若 $\delta_1 \in (0, \frac{1}{2})$, 则利用 $\sin x$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 的单增性, 也有

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right| dt - \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt \right| \\ & \leq \int_0^{\delta_1} \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + \int_{\delta_1}^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{\sin(\pi t)} + \frac{1}{\pi t} \right] dt \\ & < \delta_1 + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sin(\pi \delta_1)} + \frac{1}{\pi \delta_1} \right]. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} L_N &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\ &= 2 \int_0^{N+\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\ &= 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + 2 \int_N^{N+\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1). \end{aligned}$$

又因为

$$\int_N^{N+\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt \leq \int_N^{N+\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2},$$

故

$$\begin{aligned} L_N &= 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{t+k} dt + O(1) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k} dt + \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{t} dt + O(1). \end{aligned}$$

又因为

$$\int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{\pi t} dt \leq \int_0^1 dt = 1,$$

故

$$L_N = \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k} dt + O(1).$$

因为

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \frac{1}{t+k} dt - \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \frac{1}{k+1} dt \right| \\ & \leq \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \left| \frac{1}{t+k} - \frac{1}{k+1} \right| dt = \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \frac{1-t}{(t+k)(k+1)} dt \\ & \leq \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \frac{1}{(t+k)^2} dt = \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^2} \\ & = \int_1^N \frac{dt}{t^2} \leq \int_1^\infty \frac{dt}{t^2} = 1, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} L_N &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} dt + O(1) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} \int_0^1 \sin(\pi t) dt + O(1) \\ &= \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} + O(1). \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} - \log N \right| &= \left| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} - \int_1^N \frac{dx}{x} \right| = \left| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} - \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} - \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \frac{dx}{x+k} \right| \leq \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \left| \frac{1}{k+1} - \frac{1}{x+k} \right| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \frac{1-x}{(k+1)(x+k)} dx \leq \sum_{k=1}^{N-1} \int_0^1 \frac{dx}{(x+k)^2} \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \frac{dx}{x^2} = \int_1^N \frac{dx}{x^2} \leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1, \end{aligned}$$

故

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

引理2.7至此得证. □

2.4 依范数收敛

测度论和 L^p 空间理论的发展让收敛问题有了全新的解决方案. 现在我们希望回答下面两个问题:

- (1) 给定 $p \in [1, \infty]$, 问对任意 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0$?
- (2) 给定 $p \in [1, \infty]$, 问对任意 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$ a.e.?

问题 (1) 需要下述引理作为铺垫.

引理 2.8

$S_N f$ 依 $L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p < \infty$) 范数收敛到 f , 当且仅当存在与 N 无关的常数 C_p 使得

$$\|S_N f\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{T})}, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{T}). \quad (2.19)$$



注 引理2.8说的实际上是依范数收敛和一致有界的等价性: 算子 S_N 具有依 L^p 范数收敛的性质当且仅当其在 $L^p \rightarrow L^p$ 的算子空间中有界, 亦即其关于输入元 f 一致有界.

证明 若 $S_N f$ 依 L^p ($1 \leq p < \infty$) 范数收敛到 f , 则将 $\{S_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ 视作算子族, 根据一致有界原理有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f\|_{L^p(\mathbb{T})} = \|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \Rightarrow \sup_{N \in \mathbb{N}} \|S_N\| < \infty \Rightarrow \exists C_p \left(\sup_{N \in \mathbb{N}} \|S_N\| = \sup_{N \in \mathbb{N}} \frac{\|S_N f\|_{L^p(\mathbb{T})}}{\|f\|_{L^p(\mathbb{T})}} \leq C_p \right).$$

此即(2.19)式.

另一方面, 若(2.19)式成立, 首先需要证明若 g 是三角多项式, 且其次数为 $\deg g$, 则当 $N \geq \deg g$ 时有 $S_N g = g$.

现设 g 是 N_1 次三角多项式且¹¹ $\deg g = N_1 \leq N$, 则

$$\begin{aligned}
 S_N g(x) &= \sum_{m=-N}^N \hat{g}(m) e^{i\pi m x} \\
 &= \sum_{m=-N}^N \left(\int_0^1 \sum_{k=-N_1}^{N_1} c_k e^{i2\pi k t} e^{i2\pi m t} dt \right) e^{i2\pi m x} \\
 &= \sum_{k=-N_1}^{N_1} c_k \sum_{m=-N}^N \left(\int_0^1 e^{i2\pi(k-m)t} dt \right) e^{i2\pi m x} \\
 &\stackrel{(A)}{=} \sum_{k=-N_1}^{N_1} c_k e^{i2\pi k x} = g(x), \quad \forall x \in \mathbb{T},
 \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $k \neq m$ 时 $\int_0^1 e^{i2\pi(k-m)t} dt = 0$, 故所证断言成立. 又因为三角多项式在 $L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密 (见推论 2.1), 故任取 $f \in L^p(\mathbb{T})$ 与 $\varepsilon > 0$ 总能找到三角多项式 g 使得 $\|f - g\|_{L^p(\mathbb{T})} < \frac{\varepsilon}{C_p + 1}$, 现当 $N \geq \deg g =: N_0$ 时有:

$$\begin{aligned}
 \|S_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} &= \|S_N(f - g) + S_N g - g + g - f\|_{L^p(\mathbb{T})} \\
 &= \|S_N(f - g) + g - f\|_{L^p(\mathbb{T})} \\
 &\leq \|S_N(f - g)\|_{L^p(\mathbb{T})} + \|g - f\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq (C_p + 1)\|g - f\|_{L^p(\mathbb{T})} < \varepsilon.
 \end{aligned}$$

因此 $\|S_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$), 命题即证. $\square$

之后会说明只要 $1 < p < \infty$, 则不等式 (2.19) 始终成立. 然而不等式 (2.19) 在 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时并不成立, 下面阐明理由.

当 $p = 1$ 时, 往证 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} = L_N$, 因为一旦此断言成立, 知对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 均有 $\|S_N f - f\|_{L^1(\mathbb{T})} \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$), 于是由引理 2.8 知 $L_N = \|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} \leq c_1$, 其中 c_1 是与 N 无关的正常数, 因而由 $L_N \rightarrow \infty$ ($N \rightarrow \infty$) 导出矛盾.

下证 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} = L_N$, 先证 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} \leq L_N$. 为此, 对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 与任意 $x \in \mathbb{T}$, 由定义知 $S_N f(x) = \int_0^1 f(x-t) D_N(t) dt$, 故由 Tonelli 定理有

$$\begin{aligned}
 \|S_N f\|_{L^1(\mathbb{T})} &= \int_0^1 \int_0^1 |f(x-t) D_N(t)| dt dx \\
 &= \int_0^1 \left(\int_0^1 |f(x-t)| dx \right) |D_N(t)| dt \\
 &= \|f\|_{L^1(\mathbb{T})} \int_0^1 |D_N(t)| dt \\
 &= L_N \|f\|_{L^1(\mathbb{T})},
 \end{aligned}$$

因此 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} \leq L_N$.

再说明 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} \geq L_N$. 回忆 Hahn-Banach 定理的推论:

引理 2.9

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 则对任意 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$ (其中 θ 表示 $\mathcal{X}$ 中的零元), 必存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 使得 $f(x_0) = \|x_0\|_{\mathcal{X}}$ 且 $\|f\|_{\mathcal{X}^*} = 1$.



注意到

$$\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} = \sup_{\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} \leq 1} \|S_N f\|_{L^1(\mathbb{T})} \stackrel{(A)}{=} \sup_{\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} \leq 1} \sup_{\|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \leq 1} |\langle S_N f, g \rangle|,$$

其中 (A) 是在引理 2.9 中代入 $\mathcal{X} = L^1(\mathbb{T})$. 现对任意满足 $\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} \leq 1$ 的 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 与满足 $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \leq 1$ 的

¹¹ 即 $g(x) = \sum_{k=-N_1}^{N_1} c_k e^{i\pi k x}$, 其中 c_{N_1} 或 c_{-N_1} 不为零.

$g \in L^\infty(\mathbb{T})$ 有:

$$\begin{aligned}
 \langle S_N f, g \rangle &:= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} S_N f(x) \overline{g(x)} dx \\
 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(x-t) f(t) dt \right) \overline{g(x)} dx \\
 &\stackrel{(B)}{=} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(x-t) \overline{g(x)} dx \right) f(t) dt \\
 &\stackrel{(C)}{=} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \overline{\left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(t-x) g(x) dx \right)} f(t) dt \\
 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) \overline{S_N g(t)} dt = \langle f, S_N g \rangle,
 \end{aligned}$$

其中 (B) 是 Fubini 定理, 可积性基于下式:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(x-t) f(t) \overline{g(x)}| dt dx &\leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(x-t) f(t)| dt dx \\
 &= \|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(x-t)| dx \right) |f(t)| dt \\
 &= \|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \|D_N\|_{L^1(\mathbb{T})} \|f\|_{L^1(\mathbb{T})} < \infty,
 \end{aligned}$$

而 (C) 是因为 D_N 是偶函数. 令 $g(x) = \operatorname{sgn} D_N(x)$, 则 $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = 1$.

下证 $S_N g$ 在 0 点连续. 事实上, 因为 $D_N(t)$ 是 $[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}]$ 上的连续函数, 故其在该区间上一致连续, 根据一致连续的定义进而知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in \left(0, \frac{1}{6}\right) \forall x \in \mathbb{T} \forall t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] (|x| < \delta \Rightarrow |D_N(x-t) - D_N(-t)| < \varepsilon),$$

于是

$$|S_N g(x) - S_N g(0)| = \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(t) (D_N(x-t) - D_N(-t)) dt \right| < \|g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \varepsilon = \varepsilon,$$

因而 $S_N g$ 在 0 点连续. 又因为 $S_N g$ 是实函数, 且 $S_N g(0) = L_N$, 故由连续的定义知

$$\forall \varepsilon \in (0, L_N) \exists \delta \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \forall x \in \mathbb{T} (|x| < \delta \Rightarrow S_N g(x) > L_N - \varepsilon).$$

令 $f := \frac{1}{2\delta} \chi_{|x| < \delta}$, 则

$$\begin{aligned}
 |\langle f, S_N g \rangle| &= \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) \overline{S_N g(x)} dx \right| \\
 &= \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) S_N g(x) dx \right| \\
 &= \frac{1}{2\delta} \int_{-\delta}^{\delta} S_N g(x) dx > L_N - \varepsilon,
 \end{aligned}$$

注意到 $\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} = 1$, 故 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} \geq |\langle f, S_N g \rangle| > L_N - \varepsilon$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} \geq L_N$, 故 $\|S_N\|_{L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})} = L_N$, 也即 $p = 1$ 时不等式(2.19)并不成立, 从而算子 S_N 不是 L^1 有界的.

当 $p = \infty$ 时, 首先说明对任意 $f \in C(\mathbb{T})$ 有 $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = \|f\|_{C(\mathbb{T})}$. 回忆

$$\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} := \inf_{\substack{E \subset \mathbb{T} \\ |E|=0}} \sup_{x \in \mathbb{T} \setminus E} |f(x)|, \quad \|f\|_{C(\mathbb{T})} := \max_{x \in \mathbb{T}} |f(x)|.$$

因为 $f \in C(\mathbb{T})$, 而 $\mathbb{T}$ 是紧集, 故不妨设 $\|f\|_{C(\mathbb{T})}$ 可在 $x_0 \in \mathbb{T}$ 达到, 即 $\|f\|_{C(\mathbb{T})} = |f(x_0)|$. 下面说明 $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \leq$

$\|f\|_{C(\mathbb{T})}$, 这是因为

$$\begin{aligned}\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} &= \inf_{\substack{E \subset \mathbb{T} \\ |E|=0}} \sup_{x \in \mathbb{T} \setminus E} |f(x)| \\ &\leq \inf_{\substack{E \subset \mathbb{T} \\ |E|=0}} \max_{x \in \mathbb{T}} |f(x)| \\ &= \max_{x \in \mathbb{T}} |f(x)| = \|f\|_{C(\mathbb{T})}.\end{aligned}\quad (2.20)$$

再说明 $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \geq \|f\|_{C(\mathbb{T})}$. 任取 $E \subset \mathbb{T}$ 满足 $|E| = 0$, 知对任意 $n \in \mathbb{N}$ 必有 $((x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}) \cap \mathbb{T}) \setminus E \neq \emptyset$, 否则 $E \supset ((x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}) \cap \mathbb{T})$, 因而 $|E| > \min\{1, \frac{1}{n}\} > 0$, 这与 $|E| = 0$ 矛盾! 因而必存在 $x_n \in ((x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}) \cap \mathbb{T}) \setminus E$. 知当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n \rightarrow x_0$, 由此及 f 的连续性进一步有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ ($n \rightarrow \infty$), 因此

$$\sup_{x \in \mathbb{T} \setminus E} |f(x)| \geq \max_{n \in \mathbb{N}} |f(x_n)| \geq |f(x_0)| = \|f\|_{C(\mathbb{T})},$$

故

$$\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = \inf_{\substack{E \subset \mathbb{T} \\ |E|=0}} \sup_{x \in \mathbb{T} \setminus E} |f(x)| \geq \|f\|_{C(\mathbb{T})}. \quad (2.21)$$

结合(2.20),(2.21)两式即得 $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = \|f\|_{C(\mathbb{T})}$.

现在考虑反证法, 设问题 (1) 在 $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ 时有肯定答案 (即 $\forall f \in L^\infty(\mathbb{T}) (\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = 0)$), 则由 $\{S_N f\}_{N \in \mathbb{N}} \subset L^\infty(\mathbb{T})$ 收敛知其为 $L^\infty(\mathbb{T})$ 中的基本列. 又因为 $\{S_N f\}_{N \in \mathbb{N}}$ 中的每个元素都是三角函数和, 故 $\{S_N f\}_{N \in \mathbb{N}} \subset C(\mathbb{T})$, 从而由上述断言知 $\{S_N f\}_{N \in \mathbb{N}}$ 是 $C(\mathbb{T})$ 中的基本列. 由 $C(\mathbb{T})$ 的完备性知

$$\exists g \in C(\mathbb{T}) (\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_N f - g\|_{C(\mathbb{T})} = 0).$$

从而

$$\begin{aligned}\|f - g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} &\leq \|f - S_N f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} + \|S_N f - g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} \\ &= \|f - S_N f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} + \|S_N f - g\|_{C(\mathbb{T})} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty,\end{aligned}$$

故 $\|f - g\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = 0$. 回忆对任意 $h \in L^\infty$, 总存在 $E_h \subset \mathbb{T}$ 满足 $|E_h| = 0$, 使得 $\|h\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = \sup_{x \in \mathbb{T} \setminus E_h} |h(x)|$. 因此, 若 $\|h\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = 0$, 则 $\sup_{x \in \mathbb{T} \setminus E_h} |h(x)| = 0$, 从而 $h(x) = 0$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{T}$ 均成立. 回到原命题, 这意味着对任意 $f \in L^\infty(\mathbb{T})$, 总存在 $g \in C(\mathbb{T})$ 使得 $f(x) = g(x)$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{T}$ 均成立, 但这不可能! 譬如令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \forall t \in [0, 1/3] \cup (2/3, 1], \\ -1, & \forall t \in (1/3, 2/3]. \end{cases}$$

若存在 $g \in C(\mathbb{T})$ 使得 $f(x) = g(x)$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{T}$ 成立, 则由 g 的连续性可知 $f(x) = g(x)$ 在 $\mathbb{T}$ 上点态成立, 但这意味着 g 在 $x = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 处不连续, 矛盾. 因此问题 (1) 对一般的 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 不一定成立.

注 事实上, 就算把问题 (1) 的条件加强为 $f \in L^\infty(\mathbb{T}) \cap C(\mathbb{T})$, 也不一定有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} = 0$. 这是因为如若结论成立, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_{C(\mathbb{T})} = 0$, 从而由 $C(\mathbb{T})$ 范数的定义知对任意 $t \in \mathbb{T}$ 均有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(t) = f(t)$, 但这与 Bois-Reymond 的结果 2.5 矛盾! 故所证断言成立.

当 $p = 2$ 时, 特别有下述 Parseval 恒等式成立:

定理 2.6 (Parseval 恒等式)

映射 $f \mapsto \{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $l^2(\mathbb{Z})$ 的等距映射, 亦即

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2.$$



证明 回忆 [ZGQ] 中给出的正交系完备化条件:

补充定理 2.1 (正交系完备化条件)

设 X 是 Hilbert 空间, 若 $S = \{e_\alpha : \alpha \in A\}$ 是 X 中的正交规范集, 则下述三个命题等价:

(i) S 是封闭的, 亦即对任意 $x \in X$ 均有展开式:

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

(ii) S 是完备的, 亦即 $S^\perp = \{\theta\}$.

(iii) Parseval 等式:

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2.$$



因为三角多项式在 L^2 中稠密, 故函数族 $\{e^{i2\pi kx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 作为正交规范集满足正交系完备化条件 2.1(ii), 另有:

$$(f, e^{i2\pi k(\cdot)}) = \int_{\mathbb{T}} f(t) \overline{e^{i2\pi kt}} dt = \int_{\mathbb{T}} f(t) e^{-i2\pi kt} dt = \widehat{f}(k).$$

故由正交系完备化条件 2.1(i),(iii) 知对任意 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中均有

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{i2\pi kx},$$

且

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2.$$

由此进一步知 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 为单射. 事实上, 若存在 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ 满足对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有 $\widehat{f}(k) = \widehat{g}(k)$, 则知 $\forall k \in \mathbb{Z} ((f - g)^\wedge(k) = 0)$, 从而

$$\|f - g\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |(f - g)^\wedge(k)|^2 = 0.$$

故 $\|f - g\|_{L^2(\mathbb{T})} = 0$, 亦即 $f = g$ 几乎处处成立, 故 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 为单射.

下面说明 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是满射. 任取 $a = \{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}} \in l^2(\mathbb{C})$, 由 $\{e^{i2\pi kx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 的正交性与 $a \in l^2(\mathbb{C})$ 易知 $\{\sum_{k=-N}^N a_k e^{i2\pi kx}\}_{N \in \mathbb{N}}$ 为 $L^2(\mathbb{T})$ 中的基本列, 故由 $L^2(\mathbb{T})$ 的完备性知存在 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 使得

$$\left\| f - \sum_{k=-N}^N a_k e^{i2\pi k(\cdot)} \right\|_{L^2(\mathbb{T})} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

故 $f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{i2\pi kx}$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中成立. 由内积的连续性与 $\{e^{i2\pi kx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 的正交性进一步知对任意 $m \in \mathbb{Z}$ 均有

$$(f, e^{i2\pi m(\cdot)}) = \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N a_k e^{i2\pi k(\cdot)}, e^{i2\pi m(\cdot)} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N a_k (e^{i2\pi k(\cdot)}, e^{i2\pi m(\cdot)}) = a_m.$$

故 $a_m = \widehat{f}(m)$, 因此 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}} = \{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}} = a$ 为满射, 因此 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 为 $L^2(\mathbb{T}) \rightarrow l^2(\mathbb{C})$ 的等距同构映射, 定理证毕. $\square$

从 Parseval 恒等式 2.6 出发可得下述命题:

命题 2.2 (Fourier 级数的 L^2 收敛性)

若 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 则 $\|S_N f - f\|_{L^2(\mathbb{T})} \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty)$.



证明 方法一: 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 由 Minkowski 不等式 1.7 知

$$\begin{aligned} \|S_N f\|_{L^2(\mathbb{T})} &= \left\| \sum_{k=-N}^N \widehat{f}(k) e^{i2\pi k(\cdot)} \right\|_{L^2(\mathbb{T})} \leq \left(\sum_{k=-N}^N |\widehat{f}(k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|f\|_{L^2(\mathbb{T})} < \infty, \end{aligned}$$

故 $S_N f \in L^2(\mathbb{T})$, 于是 $f - S_N f \in L^2(\mathbb{T})$. 又对任意 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$(f - S_N f)^\wedge(k) = \begin{cases} 0, & |k| \leq N, \\ \hat{f}(k), & |k| > N. \end{cases}$$

另注意到

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2 = \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 < \infty \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{|k| > N} |\hat{f}(k)|^2 = 0,$$

于是

$$\|f - S_N f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = \sum_{|k| > N} |\hat{f}(k)|^2 \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

此即欲证. □

方法二: 回忆对任意 $N \in \mathbb{N}$, 任意 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 与任意 $x \in \mathbb{T}$ 均有

$$S_N f(x) := \sum_{k=-N}^N \hat{f}(k) e^{i2\pi kx}.$$

由此及 $\{e^{i2\pi kx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 的正交性与 Parseval 恒等式 2.6 知

$$\|S_N f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 = (S_N f, S_N f) = \sum_{k=-N}^N |\hat{f}(k)|^2 \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2 = \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2,$$

即 $\|S_N f\|_{L^2(\mathbb{T})} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}$, 故由引理 2.8 可知

$$\|S_N f - f\|_{L^2(\mathbb{T})} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

此即欲证. □

相较于问题 (1), 问题 (2) 要复杂得多. 1926 年, A. Kolmogorov 给出了一个周期为 1 的可积函数, 其 Fourier 级数在每一点均发散, 即 $p = 1$ 时问题 (2) 不成立. 1965 年, L. Carleson 证明了对任意 $f \in L^2(\mathbb{T})$, f 的 Fourier 级数几乎处处收敛; 1967 年, R. Hunt 证明了对任意 $p \in (1, \infty]$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{T})$, f 的 Fourier 级数几乎处处收敛.

注 上述结果暗示 $\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{T}) \subsetneq L^1(\mathbb{T})$, 否则 Kolmogorov 的结果与 Carleson 等人的结果就矛盾了. 下一补充节将专门介绍这方面的内容.

2.5 补充: L^p 空间的进一步讨论

2.5.1 L^p 空间之间的包含关系

命题 2.3

$\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{T}) \subsetneq L^1(\mathbb{T})$.

证明 首先说明 $\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$. 当 $p = \infty$ 时, 任取 $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ 知

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} = \int_0^1 |f(x)| dx \leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} < \infty \Rightarrow f \in L^1(\mathbb{T}),$$

故 $L^\infty(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$. 而当 $p \in (1, \infty)$ 时, 任取 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 由 Hölder 不等式知

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} = \int_0^1 |f(x)| dx \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \cdot \mu(\mathbb{T})^{1-\frac{1}{p}} = \|f\|_{L^p(\mathbb{T})} < \infty,$$

故 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 亦即 $L^p(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$ ($1 < p < \infty$), 至此即得 $\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$.

下面说明存在 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 使得对任意 $p \in (1, \infty]$ 均有 $f \notin L^p(\mathbb{T})$. 事实上, 对任意 $x \in [0, 1]$, 令

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{x(1-\log x)^2}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad (2.22)$$

首先, f 确在 $L^1(\mathbb{T})$ 内, 这是因为

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} = \int_0^1 \frac{dx}{x(1-\log x)^2} = \int_0^1 \frac{d \log x}{(1-\log x)^2} = 1 < \infty,$$

其次, 任取 $p \in (1, \infty)$ 有

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{T})}^p = \int_0^1 \frac{dx}{x^p(1-\log x)^{2p}} = \frac{1}{p-1} \int_1^\infty \frac{du}{(1 + \frac{1}{p-1} \log u)^{2p}} \geq \infty,$$

其中最后一步是因为在 u 充分大时 $u^{\frac{1}{2p}} \geq \log u$. 因此 $f \notin \bigcup_{p \in (1, \infty)} L^p(\mathbb{T})$.

最后, 当 $p = \infty$ 时, 显见 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$, 故 $f \notin L^\infty(\mathbb{T})$. 因此 $f \notin \bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{T})$. $\square$

注 上述证明中 $f(x)$ 的构造其实有迹可循, 其思路与后文补充的 Orlicz 空间的构造是类似的: 需要说明函数具有 L^1 的可积性, 但不能有 $L^{1+\varepsilon}(\varepsilon > 0)$ 的可积性, 而 Orlicz 空间 $L \log L$ 正是一种介于这两个可积性之间的空间¹².

具体来说, 因为现在研究的背景空间是 $\mathbb{T}$, 在该背景下一个常见的用于构造 L^p 空间之间嵌入关系反例的函数正是 $f_1(x) = \frac{1}{x}$. 为了让函数能够周期延拓, 注意到 $f_1(1) = 1$, 故在爆破点 $x = 0$ 处同样可设 $f_1(0) = 1$. 显见 f_1 并不在 L^1 内, 其根本原因是 $\frac{1}{x}$ 的分母对应的指标 1 太大: 如果考察函数 $f_2(x) = \frac{1}{x^{1-\varepsilon}}(\varepsilon > 0)$, 很容易可以得到 $f_2 \in L^1(\mathbb{T})$. 但另一方面, 只要确定了这个 $\varepsilon > 0$, 当然能够找到 $\varepsilon' > 1$ 使得 $\varepsilon'(1-\varepsilon) < 1$, 于是 $f_2 \in L^{\varepsilon'}(\mathbb{T})$, 依旧不符合反例的需要. 这说明如果我们想在 f_1 的分母上做文章, 首先需要找到一个 $x \rightarrow 0$ 时趋向无穷的因子 $g(x)$ (例如 f_2 中 $g(x) = x^{-\varepsilon}$), 其次 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时趋向无穷的速度应该比任何形如 $x^{-\alpha}(\alpha > 0)$ 的函数都要慢 (也就是说对任意 $\alpha > 0$ 都应该有 $x^\alpha g(x) \rightarrow 0(x \rightarrow 0)$), 这种函数的一个经典例子便是 $\log x$, 于是我们接下来尝试 $f_3(x) = \frac{1}{x \log x}$.

可惜的是, 这样构造的 f_3 新增了 $x = 1$ 这一爆破点. 为了消除这一爆破点, 我们转而考虑 $f_4(x) = \frac{1}{x(C+\log x)}(C < 0)$, 其中 $C < 0$ 是因为我们不希望 $C+\log x$ 在 $(0, 1]$ 上有零点. 为了套用先前周期延拓的条件, 考虑 $f_4(1) = 1$, 但显然 $f_4(1) < 0$, 而这个符号的冲突仅仅是因为 $\log x$ 前面的符号为正, 所以可以把 f_4 修改为 $f_5(x) = \frac{1}{x(C-\log x)}(C > 0)$, 通过令 $f_5(1) = 1$ 即得 $C = 1$, 从而有 $f_5(x) = \frac{1}{x(1-\log x)}$. 现在检查 f_5 是否在 L^1 内, 可以发现

$$\int_0^1 \frac{dx}{x(1-\log x)} = \int_0^1 \frac{d \log x}{1-\log x} = \infty,$$

所以 f_5 依旧不在 L^1 中, 其原因在于 $(1-\log x)$ 的次数过小了. 现在把次数抬高, 考虑 $f_6(x) = \frac{1}{x(1-\log x)^{1+\varepsilon}}(\varepsilon > 0)$, 可知

$$\int_0^1 \frac{dx}{x(1-\log x)^{1+\varepsilon}} = \int_0^1 \frac{d \log x}{(1-\log x)^{1+\varepsilon}} = \frac{1}{\varepsilon} < \infty.$$

于是 $f_6 \in L^1(\mathbb{T})$. 现在只剩下说明 $f_6 \notin \bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{T})$ 了.

$f_6 \notin L^\infty(\mathbb{T})$ 是显然的. 对于 $p \in (1, \infty)$, 希望说明

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p(1-\log x)^{p(1+\varepsilon)}} = \infty.$$

通过令 $u = \frac{1}{x^p} \Rightarrow x = u^{-\frac{1}{p}}$ 可知

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p(1-\log x)^{p(1+\varepsilon)}} = -\frac{1}{p} \int_\infty^1 u \frac{u^{-\frac{1}{p}-1} du}{(1 + \frac{1}{p} \log u)^{p(1+\varepsilon)}} = \frac{1}{p} \int_1^\infty \frac{du}{u^{\frac{1}{p}} (1 + \frac{1}{p} \log u)^{p(1+\varepsilon)}}.$$

为了达到目标, 就需要说明 $u^{\frac{1}{p}} (1 + \frac{1}{p} \log u)^{p(1+\varepsilon)}$ 在 $u \rightarrow \infty$ 时是比 $u^{1-\varepsilon'}$ 低阶的无穷大, 其中 $\varepsilon' > 0$ 是一个足够小的常数 (这样一来, 前述积分就不小于 $\int_1^\infty \frac{du}{u^{1-\varepsilon'}} = \infty$, 反例构造就结束了). 因为 $u \rightarrow \infty$ 时, $\log u$ 趋向无穷的速度比任意形如 $u^\alpha(\alpha > 0)$ 的函数都要慢 (对 $(\log u)^\beta(\beta > 0)$ 也有类似结论), 所以总可以找到一个足够小的 $\alpha > 0$,

¹²当然, Orlicz 空间中的元素并不能作为这里的反例, 因为它的特点是不满足 L^1 可积性, 但满足 $L^{1+\varepsilon}(\varepsilon > 0)$ 可积性 (例如 $\frac{1}{x}$ 在 $[1, \infty)$ 上的表现).

使得 $\frac{1}{p} + \alpha < 1$, 于是

$$u^{\frac{1}{p}} \left(1 + \frac{1}{p} \log u\right)^{p(1+\varepsilon)} \lesssim u^{\frac{1}{p}+\alpha}, \quad u \rightarrow \infty.$$

至此即得前述积分为 ∞ , 也就是 $f_6 \notin \bigcup_{p \in (1, \infty)} L^p(\mathbb{T})$. 命题 2.3 的证明过程所考虑的正是 $\varepsilon = 1$ 这一特殊情况.

命题 2.3 的结论可以拓展到任意指标:

命题 2.4

对任意 $p_0 \in (0, \infty)$, 均有 $\bigcup_{p \in (p_0, \infty]} L^p(\mathbb{T}) \subsetneq L^{p_0}(\mathbb{T})$.

证明 令 f 是命题 2.3 证明中构造的函数, 则由命题 2.3 可知 $f^{\frac{1}{p_0}} \in L^{p_0}(\mathbb{T})$, 且 $f^{\frac{1}{p_0}} \notin L^p(\mathbb{T}) (p \in (p_0, \infty])$. $\square$

但在背景空间为 $\mathbb{R}$ 时, 因为 $\mu(\mathbb{R}) = \infty$, 便没有相互包含的结论了:

命题 2.5

$\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{R})$ 与 $L^1(\mathbb{R})$ 互不包含.

证明 首先说明 $L^1(\mathbb{R}) \not\subset \bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{R})$. 设 f 是命题 2.3 中构造的函数在 $\mathbb{R}$ 上的周期延拓, 定义

$$g(x) := f(x) \chi_{[0,1]}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

则由命题 2.3 知 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 且 $g \notin L^p(\mathbb{R}) (p \in (1, \infty])$, 故 $L^1(\mathbb{R}) \not\subset \bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{R})$.

再说明 $\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{R}) \not\subset L^1(\mathbb{R})$. 令

$$h(x) := \frac{\chi_{(1, \infty)}}{x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

则显见 $h \notin L^1(\mathbb{R})$, 但 $h \in L^p(\mathbb{R}) (p \in (1, \infty])$, 故 $\bigcup_{p \in (1, \infty]} L^p(\mathbb{R}) \not\subset L^1(\mathbb{R})$. $\square$

关于 L^p 空间之间的包含关系与背景空间的联系, [FL] 给出了一个有趣的命题:

命题 2.6

设 (X, Σ, μ) 是测度空间, $0 < p < q < \infty$, 则

- (i) $L^p(X) \not\subset L^q(X)$ 当且仅当 X 包含任意小的正测度集;
- (ii) $L^q(X) \not\subset L^p(X)$ 当且仅当 X 包含任意大的有限测度集.

证明 (i) 若 X 包含任意小的正测度集, 则存在集族 $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ 使得 $\mu(E_n) = 2^{-2n} (\forall n \in \mathbb{N})$. 记

$$F_n := E_n \setminus \bigcup_{i=n+1}^{\infty} E_i, \quad n \in \mathbb{N},$$

则 F_n 互不相交, 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $0 < \mu(F_n) < 2^{-n}$. 令

$$f(x) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n)^{-\frac{1}{q}} \chi_{F_n}(x),$$

则根据 F_n 的不交性可知

$$\|f\|_{L^p(X)}^p = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n)^{-\frac{p}{q}} \mu(F_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n)^{1-\frac{p}{q}} < \infty,$$

且

$$\|f\|_{L^q(X)}^q = \sum_{n \in \mathbb{N}} 1 = \infty.$$

这说明 $f \in L^p(X)$, $f \notin L^q(X)$, 亦即 $L^p(X) \not\subset L^q(X)$.

若 $L^p(X) \not\subset L^q(X)$, 往证 X 包含任意小的正测度集. 用反证法, 设 X 子集测度不能任意小, 亦即

$$\exists \alpha > 0 \forall E \in \Sigma (\mu(E) = 0 \vee \mu(E) \geq \alpha). \quad (2.23)$$

下面说明在(2.23)式成立时有

$$\forall f \in L^p(X) \exists N \in \mathbb{N} (\mu(\{x \in X : |f(x)| \geq N\}) = 0). \quad (2.24)$$

这是因为如若不然, 则

$$\exists f \in L^p(X) \forall n \in \mathbb{N} (\mu(\{x \in X : |f(x)| \geq n\}) > 0),$$

根据(2.23)式可知 $\mu(\{x \in X : |f(x)| \geq n\}) \geq \alpha$, 于是

$$\begin{aligned} \alpha n^p &\leq \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq n\}) n^p \leq \int_{\{|f(x)| \geq n\}} n^p d\mu \\ &\leq \int_{\{|f(x)| \geq n\}} |f(x)|^p d\mu \leq \int_X |f(x)|^p d\mu < \infty. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得矛盾, 故(2.24)式成立, 因此任取 $f \in L^p(X)$ 可得

$$\begin{aligned} \int_X |f(x)|^q d\mu &= \int_{\{|f(x)| < 1\}} |f(x)|^q d\mu + \int_{\{1 \leq |f(x)| < N\}} |f(x)|^q d\mu + \int_{\{|f(x)| \geq N\}} |f(x)|^q d\mu \\ &= \int_{\{|f(x)| < 1\}} |f(x)|^q d\mu + \int_{\{1 \leq |f(x)| < N\}} |f(x)|^q d\mu \\ &\leq \int_{\{|f(x)| < 1\}} |f(x)|^q d\mu + N^{q-p} \int_{\{1 \leq |f(x)| < N\}} |f(x)|^p d\mu < \infty. \end{aligned}$$

这说明 $f \in L^q(X)$, 从而 $L^p(X) \subset L^q(X)$, 矛盾! 命题因而得证.

(ii) 若 X 包含任意大的有限测度集, 则存在集族 $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ 使得 $\mu(E_n) = 2^n (\forall n \in \mathbb{N})$. 记

$$F_n := E_n \setminus \bigcup_{i=0}^{n-1} E_i, \quad n \in \mathbb{N},$$

其中 $E_0 := \emptyset$. 显见 F_n 互不相交, 且对任意给定的 $n \in \mathbb{N}$ 至少有¹³ $\mu(F_n) \subset (1, \infty)$. 令

$$f(x) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n)^{-\frac{1}{q}} n^{-\frac{1}{q}} \chi_{F_n}(x),$$

则根据 F_n 的不交性可知

$$\|f\|_{L^q(X)}^q = \sum_{n \in \mathbb{N}} n^{-\frac{q}{p}} < \infty,$$

且

$$\|f\|_{L^p(X)}^p = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n)^{1-\frac{p}{q}} n^{-1} > \sum_{n \in \mathbb{N}} n^{-1} = \infty.$$

故 $L^q(X) \not\subset L^p(X)$.

若 $L^q(X) \not\subset L^p(X)$, 往证 X 包含任意大的有限测度集. 用反证法, 设 X 子集测度不能任意大, 亦即

$$\exists A \in (0, \infty) \forall E \in \Sigma (\mu(E) \leq A \vee \mu(E) = \infty). \quad (2.25)$$

下面说明在(2.25)式成立时有

$$\forall f \in L^q(X) \forall n \in \mathbb{N} \left(\mu \left(\left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n} \right\} \right) \leq A \right). \quad (2.26)$$

这是因为如若不然, 则

$$\exists f_0 \in L^q(X) \exists n_0 \in \mathbb{N} \left(\mu \left(\left\{ x \in X : |f_0(x)| \geq \frac{1}{n_0} \right\} \right) > A \right),$$

根据(2.25)式可知 $\mu(\{x \in X : |f_0(x)| \geq \frac{1}{n_0}\}) = \infty$, 于是

$$\begin{aligned} \|f_0\|_{L^q(X)}^q &= \int_X |f_0(x)|^q d\mu \geq \int_{\{|f_0(x)| \geq \frac{1}{n_0}\}} |f_0(x)|^q d\mu \\ &\geq \int_{\{|f_0(x)| \geq \frac{1}{n_0}\}} \frac{d\mu}{n_0^q} = \frac{1}{n_0^q} \mu \left(\left\{ x \in X : |f_0(x)| \geq \frac{1}{n_0} \right\} \right) = \infty. \end{aligned}$$

¹³这是因为 $\mu(F_n) \geq \mu(E_n) - \sum_{k=0}^{n-1} \mu(E_k) > 2^n - (2^n - 1) = 1$.

这与 $f_0 \in L^q(X)$ 矛盾! 故(2.26)式成立, 结合(2.26)式与单调收敛定理可知对任意 $f \in L^q(X)$ 有

$$\begin{aligned}\mu(\{x \in X : |f(x)| > 0\}) &= \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\left\{x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \leq A,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\int_X |f(x)|^p d\mu &= \int_{\{|f(x)| \geq 1\}} |f(x)|^p d\mu + \int_{\{0 < |f(x)| < 1\}} |f(x)|^p d\mu \\ &\leq \int_{\{|f(x)| \geq 1\}} |f(x)|^p d\mu + A \leq \|f\|_{L^q(X)}^q + A < \infty.\end{aligned}$$

这说明 $f \in L^p(X)$, 亦即 $L^q(X) \subset L^p(X)$, 矛盾! 命题因而得证. $\square$

注 Terence Tao 在其讲义 **Introduction, estimates, L^p theory, interpolation** 中提到“在指标 p 变大时, 空间 L^p 中的函数渐渐地不再具有高且窄的尖点, 而在指标 p 变小时, 空间 L^p 中的函数渐渐地不再具有矮且宽的尾¹⁴.”一般可以用 $x^{-\alpha}$ 型函数理解这一几何直观, 而命题2.6提供了处理函数所要求的精细度与广度这一理解方式: L^p 空间中的函数均由示性函数的可数线性组合构成, 而在表示高且窄的尖点时, 所需的示性函数对应集合测度将越来越小, 这便对背景空间的精细度提出了要求. 当背景空间 X 的精细度不够 (无法包含任意小的正测度集), 在 $L^p(X)$ 中就无法构造这种具有尖点的函数 (亦即(2.24)式成立). 同理, 在表示矮且宽的远点时, 所需的示性函数对应集合测度将越来越大, 如果背景空间 X 的广度不够 (无法包含任意大的有限测度集), 在 $L^p(X)$ 中就无法构造这种在远处具有大支集的函数 (亦即(2.26)式成立).

2.5.2 L^p 范数极限

本小节着重讨论 L^p 空间在指标 p 具有某种趋向时, 其中的范数具有的表现.

命题 2.7 (L^p 指标在无穷大的极限表现)

设 (X, Σ, μ) 为测度空间, 若存在 $p \in (0, \infty)$ 使得 $f \in L^p(X)$, 则 $\|f\|_{L^\infty(X)} = \lim_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)}$ (尽管它们未必有限), 其中约定序列 $\{\infty\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的极限为 ∞ .

证明 首先说明 $\limsup_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)} \leq \|f\|_{L^\infty(X)}$. 若 $\|f\|_{L^\infty(X)} = 0$ 或 ∞ , 则该式显然成立, 下设 $\|f\|_{L^\infty(X)} \in (0, \infty)$. 此时对任意 $q \in (p, \infty)$ 有:

$$\|f\|_{L^q(X)}^q \leq \int_X |f(x)|^{q-p} |f(x)|^p d\mu \leq \|f\|_{L^\infty(X)}^{q-p} \|f\|_{L^p(X)}^p,$$

故¹⁵ $\|f\|_{L^q(X)}^{q-p} \leq \|f\|_{L^\infty(X)}^{q-p}$, 亦即¹⁶ $\|f\|_{L^q(X)} \leq \|f\|_{L^\infty(X)}$, 从而 $\limsup_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)} \leq \|f\|_{L^\infty(X)}$.

再说明 $\|f\|_{L^\infty(X)} \leq \liminf_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)}$. 若 $\|f\|_{L^\infty(X)} = 0$, 则该式显然成立. 若 $\|f\|_{L^\infty(X)} \in (0, \infty)$, 则对任意 $\gamma \in (0, 1)$ 定义

$$E_\gamma := \{x \in X : |f(x)| > \gamma \|f\|_{L^\infty(X)}\},$$

则 $\mu(E_\gamma) \in (0, \mu(X)]$, 这是因为如若 $\mu(E_\gamma) = 0$, 则 $\|f\|_{L^\infty(X)} \leq \gamma \|f\|_{L^\infty(X)} \Rightarrow \gamma \geq 1$, 这与 γ 的设置矛盾! 因此

$$\|f\|_{L^p(E_\gamma)} = \left(\int_{E_\gamma} |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \geq \left(\int_{E_\gamma} \gamma^p \|f\|_{L^\infty(X)}^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \geq \gamma \mu(E_\gamma)^{\frac{1}{p}} \|f\|_{L^\infty(X)} > 0.$$

现对任意 $q \in (p, \infty)$ 知

$$\|f\|_{L^q(X)}^q \geq \int_{E_\gamma} |f(x)|^{q-p} |f(x)|^p d\mu \geq \gamma^{q-p} \|f\|_{L^\infty(X)}^{q-p} \int_{E_\gamma} |f(x)|^p d\mu = \gamma^{q-p} \|f\|_{L^\infty(X)}^{q-p} \|f\|_{L^p(E_\gamma)}^p,$$

¹⁴原文为 short broad tails, 可以联想正态分布中大幅偏离中心, 取值小的那些点构成的集合.

¹⁵特意排除 $\|f\|_{L^\infty(X)} = 0$ 正是为了这一步可以正常进行: 保证除数非 0.

¹⁶特意排除 $\|f\|_{L^\infty(X)} = \infty$ 正是为了这一步可以正常进行: 保证乘方正常进行.

又因为 $f \in L^p(X)$, 故 $\|f\|_{L^p(E_\gamma)} < \infty$, 从而

$$\|f\|_{L^q(X)} \geq (\gamma \|f\|_{L^\infty(X)})^{\frac{q-p}{q}} \|f\|_{L^p(E_\gamma)}^{\frac{p}{q}}.$$

因此

$$\liminf_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)} \geq \gamma \|f\|_{L^\infty(X)}.$$

由 γ 的任意性即得

$$\liminf_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)} \geq \|f\|_{L^\infty(X)}.$$

最后, 若 $\|f\|_{L^\infty(X)} = \infty$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 记 $G_n := \{x \in X : |f(x)| > n\}$, 下面分两种情况讨论:

若存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(G_{n_0}) = \infty$, 则对任意 $q \in (0, \infty)$ 有

$$\|f\|_{L^q(X)} \geq \|f\|_{L^q(G_{n_0})} \geq n_0 \mu(G_{n_0})^{\frac{1}{q}} = \infty,$$

但 $f \in L^p(X)$, 取 $q = p$ 即得矛盾.

若对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\mu(G_n) < \infty$, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与 $q \in (0, \infty)$ 均有

$$\|f\|_{L^q(X)} \geq \|f\|_{L^q(G_n)} \geq n \mu(G_n)^{\frac{1}{q}},$$

因此 $\liminf_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)} \geq n$, 由 n 的任意性即得 $\liminf_{q \rightarrow \infty} \|f\|_{L^q(X)} \geq \infty = \|f\|_{L^\infty(X)}$. 命题至此得证. $\square$

命题 2.8 (L^p 指标在 1 的极限表现)

设 (X, Σ, μ) 为 σ 有限测度空间, f 是 μ 可测函数, 且 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} < \infty$, 则 $\|f\|_{L^1(X)} = \lim_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)}$.

证明 先设 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} \in (0, \infty)$, 此时对任意 $\theta \in (0, 1)$, 取 $p_0 \in (1, \infty)$ 满足

$$\frac{1}{p_0} = \frac{\theta}{1} + \frac{1-\theta}{p},$$

显见 $p_0 \in (1, p)$, 由 Hölder 不等式知

$$\|f\|_{L^{p_0}(X)} \leq \|f\|_{L^1(X)}^\theta \|f\|_{L^p(X)}^{1-\theta},$$

令 $p \rightarrow 1^+$, 由 $p_0 \in (1, p)$ 知 $p_0 \rightarrow 1^+$, 故

$$\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} \leq \|f\|_{L^1(X)}^\theta \limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)}^{1-\theta}.$$

又因为 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} < \infty$, 故 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} \leq \|f\|_{L^1(X)}$. 而当 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} = 0$, 显见同样有 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} \leq \|f\|_{L^1(X)}$.

下证 $\|f\|_{L^1(X)} \leq \liminf_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)}$. 因为 X 是 σ 有限测度空间, 根据定义知存在 $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\mu(E_n) < \infty$, 且 $\chi_{E_n} \uparrow \mu(X) (n \rightarrow \infty)$. 由此, Fatou 引理与 Hölder 不等式知:

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^1(X)} &= \|f \liminf_{n \rightarrow \infty} \chi_{E_n}\|_{L^1(X)} \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \|f \chi_{E_N}\|_{L^1(X)} \\ &\leq \liminf_{N \rightarrow \infty} (\liminf_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} \mu(E_N)^{1-\frac{1}{p}}) \\ &= \liminf_{N \rightarrow \infty} \liminf_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} = \liminf_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)}. \end{aligned}$$

从而

$$\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} \leq \|f\|_{L^1(X)} \leq \liminf_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)}.$$

因此 $\lim_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} = \|f\|_{L^1(X)}$, 命题至此得证. $\square$

注 命题 2.8 中条件 $\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} < \infty$ 是必要的, 这是因为记 $X = [0, 1]$, f 是命题 2.3 中构造的函数, 则

$$\limsup_{p \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^p(X)} = \infty, \quad \|f\|_{L^1(X)} = 1 < \infty.$$

故 $\|f\|_{L^1(X)} \neq \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p(X)}$.

命题2.8的结论可以拓展到任意指标:

命题 2.9 (L^p 指标在正值的极限表现)

设 (X, Σ, μ) 为 σ 有限测度空间, $p \in (0, \infty)$, f 是 μ 可测函数, 且

$$\limsup_{q \rightarrow p^+} \|f\|_{L^q(X)} < \infty,$$

则 $\|f\|_{L^p(X)} = \lim_{q \rightarrow p^+} \|f\|_{L^q(X)}$.



证明 注意到

$$\limsup_{q \rightarrow p^+} \|f\|_{L^p(X)} < \infty \Leftrightarrow \limsup_{s \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^{sp}(X)} < \infty \Leftrightarrow \limsup_{s \rightarrow 1^+} \| |f|^p \|_{L^s(X)} < \infty,$$

由此及命题2.8知

$$\|f\|_{L^p(X)} = \| |f|^p \|_{L^1(X)}^{\frac{1}{p}} = \lim_{s \rightarrow 1^+} \| |f|^p \|_{L^s(X)}^{\frac{1}{p}} = \lim_{s \rightarrow 1^+} \|f\|_{L^{sp}(X)} = \lim_{q \rightarrow p^+} \|f\|_{L^q(X)}.$$

□

命题 2.10 (L^p 指标在 0 的极限表现)

设 $\mu(X) = 1, p \in (0, \infty), f \in L^p(X)$, 则对任意 $q \in (0, p)$ 均有 $f \in L^q(X)$, 且

$$\lim_{q \rightarrow 0^+} \|f\|_{L^q(X)} = e^{\int_X \log |f(x)| d\mu}.$$



证明 由 Jensen 不等式知, 对任意 $g \in L^1(X)$ 均有

$$\int_X \log |g(x)| d\mu \leq \log \left(\int_X |g(x)| d\mu \right),$$

令 $g(x) = |f(x)|^p$ 可得

$$\begin{aligned} \int_X \log |f(x)|^p d\mu &\leq \log \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right) \\ \Leftrightarrow p \int_X \log |f(x)| d\mu &\leq \log \left(\int_X |f(x)|^p d\mu \right) \\ \Leftrightarrow \int_X \log |f(x)| d\mu &\leq \log \|f\|_{L^p(X)} \\ \Leftrightarrow e^{\int_X \log |f(x)| d\mu} &\leq \|f\|_{L^p(X)}. \end{aligned} \tag{2.27}$$

另一方面, 取 $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset (0, p)$ 满足 $q_n \downarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与 $x \in X$, 记

$$\begin{aligned} h_n(x) &:= \frac{1}{p}(|f(x)|^p - 1) - \frac{1}{q_n}(|f(x)|^{q_n} - 1), \\ h(x) &:= \frac{1}{p}(|f(x)|^p - 1) - \log |f(x)|. \end{aligned}$$

易知

$$\lim_{q \rightarrow 0^+} \frac{1}{q}(t^q - 1) = \log t.$$

进一步有 $\frac{1}{q}(t^q - 1) \downarrow \log t (q \downarrow 0)$, 这是因为对任意 $x \in (0, \infty)$ 有

$$\left(\frac{t^x - 1}{x} \right)' = \frac{(t^x \log t)x - t^x + 1}{x^2} \geq 0.$$

由此可知 $0 \leq h_n \uparrow h$, 进而由 Beppo Levi 引理知在 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\int_X h_n(x) d\mu \uparrow \int_X h(x) d\mu,$$

进而当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\int_X \frac{1}{q_n}(|f(x)|^{q_n} - 1) d\mu \downarrow \int_X \log |f(x)| d\mu. \tag{2.28}$$

结合(2.27),(2.28)两式可知

$$\begin{aligned} e^{\int_X \log |f(x)| d\mu} &\leq \left[\int_X |f(x)|^{q_n} d\mu \right]^{\frac{1}{q_n}} = e^{\log \|f\|_{L^{q_n}(X)}} \\ &\leq e^{\frac{1}{q_n} (\int_X |f(x)|^{q_n} d\mu - 1)} \stackrel{(A)}{=} e^{\frac{1}{q_n} (\int_X [|f(x)|^{q_n} - 1] d\mu)}, \end{aligned}$$

其中 (A) 出于 $\mu(X) = 1$. 在上诸式中令 $n \rightarrow \infty$ 可知

$$e^{\int_X \log |f(x)| d\mu} \leq \lim_{p \rightarrow 0^+} \|f\|_{L^p(X)} \leq e^{\int_X \log |f(x)| d\mu}.$$

此即欲证. □

注 命题2.10中 $\mu(X) = 1$ 是必要的¹⁷. 这是因为考虑 $X := (1, \infty)$, 对任意 $x \in X$ 记 $f(x) = \frac{1}{x}$. 知 $p \in (1, \infty)$ 时, $f \in L^p(X)$; $p \in (0, 1]$ 时, $f \notin L^p(X)$, 故 $\lim_{p \rightarrow 0^+} \|f\|_{L^p(X)} = \infty$. 另一方面, 对任意 $x \in X$ 知 $\log |f(x)| = -\log x$, 故

$$\int_X \log |f(x)| dx = -\int_1^\infty \log x dx = -\infty,$$

因此 $e^{\int_X \log |f(x)| dx} = e^{-\infty} = 0$, 此即 $\lim_{p \rightarrow 0^+} \|f\|_{L^p(X)} \neq e^{\int_X \log |f(x)| dx}$.

2.6 求和法

在上一节对问题 (1) 的讨论中, 已经知道了在 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 时未必有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_{L^1(\mathbb{T})} = 0$. 现在为了从 Fourier 系数中还原出函数 f , 我们便需要对序列 $S_N f$ 作一定处理, 以期获得更好的收敛性. 在数学分析中, 我们曾接触过下述命题:

定理 2.7

若 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ 存在, 则算术平均极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}$ 存在, 且极限值恰为 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$. ♥

证明 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = A$, 则根据极限定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall k > N_1 \left(|a_k - A| < \frac{\varepsilon}{2} \right),$$

故 $k > N_1$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} - A \right| &= \left| \frac{(a_1 - A) + \cdots + (a_{N_1} - A) + \cdots + (a_k - A)}{k} \right| \\ &\leq \frac{1}{k} (|a_1 - A| + \cdots + |a_{N_1} - A|) + \frac{k - N_1}{k} \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

对上述取定的 N_1 , 因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} (|a_1 - A| + \cdots + |a_{N_1} - A|) = 0$, 根据极限定义知

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \forall k > N_2 \left(N_2 > N_1 \wedge \frac{1}{k} (|a_1 - A| + \cdots + |a_k - A|) < \frac{\varepsilon}{2} \right),$$

因此 $k > N_2$ 时:

$$\left| \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} - A \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{k - N_1}{k} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} = A = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k$. □

反之, 若对 $k \in \mathbb{N}$ 令 $a_k = (-1)^k$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} = 0$, 而 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ 不存在. 这说明序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的算术平均序列具有比序列本身更好的性质, 亦即在离散情形下我们可以利用序列对应的算术平均列改良对应性质. 在连续情形下, 这意味着球平均 $\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy$ 具有比函数 f 更好的性质.

现在回到 Fourier 级数收敛性的问题, 基于上述启发, 我们定义 Cesaro 求和如下:

$$\sigma_N f(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f(x) = \int_0^1 f(t) \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x-t) dt = \int_0^1 f(t) F_N(x-t) dt,$$

¹⁷这里 $\mu(X) = 1$ 和 $\mu(X) = A < \infty$ 作为条件而言是等价的, 因为总可以令 $\mu' : E \mapsto \frac{\mu(E)}{A}$ 使得 $\mu'(X) = 1$.

其中 $F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t)$ 称为 Fejér 核. 进一步, 因为

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N D_k(t) &= \sum_{k=0}^N \frac{\sin(\pi(2k+1)t)}{\sin(\pi t)} = \sum_{k=0}^N \frac{\sin(\pi(2k+1)t) \sin(\pi t)}{(\sin(\pi t))^2} \\ &= \frac{1}{(\sin(\pi t))^2} \frac{1}{2} \sum_{k=0}^N (\cos(2k\pi t) - \cos(2(k+1)\pi t)) = \frac{[\sin(\pi(N+1)t)]^2}{(\sin(\pi t))^2}, \end{aligned}$$

因此

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \left[\frac{\sin(\pi(N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right]^2.$$

F_N 具有下述性质:

(i) $F_N(t) \geq 0$,

(ii) $\|F_N\|_{L^1(\mathbb{T})} = \int_0^1 F_N(t) dt = 1$;

(iii) 若 $\delta > 0$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta < |t| < \frac{1}{2}} F_N(t) dt = 0$.

其中 (i) 是显见的, (ii) 是因为注意到 $\int_0^1 D_N(t) dt = 1$, 可知

$$\int_0^1 F_N(t) dt = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N \int_0^1 D_k(t) dt = 1.$$

而 (iii) 是因为对任意给定的 $\delta > 0$ 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta < |t| < \frac{1}{2}} F_N(t) dt \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+1} \frac{1}{\sin^2(\pi\delta)} = 0.$$

F_N 与 D_N 的本质区别就在于上述性质 (i): F_N 具有非负性, 而 D_N 不具有该性质, 进而 F_N 具有更好的衰减性. 这同样可由 Bois Reymond 的反例看出: 因为 D_N 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的积分并不绝对收敛, 故可以通过连续化 $\text{sgn } D_N$ 构造不收敛的反例; 而 F_N 具有非负性, 故至少这样的反例构造方法是行不通的. 事实上, Fourier 级数的 L^1 收敛性问题在 Fejér 核的背景下得到了解决:

定理 2.8 (Fejér 核的恒等逼近定理)

若下述两种情况有其一成立:

(i) $f \in L^p(\mathbb{T}) (1 \leq p < \infty)$;

(ii) f 是周期为 1 的连续函数, $p = \infty$,

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0.$$

证明 因为 $\int_0^1 F_N(t) dt = 1$, 由 Minkowski 积分不等式与 Lebesgue 积分的平移不变性知

$$\begin{aligned} \|\sigma_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} &= \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f(x-t) - f(x)] F_N(t) dt \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(x-t) - f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} |F_N(t)| dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} F_N(t) dt \\ &= \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} F_N(t) dt + \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} F_N(t) dt \\ &\leq \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} F_N(t) dt + 2\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} |F_N(t)| dt, \end{aligned}$$

其中 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ 待定.

当 $p \in [1, \infty)$ 时, 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 记 $g(x) := f(x)\chi_{[-1,1]}(x)$, 则 $g \in L^p(\mathbb{R})$. 根据 Lebesgue 积分的平均连续

性¹⁸知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R})} = 0.$$

又当 $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 时有

$$0 \leq \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} = \|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq \|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R})},$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0. \quad (2.29)$$

类似地, 当 $p = \infty$ 时, 因为 $\sigma_N f$ 与 f 此时都是连续函数, 回忆上一节在讨论问题 (1) 中 $p = \infty$ 的情况时提到过连续函数的一致范数与 L^∞ 范数相等, 因此

$$\begin{aligned} \|\sigma_N f - f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} &= \max_{x \in \mathbb{T}} \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f(x-t) - f(x)] F_N(t) dt \right| \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} F_N(t) dt \\ &= \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} F_N(t) dt + \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} F_N(t) dt \\ &\leq \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} F_N(t) dt + 2\|f\|_{C(\mathbb{T})} \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} F_N(t) dt. \end{aligned}$$

因为 $f \in C(\mathbb{T})$, 且 $[-1, 1]$ 是紧集, 故 f 在 $[-1, 1]$ 上一致连续, 根据一致连续的定义知:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0, \frac{1}{2}) \forall t \in [-\delta, \delta] \forall x \in \mathbb{T} (|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon).$$

这说明 $\|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} < \varepsilon$, 即(2.29)式在 $p = \infty$ 时依旧成立.

现在由(2.29)式知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall t \in [-\delta, \delta] \left(\|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} < \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

对现在取定的 ε, δ 而言, 由 F_N 的性质 (iii) 知存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得 $N > M$ 时有

$$\int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} F_N(t) dt < \frac{\varepsilon}{4[\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} + 1]},$$

故

$$\|\sigma_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} < \frac{\varepsilon}{2} \int_{|t| < \delta} F_N(t) dt + 2\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \frac{\varepsilon}{4[\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} + 1]} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

此即 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0$, 定理证毕. □

Fejér 核的恒等逼近定理2.8有下述重要推论.

推论 2.1

- (1) 三角多项式在 $L^p(\mathbb{T}) (1 \leq p < \infty)$ 中稠密.
- (2) 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 且对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有 $\hat{f}(k) = 0$, 则 f 几乎处处为零. 若 $f \in C(\mathbb{T})$, 且对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有 $\hat{f}(k) = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.
- (3) 若 $f \in C(\mathbb{T})$, 则 f 可由三角多项式一致逼近.



证明 (1) 利用 Fejér 核的恒等逼近定理2.8并注意到 $\sigma_N f$ 是三角多项式即可.

(2) 对前一命题应用 Fejér 核的恒等逼近定理2.8在 $p = 1$ 的情形, 后一命题应用 $p = \infty$ 的情形即可.

(3) 利用 Fejér 核的恒等逼近定理2.8并注意到 $\sigma_N f$ 是三角多项式即可. □

除前述考察算术平均的方法之外, 还有一种求和法是把 Fourier 级数写成 (复平面中) 单位圆上的形式极限, 定义:

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) z^{|k|}, \quad z = re^{i2\pi\theta}, \quad (2.30)$$

¹⁸Lebesgue 积分的平均连续性本身谈论的是 $\mathbb{R}$ 上的事, 但这里我们只知道 f 在 $\mathbb{T}$ 上的性质, 因此需要用函数 g 过渡到 $\mathbb{R}$ 上.

在 $f \in L^p(\mathbb{T}) (1 \leq p \leq \infty)$ 时, 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有

$$|\widehat{f}(k)| = \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) e^{-i2\pi kx} dx \right| \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(x)| dx = \|f\|_{L^1(\mathbb{T})} < \infty,$$

因此 $\{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 关于 k 一致有界, 由此可知函数 $u(z)$ 在 $|z| < 1$ (亦即 $r < 1$) 时绝对收敛, 进而 $u(z)$ 良定义. 在 $r < 1$ 时, 将 $z = re^{i2\pi\theta}$ 代入(2.30)式有

$$\begin{aligned} u(re^{i2\pi\theta}) &= \sum_{k=0}^{\infty} \widehat{f}(k) r^k e^{i2\pi k\theta} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \widehat{f}(k) r^{|k|} e^{-i2\pi |k|\theta} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(k) r^{|k|} e^{i2\pi k\theta} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) e^{-i2\pi kt} dt \right) r^{|k|} e^{-i2\pi k\theta} \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{i2\pi k(\theta-t)} dt \\ &=: \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) P_r(\theta-t) dt, \end{aligned}$$

其中

$$P_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{i2\pi kt}, \quad \forall t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

称为 $\mathbb{T}$ 上的 Poisson 核. 进一步有:

$$\begin{aligned} P_r(t) &= \sum_{k=-\infty}^{-1} r^{-k} e^{i2\pi kt} + \sum_{k=0}^{\infty} r^k e^{i2\pi kt} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} r^k e^{-i2\pi kt} + \frac{1}{1 - re^{i2\pi t}} \\ &= \frac{re^{-i2\pi t}}{1 - re^{-i2\pi t}} + \frac{1}{1 - re^{i2\pi t}} \\ &= \frac{1 - r^2}{1 - re^{i2\pi t} - re^{-i2\pi t} + r^2} \\ &= \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}. \end{aligned}$$

Poisson 核也有和 Fejér 核类似的性质:

(i) $P_r(t) \geq 0$;

(ii) $\int_0^1 P_r(t) dt = 1$;

(iii) 若 $\delta > 0$, 则 $\lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta < t < \frac{1}{2}} P_r(t) dt = 0$.

其中 (i) 是因为 $0 < r < 1$, 同时 $1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2 \geq 1 - 2r + r^2 = (1 - r)^2 \geq 0$; (ii) 是因为由 $r \in (0, 1)$ 知级数 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{i2\pi kt}$ 关于 $t \in [0, 1]$ 一致收敛, 于是

$$\int_0^1 P_r(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^1 r^{|k|} e^{i2\pi kt} dt = 1.$$

而 (iii) 是因为

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} P_r(t) dt = \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{1 - r^2}{1 + r^2} \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} \frac{dt}{1 - \frac{2r}{1+r^2} \cos(2\pi t)}, \quad (2.31)$$

又当 $\delta < |t| \leq \frac{1}{2}$ 时有 $-1 \leq \cos(2\pi t) < \cos(2\pi\delta)$, 故

$$\frac{1}{1 + \frac{2r}{1+r^2}} \leq \frac{1}{1 - \frac{2r}{1+r^2} \cos(2\pi t)} < \frac{1}{1 - \frac{2r}{1+r^2} \cos(2\pi\delta)}.$$

将上式代入(2.31)式即得欲证极限.

据此可以推知 Poisson 核的恒等逼近定理:

定理 2.9 (Poisson 核的恒等逼近定理)

若下述两种情况有一成立:

(i) $f \in L^p(\mathbb{T}) (1 \leq p < \infty)$;

(ii) f 是周期为 1 的连续函数, $p = \infty$,

则

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \|P_r * f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0.$$

证明 因为 $\int_0^1 P_r(t)dt = 1$, 由 Minkowski 积分不等式与 Lebesgue 积分的平移不变性知

$$\begin{aligned} \|P_r * f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} &= \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f(x-t) - f(x)] P_r(t) dt \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(x-t) - f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} |P_r(t)| dt \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} P_r(t) dt \\ &= \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} P_r(t) dt + \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} P_r(t) dt \\ &\leq \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} P_r(t) dt + 2\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} |P_r(t)| dt, \end{aligned}$$

其中 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ 待定.

当 $p \in [1, \infty)$ 时, 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 记 $g(x) := f(x)\chi_{[-1,1]}(x)$, 则 $g \in L^p(\mathbb{R})$. 根据 Lebesgue 积分的平均连续性知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R})} = 0.$$

又当 $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 时有

$$0 \leq \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} = \|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq \|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R})},$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0. \quad (2.32)$$

类似地, 当 $p = \infty$ 时, 因为 $P_r * f$ 和 f 此时都是连续函数, 故它们的 L^∞ 范数正是一致范数, 因此

$$\begin{aligned} \|P_r * f - f\|_{L^\infty(\mathbb{T})} &= \max_{x \in \mathbb{T}} \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f(x-t) - f(x)] P_r(t) dt \right| \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} P_r(t) dt \\ &= \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} P_r(t) dt + \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} P_r(t) dt \\ &\leq \int_{|t| \leq \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} P_r(t) dt + 2\|f\|_{C(\mathbb{T})} \int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} P_r(t) dt. \end{aligned}$$

因为 $f \in C(\mathbb{T})$, 且 $[-1, 1]$ 是紧集, 故 f 在 $[-1, 1]$ 上一致连续, 根据一致连续的定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \forall t \in [-\delta, \delta] \forall x \in \mathbb{T} (|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon).$$

这说明 $\|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{C(\mathbb{T})} < \varepsilon$, 亦即(2.32)式在 $p = \infty$ 时依旧成立.

现在由(2.32)式知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall t \in [-\delta, \delta] \left(\|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{T})} < \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

对现在取定的 ε, δ 而言, 由 P_r 的性质 (iii) 知存在 $\delta' > 0$ 使得 $1 - \delta' < r < 1$ 时有

$$\int_{\delta < |t| \leq \frac{1}{2}} P_r(t) dt < \frac{\varepsilon}{4[\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} + 1]},$$

故

$$\|P_r * f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} < \frac{\varepsilon}{2} \int_{|t| < \delta} P_r(t) dt + 2\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \frac{\varepsilon}{4[\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} + 1]} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

此即 $\lim_{r \rightarrow 1^-} \|P_r * f - f\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0$, 定理证毕. $\square$

实际上, 前面提到的

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) \bar{z}^{|k|}$$

在 $|z| < 1$ 上是调和函数, 也就是说 $(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2})u(x, y) = 0$ ($z = x + iy$). 从形式上来看, 首先需要证明

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = 4 \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z},$$

这是因为

$$\begin{cases} z = x + iy, \\ \bar{z} = x - iy, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \\ y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y}), \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y}). \end{cases}$$

于是根据 u 在 $|z| < 1$ 上的一致收敛性 (进而可以交换求和与求导) 可得

$$\Delta u(z) = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k \right) + 4 \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z} \left(\sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) \bar{z}^{|k|} \right) = 0.$$

因此, 根据 Poisson 核的恒等逼近定理 2.9 可知 (2.30) 式所定义的 u 是下述 Dirichlet 问题的解

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & |z| < 1. \\ u = f, & |z| = 1. \end{cases}$$

其中 $f \in L^p(\mathbb{T}) \wedge p \in [1, \infty)$ 或 $f \in C(\mathbb{T}) \wedge p = \infty$. 这一 Dirichlet 问题中 $u = f$ 指的是 $\lim_{r \rightarrow 1^-} \|u - f\|_{L^p(\mathbb{T})} = 0$.

注 尽管这件事在复变函数的课程中可能已经提过了, 但我们还是要强调: 对于一个定义在 $\mathbb{C}$ 上的函数 $f(x, y)$, 利用变换 $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ 和 $y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ 将其变成 $z, \bar{z}$ 的函数, 并把 $z, \bar{z}$ 看成独立变量进行微分, 依此判断 f 是否解析的这套方法是不严格的. L. Ahlfors 在 [LVA] 中指出: 对于 $\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y})$ 和 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y})$, 没有方便的极限定义形式, 只能把它们视作关于 z 和 $\bar{z}$ 的符号导数来定义¹⁹. 因此, 不能严格地把 z 和 $\bar{z}$ 看成独立变量来求微分, 这种方式只能作为理解参考. 复变函数断言 f 解析当且仅当 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 是在形式上说明了解析函数不依赖于 $\bar{z}$, 而只是 z 的一个函数. 这个形式也说明解析函数真正是一个复变量的函数, 而不仅仅是两个变量的复值函数.

2.7 补充: 高维 Fourier 级数

本节选自 [LG1]. 前文讨论的基本都是 $\mathbb{T}$ 上的 Fourier 级数, 亦即一维情况的 Fourier 级数, 本节则讨论 $\mathbb{T}^n$ 上的 Fourier 级数.

类似于一维 Fourier 级数的讨论中引入了一维环 $\mathbb{T}$, 在高维 Fourier 级数的讨论中也需要引入 n 维环 $\mathbb{T}^n$. 从直观的角度来讲, n 维环 $\mathbb{T}^n$ 是对边相等的方体 $[0, 1]^n$, 也就是说对于点 $(x_1, \dots, 0, \dots, x_n), (x_1, \dots, 0, \dots, x_n)$ 而言, 只要 0 和 1 同为第 k 个坐标, 那么这两个点就是一样的. 更精确的来说, 称 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 等价 (记作 $x \equiv y$) 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Z}^n$, 其中 $\mathbb{Z}^n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中全体整数点形成的加群. 显见 $\equiv$ 是一个等价关系, 于是它可以把 $\mathbb{R}^n$ 划分成诸多等价类, n 维环 $\mathbb{T}^n$ 就依照这些等价类定义为 $\mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$. 根据抽象代数的知识可知 n 维环依旧是加群, 且其加法单位元为 0. 但因为 0 和 1 在 n 维环中地位是相等的, 为了避免同一个单位元出现两次, 一般都设 n 维环为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^n$.

¹⁹原文为 These expressions have no convenient definition as limits, but we can nevertheless introduce them as symbolic derivatives with respect to z and $\bar{z}$.

n 维环 $\mathbb{T}^n$ 同样可看作 $\mathbb{C}^n$ 的子集:

$$\{(e^{i2\pi x_1}, \dots, e^{i2\pi x_n}) \in \mathbb{C}^n : (x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n\}. \quad (2.33)$$

$\mathbb{T}^n$ 上的函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $f(x+m) = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}^n, m \in \mathbb{Z}^n$), 这样的函数称为在每个坐标中周期为 1. $\mathbb{T}^n$ 上用于积分的测度是 n 维 Lebesgue 测度在 $\mathbb{T}^n = [0, 1]^n$ 上的限制, 这个测度依旧记为 dx , 集合 $A \subset \mathbb{T}^n$ 的测度记为 $|A|$. 根据 Lebesgue 测度的平移不变性与 $\mathbb{T}^n$ 中函数的周期性可知, 对 $\mathbb{T}^n$ 上的全体可积函数 f 都有:

$$\int_{\mathbb{T}^n} f(x) dx = \int_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^n} f(x) dx = \int_{[a_1, 1+a_1] \times \dots \times [a_n, 1+a_n]} f(x) dx. \quad (2.34)$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 是任意实数. 从周期性的视角来看, 环上的分部积分不会产生边界项 (也就是形如 $uv|_{x=0}^1$ 的项), 于是对 $\mathbb{T}^n$ 上的任意连续可微函数 f, g 都有:

$$\int_{\mathbb{T}^n} \partial^\alpha f(x) g(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{T}^n} \partial^\alpha g(x) f(x) dx.$$

特别注意 $\mathbb{T}^n$ 上的内积与距离和 $\mathbb{R}^n$ 保持一致. 结合这些性质, 下面给出高维 Fourier 系数的定义:

定义 2.3 (高维 Fourier 系数)

对复值函数 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$ 与整数点 $m \in \mathbb{Z}^n$ 而言, 定义

$$\widehat{f}(m) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-i2\pi m \cdot x} dx. \quad (2.35)$$

称 $\widehat{f}(m)$ 为 f 的第 m 个 Fourier 系数. 另外, 对 $\mathbb{T}^n$ 上的有限 Borel 测度 μ 与 $m \in \mathbb{Z}^n$ 而言, μ 的第 m 个 Fourier 系数定义为:

$$\widehat{\mu}(m) = \int_{\mathbb{T}^n} e^{-i2\pi m \cdot x} d\mu. \quad (2.36)$$



特别注意对 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Z}^n$ 而言 $\widehat{f}(\xi)$ 无定义, 这是因为函数 $x \mapsto e^{-i2\pi \xi \cdot x}$ 并非周期为 1 的函数, 因此它在 $\mathbb{T}^n$ 上不是良定义的. f 在 $x \in \mathbb{T}^n$ 的高维 Fourier 级数为:

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(m) e^{i2\pi m \cdot x}. \quad (2.37)$$

若设 $(\tau^y f)(x) = f(x-y)$, $\widetilde{f}(x) = f(-x)$, 则容易证明高维 Fourier 系数具有下述性质:

命题 2.11 (高维 Fourier 系数的性质)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{T}^n)$, 记 $\widetilde{f}(x) = f(-x)$, $\tau^y f(x) = f(x+y)$, 则对任意 $m, k \in \mathbb{Z}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, y \in \mathbb{T}^n$ 与任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有:

- (i) 线性性: $(\alpha f + \beta g)^\wedge(m) = \alpha \widehat{f}(m) + \beta \widehat{g}(m)$;
- (ii) 与共轭的交换: $\widehat{\widetilde{f}}(m) = \overline{\widehat{f}(-m)}$;
- (iii) 与反射的交换: $\widehat{\widetilde{\widetilde{f}}}(m) = \widehat{f}(-m)$;
- (iv) 平移性质: $\tau^y f(m) = \widehat{f}(m) e^{-i2\pi m \cdot y}$, $(e^{i2\pi k(\cdot)} f)^\wedge(m) = \widehat{f}(m-k)$;
- (v) $\widehat{f}(0) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) dx$;
- (vi) $\sup_{m \in \mathbb{Z}^n} |\widehat{f}(m)| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{T}^n)}$;
- (vii) 卷积公式: $(f * g)^\wedge(m) = \widehat{f}(m) \widehat{g}(m)$;
- (viii) 只要 $f \in C^\alpha(\mathbb{T}^n)$, 就有 $(\partial^\alpha f)^\wedge(m) = (i2\pi m)^\alpha \widehat{f}(m)$.



上述诸性质可以完全套用到一维情形.

注 与一维情况不同的是, 高维 Fourier 系数还有下述张量性质: 对 $\mathbb{T}^{n_1}$ 上的函数 f_1 与 $\mathbb{T}^{n_2}$ 上的函数 f_2 而言, 张量函数

$$(f_1 \otimes f_2)(x_1, x_2) = f_1(x_1) f_2(x_2)$$

是 $\mathbb{T}^{n_1+n_2}$ 上的周期函数, 其 Fourier 系数为

$$\widehat{f_1 \otimes f_2}(m_1, m_2) = \widehat{f_1}(m_1) \widehat{f_2}(m_2), \quad \forall m_1 \in \mathbb{Z}^{n_1}, m_2 \in \mathbb{Z}^{n_2}.$$

定义 2.4 (高维三角多项式)

$\mathbb{T}^n$ 上的三角多项式是形如下式的函数:

$$P(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} a_m e^{i2\pi m \cdot x}, \quad (2.38)$$

其中 $\{a_m\}_{m \in \mathbb{Z}^n}$ 是 $\mathbb{Z}^n$ 上的紧支序列. P 的阶数 $\deg P$ 定义为:

$$\deg P = \max_{\substack{q=(q_1, \dots, q_n) \\ a_q \neq 0}} (|q_1| + \dots + |q_n|).$$



根据正交性可以说明 $\widehat{P}(m) = a_m$, 由此可以定义 n 维的 Dirichlet 核与 Fejer 核:

$$D_N(x) := \sum_{|m| \leq N} e^{i2\pi m \cdot x},$$

$$F_N^n(x) := \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x_j) \right).$$

仿照一维情况, 可以证明 n 维 Fejer 核的恒等逼近定理:

命题 2.12 (n 维 Fejer 的恒等逼近定理)

若下述情况有其一成立:

- (i) $f \in L^p(\mathbb{T}^n)$ ($1 \leq p < \infty$);
- (ii) f 是周期为 1 的连续函数, $p = \infty$,

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|F_N^n * f - f\|_{L^p(\mathbb{T}^n)} = 0.$$



接下来需要强调 n 维 Fourier 系数的诸恒等式, 这些恒等式在后文将要讲述的 Fourier 变换中均有对应形式:

命题 2.13

设 $f, g \in L^2(\mathbb{T}^n)$, 则有下列命题成立:

- (i) Plancherel 恒等式:

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T}^n)}^2 = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} |\widehat{f}(m)|^2.$$

- (ii) Parseval 等式:

$$\int_{\mathbb{T}^n} f(t) \overline{g(t)} dt = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(m) \overline{\widehat{g}(m)}.$$

- (iii) 乘积公式: 对任意 $k \in \mathbb{Z}^n$ 均有

$$\widehat{fg}(k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(m) \widehat{g}(k-m) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(k-m) \widehat{g}(m).$$



证明 (i),(ii) 仿照一维情形即可证明, 下面重点说明 (iii). 因为 $g \in L^2(\mathbb{T}^n)$, 故 $e^{-i2\pi k \cdot x} g(x) \in L^2(\mathbb{T}^n)$, 因此

$$\begin{aligned} \widehat{fg}(k) &= \int_{\mathbb{T}^n} e^{-i2\pi k \cdot x} f(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) \overline{e^{i2\pi k \cdot x} \overline{g(x)}} dx \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(m) (e^{i2\pi k \cdot (\cdot)} \overline{g})^\wedge(m) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(m) \widehat{g}(m-k) \\ &= \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(m) \overline{\widehat{g}(k-m)}. \end{aligned}$$

此即 (iii). □

2.8 L^1 函数的 Fourier 变换

定义 2.5 (L^1 函数的 Fourier 变换与逆变换)

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 其 Fourier 变换定义为:

$$\mathcal{F}[f](\xi) = \widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad (2.39)$$

其 Fourier 逆变换定义为:

$$\mathcal{F}^{-1}[f](x) = \check{f}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \quad (2.40)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n$.



下面列举 Fourier 变换的一些性质, 其中设 $(\tau^h f)(x) = f(x - h)$:

命题 2.14 (L^1 函数 Fourier 变换的性质)

若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则:

- (i) 线性性: $(\alpha f + \beta g)^\wedge = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g}$;
- (ii) $\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$, 且 $\widehat{f}$ 连续;
- (iii) Riemann-Lebesgue 引理: $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0$;
- (iv) 卷积公式: $(f * g)^\wedge = \widehat{f} \cdot \widehat{g}$;
- (v) 平移性质: $(\tau_h f)^\wedge(\xi) = \widehat{f}(\xi) e^{-i2\pi h \cdot \xi}$, 且 $(f e^{i2\pi h \cdot (\cdot)})^\wedge = (\tau^h f)^\wedge(\xi) = \widehat{f}(\xi - h)$;
- (vi) 若 $\rho \in O_n$ 是正交变换, 则 $(f(\rho(\cdot)))^\wedge(\xi) = \widehat{f}(\rho\xi)$;
- (vii) 若 $\lambda \in (0, \infty)$, $g(x) = \lambda^{-n} f(\lambda^{-1}x)$, 则 $\widehat{g}(\xi) = \widehat{f}(\lambda\xi)$;
- (viii) 若 $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $(\frac{\partial f}{\partial x_j})^\wedge(\xi) = i2\pi \xi_j \widehat{f}(\xi)$;
- (ix) 若 $x_j f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $(-i2\pi(\cdot)_j f)^\wedge(\xi) = \frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j}(\xi)$.



证明 (i)

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)^\wedge &= \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha f(x) + \beta g(x)) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx + \beta \int_{\mathbb{R}^n} g(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g}. \end{aligned}$$

(ii) 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 显见

$$|\widehat{f}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi \xi \cdot x} dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},$$

由此进一步有

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

再证明 $\widehat{f}$ 连续, 对任意 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^n$ 有:

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(\xi + \eta) - \widehat{f}(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) [e^{-i2\pi(\xi+\eta) \cdot x} - e^{-i2\pi \xi \cdot x}] dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| |e^{-i2\pi \xi \cdot x} e^{-i\pi x \cdot \eta} - e^{-i\pi x \cdot \eta}| dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| |2 \sin(\pi x \cdot \eta)| dx, \end{aligned}$$

由此及 $2f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 Fatou 引理有:

$$\limsup_{\eta \rightarrow 0} |\widehat{f}(\xi + \eta) - \widehat{f}(\xi)| \leq 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \limsup_{\eta \rightarrow 0} |\sin(\pi x \cdot \eta)| dx = 0,$$

又显见 $\liminf_{\eta \rightarrow 0} |\widehat{f}(\xi + \eta) - \widehat{f}(\xi)| \geq 0$, 故 $\lim_{\eta \rightarrow 0} |\widehat{f}(\xi + \eta) - \widehat{f}(\xi)| = 0$, 从而 $\lim_{\eta \rightarrow 0} \widehat{f}(\xi + \eta) = \widehat{f}(\xi)$, 因此 $\widehat{f}$ 连续.

(iii) 对任意 $\xi \neq 0$, 记 $h = \frac{\xi}{2|\xi|^2}$, 则有

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x+h) e^{-i2\pi(x+h) \cdot \xi} dx.$$

注意到

$$e^{-i2\pi(x+h) \cdot \xi} = e^{-i2\pi x \cdot \xi} e^{-i2\pi h \cdot \xi} = -e^{-i2\pi x \cdot \xi},$$

因此

$$\widehat{f}(\xi) = - \int_{\mathbb{R}^n} f(x+h) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx.$$

又因为 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时有 $|h| \rightarrow 0$, 故由积分的平均连续性进一步可得

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(\xi)| &= \frac{1}{2} \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x) - f(x+h)] e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \|f(\cdot) - f(\cdot+h)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $\lim_{|\xi| \rightarrow 0} \widehat{f}(\xi) = 0$.

(iv) 先证明 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 在实变函数中已知推论:

推论 2.2

若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 则 $f(x-y)$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

因此 $f(x-y)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可测, 由 Tonelli 定理知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \right| dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)||g(y)|dydx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|dx \right] |g(y)|dy \\ &= \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} < \infty. \end{aligned}$$

故 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $f(x-y)g(y) \in L^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, 从而对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 由 Fubini 定理和积分的平移不变性有

$$\begin{aligned} (f * g)^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \right) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) e^{-i2\pi(x-y) \cdot \xi} dx \right) g(y) e^{-i2\pi y \cdot \xi} dy \\ &= \widehat{f}(\xi) \widehat{g}(\xi). \end{aligned}$$

(v) 显见 $\tau_h f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 故对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} (\tau_h f)^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-h) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi(x+h) \cdot \xi} dx = e^{-i2\pi h \cdot \xi} \widehat{f}(\xi). \end{aligned}$$

又显见 $f e^{i2\pi h(\cdot)} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 故对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$(f e^{i2\pi h(\cdot)})^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi(\xi-h) \cdot x} dx = \widehat{f}(\xi-h).$$

此即欲证.

(vi) 回顾: 称 ρ 是正交变换, 如果它是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子, 且对 $\mathbb{R}^n$ 中的一切 x, y 均有 $\rho x \cdot \rho y = x \cdot y$. 若 $\det \rho = 1$, 则称 ρ 是一个旋转. 因此正交变换未必是旋转, 因为其行列式可能为 -1 .

首先证明一个断言: 若 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可逆线性变换 (即它所对应的矩阵 T 可逆), 则对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$[f(T(\cdot))]^\wedge(\xi) = \frac{1}{|\det T|} \widehat{f}(T^{-t}\xi),$$

其中 $T^{-t} := (T^{-1})^t$. 这是因为在实变函数中有下述定理:

定理 2.10 (重积分换元公式)

若 U, V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 变换 φ 满足:

- (i) φ 是一一变换;
- (ii) φ 是 C^1 变换;
- (iii) φ 的 Jacobi 行列式 $J_\varphi(t) \neq 0 (\forall t \in U)$,

且 φ 的逆映射 φ^{-1} 同样满足 (i)-(iii), $f(x)$ 是 V 上的可测函数, 则:

- (i) $f[\varphi(t)]$ 是 U 上的可测函数;
- (ii) $f \in L^1(V)$ 当且仅当 $f(\varphi(t))|J_\varphi(t)|$ 在 U 上可积;
- (iii) 若 $f \in L^1(V)$ 或 $f(x) \geq 0$, 则

$$\int_V f(x) dx = \int_U f(\varphi(t)) |J_\varphi(t)| dt.$$



故对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有:

$$\begin{aligned} (f(T(\cdot)))^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(Tx) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \frac{1}{|\det T|} \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-i2\pi (T^{-1}u) \cdot \xi} du \\ &\stackrel{(B)}{=} \frac{1}{|\det T|} \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-i2\pi u \cdot T^{-t}\xi} du, \end{aligned}$$

其中 (A) 是换元 $u = Tx$; (B) 是因为若记

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ t_{n1} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$T^{-t} = \begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ t_{1n} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix},$$

因此对任意 $u = (u_1, \dots, u_n), \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ 有

$$(T^{-1}u) \cdot \xi = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n t_{ki} u_i \right) \xi_k = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n t_{[ki]} \xi_k \right) u_i = u \cdot (T^{-t}\xi),$$

故所证断言成立.

现在任取 $\rho \in O_n$, 知 $\rho^t \rho = I_n$, 因此 $|\det \rho| = 1, \rho^{-t} = \rho$, 在上述断言中代入 $T = \rho$ 即得欲证.

(vii) 取 $T := \lambda I_n (\lambda \neq 0)$, 则 $|\det T| = \lambda^n, T^{-1} = \frac{1}{\lambda} I_n$, 从而 $T^{-t} = (T^{-1})^t = \frac{1}{\lambda} I_n$, 故由上述断言知对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$(f(T(\cdot)))^\wedge(\xi) = \frac{1}{\lambda^n} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right).$$

此即欲证.

在继续证明 (viii), (ix) 之前, 需要先行回忆一下关于绝对连续函数的概念与细节.

定义 2.6 (绝对连续)

设 f 是 $[a, b]$ 上的实值函数. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$ 满足 $\sum_{i=1}^m (y_i - x_i) < \delta$ 时, 有 $\sum_{i=1}^m |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon$ 成立, 则称 f 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数. $[a, b]$ 上全体绝对连续函数构成的空间记作 $AC[a, b]$.

**注**

- 根据上述定义可见绝对连续函数必一致连续, 一致连续与绝对连续两个定义的差别就在于一个区间与任意有限个区间之间的差别. 一个自然的问题是: 若在绝对连续函数的定义中将有限个区间换成至多可列个区间, 这两个定义是否一致呢? 现在暂时分别用 $AC_{\text{fin}}[a, b]$ 与 $AC_{\text{infin}}[a, b]$ 来表示这两类函数, 事实上有

$$f \in AC_{\text{fin}}[a, b] \Leftrightarrow f \in AC_{\text{infin}}[a, b].$$

一方面, 任取 $f \in AC_{\text{fin}}[a, b]$, 根据定义知对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta > 0$, 使得对 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的区间 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 而言, 若 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$, 则

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现取 $[a, b]$ 中任意至多可列个互不相交的区间 $\{(x_i, y_i)\}_{i \in I}$ ($I = \{1, \dots, n\}$ 或 $I = \mathbb{N}$) 满足

$$\sum_{i \in I} (y_i - x_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^m (y_i - x_i) < \delta,$$

其中 $I = \{1, \dots, n\}$ 时 $m = n$, $I = \mathbb{N}$ 时 m 是任意正整数. 于是由 $f \in AC_{\text{fin}}[a, b]$ 知

$$\sum_{i=1}^m |f(y_i) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

若 $I = \{1, \dots, n\}$, 此时取 $m = n$ 即为欲证. 若 $I = \mathbb{N}$, 则在上式中令 $m \rightarrow \infty$ 可知

$$\sum_{i=1}^{\infty} |f(y_i) - f(x_i)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

故 $f \in AC_{\text{infin}}[a, b]$. 另一方面, 若 $f \in AC_{\text{infin}}[a, b]$, 则显见 $f \in AC_{\text{fin}}[a, b]$, 故前述等价性成立.

- 在上述证明中稍作修改即可说明: 在 $AC[a, b]$ 的定义中将有限个区间换为可列个区间时, 得到的定义与原定义是等价的. 也就是说, 如果暂时将更换定义后得到的集合记为 $AC_{\infty}[a, b]$, 则有

$$f \in AC_{\text{fin}}[a, b] \Leftrightarrow f \in AC_{\text{infin}}[a, b] \Leftrightarrow f \in AC_{\infty}[a, b].$$

事实上, 显然有 $f \in AC_{\text{infin}}[a, b] \Rightarrow f \in AC_{\infty}[a, b]$. 而若 $f \in AC_{\infty}[a, b]$, 则根据定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{\infty} \subset [a, b] \left((x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots) \text{ 互不相交且 } \sum_{i=1}^{\infty} (y_i - x_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon \right).$$

现在任取 $[a, b]$ 中有限个互不相交的区间 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, 若 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$, 则因为 $\delta - \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) > 0$, 故必定能找到无穷多个互不相交的区间 $\{(x_i, y_i)\}_{i=n+1}^{\infty}$ 使得

$$\left[\bigcup_{i=n+1}^{\infty} (x_i, y_i) \right] \cap \left[\bigcup_{i=1}^n (x_i, y_i) \right] = \emptyset,$$

且

$$\sum_{i=n+1}^{\infty} (y_i - x_i) < \delta - \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

从而 $\sum_{i=1}^{\infty} (y_i - x_i) < \delta$, 故

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \sum_{i=1}^{\infty} |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon.$$

因此 $f \in AC_{\text{fin}}[a, b]$, 故所证等价性成立.

- 在绝对连续函数的定义中, 不能将任意有限个互不相交的开区间替换为两个互不相交的开区间或 n 个互不

相交的开区间 ($n \in \mathbb{N}$), 后两者明显等价于函数的一致连续性. 反例如 $[0, 1]$ 上的函数

$$f(x) := \begin{cases} x \sin \frac{\pi}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

可以说明 f 不是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数, 因此 f 必定不是绝对连续函数, 这是因为闭区间上的绝对连续函数必为有界变差函数²⁰. 另一方面, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{\pi}{x} = 0 = f(0)$, 故 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 从而它在 $[0, 1]$ 上一致连续. 因此 f 满足: 对每个固定的 $n \in \mathbb{N}$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$ 使得对 $[0, 1]$ 中的任意 n 个互不相交的开区间 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 而言, 只要 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$, 就有 $\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon$. 这说明前述后者的更改与原先的定义是不相容的.

- 下面说明上述蓝色断言. 记 $[a, b]$ 上一致连续函数的全体为 $UC[a, b]$, 并记将绝对连续函数定义中区间的个数改为 2 后得到的集合为 $AC_2[a, b]$, 往证

$$f \in UC[a, b] \Leftrightarrow f \in AC_2[a, b].$$

一方面, 若 $f \in UC[a, b]$, 根据定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x, y) \subset [a, b] \left(y - x < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \right),$$

因此对任意 $(x_1, y_1) \cup (x_2, y_2) \subset [a, b]$, 只要 $(x_1, y_1) \cap (x_2, y_2) = \emptyset$ 且 $y_1 - x_1 + y_2 - x_2 < \delta$, 就有

$$|f(y_1) - f(x_1)| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ 且 } |f(y_2) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$|f(y_1) - f(x_1)| + |f(y_2) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 $f \in AC_2[a, b]$.

另一方面, 若 $f \in AC_2[a, b]$, 根据定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x_1, y_1) \cup (x_2, y_2) \subset [a, b] \left((x_1, y_1) \cap (x_2, y_2) = \emptyset \wedge \sum_{i=1}^2 (y_i - x_i) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^2 |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon \right).$$

现在对任意 $(x, y) \subset [a, b]$ 且 $y - x < \frac{\delta}{2}$, 因为 $[a, b] \setminus (x, y) \neq \emptyset$, 故总存在 $(x_1, y_1) \subset \{[a, b] \setminus (x, y)\}$ 满足 $y_1 - x_1 < \frac{\delta}{2}$, 于是

$$(x, y) \cup (x_1, y_1) \subset [a, b], (x, y) \cap (x_1, y_1) = \emptyset \text{ 且 } y - x + y_1 - x_1 < \delta,$$

故根据定义知

$$|f(y) - f(x)| + |f(y_1) - f(x_1)| < \varepsilon,$$

从而

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - f(x)| + |f(y_1) - f(x_1)| < \varepsilon,$$

亦即 $f \in AC[a, b]$, 至此即得欲证.

下面回到 (viii), (ix) 的证明.

证明 (viii) 这一命题围绕 $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 在何种意义下存在的话题, 可以分为下述两种情形进行讨论:

情形一: $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 是在绝对值意义下定义的. 此时命题为: $f, \frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且对 a.e. 给定的 $(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}$, f 作为 x_j 的函数在 $\mathbb{R}$ 的任意闭区间上绝对连续, 则

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^\wedge(\xi) = i 2\pi \xi_j \hat{f}(\xi), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (2.41)$$

特别地, 若 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $f, \frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则(2.41)式成立.

在该情形下, 为了证明结论, 首先需要证明 $\lim_{x_j \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. 由于 $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 记 $x := (x_1, \dots, x_n)$, 由 Fubini 定理知对 a.e. 取定的 $x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n$ 而言, 作为 x_j 的函数 $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^1(\mathbb{R})$. 又由假设知 f 作为 x_j

²⁰ 不过有界变差函数未必是绝对连续函数, 它甚至未必是连续函数. 例如单调函数都是有界变差函数, 但单调函数未必连续.

的函数在 $\mathbb{R}$ 的任一闭区间上绝对连续, 故由微积分基本定理知对任意 $x'_j, x''_j \in \mathbb{R}$, 若 $x'_j < x''_j$, 记

$$\begin{aligned} x' &:= (x_1, \dots, x_{j-1}, x'_j, x_{j+1}, \dots, x_n), \\ x'' &:= (x_1, \dots, x_{j-1}, x''_j, x_{j+1}, \dots, x_n), \end{aligned}$$

则

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \int_{x'_j}^{x''_j} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) dx_j \right| \leq \int_{x'_j}^{x''_j} \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right| dx_j.$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial x_j} \in L^1(\mathbb{R})$, 故 $M \rightarrow \infty$ 时有 $\int_{|x_j|>M} \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right| dx_j \rightarrow 0$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $M_{\varepsilon>0}$ 使得当 $|x'_j|, |x''_j| > M_{\varepsilon}$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| \leq \int_{x'_j}^{x''_j} \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right| dx_j \leq \int_{|x_j|>M_{\varepsilon}} \left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right| dx_j < \varepsilon.$$

故由 Cauchy 准则知 $\lim_{x_j \rightarrow \pm\infty} f(x)$ 存在, 不妨记 $\lim_{x_j \rightarrow \infty} f(x) = A, \lim_{x_j \rightarrow -\infty} f(x) = \tilde{A}$. 现若 $A \neq 0$, 则存在 $\tilde{M} > 0$ 使得对任意 $x_j > \tilde{M}$ 有

$$|f(x)| > \frac{|A|}{2} > 0,$$

从而

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx_j \geq \int_{|x_j|>\tilde{M}} |f(x)| dx_j = \infty.$$

但由 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 Fubini 定理可知, 对 a.e. 给定的 $(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}$, 有 $f(x_1, \dots, x_{j-1}, \cdot, x_{j+1}, \dots, x_n) \in L^1(\mathbb{R})$, 矛盾! 故 $A = 0$. 同理可证 $\tilde{A} = 0$, 因此 $\lim_{x_j \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$.

现在对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \exp\left(-i2\pi \sum_{k \neq j} x_k \xi_k\right) \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) e^{-i2\pi x_j \xi_j} dx_j \right) \prod_{k \neq j} dx_k. \end{aligned} \quad (2.42)$$

对于内层积分, 在 $[-k, k] (k \in \mathbb{N})$ 上应用分部积分公式, 并令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) e^{-i2\pi x_j \xi_j} dx_j &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) (\cos(2\pi x_j \xi_j) - i \sin(2\pi x_j \xi_j)) dx_j \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \cos(2\pi x_j \xi_j) dx_j - i \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \sin(2\pi x_j \xi_j) dx_j \\ &= \cos(2\pi x_j \xi_j) f(x) \Big|_{x_j=-\infty}^{\infty} + (2\pi \xi_j) \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(2\pi x_j \xi_j) dx_j \\ &\quad - i \sin(2\pi x_j \xi_j) f(x) \Big|_{x_j=-\infty}^{\infty} + i(2\pi \xi_j) \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(2\pi x_j \xi_j) dx_j \\ &= (i2\pi \xi_j) \int_{\mathbb{R}} f(x) (\cos(2\pi x_j \xi_j) - i \sin(2\pi x_j \xi_j)) dx_j \\ &= (i2\pi \xi_j) \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i2\pi x_j \xi_j} dx_j. \end{aligned}$$

将上式代入(2.42)式有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^\wedge(\xi) = i2\pi \xi_j \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = i2\pi \xi_j \widehat{f}(\xi).$$

至此即得(2.41)式, 情形一至此得证.

情形二: $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ 是在 L^1 范数意义下定义的. 确切来说, 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$ 记 $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) := g(x)$, 其中 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\lim_{h_j \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h_j} - g(x) \right| dx = 0,$$

这里 $h := (0, \dots, 0, h_j, 0, \dots, 0)$. 此时称 f 在 L^1 范数意义下关于变量 x_j 可微, 往证这种情况下依旧有(2.41)式

成立. 事实上, 由 L^1 函数 Fourier 变换性质 (v) 知对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$(f(\cdot + h) - f(\cdot))^{\wedge}(\xi) = (e^{i2\pi h \cdot \xi} - 1)\widehat{f}(\xi).$$

由此知

$$\begin{aligned} \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} \left| \widehat{g}(\xi) - \frac{e^{i2\pi h \cdot \xi} - 1}{h_j} \widehat{f}(\xi) \right| &= \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left[g(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} - \frac{f(x+h) - f(x)}{h_j} e^{-i2\pi x \cdot \xi} \right] dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left| g(x) - \frac{f(x+h) - f(x)}{h_j} \right| dx \rightarrow 0, \quad h_j \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故

$$\widehat{g}(\xi) = \lim_{h_j \rightarrow 0} \frac{e^{i2\pi h \cdot \xi} - 1}{h_j} \widehat{f}(\xi) = i2\pi \xi_j \widehat{f}(\xi).$$

此即(2.41)式. 至此 (viii) 得证.

(ix) 令 $h := (0, \dots, 0, h_j, 0, \dots, 0)$, 对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\frac{1}{h_j} [\widehat{f}(\xi + h) - \widehat{f}(\xi)] = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} \frac{e^{-i2\pi x \cdot h} - 1}{h_j} dx.$$

注意到

$$|e^{-i2\pi x \cdot h} - 1| = |e^{-i\pi x \cdot h} - e^{i\pi x \cdot h}| = |2 \sin(\pi x_j h_j)| \leq 2\pi |x_j h_j|,$$

从而

$$\left| f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} \frac{e^{-i2\pi x \cdot h} - 1}{h_j} \right| \leq 2\pi |x_j f(x)|.$$

又因为 $x_j f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 故由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\begin{aligned} \frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_j}(\xi) &= \lim_{h_j \rightarrow 0} \frac{\widehat{f}(\xi + h) - \widehat{f}(\xi)}{h_j} = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} \lim_{h_j \rightarrow 0} \frac{e^{-i2\pi x \cdot h} - 1}{h_j} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (-i2\pi x_j) f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = (-i2\pi(\cdot)_j f)^{\wedge}(\xi). \end{aligned}$$

(ix) 至此得证. □

另外, 利用数学归纳法可以将 (viii), (ix) 强化为:

命题 2.15 (L^1 函数 Fourier 变换与多重偏导的关系)

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$:

(viii)' 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, $|\alpha| = k \in \mathbb{N}$. 若在 $|\beta| \leq |\alpha|$ 时总有 $\partial^\beta f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $(\partial^\alpha f)^{\wedge}(\xi) = (i2\pi \xi)^\alpha \widehat{f}(\xi)$;

(ix)' 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, $|\alpha| = k \in \mathbb{N}$. 若在 $|\beta| \leq |\alpha|$ 时总有 $x^\beta f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $((-i2\pi(\cdot))^\alpha f)^{\wedge}(\xi) = (\partial^\alpha \widehat{f})(\xi)$. ♠

前文讨论 Fourier 级数时, 我们曾多次用到了 $L^p(\mathbb{T})$ 的下述包含关系, 但在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的背景下这一包含关系不再成立:

命题 2.16

对任意 $p \in (1, \infty]$ 均有 $L^p(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$, 但 $L^p(\mathbb{R}^n) \not\subset L^1(\mathbb{R}^n)$. ♠

证明 显见 $L^\infty(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$. 对任意 $p \in (1, \infty]$, 任取 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 有:

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{T})} := \int_{\mathbb{T}} |f(x)| dx \leq \left[\int_{\mathbb{T}} dx \right]^{\frac{1}{p'}} \left[\int_{\mathbb{T}} |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} = (2\pi)^{\frac{1}{p'}} \|f\|_{L^p(\mathbb{T})} < \infty,$$

其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 因此 $L^p(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$.

对于 $L^p(\mathbb{R}^n)$, 令

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{|x|^n}, & |x| > 1, \\ 0, & 0 \leq |x| \leq 1. \end{cases}$$

当 $p \in (1, \infty)$ 时, 有

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{|x|>1} \frac{1}{|x|^{np}} dx = \nu_{n-1} \int_1^\infty r^{n(1-p)-1} dr = \frac{\nu_{n-1}}{n(p-1)} < \infty,$$

其中 ν_{n-1} 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的测度, 从而 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$.

当 $p = \infty$ 时, $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = 1$, 故 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 而

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \int_{|x|>1} \frac{dx}{|x|^n} = \nu_{n-1} \int_1^\infty \frac{dr}{r} = \infty,$$

故 $f \notin L^1(\mathbb{R}^n)$. 因此 $L^p(\mathbb{R}^n) \not\subset L^1(\mathbb{R}^n)$.

注 事实上, 就算 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\hat{f}$ 也未必是 L^1 函数. 例如对任意 $x \in \mathbb{R}$, 令

$$f(x) := \begin{cases} e^{-2\pi x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_0^\infty e^{-2\pi x} dx = -\frac{1}{2\pi} e^{-2\pi x} \Big|_0^\infty = \frac{1}{2\pi}.$$

故 $f \in L^1(\mathbb{R})$. 但对任意 $\xi \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = \int_0^\infty e^{-2\pi x} e^{-i2\pi x \xi} dx \\ &= \int_0^\infty e^{-2\pi x} \cos(2\pi x \xi) dx - i \int_0^\infty e^{-2\pi x} \sin(2\pi x \xi) dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \frac{1}{2\pi(1+\xi^2)} - i \frac{\xi}{2\pi(1+\xi^2)} = \frac{1}{2\pi(1+i\xi)}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为对 $\xi \in \mathbb{R}$, 知

$$\begin{aligned} I(\xi) &:= \int_0^\infty e^{-2\pi x} \cos(2\pi x \xi) dx = -\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \cos(2\pi x \xi) d e^{-2\pi x} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \cos(2\pi x \xi) e^{-2\pi x} \Big|_{x=0}^\infty - \int_0^\infty e^{-2\pi x} \xi \sin(2\pi x \xi) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} + \frac{\xi}{2\pi} \int_0^\infty \sin(2\pi x \xi) d e^{-2\pi x} \\ &= \frac{1}{2\pi} + \frac{\xi}{2\pi} e^{-2\pi x} \sin(2\pi x \xi) \Big|_{x=0}^\infty - \xi^2 \int_0^\infty e^{-2\pi x} \cos(2\pi x \xi) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} - \xi^2 I(\xi), \end{aligned}$$

故 $I(\xi) = \frac{1}{2\pi(1+\xi^2)}$, 类似可证 $\int_0^\infty e^{-2\pi x} \sin(2\pi x \xi) dx = \frac{\xi}{2\pi(1+\xi^2)}$. 至此即得

$$|\hat{f}(\xi)| = \frac{1}{2\pi\sqrt{1+\xi^2}} \notin L^1(\mathbb{R}).$$

综合上述讨论, 可以发现(2.39)式实际上并没有给出 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 中函数 Fourier 变换的定义, 因为给出 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的定义并不意味着 L^p ($p > 1$) 函数的 Fourier 变换在该定义下依旧合法. 同理, Fourier 反演

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi$$

在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上也不是良定义的, 因为 L^1 函数 Fourier 变换的性质 2.14(ii), (iii) 就是我们知道的所有关于 $\hat{f}$ 的信息了, 而它们并不能推出 $\hat{f}$ 可积 (事实上 $\hat{f}$ 一般不可积). 不过, 一旦知道了 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 就能得到 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 反演定理:

命题 2.17 ($L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 反演)

若 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx, \quad (2.43)$$

且

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

这一命题的证明可逐字逐句地参考 Schwartz 空间中 Fourier 反演 2.14 相关部分的证明, 这里就省略了. $\square$

另外, 围绕 $\hat{f}$ 的可积性问题, 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中还有下述命题:

命题 2.18 (L^1 函数 Fourier 变换的可积性)

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $x = 0$ 连续且 $\hat{f} \geq 0$, 则 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $f(0) = \|\hat{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$.

证明 根据 (2.43) 式与引理 2.12, 代入 $g(x) = e^{-\pi|\varepsilon x|^2}$ 并利用恒等逼近定理 3.1 可得

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) e^{-\pi|\varepsilon x|^2} dx = f(0).$$

现由 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 知 $\hat{f} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 因此由 Lebesgue 控制收敛定理即得

$$f(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) dx = \|\hat{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

$\square$

在可积性之外, 利用 (iii), (viii)' 可以得到函数光滑性与其 Fourier 变换衰减性的关系:

推论 2.3 (函数光滑性与其 Fourier 变换衰减性的联系)

若 $f \in C^k(\mathbb{R}^n)$ ($k \in \mathbb{N}$), 且 $\partial^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ($0 \leq |\alpha| \leq k$), 则 $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \hat{f}(\xi) = o(|\xi|^{-k})$.

证明 由 L^1 函数 Fourier 变换的性质 2.14(iii), (viii)' 知

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} (\partial^\alpha f)^\wedge(\xi) = \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} (i2\pi\xi)^\alpha \hat{f}(\xi) = 0 \Rightarrow \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \xi^\alpha \hat{f}(\xi) = 0, \quad 0 \leq |\alpha| \leq k.$$

由 (2.48) 式进而可得

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} |\xi|^k \hat{f}(\xi) = 0.$$

推论即证. $\square$

相反地, 利用 (ix)' 可以直接得到下述函数衰减性与其 Fourier 变换光滑性的联系:

推论 2.4 (函数衰减性与其 Fourier 变换光滑性的联系)

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 且 $(\cdot)^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ($0 \leq |\alpha| \leq k, k \in \mathbb{N}$), 则 $\hat{f} \in C^k(\mathbb{R}^n)$.

结合推论 2.3, 2.4 便可以得到下文将要介绍的 Schwartz 空间的引入动机: 如果希望函数的 Fourier 变换足够衰减 (进而可积性足够强), 就需要函数本身足够光滑, 因此我们自然希望考虑 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ (或其子空间) 上的函数. 又因为我们想要让 Fourier 变换也变得光滑, 故需要在 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上加上某种衰减性, 这便是 Schwartz 空间.

2.9 Schwartz 空间

2.9.1 Schwartz 空间的定义与其上的拓扑

从前文的讨论中可以发现 Fourier 变换和 Fourier 逆变换的定义并不能很好地从 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 延拓到 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 上去, 这便启发我们需要找到一个空间, 使得这个空间上的 Fourier 变换定义可以延拓到 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 空间

中. Schwartz 空间正是这样的空间.

定义 2.7 (Schwartz 空间)

称函数 f 是 Schwartz 函数, 记作 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 如果它无穷可微, 且它的任意阶导数在无穷远处都是速降的, 也就是说对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| = \rho_{\alpha, \beta}(f) < \infty.$$

其中 $\{\rho_{\alpha, \beta}(f)\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n}$ 称为 f 的 Schwartz 半范族.



注 从定义出发可以直接验证下面几个命题:

命题 2.19 (Schwartz 函数背景空间的乘积性质)

若 $f_1 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), f_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^m)$, 则 $m+n$ 元函数 $f_1(x_1, \dots, x_n)f_2(x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{n+m})$ 中.



证明 根据定义知

$$\forall \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{N}^n \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^{\alpha_1} \partial^{\beta_1} f_1(x)| < \infty \right),$$

$$\forall \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{N}^m \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^m} |x^{\alpha_2} \partial^{\beta_2} f_2(x)| < \infty \right).$$

现任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^{n+m}$, 知必存在 $\alpha_1 = (\alpha_1^1, \dots, \alpha_1^n), \beta_1 = (\beta_1^1, \dots, \beta_1^n) \in \mathbb{N}^n, \alpha_2 = (\alpha_2^1, \dots, \alpha_2^m), \beta_2 = (\beta_2^1, \dots, \beta_2^m) \in \mathbb{N}^m$ 使得 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2), \beta = (\beta_1, \beta_2)$, 于是:

$$\begin{aligned} & |x^\alpha \partial^\beta f_1(x_1, \dots, x_n)f_2(x_{n+1}, \dots, x_{n+m})| \\ &= |x_1^{\alpha_1^1} \cdots x_n^{\alpha_1^n} x_{n+1}^{\alpha_2^1} \cdots x_{n+m}^{\alpha_2^m} \partial_{x_1}^{\beta_1^1} \cdots \partial_{x_n}^{\beta_1^n} \partial_{x_{n+1}}^{\beta_2^1} \cdots \partial_{x_{n+m}}^{\beta_2^m} f_1(x_1, \dots, x_n)f_2(x_{n+1}, \dots, x_{n+m})| \\ &= |(x_1^{\alpha_1^1} \cdots x_n^{\alpha_1^n} \partial_{x_1}^{\beta_1^1} \cdots \partial_{x_n}^{\beta_1^n} f_1(x_1, \dots, x_n))(x_{n+1}^{\alpha_2^1} \cdots x_{n+m}^{\alpha_2^m} \partial_{x_{n+1}}^{\beta_2^1} \cdots \partial_{x_{n+m}}^{\beta_2^m} f_2(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}))| \\ &= \rho_{\alpha_1, \beta_1}(f_1) \rho_{\alpha_2, \beta_2}(f_2) < \infty. \end{aligned}$$

故 $f_1(x_1, \dots, x_n)f_2(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n+m})$, 命题得证. □

Terence Tao 的讲义 [Introduction, estimates, \$L^p\$ theory, interpolation](#) 中提到了乘积性质 2.19 的一个应用: 张量幂技巧²¹, 但因为讲义本身没有对该技巧作深入介绍, 这里也就点到为止.

命题 2.20 (Schwartz 空间对多项式乘积的封闭性)

若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), P(x)$ 是 n 元多项式, 则 $P(x)f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.



证明 这由 Leibniz 法则即证. □

命题 2.21 (Schwartz 空间对求导运算的封闭性)

若 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标, $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\partial^\alpha f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.



证明 这由定义立得. □

命题 2.22 (Schwartz 函数的等价刻画)

$f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 Schwartz 函数当且仅当对任意正整数 N 与任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有

$$|(\partial^\alpha f)(x)| \lesssim_{\alpha, N} (1 + |x|)^{-N},$$

其中 $X \lesssim_{\alpha, N} Y$ 表示存在仅依赖于 α, N 的常数 $C_{\alpha, N}$ 使得 $X \leq C_{\alpha, N} Y$.



证明 对 $(1 + |x|)^N |\partial^\alpha f(x)|$ 考虑二项式定理与 Schwartz 函数的定义即证命题. □

²¹ 原文为 tensor power trick.

特别注意无穷可微紧支函数空间²² $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 这是因为一方面对任意 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 根据定义知存在 $R > 0$ 使得 $\text{supp } f \subset \overline{B(0, R)}$. 又对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, $x^\alpha \partial^\beta f(x)$ 依旧是支在 $\overline{B(0, R)}$ 中的紧支无穷可微函数, 故存在 $x_0 \in \overline{B(0, R)}$ 使得

$$\rho_{\alpha, \beta}(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| = \sup_{x \in \overline{B(0, R)}} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| = |x_0^\alpha \partial^\beta f(x_0)| < \infty,$$

其中最后一步是因为紧集上的连续函数必能取到最值. 因此 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 若令 $f(x) := e^{-|x|^2}$, 则 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 无紧支集, 因此 $f \notin C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 下证 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 注意到对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$e^{-|x|^2} = e^{-(x_1^2 + \cdots + x_n^2)}.$$

现对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 易知 $x^\alpha \partial^\beta e^{-|x|^2}$ 可写成形如

$$C x_1^{\alpha_1 + \tilde{\beta}_1} \cdots x_n^{\alpha_n + \tilde{\beta}_n} e^{-(x_1^2 + \cdots + x_n^2)} = C \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i + \tilde{\beta}_i} e^{-x_i^2}$$

的有限项之和, 其中 C 为常数, $\tilde{\beta}_i \in \{0, \dots, \beta_i\} (i = 1, \dots, n)$. 因为 $\lim_{|x_i| \rightarrow \infty} x_i^{\alpha_i + \tilde{\beta}_i} e^{-x_i^2} = 0$, 故

$$\sup_{x_i \in \mathbb{R}} |x_i^{\alpha_i + \tilde{\beta}_i} e^{-x_i^2}| < \infty.$$

从而 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta (e^{-|x|^2})| < \infty$, 因此 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

下面说明 Schwartz 空间定义 2.7 中给出的 $\{\rho_{\alpha, \beta}\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n}$ 确为半范族, 更进一步可以证明它在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中实际上是范数族:

命题 2.23 (Schwartz 半范是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的范数)

序列 $\{\rho_{\alpha, \beta}\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n}$ 构成 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的可数范数族.

证明 显见 $\{\rho_{\alpha, \beta}\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n}$ 是可数的, 下面验证对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 而言, $\rho_{\alpha, \beta}$ 都是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的范数. 注意非负性, 齐次性和三角不等式都是显见的, 于是只需证明 $\rho_{\alpha, \beta}(f) = 0 \Rightarrow f = 0$. 为此分两种情况:

若 $|\beta| = 0$, 此时令

$$E = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 \neq 0, \dots, x_n \neq 0\},$$

$$F = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \exists k \in \{1, \dots, n\} (x_k = 0)\}.$$

显见 $\overline{E} = \mathbb{R}^n$, $E \cap F = \emptyset$, 且 $E \cup F = \mathbb{R}^n$. 此时由 $\rho_{\alpha, 0}(f) = 0$ 知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $|x^\alpha| |f(x)| = 0$, 从而对任意 $x \in E$ 有 $f(x) = 0$. 由这一事实, $\overline{E} = \mathbb{R}^n$ 与 f 的连续性知对任意 $x \in F$ 有 $f(x) = 0$, 因此 $f = 0$. 故在此情形下结论成立.

若 $|\beta| \neq 0$, 此时令 $g := \partial^\beta f$, 则 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\rho_{\alpha, \beta}(f) = \rho_{\alpha, 0}(g)$. 根据前述讨论可知 $g = 0$, 下证 $f = 0$. 为此只需证明下述断言: 若 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且存在 $j_0 \in \{1, \dots, n\}$ 使得 $\frac{\partial h}{\partial x_{j_0}} = 0$, 则 $h = 0$.

为证断言, 不妨设 $j_0 = 1$, 则对任意 $x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 均存在常数 $C_{(x_2, \dots, x_n)}$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $h(x_1, \dots, x_n) = C_{(x_2, \dots, x_n)}$. 又因为 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故

$$|C_{(x_2, \dots, x_n)}| = |h(x_1, \dots, x_n)| = \frac{|x_1| |h(x_1, \dots, x_n)|}{|x_1|} \leq \frac{\rho_{(1, 0, \dots, 0), 0}(h)}{|x_1|} \rightarrow 0, \quad |x_1| \rightarrow \infty.$$

于是 $C_{(x_2, \dots, x_n)} = 0$, 因此 $h = 0$, 断言成立. 由此可知在这一情形下也有 $f = 0$.

结合上述两种情况即得 $\rho_{\alpha, \beta}$ 是范数. □

注 这里可能会产生一些疑惑: 诸如 [LG1], [HJR] 等教科书均把 $\rho_{\alpha, \beta}$ 称为 Schwartz 半范, 根据这里的结论为什么不把它们叫做 Schwartz 范数? 这个问题实际上在网站 [MathStackExchange](https://math.stackexchange.com/questions/709200/why-the-following-is-a-seminorm-rather-than-a-norm) 上出现过²³, 回答者提到把它称为半范数的原因可能是因为局部凸空间的一般理论就是建立在半范数之上的.

从 Schwartz 可数范数族出发, 可以诱导 Schwartz 空间上的拓扑, 使其成为局部凸拓扑空间. 事实上, 我们不仅

²² $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 当然是非空的, 例如取函数 $f(x) = \chi_{|x| < 1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}$, 则 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

²³ <https://math.stackexchange.com/questions/709200/why-the-following-is-a-seminorm-rather-than-a-norm>

仅可以说明 Schwartz 范数族诱导的拓扑可以定义 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的收敛, 还能更进一步: 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上可以定义使其完备的度量!

命题 2.24 ($\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛)

范数族 $\{\rho_{\alpha,\beta}\}_{\alpha,\beta \in \mathbb{N}^n}$ 可诱导 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的一个度量 d , 使得 $(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 完备, 且若 $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\phi_k \xrightarrow{d} 0 (k \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (\rho_{\alpha,\beta}(\phi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)).$$

证明 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 定义 $d_{\alpha,\beta}(f, g) = \rho_{\alpha,\beta}(f - g)$, 则显见 $d_{\alpha,\beta}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的一个度量. 现在将 $\{d_{\alpha,\beta} : \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n\}$ 按合适方式排列, 记作 $\{d_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(f, g)}{1 + d_n(f, g)},$$

下面说明 d 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的一个度量:

若 $d(f, g) = 0 \Rightarrow \rho_{0,0}(f, g) = 0 \Rightarrow f = g$. 而若 $f = g$, 则因为 $\rho_{\alpha,\beta}$ 是范数, 故 $d(f, g) = 0$. 显见 $d(f, g) \geq 0$ 且 $d(f, g) = d(g, f)$, 至此正定性和对称性得证.

对于三角不等式, 任取 $f, g, h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 因为对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 来说 $\rho_{\alpha,\beta}$ 均为范数, 故对任意 $n \in \mathbb{N}$ 来说 d_n 均满足三角不等式. 又因为函数 $\frac{x}{1+x}$ 在 $[0, \infty)$ 上递增, 故

$$\begin{aligned} d(f, g) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(f, g)}{1 + d_n(f, g)} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(f, h) + d_n(h, g)}{1 + d_n(f, h) + d_n(h, g)} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(f, h)}{1 + d_n(f, h)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(h, g)}{1 + d_n(h, g)} \\ &= d(f, h) + d(h, g). \end{aligned}$$

至此即得 d 满足三角不等式, 因而 d 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的度量.

现在断言: 对任意 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $d(f_k, g) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} (d_n(f_k, g) \rightarrow 0)$.

事实上, 若 $d(f_k, g) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\frac{d_n(f_k, g)}{1 + d_n(f_k, g)} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

从而

$$1 - \frac{1}{1 + d_n(f_k, g)} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty) \Leftrightarrow d_n(f_k, g) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$$

反之, $\forall n \in \mathbb{N} (d_n(f_k, g) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty))$, 根据 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 的收敛性可知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2} \right), \quad (2.44)$$

又因为对任意 $n \in \{1, \dots, N\}$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时均有 $d_n(f_k, g) \rightarrow 0$, 故

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} (k > k_0 \Rightarrow d_n(f_k, g) < \varepsilon). \quad (2.45)$$

结合(2.44),(2.45)两式知对任意 $k > k_0$, 有:

$$d(f_k, g) \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} d_n(f_k, g) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \varepsilon \sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

故所证断言成立. 由此断言进一步知

$$d(f_k, g) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (\rho_{\alpha,\beta}(f_k - g) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)).$$

下证 $(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 完备. 设 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 中的基本列, 则由前述断言知对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 而言, $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$

关于 $\rho_{\alpha,\beta}$ 也是基本列, 即

$$\rho_{\alpha,\beta}(f_k - f_j) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha (\partial^\beta f_k(x) - \partial^\beta f_j(x))| \rightarrow 0, \quad k, j \rightarrow \infty. \quad (2.46)$$

特别地, 首先说明若 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f_k(x) - f_j(x)| \rightarrow 0, \quad k, j \rightarrow \infty, \quad (2.47)$$

则存在 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ 使得 $f_k \rightrightarrows f (k \rightarrow \infty)$. 这是因为由(2.47)式可知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $|f_k(x) - f_j(x)| \rightarrow 0 (k, j \rightarrow \infty)$, 因此 $\{f_k(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的基本列, 根据 $\mathbb{C}$ 的完备性可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 存在. 现对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 定义 $f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$, 往证

(i) $f_k \rightrightarrows f (k \rightarrow \infty)$;

(ii) f 连续.

对于 (i), 由(2.47)式知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall k, j > N \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f_k(x) - f_j(x)| < \varepsilon \right).$$

于是对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|f_k(x) - f_j(x)| < \varepsilon,$$

在上式中令 $k \rightarrow \infty$ 可得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|f(x) - f_j(x)| \leq \varepsilon.$$

由此进一步知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall j < N \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x) - f_j(x)| \leq \varepsilon \right).$$

此即 $f_k \rightrightarrows f (k \rightarrow \infty)$, (i) 得证.

对于 (ii), 因为 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C(\mathbb{R}^n)$, 而连续函数列的一致收敛极限必为连续函数, 故 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, (ii) 得证. 至此即知断言成立.

在(2.46)式中取 $\alpha = \mathbf{0}$ 或 $\beta = \mathbf{0}$ 可知 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 与 $\{\partial^\beta f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 都在 $\mathbb{R}^n$ 中一致收敛, 因此由上述断言可知存在 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 一致收敛到 f . 下面说明 $\{\partial^\beta f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 一致收敛于 $\partial^\beta f$.

事实上, 当 $\beta = \mathbf{0}$ 时, 欲证显然成立. 现设 $|\beta| = m$ 时 $\partial^\beta f_k \rightrightarrows \partial^\beta f (k \rightarrow \infty)$, 下证 $|\beta| = m+1$ 时仍有 $\partial^\beta f_k \rightrightarrows \partial^\beta f (k \rightarrow \infty)$. 此时存在 $\alpha, \gamma \in \mathbb{N}^n$ 使得 $|\alpha| = m, |\gamma| = 1$ 且 $\beta = \alpha + \gamma$, 于是 $\partial^\beta f_k = \partial^\gamma \partial^\alpha f_k$, 由归纳假设知

$$\partial^\alpha f_k \rightrightarrows \partial^\alpha f, \quad k \rightarrow \infty.$$

记 $\partial^\beta f_k \rightrightarrows g (k \rightarrow \infty)$, 下证 $f = \partial^\beta f$. 不失一般性, 设 $\gamma := (1, 0, \dots, 0)$, 因为 $\partial^\alpha f_k \in C(\mathbb{R}^n)$, 故对任意 $x_1 \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^{x_1} \partial^\beta f_k(t, x_2, \dots, x_n) dt &= \int_0^{x_1} \partial^\gamma \partial^\alpha f_k(t, x_2, \dots, x_n) dt \\ &= \partial^\alpha f_k(x_1, x_2, \dots, x_n) - \partial^\alpha f_k(0, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

在上式两端令 $k \rightarrow \infty$, 由 $\partial^\beta f_k \rightrightarrows g$ 与 $\partial^\alpha f_k \rightrightarrows \partial^\alpha f$ 可知对任意 $x_1 \in \mathbb{R}$ 有

$$\int_0^{x_1} g(t, x_2, \dots, x_n) dt = \partial^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n) - \partial^\alpha f(0, x_2, \dots, x_n).$$

显见 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, 故 $\partial^\gamma \partial^\alpha f$ 存在, 因而在上式两端同时关于 x_1 求偏导得

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \partial^\gamma \partial^\alpha f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \partial^\beta f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

故 $g = \partial^\beta f$. 因此当 $|\beta| = m+1$ 时仍有 $\partial^\beta f_k \rightrightarrows \partial^\beta f (k \rightarrow \infty)$, 故对任意 $\beta \in \mathbb{N}^n$ 均有 $\partial^\beta f_k \rightrightarrows \partial^\beta f (k \rightarrow \infty)$. 这说明对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 由 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 为基本列知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall k, j > N (\rho_{\alpha,\beta}(f_k - f_j) < \varepsilon).$$

从而当 $k > N$ 时有

$$\begin{aligned}\rho_{\alpha,\beta}(f_k - f) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha [\partial^\beta f_k(x) - \partial^\beta f(x)]| \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \lim_{\substack{j \rightarrow \infty \\ j \geq N}} |x^\alpha [\partial^\beta f_k(x) - \partial^\beta f_j(x)]| \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \lim_{\substack{j \rightarrow \infty \\ j \geq N}} \rho_{\alpha,\beta}(f_k - f_j) = \lim_{\substack{j \rightarrow \infty \\ j \geq N}} \rho_{\alpha,\beta}(f_k - f_j) \leq \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性知对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_{\alpha,\beta}(f_k - f) = 0,$$

再由 α, β 的任意性可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, f) = 0$, 故 $(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 完备.

注 命题2.24实际上定义了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 收敛的等价表述: 设 $f_k, f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ($k = 1, 2, \dots$), 则在谈及“ f_k 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 f ”(记作 $f_k \rightarrow f(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$) 时, 可以同时指代下述两个等价命题:

- $\lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, f) = 0$, 其中 d 是命题2.24中诱导得到的度量;
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_{\alpha,\beta}(f_k - f) = 0)$.

另外, [LG1] 中给出了 Schwartz 空间中的收敛与 L^p 中的收敛之间的比较. 在介绍这个命题之前, 首先需要给出一个事实:

$$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \left(|x|^k \leq C_{n,k} \sum_{|\beta|=k} |x^\beta| \right), \quad (2.48)$$

其中 $C_{n,k}$ 是仅依赖于 n, k 的常数. (2.48)式成立是因为若设 $|x| = 1$, 则考虑 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数 $f(x) = \sum_{|\beta|=k} |x^\beta|$. 显见 f 连续且在 $\mathbb{R}^n$ 的单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上非零, 故其在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上有非零最小值, 取该最小值为 $\frac{1}{C_{n,k}}$ 即可. 对 $|x| \neq 1$ 的情况, 把 x 换成 $\frac{x}{|x|}$ 即得结果.

下述命题表明 Schwartz 空间中的收敛比任何 L^p ($0 < p \leq \infty$) 中的收敛都要强.

补充命题 2.1

设 $f_k, f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ($k = 1, 2, \dots$), 若 $f_k \rightarrow f(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 则对任意 $0 < p \leq \infty$ 均有 $f_k \rightarrow f(L^p(\mathbb{R}^n))$. 另存在 $C_{p,n} > 0$ 满足

$$\forall \beta \in \mathbb{N}^n \left(\|\partial^\beta f\|_{L^p} \leq C_{p,n} \sum_{|\alpha| \leq [\frac{n+1}{p}] + 1} \rho_{\alpha,\beta}(f) \right), \quad (2.49)$$

其中 f 保证右式收敛.

证明 记 ν_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积, 知当 $p < \infty$ 时有:

$$\begin{aligned}\|\partial^\beta f\|_{L^p} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\beta f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\int_{|x| \leq 1} |\partial^\beta f(x)|^p dx + \int_{|x| > 1} |x|^{n+1} |\partial^\beta f(x)|^p \cdot \frac{1}{|x|^{n+1}} dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\nu_n \|\partial^\beta f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p + \left(\sup_{|x| > 1} |x|^{n+1} |\partial^\beta f(x)|^p \right) \int_{|x| > 1} |x|^{-(n+1)} dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq C_{p,n} \left(\|\partial^\beta f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{|x| > 1} (|x|^{[\frac{n+1}{p}] + 1} |\partial^\beta f(x)|) \right).\end{aligned}$$

$p = \infty$ 时上式的推导基于三角不等式, 从而上式结论依旧成立. 现由(2.48)式知

$$\sup_{|x| > 1} (|x|^{[\frac{n+1}{p}] + 1} |\partial^\beta f(x)|) \lesssim \sum_{|\alpha| = [\frac{n+1}{p}] + 1} \sup_{|x| > 1} (|x^\alpha \partial^\beta f(x)|) \leq \sum_{|\alpha| \leq [\frac{n+1}{p}] + 1} \rho_{\alpha,\beta}(f),$$

至此即得(2.49)式, 因而 $\mathcal{S}$ 中的收敛强于 L^p 中的收敛. □

在实践中, 特别会用到下面几条 Schwartz 意义下收敛的例子:

例 2.1(差分到导数的收敛性) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, e_j 表示第 j 个元素为 1, 其余元素为 0 的单位向量, 则

$$\frac{1}{h}(f(x + he_j) - f(x)) \rightarrow \partial_j f(x) (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)), h \rightarrow 0.$$

这是因为对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 有:

$$\begin{aligned} \rho_{\alpha, \beta} \left(\frac{1}{h}(f(\cdot + he_j) - f(\cdot)) - \partial_j f \right) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| x^\alpha \partial^\beta \left(\frac{1}{h}(f(x + he_j) - f(x)) - \partial_j f(x) \right) \right| \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta (\partial_j f(x) - \partial_j f(x))| \leq \rho_{\alpha, \beta + e_j}(f) |h| \rightarrow 0, h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

例 2.2(函数的光滑截断到函数的收敛性) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足在原点的某邻域附近恒有 $\varphi(x) = 1$, 记 $\varphi_k(x) = \varphi(\frac{x}{k})$, 则

$$\varphi_k f \rightarrow f (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)), k \rightarrow \infty.$$

这是因为不妨记 $\text{supp } \varphi \subset B$, $kB = \{kx : x \in B\}$, 则对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 有:

$$\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k f - f) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta ((\varphi_k(x) - 1)f(x))| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus kB} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

□

例 2.3 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足在原点的某邻域附近恒有 $\varphi(x) = 1$, 记 $\varphi_k(x) = \varphi(\frac{x}{k})$, 则

$$\varphi_k(\varphi_k f)^\wedge \rightarrow \widehat{f}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)), k \rightarrow \infty.$$

这是因为已知函数的光滑截断在 Schwartz 意义下收敛到函数本身 (例 2.2), 故 $\varphi_k f \rightarrow f (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 由定理 2.12 可知 $(\varphi_k f)^\wedge \rightarrow \widehat{f}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 因此

$$\varphi_k(\varphi_k f)^\wedge \rightarrow \varphi_k \widehat{f} \rightarrow \widehat{f}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)), k \rightarrow \infty.$$

□

不同于命题 2.24, [ST4] 中给出了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 拓扑的另一种定义方法: 任取 $N \in \mathbb{N}$, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\rho_N(\varphi) := \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha|, |\beta| \leq N}} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)|,$$

对于 $\varphi_k, \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) (k \in \mathbb{N})$, 称 $\varphi_k \rightarrow \varphi (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 如果对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\rho_n(\varphi_k - \varphi) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 这一拓扑实际上与先前定义的拓扑是等价的, 此即下述命题:

命题 2.25

对任意 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 而言有:

$$\forall N \in \mathbb{N} (\rho_N(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)) \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)). \quad (2.50)$$

♠

证明 当 $\forall N \in \mathbb{N} (\rho_N(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty))$ 时, 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 若 $\alpha = \mathbf{0} = \beta$, 则令 $N = 1$, 否则令 $N := \max(|\alpha|, |\beta|)$, 显见 $\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \leq \rho_N(\varphi_k)$, 因此 $\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$.

当 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty))$ 时, 任取 $N \in \mathbb{N}$, 显见

$$\rho_N(\varphi_k) = \max\{\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) : |\alpha| \leq N, |\beta| \leq N\}.$$

注意到上右式至多有 $(N+1)^{2n}$ 项, 因此 $\rho_N(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 至此即得欲证. □

注 容易证明 $\{\rho_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ 同样是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的可数范数族.

可惜的是, 虽然我们已经说明了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上用于诱导拓扑的 Schwartz 半范族实际上是范数族, 且确实存在度量 d 使得 d 诱导的拓扑与 Schwartz 半范族诱导的拓扑相容, 但 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上并不存在某个范数 $\|\cdot\|$, 使得该范数诱导的拓扑与 Schwartz 半范族诱导的拓扑相容. 此即下述定理:

定理 2.11

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是不可赋范的.

♡

证明 往证不存在范数 $\|\cdot\|$ 使得

$$\forall \{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) (\|\varphi_k\| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)) \Leftrightarrow \forall N \in \mathbb{N} (\rho_N(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)).$$

考虑反证法, 若存在这样的范数 $\|\cdot\|$, 则下述两条断言成立:

- (i) 存在 $M \in \mathbb{N}$ 及常数 $C_M \in (0, \infty)$ 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\|\varphi\| \leq C_M \rho_M(\varphi)$.
- (ii) 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 存在常数 $C_N \in (0, \infty)$ 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\rho_N(\varphi) \leq C_N \|\varphi\|$.

对于断言 (i), 若该断言不成立, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|\varphi_k\| > k \rho_k(\varphi_k)$, 因此 $\varphi_k \neq 0$ (否则 $\|\varphi_k\| = 0 \leq k \rho_k(\varphi_k)$, 矛盾). 令 $\tilde{\varphi}_k := \frac{\varphi_k}{\rho_k(\varphi_k)}$, 则 $\|\tilde{\varphi}_k\| > k$ 且 $\rho_k(\tilde{\varphi}_k) = 1$.

现对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $\psi_k := \frac{\tilde{\varphi}_k}{\sqrt{k}}$, 则 $\|\psi_k\| > \sqrt{k}$ 且 $\rho_k(\psi_k) = \frac{1}{\sqrt{k}}$. 因为 $\|\cdot\|_k$ 关于 $k \in \mathbb{N}$ 递增, 故对任意 $N \in \mathbb{N}$, 当 $k \geq N$ 时有

$$\rho_N(\psi_k) \leq \rho_k(\psi_k) = \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_N(\psi_k) = 0$, 由此与先前的假设可得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\psi_k\| = 0$, 但由 $\{\psi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的选取可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\psi_k\| = \infty$, 矛盾! 由此可知断言 (i) 成立.

对于断言 (ii), 若该断言不成立, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\rho_N(\varphi_k) > k \|\varphi_k\|$, 因此 $\varphi_k \neq 0$. 现对任意 $k \in \mathbb{N}$, 令 $\tilde{\varphi}_k := \frac{\varphi_k}{\|\varphi_k\|}$, 则 $\rho_N(\tilde{\varphi}_k) > k$ 且 $\|\tilde{\varphi}_k\| = 1$. 再对任意 $k \in \mathbb{N}$ 令 $\psi_k := \frac{\tilde{\varphi}_k}{\sqrt{k}}$, $\rho_N(\psi_k) > \sqrt{k}$ 且 $\|\psi_k\| = \frac{1}{\sqrt{k}}$. 因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\psi_k\| = 0$, 由此及假设知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_N(\psi_k) = 0$, 但由 $\{\psi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的选取有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_N(\psi_k) = \infty$, 矛盾! 因此断言 (ii) 成立.

回到原来的证明, 令 $M \in \mathbb{N}$ 是断言 (i) 中声明存在的数, 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 设 $N \geq M$, 若记 $C_{(M)}$ 与 $C_{(N)}$ 分别是断言 (i) 与断言 (ii) 中提到的常数, 由 $\{\rho_N(\cdot)\}_{N \in \mathbb{N}}$ 关于 N 单增知, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\rho_M(\varphi) \leq \rho_N(\varphi) \leq C_{(N)} \|\varphi\| \leq C_N C_M \rho_M(\varphi).$$

因此 ρ_N 与 ρ_M 等价.

下面说明范数 $\rho_M(\cdot)$ 和 $\rho_{M+1}(\cdot)$ 不等价. 对任意取定的 $N \in \mathbb{N}$ 及任意 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\varphi_N(x) := \frac{1}{N^{M+1}} e^{-|x|^2} \sin(Nx_1).$$

下证 $\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_M(\varphi_N) = 0$, 为此对任意 $\alpha, \beta := (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{N}^n, |\alpha|, |\beta| \leq M$, 由 Leibniz 公式与 $|\beta| \leq M$ 知

$$\begin{aligned} |x^\alpha (\partial^\beta \varphi_N)(x)| &= \frac{1}{N^{M+1}} \left| x^\alpha \sum_{i=0}^{\beta_1} C_{\beta_1}^i (\partial^{(i, \beta_2, \dots, \beta_n)} e^{-|\cdot|^2})(x) \cdot N^{\beta_1-i} \sin\left(Nx_1 + (\beta_1 - i) \frac{\pi}{2}\right) \right| \\ &\leq \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{\beta_1} C_{\beta_1}^i |x^\alpha (\partial^{(i, \beta_2, \dots, \beta_n)} e^{-|\cdot|^2})(x)|. \end{aligned}$$

由此可知存在正常数 $C_{(M)}$ 使得 $\rho_M(\varphi_N) \leq \frac{C_{(M)}}{N}$. 令 $N \rightarrow \infty$ 即得 $\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_M(\varphi_N) = 0$.

再证明 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \rho_{M+1}(\varphi_N) > 0$. 为此令 $\alpha = \mathbf{0}, \beta := (M+1, 0, \dots, 0)$, 则

$$\begin{aligned} |x^\alpha (\partial^\beta \varphi_N)(x)| &= \frac{1}{N^{M+1}} \left| \sum_{i=0}^{M+1} C_{M+1}^i (\partial_{x_1}^i e^{-|\cdot|^2})(x) \cdot N^{M+1-i} \sin\left(Nx_1 + (M+1-i) \frac{\pi}{2}\right) \right| \\ &\geq e^{-|x|^2} \left| \sin\left(Nx_1 + (M+1) \frac{\pi}{2}\right) \right| - \frac{1}{N^{M+1}} \left| \sum_{i=1}^{M+1} C_{M+1}^i (\partial_{x_1}^i e^{-|\cdot|^2})(x) \cdot N^{M+1-i} \sin\left(Nx_1 + (M+1-i) \frac{\pi}{2}\right) \right| \\ &\geq e^{-|x|^2} \left| \sin\left(Nx_1 + (M+1) \frac{\pi}{2}\right) \right| - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{M+1} C_{M+1}^i |(\partial_{x_1}^i e^{-|\cdot|^2})(x)| \\ &\geq e^{-|x|^2} \left| \sin\left(Nx_1 + (M+1) \frac{\pi}{2}\right) \right| - \frac{1}{N} \widetilde{C_{(M)}}, \end{aligned}$$

其中

$$\widetilde{C_{(M)}} := \sum_{i=1}^{M+1} C_{M+1}^i \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(\partial_{x_1}^i e^{-|\cdot|^2})(x)| > 0,$$

因此

$$\rho_{M+1}(\varphi_N) \geq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} \left| \sin \left(Nx_1 + (M+1) \frac{\pi}{2} \right) \right| - \frac{1}{N} \widetilde{C}_{(M)},$$

特别令 $\tilde{x} := (\frac{1}{N}, 0, \dots, 0)$ 可得

$$\rho_{M+1}(\varphi_N) \geq e^{-1} \left| \sin \left(1 + (M+1) \frac{\pi}{2} \right) \right| - \frac{1}{N} \widetilde{C}_{(M)}.$$

由此进一步有

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \rho_{M+1}(\varphi_N) \geq e^{-1} \left| \sin \left(1 + (M+1) \frac{\pi}{2} \right) \right| > 0,$$

由该估计及 $\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_M(\varphi_N) = 0$ 可知 ρ_M 与 ρ_{M+1} 不等价, 但这与前述等价断言矛盾! 故 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 不可赋范. $\square$

2.9.2 Schwartz 空间在 Lebesgue 空间中的稠密性

Schwartz 空间对 Fourier 分析的贡献主要基于它在 Lebesgue 空间中的稠密性, 为此首先需要说明 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 Lebesgue 空间中的稠密性.

命题 2.26 ($C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 L^p 空间中的稠密性)

对任意 $p \in (0, \infty)$, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

为证明命题 2.26, 需要预备下述两条引理:

引理 2.10

设 $p \in (0, \infty)$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)|^p dx < \varepsilon.$$

^a这里 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 表示紧支连续函数.

引理 2.11

设 $p \in (0, \infty)$, $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)|^p dx < \varepsilon.$$

下面证明命题 2.26.

证明 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 由引理 2.10 知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)|^p dx < \varepsilon.$$

由此及引理 2.11 知存在 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x) - h(x)|^p dx < \varepsilon.$$

当 $p \in (0, 1]$ 时, 因为对任意正数列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 均有²⁴

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right)^p \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k^p, \quad (2.51)$$

故

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - h(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} [|f(x) - g(x)|^p + |g(x) - h(x)|^p] dx < 2\varepsilon.$$

²⁴这是因为由 $\frac{a_j}{\sum_{k=1}^{\infty} a_k} \leq 1$ 知 $\left(\frac{a_j}{\sum_{k=1}^{\infty} a_k} \right)^p \geq \frac{a_j}{\sum_{k=1}^{\infty} a_k}$, 两边对 j 求和即得 $\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{a_j}{\sum_{k=1}^{\infty} a_k} \right)^p \geq 1$, 整理即得 (2.51) 式.

当 $p \in (1, \infty)$ 时, 由 Jensen 不等式知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - h(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |g(x) - h(x)|^p dx \right] < 2^p \varepsilon,$$

由此及 ε 的任意性与 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 即知 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. $\square$

下面证明引理 2.10.

证明 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 根据积分的存在性知 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 a.e. 有限. 现对任意 $m \in \mathbb{N}$ 与任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$f_m(x) := f(x) \chi_{\{|f(x)| < m\}}(x) \chi_{\{|x| < m\}}(x).$$

显见 $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上 a.e. 成立, 由该极限式, $|f_m| \leq |f| \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 与 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_m(x) - f(x)|^p dx = 0,$$

亦即

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_N(x) - f(x)|^p dx < \varepsilon \right). \quad (2.52)$$

注意到 f_N 是 $B(0, N)$ 上的有界可测函数, 故由 Lusin 定理知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset B(0, N)$ 使得 $|B(0, N) \setminus F| < (\frac{1}{2N})^p \varepsilon$, 且 f_N 在 F 上连续. 因此, f_N 在 $F \cup (\mathbb{R}^n \setminus B(0, N))$ 上连续, 由此及闭集连续延拓定理知存在 $g \in C(\mathbb{R})$ 使得

(i) $\forall x \in \mathbb{R}^n (|g(x)| \leq N)$;

(ii) $\forall x \in F \cup (\mathbb{R}^n \setminus B(0, N)) (g(x) = f_N(x))$.

由此进一步知 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x) - f_N(x)|^p dx = \int_{B(0, N) \setminus F} |g(x) - f_N(x)|^p dx \leq |B(0, N) \setminus F| (2N)^p < \varepsilon. \quad (2.53)$$

现当 $p \in (0, 1]$ 时, 由 (2.52), (2.53) 两式知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - f_N(x)|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f_N(x) - g(x)|^p dx < 2\varepsilon.$$

当 $p \in (1, \infty)$ 时, 同样由 (2.52), (2.53) 两式知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - g(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) - f_N(x)|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f_N(x) - g(x)|^p dx \right] < 2^p \varepsilon.$$

至此引理 2.10 得证. $\square$

下面证明引理 2.11.

证明 取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp } \varphi \subset B(0, 1)$, $\varphi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$. 设 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 不妨取 $L \in (0, \infty)$ 使得 $\text{supp } f \subset B(0, L)$. 对任意 $t \in (0, 1)$, 定义 $\varphi_t(x) := \frac{1}{t^n} \varphi(\frac{x}{t})$. 现对任意 $t \in (0, 1)$, 因为 $|x - y| < L, |y| < t \leq 1 \Rightarrow |x| < |x - y| + |y| \leq L + 1$, 故 $\text{supp}(\varphi_t * f) \subset B(0, L + 1)$. 由此可知 $t \in (0, 1)$ 时有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |(\varphi_t * f)(x) - f(x)|^p dx = \int_{B(0, L+1)} |(\varphi_t * f)(x) - f(x)|^p dx \leq |B(0, L+1)| \|\varphi_t * f - f\|_{L^\infty(B(0, L+1))}^p. \quad (2.54)$$

下面断言对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $t_\varepsilon \in (0, 1)$ 使得

$$\|\varphi_{t_\varepsilon} * f - f\|_{L^\infty(B(0, L+1))} < \left[\frac{\varepsilon}{|B(0, L+1)|} \right]^{\frac{1}{p}}.$$

事实上, 由 $f \in C(\overline{B(0, L+2)})$ 和 $\overline{B(0, L+2)}$ 是紧集知 f 在 $\overline{B(0, L+2)}$ 上一致连续, 即

$$\forall \varepsilon \exists \delta_\varepsilon \in (0, 1) \forall x, y \in \overline{B(0, L+2)} \left(|x - y| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \left[\frac{\varepsilon}{|B(0, L+1)|} \right]^{\frac{1}{p}} \right).$$

由此可知若取 $t_\varepsilon \in (0, \delta_\varepsilon)$, 则对任意 $x \in B(0, L+1)$ 均有

$$\begin{aligned} |(\varphi_{t_\varepsilon} * f)(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_{t_\varepsilon}(y) f(x - y) dy - f(x) \right| \\ &= \left| \int_{B(0, 1)} \varphi(y) [f(x - t_\varepsilon y) - f(x)] dy \right| < \left[\frac{\varepsilon}{|B(0, L+1)|} \right]^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

因此所证断言成立.

由(2.54)式与上述断言进一步可知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |(\varphi_{t_\varepsilon} * f)(x) - f(x)|^p dx < |B(0, L+1)| \frac{\varepsilon}{|B(0, L+1)|} = \varepsilon.$$

由此及 $\varphi_{t_\varepsilon} * f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 知引理2.11成立. □

下面给出本小节的主要结果.

命题 2.27

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

证明 由命题2.26已知 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密, 又因为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故只需证明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 即可. 现设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, ν_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积, 则

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\int_{|x| \leq 1} |\varphi(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{|x| > 1} |\varphi(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left(\int_{|x| \leq 1} dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{|x| > 1} \left(\frac{|x|^{2n} |\varphi(x)|}{|x|^{2n}} \right)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \nu_n^{\frac{1}{p}} + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (|x|^{2n} |\varphi(x)|) \cdot \left(\int_{|x| > 1} \frac{dx}{|x|^{2np}} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\lesssim \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^n |\varphi(x)| \\ &\stackrel{(A)}{\sim} \rho_{0,0}(\varphi) + \sum_{|\alpha|=2n} \rho_{\alpha,0}(\varphi) < \infty, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为根据(2.48)式有:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x|^{2n} |\varphi(x)| \lesssim \sum_{|\alpha|=2n} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \varphi(x)| = \sum_{|\alpha|=2n} \rho_{\alpha,0}(\varphi).$$

故 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 因此 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$. 欲证因而成立. □

注 实际上, 对 $p \in (0, \infty)$ 而言, 均有 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 在 $p \in (0, 1)$ 时, 同样只需证明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$. 任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 知

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq 2^{\frac{1}{p}-1} \left(\int_{|x| \leq 1} |\varphi(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + 2^{\frac{1}{p}-1} \left(\int_{|x| > 1} |\varphi(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq 2^{\frac{1}{p}-1} \nu_n^{\frac{1}{p}} \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \left(\int_{|x| > 1} \left(\frac{|x|^{2([\frac{n}{p}]+1)} |\varphi(x)|}{|x|^{2([\frac{n}{p}]+1)}} \right)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\lesssim \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x|^{2([\frac{n}{p}]+1)} |\varphi(x)| \\ &\sim \rho_{0,0}(\varphi) + \sum_{|\alpha|=2([\frac{n}{p}]+1)} \rho_{\alpha,0}(\varphi) < \infty. \end{aligned}$$

故 $\varphi \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 因此 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$, 此即欲证.

2.9.3 Schwartz 函数的 Fourier 变换

上一小节证明了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 而(2.39)式本身是 L^1 函数 Fourier 变换的定义, 故该式同样是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中函数 Fourier 变换的定义. Schwartz 函数的 Fourier 变换继承了 L^1 函数 Fourier 变换的所有性质, 本节

着重探讨 Schwartz 空间中 Fourier 变换将有哪些更好的性质. 为此首先需要证明下述引理:

引理 2.12

若 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\widehat{f}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$.



证明 这件事本身直接在 $\mathbb{C}$ 上积分, 利用留数定理就能证明, 但这里给出一个不同的方法. 事实上, 如果能说明对任意 $x \in \mathbb{R}$ 定义的函数 $f_1(x) := e^{-\pi x^2}$ 有

$$\widehat{f_1}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 定义的函数 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 与任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有:

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi|x|^2} e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi(x_1^2 + \cdots + x_n^2)} e^{-i2\pi(x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n)} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{j=1}^n e^{-\pi x_j^2} e^{-i2\pi x_j \xi_j} dx_1 \cdots dx_n \\ &= \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x_j^2} e^{-i2\pi x_j \xi_j} dx_j \\ &= \prod_{j=1}^n e^{-\pi \xi_j^2} = e^{-\pi|\xi|^2}. \end{aligned}$$

下面证明 $n=1$ 的情况成立. 首先说明函数 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ 对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 而言都是下述方程的解:

$$\begin{cases} u' + 2\pi x u = 0, \\ u(0) = 1. \end{cases}$$

这是因为由上述方程知

$$\frac{du}{u} = -2\pi x dx \Rightarrow \int_0^x \frac{du}{u} = - \int_0^x 2\pi y dy \Rightarrow \log \frac{u(x)}{u(0)} = -\pi x^2.$$

代入 $u(0) = 1$ 即得 $u(x) = u(0)e^{-\pi x^2} = e^{-\pi x^2}$. 现在在 $u' + 2\pi x u = 0$ 两边取 Fourier 变换, 由 Fourier 变换的性质 2.14(viii), (ix) 知

$$(u')^\wedge + (2\pi x u)^\wedge = 0 \Rightarrow i2\pi x \widehat{u} - \frac{1}{i}(\widehat{u})' = 0 \Rightarrow (\widehat{u})' + 2\pi x \widehat{u} = 0.$$

此外

$$\begin{aligned} \widehat{u}(0) &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = \left[\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi(x^2+y^2)} dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\int_0^\infty e^{-\pi r^2} r dr \int_{\mathbb{S}^1} d\sigma \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\int_0^\infty e^{-\pi r^2} 2\pi r dr \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= [(-e^{-\pi r^2})|_0^\infty]^{\frac{1}{2}} = 1. \end{aligned}$$

因此, $\widehat{u}$ 满足同一个微分方程:

$$\begin{cases} (\widehat{u})' + 2\pi x \widehat{u} = 0, \\ \widehat{u}(0) = 1. \end{cases}$$

又因为若 u_1, u_2 均满足上述微分方程, 则

$$\begin{cases} (u_1 - u_2)' + 2\pi x(u_1 - u_2) = 0, \\ (u_1 - u_2)(0) = 0, \end{cases} \Rightarrow u_1 - u_2 = 0 \Rightarrow u_1 = u_2.$$

故该微分方程有唯一解, 因此 $\widehat{u}(x) = e^{-\pi x^2} = u(x)$. □

Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的一个重要性质在于它是保 Schwartz 函数的连续变换, 此即下述定理:

定理 2.12 (Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续性)

Fourier 变换是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的连续映射.

证明 首先说明 Fourier 变换把 Schwartz 函数映成 Schwartz 函数. 事实上, 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 任取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, 由 Fourier 变换的性质 2.14(viii), (ix) 知

$$\begin{aligned}\xi^\alpha [\partial^\beta \widehat{f}(\xi)] &= \xi^\alpha [(-i2\pi x)^\beta f]^\wedge(\xi) \\ &= \frac{1}{(i2\pi)^{|\alpha|}} (i2\pi \xi)^\alpha [(-i2\pi x)^\beta f]^\wedge(\xi) \\ &= \frac{1}{(i2\pi)^{|\alpha|}} [\partial^\alpha ((i2\pi x)^\beta f)]^\wedge(\xi) \\ &= C_1 (\partial^\alpha (x^\beta f))^\wedge(\xi),\end{aligned}$$

其中 $C_1 := (i2\pi)^{|\beta| - |\alpha|}$. 从而由 Fourier 变换的性质 2.14(ii) 知

$$\begin{aligned}|\xi^\alpha \partial^\beta \widehat{f}(\xi)| &\leq |C_1| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(1+|x|^2)^n} (1+|x|^2)^n |\partial^\alpha (x^\beta f)(x)| dx \\ &\lesssim |C_1| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(1+|x|^2)^n} \sum_{\substack{|\tilde{\alpha}| \leq 2n+|\beta| \\ |\tilde{\beta}| \leq |\alpha|}} \rho_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}(f) dx \\ &\sim |C_1| \sum_{\substack{|\tilde{\alpha}| \leq 2n+|\beta| \\ |\tilde{\beta}| \leq |\alpha|}} \rho_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}(f) < \infty.\end{aligned}\tag{2.55}$$

这表明 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 亦即 Fourier 变换把 Schwartz 函数映成 Schwartz 函数. 对于连续性, 设 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $n \rightarrow \infty$ 时 $f_n \rightarrow \theta(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 则对任意 $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{N}^n$ 有 $\rho_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}(f_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 由此及 (2.55) 式知

$$0 \leq \rho_{\alpha, \beta}(\widehat{f_n}) \lesssim |C_1| \sum_{\substack{|\tilde{\alpha}| \leq 2n+|\beta| \\ |\tilde{\beta}| \leq |\alpha|}} \rho_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}(f_n) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

因此 $\rho_{\alpha, \beta}(\widehat{f_n}) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\widehat{f_n} \rightarrow \theta(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 因此 Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的连续变换. $\square$

因为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 同样在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 故对于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换, 也可以谈论它的 L^2 性质. 这其中最重要的一条便是下述乘法公式:

定理 2.13 (Fourier 变换的乘法公式)

对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) g(x) dx.\tag{2.56}$$

证明 因为 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $f(x)g(y)e^{-i2\pi x \cdot y}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的连续函数, 因而其为可测函数, 又由 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 Tonelli 定理知

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(x)g(y)e^{-i2\pi x \cdot y}| dx dy = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| dy < \infty.$$

故 $f(x)g(y)e^{-i2\pi x \cdot y} \in L^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$. 从而由 Fubini 定理知

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \left[\int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi \right] dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \right] d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) \widehat{f}(\xi) d\xi.\end{aligned}$$

乘法公式至此得证. $\square$

利用乘法公式 (2.56) 可得 Fourier 变换的反演公式:

定理 2.14 (Fourier 变换的反演公式)

对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi. \quad (2.57)$$

♡

证明 任取 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Fourier 变换的性质 (vii) 与乘法公式(2.56)知

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(\lambda x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \lambda^{-n} g(\lambda^{-1} x) dx.$$

在上左式中换元 $\lambda x = y$ 得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\lambda^{-1} x) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) g(\lambda^{-1} x) dx;$$

因为 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Fourier 变换把 Schwartz 函数映成 Schwartz 函数知 $\widehat{f}, \widehat{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $f(\lambda^{-1} x) \widehat{g}(x), \widehat{f}(x) g(\lambda^{-1} x)$ 均可被某可积函数关于 λ 一致控制. 现在在上式两端同时令 $\lambda \rightarrow \infty$, 由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$f(0) \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(x) dx = g(0) \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) dx.$$

令 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 由引理 2.12 知

$$f(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) d\xi,$$

这正是(2.57)式在 $x = 0$ 的情况. 现在把 f 换成 $\tau_{-x} f$, 根据 Fourier 变换的性质 (v) 有

$$f(x) = (\tau_{-x} f)(0) = \int_{\mathbb{R}^n} (\tau_{-x} f)^\wedge(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi.$$

此即欲证. □

Fourier 变换的反演公式有下述直接推论:

推论 2.5 (Fourier 变换的复合)

任取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有 $(\widehat{f})^\wedge = \widetilde{f}$, 故 Fourier 变换的周期为 4(也就是说它的四阶复合为恒同算子). ♡

证明 由反演公式(2.57)知对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $\mathbb{R}^n$ 有

$$f(-x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi,$$

即 $\widetilde{f} = (\widehat{f})^\wedge$, 从而 $f^{\wedge\wedge\wedge} = (\widetilde{f})^\sim = f$, 从而 Fourier 变换的周期为 4, 推论得证. □

注 对于 Schwartz 函数而言, 同样可以依照(2.40)式定义其 Fourier 逆变换 $f^\vee$. 从定义中可知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $f^\vee(x) = \widehat{f}(-x)$. 现由推论 2.5 知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有:

$$f(-x) = \widetilde{f}(x) = (\widehat{f})^\wedge(x) = f^{\wedge\wedge}(x),$$

由此及 $f^\vee$ 的定义知

$$(f^\vee)^\wedge = (\widetilde{\widetilde{f}})^\wedge = (f^{\wedge\wedge})^\wedge = f^{\wedge\wedge\wedge} = f.$$

因此, Fourier 变换与 Fourier 逆变换互为逆算子. 同时由 $f^\vee = f^{\wedge\wedge\wedge}$ 及 Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续性 2.12 知 Fourier 逆变换同样是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的连续映射.

2.10 缓增分布空间

2.10.1 缓增分布空间的定义

定义 2.8 (缓增分布空间)

称 $T: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C}$ 是缓增分布, 如果 T 是线性泛函, 且

$$\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \wedge \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)) \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \langle T, \varphi_k \rangle = 0.$$

亦即 T 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函. 称全体缓增分布构成的空间为缓增分布空间, 记作 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

从连续性出发可以得到缓增分布的下述等价刻画:

命题 2.28 (缓增分布的等价刻画)

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 L 是连续的当且仅当存在常数 $C > 0$ 与非负整数 k, m 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$|\langle L, \varphi \rangle| \leq C \sum_{\substack{|\alpha| \leq k \\ |\beta| \leq m}} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi). \quad (2.58)$$

证明 若 L 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上满足(2.58)式的一个线性泛函, 往证 L 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上连续. 进一步由 L 的线性性知只需证明 L 在 θ 点连续. 为此任取 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛的等价刻画2.24可知对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 均有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) = 0$. 由此及(2.58)式知

$$0 \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} |\langle L, \varphi_k \rangle| \leq C \sum_{\substack{|\alpha| \leq k \\ |\beta| \leq m}} \limsup_{k \rightarrow \infty} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) = 0.$$

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \langle L, \varphi_k \rangle = 0$, 从而 L 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 即 $L \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

另一方面, 任取 $L \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 往证 L 满足(2.58)式. 首先由 L 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上连续的定义知

$$\exists \varepsilon_0 \in (0, 1] \forall \varphi \in B_d(\theta, \varepsilon_0) (|\langle L, \varphi \rangle| < 1), \quad (2.59)$$

其中 d 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛等价刻画2.24中定义的度量. (2.59)式的成立是因为若不然, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 总存在 $\varphi_n \in B_d(\theta, \frac{1}{n})$ 使得 $|\langle L, \varphi_n \rangle| \geq 1$, 从而一方面 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 另一方面 $\langle L, \varphi_n \rangle$ 不收敛到 0, 这与 L 的连续性相矛盾! 因此(2.59)式成立.

下证断言: 存在非负整数 k, m 使得

$$A := \left\{ \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) : \sum_{\substack{|\alpha| \leq k \\ |\beta| \leq m}} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi) < \frac{\varepsilon_0}{2} \right\} \subset B_d(\theta, \varepsilon_0).$$

首先确定 k, m . 为此注意到存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum_{n=N_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon_0}{2}$. 由 $d(\varphi, \theta)$ 的定义可知 $\{d_n(\varphi, \theta)\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\{\rho_{\alpha, \beta}(\varphi)\}_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n}$ 的一个重排, 记 I_1, I_2 分别为该重排中的前 N_0 项 $\{d_n(\varphi, \theta)\}_{n=1}^{N_0}$ 中所有 α 和 β 所组成的集合, 记

$$k := \max\{|\alpha| : \alpha \in I_1\}, \quad m = \max\{|\beta| : \beta \in I_2\}.$$

注意到对任意 $n \in \{1, \dots, N_0\}$, 总存在 $\alpha \in I_1, \beta \in I_2$ 使得

$$d_n(\varphi, \theta) = \rho_{\alpha, \beta}(\varphi).$$

从而若 $\varphi \in A$, 则对任意 $n \in \{1, \dots, N_0\}$ 有

$$d_n(\varphi, \theta) = \rho_{\alpha, \beta}(\varphi) < \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

由此进一步有

$$\begin{aligned} d(\varphi, \theta) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(\varphi, \theta)}{1 + d_n(\varphi, \theta)} \\ &\leq \sum_{n=1}^{N_0} \frac{1}{2^n} d_n(\varphi, \theta) + \sum_{n=N_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon_0}{2} \sum_{n=1}^{N_0} \frac{1}{2^n} + \frac{\varepsilon_0}{2} \leq \varepsilon_0. \end{aligned}$$

从而 $\varphi \in B_d(\theta, \varepsilon_0)$, 故由 φ 的任意性知 $A \subset B_d(\theta, \varepsilon_0)$, 亦即所证断言成立.

下面再证明(2.58)式成立, 为此任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 若 $\varphi = \theta$, 则(2.58)式显然成立. 若 $\varphi \neq \theta$, 令

$$\|\varphi\| := \sum_{\substack{|\alpha| \leq k \\ |\beta| \leq m}} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi),$$

则 $\|\varphi\| > 0$. 取 $\eta \in (0, \frac{\varepsilon_0}{2})$, 令 $\psi := \eta \frac{\varphi}{\|\varphi\|}$, 由此及 $\rho_{\alpha, \beta}$ 的齐次性可知

$$\|\psi\| = \eta < \frac{\varepsilon_0}{2},$$

亦即 $\psi \in A$. 从而由所证断言知 $|\langle L, \psi \rangle| \leq 1$, 再由 L 的线性性知

$$|\langle L, \varphi \rangle| \leq \frac{1}{\eta} \|\varphi\| = \frac{1}{\eta} \sum_{\substack{|\alpha| \leq k \\ |\beta| \leq m}} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi).$$

此即(2.58)式, 命题即证. $\square$

回忆在研究 Schwartz 空间时引入过 [ST4] 所介绍的由 ρ_N 诱导的拓扑, 并给出了 ρ_N 与 $\rho_{\alpha, \beta}$ 两个范数族诱导拓扑的等价性 2.25. 因为泛函的连续性依赖于拓扑定义, 故由该等价性可知

$$L \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{对 } \forall \{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \text{ 若对 } \forall N \in \mathbb{N} \text{ 有 } \rho_N(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty), \text{ 则 } \langle L, \varphi_k \rangle \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$$

$$\Leftrightarrow \text{对 } \forall \{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \text{ 若对 } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n \text{ 有 } \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty), \text{ 则 } \langle L, \varphi_k \rangle \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$$

仿照缓增分布的等价刻画 2.28, 如果在 ρ_N 诱导的拓扑下考虑, 可以得到下述命题:

命题 2.29 (缓增分布的等价刻画)

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 L 是连续的当且仅当存在 $N \in \mathbb{N}$ 及常数 $C > 0$ 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$|\langle L, \varphi \rangle| \leq C \rho_N(\varphi). \quad (2.60) \quad \spadesuit$$

证明 若 L 满足(2.60)式, 则对任意 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 若 $k \rightarrow \infty$ 时 φ_k 在(2.50)左式的意义下收敛到 θ , 则显见 $|\langle L, \varphi_k \rangle| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 故 $L \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

反之, 若 $L \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 L 不满足(2.50)式, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均存在 $\tilde{\psi}_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $|\langle L, \tilde{\psi}_k \rangle| > k \rho_k(\tilde{\psi}_k)$, 从而 $\tilde{\psi}_k \neq 0$ (否则将出现 $0 > 0$ 的矛盾), 因此至少有 $\rho_{0,0}(\tilde{\psi}_k) > 0$, 故 $\rho_k(\tilde{\psi}_k) > 0$. 令 $\psi_k := \frac{\tilde{\psi}_k}{\rho_k(\tilde{\psi}_k)}$, 则 $\rho_k(\psi_k) = 1$ 且 $|\langle L, \psi_k \rangle| > k$. 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 再令 $\varphi_k := \frac{\psi_k}{k^{\frac{1}{2}}}$, 则由于对任意 $N \in \mathbb{N}$ 与任意 $k > N$ 有 $\rho_N(\varphi_k) \leq \rho_k(\varphi_k)$, 因此 $\rho_N(\varphi_k) \leq k^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 但同时 $|\langle L, \varphi_k \rangle| > k^{\frac{1}{2}} \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$, 这与 $L \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 矛盾! 故(2.60)式成立, 命题证毕. $\square$

注 称定义在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 L 是有界的, 若 L 满足(2.58)式 (或等价地满足(2.60)式). 故由上述讨论知 L 有界当且仅当 L 连续.

根据泛函分析中共轭空间中收敛的定义, 可以得到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的收敛:

定义 2.9 ($\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的收敛)

称 $T_k \rightarrow T (\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)) (k \rightarrow \infty)$, 如果 $T_k, T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) (k = 1, 2, \dots)$, 且

$$\langle T_k, f \rangle \rightarrow \langle T, f \rangle, \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$



2.10.2 缓增分布空间上的 Fourier 变换与其它线性算子

定义 2.10 (缓增分布的 Fourier 变换与 Fourier 逆变换)

缓增分布 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换记作 $\widehat{T}$ 或 $\mathcal{F}[T]$, 定义为

$$\langle \widehat{T}, f \rangle := \langle T, \widehat{f} \rangle, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

其 Fourier 逆变换记作 $T^\vee$ 或 $\mathcal{F}^{-1}[T]$, 定义为

$$\langle T^\vee, f \rangle := \langle T, f^\vee \rangle, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$



类似于 Schwartz 空间的情况, Fourier 变换在缓增分布空间中同样有连续性:

定理 2.15 (Fourier 变换在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的连续性)

Fourier 变换是从 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的连续双射, 且其逆变换也连续.



证明 首先说明 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 把缓增分布映成缓增分布. 任取 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 由 Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续性 2.12 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \widehat{\varphi_k} = 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. 从而由 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \widehat{T}, \varphi_k \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle T, \widehat{\varphi_k} \rangle = \langle T, \lim_{k \rightarrow \infty} \widehat{\varphi_k} \rangle = 0.$$

故 $\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 依照完全相同的步骤可以说明 Fourier 逆变换 $\mathcal{F}^{-1}$ 同样把缓增分布映成缓增分布.

为了证明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 需要回忆 $L: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 连续的定义:

$$\forall \{T_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) (\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = T(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))) \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} L(T_k) = L(T)(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)).$$

现设 $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = T(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \widehat{T_k}, \varphi \rangle = \langle T_k, \widehat{\varphi} \rangle \rightarrow \langle T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle \widehat{T}, \varphi \rangle, \quad k \rightarrow \infty.$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \widehat{T_k} = \widehat{T}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 故 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续.

下面证明 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的双射, 为此只需证明在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上有 $\mathcal{F}^4 = I$, 其中 I 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的恒同算子. 事实上, 对任意 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \mathcal{F}^4[T], f \rangle = \langle T, \mathcal{F}^4[f] \rangle = \langle T, f \rangle,$$

因此在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上有 $\mathcal{F}^4 = I$, 故 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的双射.

下面证明 $\mathcal{F}^{-1}$ 也在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续. 事实上, 由于在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上有 $\mathcal{F}^4 = I$, 故在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上 $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^3$, 又已经证明了 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 故 $\mathcal{F}^{-1}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 定理证毕. $\square$

缓增分布空间囊括了诸多我们所熟识的空间. 在这些不同的空间中, 缓增分布在函数上的作用可能表现为不同形式, 为此需要阐明缓增分布何时与一个函数重合:

定义 2.11 (缓增分布与函数的重合)

对于 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 称 T 在分布意义下与函数 h 重合, 如果对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\langle T, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} h(x) f(x) dx.$$

**命题 2.30**

若 $T \in L^1(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{T}$ 与函数

$$h(x) := \int_{\mathbb{R}^n} T(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

重合.



证明 对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 $T \in L^1(\mathbb{R}^n)$, Tonelli 定理与 Fubini 定理知:

$$\begin{aligned}\langle \widehat{T}, f \rangle &= \langle T, \widehat{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} T(\xi) \widehat{f}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T(\xi) \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi \right] dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} h(x) f(x) dx.\end{aligned}$$

命题因而成立. □

缓增分布同样可以具有测度的形式, 为此我们先介绍复值测度:

定义 2.12 (复测度)

设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 代数, 称 $\mu: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的复测度, 如果

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$;
- (ii) μ 满足可列可加性, 即若 $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{B}$ 满足 E_j 两两不交, 则 $\mu(\bigcup_{j=1}^\infty E_j) = \sum_{j=1}^\infty \mu(E_j)$.

复测度的模同样是测度, 此即下述命题:

命题 2.31

若 μ 是 $\mathcal{B}$ 上的复测度, 对任意 $E \in \mathcal{B}$ 令

$$|\mu|(E) := \sup_{\substack{E = \bigcup_{j=1}^\infty E_j, \forall j \in \mathbb{N} (E_j \in \mathcal{B}) \\ \forall j \neq k (E_j \cap E_k = \emptyset)}} \sum_{j=1}^\infty |\mu(E_j)|,$$

则

- (i) $|\mu|$ 是 $\mathcal{B}$ 上的有限测度, 即 $|\mu|(\mathbb{R}^n) < \infty$, 从而 μ 是有限 Borel 测度.
- (ii) $|\mu|$ 是正则的, 即 $|\mu|$ 满足内正则和外正则条件, 亦即对任意 $E \in \mathcal{B}$ 有

$$\text{内正则性: } |\mu|(E) = \inf\{|\mu|(U) : U \supset E \text{ 为开集}\},$$

$$\text{外正则性: } |\mu|(E) = \sup\{|\mu|(K) : K \subset E \text{ 为紧集}\}.$$

另若 $|\mu|$ 正则, 则称 μ 正则, 故 $\mathbb{R}^n$ 上的复测度均正则. ♠

现记 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上全体复 Borel 测度构成的空间, 赋以范数 $\|\mu\|_{\mathcal{M}} = |\mu|(\mathbb{R}^n)$. 另设 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是衰减连续函数空间, 则有下列结论:

定理 2.16

$$(C_0(\mathbb{R}^n))^* = \mathcal{M}(\mathbb{R}^n).$$

为了继续研究缓增分布与测度的关系, 还需要下述 Radon-Nikodym 定理:

定理 2.17 (Radon-Nikodym)

设 $(X, \mathcal{M})$ 是测度空间, μ 是其上的复测度, 则存在 X 上的可测函数 h 使得对任意 $x \in X$ 均有 $|h(x)| = 1$, 且 $d\mu = h d|\mu|$. ♥

复 Borel 测度与缓增分布的关系如下:

命题 2.32

对任意 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 均有 $\mu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. ♠

证明 任取 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = 0$ ($\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$), 则显见

$$0 \leq \|\varphi_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \rho_{0,0}(\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty$$

又由 Radon-Nikodym 定理 2.17 知存在可测函数 h 使得 $\forall x \in \mathbb{R}^n (|h(x)| = 1)$, 且

$$\begin{aligned} |\langle \mu, \varphi_k \rangle| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x) d\mu(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x) h(x) d|\mu|(x) \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k(x)| d|\mu|(x) \\ &\leq \|\varphi_k\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |\mu|(\mathbb{R}^n) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \mu, \varphi_k \rangle = 0$, 故 $\mu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. □

现若缓增分布表现为复 Borel 测度, 则其 Fourier 变换有下述表现:

命题 2.33

对任意 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $\hat{\mu}$ 都是有界连续函数, 且

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\mu(x).$$

证明 首先由 Radon-Nikodym 定理 2.17 知存在可测函数 h 使得 $\forall x \in \mathbb{R}^n (|h(x)| = 1)$, 且 $d\mu = h d|\mu|$. 由此及缓增分布 Fourier 变换的定义知

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mu}, f \rangle &= \langle \mu, \hat{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi h(x) d|\mu|(x). \end{aligned}$$

又由 Tonelli 定理知

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} h(x)| d\xi d|\mu|(x) = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(\xi)| d\xi d|\mu|(x) = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} |\mu|(\mathbb{R}^n) < \infty,$$

由此及 Fubini 定理进一步有

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mu}, f \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} h(x) d|\mu|(x) \right] f(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\mu(x) \right] f(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

故在分布意义下有

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\mu(x). \quad (2.61)$$

现在由 Radon-Nikodym 定理 2.17 与 (2.61) 式知对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|\hat{\mu}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} h(x) d|\mu|(x) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} d|\mu|(x) \leq |\mu|(\mathbb{R}^n) < \infty,$$

故 $\hat{\mu}$ 是有界函数. 另对任意 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^n$, 由 Radon-Nikodym 定理 2.17 与 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\begin{aligned} |\hat{\mu}(\xi + \eta) - \hat{\mu}(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} [e^{-i2\pi \eta \cdot x} - 1] d\mu(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\pi x \cdot (2\xi + \eta)} [e^{-i\pi \eta \cdot x} - e^{i\pi \eta \cdot x}] d\mu(x) \right| \\ &= \left| - \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\pi x \cdot (2\xi + \eta)} 2i \sin(\pi \eta \cdot x) h(x) d|\mu|(x) \right| \\ &\leq 2 \int_{\mathbb{R}^n} |\sin(\pi \eta \cdot x)| d|\mu|(x) \rightarrow 0, \quad \eta \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\mu}$ 是连续函数, 命题至此即证. □

另外, Dirac 测度同样是缓增分布. 设 δ 是定义在原点的 Dirac 测度, 则对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \delta, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} f(x) d\delta(x) + \int_{\{0\}} f(x) d\delta(x) = 0 + f(0) = f(0).$$

下面说明 $\delta \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 事实上, 任取 $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 则

$$0 \leq |\varphi_k(0)| \leq \rho_{0,0}(\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

由此知 $\langle \delta, \varphi_k \rangle = \varphi_k(0) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 故 $\delta \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

Dirac 测度的 Fourier 变换有下述表现:

命题 2.34

$$\widehat{\delta} = 1.$$

证明 对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 知

$$\langle \widehat{\delta}, f \rangle = \langle \delta, \widehat{f} \rangle = \widehat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) d\xi.$$

这说明 $\langle \widehat{\delta}, f \rangle = \langle 1, f \rangle$, 故在分布意义下有 $\widehat{\delta} = 1$. □

类似于 Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续性 2.12, 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中有下述命题:

定理 2.18

Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是从 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的连续双射, 且其逆变换也是连续的.

证明 为证明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 回忆 $L: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 连续指的是

$$\forall \{T_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \left(\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = T(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)) \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} LT_k = LT(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)) \right).$$

现设 $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = T(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 则由此知对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \widehat{T_k}, \varphi \rangle = \langle T_k, \widehat{\varphi} \rangle \rightarrow \langle T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle \widehat{T}, \varphi \rangle, \quad k \rightarrow \infty.$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \widehat{T_k} = \widehat{T}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 故 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续.

下面证明 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的双射, 为此只需证明在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上有 $\mathcal{F}^4 = I$, 其中 I 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的恒同算子. 事实上, 对任意 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有:

$$\langle \mathcal{F}^4[T], f \rangle = \langle T, \mathcal{F}^4[f] \rangle = \langle T, f \rangle,$$

因此 $\mathcal{F}^4 = I(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 故 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的双射.

最后说明 $\mathcal{F}^{-1}$ 同样在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续. 事实上, 因为 $\mathcal{F}^4 = I(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 故 $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^3(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 又已经证明了 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 故 $\mathcal{F}^{-1}$ 也在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续, 命题证毕. □

若对任意 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 定义 T 的反射变换为 $\langle \widetilde{T}, f \rangle := \langle T, \widehat{f} \rangle$ (其中 $\widehat{f}(x) := f(-x)$), 因为对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 均有 $\rho_{\alpha, \beta}(\widehat{f}) = \rho_{\alpha, \beta}(f)$, 故 $\widetilde{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 缓增分布的反射变换与函数的反射变换在定义上是相容的, 即:

命题 2.35

若 $T \in \bigcup_{p \in [1, \infty]} L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widetilde{T}(\cdot) = T(-\cdot)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上成立.

证明 任取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 知

$$\begin{aligned} \langle \widetilde{T}, f \rangle &= \langle T, \widehat{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} T(x) f(-x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T(-x) f(x) dx = \langle T(-\cdot), f \rangle. \end{aligned}$$

故 $\widetilde{T}(\cdot) = T(-\cdot)(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. □

类似于 Schwartz 空间中 Fourier 变换的复合 2.5, 对缓增分布而言有下述命题成立:

命题 2.36 (缓增分布的 Fourier 变换复合)

若 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\tilde{T} = (\hat{T})^\wedge(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 且 $(\tilde{\tilde{T}})^\wedge = T(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

证明 由 Fourier 变换的复合 2.5 知对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有:

$$\langle (\hat{T})^\wedge, f \rangle = \langle T, (\hat{f})^\wedge \rangle = \langle T, \tilde{f} \rangle = \langle \tilde{T}, f \rangle,$$

此即 $(\hat{T})^\wedge = \tilde{T}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. 由此进一步知

$$(\tilde{\tilde{T}})^\wedge = (T^{\wedge\wedge})^\wedge = \mathcal{F}^4[T] = T.$$

故 $(\tilde{\tilde{T}})^\wedge = T(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. □

另外, 缓增分布空间中也有下述 Fourier 反演公式:

命题 2.37 (缓增分布的 Fourier 反演公式)

若 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $\hat{T} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 而言, 下式在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中成立:

$$T(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{T}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi.$$

证明 首先证明断言: 当 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时, 缓增分布意义下的 Fourier 变换定义与函数意义下的 Fourier 变换定义在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下是一致的. 事实上, 由两者的定义与 Fubini 定理知, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} \langle \hat{f}, \varphi \rangle &= \langle f, \hat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{\varphi}(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \left[\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi \right] dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \right] \varphi(\xi) d\xi \\ &= \left\langle \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x \cdot (\cdot)} dx, \varphi \right\rangle. \end{aligned} \tag{2.62}$$

因此断言成立. 由上述断言知当 $\hat{T} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} T(x) &= (\tilde{\tilde{T}})^\wedge(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{T}(-\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{T}(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi \end{aligned}$$

在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立, 命题进而得证. □

由上述命题可知, 若 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $\hat{T} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 T 在分布意义下等同于一个有界连续且衰减的函数, 其中有界性是 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 连续性显见, 衰减性是 Riemann-Lebesgue 引理.

上面这种定义缓增分布空间中算子的方式并非偶然. [HJR] 指出这正是 Schwartz 用来定义缓增分布空间中算子的一般方法, 该方法基于下述命题:

补充命题 2.2 (缓增分布空间中的线性算子)

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $A: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 是线性映射, 且

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n \exists p, q \in \mathbb{N} \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \left(\rho_{\alpha, \beta}(\varphi) \lesssim \sum_{\substack{|\gamma| \leq p \\ |\delta| \leq q}} \rho_{\gamma, \delta}(\varphi) \right),$$

则式子

$$\langle A^t u, \phi \rangle := \langle u, A\phi \rangle$$

定义了一个缓增分布 $A^t u$, 且若 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $u_n \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 那么 $A^t u_n \rightarrow A^t u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. ♠

证明 根据 u, A 的线性性立得 $A^t u$ 的线性性. 根据缓增分布的等价刻画 2.28 知存在 $p, q \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\langle u, \theta \rangle| \lesssim \sum_{\substack{|\alpha| \leq p \\ |\beta| \leq q}} \rho_{\alpha, \beta}(\theta), \quad \forall \theta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

根据 $A : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 满足的条件知对每个 α, β 都存在 $l_\alpha, r_\beta \in \mathbb{N}$ 使得

$$\rho_{\alpha, \beta}(A\phi) \lesssim \sum_{\substack{|\gamma| \leq l \\ |\delta| \leq r}} \rho_{\gamma, \delta}(\phi), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

现今 $\theta = A\phi$ 可知

$$|\langle A^t u, \phi \rangle| = |\langle u, A\phi \rangle| \lesssim \sum_{\substack{|\alpha| \leq p \\ |\beta| \leq q}} \sum_{\substack{|\gamma| \leq l_\alpha \\ |\delta| \leq r_\beta}} \rho_{\gamma, \delta}(\phi), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

这便导出了 $A^t u$ 的连续性, 因而 $A^t u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 另外若 $u_k \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 根据定义知

$$\langle A^t u_k, \phi \rangle = \langle u_k, A\phi \rangle \rightarrow \langle u, A\phi \rangle = \langle A^t u, \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

亦即 $A^t u_k \rightarrow A^t u(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. □

下面给出一些利用补充命题 2.2 导出的缓增分布空间中的算子.

例 2.4(求导与多项式乘积算子) $A = (-D)^\gamma (\gamma \in \mathbb{N}^n)$ 满足补充命题 2.2 的条件, 这是因为任取 $\phi \in \mathcal{S}, \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 都有

$$\rho_{\alpha, \beta}((-D)^\alpha \phi) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha \partial^\beta (-\partial^\gamma \phi)|\} \leq \rho_{\alpha, \beta + \gamma}(\phi),$$

于是只要 $u \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n) \cap C^{|\gamma|}(\mathbb{R}^n)^{25}$, 那么

$$\langle ((-D)^\gamma)^t u, \phi \rangle := \langle u, (-D)^\gamma \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} u(x) (-D)^\gamma \phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} (\partial^\gamma u(x)) \phi(x) dx = \langle \partial^\gamma u, \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

这说明 $((-D)^\gamma)^t u = \partial^\gamma u$, 也即 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的算子 $(-D)^\gamma$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中对偶地成为 ∂^γ .

$A : x^\gamma \mapsto x^\gamma \phi (\gamma \in \mathbb{N}^n)$ 也满足补充命题 2.2 的条件, 这是因为任取 $\phi \in \mathcal{S}, \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 都有

$$\rho_{\alpha, \beta}(x^\gamma \phi) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha \partial^\beta (x^\gamma \phi(x))|\} \lesssim \sum_{|\delta| + |\tau| \leq |\alpha| + |\beta| + |\gamma|} \rho_{\delta, \tau}(\phi),$$

于是只要 $u \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, 就有

$$\langle (x^\gamma)^t u, \phi \rangle := \langle u, x^\gamma \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} u(x) x^\gamma \phi(x) dx = \langle x^\gamma u, \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

这说明 $(x^\gamma)^t u = x^\gamma u$, 也即 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的算子 $x^\gamma \mapsto x^\gamma \phi$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中对偶地成为 $x^\gamma \mapsto x^\gamma u$.

注 求导算子对补充部分所提到的分布也是可以定义的.

例 2.5(线性自同构算子) 设 L 是 $\mathbb{R}^d$ 上的线性自同构, 定义

$$A_L \phi := \frac{1}{|\det L|} \phi \circ L^{-1},$$

显见 A_L 满足补充命题 2.2 的条件. 于是只要 $u \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, 就有

$$\langle A_L^t u, \phi \rangle := \frac{1}{|\det L|} \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \phi(L^{-1}x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} u(Ly) \phi(y) dy = \langle u(L(\cdot)), \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

这说明 $A_L^t u(x) = u(Lx)$, 也即 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的算子 A_L 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中对偶地成为 $u \mapsto u(L(\cdot))$.

例 2.6(函数与缓增分布的卷积) 设 $\theta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \tilde{\theta}(x) = \theta(-x), A_\theta \phi = \tilde{\theta} * \phi$, 则 A_θ 满足补充命题 2.2 的条件, 这是因为任取 $\phi \in \mathcal{S}, \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 都有

$$\begin{aligned} \rho_{\alpha, \beta}(A_\theta \phi) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left\{ \left| x^\alpha \partial^\beta \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\theta}(y) \phi(x - y) dy \right| \right\} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left\{ \left| \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\theta}(y) (x^\alpha D_x^\beta \phi(x - y)) dy \right| \right\} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{\theta}| \cdot \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha \partial_x^\beta \phi(x - y)|\} dy \lesssim \rho_{\alpha, \beta}(\phi), \end{aligned}$$

²⁵ 其中 $L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ 保证了 $\langle u, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \phi(x) dx$, 而 $C^{|\gamma|}(\mathbb{R}^n)$ 保证了 $(-D)^\gamma u$ 的合法性.

于是只要 $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 就有

$$\begin{aligned}\langle A_\theta^t u, \phi \rangle &:= \int_{\mathbb{R}^n} u(x)(\tilde{\theta} * \phi)(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\theta}(x-y)\phi(y)dydx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} u(x)\theta(y-x)\phi(y)dx dy = \int_{\mathbb{R}^n} (u * \theta)(y)\phi(y)dy = \langle u * \theta, \phi \rangle.\end{aligned}$$

这说明在 $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 时 $A_\theta^t u = u * \theta$, 它与 [LG1] 中给出的函数与缓增分布的卷积定义是重合的:

定义 2.13 (函数与缓增分布的卷积)

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则卷积 $h * u$ 定义为

$$\langle h * u, \phi \rangle = \langle u, \tilde{h} * \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

例 2.7(函数与缓增分布的乘积) 若记

$$\Theta_{\mathcal{M}} := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \forall \alpha \in \mathbb{N}^n \exists N \in \mathbb{N} (\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{(1+|x|)^{-N} |\partial^\alpha f(x)|\} < \infty)\},$$

亦即对任意 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得²⁶ $|\partial^\alpha f(x)| \lesssim (1+|x|)^N$. 记 $A_f \phi = f(x)\phi(x)$ ($f \in \Theta_{\mathcal{M}}$), 则 A_f 满足补充命题 2.2 的条件. 这是因为任取 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 都有

$$\begin{aligned}\rho_{\alpha, \beta}(A_f \phi) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha \partial^\beta (f(x)\phi(x))|\} \\ &\lesssim \sum_{|\gamma|+|\delta| \leq |\beta|} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha \partial^\gamma f(x) \partial^\delta \phi(x)|\} \\ &\lesssim \sum_{|\gamma|+|\delta| \leq |\beta|} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{|x^\alpha (1+|x|)^{N_\gamma} \partial^\delta \phi(x)|\} \\ &\lesssim \sum_{\substack{|\tau| \leq |\alpha| + \max_{|\gamma| \leq |\beta|} N_\gamma \\ |\delta| \leq |\beta|}} \rho_{\tau, \beta}(\phi).\end{aligned}$$

于是只要 $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 就有

$$\langle A_f^t u, \phi \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} u(x)f(x)\phi(x)dx = \langle fu, \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

这说明在 $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 时 $A_f^t u = fu$, 它与 [LG1] 中给出的函数与缓增分布的乘积定义是重合的:

定义 2.14 (函数与缓增分布的乘积)

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $h \in \Theta_{\mathcal{M}}$, 则定义 h, u 的乘积为:

$$\langle hu, \phi \rangle = \langle u, h\phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

缓增分布的 Fourier 变换自然也可以用补充命题 2.2 来刻画, 只需注意 (2.62) 式即可. 类似于 L^1 函数 Fourier 变换的性质, 缓增分布的 Fourier 变换满足下述命题:

补充命题 2.3 (缓增分布 Fourier 变换的性质)

给定 $u_j, u, v \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ ($j = 1, 2, \dots$), $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $y \in \mathbb{R}^n$, $a, b \in \mathbb{C}$, $\alpha \in \mathbb{N}^n$, $c\lambda > 0$, 则

- (i) 线性性: $(au + bv)^\wedge = a\hat{u} + b\hat{v}$;
- (ii) 连续性: 若 $u_j \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 则 $\hat{u}_j \rightarrow \hat{u}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$;
- (iii) 与反射的可换性: $\widehat{\tilde{u}} = \tilde{\hat{u}}$;
- (iv) 平移性质: 若 $\tau_y u(x) = u(x-y)$, 则 $(\tau_y u)^\wedge(\xi) = e^{-i2\pi y \cdot \xi} \hat{u}(\xi)$, 且 $(e^{i2\pi y(\cdot)} u)^\wedge = \hat{u}(\xi - y) = (\tau_y u)^\wedge(\xi)$;
- (v) 若 $v(x) = \lambda^{-n} u(\lambda^{-1} x)$, 则 $\hat{v}(\xi) = \hat{u}(\lambda \xi)$;
- (vi) $(\partial^\alpha u)^\wedge(\xi) = (i2\pi \xi)^\alpha \hat{u}(\xi)$;
- (vii) $(-i2\pi(\cdot)^\alpha f)^\wedge(\xi) = \partial^\alpha \hat{f}(\xi)$;

²⁶ 这个空间的设置目的在于使后面的乘积运算有意义, 注意并不是全体 C^∞ 函数与缓增分布的乘积都有意义.

(viii) 卷积公式: $(u * v)^\wedge = \hat{u} \cdot \hat{v}$.

上述所有性质的证明均类似于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的证明, 此处略过. 另外, Schwartz 函数与缓增分布的卷积还有下述刻画:

定理 2.19 (Schwartz 函数与缓增分布卷积的刻画)

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\varphi * u$ 是 C^∞ 函数, 且对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$(\varphi * u)(x) = \langle u, \tau^x \tilde{\varphi} \rangle,$$

其中 $(\tau^x f)(y) = f(y - x)$. 另外, 存在正常数 m 使得对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有常数 $C_\alpha > 0$ 满足

$$|\partial^\alpha (\varphi * u)(x)| \leq C_\alpha (1 + |x|)^m. \quad (2.63)$$

另外, 若 u 紧支, 则 $\varphi * u$ 是 Schwartz 函数.

证明 设 $\Psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{aligned} \langle \varphi * u, \Psi \rangle &= \langle u, \tilde{\varphi} * \Psi \rangle \\ &= \left\langle u, \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}(\cdot - y) \Psi(y) dy \right\rangle \\ &= \left\langle u, \int_{\mathbb{R}^n} (\tau^y \tilde{\varphi})(\cdot) \Psi(y) dy \right\rangle \\ &\stackrel{(A)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \langle u, \tau^y \tilde{\varphi} \rangle \Psi(y) dy, \end{aligned} \quad (2.64)$$

其中 (A) 的成立需要说明 u 作为算子是连续的, 且积分 $\int_{\mathbb{R}^n} (\tau^y \tilde{\varphi})(\cdot) \Psi(y) dy$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的意义下收敛²⁷. 前者已经由 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 显见, 后者在后文会加以说明. 现在在 (2.64) 式成立的情况下即得

$$(\varphi * u)(x) = \langle u, \tau^x \tilde{\varphi} \rangle.$$

下面说明 $(\varphi * u)(x)$ 是 C^∞ 函数. 设 $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是第 j 个元素为 1, 其余全为 0 的向量, 则

$$\frac{\tau^{-he_j}(\varphi * u)(x) - (\varphi * u)(x)}{h} = \left\langle u, \frac{\tau^{-he_j}(\tau^x \tilde{\varphi}) - \tau^x \tilde{\varphi}}{h} \right\rangle \stackrel{(B)}{\rightarrow} \langle u, -\partial_j \tau^x \tilde{\varphi} \rangle, \quad h \rightarrow 0,$$

其中 (B) 的成立要求 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $\frac{\tau^{-he_j}(\tau^x \tilde{\varphi}) - \tau^x \tilde{\varphi}}{h} \rightarrow -\partial_j \tau^x \tilde{\varphi}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 下面说明后者. 任取 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 知

$$\begin{aligned} \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \left\{ \left| y^\alpha \partial^\beta \left(\frac{\phi(y - he_j) - \phi(y)}{h} + \partial_j \phi(y) \right) \right| \right\} &= \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \left\{ \left| y^\alpha \left(\frac{1}{h} (\partial^\beta \phi(y - he_j) - \partial^\beta \phi(y)) + \partial_j \partial^\beta \phi(y) \right) \right| \right\} \\ &\lesssim \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{ |y^\alpha h^2 \partial_j^2 \partial^\beta \phi(y)| \} \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0, \end{aligned}$$

因而 (B) 成立. 对更高阶的情况归纳即知 $\varphi * u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对任意多重指标 $\gamma \in \mathbb{N}^n$ 均有 $\partial^\gamma (\varphi * u) = (\partial^\gamma \varphi) * u$.

再来证明 (2.63) 式. 对 u 考虑缓增分布的等价刻画 2.28 知存在 $m, k \in \mathbb{N}$ 使得

$$\begin{aligned} |(\partial^\alpha (\varphi * u))(x)| &= |(\partial^\alpha \varphi) * u(x)| = |\langle u, \tau^x \partial^\alpha \tilde{\varphi} \rangle| \\ &\lesssim \sum_{\substack{|\gamma| \leq m \\ |\beta| \leq k}} \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{ |y^\gamma \tau^x (\partial^{\alpha+\beta} \tilde{\varphi})(y)| \} \\ &\stackrel{(C)}{=} \sum_{\substack{|\gamma| \leq m \\ |\beta| \leq k}} \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{ |(x+y)^\gamma (\partial^{\alpha+\beta} \tilde{\varphi})(y)| \} \\ &\lesssim_m \sum_{|\beta| \leq k} \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{ (1 + |x|^m)(1 + |y|^m)(\partial^{\alpha+\beta} \tilde{\varphi})(y) \}, \end{aligned} \quad (2.65)$$

其中 (C) 是将 y 换成 $x + y$. 根据 $\partial^{\alpha+\beta} \tilde{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 知 $\partial^\alpha (\varphi * u)$ 在无穷远处至多以多项式速度增长, 亦即 (2.63) 式

²⁷ 联想连续函数的性质: $f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$, (i) 前式相当于 $f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$, 后式相当于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$.

成立.

再设 u 紧支, 往证 $\varphi * u$ 是 Schwartz 函数. 根据 u 的紧支性知存在 $m, N > 0$ 使得对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有:

$$|\langle u, \varphi(x - \cdot) \rangle| = |(\varphi * u)(x)| \lesssim \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{|y| \leq N} |\partial_y^\alpha \varphi(x - y)|.$$

又因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故根据 Schwartz 函数的等价刻画 2.22 知对任意 $M > 0$, 当 $|x| \geq 2N$ 时均有

$$|\partial_y^\alpha \varphi(x - y)| \lesssim_{\alpha, M} (1 + |x - y|)^{-M} \lesssim_{\alpha, M, N} (1 + |x|)^{-M}.$$

进而 $\varphi * u$ 在无穷远处是速降的. 因为 $\partial^\gamma(\varphi * u) = (\partial^\gamma \varphi) * u$, 故仿照上述过程可知 $\varphi * u$ 的各阶导数在无穷远处均速降, 因而 $\varphi * u$ 是 Schwartz 函数. 另外, 上面的证明过程还说明了 $\varphi * u$ 的任意 Schwartz 半范都可以被 φ 的 Schwartz 半范有限和控制.

最后回过头来证明 (2.64)(A) 中积分在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 意义下的收敛性, 亦即对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\int_{[-N, N]^n} \tilde{\varphi}(x - y) \Psi(y) dy \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}(x - y) \Psi(y) dy (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)).$$

从 Riemann 积分的定义入手, 对每个 $N = 1, 2, \dots$ 将 $[-N, N]^n$ 划分成 $(2N^2)^n$ 个边长为 $\frac{1}{N}$ 的方体 Q_m , 设每个方体 Q_m 的中心为 y_m . 对任意多重指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 往证

$$D_N(x) = \sum_{m=1}^{(2N^2)^n} x^\alpha \partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - y_m) \Psi(y_m) |Q_m| - \int_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - y) \Psi(y) dy \rightarrow 0 (L^\infty(\mathbb{R}^n)).$$

根据微分中值定理知

$$x^\alpha \partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - y_m) \Psi(y_m) |Q_m| - \int_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - y) \Psi(y) dy = \int_{Q_m} x^\alpha (y - y_m) \cdot \nabla (\partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - \cdot) \Psi)(\xi) dy,$$

其中 $\xi = y + \theta(y_m - y)$, $\theta \in [0, 1]$. 注意在 Q_m 中 $|y - y_m| \leq \frac{\sqrt{n}}{2N}$, 于是将上右式被积函数中的梯度打开并代入 Schwartz 函数的等价刻画 2.22 可知

$$|x^\alpha (y - y_m) \cdot \nabla (\partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - \cdot) \Psi)(\xi)| \lesssim |x|^{|\alpha|} \frac{\sqrt{n}}{N} \frac{1}{(1 + |x - \xi|)^{\frac{M}{2}}} \frac{1}{(2 + |\xi|)^M},$$

其中 $M > 2 \max\{|\alpha|, n\}$ 足够大. 又因为 $N \geq \sqrt{n}$ 时 $|y| \leq |\xi| + \theta|y - y_m| \leq |\xi| + \frac{\sqrt{n}}{N} \leq |\xi| + 1$, 故

$$|x|^{|\alpha|} \frac{\sqrt{n}}{N} \frac{1}{(1 + |x|)^{\frac{M}{2}}} \frac{1}{(2 + |\xi|)^{\frac{M}{2}}} \lesssim |x|^{|\alpha|} \frac{\sqrt{n}}{N} \frac{1}{(1 + |x|)^{\frac{M}{2}}} \frac{1}{(1 + |y|)^{\frac{M}{2}}}.$$

将最后得到的估计代回 $D_N(x)$ 可知

$$|D_N(x)| \lesssim \frac{|x|^{|\alpha|}}{N(1 + |x|)^{\frac{M}{2}}} \int_{[-N, N]^n} \frac{dy}{(1 + |y|)^{\frac{M}{2}}} + \int_{([-N, N]^n)^c} |x^\alpha \partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - y) \Psi(y)| dy,$$

再次利用 Schwartz 函数的等价刻画 2.22, 对上式第二项有

$$\int_{([-N, N]^n)^c} |x^\alpha \partial_x^\beta \tilde{\varphi}(x - y) \Psi(y)| dy \lesssim \int_{([-N, N]^n)^c} \frac{|x|^{|\alpha|}}{(1 + |x - y|)^{\frac{M}{2}}} \frac{dy}{(1 + |y|)^M} \lesssim \frac{|x|^{|\alpha|}}{(1 + |x|)^{\frac{M}{2}}} \int_{([-N, N]^n)^c} \frac{dy}{(1 + |y|)^{\frac{M}{2}}}.$$

至此即知 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D_N(x)| = 0$, 命题得证. $\square$

注 Schwartz 函数与缓增分布卷积的刻画 2.19 表明 Schwartz 函数与缓增分布的卷积不仅仅是缓增分布, 而是光滑函数.

2.11 补充: 分布与紧支分布

本节选自 [LG1], 旨在补充分布与紧支分布的一些必要知识.

回忆 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支光滑函数空间, 而 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数空间, 结合先前提到的 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 容易得到下述关系:

$$C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (2.66)$$

下面分别定义 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 与 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的收敛性:

定义 2.15 ($C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 与 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的收敛)

称 $f_k \rightarrow f$ ($C^\infty(\mathbb{R}^n)$), 若 $f_k, f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 与 $N = 1, 2, \dots$ 均有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{|x| \leq N} |\partial^\alpha (f_k - f)(x)| = 0.$$

称 $f_k \rightarrow f$ ($C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$), 若存在紧集 B 使得 $f_k, f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有 $\text{supp}(f_k) \subset B$, 且对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\partial^\alpha (f_k - f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = 0.$$



根据紧支性可以说明 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛强于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛, 而根据定义亦知 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛强于 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛. 下面的例子表明这三种收敛性互不等价:

例 2.8(光滑鼓包函数) 设 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 是非零函数, 定义序列 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 为 $\varphi_k(x) = \frac{\varphi(x-k)}{k}$, 称 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是光滑鼓包函数列.




图 2.2: $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 示意图

首先, $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $C^\infty(\mathbb{R})$ 上是收敛到零的, 这是因为对取定的 $\alpha \in \mathbb{N}^n, N \in \mathbb{N}$ 有:

$$\sup_{|x| \leq N} |\partial^\alpha \varphi_k(x)| \leq \frac{\|\partial^\alpha \varphi_k\|_{L^\infty(\mathbb{R})}}{k} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

其次, $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上不收敛, 这是因为显见 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中收敛到 0, 故从 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的收敛性比 $L^\infty(\mathbb{R})$ 上的收敛性更强可知, 就算 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上收敛, 它也只能收敛到零. 如若该断言成立, 则根据定义知对任意指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ 均有

$$\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

特别令 $\alpha = 2, \beta = 0$ 知

$$\rho_{2,0}(\varphi_k) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^2 \varphi_k(x)| \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

但若设 $\varphi(0) = 1$, 则

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^2 \varphi_k(x)| \geq k^2 \varphi_k(k) = k \varphi(0) \rightarrow \infty, \quad k \rightarrow \infty,$$

矛盾! 故 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上不收敛.

最后, 我们没有办法谈 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的收敛性, 这是因为并不存在紧集 B 使得 $\forall k \in \mathbb{N} (\text{supp}(\varphi_k) \subset B)$.

□

根据定义 2.15, 空间 $C^\infty(\mathbb{R})$ 装备有半范族

$$\tilde{\rho}_{\alpha, N}(f) = \sup_{|x| \leq N} |(\partial^\alpha f)(x)|, \quad \alpha \in \mathbb{N}^n, N \in \mathbb{N}. \quad (2.67)$$

可以证明 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在上述可数半范族下完备, 亦即其为 Fréchet 空间. 但我们并不能用同样的半范族生成在 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上符合定义 2.15 的拓扑, 这是因为取 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是例 2.8 中定义的光滑鼓包函数列, 则显见 $\{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在半范族 (2.67) 诱导的拓扑下收敛到 0, 但它依照定义 2.15 在 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 中不收敛.

其实, 我们并不能找到某个半范族, 使得它在 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上生成的拓扑满足定义 2.15, 且这个拓扑还能令 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 完备. 定义 2.15 所诱导的 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的拓扑实际上是一个归纳极限拓扑, 且在该拓扑下 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是完备的. 也就是说, 我们需要首先取 $C_0^\infty(B(0, k))$ 是全体支在 $B(0, k)$ 中的光滑函数构成的空间, 对每个固定的 k 而言, 空间

$C_0^\infty(B(0, k))$ 关于(2.67)式定义的半范族 $\tilde{\rho}_{\alpha, N}$ 所生成的拓扑完备, 又因为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) = \bigcup_{k=1}^\infty C_0^\infty(B(0, k))$, 所以 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在这种归纳的意义下完备. 不过就算进行这样的修改, 我们还是需要遗憾地承认: $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是不可度量化. 关于这些空间拓朴性质的进一步讨论可见 [FL] 与 [SW].

下面来讨论 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 与 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间. 记 $(C_0^\infty(\mathbb{R}^n))' = \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $(C^\infty(\mathbb{R}^n))' = \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 其中的收敛性定义为:

$$\begin{aligned} T_k \rightarrow T(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)) &\Leftrightarrow T_k, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \wedge \forall f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) (T_k(f) \rightarrow T(f) (C_0^\infty(\mathbb{R}^n))), \\ T_k \rightarrow T(\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)) &\Leftrightarrow T_k, T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \wedge \forall f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) (T_k(f) \rightarrow T(f) (C^\infty(\mathbb{R}^n))). \end{aligned}$$

依照(2.66)式可知

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

定义 2.16 (分布, 紧支分布)

$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中的元素称为分布, $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中的元素称为紧支分布.

类似于缓增分布的等价刻画2.28, 可以证明分布与紧支分布也有下述等价刻画:

命题 2.38 (分布与紧支分布的等价刻画)

(i) $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 u 是分布当且仅当对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 存在整数 m 使得

$$|\langle u, f \rangle| \lesssim \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty}, \quad \forall f \in C^\infty, \text{supp}(f) \subset K. \quad (2.68)$$

(ii) $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 u 是紧支分布当且仅当存在整数 N, m 使得

$$|\langle u, f \rangle| \lesssim \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\rho}_{\alpha, N}(f), \quad \forall f \in C^\infty(\mathbb{R}^n), \quad (2.69)$$

其中

$$\rho_{\alpha, \beta}(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)|, \quad \tilde{\rho}_{\alpha, N}(f) = \sup_{|x| \leq N} |(\partial^\alpha f)(x)|.$$

下面讨论分布的支集与紧支分布一词的含义.

定义 2.17 (分布的支集)

设 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 闭集 K 满足对 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\text{supp } \varphi \subset \mathbb{R}^n \setminus K \Rightarrow \langle u, \varphi \rangle = 0,$$

则 $\text{supp } u$ 定义为全体具有上述性质的闭集 K 的交.

从定义出发可以得到下述命题:

命题 2.39

对任意 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 若 $\text{supp } \varphi \cap \text{supp } u = \emptyset$, 则 $\langle u, \varphi \rangle = 0$.

为了证明命题2.39, 首先 (不加证明地) 介绍单位分解定理:

定理 2.20 (单位分解)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 某个覆盖 E 的开集族 (亦即 $E \subset \bigcup_{U \in \mathcal{O}} U$), 则存在 C_0^∞ 函数构成的函数族 Ψ 使得:

- (i) 对任意 $\psi \in \Psi$ 与任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $0 \leq \psi(x) \leq 1$;
- (ii) 若 $K \subset \bar{K} \subset E$ (即 K 紧包含于 E), 则只有有限个 $\psi \in \Psi$ 在 K 上不为零;
- (iii) 对任意 $\psi \in \Psi$ 均存在 $U \in \mathcal{O}$ 使得 $\text{supp } \psi \subset U$;
- (iv) 对任意 $x \in E$ 均有 $\sum_{\psi \in \Psi} \psi(x) = 1$.

函数族 Ψ 称为 E 从属于 $\mathcal{O}$ 的 C^∞ 单位分解.

下面证明命题2.39.

证明 设 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且 $\text{supp } \varphi \cap \text{supp } u = \emptyset$. 根据 $\text{supp } u$ 的定义知 $(\text{supp } u)^c = (\bigcap K)^c = \bigcup K^c$, 其中每个闭集 K 均满足

$$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \wedge \text{supp } \varphi \subset \mathbb{R}^n \setminus K \Rightarrow \langle u, \varphi \rangle = 0,$$

进而由 $\text{supp } \varphi \cap \text{supp } u = \emptyset$ 知 $\text{supp } \varphi \subset (\text{supp } u)^c = \bigcup K^c$, 亦即 $\bigcup K^c$ 是紧集 $\text{supp } \varphi$ 的一个开覆盖, 故存在有限多个 $K_j^c (j = 1, \dots, m)$ 使得

$$\text{supp } \varphi \subset \bigcup_{j=1}^m K_j^c.$$

在 $\bigcup_{j=1}^m K_j^c$ 上作单位分解, 可得 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数 $\psi_j (j = 1, \dots, m)$ 满足:

- (i) $0 \leq \psi_j(x) \leq 1$;
- (ii) $\text{supp } \psi_j \subset K_j^c$;
- (iii) $\sum_{j=1}^m \psi_j = 1$.

因此

$$\langle u, \varphi \rangle = \left\langle u, \sum_{j=1}^m \varphi \psi_j \right\rangle = \sum_{j=1}^m \langle u, \varphi \psi_j \rangle = 0.$$

□

紧支分布恰为定义2.17中支集为紧集的分布. 为了说明这一断言, 首先说明紧支分布的支集确为紧集. 从定义2.16中的紧支分布 u 出发. 根据紧支分布的等价刻画2.38知存在 $N, m > 0$ 使得

$$|\langle u, f \rangle| \lesssim \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\rho}_{\alpha, N}(f), \quad \forall f \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

现对支在 $B(0, N)^c$ 中的 C^∞ 函数 f 知上右式为零, 因而只能有 $\langle u, f \rangle = 0$. 这说明 $\text{supp } u \subset \overline{B(0, N)}$, 于是 $\text{supp } u$ 至少有界. 又因为根据定义, $\text{supp } u$ 为一系列闭集的交, 故它同样是闭集, 因而它是紧集.

再说明支集为紧集的分布为紧支分布. 若定义2.17中的 $\text{supp } u$ 是紧集, 则存在 $N > 0$ 使得 $\text{supp } u \subset B(0, N)$. 取光滑函数 η 在 $B(0, N)$ 上恒等于 1, 在 $B(0, N+1)$ 外恒等于零, 则对 $h \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 而言 $\text{supp}(h(1-\eta)) \cap \text{supp } u = \emptyset$, 因此根据命题2.39知 $\langle u, h(1-\eta) \rangle = 0$, 于是

$$\langle u, h \rangle = \langle u, h\eta \rangle + \langle u, h(1-\eta) \rangle = \langle u, h\eta \rangle.$$

现在 u 可视为按下述定义的 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中的元素²⁸:

$$\langle u, f \rangle = \langle u, f\eta \rangle, \quad f \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

现取定 $K = \overline{B(0, N+1)}$ 并对应选取 m , 根据 Leibniz 公式知 $\|\partial^\alpha(f\eta)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 被半范族 $\tilde{\rho}_{\alpha, N+1}(f) (|\alpha| \leq m)$ 的有限和控制, 因而(2.69)式成立, 根据紧支分布的等价刻画2.38即知 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$.

定义 2.18 (分布与函数重合)

称分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 与函数 h 在开集 Ω 上重合, 如果

$$\langle u, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)h(x)dx, \quad \forall f \in C_0^\infty(\Omega). \quad (2.70)$$



这一定义同时表明分布 $u - h$ 的支集在 Ω^c 内.

例 2.9 当 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^n$ 时, 分布 $|x|^2 + \delta_{a_1} + \delta_{a_2}$ 在不包含 a_1, a_2 的开集上与函数 $|x|^2$ 重合. 另外, 分布

$$\langle u, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \varphi(x) \frac{dx}{x}$$

在除去 0 的实轴上与函数 $\frac{\chi_{|x| \leq 1}}{x}$ 重合.

²⁸这一新定义是与 η 的选取无关的, 这是因为如果另选在 $B(0, N)$ 上恒等于 1 的光滑函数 ψ , 则有 $\text{supp } u \cap \text{supp}(\eta - \psi) = \emptyset$, 故 $\langle u, f\eta \rangle = \langle u, f\psi \rangle$.

对于紧支分布而言, 还有下述重要结果²⁹:

定理 2.21 (紧支分布 Fourier 变换的性质)

若 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{u}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实解析函数, 特别知 $\hat{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 另外 $\hat{u}$ 与其各阶导数均在无穷远处有多项式速度增长, 且 $\hat{u}$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上有解析延拓.

证明 设 u 是紧支分布, $p(\xi)$ 是多项式, 则 u 在 C^∞ 函数 $\xi \mapsto p(\xi)e^{-i2\pi x \cdot \xi}$ 上的作用是关于 x 良定义的函数, 记之为 $\langle u, p(\cdot)e^{-i2\pi x(\cdot)} \rangle$, 这里 $x \in \mathbb{R}^n$. 可以验证若将 x 换成 $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, 则该结论依旧成立, 此时约定 ξ 与 z 的内积为 $\xi \cdot z = \sum_{k=1}^n \xi_k z_k$.

下面说明定义在 $\mathbb{C}^n$ 上关于 $z = (z_1, \dots, z_n)$ 的函数

$$F(z) = \langle u, e^{-i2\pi(\cdot) \cdot z} \rangle$$

是整函数. 这是因为由 $u, e^{-i2\pi\xi \cdot z}$ 的连续性与 u 的线性性知 F 对每个变量均解析, 另由 $\mathbb{C} \ni h \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{h}(e^{-i2\pi\xi_j \cdot h} - 1) \rightarrow 0(C^\infty(\mathbb{R}^n))$ 知 F 关于 z_j 的导数为³⁰:

$$\langle u, (-i2\pi(\cdot)_j)e^{-i2\pi(\cdot) \cdot z} \rangle,$$

归纳知对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 有

$$\partial^\alpha F = \partial_{z_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{z_n}^{\alpha_n} F = \langle u, (-i2\pi(\cdot))^\alpha e^{-i2\pi(\cdot) \cdot z} \rangle.$$

因为 F 是整函数, 故其在 $\mathbb{R}^n$ 上的限制 (亦即 $F(x_1, \dots, x_n)(x_j = \operatorname{Re} z_j)$) 是实解析函数. 另由紧支分布的等价刻画 2.38 与 Leibniz 公式知 F 在 $\mathbb{R}^n$ 上的限制与其各阶导数均在无穷远处有多项式速度增长.

现对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \hat{u}, f \rangle = \langle u, \hat{f} \rangle = \left\langle u, \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i2\pi x(\cdot)} dx \right\rangle \stackrel{(A)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \langle u, e^{-i2\pi x(\cdot)} \rangle dx, \quad (2.71)$$

其中 (A) 的成立需要说明 $f(x)e^{-i2\pi x(\cdot)}$ 关于 x 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Riemann 积分部分和在 C^∞ 的意义下收敛到 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-i2\pi x(\cdot)} dx$, 之后根据 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 所自带的连续性即得等式. 注意到 (2.71) 右式恰为 $\langle F, f \rangle$, 于是缓增分布 $\hat{u}$ 与实解析函数 $x \mapsto F(x)$ 实际上是重合的, 因而藉由 F 的诸性质可知 $\hat{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\hat{u}$ 与其各阶导数均在无穷远处有多项式速度增长, $\hat{u}$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上有解析延拓 $F(z)$.

下面来说明前述待证的收敛性, 其证明思路类似于函数与缓增分布卷积刻画定理 2.19. 对每个 $N = 1, 2, \dots$, 将方体 $[-N, N]^n$ 分割成 $(2N^2)^n$ 个边长为 $\frac{1}{N}$ 的小块 Q_m , 设 y_m 是小块 Q_m 的中心. 取定多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$, 记

$$D_N(\xi) = \sum_{m=1}^{(2N^2)^n} f(y_m) (-i2\pi y_m)^\alpha e^{-i2\pi y_m \cdot \xi} |Q_m| - \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (-i2\pi x)^\alpha e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx,$$

往证对任意 $M > 0$, 在 $N \rightarrow \infty$ 时均有 $\sup_{|\xi| \leq M} |D_N(\xi)| \rightarrow 0$. 记 $g(x) = f(x)(-i2\pi x)^\alpha$, 知

$$D_N(\xi) = \sum_{m=1}^{(2N^2)^n} \int_{Q_m} (g(y_m)e^{-i2\pi y_m \cdot \xi} - g(x)e^{-i2\pi x \cdot \xi}) dx - \int_{([-N, N]^n)^c} g(x)e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx.$$

对于上右式第二项, 因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 因此 $N \rightarrow \infty$ 时该项趋零. 对上右式第一项, 根据微分中值定理, 对被积函数有

$$|g(y_m)e^{-i2\pi y_m \cdot \xi} - g(x)e^{-i2\pi x \cdot \xi}| = \frac{\sqrt{n}}{N} (|\nabla g(z_m)| + 2\pi|\xi||g(z_m)|) \lesssim_m \frac{\sqrt{n}}{N} \frac{1 + |\xi|}{(1 + |z_m|)^K},$$

其中 $z_m \in Q_m$. 又因为对 $|\xi| \leq M$, 注意到每个 Q_m 的边长均为 $\frac{1}{N}$, 可知:

$$\sum_{m=1}^{(2N^2)^n} \int_{Q_m} \frac{1 + |\xi|}{(1 + |z_m|)^K} dx \lesssim 1 + M < \infty.$$

故 $N \rightarrow \infty$ 时 $\sup_{|\xi| \leq M} |D_N(\xi)| \rightarrow 0$, 命题得证. □

²⁹ 这一结果将在偶函数诱导的齐次奇异积分算子 L^p 有界性定理 4.7 的证明中用到.

³⁰ 仿照 (2.65) 式可以说明该表达式是良定义的.

从紧支分布 Fourier 变换的性质 2.21 可得下述结论:

命题 2.40 ($C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密)

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则存在 C_0^∞ 函数序列 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得 $f_k \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. 特别地, $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 

证明 取定 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足在原点附近有 $\varphi(x) = 1$, 记 $\varphi_k(x) = \varphi(\frac{x}{k})$. 因为 $\varphi_k f \rightarrow f(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$ (见例 2.2), 故对任意 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 均有 $\varphi_k u \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. 因为 Fourier 变换与逆变换在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的拓扑下是连续的, 故映射 $u \mapsto (\varphi_k \hat{u})^\vee$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中连续. 因为本身根据 φ_k 的紧支性有 $\varphi_k \hat{u} \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 故由紧支分布 Fourier 变换的性质 2.21 可知 $(\varphi_k \hat{u})^\vee \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 进而 $\varphi_k(\varphi_k \hat{u})^\vee \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. 由例 2.3 即知 $\varphi_k(\varphi_k \hat{u})^\vee \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. $\square$

2.12 补充: 一些特殊的分布

本节选自 [LG1], 旨在探讨分布与 Fourier 变换的更多性质, 并将它们与 PDE 理论联系起来.

2.12.1 支在一点的分布

命题 2.41 (支在一点的缓增分布刻画)

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 支在单点集 $\{x_0\}$ 上, 则存在 $k \in \mathbb{N}$ 与 $a_\alpha \in \mathcal{C}$ 使得

$$u = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha \partial^\alpha \delta_{x_0}.$$

证明 不失一般性可设 $x_0 = 0$, 根据缓增分布的等价刻画 2.28 知存在 $m, k \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\langle u, f \rangle| \lesssim \sum_{\substack{|\alpha| \leq m \\ |\beta| \leq k}} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha (\partial^\beta f)(x)|, \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

下面证明若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\partial^\alpha \varphi)(0) = 0, \quad \forall |\alpha| \leq k, \quad (2.72)$$

则 $\langle u, \varphi \rangle = 0$. 这是因为取定满足 (2.72) 的 φ 后, 设 $\zeta(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中在 $|x| \geq 2$ 时恒等于 1, 在 $|x| \leq 1$ 时恒等于 0 的光滑函数. 记 $\zeta^\varepsilon(x) = \zeta(\frac{x}{\varepsilon})$, 根据 (2.72) 式与 φ 在原点的光滑性不难说明对任意 $|\alpha| \leq m, |\beta| \leq k$ 均有 $\rho_{\alpha, \beta}(\zeta^\varepsilon \varphi - \varphi) \rightarrow 0$, 于是

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq |\langle u, \zeta^\varepsilon \varphi \rangle| + |\langle u, \zeta^\varepsilon \varphi - \varphi \rangle| \lesssim 0 + \sum_{\substack{|\alpha| \leq m \\ |\beta| \leq k}} \rho_{\alpha, \beta}(\zeta^\varepsilon \varphi - \varphi) \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0,$$

断言因而成立.

现设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 记 $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是在原点附近为 1 的函数. 对 f 作 Taylor 展开有:

$$f(x) = \eta(x) \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} x^\alpha + h(x) \right) + (1 - \eta(x))f(x), \quad (2.73)$$

其中 $x \rightarrow 0$ 时 $h(x) = O(x^{k+1})$, 故 ηh 满足 (2.72) 式, 因而 $\langle u, \eta h \rangle = 0$. 另外根据 η 的构造与 $\text{supp } u \subset \{0\}$ 可知

$$\langle u, ((1 - \eta)f) \rangle = 0.$$

现在在 (2.73) 式两端同时作用 u 有

$$\langle u, f \rangle = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} \langle u, x^\alpha \eta(x) \rangle = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha (\partial^\alpha \delta_0)(f),$$

其中 $a_\alpha = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} \langle u, x^\alpha \eta(x) \rangle$. 最后, 可以说明 a_α 实际上与 η 的取法无关, 命题即证 $\square$

依此立得下述推论:

推论 2.6 (频率支在原点的缓增分布刻画)

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 若 $\hat{u}$ 支在单点集 $\{\xi_0\}$ 上, 则 u 必是形如 $(-i2\pi\xi)^\alpha e^{i2\pi\xi \cdot \xi_0}$ 的有限线性组合, 其中 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 是多重指标. 特别地, 如果 $\hat{u}$ 支在原点, 那么 u 是多项式^a.

^a将推论中的 $\hat{u}$ 换成 $u^\vee$ 也可以, 因为 Fourier 变换与逆变换之间只差一个反射.



证明 支在一点的缓增分布刻画 2.41 已经表明 $\hat{u}$ 形如 ξ_0 处 Dirac 测度的有限线性组合, 由缓增分布 Fourier 变换的性质 2.3(iv) 即得结论. $\square$

注 上述推论在齐次空间理论 (诸如齐次 Sobolev 空间, 齐次 Littlewood-Paley 分解) 中均起重要作用. 后面会介绍空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \setminus P(\mathbb{R}^n)$, 其基本动机正源于此.

2.12.2 Laplace 算子

Laplace 算子 Δ 是应用在 $\mathbb{R}^n$ 中缓增分布上的偏微分算子:

$$\Delta(u) = \sum_{j=1}^n \partial_j^2 u.$$

Laplace 方程 $\Delta(u) = 0$ 的解称为调和分布. 特别有下述结论成立:

推论 2.7

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\Delta(u) = 0$, 则 u 是多项式.



证明 在方程两边取 Fourier 变换可知 $\widehat{\Delta(u)} = 0$, 因而在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中有

$$-4\pi^2 |\xi|^2 \hat{u} = 0.$$

这说明 $\hat{u}$ 支在原点, 因而根据频率支在原点的缓增分布刻画 2.6 知 u 是多项式. $\square$

特别地, 如果调和分布在 $\mathbb{R}^n$ 上有界, 它就必是缓增分布, 而上述推论表明它是多项式, 但只有零阶多项式 (即常数) 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界, 故此时其必为常数, 这便是大名鼎鼎的 Liouville 定理.

下面推导 Laplace 方程在 $\mathbb{R}^n$ 中的基本解. 在 PDE 理论中, 称分布 u 是偏微分算子 L 的基本解, 指的是 $L(u) = \delta_0$. 下面的结果给出了 Laplace 算子的基本解:

命题 2.42 (Laplace 算子的基本解)

对 $n \geq 3$ 有

$$\Delta(|x|^{2-n}) = -(n-2) \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \delta_0, \quad (2.74)$$

对 $n = 2$ 有

$$\Delta(\log |x|) = 2\pi \delta_0. \quad (2.75)$$

其中原点处的导数是在分布意义下的.



证明 对 (2.74) 式, 考虑 Green 公式:

$$\int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dx = \int_{\partial \Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds,$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 边界光滑的开集, $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 表示 v 在单位外法向量方向上的导数. 取 $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \overline{B(0, \varepsilon)}$, $v = |x|^{2-n}$, $u = f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 知 $f(r\theta)$ 的法向导数正是其关于径向变量 r 的导数. 观察到 $x \neq 0$ 时 $\Delta(|x|^{2-n}) = 0$, 于是

$$\int_{|x|>\varepsilon} \Delta(f)(x) |x|^{2-n} dx = - \int_{|\theta|=\varepsilon} \left(\varepsilon^{2-n} \frac{\partial f}{\partial r} - f(\theta) \frac{\partial r^{2-n}}{\partial r} \right) d\theta, \quad (2.76)$$

其中 $d\theta$ 表示球面 $|\theta| = \varepsilon$ 上的面测度. 注意到一方面因为 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故存在关于 f 的常数 C_f 使得

$$\left| \int_{|\theta|=\varepsilon} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta \right| \leq C_f \varepsilon^{n-1}.$$

另一方面

$$\int_{|\theta|=\varepsilon} f(r\theta) \varepsilon^{1-n} d\theta \rightarrow \nu_{n-1} f(0), \quad \varepsilon \rightarrow 0,$$

其中 ν_{n-1} 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的面积. 现在在(2.76)式两端同时令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 知

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} \Delta(f)(x) |x|^{2-n} dx = -(n-2) \nu_{n-1} f(0).$$

代入 $\nu_{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}$ 即得欲证.

(2.75)式的证明与上述证明是完全类似的, 只需注意将(2.76)式中的 $\frac{\partial r^{2-n}}{\partial r}$ 换成 $\frac{\partial \log r}{\partial r}$ 即可. $\square$

2.12.3 齐次分布

Laplace 算子的基本解是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数, 也是 $n \geq 3$ 时的 $2-n$ 阶齐次分布. 齐次分布本身在诸多领域中有十分广泛的应用, 故本小节将研究齐次分布的简单性质与一些例子.

定义 2.19 (齐次分布)

若缓增分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足对任意 $\lambda > 0$ 与任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\langle u, \varphi(\lambda(\cdot)) \rangle = \lambda^{-n-\gamma} \langle u, \varphi \rangle,$$

就称 u 是 γ 阶齐次分布.

注 当缓增分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 可视作函数时, 其作为分布的齐次性和作为函数的齐次性是相容的. 这是因为如果 u 是 γ 阶齐次分布, 任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 可得:

$$\begin{aligned} \langle u, \varphi(\lambda(\cdot)) \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \varphi(\lambda x) dx = \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} u\left(\frac{x}{\lambda}\right) \varphi(x) dx \\ &= \lambda^{-n-\gamma} \langle u, \varphi \rangle = \lambda^{-n-\gamma} \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \varphi(x) dx, \end{aligned}$$

因而 $\lambda^{-n} u(\frac{x}{\lambda}) = \lambda^{-n-\gamma} u(x)$, 亦即 $u(x) = \lambda^{-\gamma} u(\frac{x}{\lambda})$, 这正是 γ 阶齐次函数的定义.

从定义出发可以验证下述性质:

命题 2.43 (齐次分布的简单性质)

- (a) δ_0 是 $-n$ 阶齐次分布;
- (b) 若 u 是 γ 阶齐次分布, 则 $\partial^\alpha u$ 是 $\gamma - |\alpha|$ 阶齐次分布;
- (c) u 是 γ 阶齐次分布当且仅当 $\hat{u}$ 是 $-n - \gamma$ 阶齐次分布.

证明 (a) 任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \delta_0, \varphi(\lambda(\cdot)) \rangle = \varphi(0) = \lambda^{-n-(-n)} \varphi(0) = \lambda^{-n-(-n)} \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

根据定义即得结论.

(b) 当 u 是 γ 阶齐次分布, 任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\lambda > 0$ 知

$$\begin{aligned} \langle \partial^\alpha u, \varphi(\lambda(\cdot)) \rangle &= \langle u, (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha (\varphi(\lambda(\cdot))) \rangle = \langle u, (-1)^{|\alpha|} \lambda^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(\lambda(\cdot)) \rangle \\ &= \lambda^{-n-\gamma+\alpha} \langle u, (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi \rangle = \lambda^{-n-(\gamma-|\alpha|)} \langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

根据定义即得结论.

(c) 当 u 是 γ 阶齐次分布, 任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\lambda > 0$ 知

$$\begin{aligned}\langle \widehat{u}, \varphi(\lambda(\cdot)) \rangle &= \langle u, \widehat{\varphi(\lambda(\cdot))} \rangle = \left\langle u, \frac{1}{\lambda^n} \widehat{\varphi} \left(\frac{\xi}{\lambda} \right) \right\rangle \\ &= \lambda^{-n} \langle u, \widehat{\varphi}(\lambda^{-1}\xi) \rangle = \lambda^{-n} \lambda^{n+\gamma} \langle u, \widehat{\varphi} \rangle \\ &= \lambda^{-n-(-n-\gamma)} \langle \widehat{u}, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

根据定义即得结论. $\square$

上面的命题特别说明了 $\mathbb{R}^n$ 上的 Dirac 测度是 $-n$ 阶齐次分布, 下面讨论另一种 $-n$ 阶齐次分布 W_Ω , 它将在奇异积分算子中起到至关重要的作用:

$$\langle W_\Omega, f \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} f(x) dx, \quad (2.77)$$

其中 Ω 是球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上积分为零的可积函数. 下面验证 $W_\Omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是良定义的. 事实上, 因为 $\frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n}$ 在任意中心在原点的环³¹上积分均为零, 知

$$\begin{aligned}|\langle W_\Omega, \varphi \rangle| &= \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} (\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \varphi(x) dx \right| \\ &\leq \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \leq 1} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^{n-1}} dx + \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x| |\varphi(x)| \right) \int_{|x| \geq 1} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^{n+1}} dx \\ &\lesssim \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + \sum_{|\alpha| \leq 1} \|x^\alpha \varphi(x)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}.\end{aligned}$$

因此 $W_\Omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 类似于在原点的 Dirac 测度, 容易观察知 W_Ω 也是 $-n$ 阶齐次分布. 事实上只要 $\mathbb{R}^n$ 上的某 $-n$ 阶齐次分布在原点之外与某光滑函数重合, 它就具有 W_Ω 的形式, 此即下述结果:

命题 2.44 (零阶齐次函数的刻画)

若 $m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 是零阶齐次函数, 则存在标量 b 与 $\Omega \in C^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 且

$$m^\vee = b\delta_0 + W_\Omega, \quad (2.78)$$

其中 W_Ω 是按(2.77)式定义的分布^a.

^a因为零次齐次的连续函数一定有界, 故 m 首先是一个缓增分布, 因而上述 Fourier 逆变换是缓增分布意义下的.

要证明上述命题, 我们需要下面的命题作为铺垫:

命题 2.45 (z 阶齐次分布的性质)

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的 C^∞ 函数, 且其是 $z(z \in \mathbb{C})$ 阶齐次的, 则 $\widehat{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

在承认命题2.45的前提下, 下面来证明零阶齐次函数的刻画2.44.

证明 设 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} m(x) dx = a$, 因为 m 本身是零阶齐次函数 (即 $m(x) = m(\lambda x)(\forall \lambda \in \mathbb{C})$), 故 $m(x) - a = m(\lambda x) - a$ ($\forall \lambda \in \mathbb{C}$), 因而函数 $m - a$ 也是零阶齐次函数. 因为 m 至少在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上可积, 根据其零阶齐次性知 $m \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 从而 $m - a \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$. 因为 $m - a \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 其自然能被视作缓增分布, 设 $m - a = \widehat{u}$, 其中 u 是缓增分布. 因为 $\widehat{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 故由命题2.45知同样有 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ ³². 设 Ω 是 u 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的限制, 则显然 $\Omega \in C^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$ 是良定义的. 因为 $\widehat{u}$ 是零阶齐次函数, 故在 $\widehat{u}(\lambda\xi) = \widehat{u}(\xi)$ 两边同时作 Fourier 逆变换可知 u 是 $-n$ 阶齐次函数, 又注意到 u 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上与 Ω 重合, 故对 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 有 $u(x) = \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n}$.

下面说明 Ω 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上积分为零. 取 $\mathbb{R}^n$ 中非负径向光滑的非零函数 ψ , 设其支在环 $1 < |x| < 2$ 内, 考虑极坐

³¹ $\mathbb{R}^n$ 中以 x 为中心, r, R 分别为内圈, 外圈半径的环定义为 $\{\xi \in \mathbb{R}^n : 0 < r \leq |x - \xi| \leq R\}$.

³² 因为 $\widehat{\widehat{u}} = u(-\cdot)$, 故命题2.45同样可由 $\widehat{u}$ 的性质推得 u 的性质.

标换元有:

$$\begin{aligned}\langle u, \psi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \psi(x) dx = c_\psi \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) d\theta, \\ \langle u, \psi \rangle &= \langle \hat{u}, \psi^\vee \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} (m(\xi) - a) \psi^\vee(\xi) d\xi = c'_\psi \int_{\mathbb{S}^{n-1}} (m(\theta) - a) d\theta = 0.\end{aligned}$$

于是因为 $c_\psi \neq 0$, 只能有 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) d\theta = 0$.

现在按照(2.77)式定义分布 W_Ω , 知其在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与函数 $\frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n}$ 重合. 与此同时分布 u 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上也与该函数重合, 这说明 $u - W_\Omega$ 支在原点. 频率支在原点的缓增分布刻画2.6表明 $u - W_\Omega$ 是 Dirac 测度一系列导数的有限和. 又因为 $u - W_\Omega$ 是 $-n$ 阶齐次分布, 而 $\partial^\alpha \delta_0$ 仅在 $\alpha = 0$ 时成为 $-n$ 阶齐次分布, 故

$$u - W_\Omega = c\delta_0.$$

又根据 u 的构造知 $u = (m - a)^\vee = m^\vee - a\delta_0$, 故 $m^\vee = (c + a)\delta_0 + W_\Omega$, 命题即证. $\square$

下面证明 z 阶齐次分布的性质2.45.

证明 设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 z 阶齐次函数, 且在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑, 往证 $\hat{u}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上也光滑, 这便需要说明 $\hat{u} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 对任意 $M \in \mathbb{N}$ 均成立. 取定 $M \in \mathbb{N}$, 设 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 满足

$$|\alpha| > n + M + \operatorname{Re} z. \quad (2.79)$$

设 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $|x| \geq 2$ 时恒为 1, 而在 $|x| \leq 1$ 时恒为零, 记 $u_0 = (1 - \varphi)u$, $u_\infty = \varphi u$, 则

$$\partial^\alpha u = \partial^\alpha u_0 + \partial^\alpha u_\infty,$$

于是

$$\widehat{\partial^\alpha u} = \widehat{\partial^\alpha u_0} + \widehat{\partial^\alpha u_\infty}.$$

其中各算子的作用是在分布的意义下进行的. 因为 u_0 是紧支函数, 故根据紧支分布 Fourier 变换的性质2.21知 $\widehat{\partial^\alpha u_0} \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. 现根据 Leibniz 公式有

$$\partial^\alpha u_\infty = v + \varphi \partial^\alpha u,$$

其中 v 是支在环 $1 \leq |x| \leq 2$ 上的光滑函数, 这是因为 v 本质上是应用 Leibniz 公式后全体对 φ 求过偏导的部分的求和. 因为 φ 在 $|x| \leq 1$ 和 $|x| \geq 2$ 上均为常数, 因此 φ 的各阶偏导是支在 $1 \leq |x| \leq 2$ 上的光滑函数, 又因为 u 在原点之外也是光滑函数, 故 v 只能支在 $1 \leq |x| \leq 2$ 上. 现知 $\hat{v} \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 于是只需说明 $\widehat{\varphi \partial^\alpha u} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 即可. 显见 $\varphi \partial^\alpha u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 同时根据 u 是 z 阶齐次函数容易证明 $\partial^\alpha u$ 是 $z - |\alpha|$ 阶齐次函数, 于是类似于零阶齐次函数刻画2.44证明中的蓝色部分, 可得 $(\partial^\alpha u)(x) = |x|^{-|\alpha|+z}(\partial^\alpha u)(\frac{x}{|x|})$. 因为 φ 支在原点之外, 故存在 $C_\alpha > 0$ 使得

$$|\varphi(x)(\partial^\alpha u)(x)| \leq \frac{C_\alpha}{(1 + |x|)^{|\alpha| - \operatorname{Re} z}}. \quad (2.80)$$

为了藉由(2.80)式阐明 $\hat{u}$ 的光滑性, 需要引入下述引理:

引理 2.13

若函数 f 满足估计

$$|f(x)| \leq \frac{C}{(1 + |x|)^N},$$

其中 $C > 0, N > n + 1$, 则对任意满足 $1 \leq M < N - n$ 的 $M \in \mathbb{N}$ 均有 $\hat{f} \in C^M(\mathbb{R}^n)$.



这是因为对任意 $\xi_0 \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned}|\hat{f}(\xi) - \hat{f}(\xi_0)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \cdot |e^{-i2\pi x \cdot \xi} - e^{-i2\pi x \cdot \xi_0}| dx \\ &\lesssim \int_{\mathbb{R}^n} |2\pi x f(x)| \cdot |\xi - \xi_0| dx \\ &\lesssim |\xi - \xi_0| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|x|}{(1 + |x|)^N} dx.\end{aligned}$$

于是首先有 $\widehat{f} \in C^1(\mathbb{R}^n)$. 对一般的 $1 \leq M < N - n$, 注意 $\partial^\alpha \widehat{f} = ((-i2\pi x)^\alpha f)^\wedge$ 同样可证 $\widehat{f} \in C^M(\mathbb{R}^n)$, 引理得证.

回到原命题, 根据引理可知只要 $|\alpha| > n + M + \operatorname{Re} z$, 就有 $\widehat{\varphi \partial^\alpha u} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 因而 $\widehat{\partial^\alpha u_\infty} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 这便说明 $\widehat{\partial^\alpha u} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. 下面从 $\widehat{\partial^\alpha u}(\xi) = (i2\pi\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi)$ 出发来推导 $\widehat{u} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. 设 $\xi \neq 0$, 取 ξ 的某邻域 V 满足对 V 内任意一点 η 均存在 $j \in \{1, \dots, n\}$ 使得 $\eta_j \neq 0$. 考虑多重指标 $(0, \dots, |\alpha|, \dots, 0)$ (其中 $|\alpha|$ 在第 j 位, 其余位均为 0), 知 $(i2\pi\eta_j)^{|\alpha|} \widehat{u}(\eta)$ 是 V 上的 C^M 函数, 两边同除 $\eta_j^{|\alpha|}$ 即知 $\widehat{u}(\eta)$ 也是 V 上的 C^M 函数, 因此 $\widehat{u} \in C^M(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. 又因为前面选取的 M 是任意的, 结论因而成立. $\square$

本小节末我们再给出一个齐次分布的例子, 即 $\mathbb{R}^n$ 上的幂函数 $|t|^z$ 诱导的分布 (其中 $\operatorname{Re} z \leq -n$). 若 $n = 1$, 则缓增分布

$$\langle w_z, \varphi \rangle := \int_{-1}^1 |t|^z \varphi(t) dt$$

在 $\operatorname{Re} z > -1$ 时是良定义的, 这是因为

$$|\langle w_z, \varphi \rangle| \leq \|\varphi\|_{L^\infty[-1,1]} \int_{-1}^1 |t|^{\operatorname{Re} z} dt \lesssim \rho_{0,0}(\varphi),$$

故 w_z 确为缓增分布. 我们还可以将这一定义延拓到 $\operatorname{Re} z > -3$ 且 $z \neq -1$ 的情况, 延拓方法为将上式重写为

$$\langle w_z, \varphi \rangle = \int_{-1}^1 |t|^z (\varphi(t) - \varphi(0) - t\varphi'(0)) dt + \frac{2}{z+1} \varphi(0), \quad (2.81)$$

且由 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 与微分中值定理可知

$$|\langle w_z, \varphi \rangle| \leq \frac{1}{|\operatorname{Re} z + 3|} \|\varphi''\|_{L^\infty(\mathbb{R})} + \frac{2}{|z+1|} \|\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

因此 $w_z \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, 这样的延拓进而是合理的. 另外若采用 φ 在 0 处的三阶而非一阶 Taylor 多项式, 通过类似(2.81)式的形式可以进一步将 w_z 的定义延拓至 $\operatorname{Re} z > -5, \operatorname{Re} z \notin \{-1, -3\}$ 的情况. 随着 Taylor 多项式的阶数越来越高, w_z 的定义可以延拓到 $z \in \mathbb{C}$ 不为负奇数的情况. 为将 $z = -1, -3, \dots$, 这些点也囊入 w_z 的定义, 我们就需要给 w_z 乘上某个整函数, 这个整函数需要在全体负奇数处为零, 如此才能消掉这些一阶极点. $\Gamma(\frac{z+1}{2})^{-1}$ 就是满足该要求的一个整函数³³. 上述讨论在 $\mathbb{R}^n$ 中对应着下述定义³⁴:

定义 2.20

对 $z \in \mathbb{C}$, 可定义分布 u_z 为:

$$\langle u_z, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} |x|^z f(x) dx. \quad (2.82)$$

显见 u_z 在 $\operatorname{Re} z > -n$ 时与局部可积函数 $x \mapsto \pi^{\frac{z+n}{2}} \Gamma(\frac{z+n}{2})^{-1} |x|^z$ 重合, u_z 自身也只在 $\operatorname{Re} z > -n$ 时良定义. 由定义立得 u_z 是 z 阶齐次分布. 下面将 u_z 的定义延拓到 $z \in \mathbb{C}$ 的情况. 先设 $\operatorname{Re} z > -n$, 取定正整数 N . 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 将积分(2.82)重写为:

$$\begin{aligned} \int_{|x|<1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \left(f(x) - \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} x^\alpha \right) |x|^z dx + \int_{|x|>1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} f(x) |x|^z dx \\ + \int_{|x|<1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} x^\alpha |x|^z dx. \end{aligned}$$

³³ 回忆 Γ 函数的所有极点为负整数.

³⁴ 前面所谈的定义方式问题在于, 从 $\operatorname{Re} z > -n$ 的定义不能直接推到 $\operatorname{Re} z > -n-1$ 的定义, 中间会出现 $\operatorname{Re} z = -n$ 这一未定义点. 因此为了得到归纳定义 (亦即从 $\operatorname{Re} z > -n$ 可归纳得 $\operatorname{Re} z > -n-1$, 而无需强调未定义点) 而重新规定 u_z 的定义为下述新定义.

对上式最后一项用极坐标换元知上式即

$$\begin{aligned} & \int_{|x|<1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \left(f(x) - \sum_{|\alpha|\leq N} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} x^\alpha \right) |x|^z dx + \int_{|x|>1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} f(x) |x|^z dx \\ & + \sum_{|\alpha|\leq N} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \int_0^1 dr \int_{\mathbb{S}^{n-1}} (r\theta)^\alpha r^{z+n-1} d\theta. \end{aligned}$$

现在对于上最后一项, 令

$$\begin{aligned} b(n, \alpha, z) &= \frac{1}{\alpha!} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \int_0^1 dr \int_{\mathbb{S}^{n-1}} (r\theta)^\alpha r^{z+n-1} d\theta \\ &= \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \frac{1}{\alpha!} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \theta^\alpha d\theta \right) \int_0^1 r^{|\alpha|+n+z-1} dr \\ &= \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \frac{1}{\alpha!} \frac{\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \theta^\alpha d\theta}{|\alpha| + z + n}, \end{aligned}$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是多重指标. 因为 $\mathbb{S}^{n-1}$ 关于原点对称, 故根据奇函数在原点对称集上积分的消失性知, 只要有某个 α_j 是奇数, 就有 $b(n, \alpha, z) = 0$. 于是不妨设全体 α_j 均为偶数, 因此 $|\alpha|$ 也是偶数. 回忆复变函数的结论, 知点 $z = -n, z = -(n+2), z = -(n+4), \dots$ 均为函数 $\Gamma(\frac{z+n}{2})$ 的一阶极点, 这些极点恰好抵消了函数 $z \mapsto (|\alpha| + z + n)^{-1}$ 在 $z = -n - |\alpha|$ ($|\alpha|$ 是 $[0, N]$ 中的偶数) 处的极点. 因此

$$\begin{aligned} \langle u_z, f \rangle &= \int_{|x|\geq 1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} f(x) |x|^z dx + \sum_{|\alpha|\leq N} b(n, \alpha, z) (-1)^{|\alpha|} \langle \partial^\alpha \delta_0, f \rangle \\ &+ \int_{|x|<1} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} \left(f(x) - \sum_{|\alpha|\leq N} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} x^\alpha \right) |x|^z dx. \end{aligned} \quad (2.83)$$

上式中出现的两个积分在 $\operatorname{Re} z > -N - n - 1$ 时均绝对收敛, 这是因为第一个积分中 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故被积函数在 x 足够大时是足够衰减的; 第二个积分中根据中值定理可知 $f(x) - \sum_{|\alpha|\leq N} \frac{(\partial^\alpha f)(0)}{\alpha!} x^\alpha$ 能被 $|x|^{N+1}$ 的常数倍控制, 代入该控制后得到的函数在 $x=0$ 附近形如 $|x|^{N+1+z}$, 又因为 $\operatorname{Re} z > -N - n - 1$, 故 $N+1+\operatorname{Re} z > -1$, 这说明被积函数在 $x=0$ 附近可积. 因此, (2.83) 式所定义的关于 z 的函数在 $\operatorname{Re} z > -N - n - 1$ 时是良定义的解析函数.

因为 N 是任意整数, 故 $\langle u_z, f \rangle$ 在 $\mathbb{C}$ 上有解析延拓. 因此, u_z 是关于 z 的分布值整函数, 亦即对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 而言, 函数 $z \mapsto \langle u_z, \varphi \rangle$ 都是整函数. 另外对每个给定的 $z \in \mathbb{C}$ 而言, u_z 都是缓增分布, 因为在 (2.83) 右式第一项中, 将被积函数记为 $C|x|^{\operatorname{Re} z+n+1} f(x) \cdot |x|^{-n-1}$, 利用 Hölder 不等式即知该项可被 f 的 Schwartz 半范控制; 第二项是 Dirac 测度及其偏导在 f 上的作用, 由 Dirac 测度是缓增分布即知该项可被 f 的 Schwartz 半范控制; 第三项中的被积函数依照中值定理能被 $\|\partial^{N+1} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |x|^{N+1+\operatorname{Re} z}$ 控制, 因此第三项也可被 f 的 Schwartz 半范控制. 至此即知对每个 $z \in \mathbb{C}$ 而言均有 $u_z \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

在阐明 u_z 是缓增分布后, 便可以对其作用 Fourier 变换了. 根据齐次分布的简单性质 2.43(c) 知 $\widehat{u_z}$ 是 $-n-z$ 次齐次分布, 进一步有下述结果:

定理 2.22

对任意 $z \in \mathbb{C}$ 均有 $\widehat{u_z} = u_{-n-z}$.

证明 证明的思路是很直接的: 先证明对某一范围的 z 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^z \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = C(n, z) \int_{\mathbb{R}^n} |x|^{-n-z} \varphi(x) dx, \quad (2.84)$$

其中 $C(n, z)$ 是常数, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 任取; 然后取一个特定的 φ 来估计常数 $C(n, z)$; 最后根据解析函数没有孤立零点将 (2.84) 式推广到整个复平面上. 在 (2.84) 式中考虑极坐标换元 (这里可以暂时设 $-n < \operatorname{Re} z < 0$ 以保证式子两端

积分均有意义), 记 $\xi = \rho\phi, x = r\theta$, 有:

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^z \widehat{\varphi}(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^z \left(\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \right) d\xi \\
 &= \int_0^\infty \rho^z \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \int_0^\infty \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(r\theta) e^{-i2\pi r\rho\phi \cdot \theta} d\theta \cdot r^{n-1} dr \cdot d\phi \cdot \rho^{n-1} d\rho \\
 &\stackrel{(A)}{=} \int_0^\infty r^{n-1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(r\theta) \int_0^\infty \rho^{z+n-1} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} e^{-i2\pi r\rho(\phi \cdot \theta)} d\phi \right) d\rho d\theta dr \\
 &= \int_0^\infty r^{n-1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(r\theta) \left(\int_0^\infty \rho^{z+n-1} \sigma_n(r\rho) d\rho \right) d\theta dr \\
 &\stackrel{(B)}{=} C(n, z) \int_0^\infty r^{-z-n} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(r\theta) d\theta \right) r^{n-1} dr \\
 &= C(n, z) \int_{\mathbb{R}^n} |x|^{-n-z} \varphi(x) dx,
 \end{aligned}$$

其中

$$\sigma_n(t) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} e^{-i2\pi t(\theta \cdot \varphi)} d\varphi = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} e^{-i2\pi t\varphi_1} d\varphi, \quad (2.85)$$

$$C(n, z) = \int_0^\infty \sigma_n(t) t^{z+n-1} dt, \quad (2.86)$$

上述推导中 (A) 需要特别强调积分顺序的调换: 这里因为 $\int_0^\infty \rho^{z+n-1} d\rho$ 可能为 ∞ , 故我们并不能随意调换与之相关的换元 (即 $d\rho, d\phi$) 对应的积分顺序. 出于相同原因, (A) 所蕴含的将 $d\phi d\rho$ 与 $d\theta dr$ 整体调换的合法性是之后要说明的, 出现在此只为叙述需要. (B) 中 r 的指数是在 (B) 左式括号中凑微分计算得到的. (2.85) 式中第二个等号是对 φ 作对应正交变换得到的. 下面要说明 (A) 的操作合法, 就是要说明 (2.86) 右式积分对某个范围内的 z 均收敛.

若 $n = 1$, 则

$$\sigma_1(t) = \int_{\mathbb{S}^0} e^{-i2\pi t\varphi} d\varphi = e^{-i2\pi t} + e^{i2\pi t} = 2 \cos(2\pi t),$$

此时可说明 (2.86) 右式积分在 $-1 < \operatorname{Re} z < 0$ 时条件收敛.

现设 $n \geq 2$. 因为 $|\sigma_n(t)| \leq \nu_{n-1} = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} d\varphi$, 故在 $\operatorname{Re} z > -n$ 时, (2.86) 右式积分在 t 很小时绝对收敛. 下面考察 $\sigma_n(t)$ 在 t 很大时的表现. 由引理 4.2 与 Bessel 函数的定义

$$J_v(t) = \frac{(t/2)^v}{\Gamma(v + \frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})} \int_{-1}^1 e^{its} (1-s^2)^v \frac{ds}{\sqrt{1-s^2}},$$

可知

$$\sigma_n(t) = \nu_{n-2} \int_{-1}^1 e^{i2\pi ts} (\sqrt{1-s^2})^{n-2} \frac{ds}{\sqrt{1-s^2}} = c_n t^{-\frac{n-2}{2}} J_{\frac{n-2}{2}}(2\pi t),$$

其中 c_n 是某常数. 因为 $n \geq 2 \Rightarrow \frac{n-2}{2} > -\frac{1}{2}$, 故由 Bessel 函数的渐进性质³⁵知对任意 $\operatorname{Re} v > -\frac{1}{2}$ 与 $r \geq 1$ 有:

$$|J_v(r)| \leq C_1(\operatorname{Re} v) e^{(\max((\operatorname{Re} v + \frac{1}{2})^{-2}, (\operatorname{Re} v + \frac{1}{2})^{-1}) + \frac{\pi}{2}) |\operatorname{Im} v|^2} r^{-\frac{1}{2}}.$$

因此对任意 $t \geq 1$ 均有 $|\sigma_n(t)| \leq ct^{-\frac{n-1}{2}}$. 现在将 (2.86) 右式积分分为 $t \leq 1$ 和 $t > 1$ 两部分, 利用该估计即知 $\operatorname{Re} z > -n$ 时 $t \leq 1$ 的部分绝对收敛, $\operatorname{Re} z < -\frac{n+1}{2}$ 时 $t \geq 1$ 的部分绝对收敛.

现在已经知道了在 $-n < \operatorname{Re} z < -\frac{n+1}{2} \wedge n \geq 2$ 或 $-1 < \operatorname{Re} z < 0 \wedge n = 1$ 时, (A) 的操作是合法的, 进而根据缓增分布的 Fourier 变换定义知存在常数 $C(n, z)$ 使得

$$\frac{\Gamma(\frac{z+n}{2})}{\pi^{\frac{z+n}{2}}} \widehat{u_z} = C(n, z) \frac{\Gamma(-\frac{z}{2})}{\pi^{\frac{z}{2}}} u_{-n-z}.$$

下面通过取特殊函数来计算 $C(n, z)$. 在 (2.84) 式中取 $\varphi(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 已知该函数满足 $\widehat{\varphi} = \varphi$, 现将其代入 (2.84) 式并考虑极坐标换元可得

$$\nu_{n-1} \int_0^\infty r^{z+n-1} e^{-\pi r^2} dr = C(n, z) \nu_{n-1} \int_0^\infty r^{-z-n+n-1} e^{-\pi r^2} dr.$$

³⁵ 参见 [LG1] Appendix B.7, 这里可以只关注结论.

换元 $s = \pi r^2$ 并利用 Gamma 函数的定义即得

$$C(n, z) = \frac{\Gamma(\frac{z+n}{2})}{\Gamma(-\frac{z}{2})} \frac{\pi^{-\frac{z+n}{2}}}{\pi^{\frac{z}{2}}}.$$

至此即得 $\widehat{u_z} = u_{-n-z}$.

注意到对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 函数 $z \mapsto \langle \widehat{u_z} - u_{-n-z}, f \rangle$ 都是整函数, 且在 $-n < \operatorname{Re} z < -n + \frac{1}{2}$ 时均为零. 因为非零解析函数没有孤立零点, 故该函数在整个复平面上均为零, 定理即证. $\square$

2.13 $L^p(1 < p \leq 2)$ 上的 Fourier 变换

引进 Schwartz 函数空间的目的就在于把 L^1 上的 Fourier 变换延拓到 $L^p(1 < p \leq \infty)$ 上. 注意 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 作为一个“大”空间, 其上的 Fourier 变换已经在上一节具有良定义了, 所以要给出 $L^p(\mathbb{R}^n)(1 < p \leq \infty)$ 上 Fourier 变换的定义, 就可以考虑说明 $L^p(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)(1 < p \leq \infty)$, 再套用 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中 Fourier 变换的定义即可. 此即下述命题:

命题 2.46

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leq p \leq \infty)$, 则 f 唯一对应一个缓增分布.

证明 任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\langle T_f, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx,$$

首先由 Hölder 不等式即知 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx$ 有限, 下证 $T_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 事实上, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Hölder 不等式知

$$|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|\varphi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)},$$

又由补充命题 2.1 知 $\|\varphi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$ 能被函数 $x^\alpha \varphi(x)$ 的 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 范数的有限线性组合所控制, 故其能被 φ 的有限 Schwartz 半范和控制, 进而 $T_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. $\square$

根据命题 2.46, 只要 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leq p \leq \infty)$, 就可以在缓增分布的意义下按照补充命题 2.2 去定义 f 的 Fourier 变换, 根据这个思路可以得到下述 Plancherel 定理:

定理 2.23 (Plancherel)

Fourier 变换是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的等距映射. 即对任意 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 均有 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ (其中 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 意为存在 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\widehat{f} = T_g(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$), 且 $\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$, 且 $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$. 另有

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| < R} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad (2.87)$$

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (2.88)$$

并且上述两个极限均在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 意义下成立.

证明 首先证明 Plancherel 恒等式在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中成立. 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令 $g := \overline{\widehat{f}}$, 则 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 由 Fourier 反演公式 2.14 知

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} g(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\widehat{f}(x)} e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \overline{\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{i2\pi x \cdot \xi} dx} = \overline{f(\xi)}, \end{aligned}$$

故由乘法公式 2.13 知

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{f(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \overline{\widehat{f}(x)} dx = \|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2. \end{aligned}$$

故 Plancherel 恒等式对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均成立.

下面证明 Plancherel 恒等式对任意 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 也成立. 因为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 故存在 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = 0$, 故 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 现由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Plancherel 恒等式知 $\{\widehat{f_k}\}_{k=1}^\infty$ 同样是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列, 故由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的完备性进一步知存在 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\widehat{f_k} - g\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = 0$. 由此并再次应用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Plancherel 恒等式知

$$\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\widehat{f_k}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

现在证明 $\widehat{f} = T_g(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. 事实上, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Hölder 不等式与 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\begin{aligned} \langle \widehat{f}, \varphi \rangle &= \langle f, \widehat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{\varphi}(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \widehat{\varphi}(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f_k}(x) \varphi(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \varphi(x) dx = \langle T_g, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

故 $\widehat{f} = T_g(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. 因此 $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$, 即 Plancherel 恒等式在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上成立.

下面证明 (2.87), (2.88) 式成立, 为此任取 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 对任意 $R \in (0, \infty)$ 定义 $f_R := f \chi_{B(0, R)}$, 显见 $f_R \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $\lim_{R \rightarrow \infty} f_R = f$ ($L^2(\mathbb{R}^n)$). 故由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Plancherel 恒等式知对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\xi) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \widehat{f_R}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_R(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| < R} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \end{aligned}$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立, 由此对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 进一步有

$$\begin{aligned} (\widehat{f})^\wedge(x) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(-\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \end{aligned} \quad (2.89)$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立. 又任取 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\|f - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$), 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Plancherel 恒等式知

$$\|(\widehat{f})^\wedge - (\widehat{f_k})^\wedge\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\widehat{f} - \widehat{f_k}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

由此及 Fourier 反演公式知

$$(\widehat{f})^\wedge = \lim_{k \rightarrow \infty} (\widehat{f_k})^\wedge = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f \quad (L^2(\mathbb{R}^n)),$$

再由此与 (2.89) 式知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \quad (L^2(\mathbb{R}^n)).$$

至此定理证毕. □

实际上, 依照这一套方法定义的 Fourier 变换的收敛性非常弱 (因为它考虑的收敛性是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的). 如果从函数而非分布的意义下考虑 Fourier 变换的延拓, 就需要 [ST4] 中给出的一个命题:

补充命题 2.4 (线性算子延拓定理)

设 $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ 是 Banach 空间, $S \subset X$ 是 X 的一个稠密线性子空间. 若 $T_0 : S \rightarrow Y$ 满足

$$\|T_0 f\|_Y \lesssim \|f\|_X, \quad \forall f \in S,$$

则 T_0 在 X 上有唯一的延拓 T , 且

$$\|T f\|_Y \lesssim \|f\|_X, \quad \forall f \in X.$$

进一步, $\|T\|_{X \rightarrow Y} = \|T_0\|_{S \rightarrow Y}$, 亦即 T 是 T_0 的保范延拓.

证明 任取 $f \in X$, 因为 S 在 X 中稠密, 故存在 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S$ 使得 $\|f_n - f\|_X \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 显见 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X 中的基本列, 根据 T_0 满足的条件知

$$\|T_0(f_n - f_m)\|_Y \lesssim \|f_n - f_m\|_X \rightarrow 0, m, n \rightarrow \infty,$$

于是 $\{T_0 f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 Y 中的基本列, 根据 Y 的完备性知其具有极限 y , 现构造算子

$$T: X \rightarrow Y, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f \mapsto Tf := \lim_{n \rightarrow \infty} T_0 f_n,$$

根据极限唯一性可见 Tf 并不依赖于 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的选取, 因而 $T: X \rightarrow Y$ 即为欲求. 下面证明 T 的保范性, 注意

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} = \sup_{\|f\|_X \leq 1} \|Tf\|_Y \geq \sup_{\substack{\|f\|_X \leq 1 \\ f \in S}} \|Tf\|_Y = \|T_0\|_{S \rightarrow Y},$$

故只需说明 $\|T\|_{X \rightarrow Y} \leq \|T_0\|_{S \rightarrow Y}$. 若 $\|T\|_{X \rightarrow Y} > \|T_0\|_{S \rightarrow Y}$, 根据算子范数的定义知

$$\exists f \in X (\|f\|_X \leq 1 \wedge \|Tf\|_Y > \|T_0\|_{S \rightarrow Y}).$$

根据 S 在 X 中的稠密性, 可设 $S \ni f_k \rightarrow f (k \rightarrow \infty)$, 且 $\|f_k\|_X \leq 1 (k = 1, 2, \dots)$. 于是必存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $\|Tf_K\|_X = \|T_0 f_K\|_X > \|T_0\|_{S \rightarrow Y}$, 矛盾! 命题即证. $\square$

延拓定理 2.4 对于 Plancherel 定理的优化在于它允许我们不再用 T_g 定义 $\hat{f}$, 而是直接把 L^2 函数 g 定义成 $\hat{f}$, 且这一定义不会改变 Plancherel 恒等式. 由此可知 L^2 函数的 Fourier 变换实际上还是 L^2 函数.

注 Plancherel 定理 2.23 给出了 Fourier 变换对 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 代数结构的作用, 事实上 Fourier 变换对 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的几何结构 (也即内积) 也有作用. [DY] 介绍了下述 Parseval 恒等式:

补充定理 2.2 (Fourier 变换的 Parseval 恒等式)

对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) \overline{\hat{g}(-x)} dx.$$

在泛函分析的课程中曾学习过范数与内积的相容性条件: 平行四边形等式. 事实上 Plancherel 定理介绍的是关于范数的等式, 而 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 作为内积空间, 范数和内积是可以互相诱导的, 故 Parseval 恒等式是 Plancherel 定理与平行四边形等式的直接推论.

在给出 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 和 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 这两个“端点空间”中的 Fourier 变换后, 下面可以研究 $L^p(\mathbb{R}^n) (1 < p < 2)$ 上的 Fourier 变换了. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 < p < 2)$, 在实变函数的课程中有结论: f 可以分解成 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n)$ (例如令 $f_1 = f \chi_{\{|x|: |f(x)| > 1\}}$, $f_2 = f - f_1$, 参见加和空间插值 1.14). 进而 $\hat{f} = \hat{f}_1 + \hat{f}_2 \in L^\infty(\mathbb{R}^n) + L^2(\mathbb{R}^n)$. 为了进一步研究 $\hat{f}$ 所处的空间, 需要下面的插值定理:

定理 2.24 (Riesz-Thorin 插值定理)

设 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$, 对 $0 < \theta < 1$ 定义 p, q 为:

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1},$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

现若 $T: L^{p_0}(\mathbb{R}^n) + L^{p_1}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{q_0}(\mathbb{R}^n) + L^{q_1}(\mathbb{R}^n)$ 是线性算子, 且其满足

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^{q_0}(\mathbb{R}^n)} &\leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall f \in L^{p_0}(\mathbb{R}^n), \\ \|Tf\|_{L^{q_1}(\mathbb{R}^n)} &\leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall f \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n), \end{aligned} \quad (2.90)$$

则

$$\|Tf\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

证明 若 $p = \infty$ 或 $q' = \infty$, 则命题无所可证. 下设 $p, q' < \infty$, 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^m a_k e^{i\alpha_k} \chi_{A_k}(x)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的有限简单函数, 其中 $a_k > 0, \alpha_k$ 是实数, A_k 是 $\mathbb{R}^n$ 中有限测度的不交子集列. 注意 $L^q(\mathbb{R}^n) = (L^{q'}(\mathbb{R}^n))^*$, 于是 $\|Tf\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}$ 可以视作 $L^{q'}(\mathbb{R}^n)$ 上的算子范数, 即:

$$\|Tf\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \sup_g \left| \int_{\mathbb{R}^n} Tf(y)g(y)dy \right|,$$

其中上确界在 $L^{q'}$ 范数小于等于 1 的全体有限简单函数 g 中取. 记

$$g(x) = \sum_{j=1}^n b_j e^{i\beta_j} \chi_{B_j}(x),$$

其中 $b_j > 0, \beta_j$ 是实数, B_j 是 $\mathbb{R}^n$ 中有限测度的不交子集列. 记

$$P(z) = \frac{p}{p_0}(1-z) + \frac{p}{p_1}z, \quad Q(z) = \frac{q'}{q'_0}(1-z) + \frac{q'}{q'_1}z. \quad (2.91)$$

对于闭带 $\bar{S} = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\}$ 中的 z , 定义

$$f_z(y) = \sum_{k=1}^m a_k^{P(z)} e^{i\alpha_k} \chi_{A_k}(y), \quad g_z(y) = \sum_{j=1}^n b_j^{Q(z)} e^{i\beta_j} \chi_{B_j}(y), \quad (2.92)$$

且记

$$F(z) = \int_{\mathbb{R}^n} Tf_z(y)g_z(y)dy.$$

注意 $P(\theta) = Q(\theta) = 1 \Rightarrow f_\theta(y) = f(y), g_\theta(y) = g(y)$, 根据积分的线性性知:

$$F(z) = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n a_k^{P(z)} b_j^{Q(z)} \int_{\mathbb{R}^n} T(\chi_{A_k})(y) \chi_{B_j}(y) dy.$$

因为 $a_k, b_j > 0$, 故 F 对 z 是解析的. 同时利用指标为 q_0, q'_0 的 Hölder 不等式与条件(2.90)可知

$$\int_{\mathbb{R}^n} T(\chi_{A_k})(y) \chi_{B_j}(y) dy \leq \|T\chi_{A_k}\|_{L^{q_0}(\mathbb{R}^n)} \|\chi_{B_j}\|_{L^{q'_0}(\mathbb{R}^n)} < \infty,$$

因而 $\int_{\mathbb{R}^n} T(\chi_{A_k})(y) \chi_{B_j}(y) dy$ 绝对收敛, 其为有限常数, 故 F 对 f_z, g_z 是良定义且关于 z 解析的函数.

根据 A_k 的不交性与 $|a_k^{P(it)}| = a_k^{\frac{p}{p_0}}$ 可知:

$$\begin{aligned} \|f_{it}\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{k=1}^m a_k^{P(it)} e^{i\alpha_k} \chi_{A_k}(y) \right|^{p_0} dy \right)^{\frac{1}{p_0}} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^m a_k^p \chi_{A_k}(y) dy \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{k=1}^m a_k e^{i\alpha_k} \chi_{A_k}(y) \right|^p dy \right)^{\frac{1}{p_0}} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p_0}}. \end{aligned}$$

同理根据 B_j 的不交性与 $|b_j^{Q(it)}| = b_j^{\frac{q'}{q'_0}}$ 可知:

$$\|g_{it}\|_{L^{q'_0}(\mathbb{R}^n)} = \|g\|_{L^{q'_0}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{q'}{q'_0}}.$$

故根据指标为 q_0, q'_0 的 Hölder 不等式与条件(2.90)知:

$$|F(it)| \leq \|T(f_{it})\|_{L^{q_0}(\mathbb{R}^n)} \cdot \|g_{it}\|_{L^{q'_0}(\mathbb{R}^n)} \leq M_0 \|f_{it}\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^n)} \cdot \|g_{it}\|_{L^{q'_0}(\mathbb{R}^n)} = M_0 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p_0}} \cdot \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{q'}{q'_0}}. \quad (2.93)$$

同理有

$$\|f_{1+it}\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p_1}}, \quad \|g_{1+it}\|_{L^{q'_1}(\mathbb{R}^n)} = \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{q'}{q'_1}}.$$

从而可得

$$|F(1+it)| \leq M_1 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p_1}} \cdot \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{q'}{q'_1}}. \quad (2.94)$$

最后要完成证明, 需要引入 Hadamard 三线引理:

引理 2.14 (Hadamard 三线引理)

设 F 是开带 $S = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ 上的解析函数, 且在 $\bar{S}$ 上有界连续, 亦即存在 $0 < B_0, B_1 < \infty$ 使得 $\operatorname{Re} z = 0$ 时 $|F(z)| \leq B_0$, $\operatorname{Re} z = 1$ 时 $|F(z)| \leq B_1$. 则对任意的 $0 \leq \theta \leq 1$, 在 $\operatorname{Re} z = \theta$ 时有 $|F(z)| \leq B_0^{1-\theta} B_1^\theta$.

要证明这个引理, 可定义解析函数:

$$G(z) = F(z)(B_0^{1-z} B_1^z)^{-1}, \quad G_n(z) = G(z)e^{\frac{z^2-1}{n}},$$

其中 z 在单位带 S 上, $n = 1, 2, \dots$. 既然 F 在 $\bar{S}$ 上有界, 且

$$|B_0^{1-z} B_1^z| \geq \min(1, B_0) \min(1, B_1) > 0$$

对任意 $z \in \bar{S}$ 均成立, 可知 G 在 $\bar{S}$ 上以某常数 M 为界. 因为

$$|G_n(x+iy)| \leq M e^{-\frac{y^2}{n}} e^{\frac{x^2-1}{n}} \leq M e^{-\frac{y^2}{n}},$$

可知 $G_n(x+iy)$ 在 $|y| \rightarrow \infty$ 时关于 $0 \leq x \leq 1$ 一致趋零. 取用 $y(n) > 0$ 满足对任意 $|y| \geq y(n)$, 都有 $|G_n(x+iy)| \leq 1 (\forall x \in [0, 1])$. 同时, 对 F 的假设表明 G 在构成 $\bar{S}$ 边界的两条直线上以 1 为界. 从而根据极值原理可知对任意 $z \in [0, 1] \times [-y(n), y(n)]$ 均有 $|G_n(z)| \leq 1$. 因为 $|G_n(z)| \leq 1$ 对闭带中的任意 z 均成立, 令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $|G(z)| \leq 1$ 在闭带上成立. 取 $z = \theta + it$ 可得

$$|F(\theta + it)| \leq |B_0^{1-\theta-it} B_1^{\theta+it}| = B_0^{1-\theta} B_1^\theta,$$

其中 t 是实数, 引理得证.

最后回到证明, 观察到 F 在开带 S 上解析, 在 $\bar{S}$ 上连续. 同时 F 在单位带上有界 (界依赖于 f, g). 因此根据 (2.93), (2.94) 式与三线引理知:

$$|F(z)| \leq (M_0 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p_0}} \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{q'}{q_0}})^{1-\theta} (M_1 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p_1}} \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{q'}{q_1}})^\theta = M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $\operatorname{Re} z = \theta$. 观察到 $P(\theta) = Q(\theta) = 1$, 因此

$$F(\theta) = \int_{\mathbb{R}^n} T f(y) g(y) dy.$$

现对全体 $L^{q'}$ 范数小于等于 1 的有限简单函数 g 取上确界即得欲证. □

$L^p(1 \leq p \leq 2)$ 函数的 Fourier 变换所在空间由下述定理给出:

推论 2.8 (Hausdorff-Young 不等式)

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p \leq 2)$, 则 $\widehat{f} \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|\widehat{f}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

证明 因为已经知道 $\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$ 与 $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$, 故由 Riesz-Thorin 插值定理 2.24, 取 $T = \mathcal{F}$, 只要 $0 < \theta < 1$, 且

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} &= \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{2} = 1 - \frac{\theta}{2}, \\ \frac{1}{q} &= \frac{1-\theta}{\infty} + \frac{\theta}{2} = \frac{\theta}{2}, \end{aligned}$$

亦即 $q = p'$, 则

$$\|\widehat{f}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1^{1-\theta} 1^\theta \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

□

至此我们讨论的都是延拓定理 2.4 中 $X = L^p(\mathbb{R}^n), Y = L^{p'}(\mathbb{R}^n) (1 \leq p \leq 2)$ 的情况. 一个自然的问题是 Fourier 变换的延拓是否对任意的 $X = L^p(\mathbb{R}^n), Y = L^q(\mathbb{R}^n) (1 \leq p, q \leq \infty)$ 均成立? 要想套用延拓定理 2.4, 就必

须讨论不等式

$$\|\widehat{f}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (2.95)$$

在什么情况下成立 (或可能成立). 从 scaling 的角度来看, 如果把 $f(x)$ 换成 $g(x) = f(\lambda x) (\lambda > 0)$, 上述不等式应该依旧成立. 此时

$$\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(\lambda x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

可以计算得到 $\widehat{g}(\xi) = \lambda^{-n} f(\lambda^{-1} \xi)$, 于是

$$\|\widehat{g}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\lambda^{-n} f(\lambda^{-1} \xi)|^q d\xi \right)^{\frac{1}{q}} = \lambda^{-n+\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

因为 g 也应该满足不等式(2.95), 故

$$\lambda^{-n+\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \lesssim \lambda^{-\frac{n}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \Rightarrow \|\widehat{f}\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \lesssim \lambda^{n(1-\frac{1}{q}-\frac{1}{p})} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

式子应与 λ 无关, 故只能有 $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$, 亦即 $q = p'$. 所以在谈论 Lebesgue 空间上的 Fourier 变换时, 它只可能是从 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的算子.

另一个问题在于可否令 $p > 2$? 要想通过延拓定理2.4来解决这个问题, 就是在问当 $p > 2$ 时是否有 Hausdorff-Young 型不等式:

$$\|\widehat{f}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

遗憾的是, Terence Tao 的讲义 **Interpolation, Schur's test, Young's inequality, Hausdorff-Young, Christ-Kiselev** 中指出 $p > 2$ 时上述不等式并不成立. 讲义中的论述如下: 设 N 是足够大的整数, $v \in \mathbb{R}^d$ 满足 $|v|$ 足够大, 考虑函数

$$f(x) := \sum_{k=1}^N e^{i2\pi x \cdot kv} g(x - kv),$$

其中 $g(x) := e^{-\pi|x|^2}$, 则根据引理2.12与 Fourier 变换的性质2.14(v) 知

$$\widehat{f}(\xi) := \sum_{k=1}^N e^{-i2\pi \xi \cdot kv} g(\xi - kv) = \overline{f(\xi)}. \quad (2.96)$$

下面证明对任意 $1 \leq p \leq \infty$ 有

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \sim_p N^{\frac{1}{p}},$$

其中 $X \sim_p Y$ 表示 $X \lesssim_p Y$ 且 $Y \lesssim_p X$. 这是因为一方面当 $p = 1$ 时知

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{k=1}^N e^{i2\pi x \cdot kv} g(x - kv) \right| dx \leq \sum_{k=1}^N \int_{\mathbb{R}^n} |g(x - kv)| dx \lesssim N,$$

而当 $p = \infty$ 时知

$$\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \mathbb{R}^n} \left\{ \left| \sum_{k=1}^N e^{i2\pi x \cdot kv} g(x - kv) \right| \right\} \lesssim 1,$$

于是根据 L^p 范数的对数凸性1.13, 对任意 $1 < p < \infty$ 有

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^{1-\frac{1}{p}} \lesssim_p N^{\frac{1}{p}}.$$

另一方面, 考虑 $|v|$ 足够大, 以至于存在足够小的 $\varepsilon > 0$ 使得 $g(0) = 1 > \frac{N}{\varepsilon} g(v)$, 则对 $x \in B(v, r)$ (以 v 为球心, $r > 0$ 为半径的球). 根据 g 的连续性可知对这一给定的 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$x \in B(0, \delta) \Rightarrow |g(x)| > |g(0)| - \varepsilon = 1 - \varepsilon,$$

设 $r = \delta$, 则

$$\begin{aligned} \int_{B(v,r)} |f(x)|^p dx &\geq \int_{B(v,r)} \left(|e^{i2\pi x \cdot v} g(x-v)| - \left| \sum_{k=2}^N e^{i2\pi x \cdot kv} g(x-kv) \right| \right)^p dx \\ &\geq \int_{B(v,r)} \left(|g(x-v)| - \sum_{k=2}^N |g(x-kv)| \right)^p dx \\ &\geq \int_{B(v,r)} (|g(x-v)| - \varepsilon)^p dx \\ &\geq \int_{B(v,r)} \varepsilon' |g(x-v)|^p dx, \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon' = \varepsilon'(\varepsilon) > 0$. 同理, 对 $x \in B(2v, r)$ 考虑 $|f(x)| \geq |g(x-2v)| - |\sum_{1 \leq k \leq N, k \neq 2} e^{i2\pi x \cdot kv} g(x-kv)|$ 亦得

$$\int_{B(2v,r)} |f(x)|^p dx \geq \int_{B(2v,r)} \varepsilon' |g(x-2v)|^p dx.$$

依此类推, 于是

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \geq \left(\sum_{k=1}^N \|f\|_{L^p(B(kv,r))}^p \right)^{\frac{1}{p}} \gtrsim_p N^{\frac{1}{p}}.$$

至此便有

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \sim_p N^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leq p \leq \infty. \quad (2.97)$$

于是根据(2.96),(2.97)式有

$$\|\widehat{f}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = \frac{\|f\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}}{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \sim_p N^{\frac{1}{p'} - \frac{1}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

当 $p > 2$ 时, $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} > 0$, 于是可令 $N \rightarrow \infty$ 推知此时并无 Hausdorff-Young 型不等式成立. 所以通过延拓定理2.4与 Hausdorff-Young 不等式达成的 Fourier 变换延拓的最优结果只能是 $1 \leq p \leq 2$.

Riesz-Thorin 插值定理的应用极其广泛. 不仅仅是上面提到的 Hausdorff-Young 不等式可以用该定理证明, 实际上前面提到的关于卷积的 Young 不等式也可以用它来证明:

推论 2.9 (Young 不等式)

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n), g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in L^r(\mathbb{R}^n)$, 其中 $\frac{1}{r} + 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, 且

$$\|f * g\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

证明 若固定 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则首先有

$$\begin{aligned} \|f * g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \right|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)g(y)|dy \right)^p dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^{\frac{1}{p'}} \cdot |f(x-y)| |g(y)|^{\frac{1}{p}} dy \right)^p dx \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|dy \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p |g(y)|dy \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p dx \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|dy \right)^{\frac{p}{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p |g(y)|dydx \\ &= \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{p'}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 Hölder 不等式, 于是 $\|f * g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$. 另外有

$$|f * g| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)g(y)|dy \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \Rightarrow \|f * g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}.$$

于是

$$\begin{aligned}\|f * g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \\ \|f * g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

根据 Riesz-Thorin 插值定理 2.24, 把 $f * g$ 看成作用在 g 上的算子, 只要 $0 < \theta < 1$ 满足

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} &= \frac{1-\theta}{p} + \frac{\theta}{\infty}, \\ \frac{1}{q} &= \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{p'},\end{aligned}$$

亦即

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \theta\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'}\right) - 1 + \theta = \frac{1}{p} - 1 \Rightarrow \frac{1}{r} + 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q},$$

就有

$$\|f * g\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{1-\theta} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^\theta \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

□

2.14 Fourier 积分的收敛性与求和法

前面在 Fourier 级数的部分中讨论过如何从 Fourier 系数还原得到原来函数, 这里同样可以讨论如何从 Fourier 变换还原得到原来的函数. 这个问题就是在问式子

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi = f(x), \quad B \text{ 是原点的一个开凸邻域, } B_R = \{Rx : x \in R\}$$

是否成立, 何时成立, 极限是在 L^p 意义下成立还是在几乎处处意义下成立. 如果我们定义部分和算子 S_R 为

$$(S_R f)^\wedge(\xi) = \chi_{B_R}(\xi) \widehat{f}(\xi),$$

则这个问题就等价于验证 L^p 意义与几乎处处意义下的极限式:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_R f = f.$$

对 L^p 意义下的收敛性, 类似于引理 2.8, 可以给出下述引理:

引理 2.15

$S_R f$ 依 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 范数收敛到 f , 当且仅当存在与 R 无关的常数 C_p 使得

$$\|S_R f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n). \quad (2.98)$$

之后的章节中会证明 $n = 1$ 时 (2.98) 式对任意 $p \geq 1$ 均成立, 但 $n > 1$ 时只要 $p \neq 2$, 就不存在 $S_R f$ 的依 L^p 范数收敛性.

类似于 Fourier 级数中的 Dirichlet 核, 我们也可以定义 Fourier 变换中的 Dirichlet 核: 当 $n = 1$, 若 $B = (-1, 1)$, 则

$$S_R f(x) = (D_R * f)(x),$$

其中 D_R 称为 Dirichlet 核:

$$D_R(x) = \int_{-R}^R e^{i2\pi x \xi} d\xi = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x}.$$

显见 $D_R(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上并不可积, 但有 $D_R \in L^q(\mathbb{R})$ ($q > 1$), 故若 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$), 那么根据 Hölder 不等式即知 $D_R * f$ 良定义.

对于几乎处处意义下的收敛性, 其证明主要依赖于下述确界估计:

$$\left\| \sup_{R>0} |S_R f| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (2.99)$$

根据 Carleson-Hunt 定理, (2.99) 式对 $1 < p < \infty$ 成立, 不过这个定理的证明极其冗杂, 这里就先不提了.

对于 Fourier 变换而言, Fourier 级数中的 Cesaro 求和法变为取部分和算子的积分平均:

$$\sigma_R f(x) := \frac{1}{R} \int_0^R S_t f(x) dt,$$

而 Cesaro 求和法的任务就是讨论在什么意义下成立极限 $\lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_R f(x) = f(x)$. 在 $n = 1, B = (-1, 1)$ 时, σ_R 可以化简为:

$$\sigma_R f(x) = (F_R * f)(x),$$

其中 F_R 称为 Fejér 核:

$$F_R(x) = \frac{1}{R} \int_0^R D_t(x) dt = \frac{\sin^2(\pi R x)}{R(\pi x)^2}. \quad (2.100)$$

不同于 Dirichlet 核, Fejér 核在 $\mathbb{R}$ 上是可积的. 类似于 Fourier 级数版本的 Fejér 核, 可以证明上述 Fejér 核同样有下述性质:

- (i) $F_R(x) \geq 0$;
- (ii) $\|F_R\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_{-\infty}^{\infty} F_R(x) dx = 1$;
- (iii) 若 $\delta > 0$, 则 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\delta < |x|} F_R(x) dx = 0$.

下一章中将会证明用于推导依 L^p 范数收敛与几乎处处收敛的一般准则, 即恒等逼近定理. 该定理所需要的条件恰是上面给出的三条性质.

Abel-Poisson 求和法说的是在 Fourier 反演的定义中加入因子 $e^{-2\pi t|\xi|}$, 得到函数

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \quad (2.101)$$

注意只要 $t > 0$, 上述积分均收敛, 进一步可以令 $t \rightarrow 0$. 如果把因子 $e^{-2\pi t|\xi|}$ 换成 $e^{-\pi t^2|\xi|^2}$, 我们就得到了 Gauss-Weierstrass 求和法, 此时研究的函数是

$$w(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi t^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi. \quad (2.102)$$

这两个求和法的目标在于讨论极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = f(x) \quad (2.103)$$

与

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} w(x, t) = f(x) \quad (2.104)$$

在 L^p 意义下是否成立, 在几乎处处意义下是否成立. 答案是肯定的, 不过具体论证还是等到下一章的恒等逼近定理之后再行.

可以说明 $u(x, t)$ 在半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 上是调和函数: 注意到

$$\begin{aligned} \Delta_x u(x, t) &= -4\pi^2 |\xi|^2 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \\ u_{tt}(x, t) &= 4\pi^2 |\xi|^2 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \end{aligned}$$

于是 $(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta_x)u = 0$. 在 $n = 1$ 时, (2.101) 式可被写成:

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it. \quad (2.105)$$

进一步, 极限(2.103)可以被视作下述 Dirichlet 问题的相容性条件:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{在 } \mathbb{R}_+^{n+1} \text{ 上,} \\ u(x, 0) = f(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

根据 Fourier 反演定理与卷积公式, 由(2.101)式可知

$$u(x, t) = (P_t * f)(x),$$

其中 $\widehat{P}_t(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$. 下面求解 $P_t(\xi)$, 这件事可以分为下面三步进行:

1. 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 均有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) du. \quad (2.106)$$

这是因为当 $x < 0$ 时换元 $u = x - \frac{1}{x}$ (即 $x = \frac{1}{2}(u - \sqrt{4+u^2})$), 而在 $x > 0$ 时换元 $u = x - \frac{1}{x}$ (即 $x = \frac{1}{2}(u + \sqrt{4+u^2})$) 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{f(u)}{2} \left(1 - \frac{u}{\sqrt{4+u^2}}\right) + \frac{f(u)}{2} \left(1 + \frac{u}{\sqrt{4+u^2}}\right) \right) du = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) du.$$

2. 在(2.106)式中代入 $f(x) = e^{-tx^2}$ ($t > 0$) 知

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t(x-\frac{1}{x})^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-tu^2} du. \quad (2.107)$$

对(2.107)左式知

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t(x-\frac{1}{x})^2} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t(x^2+\frac{1}{x^2}-2)} dx = e^{2t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t(x^2+\frac{1}{x^2})} dx \\ &= 2e^{2t} \int_0^{\infty} e^{-y-\frac{t^2}{y}} d\sqrt{\frac{y}{t}} = \frac{e^{2t}}{\sqrt{t}} \int_0^{\infty} e^{-y-\frac{t^2}{y}} \frac{dy}{\sqrt{y}}. \end{aligned}$$

对(2.107)右式知

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-tu^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{t}}.$$

比对即得

$$e^{-2t} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-y-\frac{t^2}{y}} \frac{dy}{\sqrt{y}}. \quad (2.108)$$

3. 在(2.108)式中代入 $t = \pi|x|$, 并在两边同时关于 $e^{i2\pi\xi \cdot x} dx$ 积分有³⁶:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi|x|} e^{i2\pi\xi \cdot x} dx &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{i2\pi\xi \cdot x} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-y-\frac{\pi^2 x^2}{y}} \frac{dy}{\sqrt{y}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} dy \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi^2 x^2}{y} + i2\pi\xi \cdot x - y} \frac{1}{\sqrt{y}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} y^{\frac{n-1}{2}} dy \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi^2 t^2 + i2\pi\xi \cdot \sqrt{y}t - y} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} y^{\frac{n-1}{2}} dy \int_{\mathbb{R}^n} e^{-(\pi t - i\xi\sqrt{y})^2} e^{-(\xi^2+1)y} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \prod_{k=1}^n \int_0^{\infty} y^{\frac{n-1}{2}} e^{-(\xi^2+1)y} dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\pi t_k - i\xi_k\sqrt{y})^2} dt_k \\ &= \frac{1}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{\infty} \left(\frac{t}{\xi^2+1} \right)^{\frac{n-1}{2}} e^{-t} d\frac{t}{\xi^2+1} \\ &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{1}{(1+|\xi|^2)^{\frac{n+1}{2}}}. \end{aligned}$$

于是

$$P_1(x) = (e^{-2\pi|\cdot|})^\vee(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{1}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}},$$

至此即得

$$P_t(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{t}{(t^2+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}}. \quad (2.109)$$

P_t 称为 Poisson 核.

³⁶[LG1] 对应部分 (pg. 118 2.2.11(b)) 疑似有勘误网未登出的错误: integrate with respect to $e^{-2\pi i\xi \cdot x}$ 得到的结果对应的 $(e^{-2\pi|x|})^\wedge$ 并不是希望求的东西, 要求的应该是 $(e^{-2\pi|x|})^\vee$.

对于 Gauss-Weierstrass 求和法, 可以说明函数 $\tilde{w}(x, t) = w(x, \sqrt{4\pi t})$ 是下述热方程的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} - \Delta \tilde{w} = 0, & \text{在 } \mathbb{R}_+^{n+1} \text{ 上,} \\ \tilde{w}(x, 0) = f(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

极限(2.104)可以视作上述 Dirichlet 问题的相容性条件, 同样有

$$w(x, t) = (W_t * f)(x),$$

其中 W_t 是 Gauss-Weierstrass 核:

$$W_t(x) = t^{-n} e^{-\frac{\pi|x|^2}{t^2}}. \quad (2.110)$$

2.15 补充: L^p 上的卷积算子与乘子

下面默认 $(\tau^y f)(x) = f(x - y)$.

2.15.1 平移可换算子

定义 2.21 (对平移封闭, 平移可换算子)

$\mathbb{R}^n$ 上的可测函数构成的某向量空间 X 称为对平移封闭的空间, 如果对任意 $f \in X$ 与任意 $z \in \mathbb{R}^n$ 均有 $\tau^z(f) \in X$. 再设 X, Y 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数构成的某对平移封闭的向量空间, 设 T 是 X 到 Y 的算子, 称 T 是平移可换算子, 如果对任意 $f \in X$ 与 $y \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$T(\tau^y(f)) = \tau^y(T(f)).$$

显见卷积算子是平移可换的, 亦即只要卷积有定义, 那么 $\tau^y(f * g) = (\tau^y f) * g$. 这是因为

$$(\tau^y(f * g))(x) = \tau^y \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(\cdot - t) g(t) dt \right) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y - t) g(t) dt = ((\tau^y f) * g)(x).$$

本节将会证明该命题的逆命题: 全体平移可换的有界线性算子都具有卷积形式, 亦即

定理 2.25 (平移可换有界线性算子的刻画)

设 $1 \leq p, q \leq \infty$, $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 是平移可换有界线性算子, 则存在唯一的缓增分布 w 使得对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$T(f) = f * w, \text{ a.e..} \quad (2.111)$$

特别注意若 $p = \infty$, 则 T 在 $\mathcal{S}$ 上的限制并不唯一确定 T 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上表现, 这是因为对 $1 \leq p < \infty$ 而言 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中均稠密, 而这种稠密性在 $p = \infty$ 时是不成立的. 上述定理是下面两条引理的推论:

引理 2.16

在定理 2.25 的条件下, 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $T(f)$ 的弱导数是 L^q 函数, 且其满足对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有:

$$\partial^\alpha(T(f)) = T(\partial^\alpha f). \quad (2.112)$$

引理 2.17

设 $1 \leq q \leq \infty$, $h \in L^q(\mathbb{R}^n)$. 若 h 的全体弱导数 $\partial^\alpha h$ 均为 L^q 函数, 则 h 几乎处处等于一个连续函数 H , 且存在仅关于 n, q 的常数 $C_{n,q}$ 使得

$$|H(0)| \leq C_{n,q} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha h\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.113)$$

在承认引理 2.16, 2.17 的情况下, 下面着手证明平移可换有界线性算子的刻画定理 2.25.

证明 取定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 是平移可换有界线性算子. 根据引理2.16知 $T(f)$ 满足引理2.17的条件, 于是存在连续函数 H 使得 $T(f) = H$ a.e., 且

$$|H(0)| \leq C_{n,q} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

现定义 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 u 为:

$$\langle u, f \rangle := H(0).$$

知 u 是良定义的, 这是因为若还存在另一连续函数 G 使得 $G = T(f)$ a.e., 则 $G = H$ a.e., 又因为 G, H 都是连续函数, 故 $H = G$ 点态成立, 因而 $H(0) = G(0)$.

现在根据(2.112),(2.113)式与 T 的有界性知

$$\begin{aligned} |\langle u, f \rangle| &\leq C_{n,q} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C_{n,q} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|T(\partial^\alpha f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C_{n,q} \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C'_{n,q} \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \sum_{\substack{|\gamma| \leq [\frac{n+1}{\rho}] + 1 \\ |\alpha| \leq n+1}} \rho_{\gamma,\alpha}(f), \end{aligned}$$

其中 (A) 是补充命题2.1, 故 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 现设 $w = \tilde{u} = u(-x)$, 先承认对全体 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$\langle u, \tau^{-x} f \rangle = H(x), \quad (2.114)$$

根据(2.114)式即知对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 都有 $T(f) = f * w$, 这是因为根据函数与缓增分布卷积的刻画定理2.19与 T 的平移可换性, 对取定的 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$(f * w)(x) = (f * \tilde{u})(x) = \langle \tilde{u}, \tau^x f \rangle = \langle u, \tau^{-x} f \rangle = H(x) \stackrel{(B)}{=} T(f)(x),$$

其中 (B) 对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$ 成立, 因而 $f * w = T(f)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上 a.e. 成立. w 的唯一性是因为若 $f * w = f * w'$ 对全体 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $w = w'$, 至此(2.111)式得证.

下面证明(2.114)式. 取定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $x \in \mathbb{R}^n$, 基于引理2.17取 H_x 是满足 $H_x = T(\tau^{-x} f)$ 几乎处处成立的连续函数, 下证 $H_x(0) = H(x)$. 知

$$H_x(y) = T(\tau^{-x} f)(y) = \tau^{-x} T(f)(y) = T(f)(x+y) \stackrel{(C)}{=} H(x+y) = \tau^{-x} H(y),$$

其中 (C) 对 a.e. $y \in \mathbb{R}^n$ 成立, 因此连续函数 H_x 与 $\tau^{-x} H$ 几乎处处相等, 根据连续性即知在点态意义下有 $H_x(y) = H(x+y)$. 特别令 $y = 0$ 知 $H_x(0) = H(x)$, 此即(2.114)式. $\square$

下面再来证明引理2.16,2.17. 首先证明引理2.16:

证明 已知 $1 \leq p, q \leq \infty$, $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 是平移可换有界线性算子, 往证对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 在分布意义下对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均有 $\partial^\alpha(T(f)) = T(\partial^\alpha f)$. 对多重指标 α 考虑归纳法, 设 $\alpha = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, 其中 1 在第 j 位. 记 $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 是第 j 个单位向量, 通过换元与 T 的平移可换性知

$$\int_{\mathbb{R}^n} T(f)(y) \frac{\varphi(y + he_j) - \varphi(y)}{h} dy = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) T\left(\frac{\tau^{-he_j}(f) - f}{h}\right)(y) dy. \quad (2.115)$$

下面研究(2.115)式两边在 $h \rightarrow 0$ 时的情况. 首先知

$$\frac{\varphi(y + he_j) - \varphi(y)}{h} = \int_0^1 \partial_j \varphi(y + hte_j) dt,$$

又因为 $\partial_j \varphi(y + hte_j)$ 关于 t 是 Schwartz 函数, 根据 Schwartz 函数的等价刻画2.22知在 $|h| < \frac{1}{2}$ 时有

$$\left| \frac{\varphi(y + he_j) - \varphi(y)}{h} \right| \lesssim \int_0^1 \frac{dt}{(1 + |y + hte_j|)^M} \leq \int_0^1 \frac{dt}{(1 + |y| - \frac{1}{2})^M} \lesssim \frac{1}{(1 + |y|)^M}.$$

于是(2.115)左式的被积函数被可积函数 $|T(f)(y)|(1 + |y|)^{-M}$ 控制, 且其在 $h \rightarrow 0$ 时 a.e. 收敛到 $T(f)(y) \partial_j \varphi(y)$,

故由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} T(f)(y) \frac{\varphi(y + he_j) - \varphi(y)}{h} dy = \int_{\mathbb{R}^n} T(f)(y) \partial_j \varphi(y) dy = - \int_{\mathbb{R}^n} \partial_j (T(f))(y) \varphi(y) dy. \quad (2.116)$$

下面再讨论(2.115)右式, 为了说明 $T(\frac{\tau^{-he_j}(f) - f}{h}) \rightarrow -T(\partial_j f)$ 在 L^q 意义下成立, 就需要说明 $\frac{\tau^{-he_j}(f) - f}{h} \rightarrow -\partial_j f$ 在 L^p 意义下成立. 对 Schwartz 函数 f 有³⁷

$$\frac{\tau^{-he_j}(f)(y) - f(y)}{h} = - \int_{-1}^0 \partial_j f(y + hte_j) dt = - \int_0^1 \partial_j f(y - hte_j) dt,$$

根据连续性知 $-\int_0^1 \partial_j f(y - hte_j) dt$ 在 $h \rightarrow 0$ 时点态收敛到 $-\partial_j f(y)$, 同时类似于前面对 φ 的操作可知 $|h| < \frac{1}{2}$ 时其被 $(1 + |y|)^{-M}$ 控制, 于是由 Lebesgue 控制收敛定理即知

$$\frac{\tau^{-he_j}(f) - f}{h} \rightarrow -\partial_j f(L^p(\mathbb{R}^n)), \quad (2.117)$$

再根据 T 的连续性可得

$$T\left(\frac{\tau^{-he_j}(f) - f}{h}\right) \rightarrow -T(\partial_j f)(L^q(\mathbb{R}^n)). \quad (2.118)$$

又因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^{q'}(\mathbb{R}^n)$, 故根据 Hölder 不等式知(2.115)右式在 $h \rightarrow 0$ 时收敛到 $-\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) T(\partial_j f)(y) dy$. 因而

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \partial_j T(f)(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) T(\partial_j f)(y) dy, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

对 $|\alpha|$ 归纳即得欲证. □

再证明引理2.17.

证明 已知 $1 \leq q \leq \infty, h \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 且 $\partial^\alpha h \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 均成立, 往证存在连续函数 H 使得 $h = H$ 几乎处处成立, 且 H 满足(2.113)式. 设 $R \geq 1$, 取定 $\varphi_R \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $|x| \leq R$ 内恒为 1, 而在 $|x| \geq 2R$ 内恒为 0. 因为 $h \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 由 Hölder 不等式知 $\varphi_R h \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 下面说明 $\widehat{\varphi_R h} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 首先考虑不等式

$$1 \leq C_n (1 + |x|)^{-(n+1)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} |(-i2\pi x)^\alpha|, \quad (2.119)$$

这是因为对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 与任意 $k \in \mathbb{N}$, 根据(2.48)式已经有

$$|x|^k \leq C_{n,k} \sum_{|\beta|=k} |x^\beta|.$$

若 $|x| \geq 1$, 则将 $(1 + |x|)^{n+1}$ 按二项式定理展开并代入上式即得(2.119)式. 而若 $|x| < 1$, 知和式 $\sum_{|\alpha| \leq n+1} |(-i2\pi x)^\alpha|$ 至少是 1, 取 $C_n = 2^{n+1}$ 即得(2.119)式. 现在在(2.119)式两端同乘 $|\widehat{\varphi_R h}(x)|$ 可得

$$\begin{aligned} |\widehat{\varphi_R h}(x)| &\leq C_n (1 + |x|)^{-(n+1)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} |(-i2\pi x)^\alpha \widehat{\varphi_R h}(x)| \\ &\leq C_n (1 + |x|)^{-(n+1)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|(\partial^\alpha(\varphi_R h))^\wedge\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C_n (1 + |x|)^{-(n+1)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha(\varphi_R h)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C_n (2^n R^n \nu_n)^{\frac{1}{q'}} (1 + |x|)^{-(n+1)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha(\varphi_R h)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} C_{n,R} (1 + |x|)^{-(n+1)} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha h\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是对 $\partial^\alpha(\varphi_R h)\chi_{2R}$ 应用 Hölder 不等式, (B) 是基于 φ_R 各阶导数的有界性与 Leibniz 公式. 对上述不等式两端关于 x 积分得

$$\|\widehat{\varphi_R h}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,R} \sum_{|\alpha| \leq n+1} \|\partial^\alpha h\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty. \quad (2.120)$$

³⁷[LG1] 此处 (pg.148(2.5.6)) 存在勘误网上未出现的错误, 符号有误, 此处已改正.

因此 $\varphi_R h$ 满足 Fourier 反演的条件, 利用 Fourier 反演知存在连续函数 $(\widehat{\varphi_R h})^\vee$ 几乎处处等于 $\varphi_R h$. 因为在球 $B(0, R)$ 上 $\varphi_R \equiv 1$, 故 h 在球 $B(0, R)$ 上几乎处处等于该连续函数. 又因为 $R > 0$ 是任意的, 故 h 在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处等于某连续函数, 记作 H . 最后, 在(2.120)式中令 $R = 1$, 由 $|H(0)| \leq \|\widehat{\varphi_1 h}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$ 即得(2.113)式. $\square$

2.15.2 线性算子的转置和伴随

本小节简要讨论线性算子的转置与伴随这两个概念. 首先回忆实与复的内积: 设 f, g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 记

$$\langle f|g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx$$

(在积分绝对收敛时) 为它们的复内积, 另记

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) g(x) dx$$

为它们在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的实内积. 前文已经多次表明, 记号 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 也用来表示缓增分布 f 在测试函数 g 上的作用. 在缓增分布 f 能用某函数表示时, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的这两种意义是一样的.

设 $1 \leq p, q \leq \infty$, 对有界线性算子 $T: L^p(X, \mu) \rightarrow L^q(Y, \nu)$, 记其伴随算子 T^* 为:

$$\langle T(f)|g \rangle = \int_Y T(f)(y) \overline{g(y)} d\nu = \int_X f(x) \overline{T^*(g)(x)} d\mu = \langle f|T^*(g) \rangle, \quad \forall f \in L^p(X, \mu), g \in L^{q'}(Y, \nu). \quad (2.121)$$

另定义 T 的转置 T^t 为:

$$\langle T(f), g \rangle = \int_Y T(f)(y) g(y) d\nu = \int_X f(x) T^t(g)(x) d\mu = \langle f, T^t(g) \rangle, \quad \forall f \in L^p(X, \mu), g \in L^{q'}(Y, \nu). \quad (2.122)$$

若 T 是形如下式的积分算子

$$T(f)(x) = \int_X K(x, y) f(y) d\mu(y),$$

则 T^*, T^t 分别是具有积分核 $K^*(x, y) = \overline{K(y, x)}$ 与 $K^t(x, y) = K(y, x)$ 的积分算子. 这是因为

$$\begin{aligned} \langle Tf|g \rangle &= \int_Y T(f)(x) \overline{g(x)} d\nu(x) \\ &= \int_Y \left(\int_X K(x, y) f(y) d\mu(y) \right) \overline{g(x)} d\nu(x) \\ &= \int_X \left(\int_Y K(x, y) \overline{g(x)} d\nu(x) \right) f(y) d\mu(y) \\ &= \int_X \overline{\left(\int_Y \overline{K(x, y)} g(x) d\nu(x) \right)} f(y) d\mu(y) = \langle f|T^*g \rangle. \end{aligned}$$

因此 $T^*(g)(y) = \int_Y \overline{K(x, y)} g(x) d\nu(x)$, 从而 $T^*(g)(x) = \int_Y \overline{K(y, x)} g(y) d\nu(y)$, 亦即 $K^*(x, y) = \overline{K(y, x)}$. 而

$$\begin{aligned} \langle Tf, g \rangle &= \int_Y T(f)(x) g(x) d\nu(x) \\ &= \int_Y \left(\int_X K(x, y) f(y) d\mu(y) \right) g(x) d\nu(x) \\ &= \int_X \left(\int_Y K(x, y) g(x) d\nu(x) \right) f(y) d\mu(y) = \langle f, T^t g \rangle. \end{aligned}$$

因此 $T^t(g)(y) = \int_Y K(x, y) g(x) d\nu(x)$, 从而 $T^t(g)(x) = \int_Y K(y, x) g(y) d\nu(y)$, 亦即 $K^t(x, y) = K(y, x)$.

另外, 若 T 形如 $T(f)(x) = (\widehat{f}m)^\vee(x)$, 则 $T^*(f)(x) = (\widehat{f}\overline{m})^\vee(x)$, 这是因为对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{T^*(g)(x)} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} T(f)(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{T(f)}(\xi) \widehat{\overline{g}}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) m(\xi) \widehat{\overline{g}}(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{m}(\xi)} \widehat{\overline{g}}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{(\widehat{m}g)^\vee(x)} dx. \end{aligned}$$

同理可证 $T^t(f)(x) = (\widehat{f} \cdot m(-\cdot))^\vee(x)$. 因为复值函数 $\overline{m(\xi)}$ 与 $m(-\xi)$ 一般不同, 故 T^* 与 T^t 一般也是不同的. 另外, 若 $m(\xi)$ 是实值函数, 亦即 $m(\xi) = \overline{m(\xi)}$, 则此时 $T = T^*$, 称 T 为自伴随算子. 若 m 是偶函数, 亦即 $m(\xi) = m(-\xi)$,

则此时 $T = T^t$, 称 T 为自转置算子.

2.15.3 平移可换有界线性算子空间 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$

定义 2.22 (平移可换有界线性算子空间)

给定 $1 \leq p, q \leq \infty$, 记 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 的全体平移可换有界线性算子构成的空间为 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$.

根据平移可换有界线性算子的刻画定理 2.25, 任意 $T \in \mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 均能表为与某缓增分布的卷积. $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 上的范数取为

$$\|T\|_{\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)} = \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)},$$

亦即 T 在 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 中的范数等于其作为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 的算子的范数. 根据 $\mathcal{L}(L^p(\mathbb{R}^n), L^q(\mathbb{R}^n))$ ³⁸ 的完备性易证 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 在该范数下是 Banach 空间.

下面说明当 $p > q$ 时 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 只包含一个元素, 亦即零算子 $T = 0$, 因而只有 $p \leq q$ 的情况具有研究价值.

定理 2.26

若 $1 \leq q < p < \infty$, 则 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n) = \{0\}$.

证明 设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是非零函数, $h \in \mathbb{R}^n$, 任取 $T \in \mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|\tau^h(T(f)) + T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|T(\tau^h(f) + f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \|\tau^h(f) + f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (2.123)$$

下证 $|h| \rightarrow \infty$ 时 $\|\tau^h(f) + f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 2^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}$. 设 $\text{supp } f \subset K$ 是紧集, 取 $|h|$ 足够大使得 $K \cap K + h = \emptyset$, 则此时

$$\begin{aligned} \|\tau^h(f) + f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-h) + f(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\int_K |f(x)|^q dx + \int_{K+h} |f(x-h)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = 2^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

这便有 $\|\tau^h(f) + f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 2^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} (|h| \rightarrow \infty)$. 现在在 (2.123) 式两端令 $|h| \rightarrow \infty$, 利用上述结果可得

$$2^{\frac{1}{q}} \|T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} 2^{\frac{1}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

在 $q < p$ 时, 除非 $T = 0$, 否则上式不成立. □

下面考察 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间.

定理 2.27 ($\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间刻画)

若 $1 < p \leq q < \infty$, $T \in \mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$, 则 T 在 $L^{q'}(\mathbb{R}^n)$ 上有定义, 且该定义与其原先在 $L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^{q'}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的定义等价. 进一步, T 是 $L^{q'}(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 且其算子范数为

$$\|T\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)}, \quad (2.124)$$

亦即下述等距同构成立:

$$\mathcal{M}^{q',p'}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n).$$

证明 首先因为 $T \in \mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$, 故由平移可换有界线性算子的刻画 2.25 知存在 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 使得 $T : L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow$

³⁸即 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 的全体有界线性算子构成的空间.

$L^q(\mathbb{R}^n)$, $f \mapsto u * f$, 进而其伴随算子为 $T^*: L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, $f \mapsto \tilde{u} * f$, 这是因为对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有³⁹

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{T^*(g)(x)} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} T(f)(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} (f * u)(x) \overline{g(x)} dx \\ &= \langle f * u, \bar{g} \rangle = \langle u, \tilde{f} * \bar{g} \rangle = \langle u, (f * \tilde{g})^\sim \rangle \\ &= \langle \tilde{u}, f * \tilde{g} \rangle = \langle \tilde{u}, \overline{\tilde{f} * \tilde{g}} \rangle = \overline{\langle \tilde{u}, \tilde{f} * \tilde{g} \rangle} \\ &= \overline{\langle \tilde{u} * g, \tilde{f} \rangle} = \langle \tilde{u} * g, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{(\tilde{u} * g)(x)} dx. \end{aligned}$$

因此 $T^*: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $g \mapsto \tilde{u} * g$. 下面说明

$$\overline{f * \tilde{u}} = (\tilde{f} * u)^\sim, \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n). \quad (2.125)$$

这是因为对任意 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} \overline{\langle f * \tilde{u}, g \rangle} &= \overline{\langle f * \tilde{u}, \bar{g} \rangle} = \overline{\langle \tilde{u}, \tilde{f} * \bar{g} \rangle} \\ &= \langle \tilde{u}, \tilde{f} * g \rangle = \langle u, (\tilde{f} * g)^\sim \rangle \\ &= \langle u, \tilde{f} * \tilde{g} \rangle = \langle u * \tilde{f}, \tilde{g} \rangle \\ &= \langle (u * \tilde{f})^\sim, g \rangle. \end{aligned}$$

现在只需说明 $T: f \mapsto u * f$ 和 $T^*: f \mapsto \tilde{u} * f$ 在作为 $L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的算子时范数是相等的. 由(2.125)式知对任意非零 Schwartz 函数 f 均有:

$$\frac{\|f * \tilde{u}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}}{\|f\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}} = \frac{\|\tilde{f} * u\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}}{\|\tilde{f}\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}}.$$

于是

$$\|T^*\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = \|T\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)}.$$

下面说明

$$\|T^*\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)} = \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

这是因为一方面

$$\begin{aligned} \|T^* f\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} &= \sup_{\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} T^*(f)(x) \overline{g(x)} dx \right| \\ &= \sup_{\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{T(g)(x)} dx \right| \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=1} \|f\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)} \|T(g)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=1} \|f\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)} \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

因此 $\|T^*\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{q'}(\mathbb{R}^n)} \leq \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)}$, 另一方面

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} &= \sup_{\|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} T(f)(x) \overline{g(x)} dx \right| \\ &= \sup_{\|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{T^*(g)(x)} dx \right| \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}=1} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|T^*(g)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \end{aligned}$$

³⁹下面的过程中多次运用了 $(\tilde{f} * \bar{g})^\sim = f * \tilde{g}$, $\langle \bar{u}, f \rangle = \langle u, \tilde{f} \rangle$. 这两件事是根据定义即可说明的.

$$\begin{aligned} &\leq \sup_{\|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)}=1} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|T^*\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \|T^*\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

因此 $\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \leq \|T^*\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{q'}(\mathbb{R}^n)}$, 故 $\|T^*\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{q'}(\mathbb{R}^n)} = \|T^*\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{q'}(\mathbb{R}^n)}$, 至此即得

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} = \|T\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)}.$$

命题即证. $\square$

注 初见上述定理时可能会感到疑惑: 既然函数与缓增分布的卷积是缓增分布, 上述证明过程就相当于将条件中的 $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 增强为 $T: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 得到 $T^*: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 后根据 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^{q'}(\mathbb{R}^n)$ 中稠与 $L^{p'}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 得到 $T^*: L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, 最后用 $\|T^*\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$ 来控制 $\|T\|_{L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$. 这一过程并没有给出 $T(f)$ 在 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 上的刻画, 从而我们是否应该在研究 $T(f)$ 在 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 中的表现时用缓增分布的那套方法 (也就是研究它在任意 Schwartz 函数上的作用, 而非研究它本身)? 换句话说, 我们是否应该将 $T: L^{q'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 视为函数到分布 (而非函数到函数) 的算子? 事实并非如此. 上述定理中该定义与原先在 $L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^{q'}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的定义等价一句暗示了在 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素 $T(f)$ 是函数 (而不仅仅是分布). 更细致地来说, Schwartz 函数与缓增分布卷积的刻画 2.19 表明 T 实际上是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的, 因此在提到 $T^*: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 时, 我们需要铭记此时 T^* 的输出就是函数, 而不会成为非函数的分布, 这也就说明了证明最初 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{T^*(g)(x)} dx$ 这一写法的合法性.

之后我们重点关注 $p = q$ 时的 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 空间, 这类空间包含了后面章节将要介绍的奇异积分算子.

2.15.4 $\mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n), \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画

平移可换有界线性算子的刻画定理 2.25 指出 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素均有卷积形式, 我们自然希望知道对 $\mathcal{M}^{p,p}(\mathbb{R}^n)$ 而言其卷积形式能否更具体一些 (例如它代表与什么函数作卷积). 可惜的是, 目前为止这方面的进展尚未明了 (还不知道可不可以作一般的讨论), 我们只知道几种特殊情况. $\mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n), \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 就是两种特殊情况.

定理 2.28 ($\mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画)

算子 $T \in \mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当它能表为 $f \mapsto f * \mu$, 其中 μ 是有限 Borel (复值) 测度. 此时 T 的算子函数恰是 μ 的全变差.

证明 当存在有限 Borel 测度 μ 使得 $T: f \mapsto f * \mu$, 则

$$\begin{aligned} \|T(f)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} &= \|f * \mu\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) d\mu(y) \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| dx d|\mu(y)| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|\mu\|_{\mathcal{M}}, \end{aligned}$$

其中 $\|\mu\|_{\mathcal{M}}$ 是 μ 的全变差. 因此 T 以至多为 $\|\mu\|_{\mathcal{M}}$ 的范数将 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^1(\mathbb{R}^n)$.

下面验证 T 的平移可换性. 已知

$$T(f)(x) = (f * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) d\mu(t),$$

故

$$\tau^y T(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y-t) d\mu(t) = T(\tau^y f)(x).$$

当 $T \in \mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, 由平移可换有界线性算子的刻画 2.25 知存在唯一的缓增分布 u 使得对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$T(f)(x) = (f * u)(x), \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^n,$$

现取 $f_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} e^{-\pi|x/\varepsilon|^2}$, 知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_\varepsilon(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varepsilon^{-n} e^{-\pi|x/\varepsilon|^2} dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi u^2} du = 1.$$

故 $\{f_\varepsilon\}_\varepsilon$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中一致有界, 因此

$$\|f_\varepsilon * u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \|T(f_\varepsilon)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^n)} \|f_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

这说明 $\{f_\varepsilon * u\}_\varepsilon$ 同样在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中有界. 因为 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 自然嵌入到有限 Borel 测度空间 $(C_0(\mathbb{R}^n))^*$ 中⁴⁰, 故 $\{f_\varepsilon * u\}_\varepsilon$ 作为 $(C_0(\mathbb{R}^n))^*$ 中的有界集, 可被 $(C_0(\mathbb{R}^n))^*$ 中单位球的某常数倍包含, 因此根据 Banach-Alaoglu 定理知 $\{f_\varepsilon * u\}_\varepsilon$ 是弱 * 紧集, 从而存在 $\{f_{\varepsilon_k} * u\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的某子列在弱 * 拓扑意义下收敛到某测度 μ , 即存在 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ 使得对任意 $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) (f_{\varepsilon_k} * u)(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) d\mu(x). \quad (2.126)$$

下面说明 $u = \mu$, 为此取定 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 (2.126) 式知

$$\langle u, \widetilde{f_{\varepsilon_k} * g} \rangle = \langle u, f_{\varepsilon_k} * g \rangle \rightarrow \langle \mu, g \rangle, \quad k \rightarrow \infty.$$

另外可证 $g * f_{\varepsilon_k}$ 在 Schwartz 意义下收敛到 g , 因此

$$\langle u, f_{\varepsilon_k} * g \rangle \rightarrow \langle u, g \rangle.$$

于是由 (2.126) 式知 $\langle u, g \rangle = \langle \mu, g \rangle$, 又因为 g 是任意的, 故 $u = \mu$.

最后说明 $\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^n)} = \|\mu\|_{\mathcal{M}}$. 由 (2.126) 式知对任意 $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(x) d\mu(x) \right| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) (f_{\varepsilon_k} * u)(x) dx \right| \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \sup_{k \in \mathbb{N}} \|f_{\varepsilon_k} * u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.127)$$

但 Riesz 表示定理表明 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的泛函 $g \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} g(x) d\mu(x)$ 的范数恰为 $\|\mu\|_{\mathcal{M}}$, 于是由 (2.127) 式知 $\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^n)} \geq \|\mu\|_{\mathcal{M}}$. 又显见 $\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|\mu\|_{\mathcal{M}}$, 故 $\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^n)} = \|\mu\|_{\mathcal{M}}$. $\square$

设 μ 是有限 Borel 测度, 显见对任意 $1 \leq p \leq \infty$, 算子 $h \mapsto h * \mu$ 都是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ 的, 因此 $\mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ 可以看成是 $\mathcal{M}^{\infty,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的某个子空间. 但另一方面, 存在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性算子 Φ 满足平移可换性, 但不存在有限 Borel 测度 μ 使得 $\Phi(h) = h * \mu$ 对任意 $h \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立. 参见下述反例:

例 2.10 设

$$(X, \|\cdot\|_{L^\infty(\mathbb{R})}) := \left\{ \mathbb{R} \text{ 上的复值函数 } f : \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} < \infty, \Phi(f) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \int_0^R f(t) dt \text{ 存在} \right\}.$$

显见 Φ 是 X 上的线性泛函, 又因为

$$|\Phi(f)| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \int_0^R |f(t)| dt \leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})},$$

故 Φ 是 X 上的有界线性泛函, 且可以进一步说明 $\|\Phi\|_{X^*} = 1$, 从而由 Hahn-Banach 定理可知 Φ 在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 上有范数为 1 的有界延拓 $\tilde{\Phi}$. 现在将 $\tilde{\Phi}$ 视作 $L^\infty(\mathbb{R})$ 到常值函数空间的有界线性算子. 又因为对任意 $f \in L^\infty(\mathbb{R})$ 与任意 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$\tilde{\Phi}(\tau^x(f)) - \tau^x(\tilde{\Phi}(f)) = \tilde{\Phi}(\tau^x(f)) - \tilde{\Phi}(f) = \tilde{\Phi}(\tau^x(f) - f) = \Phi(\tau^x(f) - f) \stackrel{(A)}{=} 0,$$

其中 (A) 是因为对任意 $R > 0$ 有

$$\left| \frac{1}{R} \int_0^R (f(t-x) - f(t)) dt \right| = \left| \frac{1}{R} \int_{-x}^{R-x} f(u) du - \frac{1}{R} \int_0^R f(t) dt \right| \leq \frac{2\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}}{R},$$

令 $R \rightarrow \infty$ 即得 (A). 故 $\tilde{\Phi}$ 是平移可换有界线性算子, 于是根据平移可换有界线性算子的刻画 2.25 知存在唯一的缓增分布 u 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 均有 $\tilde{\Phi}(\varphi) = \varphi * u$. 因为

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R f(t) dt = 0, \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

故 $\Phi(f) \equiv 0, f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 再根据 u 的唯一性可知 $u = 0$. 因此, 若存在有限 Borel 测度 μ 使得对任意 $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ 均有 $\tilde{\Phi}(h) = h * \mu$, 则在 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 时总有 $0 = \Phi(\varphi) = \varphi * \mu$, 因此 μ 只能是零测度. 然而 Φ 并非 X 上的零算子, 矛盾! 故并不存在这样的有限 Borel 测度 μ . $\square$

⁴⁰ 其中 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是衰减连续函数空间, 有限 Borel 测度空间为 $(C_0(\mathbb{R}^n))^*$ 这一断言是泛函分析的结论.

下面研究 $p = 2$ 的情况.

定理 2.29 ($\mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画)

算子 $T \in \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当存在 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 使得 $T: f \mapsto f * u$, 且 u 满足 $\hat{u} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 另有

$$\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\hat{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.128)$$



证明 若 $T(f) = f * u$, 其中 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\hat{u} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则根据 Plancherel 定理有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |(f * u)(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi) \hat{u}(\xi)|^2 d\xi \leq \|\hat{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^2 \|\hat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2,$$

因此 $\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\hat{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, 故 $T \in \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$.

若 $T \in \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$, 根据平移可换有界线性算子的刻画定理 2.25 知其能被表成与某缓增分布 u 的卷积, 下面证明 $\hat{u}$ 有界. 设 $R > 0$, $\varphi_R \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是在球 $B(0, R)$ 内恒为 1 且支在球 $B(0, 2R)$ 内的函数. 知 φ_R 与分布 $\hat{u}$ 的乘积为 $\varphi_R \hat{u} = ((\varphi_R)^\vee * u)^\wedge = T((\varphi_R)^\vee)^\wedge$, 其为 L^2 函数. 又因为 L^2 函数 $\varphi_R \hat{u}$ 与分布 $\hat{u}$ 在 $B(0, R)$ 上重合, 故对任意 $R > 0$ 总有 $\hat{u} \in L^2(B(0, R))$, 因而 $\hat{u} \in L_{loc}^2(\mathbb{R}^n)$. 另设 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 紧支, 则 $f\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 因而根据 Plancherel 定理与 T 的有界性知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x) \hat{u}(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |T(f^\vee)(x)|^2 dx \leq \|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx.$$

因此对全体有界紧支函数 f 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)}^2 - |\hat{u}(x)|^2) |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

取 $f(x_1, \dots, x_n) = (2r)^{-\frac{n}{2}} \prod_{j=1}^n \chi_{[-r, r]}(x_j)$ ($r > 0$), 根据 Lebesgue 微分定理 3.5 知对几乎处处 x 均有 $\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)}^2 - |\hat{u}(x)|^2 \geq 0$, 因此 $\|\hat{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)}$, 即 $\hat{u} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又因为在 $\hat{u} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 时已经有 $\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\hat{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, 故 $\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\hat{u}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, 命题得证. $\square$

2.15.5 Fourier 乘子空间 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$

定理 2.29 已经刻画了 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的全体卷积算子, 现设 $T \in \mathcal{M}^{p,p}(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < 2$), 根据 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间刻画定理 2.27, T 也是 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的算子. 因为 $p < 2 < p'$, 根据 Riesz-Thorin 插值定理 2.24, T 依旧将 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 映到 $L^2(\mathbb{R}^n)$, 于是 T 还是可以表为与某缓增分布 u 的卷积, 其中 $\hat{u}$ 有界.

定义 2.23 (L^p 的 Fourier 乘子空间)

给定 $1 \leq p < \infty$, 若 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界函数, 且其使得算子

$$T_m(f) = (\hat{f}m)^\vee, \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界 (或在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的某稠密子空间内有定义, 且在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有有界延拓), 则称 m 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的一个 Fourier 乘子 (或简称为 L^p 乘子). 全体 L^p 乘子构成的空间记作 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 中的范数定义为

$$\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (2.129)$$



上述定义表明 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $T_m \in \mathcal{M}^{p,p}(\mathbb{R}^n)$, 这是因为显见 $T_m \in \mathcal{M}^{p,p}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, 而当 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, 则 T_m 是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子, 于是只需说明 T_m 是平移可换算子即可. 知

$$\tau^x T_m(f) = \tau^x ((\hat{f}m)^\vee) = (\hat{f}m e^{-i2\pi x(\cdot)})^\vee = ((\tau^x f)^\wedge m)^\vee = T_m(\tau^x f).$$

特别地, 当 $p = 2$ 时, $\mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画定理 2.29 可知 $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}^n) = L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 这是因为

$$\begin{aligned} m \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}^n) &\Leftrightarrow T_m \in \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n) \\ &\Leftrightarrow \exists u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) (\hat{u} \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \wedge T_m(f) = f * u = f * m^\vee) \\ &\Leftrightarrow m = \hat{u}. \end{aligned}$$

当 $p = 1$ 时, 根据 $\mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画定理 2.28 可知 $\mathcal{M}_1(\mathbb{R}^n)$ 正是有限 Borel 测度 Fourier 变换的集合 (记为 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$). 这是因为

$$\begin{aligned} m \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R}^n) &\Leftrightarrow T_m \in \mathcal{M}^{1,1}(\mathbb{R}^n) \\ &\Leftrightarrow \exists \text{ 有限 Borel 测度 } \mu \text{ 使得 } T_m(f) = f * \mu = (\widehat{f}m)^\vee = f * m^\vee \\ &\Leftrightarrow m = \widehat{\mu}. \end{aligned}$$

同时, 根据 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 共轭空间的刻画定理 2.27 可知有界函数 m 为 L^p 乘子当且仅当其为 $L^{p'}$ 乘子, 且此时

$$\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|m\|_{\mathcal{M}_{p'}(\mathbb{R}^n)}, \quad 1 < p < \infty.$$

根据 Riesz-Thorin 插值定理 2.24 可得赋范空间 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 之间的嵌套关系:

$$\mathcal{M}_1(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}_q(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R}^n) = L^\infty(\mathbb{R}^n), \quad 1 \leq p \leq q \leq 2.$$

这是因为取定 $1 \leq p < 2$, 根据定义知 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 必定是 L^∞ 函数, 因而 $m \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}^n)$, 根据 Riesz-Thorin 插值定理即知对任意 $q \in [p, 2]$ 均有 $m \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R}^n)$.

另外, 若 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2 \leq p'$, 则根据 Riesz-Thorin 插值定理 2.24 知

$$\|T_m\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{2}} \|T_m\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{2}} \stackrel{(A)}{=} \|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (2.130)$$

其中 (A) 基于 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 共轭空间的刻画定理 2.27. 最后, 根据 Riesz-Thorin 插值定理 2.24 知在 $1 \leq p \leq q \leq 2$ 时有

$$\|T_m\|_{L^q(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \leq \|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)}^{1-\theta} \|T_m\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)}^\theta = \|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

因此

$$\|m\|_{\mathcal{M}_q(\mathbb{R}^n)} \leq \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}, \quad 1 \leq p \leq q \leq 2.$$

从而当 p 从 1 增长到 2 时, 空间族 $\{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)\}_p$ 是在嵌入意义下的递增族.

例 2.11 对任意 $b \in \mathbb{R}^n$ 而言, 函数 $m(\xi) = e^{i2\pi\xi \cdot b}$ 是 L^p 乘子. 这是因为它所对应的算子为

$$T_m(f)(x) = (\widehat{f}m)^\vee(x) = (\widehat{f}e^{i2\pi\xi \cdot b})^\vee(x) = f(x+b), \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n),$$

因此 T_m 是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子, 且显见 $\|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} = 1$, 因此 $\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = 1$.

命题 2.47 ($\mathcal{M}_p$ 的完备性)

若 $1 \leq p < \infty$, 则赋范空间 $(\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)})$ 是 Banach 空间, 且 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 对点态乘积封闭, 因而其为 Banach 代数.

证明 根据 $\mathcal{M}^{p,q}(\mathbb{R}^n)$ 共轭空间的刻画定理 2.27, 只需证明 $1 \leq p \leq 2$ 的情况. 显见只要 $m_1, m_2 \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, $b \in \mathbb{C}$, 则 $m_1 + m_2, bm_1 \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$. 对 $m_1 m_2$ 而言, 知它是对应于算子 $T_{m_1} T_{m_2} = T_{m_1 m_2}$ 的乘子, 因而

$$\|m_1 m_2\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|T_{m_1} T_{m_2}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|m_1\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \|m_2\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}.$$

这表明 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 是代数. 为了说明 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 是完备赋范空间, 设 $\{m_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列. 因为 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $\{m_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 同样是 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列, 根据 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的完备性可知 $\{m_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 在 L^∞ 意义下存在极限 $m \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 另从 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 本身的定义知 $\{m_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 关于 j 几乎处处一致有界, 不妨设 $\sup_{j \in \mathbb{N}} \|m_j\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = C$. 现在希望说明 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, 固定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$T_{m_j}(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) m_j(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \stackrel{(A)}{\rightarrow} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) m(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi = T_m(f)(x), \quad \text{a.e.},$$

其中 (A) 左式的被积函数被可积函数 $C|\widehat{f}|$ 控制, (i) 的成立基于 Lebesgue 控制收敛定理. 因为 $\{m_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$

中的基本列, 其在 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 中有界, 因此 $\sup_{j \in \mathbb{N}} \|m_j\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} < +\infty$. 由 Fatou 引理知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |T_m(f)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \liminf_{j \rightarrow \infty} |T_{m_j}(f)|^p dx \\ &\leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |T_{m_j}(f)|^p dx \\ &\leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \|m_j\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}^p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p, \end{aligned}$$

这说明 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$. 至此已经说明了只要 $m_j \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 且 m_j 一致收敛到 m , 则 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \|m_j\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}.$$

现将上述不等式中的 m_j 换成 $m_k - m_j$, m 换成 $m_k - m$, 其中 k 取定, 则

$$\|m_k - m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \|m_k - m_j\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad (2.131)$$

根据基本列的 Cauchy 准则知 $\|m_k - m_j\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 (k, j \rightarrow \infty)$, 因此 $\|m_k - m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 故 $m_k \rightarrow m$ ($\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$), 因而 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 是 Banach 空间. $\square$

下面的命题列举了一些乘子的简单性质:

命题 2.48

对任意 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p < \infty), x \in \mathbb{R}^n, h > 0$ 有

- (i) $\|\tau^x(m)\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}$;
- (ii) $\|m(h(\cdot))\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}$;
- (iii) $\|\widetilde{m}\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}$;
- (iv) $\|e^{i2\pi x(\cdot)} m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}$;
- (v) $\|m \circ A\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} = \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)}$, 其中 A 是正交阵.

2.16 补充: 振荡积分

振荡积分在调和分析发展之初就扮演着非常重要的角色. Fourier 变换是振荡积分的原型, 它给出了非平凡相位的最简单例子, 即关于积分变量的线性函数. 更复杂的相位在各种各样的问题也会自然出现, 例如 Bessel 函数给出了相位为正弦函数时振荡积分的例子.

本节我们会快速浏览一遍振荡积分的内容. 我们主要研究一维情况, 就算是这种最简单的情况也是需要一些具体分析的. 对于高维情况, 我们只会研究一个非常简单的情形.

定义 2.24 (振荡积分)

振荡积分是形如下式的表达式

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\lambda\varphi(x)} \psi(x) dx, \quad (2.132)$$

其中 λ 是正实数; φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数, 称为相位; ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的复值光滑可积函数, 一般都设它是紧支函数.

2.16.1 无驻点的相位

我们从最简单的一维情况开始研究. 设 φ, ψ 都是 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数, $\text{supp } \psi$ 是闭区间, 且对任意 $x \in \text{supp } \psi$ 都有 $\varphi'(x) \neq 0$. 因为 φ' 非零, 故在 $\text{supp } \psi$ 上 φ' 要么严格正, 要么严格负. 这说明 φ 在 $\text{supp } \psi$ 上必是单调的, 因此在 (2.132) 式中可以考虑换元

$$u = \varphi(x).$$

知 $dx = (\varphi'(x))^{-1} du = (\varphi^{-1})'(u) du$, 其中 φ^{-1} 是 φ 的反函数. 现在将(2.132)式写成

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda u} \psi(\varphi^{-1}(u)) (\varphi^{-1})'(u) du, \quad (2.133)$$

注意到函数 $\theta(u) = \psi(\varphi^{-1}(u)) (\varphi^{-1})'(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的光滑紧支函数, 因此

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda u} \psi(\varphi^{-1}(u)) (\varphi^{-1})'(u) du = \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda u} \theta(u) du = \widehat{\theta}\left(\frac{-\lambda}{2\pi}\right),$$

其中 $\widehat{\theta}$ 是 θ 的 Fourier 变换. 因为 θ 是光滑紧支函数, 故由函数光滑性与其 Fourier 变换衰减性的联系 2.3 知 $\lambda \rightarrow \infty$ 时 $\widehat{\theta}$ 是速降的 (亦即对任意 $N > 0$ 均有 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \widehat{\theta}(-\frac{\lambda}{2\pi}) = o(\lambda^{-N})$), 进而(2.133)式中的积分在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时是速降的.

下面探讨这种情况的高维版本.

定义 2.25 (驻点)

称点 x_0 是相位函数 φ 的驻点, 如果

$$\nabla \varphi(x_0) = (\partial_1 \varphi(x_0), \dots, \partial_n \varphi(x_0)) = 0.$$

例 2.12 设 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 则相位函数 $\varphi_1(x) = x \cdot \xi$, $\varphi_2(x) = e^{x \cdot \xi}$ 无驻点, 而相位函数 $\varphi_3(x) = |x|^2 - x \cdot \xi$ 有一个驻点 $x_0 = \frac{1}{2}\xi$.

下面的结果给出了相位函数无驻点时振荡积分的行为.

命题 2.49 (无驻点相位振荡积分的点态估计)

设 ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支光滑函数, φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实值 C^∞ 函数, 且在 $\text{supp } \psi$ 上无驻点. 则振荡积分

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\lambda \varphi(x)} \psi(x) dx \quad (2.134)$$

对任意 $\lambda \geq 1$ 与任意 $N > 0$ 满足估计 $|I(\lambda)| \leq C_N \lambda^{-N}$, 其中 C_N 是依赖于 N, φ, ψ 的常数.

证明 一维的情况已经在前面讨论过了, 下面着重于 $n \geq 2$ 的情况. 对任意 $y \in \text{supp } \psi$, 总存在单位向量 θ_y 使得

$$\theta_y \cdot \nabla \varphi(y) = |\nabla \varphi(y)|.$$

根据 $\nabla \varphi$ 的连续性知存在 y 的某邻域 $B(y, r_y)$ 使得对任意 $x \in B(y, r_y)$ 均有

$$\theta_y \cdot \nabla \varphi(x) \geq \frac{1}{2} |\nabla \varphi(y)| > 0.$$

因为 $\text{supp } \psi$ 是紧集, 故可用有限个球 $B(y_j, r_{y_j}) (j = 1, \dots, m)$ 覆盖 $\text{supp } \psi$. 记 $c = \min_{1 \leq j \leq m} \frac{1}{2} |\nabla \varphi(y_j)|$, 则

$$\theta_{y_j} \cdot \nabla \varphi(x) \geq c > 0 \quad (2.135)$$

对任意 $x \in B(y_j, r_{y_j})$ 与 $j = 1, \dots, m$ 成立.

下面在 $\bigcup_{j=1}^m B(y_j, r_{y_j})$ 上作单位分解. 因为 $\bigcup_{j=1}^m B(y_j, r_{y_j})$ 紧包含于 $\mathbb{R}^n$, 故通过单位分解定理得到的 C_0^∞ 函数族 Ψ 中的每个函数 ψ 要么支在某个球 $B(y_j, r_{y_j})$ 上, 要么支在 $\text{supp } \psi$ 之外 (实际上是支在 $\bigcup_{j=1}^m B(y_j, r_{y_j})$ 之外). 现在根据单位分解定理 2.20(ii),(iv) 知存在有限个函数 $\{\zeta_k\}_k \in \Psi$ 使得

$$I(\lambda) = \sum_k \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\lambda \varphi(x)} \psi(x) \zeta_k(x) dx. \quad (2.136)$$

于是只需证明(2.136)右和式中的每个项在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时均速降即可.

现在固定 k , 取 j 满足 $\text{supp}(\psi \zeta_k) \subset B(y_j, r_{y_j})$, 并取单位向量 $\theta_{y_j, 2}, \dots, \theta_{y_j, n}$ 使得向量组 $\{\theta_{y_j}, \theta_{y_j, 2}, \dots, \theta_{y_j, n}\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上正交. 设 e_j 是 $\mathbb{R}^n$ 上第 j 个元素为 1, 其余元素为 0 的单位 (列) 向量. 现取正交阵 R 使得 $R^t e_1 = \theta_{y_j}$, 在积分

$$I_k(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\lambda \varphi(x)} \psi(x) \zeta_k(x) dx$$

中考虑换元 $u = y_j + R(x - y_j)$. 映射 $x \mapsto u = (u_1, \dots, u_n)$ 实际上是旋转, 进而在该映射下球 $B(y_j, r_{y_j})$ 是不变

的. 定义 $\varphi(x) = \varphi^o(u)$, $\psi(x) = \psi^o(u)$, $\zeta_k(x) = \zeta_k^o(u)$, 则在新的坐标系中有

$$I_k(\lambda) = \int_K \left\{ \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda\varphi^o(u)} \psi^o(u_1, \dots, u_n) \zeta_k^o(u_1, \dots, u_n) du_1 \right\} du_2 \cdots du_n, \quad (2.137)$$

其中 K 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的某紧子集. 因为 R 是正交阵, 故 $R^{-1} = R^t$, 进而 $u = y_j + R(x - y_j)$ 等价于 $x = y_j + R^t(u - y_j)$. 若设

$$R = \begin{pmatrix} R_{11} & \cdots & R_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ R_{n1} & \cdots & R_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$x = y_j + \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n R_{i1} u_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n R_{in} u_i \end{pmatrix} - R^t y_j,$$

因此

$$\frac{\partial x}{\partial u_1} = \begin{pmatrix} R_{11} \\ \vdots \\ R_{1n} \end{pmatrix} = R^t e_1 = \theta_{y_j}.$$

于是对任意 $x \in B(y_j, r_{y_j})$, 由(2.135)式知

$$\frac{\partial \varphi^o(u)}{\partial u_1} = \frac{\partial \varphi(y_j + R^t(u - y_j))}{\partial u_1} = \nabla \varphi(x) \cdot \frac{\partial x}{\partial u_1} = \nabla \varphi(x) \cdot \theta_{y_j} \geq c > 0.$$

现在将(2.137)式中大括号内的积分视作关于 u_1 的振荡积分, 知 $\psi^o \zeta_k^o$ 是关于 u_1 的光滑函数, 且上式已经说明了关于 u_1 的相位函数 φ^o 无驻点, 因此由前文讨论过的一维情形可知对任意 $N > 0$, (2.137)式中大括号内的部分在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时都表现为 $o(\lambda^{-N})$. 又因为 K 是紧集, 故 $I_k(\lambda)$ 在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时同样表现为 $o(\lambda^{-N})$, 这便完成了证明. $\square$

2.16.2 下水平集估计与 Van der Corput 引理

下面讨论一维振荡积分的一个最佳衰减估计. 这个估计是通过函数 u 的下水平集 $\{|u| \leq \alpha\}$ 的 Lebesgue 测度作精确的尺寸估计而得到的. 下面记 $u^{(k)}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数 $u(t)$ 的 k 阶导数, $C^k(\mathbb{R})$ 是 k 阶连续可微函数空间.

引理 2.18

设 $k \geq 1$, $a_0, \dots, a_k$ 是两两不同的实数. 记 $a = \min(a_j)$, $b = \max(a_j)$, f 是 $[a, b]$ 上的实值 C^{k-1} 函数, 且它在 (a, b) 上是 C^k 函数, 则存在 $y \in (a, b)$ 使得

$$\sum_{m=0}^k c_m f(a_m) = f^{(k)}(y),$$

其中 $c_m = (-1)^k k! \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq m}}^k (a_l - a_m)^{-1}$.



证明 如果可以找到多项式 $p_k(x) = \sum_{j=0}^k b_j x^j$ 使得函数

$$\varphi(x) = f(x) - p_k(x) \quad (2.138)$$

满足对任意 $0 \leq m \leq k$ 均有 $\varphi(a_m) = 0$, 因为 a_j 两两不同, 故对 φ 用 k 次 Rolle 定理可知存在 $y \in (a, b)$ 使得

$$f^{(k)}(y) = k! b_k.$$

(2.138)式中多项式 p_k 的存在性等价于下述矩阵方程解的存在性

$$\begin{pmatrix} a_0^k & a_0^{k-1} & \cdots & a_0 & 1 \\ a_1^k & a_1^{k-1} & \cdots & a_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k-1}^k & a_{k-1}^{k-1} & \cdots & a_{k-1} & 1 \\ a_k^k & a_k^{k-1} & \cdots & a_k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_k \\ b_{k-1} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(a_0) \\ f(a_1) \\ \vdots \\ f(a_{k-1}) \\ f(a_k) \end{pmatrix}.$$

上左式中矩阵的行列式恰为 Vandermonde 行列式, 知

$$\begin{vmatrix} a_0^k & a_0^{k-1} & \cdots & a_0 & 1 \\ a_1^k & a_1^{k-1} & \cdots & a_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k-1}^k & a_{k-1}^{k-1} & \cdots & a_{k-1} & 1 \\ a_k^k & a_k^{k-1} & \cdots & a_k & 1 \end{vmatrix} = \prod_{l=0}^{k-1} \prod_{j=l+1}^k (a_j - a_l).$$

又因为 a_j 互不相同, 故 $\prod_{l=0}^{k-1} \prod_{j=l+1}^k (a_j - a_l) \neq 0$, 这说明矩阵方程有唯一解. 根据 Cramer 法则解得

$$\begin{aligned} b_k &= \sum_{m=0}^k (-1)^m f(a_m) \frac{\prod_{\substack{l=0 \\ l \neq m}}^{k-1} \prod_{\substack{j=l+1 \\ j \neq m}}^k (a_l - a_j)}{\prod_{l=0}^{k-1} \prod_{j=l+1}^k (a_l - a_j)} \\ &= \sum_{m=0}^k (-1)^m f(a_m) \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq m}}^k (a_l - a_m)^{-1} (-1)^{k-m}, \end{aligned}$$

对应设置 c_m 即可. □

引理 2.19

设 E 是 $\mathbb{R}$ 的可测子集, 且它具有非零的有限 Lebesgue 测度. 若 $k \in \mathbb{N}$, 则存在 $a_0, \dots, a_k \in E$ 使得对任意 $l = 0, 1, \dots, k$ 均有

$$\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq l}}^k |a_j - a_l| \geq \left(\frac{|E|}{2e} \right)^k. \quad (2.139)$$

证明 取定有限测度集 E , 根据实变函数的结论知对任意 $\delta > 0$, 存在 E 的紧子集 E' 使得 $|E \setminus E'| < \delta$. 现对 $x \in \mathbb{R}$ 定义 $T(x) = |(-\infty, x) \cap E'|$, 则 T 满足下述距离递减性:

$$|T(x) - T(y)| \leq |x - y|, \quad \forall x, y \in E',$$

因此 T 是连续函数, 进而根据连续函数的介值定理知 T 是从 E' 到 $[0, |E'|]$ 的满射. 现设 $a_j \in E'$ 满足 $T(a_j) = \frac{j}{k}|E'|$ ($j = 0, 1, \dots, k$), 若 k 是偶数, 则

$$\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq l}}^k |a_j - a_l| \geq \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq l}}^k \left| \frac{j}{k}|E'| - \frac{l}{k}|E'| \right| \geq \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq \frac{k}{2}}}^k \left| \frac{j}{k} - \frac{1}{2} \right| |E'|^k = \prod_{r=0}^{\frac{k}{2}-1} \left(\frac{r - \frac{k}{2}}{k} \right)^2 |E'|^k,$$

根据 Stirling 公式知存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$\left(\frac{k}{2} \right)! = \sqrt{\pi k} \left(\frac{k}{2e} \right)^{\frac{k}{2}} e^{\frac{\theta}{2k}}.$$

于是

$$\prod_{r=0}^{\frac{k}{2}-1} \left(\frac{r - \frac{k}{2}}{k} \right)^2 = \pi k (2e)^{-k} e^{\frac{\theta}{k}} \geq (2e)^{-k}.$$

若 k 是奇数, $k=1$ 时结论显然成立, 下设 $k>1$, 则

$$\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq l}}^k |a_j - a_l| \geq \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq l}}^k \left| \frac{j}{k} |E'| - \frac{l}{k} |E'| \right| \geq \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq \frac{k+1}{2}}}^k \left| \frac{j}{k} - \frac{k+1}{2k} \right| |E'|^k,$$

而

$$\begin{aligned} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq \frac{k+1}{2}}}^k \left| \frac{j}{k} - \frac{k+1}{2k} \right| &\geq \left(\frac{1}{k} \cdot \frac{2}{k} \cdots \frac{\frac{k-1}{2}}{k} \right)^2 \frac{k+1}{2k} \\ &\geq k^{1-k} \cdot \pi(k-1) \cdot (k-1)^{k-1} \cdot (2e)^{1-k} \cdot \frac{k+1}{2k} \\ &= 2e\pi \left(\frac{k-1}{k} \right)^k \frac{k+1}{2} (2e)^{-k} \geq \frac{e\pi}{2} \frac{k+1}{2} (2e)^{-k} \geq (2e)^{-k}. \end{aligned}$$

至此已经证明了(2.139)式中将 E 换成 E' 的情况. 又因为 $|E \setminus E'| < \delta$, 而 δ 可取任意小, 至此即得结论. $\square$

下面阐述本节的主要结论.

命题 2.50 (Van der Corput)

(a) 设 u 是实值 C^k 函数, $k \in \mathbb{N}$ 满足 $u^{(k)}(t) \geq 1$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立, 则下述估计对任意 $\alpha > 0$ 成立:

$$|\{t \in \mathbb{R} : |u(t)| \leq \alpha\}| \leq (2e)((k+1)!)^{\frac{1}{k}} \alpha^{\frac{1}{k}}. \quad (2.140)$$

(b) 设 $-\infty < a < b < \infty$. 对全体 $k \geq 2$, 只要 $\mathbb{R}$ 上的实值 C^k 函数 u 满足 $u^{(k)}(t) \geq 1$ 对任意 $t \in [a, b]$ 成立, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 均有:

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} dt \right| \leq 10k|\lambda|^{-\frac{1}{k}}. \quad (2.141)$$

(c) 若 $k=1$, $u'(t)$ 在 (a, b) 上单调, $u'(t) \geq 1$ 对任意 $t \in (a, b)$ 成立, 则对任意非零实数 λ 有

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} dt \right| \leq 4|\lambda|^{-1}. \quad (2.142)$$



证明 (a) 设 $E = \{t \in \mathbb{R} : |u(t)| \leq \alpha\}$. 若 $|E|$ 非零, 则根据引理2.19知存在 $a_0, a_1, \dots, a_k \in E$ 使得对任意 $l \in \{0, 1, \dots, k\}$ 均有

$$|E|^k \leq (2e)^k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq l}}^k |a_j - a_l|. \quad (2.143)$$

引理2.18说明存在 $y \in (\min a_j, \max a_j)$ 使得

$$u^{(k)}(y) = (-1)^k k! \sum_{m=0}^k u(a_m) \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq m}}^k (a_l - a_m)^{-1}. \quad (2.144)$$

将(2.143)式代入(2.144)右式可得

$$\begin{aligned} \left| (-1)^k k! \sum_{m=0}^k u(a_m) \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq m}}^k (a_l - a_m)^{-1} \right| &\leq k! \sum_{m=0}^k \max_{0 \leq j \leq k} u(a_j) (2e)^k |E|^{-k} \\ &\leq (k+1)! \max_{0 \leq j \leq k} u(a_j) (2e)^k |E|^{-k} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} (k+1)! \alpha (2e)^k |E|^{-k}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $a_j \in E$. 现由 $u^{(k)}(t) \geq 1$ 知

$$(k+1)! \alpha (2e)^k |E|^{-k} \geq 1 \Rightarrow |E|^k \leq (k+1)! (2e)^k \alpha.$$

此即(2.140)式.

(b) 取 $k \geq 2$, 将(2.141)式中提到的区间分为两部分:

$$R_1 = \{t \in (a, b) : |u'(t)| \leq \beta\},$$

$$R_2 = \{t \in (a, b) : |u'(t)| > \beta\},$$

其中 β 是待定常数. 函数 $v = u'$ 满足 $v^{(k-1)} \geq 1$, 同时 $k-1 \geq 1$, 故由 (a) 的结论知

$$\left| \int_{R_1} e^{i\lambda u(t)} dt \right| \leq |R_1| \leq 2e(k!)^{\frac{1}{k-1}} \beta^{\frac{1}{k-1}} \leq 6k\beta^{\frac{1}{k-1}}.$$

为了给出 R_2 的估计, 注意到若 $u^{(k)} \geq 1$, 则集合 $\{|u'| > \beta\}$ 可以写成至多 $2k-2$ 个区间的并, 在其中每个区间上 u' 都是单调的. 这是因为 $u^{(k)} \geq 1$ 意味着 $u^{(k-1)}$ 至多有 1 个零点, 进而 $u^{(k-2)}$ 至多有 2 个零点, 重复该过程可知 u'' 至多有 $k-2$ 个零点, 也就是说 u' 的单调区间至多有 $k-1$ 个. 现设 (c, d) 是构成 $\{|u'| > \beta\}$ 的某个单调区间, 则 u' 在 (c, d) 上符号固定, 进而

$$\begin{aligned} \left| \int_c^d e^{i\lambda u(t)} dt \right| &= \left| \int_c^d (e^{i\lambda u(t)})' \frac{1}{\lambda u'(t)} dt \right| \\ &\leq \left| \int_c^d e^{i\lambda u(t)} \left(\frac{1}{\lambda u'(t)} \right)' dt \right| + \frac{1}{|\lambda|} \left| \frac{e^{i\lambda u(d)}}{u'(d)} - \frac{e^{i\lambda u(c)}}{u'(c)} \right| \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} \int_c^d \left| \left(\frac{1}{u'(t)} \right)' \right| dt + \frac{2}{|\lambda|\beta} \\ &\stackrel{(B)}{=} \frac{1}{|\lambda|} \left| \int_c^d \left(\frac{1}{u'(t)} \right)' dt \right| + \frac{2}{|\lambda|\beta} \\ &= \frac{1}{|\lambda|} \left| \frac{1}{u'(d)} - \frac{1}{u'(c)} \right| + \frac{2}{|\lambda|\beta} \leq \frac{4}{|\lambda|\beta}, \end{aligned}$$

其中 (B) 是因为 (c, d) 是 u' 的单调区间, 进而也是 $\frac{1}{u'}$ 的单调区间, 所以 $\left(\frac{1}{u'}\right)'$ 在 (c, d) 上符号固定. 现有

$$\left| \int_{R_2} e^{i\lambda u(t)} dt \right| \leq \frac{4(k-1)}{|\lambda|\beta} \leq \frac{4k}{|\lambda|\beta},$$

取 $\beta = |\lambda|^{-\frac{k-1}{k}}$ 可得

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} dt \right| &\leq \left| \int_{R_1} e^{i\lambda u(t)} dt \right| + \left| \int_{R_2} e^{i\lambda u(t)} dt \right| \\ &\leq 6k|\lambda|^{-\frac{1}{k}} + 4k|\lambda|^{-\frac{1}{k}} = 10k|\lambda|^{-\frac{1}{k}}. \end{aligned}$$

此即(2.141)式.

(c) 因为 $u'(t) \geq 1$, 故

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} dt \right| &= \left| \int_a^b (e^{i\lambda u(t)})' \frac{1}{\lambda u'(t)} dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} \left(\frac{1}{\lambda u'(t)} \right)' dt \right| + \frac{1}{|\lambda|} \left| \frac{e^{i\lambda u(b)}}{u'(b)} - \frac{e^{i\lambda u(a)}}{u'(a)} \right| \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} \int_a^b \left| \left(\frac{1}{u'(t)} \right)' \right| dt + \frac{2}{|\lambda|} \\ &= \frac{1}{|\lambda|} \left| \int_a^b \left(\frac{1}{u'(t)} \right)' dt \right| + \frac{2}{|\lambda|} \\ &\leq \frac{1}{|\lambda|} \left| \frac{1}{u'(b)} - \frac{1}{u'(a)} \right| + \frac{2}{|\lambda|} \leq 4|\lambda|^{-1}. \end{aligned}$$

此即(2.142)式. □

推论 2.10

设 (a, b) , $u(t)$, $\lambda > 0$, k 满足 Van der Corput 引理 2.50 的条件, 则对 (a, b) 上任意具有可积导函数的函数 ψ , 当 $k \geq 2$ 时有

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} \psi(t) dt \right| \leq 10\lambda^{-\frac{1}{k}} \left[|\psi(b)| + \int_a^b |\psi'(s)| ds \right].$$

若 $k = 1$ 且 ψ' 在 (a, b) 上单调, 则

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} \psi(t) dt \right| \leq 4\lambda^{-1} \left[|\psi(b)| + \int_a^b |\psi'(s)| ds \right].$$



证明 设

$$F(x) = \int_a^x e^{i\lambda u(t)} dt,$$

分部积分知

$$\int_a^b e^{i\lambda u(t)} \psi(t) dt = F(b)\psi(b) - \int_a^b F(t)\psi'(t) dt.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} \psi(t) dt \right| &\leq |F(b)\psi(b)| + \int_a^b |F(t)| |\psi'(t)| dt \\ &= \left| \int_a^b e^{i\lambda u(t)} dt \right| |\psi(b)| + \int_a^b \left| \int_a^t e^{i\lambda u(y)} dy \right| |\psi'(t)| dt \\ &\leq 10k|\lambda|^{-\frac{1}{k}} |\psi(b)| + 10k|\lambda|^{-\frac{1}{k}} \int_a^b |\psi'(t)| dt \\ &= 10\lambda^{-\frac{1}{k}} \left[|\psi(b)| + \int_a^b |\psi'(s)| ds \right]. \end{aligned}$$

另一结论类似可证. □

例 2.13(Bessel 函数) m 阶 Bessel 函数定义为

$$J_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ir \sin \theta} e^{-im\theta} d\theta,$$

其中 r, m 均为实数, 另设 $m > -\frac{1}{2}$. 下面用推论 2.10 研究 Bessel 函数在 $r \rightarrow \infty$ 时的衰减情况. 设 $\varphi(\theta) = \sin(\theta)$, 注意到在区间 $[0, 2\pi]$ 内, $\varphi'(\theta)$ 只会在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 与 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 这两处为零, 另有 $\varphi''(\frac{\pi}{2}) = 1, \varphi''(\frac{3\pi}{2}) = -1$. 现记 $1 = \psi_1 + \psi_2 + \psi_3$, 其中 ψ_1 在 $\frac{\pi}{2}$ 的某个小邻域内光滑紧支, ψ_2 在 $\frac{3\pi}{2}$ 的某个小邻域内光滑紧支. 对 $j = 1, 2$, 推论 2.10 表明

$$\left| \int_0^{2\pi} e^{ir \sin(\theta)} (\psi_j(\theta) e^{-im\theta}) d\theta \right| \leq C m r^{-\frac{1}{2}},$$

其中 C 是常数. 对于 $j = 3$, 因为此时积分区域不包含 $\sin \theta$ 的驻点, 故根据无驻点相位振荡积分的点态估计 2.49 知 ψ_3 对应的积分在 $r \rightarrow \infty$ 时速降. 因此 J_m 在 $r \rightarrow \infty$ 时以 $r^{-\frac{1}{2}}$ 这一速度衰减.

第三章 Hardy-Littlewood 极大函数

3.1 恒等逼近定理

设 ϕ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 且其满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$, 对 $t > 0$ 定义 $\phi_t(x) = t^{-n} \phi(t^{-1}x)$. 当 $t \rightarrow 0$, 知 $\phi_t \rightarrow \delta(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 其中 δ 是在原点的 Dirac 测度. 这是因为首先有

$$\langle \phi_t, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} t^{-n} \phi(t^{-1}x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) g(tx) dx, \quad \forall g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n),$$

于是根据控制收敛定理有

$$\langle \lim_{t \rightarrow 0} \phi_t, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{t \rightarrow 0} \phi(x) g(tx) dx = g(0) = \langle \delta, g \rangle,$$

此即 $\phi_t \rightarrow \delta(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$. 因为 $\delta * g(x) = g(x)$, 故对任意 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 都在点态意义下有

$$\lim_{t \rightarrow 0} (\phi_t * g)(x) = g(x).$$

基于上述启发, 可以得到恒等逼近族的定义:

定义 3.1 (恒等逼近族)

设 $\phi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\phi_t(x) = \frac{1}{t^n} \phi(\frac{x}{t})$ ($t > 0$) 满足:

(i) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$;

(ii) $\phi_t \rightarrow \delta(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$,

那么就称 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 是恒等逼近族.

实际上 [DY] 中给出了下述更宽泛的恒等逼近族定义:

定义 3.2 (恒等逼近族^{DY})

设 ϕ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测, 对任意 $t > 0$, 记 $\phi_t(x) = \frac{1}{t^n} \phi(\frac{x}{t})$. 若任取 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p \leq \infty$), 在 $t \rightarrow 0$ 时都 (在依 L^p 范数或点态意义下) 有 $f * \phi_t \rightarrow f$, 则称 ϕ 为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的恒等逼近核, 称 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 为恒等逼近族.

在后文中若非特殊说明, 称恒等逼近族时指代的都是定义 3.1.

前面的所有求和法中的收敛性结果都是恒等逼近定理的特殊情况: 对 Cesaro 求和法, 可取 $\phi = F_1$, $F_R = \phi_{\frac{1}{R}}$; 对 Abel-Poisson 求和法, 可取 $\phi = P_1$; 对 Gauss-Weierstrass 求和法, 可取 $\phi = W_1$. 下面的恒等逼近定理表明这些求和法最后都能导出依 L^p 范数收敛性.

定理 3.1 (恒等逼近定理)

设 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 是恒等逼近族, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\phi_t * f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0,$$

其中 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$). 特别当 $p = \infty$, 则只要 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 上述极限就成立.

证明 因为 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$, 故

$$(\phi_t * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) [f(x - ty) - f(x)] dy.$$

因为本身有 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故任取 $\varepsilon > 0$, 总存在 (依赖于 f 的) $\delta > 0$ 使得对 $|h| < \delta$ 有

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon,$$

对固定的 δ , 又存在足够小的 t 使得

$$\int_{|y| \geq \frac{\delta}{t}} |\phi(y)| dy \leq \varepsilon,$$

于是根据 Minkowski 不等式有

$$\begin{aligned}
 \|\phi_t * f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \left\| \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) [f(\cdot - ty) - f(\cdot)] dy \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
 &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |\phi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} dy \\
 &= \int_{|y| < \frac{\delta}{t}} |\phi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} dy \\
 &\quad + \int_{|y| \geq \frac{\delta}{t}} |\phi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} dy \\
 &\leq \varepsilon \int_{|y| < \frac{\delta}{t}} |\phi(y)| dy + 2\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \varepsilon.
 \end{aligned}$$

由 ε 的任意性即得命题. $\square$

作为恒等逼近定理的推论, 回忆依 L^p 范数收敛可以推知依测度收敛, 而 Riesz 定理表明依测度收敛列存在几乎处处收敛子列, 故存在依赖于 f 的序列 $\{t_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得 $t_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\phi_{t_k} * f)(x) = f(x), \text{ a.e..}$$

因此只要极限 $\lim_{t \rightarrow 0} (\phi_t * f)(x)$ 存在, 它必几乎处处等于 $f(x)$. 之后的章节中我们会来研究这个极限的存在性.

注 类似于恒等逼近定理的证明, 如果将恒等逼近族定义中的 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ 修改为 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = a \in \mathbb{C}$, 可得下述定理:

补充定理 3.1 (恒等逼近定理的推广)

若 $\phi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\phi_t(x) = \frac{1}{t^n} \phi(\frac{x}{t}) (t > 0)$ 满足

(i) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = a \in \mathbb{C}$;

(ii) 对任意 $\delta > 0$ 均有 $\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \phi_t(x) dx \rightarrow 0$,

则对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p \leq \infty)$:

(a) 若 $1 \leq p < \infty$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \|\phi_t * f - af\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$;

(b) 若 $p = \infty$, $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \|\phi_t * f - af\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$.



3.2 弱型不等式与几乎处处收敛

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是测度空间, T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 Y 上复值可测函数空间的算子.

定义 3.3 (弱 (p, q) 型算子)

称 T 是弱 $(p, q) (q < \infty)$ 型算子, 如果存在常数 C 使得

$$\nu(\{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{C \|f\|_{L^p(X, \mu)}}{\lambda} \right)^q, \quad \forall \lambda > 0. \quad (3.1)$$

(3.1) 式又称为弱 (p, q) 型不等式. 称 T 是弱 (p, ∞) 型算子, 如果它是从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^\infty(Y, \nu)$ 的有界算子, 亦即

$$\|T\|_{L^p(X, \mu) \rightarrow L^\infty(Y, \nu)} = \sup_{\|f\|_{L^p(X, \mu)} \leq 1} \|Tf\|_{L^\infty(Y, \nu)} < \infty. \quad (3.2)$$

(3.2) 式又称为弱 (p, ∞) 型不等式.



定义 3.4 (强 (p, q) 型算子)

称 T 是强 (p, q) 型算子, 如果它是从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^q(Y, \nu)$ 的有界算子, 亦即

$$\|T\|_{L^p(X, \mu) \rightarrow L^q(Y, \nu)} = \sup_{\|f\|_{L^p(X, \mu)} \leq 1} \|Tf\|_{L^q(Y, \nu)} < \infty. \quad (3.3)$$

(3.3)式又称为强 (p, q) 型不等式.



下面说明强 (p, q) 型算子必是弱 (p, q) 型算子: 任取 $\lambda > 0$, 设 $E_\lambda = \{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}$, $\|Tf\|_{L^q(Y, \nu)} \leq C\|f\|_{L^p(X, \mu)}$, 其中 C 是常数, 则

$$\nu(E_\lambda) = \int_{E_\lambda} d\nu \leq \int_{E_\lambda} \left| \frac{Tf(x)}{\lambda} \right|^q d\nu \leq \frac{\|Tf\|_{L^q(Y, \nu)}^q}{\lambda^q} \leq \left(\frac{C\|f\|_{L^p(X, \mu)}}{\lambda} \right)^q.$$

当 $(X, \mu) = (Y, \nu)$, T 是恒同算子时, T 的弱 (p, p) 型不等式就正是 Chebyshev 不等式.

弱 (p, q) 型不等式与几乎处处收敛的关系由下述定理给出, 其中设 $(X, \mu) = (Y, \nu)$.

定理 3.2 (算子族的点态收敛性)

设 $\{T_t\}_t$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, 定义

$$T^*f(x) = \sup_t |T_tf(x)|,$$

若 T^* 是弱 (p, q) 型算子, 则集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭.



证明 设 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是依 L^p 范数收敛到 f 的函数列, 且其满足 $T_tf_n(x)$ 在 $t \rightarrow t_0$ 时几乎处处收敛到 $f_n(x)$. 往证 $\lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x)$ a.e., 任取 $\lambda > 0$ 知:

$$\begin{aligned} \mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leq \mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_t(f - f_n)(x) - (f - f_n)(x)| > \lambda\}) \\ &\stackrel{(A)}{=} \mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| - \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf_n(x) - f_n(x)| > \lambda\}) \\ &\leq \mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_t(f - f_n)(x) - (f - f_n)(x)| > \lambda\}) \\ &\leq \mu\left(\left\{x \in X : T^*(f - f_n)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}\right) + \mu\left(\left\{x \in X : |(f - f_n)(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right) \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \left(\frac{2C}{\lambda}\|f - f_n\|_{L^p(X, \mu)}\right)^q + \left(\frac{2}{\lambda}\|f - f_n\|_{L^p(X, \mu)}\right)^p, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $\mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf_n(x) - f_n(x)| > \lambda\}) = 0$, (B) 的第一式是 T^* 作为弱 (p, q) 型算子的定义, 第二式是 Chebyshev 不等式. 最后的式子在 $n \rightarrow \infty$ 时是趋零的, 故

$$\mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 0\}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu\left(\left\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}\right) = 0.$$

于是 $\lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x)$ a.e., 进而 $f \in \{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$, 亦即 $\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 中的闭集. $\square$

注 算子族的点态收敛性定理 3.2 指出要研究算子族 $\{T_t\}_t$ 的点态收敛性, 只需研究 T^* 的弱型不等式即可. 该定理同时引出了下述定义:

定义 3.5 (算子族的极大算子)

若 $\{T_t\}_t$ 是一族线性算子, 则称算子 $T^* : f \mapsto \sup_t |T_tf|$ 为算子族 $\{T_t\}_t$ 的极大算子.



另外, 在上述定理的证明中如果定义线性算子 $T : f \mapsto \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon(f)$, 将 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 改为依 L^p 范数收敛到 $T(f)$ 的函数列, 则可逐字逐句地重复上述证明得到下述定理:

定理 3.3 (算子族的点态收敛性)

设 $0 < p < \infty, 0 < q < \infty$, $\{T_\varepsilon\}_\varepsilon$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, T^* 是 $\{T_\varepsilon\}_\varepsilon$ 的极大算子, D 是 $L^p(X, \mu)$ 的稠密子空间. 若 T^* 是弱 (p, q) 型算子, 且对全体 $f \in D$ 而言

$$T(f) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon(f) \quad (3.4)$$

存在且 μ a.e. 有限, 则对任意 $f \in L^p(X, \mu)$ 而言, 极限(3.4)均存在且 a.e. 有限, 且依照极限(3.4)定义的 $L^p(X, \mu)$ 上的线性算子 T 依旧是弱 (p, q) 型算子.

更一般地, 用证明定理3.2的同样技巧可以证明集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \text{ a.e. 存在}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭, 亦即下述命题:

命题 3.1

设 $\{T_t\}_t$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, T^* 是其对应的极大算子. 若 T^* 是弱 (p, q) 型算子, 则集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \text{ a.e. 存在}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭.

证明 设 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是依 L^p 范数收敛到 f 的函数列, 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 而言 $\lim_{t \rightarrow t_0} T_t f_n(x)$ 均 a.e. 存在, 往证 $\lim_{t \rightarrow t_0} T_t f(x)$ a.e. 存在.

$$\begin{aligned} & \mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) > \lambda\}) \\ & \leq \mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_t(f - f_n)(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t(f - f_n)(x) > \lambda\}) \\ & \leq \mu(\{x \in X : 2T^*(f - f_n)(x) > \lambda\}) \leq C \left(\frac{\|f - f_n\|_{L^p(X, \mu)}}{\lambda} \right)^q, \end{aligned}$$

最后的式子在 $n \rightarrow \infty$ 时趋零, 故 $\mu(\{x \in X : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) > \lambda\}) = 0$, 因而 $f \in \{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \text{ a.e. 存在}\}$, 命题得证. $\square$

回到上一节的主题, 恒等逼近定理已经解决了恒等逼近算子 $T_t : f \rightarrow \phi_t * f$ ($\{\phi_t\}_{t>0}$ 是恒等逼近族) 在 L^p 意义下是否收敛到 f 的问题. 现在希望知道恒等逼近算子族 $\{T_t\}_{t>0}$ 什么时候几乎处处 (或点态) 意义下收敛到 f , 根据算子族的点态收敛定理3.2, 此即讨论极大算子 $f \rightarrow \sup_{t>0} |\phi_t * f|$ 什么时候成为弱 (p, q) 型算子. 这件事的解决需要引入下一节介绍的插值定理.

3.3 Marcinkiewicz 插值定理

本节设 (X, μ) 是测度空间.

定义 3.6 (分布函数)

若 $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ 是可测函数, 则 f 关于 μ 的分布函数 $d_f : (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ 定义为

$$d_f(\lambda) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}).$$

首先需要注意 $d_f(t)$ 是关于 t 的递增函数, 这是因为若 $t_1 < t_2$, 根据 $d_f(s)$ 的定义注意到

$$\begin{aligned} s_1 > s_2 & \Rightarrow (|f(x)| > s_1 \Rightarrow |f(x)| > s_2) \\ & \Rightarrow (\mu(\{x \in X : |f(x)| > s_1\}) \geq \mu(\{x \in X : |f(x)| > s_2\})) \\ & \Rightarrow d_f(s_1) > d_f(s_2). \end{aligned}$$

此即欲证. [LG1] 中另外列举了分布函数的一些性质, 它们的证明或许有助于提前习惯分布函数的语言:

命题 3.2 (分布函数的性质)

若 f, g, f_n 均为 (X, μ) 上的可测函数, 则对任意 $\alpha, \beta > 0$ 有:

- (i) 若 $|g(x)| \leq |f(x)|$ 是 μ 几乎处处成立的, 则对任意 $\lambda > 0$ 有 $d_g(\lambda) \leq d_f(\lambda)$;
- (ii) 对任意 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 有 $d_{cf}(\alpha) = d_f(\frac{\alpha}{|c|})$;
- (iii) $d_{f+g}(\alpha + \beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$;
- (iv) $d_{fg}(\alpha\beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$;
- (v) d_f 在 $[0, \infty)$ 上右连续;
- (vi) 若 $|f| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n|$ 是 μ 几乎处处成立的, 则 $d_f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} d_{f_n}$;
- (vii) 若 $|f_n| \uparrow |f|$, 则 $d_{f_n} \uparrow d_f$.

证明 (i) 当 $|g(x)| \leq |f(x)|$ 是 μ -a.e. 的, 则对任意 $\lambda > 0$ 均有 $|g(x)| > \lambda \Rightarrow |f(x)| > \lambda$, 于是

$$\{x \in X : |g(x)| > \lambda\} \subset \{x \in X : |f(x)| > \lambda\} \Rightarrow d_g(\lambda) \leq d_f(\lambda).$$

(ii) 知

$$d_{cf}(\alpha) = \mu(\{x \in X : |cf(x)| > \alpha\}) = \mu\left(\left\{x \in X : |f(x)| > \frac{\alpha}{|c|}\right\}\right) = d_f\left(\frac{\alpha}{|c|}\right).$$

(iii) 注意到 $|f(x) + g(x)| > \alpha + \beta$ 必能导出 $|f(x)| > \alpha$ 或 $|g(x)| > \beta$, 否则若 $|f(x)| \leq \alpha$ 且 $|g(x)| \leq \beta$, 将有

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \alpha + \beta,$$

矛盾! 故

$$\{x \in X : |f(x) + g(x)| > \alpha + \beta\} \subset \{x \in X : |f(x)| > \alpha\} \cup \{x \in X : |g(x)| > \beta\} \Rightarrow d_{f+g}(\alpha + \beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta).$$

(iv) 注意到 $|f(x)g(x)| > \alpha\beta$ 必能导出 $|f(x)| > \alpha$ 或 $|g(x)| > \beta$, 否则若 $|f(x)| \leq \alpha$ 且 $|g(x)| \leq \beta$, 将有

$$|f(x)g(x)| \leq \alpha\beta,$$

矛盾! 故

$$\{x \in X : |f(x)g(x)| > \alpha\beta\} \subset \{x \in X : |f(x)| > \alpha\} \cup \{x \in X : |g(x)| > \beta\} \Rightarrow d_{fg}(\alpha\beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta).$$

(v) 设 $t_n \downarrow 0$, 根据 $d_f(t)$ 的单增性往证对任意 $\alpha_0 > 0$ 均有 $d_f(\alpha_0 + t_n) \uparrow d_f(\alpha_0)$. 根据定义知

$$\begin{aligned} d_f(\alpha_0) - d_f(\alpha_0 + t_n) &= \mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha_0\}) - \mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha_0 + t_n\}) \\ &\leq \mu(\{x \in X : \alpha_0 < |f(x)| \leq \alpha_0 + t_n\}). \end{aligned}$$

因为 $\mu(\{x \in X : \alpha_0 < |f(x)| \leq \alpha_0 + t_n\})$ 随 t_n 递降而递降, 故根据单调收敛定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : \alpha_0 < |f(x)| \leq \alpha_0 + t_n\}) = \mu(\{x \in X : \alpha_0 < |f(x)| \leq \alpha_0\}) = 0,$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_f(\alpha_0) - d_f(\alpha_0 + t_n) = 0$, 此即欲证.

(vi) 任取 $\lambda > 0$, 欲证即

$$\mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x)| > \lambda\}).$$

因为 $|f| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n|$ 是 μ 几乎处处成立的, 故这正是 Fatou 引理.

(vii) 当 $|f_n| \uparrow |f|$, 任取 $\lambda > 0$ 知

$$\begin{aligned} d_f(\lambda) &= \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}) \\ &\leq \mu(\{x \in X : |f(x) - f_n(x)| > 0\}) + \mu(\{x \in X : |f_n(x)| > \lambda\}), \end{aligned}$$

于是

$$d_f(\lambda) - d_{f_n}(\lambda) \leq \mu(\{x \in X : |f(x) - f_n(x)| > 0\}),$$

根据 $|f_n| \uparrow |f|$ 知 $\mu(\{x \in X : |f(x) - f_n(x)| > 0\}) \rightarrow 0$, 命题即证. $\square$

本章末会补充建立在分布函数与弱型不等式之上的 $L^{p,q}$ 空间理论, 它可以视作 L^p 空间的推广. 利用分布函

数可以导出下述重要命题, 它是 $L^{p,q}$ 空间与 L^p 空间之间的一条重要纽带.

命题 3.3 (期望公式)

^a 设 (X, μ) 是 σ 有限测度空间, $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 可微, 递增, 且 $\phi(0) = 0$, 则

$$\int_X \phi(|f(x)|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

^{a''} “期望公式” 其名是自行加上的, 这个名称的来源于概率论中该公式可导出一个重要的计算期望的式子.

证明 知

$$\begin{aligned} \int_X \phi(|f(x)|) d\mu &= \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu \stackrel{(A)}{=} \int_0^\infty \int_{|f(x)| > \lambda} \phi'(\lambda) d\mu d\lambda \\ &= \int_0^\infty \phi'(\lambda) \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}) d\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 Fubini 定理, 它需要 (X, μ) 的 σ 有限性才能成立. □

特别令 $\phi(\lambda) = \lambda^p$ 可得 L^p 范数的等价计算式:

$$\|f\|_{L^p}^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda. \quad (3.5)$$

因为弱型不等式研究的是分布函数的大小, 所以可以看到等价计算式(3.5)在下面的插值定理中有很好的应用: 它能从弱型不等式中导出 L^p 意义下的有界性. 下面的 Marcinkiewicz 插值定理本身是应用在比线性算子更广的一类算子上的 (注意极大算子本身不是线性算子), 即次线性算子:

定义 3.7 (次线性算子)

称从可测函数空间到可测函数空间的算子 T 是次线性算子, 如果对任意可测函数 f_0, f_1 均有:

$$\begin{cases} |T(f_0 + f_1)(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|, \\ |T(\lambda f)| = |\lambda| |Tf|, \lambda \in \mathbb{C}. \end{cases}$$

定理 3.4 (Marcinkiewicz 插值定理)

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是测度空间, $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$, 并设 T 是从 $L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$ 到 Y 上可测函数空间的次线性算子, 且 T 同时是弱 (p_0, p_0) 型算子与弱 (p_1, p_1) 型算子. 那么只要 $p_0 < p < p_1$, T 就是强 (p, p) 型算子. ♡

证明 给定 $f \in L^p(X, \mu)$, 任取 $\lambda > 0$, 把 f 分解成 $f_0 + f_1$:

$$f_0 = f \chi_{\{x \in X : |f(x)| > c\lambda\}},$$

$$f_1 = f \chi_{\{x \in X : |f(x)| \leq c\lambda\}},$$

其中常数 c 是一个待定系数. 根据插值定理 1.14 知 $f_0 \in L^{p_0}(X, \mu), f_1 \in L^{p_1}(X, \mu)$, 进一步根据 T 的次线性性有

$$|Tf(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|,$$

于是由分布函数的性质 3.2(iii) 知

$$d_{Tf}(\lambda) \leq d_{Tf_0}\left(\frac{\lambda}{c}\right) + d_{Tf_1}\left(\frac{\lambda}{c}\right).$$

下面开始分类讨论.

设 $p_1 = \infty$, 取 $c = \frac{1}{2A_1}$, 其中 A_1 满足 $\|Tg\|_{L^\infty(Y, \nu)} \leq A_1 \|g\|_{L^\infty(X, \mu)}$, 于是

$$\|Tf_1\|_{L^\infty(Y, \nu)} \leq A_1 \|f_1\|_{L^\infty(X, \mu)} \leq A_1 c \lambda = \frac{\lambda}{2}$$

进而 $d_{Tf_1}(\frac{\lambda}{2}) = 0$. 根据 T 的弱 (p_0, p_0) 型不等式有:

$$d_{Tf_0}\left(\frac{\lambda}{2}\right) \leq \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, \mu)}\right)^{p_0};$$

于是

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^p(X, \mu)}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{Tf}(\lambda) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(d_{Tf_0}\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_{Tf_1}\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right) d\lambda \\ &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{Tf_0}\left(\frac{\lambda}{2}\right) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, \mu)} \right)^{p_0} d\lambda \\ &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} (2A_0)^{p_0} \int_X |f_0(x)|^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= p(2A_0)^{p_0} \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} \int_{\{x \in X: |f(x)| > c\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= p(2A_0)^{p_0} \int_X |f(x)|^{p_0} \int_0^{\frac{|f(x)|}{c}} \lambda^{p-1-p_0} d\lambda d\mu \\ &= \frac{p(2A_0)^{p_0}}{p-p_0} (2A_1)^{p-p_0} \int_X |f(x)|^p d\mu = \frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} (2A_1)^{p-p_0} \|f\|_{L^p(X, \mu)}^p. \end{aligned}$$

现设 $p_1 < \infty$, 根据弱 (p_0, p_0) 型不等式与弱 (p_1, p_1) 型不等式有:

$$\begin{aligned} d_{Tf_0}\left(\frac{\lambda}{2}\right) &\leq \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, \mu)}\right)^{p_0}, \\ d_{Tf_1}\left(\frac{\lambda}{2}\right) &\leq \left(\frac{2A_1}{\lambda} \|f_1\|_{L^{p_1}(X, \mu)}\right)^{p_1}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^p(X, \mu)}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{Tf}(\lambda) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(d_{Tf_0}\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_{Tf_1}\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right) d\lambda \\ &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, \mu)} \right)^{p_0} d\lambda + p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\frac{2A_1}{\lambda} \|f_1\|_{L^{p_1}(X, \mu)} \right)^{p_1} d\lambda \\ &\leq p(2A_0)^{p_0} \int_X |f(x)|^{p_0} \int_0^{\frac{|f(x)|}{c}} \lambda^{p-1-p_0} d\lambda d\mu + p(2A_1)^{p_1} \int_X |f(x)|^{p_1} \int_{\frac{|f(x)|}{c}}^\infty \lambda^{p-1-p_1} d\lambda d\mu \quad (3.6) \\ &\leq p \left(\frac{(2A_0)^{p_0}}{(p-p_0)c^{p-p_0}} + \frac{(2A_1)^{p_1}}{(p_1-p)c^{p-p_1}} \right) \int_X |f(x)|^p d\lambda \\ &= \left(\frac{p2^{p_0}}{p-p_0} \frac{A_0^{p_0}}{c^{p-p_0}} + \frac{p2^{p_1}}{p_1-p} \frac{A_1^{p_1}}{c^{p-p_1}} \right) \|f\|_{L^p(X, \mu)}^p. \end{aligned}$$

综上即得命题. $\square$

根据(3.6)式, Marcinkiewicz 插值定理3.4中提到的强 (p, p) 型不等式可以进一步写成:

$$\|Tf\|_{L^p(X, \mu)} \leq 2p^{\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{\frac{1}{p}} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{L^p(X, \mu)}, \quad (3.7)$$

其中

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_0}, \quad 0 < \theta < 1.$$

当 $p_1 = \infty$ 时这就是上面证明中取用 $c = \frac{1}{2A_1}$ 得到的结果, 而当 $p_1 < \infty$ 时取 c 使得 $(2A_0c)^{p_0} = (2A_1c)^{p_1}$ 即可得到该结果.

注 至此调和分析中的两大重要插值定理: Riesz-Thorin 插值定理2.24与 Marcinkiewicz 插值定理3.4就都介绍完毕了. 回忆 Riesz-Thorin 插值定理是强 (p, p) 型算子的插值, Marcinkiewicz 插值定理是将弱 (p, p) 型提升为强 (p, p) 型的插值. 结合这两个插值定理还能说明: 若 Marcinkiewicz 插值定理3.4的条件中有一个端点对应的是强型不等式, 那么当指标趋向该端点时, 插值所得的算子范数并不会爆破.

推论 3.1

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $1 < p < r \leq \infty$, T 是从空间 $L^{p_0}(X) + L^{p_1}(X)$ ($0 < p_0 < p_1 \leq \infty$) 到 Y 上可测函数空间的线性算子. 设 T 在作为 $L^1(X) \rightarrow L^{1,\infty}(Y)$ 的算子时算子函数为 A_0 , 作为 $L^r(X) \rightarrow L^r(Y)$ 的算子时算子范数为 A_1 , 则 T 也可作为 $L^p(X) \rightarrow L^p(Y)$ 的算子, 且

$$\|T\|_{L^p(X) \rightarrow L^p(Y)} \leq 8(p-1)^{-\frac{1}{p}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{r}}}.$$



证明 因为 T 已经可以作为 $L^1(X) \rightarrow L^{1,\infty}(Y)$ 和 $L^r(X) \rightarrow L^r(Y)$ 的算子了, 故可将其视为从 $L^1(X) + L^r(X)$ 到 Y 上可测函数空间的线性算子. 因为强 (p, p) 型算子一定是弱 (p, p) 型算子, 故 T 同时是弱 $(1, 1)$ 型算子与弱 (r, r) 型算子, 由 Marcinkiewicz 插值定理与 $1 < \frac{1+p}{2} < p < r$ 知

$$\begin{aligned} \|T\|_{L^{\frac{1+p}{2}}(X) \rightarrow L^{\frac{1+p}{2}}(Y)} &\leq 2 \left(\frac{1+p}{2} \right)^{\frac{2}{1+p}} \left(\frac{2}{p-1} + \frac{2}{r-(p+1)} \right)^{\frac{2}{1+p}} A_0^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{1-\frac{2}{1+p}}{1-\frac{1}{r}}} \\ &= 2 \left(\frac{p+1}{p-1} + \frac{p+1}{r-(p+1)} \right)^{\frac{2}{1+p}} A_0^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{1-\frac{2}{1+p}}{1-\frac{1}{r}}}. \end{aligned}$$

再由 Riesz-Thorin 插值定理与 $\frac{1+p}{2} < p < r$ 知

$$\begin{aligned} \|T\|_{L^p(X) \rightarrow L^p(Y)} &\leq \left(2 \left(\frac{p+1}{p-1} + \frac{p+1}{r-(p+1)} \right)^{\frac{2}{1+p}} A_0^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{1-\frac{2}{1+p}}{1-\frac{1}{r}}} \right)^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{\frac{1}{p+1}-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r}}} \\ &= \left(2 \left(\frac{\frac{p+1}{2}}{\frac{p+1}{2}-1} + \frac{\frac{p+1}{2}}{r-\frac{p+1}{2}} \right)^{\frac{2}{p+1}} \right)^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{\frac{1}{p+1}-\frac{1}{r}}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{(1-\frac{2}{p+1})(\frac{1}{p}-\frac{1}{r})}{(1-\frac{1}{r})(\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r})} + \frac{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r}}}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

因为

$$\frac{(1-\frac{2}{p+1})(\frac{1}{p}-\frac{1}{r})}{(1-\frac{1}{r})(\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r})} + \frac{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r}} = \frac{-\frac{1}{r}-\frac{2}{p+1}\frac{1}{p}+\frac{2}{p+1}+\frac{1}{r}\frac{1}{p}}{(1-\frac{1}{r})(\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r})} = \frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{r}}, \quad (3.9)$$

同时

$$\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{r}} \leq \frac{\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}} = \frac{p+1}{2p}, \quad (3.10)$$

又因为 $\frac{p+1}{2} < \frac{r+1}{2}$, 故 $r - \frac{p+1}{2} > \frac{p+1}{2} - 1$, 因而

$$\frac{\frac{p+1}{2}}{r-\frac{p+1}{2}} < \frac{\frac{p+1}{2}}{\frac{p+1}{2}-1}. \quad (3.11)$$

将(3.9)-(3.11)式代入(3.8)式可得

$$\|T\|_{L^p(X) \rightarrow L^p(Y)} \leq 2^{1+\frac{1}{p}} \left(\frac{p+1}{p-1} \right)^{\frac{1}{p}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{r}}}.$$

最后由 $(p+1)^{\frac{1}{p}} < 2$ ($p > 1$) 即得

$$\|T\|_{L^p(X) \rightarrow L^p(Y)} \leq 8(p-1)^{-\frac{1}{p}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{r}}{1-\frac{1}{r}}} A_1^{\frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{r}}}.$$

□

3.4 Hardy-Littlewood 极大函数

回忆先前的主题, 我们的任务是讨论算子 $T: f \mapsto \sup_{t>0} |\phi_t * f|$ 什么时候成为弱 (p, q) 型算子. 设 $B_r = B(0, r)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中球心在原点, 半径为 r 的球, 若取 $\phi(x) = \frac{1}{|B_1|} \chi_{B_1}(x)$, 并依照定义 3.1 诱导恒等逼近族 $\phi_t(x) =$

$\frac{1}{t^n} \phi(\frac{x}{t}) = \frac{1}{|B_t|} \chi_{B_t}(x)$, 则对于非负函数 f 而言知算子 T 此时为:

$$Tf(x) = \sup_{t>0} \left| \frac{1}{|B_t|} \chi_{B_t} * f \right|(x) = \sup_{t>0} \frac{1}{|B_t|} \int_{B_t} |f(x-y)| dy.$$

这便引入了下述 Hardy-Littlewood 极大函数的定义:

定义 3.8 (Hardy-Littlewood 极大函数)

设 $B_r = B(0, r)$ 表示欧氏空间中球心在原点, 半径为 r 的球. $\mathbb{R}^n$ 上局部可积函数 f 的 Hardy-Littlewood 极大函数定义为:

$$M(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy. \quad (3.12)$$

注意上述定义中 $M(f)(x)$ 取值可以为 $+\infty$. 有时也会用方体而非球去定义极大函数: 设 Q_r 是方体 $[-r, r]^n$, 定义

$$M'(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q_r} |f(x-y)| dy. \quad (3.13)$$

当 $n=1$, 知 M 与 M' 完全相等. 若 $n>1$, 则存在仅依赖于 n 的常数 c_n 与 C_n 满足

$$c_n M'(f)(x) \leq M(f)(x) \leq C_n M'(f)(x). \quad (3.14)$$

这是因为对球 B_r , 总存在方体 $[-r, r]^n$ 与方体 $[-c_n r, c_n r]^n$ 使得

$$[-c_n r, c_n r]^n \subset B_r \subset [-r, r]^n,$$

于是

$$\frac{1}{(2r)^n} \int_{[-c_n r, c_n r]^n} |f(x-y)| dy \leq M(f)(x) \leq \frac{1}{(2c_n r)^n} \int_{[-r, r]^n} |f(x-y)| dy.$$

此即(3.14)式. 根据该式, 算子 M, M' 本质上是一样的, 从而在实际应用中一般是哪个方便就用哪个. 也可以定义一个一般的极大函数

$$M''(f)(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy, \quad (3.15)$$

其中上确界在全体包含 x 的方体中取. 同样可以证明 M'' 与 M 在本质上是一样的. 有时为了区分 M' 和 M'' , 把前者叫做有心极大算子, 而把后者叫做无心极大算子. 无心极大算子也可以通过球来定义, 这里就省略了.

定理 3.5 (极大算子的弱 $(1, 1)$ 型不等式与强 (p, p) ($1 < p \leq \infty$) 型不等式)

算子 M 是弱 $(1, 1)$ 型算子与强 (p, p) ($1 < p \leq \infty$) 型算子.

根据不等式(3.14)可知这个结论对 M' 和 M'' 也是成立的.

根据极大算子的定义知

$$\|M(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}, \quad (3.16)$$

这说明 M 是弱 (∞, ∞) 型算子, 于是根据 Marcinkiewicz 插值定理, 要证明定理3.5, 只需证明 M 是弱 $(1, 1)$ 型算子. 这里我们先证明 $n=1$ 的情况, 一般情况之后再去证明. 一维情况的证明需要下述覆盖引理:

引理 3.1

设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的区间族, K 是 $\bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha$ 中的紧集, 则存在有限子族 $\{I_j\}$ 使得

$$K \subset \bigcup_j I_j, \text{ 且 } \sum_j \chi_{I_j}(x) \leq 2 (x \in \mathbb{R}).$$

证明 因为紧集意味着其任意开覆盖都有有限子覆盖, 于是由 $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha$ 与 K 的紧性知存在有限子族 $\{I_j\}_{j=1}^N$ 使得 $K \subset \bigcup_{j=1}^N I_j$. 考虑到此时维数为 1, 故若存在 $j_1 \neq j_2 \neq j_3$ 满足存在 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $\chi_{I_{j_1}}(x) + \chi_{I_{j_2}}(x) + \chi_{I_{j_3}}(x) = 3$, 则 $I_{j_1}, I_{j_2}, I_{j_3}$ 中必有其一在两者之并中, 不妨设 $I_{j_3} \subset I_{j_1} \cup I_{j_2}$. 现在在 $\{I_j\}_{j=1}^N$ 中剔除所有满足上述性质的

I_{j3} , 得到的新子族即为欲求. □

下面证明定理3.5.

证明 当 $n = 1$, 任取 $\lambda > 0$, 设 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M(f)(x) > \lambda\}$. 若 $|E_\lambda| = \infty$, 则必有 $|E_\alpha| = \infty (\forall \alpha \in (0, \lambda])$, 于是

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_0^\infty d_f(\alpha) d\alpha \geq \int_0^\lambda d_f(\alpha) d\alpha = \infty,$$

于是 $f \notin L^1(\mathbb{R})$, 这与弱 $(1, 1)$ 型算子的定义域本身是不符合的, 于是只能有 $\forall \lambda > 0 (|E_\lambda| < \infty)$. 此时若 $x \in E_\lambda$, 根据极大算子的定义知存在以 x 为中心的区间 I_x 使得

$$\frac{1}{|I_x|} \int_{I_x} |f(y)| dy > \lambda. \quad (3.17)$$

现设 $K \subset E_\lambda$ 是紧集, 则必有 $K \subset \bigcup_{x \in E_\lambda} I_x$, 根据引理3.1知存在子族 $\{I_j\}$ 使得 $K \subset \bigcup_j I_j$, 且 $\sum_j \chi_{I_j} \leq 2$, 因此

$$|K| \leq \sum_j |I_j| \leq \sum_j \frac{1}{\lambda} \int_{I_j} |f(y)| dy \stackrel{(A)}{\leq} \frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} \sum_j \chi_{I_j}(y) |f(y)| dy \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})},$$

其中 (A) 是代入了 (3.17) 式. 注意上述不等式对全体紧集 $K \subset E_\lambda$ 均成立, 而既然 $|E_\lambda| < \infty$, 知对任意 $\varepsilon > 0$ 存在紧集 $K_\varepsilon \subset E_\lambda$ 使得 $|E_\lambda| < |K_\varepsilon| + \varepsilon$, 于是

$$|E_\lambda| \leq |K| + \varepsilon \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} + \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

亦即 $|E_\lambda| = \mu(\{x \in \mathbb{R} : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$, 故 M 的弱 $(1, 1)$ 型不等式成立. 进一步因为已知 M 是弱 (∞, ∞) 型算子, 故根据 Marcinkiewicz 插值定理3.4知 M 是强 $(p, p) (1 < p < \infty)$ 型算子. □

注

- (i) 引理3.1在维数大于 1 时其实是不成立的. 实际上对任意固定的 $p \in (1, \infty)$, 极大算子 M 的 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 在 $n \rightarrow \infty$ 均趋无穷¹.
- (ii) 极大函数 $M(f)$ 关于 f 存在下界估计: 若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则取 f 在球 $B(x, |x| + R) \supset B(0, R)$ 上的积分平均知

$$M(f)(x) \geq \frac{1}{|B(x, |x| + R)|} \int_{B(x, |x| + R)} |f(x - y)| dy \geq \frac{\int_{B(0, R)} |f(y)| dy}{\nu_n(|x| + R)^n}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad (3.18)$$

其中 ν_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球体积. 根据 (3.18) 式可知: 只要在一个正测集上有 $f \neq 0$, 则 $M(f) \notin L^1(\mathbb{R}^n)$. 也就是说, 如果 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $f = 0$ a.e. 这是因为对 (3.18) 式两边关于 x 在 $\mathbb{R}^n$ 上积分可得

$$\|M(f)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \geq \int_{B(0, R)} |f(y)| dy \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{\nu_n(|x| + R)^n} < \infty,$$

但 $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{\nu_n(|x| + R)^n} = \infty$, 这便只能有 $\int_{B(0, R)} |f(y)| dy = 0$. 注意上式对任意 $R > 0$ 均成立, 故 $f = 0$ a.e..

另外, 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $M(f)(x_0) = 0$, 则 $f = 0$ a.e. 这是因为在 (3.18) 式中取 $x = x_0$ 知 $\int_{B(0, R)} |f(y)| dy = 0$, 而该式对任意 $R > 0$ 均成立, 故 $f = 0$ a.e..

为了进一步讨论恒等逼近算子族的点态收敛性质, 需要给出下述命题:

命题 3.4 (正递减可积径向函数生成的恒等逼近族性质)

设 ϕ 是定义在 $(0, \infty)$ 上的正递减可积径向函数, 则对任意 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\sup_{t>0} |(\phi_t * f)(x)| \leq \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} M(f)(x).$$

证明 若另设 ϕ 是简单函数, 亦即设

$$\phi(x) = \sum_j a_j \chi_{B_{r_j}}(x),$$

¹ 有时间则补充 [LG1]Ex 2.1.8.

其中 $a_j > 0$, 则

$$\begin{aligned}(\phi * f)(x) &= \sum_j a_j |B_{r_j}| \frac{1}{|B_{r_j}|} (\chi_{B_{r_j}} * f)(x) \\&= \sum_j a_j |B_{r_j}| \cdot \frac{1}{|B_{r_j}|} \int_{B_{r_j}} f(x-y) dy \\&\stackrel{(A)}{\leq} \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})} \cdot M(f)(x),\end{aligned}$$

其中 $\|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})} = \sum_j a_j |B_{r_j}|$, (A) 是指标为 $(1, \infty)$ 的离散 Hölder 不等式.

现在对任意函数 ϕ , 根据命题条件知它总被一系列渐升简单函数列逼近, 而其经尺度变换后的函数 ϕ_t 同样是正递减可积径向函数, 且 $\|\phi_t\|_{L^1(\mathbb{R})} = \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})}$, 于是总有

$$|(\phi_t * f)(x)| = (\phi_t * f)(x) \leq \|\phi_t\|_{L^1(\mathbb{R})} M(f)(x) = \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})} M(f)(x),$$

对左式关于 t 取上确界即得

$$\sup_{t>0} |(\phi_t * f)(x)| \leq \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R})} M(f)(x).$$

□

结合极大算子有界性 3.5 与正递减可积径向函数的性质 3.4 的结果可得下述推论:

推论 3.2

若 $|\phi(x)| \leq \psi(x)$ a.e., 其中 ψ 是正递减可积径向函数, 设 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 是 ϕ 诱导的恒等逼近族, 则

$$\sup_{t>0} |(\phi_t * f)(x)| \leq \|\psi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} M(f)(x),$$

另外极大函数 $\sup_{t>0} |(\phi_t * f)(x)|$ 是弱 $(1, 1)$ 型与强 (p, p) ($1 < p \leq \infty$) 型算子^a.

^a亦即算子 $\sup_{t>0} |(\phi_t * (\cdot))|$ 是弱 $(1, 1)$ 型和强 (p, p) 型算子.

♡

证明 显见

$$|(\phi_t * f)(x)| \leq \|\phi_t\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

故

$$\|\sup_{t>0} |\phi_t * f|\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

此即极大函数的弱 (∞, ∞) 型不等式, 下面证明极大函数的弱 $(1, 1)$ 型不等式. 根据正递减可积径向函数的性质 3.4 可知

$$\sup_{t>0} |(\phi_t * f)(x)| \leq \sup_{t>0} \{(\psi_t * |f|)(x)\} \leq \|\psi_t\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} M(f)(x).$$

又根据极大算子的有界性 3.5 知 $M(f)$ 是弱 $(1, 1)$ 型算子, 故 $f \mapsto \sup_{t>0} |\phi_t * f|$ 是弱 $(1, 1)$ 型算子. 最后根据 Marcinkiewicz 插值定理 3.4 知 $f \mapsto \sup_{t>0} |\phi_t * f|$ 是强 (p, p) ($1 < p < \infty$) 型算子, 命题即证. □

将上述推论与算子族的点态收敛定理 3.2 结合即得下述推论:

推论 3.3 (恒等逼近族微分定理)

在推论 3.2 的条件下, 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 或 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} (\phi_t * f)(x) = f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx, \text{ a.e..}$$

特别地, 第一章提过的求和法 (Cesaro, Abel-Poisson 和 Gauss-Weierstrass 求和法) 中, 只要 f 在上面给出的空间之一内, 那么这些求和法全都几乎处处收敛到 $f(x)$.

♡

证明 已经证明了 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 时这些求和法是几乎处处收敛的, 而 Poisson 核 (2.109) 与 Gauss-Weierstrass 核 (2.110) 本身是正递减可积径向函数生成的恒等逼近族, 同时 Fejér 核 (2.100) 由正递减可积径向函数 $\min(1, \frac{1}{(\pi x)^2})$ 控制, 于

是根据推论3.2知它们对应的极大函数均为弱 (p, p) ($1 \leq p \leq \infty$) 型算子, 再根据点态收敛定理3.2与 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 或 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性知, 几乎处处收敛性对 $f \in \overline{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} = L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 或 $f \in \overline{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} = C_0(\mathbb{R}^n)$ 也成立. $\square$

另根据恒等逼近定理的推广3.1, 完全仿照恒等逼近族微分定理3.3可得下述推论:

推论 3.4 (恒等逼近族微分定理的推广)

若 $\phi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\phi_t(x) = \frac{1}{t^n} \phi(\frac{x}{t})$ 满足

- (i) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = a \in \mathbb{C}$;
- (ii) 对任意 $\delta > 0$ 均有 $\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \phi_t(x) dx \rightarrow 0$;
- (iii) $|\phi(x)| \leq \psi(x)$ a.e., 其中 ψ 是正递减可积径向函数,

则对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 均有

$$\lim_{t \rightarrow 0} (f * \phi_t)(x) = af(x), \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$



3.5 二进极大函数

定义 3.9 (二进方体)

在 $\mathbb{R}^n$ 中取单位半开方体 $[0, 1)^n$, 并设 $\mathcal{Q}_0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中与 $[0, 1)^n$ 全等的方体族, 且其中每个方体的顶点都在格点集 $\mathbb{Z}^n$ 上. 把这个集族作因子为 2^{-k} 的尺度变换, 亦即取全体右侧开且顶点与格点集 $(2^{-k}\mathbb{Z})^n$ 重合的方体, 得到的方体族记作 $\mathcal{Q}_k$ ($k \in \mathbb{Z}$). 若方体在 $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{Q}_k$ 中, 则称其为二进方体.




图 3.1: 二进方体示意图

根据这个构造可以立即得到下述性质:

命题 3.5 (二进方体的性质)

- (i) 给定 $x \in \mathbb{R}^n$, 在每个族 $\mathcal{Q}_k$ 中总有唯一的方体包含 x ;
- (ii) 对任意两个二进方体, 要么它们不交, 要么一个完全被另一个包含;
- (iii) 对于 $\mathcal{Q}_k$ 中的二进方体, 在每个族 $\mathcal{Q}_j$ ($j < k$) 中都能找到唯一的方体包含它, 同时它包含 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的 2^n 个二进方体.



定义 3.10 (二进恒等逼近族, 二进极大函数)

给定函数 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$E_k f(x) = \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f(y) dy \right) \chi_Q(x),$$

称 $E_k f$ 为 f 对应的二进恒等逼近族. 另定义

$$M_d f(x) = \sup_{k \in \mathbb{Z}} |E_k f(x)|, \quad (3.19)$$

称 $M_d f$ 为 f 对应的二进极大函数.




图 3.2: $E_k f(x)$ 示意图

$E_k f$ 是 f 关于 $\mathcal{Q}_k$ 生成的 σ 代数的条件期望, 它满足下述基本性质:

命题 3.6

若 Ω 是 $\mathcal{Q}_k$ 中一些方体的并, 那么

$$\int_{\Omega} E_k f(x) dx = \int_{\Omega} f(x) dx.$$



证明 知

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} E_k f(x) dx &= \int_{\Omega} \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f(x) dx \right) \chi_Q(x) dx \\ &= \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f(x) dx \right) \int_{\Omega} \chi_Q(x) dx \\ &= \sum_{\substack{Q \in \mathcal{Q}_k \\ Q \cap \Omega \neq \emptyset}} \int_Q f(x) dx = \int_{\Omega} f(x) dx. \end{aligned}$$

□

下面的定理说明了二进恒等逼近族有类似于恒等逼近族的性质:

定理 3.6 (二进极大函数的弱 (1, 1) 型不等式与二进恒等逼近族的逼近性质)

- (i) 二进极大函数 $M_d f$ 是弱 (1, 1) 型函数;
- (ii) 若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) = f(x)$ a.e..



证明 (i) 固定 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 往证存在 $C > 0$ 使得

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \quad (3.20)$$

不妨设 f 非负, 这是因为若 f 是实值函数, 则它可以被分成正负部来分别讨论, 而若 f 是复值函数, 则分别讨论它的实部和虚部.

现设

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_k \Omega_k,$$

其中

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \lambda \text{ 且 } \forall j < k (E_j(x) \leq \lambda)\}.$$

这是因为对任意 k , 只要存在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $E_k(x_0) > \lambda$, 且 $\forall j < k (E_j(x_0) \leq \lambda)$, 那么必有 $M_d f(x_0) = \sup_{k \in \mathbb{Z}} |E_k f(x_0)| > \lambda$, 故 $\forall k \in \mathbb{Z} (\Omega_k \subset \{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\})$. 另一方面, 只要 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 满足 $M_d f(x_0) = \sup_{k \in \mathbb{Z}} |E_k f(x_0)| > \lambda$, 根据上确界的定义与不等号的严格性就必能找到 $k_0 \in \mathbb{Z}$ 使得 $|E_{k_0} f(x_0)| = E_{k_0} f(x_0) > \lambda$. 对这个固定的点 x_0 , 当 $k \rightarrow -\infty$, 知

$$|E_k f(x)| \leq \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{|Q|} \chi_Q(x_0) \sim \frac{1}{|Q_k|} \rightarrow 0, \quad x_0 \in Q_k,$$

于是集合 $\{k \in \mathbb{Z} : E_k f(x_0) > \lambda\}$ 必有下确界, 设其下确界为 k_{x_0} , 即得 $x_0 \in \Omega_{k_{x_0}} \subset \bigcup_k \Omega_k$, (3.20) 式成立.

显见 Ω_k 彼此不交 (否则与 Ω_k 的定义矛盾), 且每个 Ω_k 都能被写成 $\mathcal{Q}_k$ 中二进方体的并, 这是因为对每个 k 而言, $E_k f(x)$ 本质上是基于 $\mathcal{Q}_k$ 的简单函数. 因而 Ω_k 作为指示 $E_k f(x)$ 大小的集合依旧由 $\mathcal{Q}_k$ 中的某些二进方体构成. 于是

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}| &= \sum_k |\Omega_k| \leq \sum_k \int_{\Omega_k} \frac{E_k f(x)}{\lambda} dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \frac{1}{\lambda} \sum_k \int_{\Omega_k} f(x) dx \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 (A) 应用了命题 3.6, 故 $M_d f(x)$ 是弱 (1, 1) 型函数.

(ii) 若 f 连续, 则要求的极限显然成立, 又因为 $M_d f(x)$ 本身是弱 (1, 1) 型函数, 故根据算子族的点态收敛定理 3.2 知

$$\{f \in L^1(\mathbb{R}^n) : \lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$$

在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中闭, 而 $\overline{C(\mathbb{R}^n)} = L^1(\mathbb{R}^n)$, 故要求的极限对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 也成立. 现若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $Q \in \mathcal{Q}_0$ 都有 $f \chi_Q \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 于是 (ii) 对几乎所有 $x \in Q$ 均成立, 因而对几乎所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 均成立. $\square$

上述证明用到的对 $\mathbb{R}^n$ 的分解是尤其有用的, 它称为 Calderón-Zygmund 分解, 下面我们进一步来介绍这个分解.

定理 3.7 (Calderón-Zygmund)

给定非负可积函数 f 与正数 λ , 必存在不交二进方体列 $\{Q_j\}$ 使得:

- (i) 对几乎所有 $x \notin \bigcup_j Q_j$ 有 $f(x) \leq \lambda$;
- (ii) $|\bigcup_j Q_j| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$;
- (iii) $\forall j (\lambda < \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(x) dx \leq 2^n \lambda)$.



证明 类似于二进极大函数的弱 (1, 1) 型不等式 3.6 的证明, 构造

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \lambda \text{ 且 } \forall j < k (E_j(x) \leq \lambda)\},$$

知 Ω_k 是 $\mathcal{Q}_k$ 中一些二进方体的不交并, 再把 $\bigcup_k \Omega_k$ 中包含的二进方体的全体记作集族 $\{Q_j\}$, 通过合理的选取方式可令 $\{Q_j\}$ 是不交二进方体列.

现在结论 (ii) 正是 (3.20) 式. 对结论 (i), 若 $x \notin \bigcup_j Q_j = \bigcup_k \Omega_k$, 则根据 Ω_k 的构造知 $\forall k \in \mathbb{Z} (E_k f(x) \leq \lambda)$, 于是由二进恒等逼近族的逼近性质 3.6(ii) 知 $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) \leq \lambda$ a.e. 最后对结论 (iii), 根据 Ω_k 的定义知 f 在 $Q_j \subset \Omega_k$ 上的积分平均 $\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(x) dx$ 总比 λ 大, 此即欲证式左端. 对右端, 设 $\widetilde{Q}_j$ 是包含 Q_j , 且边长是 Q_j 边长两倍的二进方体, 则

$$\frac{1}{|\widetilde{Q}_j|} \int_{\widetilde{Q}_j} f(x) dx = E_{k-1}(x) \leq \lambda, \quad x \in \widetilde{Q}_j,$$

进而

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(x) dx \leq \frac{|\widetilde{Q}_j|}{|Q_j|} \frac{1}{|\widetilde{Q}_j|} \int_{\widetilde{Q}_j} f(x) dx \leq 2^n \lambda.$$

□

注 [LG1] 中也介绍了 Calderón-Zygmund 分解, 不过定理形式略有不同, 它们的本质是一样的:

补充定理 3.2 (Calderón-Zygmund)

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\lambda > 0$, 则存在函数 $g, b \in \mathbb{R}^n$ 与不交二进方体列 $\{Q_j\}$ 使得:

- (i) $f(x) = g(x) + b(x)$;
- (ii) $\|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$, 且 $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq 2^n \lambda$;
- (iii) $b(x) = \sum_j b_j(x)$, 其中 $\text{supp } b_j \subset Q_j$;
- (iv) $\int_{Q_j} b_j(x) dx = 0$;
- (v) $\|b_j\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{n+1} \lambda |Q_j|$;
- (vi) $\sum_j |Q_j| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$.

♡

定理中的 g 称为分解中的好函数, 因为它可积且有界; b 称为坏函数, 因为它包含了 f 的奇异部分, 但这也不是随意选取的, 因为 (iv) 已经说明 b 的积分均值为零. 根据 (i), (ii), 坏函数 b 也是可积的, 且

$$\|b\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq 2\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

根据 (ii), 好函数 g 是有界可积的, 于是对任意 $1 \leq p \leq \infty$ 均有 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 进一步根据 L^p 范数的对数凸性 1.13 知

$$\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}} \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^{1-\frac{1}{p}} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}} (2^n \lambda)^{1-\frac{1}{p}} = 2^{\frac{n}{p'}} \lambda^{\frac{1}{p'}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}}.$$

上述定理中, 只要令

$$b_j(x) = \left(f(x) - \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(y) dy \right) \chi_{Q_j}(x),$$

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j, \\ \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(x) dx, & x \in Q_j, \end{cases}$$

即可套用定理 3.7 来证明.

3.6 极大函数的弱 (1, 1) 型不等式

下面运用二进极大函数的弱 (1, 1) 型不等式 3.6 来证明极大算子的弱 (1, 1) 型不等式与强 (p, p) 型不等式 3.5. 首先需要证明一个引理, 回忆 M' 是由 (3.13) 定义的在方体上的极大函数.

引理 3.2

若 f 是非负函数, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M'(f)(x) > 4^n \lambda\}| \leq 2^n |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

只要能证明这个引理, 那么根据前面提到的 M_d 的弱 (1, 1) 型不等式, 就有

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M'(f)(x) > \lambda\}| \leq 2^n |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > 4^{-n} \lambda\}| \leq 2^n \frac{1}{4^{-n} \lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},$$

于是 M' 是弱 (1, 1) 型算子, 进而根据 Marcinqiewicz 插值定理与极大函数的定义就能得到 M' 的强 (p, p) 型不等式. 下面来证明引理 3.2.

证明 类似于 Calderón-Zygmund 分解 3.7, 设

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_j Q_j.$$

设 $2Q_j$ 是与 Q_j 同心, 边长为其两倍的方体. 于是证明引理, 就是要证明

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'(f)(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

固定 $x \notin \bigcup_j 2Q_j$, 往证 $x \notin \{x \in \mathbb{R}^n : M'(f)(x) > 4^n \lambda\}$, 亦即 $M'(f)(x) \leq 4^n \lambda$. 设 Q 是任意以 x 为心的方体, 记 $l(Q)$ 为 Q 的边长, 知总可以选到 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $2^{k-1} \leq l(Q) < 2^k$. 设 Q 与 Q_k 中的 m 个二进方体交集非空, 并设 $m \leq 2^n$, 记这 m 个二进方体分别为 $R_1, R_2, \dots, R_m$. 注意这些 $R_i (i = 1, \dots, m)$ 均不可能出现在集族 $\{Q_j\}$ 中, 否则若 $R_{j_0} \in \{Q_j\}$, 则根据 R_{j_0} 的构造方式知 $Q \subset 2R_{j_0}$, 进而必有 $x \in 2R_{j_0} \subset \bigcup_j 2Q_j$, 矛盾. 根据 Q_j 的定义与 $x \notin Q_j$ 可知此时 $M_d f(x) \leq \lambda$, 进而 f 在每个 R_i 上的积分平均都至多为 λ , 故

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q f(x) dx = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^m \int_{Q \cap R_i} f(x) dx \stackrel{(A)}{\leq} \sum_{i=1}^m \frac{2^{kn}}{|Q|} \frac{1}{|R_i|} \int_{R_i} f(x) dx \leq 2^n m \lambda \leq 4^n \lambda,$$

其中 (A) 是因为对每个 R_i 而言都有 $|R_i| < 2^{kn}$, 引理至此得证. $\square$

至此即得极大函数的弱 (1, 1) 型不等式与强 (p, p) 型不等式:

定理 3.8 (极大函数的弱 (1, 1) 型不等式与强 (p, p) 型不等式)

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, $M(f)$ 为 f 的 Hardy-Littlewood 极大函数, 则算子 M 是弱 (1, 1) 型与强 $(p, p) (1 < p \leq \infty)$ 型算子.

注 [LG1] 中给出了无心极大函数 M'' 的一个确切的算子范数上界:

$$\|M''\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{p 3^{\frac{n}{p}}}{p-1}, \quad (3.21)$$

这里就不另外说明这个上界是如何得到的了.

现在根据 M 的弱 (1, 1) 型不等式 3.8 与算子族点态收敛定理 3.2 可以得到二进恒等逼近族收敛性 3.6(ii) 的连续形式:

推论 3.5 (Lebesgue 微分定理)

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \text{ a.e..}$$

证明 不妨设 f 是非负函数, 若 f 连续, 则欲证式显然成立. 根据 Hardy-Littlewood 极大函数的定义知

$$M(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy,$$

而 M 已经是弱 (1, 1) 型算子了, 故根据算子族的点态收敛定理 3.2 知

$$\left\{ f \in L^1(\mathbb{R}^n) : \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \text{ a.e..} \right\}$$

在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中闭, 而 $\overline{C(\mathbb{R}^n)} = L^1(\mathbb{R}^n)$, 故待证极限对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 成立. 现若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 B_r 均有 $f\chi_{B_r} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 于是

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x)$$

对几乎所有 $x \in B_r$ 均成立, 因而对几乎所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 均成立.

对一般的实值函数 f 而言, 根据算子族的点态收敛定理 3.2 知

$$\left\{ f \in L^1(\mathbb{R}^n) : \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy = |f(x)| \text{ a.e.} \right\}$$

在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中闭. 注意若对选定的 x , 存在正测集 Q 使得 $x \in Q$ 且 $f(x) < 0$, 则根据 Lebesgue 测度的定义知必存在 B_r 使得 $x - B_r \subset Q$, 于是对该选定的 x 有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy = |f(x)| \Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x),$$

因而亦有

$$\left\{ f \in L^1(\mathbb{R}^n) : \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \text{ a.e.} \right\}$$

在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中闭, 其余过程与非负情况类似. □

特别由此可知 $|f(x)| \leq M(f)(x)$ a.e., 根据 M 与 M', M'' 的等价性可知同样有 $|f(x)| \leq M'(f)(x)$ a.e., $|f(x)| \leq M''(f)(x)$ a.e.. Lebesgue 微分定理可以进一步优化为下述推论²:

推论 3.6

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy = 0 \text{ a.e.} \quad (3.22)$$



上面的这些讨论可以引出 Lebesgue 点的定义:

定义 3.11 (Lebesgue 点)

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 且 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得极限式 (3.22) 成立, 即

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x_0 - y) - f(y)| dy = 0,$$

则称 x_0 为 f 的 Lebesgue 点. ♣

Lebesgue 点具有下述平均性质:

命题 3.7 (Lebesgue 点的平均性质)

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, x 是 f 的 Lebesgue 点, 球套 $\{B_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 满足 $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ 且 $\bigcap_{j \in \mathbb{N}} B_j = \{x\}$ (注意这列球不一定以 x 为球心), 则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{|B_j|} \int_{B_j} f(x) dx = f(x).$$



证明 注意 $B_j \subset B(x, 2r_j)$, 其中 r_j 是 B_j 的半径, 代入 Lebesgue 点的定义即得命题. □

如果把球换成方体, Lebesgue 点的平均性质同样成立, 这里就不赘述了.

前面我们探讨的是极大函数 $M(f)$ 的弱 (1, 1) 型不等式, 事实上 $M(f)$ 的强 (1, 1) 型不等式并不成立, 这依赖于下述前面已经说明过的命题, 这里给出 [JD] 上的版本:

命题 3.8

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且不几乎处处为零, 那么 $M(f) \notin L^1(\mathbb{R}^n)$. ♠

²[JD] 上对应 pg.36 的证明我没跟上: 为什么从 $\frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy \leq Mf(x) + |f(x)|$ 能直接推出结论? 这里就先不写证明了.

证明 因为 f 不几乎处处为零, 故总存在 $R > 0$ 使得

$$\int_{B_R} |f(x)| dx \geq \varepsilon > 0.$$

现若 $|x| > R$, $B_R \subset B(x, 2|x|)$, 则

$$M(f)(x) \geq \frac{1}{2|x|^n} \int_{B_R} |f(x)| dx \geq \frac{\varepsilon}{2^n |x|^n} \geq \frac{\varepsilon}{2^n |x|^n},$$

而 $\frac{1}{|x|^n} \notin L^1(\mathbb{R}^n)$, 命题即证. □

但对 M 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中的情况成立下述控制:

定理 3.9

若 $B \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 则

$$\int_B M(f)(x) dx \leq 2|B| + C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx,$$

其中 $\log^+ t = \max(\log t, 0)$. ♡

证明 根据 L^p 范数的等价计算式 3.5 有

$$\begin{aligned} \int_B M(f)(x) dx &\leq 2 \int_0^\infty |\{x \in B : M(f)(x) > 2\lambda\}| d\lambda \\ &\leq 2 \int_0^1 |B| d\lambda + 2 \int_1^\infty |\{x \in B : M(f)(x) > 2\lambda\}| d\lambda \\ &= 2|B| + 2 \int_1^\infty |\{x \in B : M(f)(x) > 2\lambda\}| d\lambda. \end{aligned}$$

将 f 分解为 $f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f \chi_{\{|f(x)| > \lambda\}}$, $f_2 = f - f_1$, 则因为

$$M(f)(x) \leq M(f)_1(x) + M(f)_2(x) = M(f)_1(x) + \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f_2(x-y)| dy < M(f)_1(x) + \lambda,$$

可得

$$(M(f)(x) > 2\lambda \Rightarrow M(f)_1(x) > \lambda) \Rightarrow (\{x \in B : M(f)(x) > 2\lambda\} \subset \{x \in B : M(f)_1(x) > \lambda\}).$$

于是

$$\begin{aligned} \int_1^\infty |\{x \in B : M(f)(x) > 2\lambda\}| d\lambda &\leq \int_1^\infty |\{x \in B : M(f)_1(x) > \lambda\}| d\lambda \stackrel{(A)}{\leq} \int_1^\infty \frac{C}{\lambda} \int_{\{|f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx d\lambda \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \int_1^{\max\{|f(x)|, 1\}} \frac{d\lambda}{\lambda} dx = C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 M 的弱 $(1, 1)$ 型不等式. □

3.7 加权范数不等式

定理 3.10

若 w 是非负可测函数, $1 < p < \infty$, 则存在常数 C_p 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} M(f)(x)^p w(x) dx \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p M w(x) dx.$$

进一步有

$$\int_{\{x: M(f)(x) > \lambda\}} w(x) dx \leq \frac{C_1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| M w(x) dx. \quad (3.23)$$
♡

证明 如果把 $w(x)dx$ 看成新的测度, 则只要 $\|M(f)\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(w)}$ 与测度 $w(x)dx$ 下的弱 $(1, 1)$ 型不等式得证, 那么根据 Marcinkiewicz 插值定理即可得到强 (p, p) 型不等式. 如果存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $M w(x) = 0$, 则必有

$w(x) = 0$ a.e., 这是因为此时

$$Mw(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |w(x-y)| dy,$$

于是只能有 $\forall r > 0 (\int_{B_r} |w(x-y)| dy = 0)$, 即 $w(x) = 0$, a.e., 进而命题无所可证, 故可设 $\forall x \in \mathbb{R}^n (Mw(x) > 0)$. 若 $a > \|f\|_{L^\infty(Mw)}$ ³, 则此即

$$a > \int_{\{x: |f(x)| > a\}} Mw(x) dx = 0,$$

进而根据 $Mw(x) > 0$ 知 $|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > a\}| = 0$, 亦即 $|f(x)| \leq a$ a.e. 故 $M(f)(x) \leq a$ a.e., 进而 $\|M(f)\|_{L^\infty(w)} \leq a$. 这便证明了 $\|M(f)\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$.

要证明弱 (1,1) 型不等式, 可设 f 是非负函数, 且 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. (若 $f \in L^1(Mw)$, 则 $f_j = f\chi_{B(0,j)}$ 是点态递增到 f 的可积函数列.)⁴ 设 $\{Q_j\}$ 是 f 高度为 λ 的 Calderón-Zygmund 分解, 则类似于引理 3.2 的证明, 有

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'(f)(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j,$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\{x: M'(f)(x) > 4^n \lambda\}} w(x) dx &\leq \sum_j \int_{2Q_j} w(x) dx \\ &= \sum_j 2^n |Q_j| \frac{1}{|2Q_j|} \int_{2Q_j} w(x) dx \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) \left(\frac{1}{|2Q_j|} \int_{2Q_j} w(x) dx \right) dy \\ &\leq \frac{2^n C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) M''w(y) dy, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 Calderón-Zygmund 定理 3.7(iii). 又因为 $M''w(y) \leq C_n Mw(y)$, 命题即证. $\square$

3.8 补充: 弱 L^p 空间与 Lorentz 空间

3.8.1 弱 L^p 空间

3.8.1.1 弱 L^p 空间的基本介绍

设 $0 < p < \infty$, 回忆 $T = id$ 时的弱 (p, p) ($p < \infty$) 型不等式:

$$\mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{C \|f\|_{L^p(X, \mu)}}{\lambda} \right)^p, \quad \forall \lambda > 0,$$

注意 $d_f(\lambda) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\})$, 于是上式可以整理为

$$\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}} \leq C \|f\|_{L^p(X, \mu)}, \quad \forall \lambda > 0.$$

为了消除 λ 的影响, 知上式等价于

$$\sup_{\lambda > 0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

若 $f \in L^p(X, \mu)$, 自然能导出 $\sup_{\lambda > 0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} < \infty$. 但就算 $\|f\|_{L^p(X, \mu)} = \infty$, 也未必有 $\sup_{\lambda > 0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} = \infty$. 这说明如果 $\sup_{\lambda > 0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\}$ 能成为范数 (或拟范数), 它将导出一个比 $L^p(X, \mu)$ 范围更大的空间. 此即下述弱 L^p 空间的定义:

³什么是 $\|\cdot\|_{L^\infty(Mw)}$?

⁴这个补充的意义是什么?

定义 3.12 (弱 $L^p(X, \mu)$)

对 $0 < p < \infty$, 弱 $L^p(X, \mu)$ (又记为 $L^{p,\infty}(X, \mu)$) 由 X 上满足

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} = \sup_{\lambda>0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \left(= \inf \left\{ C > 0 : \forall \alpha > 0 \left(d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p} \right) \right\} \right) < \infty$$

的全体可测函数 f 构成. 弱 $L^\infty(X, \mu)$ 空间定义为 $L^\infty(X, \mu)$, $\|\cdot\|_{L^{\infty,\infty}(X,\mu)} := \|\cdot\|_{L^\infty(X,\mu)}$.



注 $L^{\infty,\infty}(X, \mu) = L^\infty(X, \mu)$ 可以理解为: 当 $p = \infty$ 时, $\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\}$ 有意义当且仅当 $d_f(\lambda) < \infty$, 于是

$$\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} = \sup_{\lambda>0} \{\lambda > 0 : d_f(\lambda) < \infty\},$$

而后式意味着 $\mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}) < \infty$, 满足该式的 λ 的上确界恰为本性上确界的定义.

容易证明用于定义 $\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 的两个式子是相等的, 下面说明 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 是拟范数:

命题 3.9 (弱 $L^p(0 < p \leq \infty)$ 空间的可赋拟范性)

$\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 是弱 $L^p(X, \mu)$ ($0 < p \leq \infty$) 上的拟范数.



证明 $p = \infty$ 的情况无所可证. $p < \infty$ 时, 正定性和齐次性显见, 要说明 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} = \sup_{\lambda>0} \{\lambda d_{(\cdot)}(\lambda)^{\frac{1}{p}}\}$ 是拟范数, 就是要说明

$$\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_{f+g}(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \lesssim \sup_{\lambda>0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} + \sup_{\lambda>0} \{\lambda d_g(\lambda)^{\frac{1}{p}}\}, \quad \forall f, g \in L^{p,\infty}(X, \mu).$$

注意若 $0 < \theta \leq 1$, 那么对任意 $a, b \geq 0$ 均有 $(a+b)^\theta \leq a^\theta + b^\theta$, 这是因为只需考虑 $(1+x)^\theta \leq 1 + x^\theta$, 对 $x \geq 0$ 求导即证. 现若 $1 \leq p < \infty$, 则代入 $a = d_f(\lambda)$, $b = d_g(\lambda)$, $\theta = \frac{1}{p}$ 并利用分布函数性质 3.2(iii) 有

$$\lambda d_{f+g}(\lambda)^{\frac{1}{p}} \leq \lambda \left(d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right)^{\frac{1}{p}} \leq \lambda \left(d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right)^{\frac{1}{p}} + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right)^{\frac{1}{p}} \right),$$

于是

$$\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_{f+g}(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \leq 2 \left(\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} + \sup_{\lambda>0} \{\lambda d_g(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \right),$$

此即欲证.

当 $0 < p < 1$ 时, 根据 (1.9) 式知对任意 $a, b \geq 0$ 与 $\theta \in [1, \infty)$ 有 $(a+b)^\theta \leq 2^{\theta-1}(a^\theta + b^\theta)$, 代入 $a = d_f(\lambda)$, $b = d_g(\lambda)$, $\theta = \frac{1}{p}$ 并利用分布函数性质 3.2(iii) 有

$$\lambda d_{f+g}(\lambda)^{\frac{1}{p}} \leq \lambda \left(d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right)^{\frac{1}{p}} \leq \lambda 2^{\frac{1}{p}-1} \left(d_f\left(\frac{\lambda}{2}\right)^{\frac{1}{p}} + d_g\left(\frac{\lambda}{2}\right)^{\frac{1}{p}} \right),$$

于是

$$\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_{f+g}(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \leq 2^{\frac{1}{p}} \left(\sup_{\lambda>0} \{\lambda d_f(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} + \sup_{\lambda>0} \{\lambda d_g(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} \right).$$

命题即证. □

$L^{p,\infty}(X, \mu)$ 与 $L^p(X, \mu)$ 两个空间之间的关系由下述命题体现:

命题 3.10

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \leq \|f\|_{L^p(X,\mu)},$$

特别因此有 $L^p(X, \mu) \hookrightarrow L^{p,\infty}(X, \mu)$.



证明 知对任意的 $\alpha > 0$:

$$\alpha^p d_f(\alpha) = \alpha^p \mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}) = \int_{\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}} \alpha^p d\mu \leq \int_{\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}} |f(x)|^p d\mu,$$

故

$$\alpha^p d_f(\alpha) \leq \|f\|_{L^p(X, \mu)}^p, \quad \forall \alpha > 0,$$

从而

$$\|f\|_{L^{p, \infty}(X, \mu)}^p = \sup_{\alpha > 0} \{\alpha^p d_f(\alpha)\} \leq \|f\|_{L^p(X, \mu)}^p,$$

即得

$$\|f\|_{L^{p, \infty}(X, \mu)} \leq \|f\|_{L^p(X, \mu)}.$$

□

上面的嵌入关系是严格的, [LG1] 中给出了一个可说明 $L^p(\mathbb{R}^n) \subsetneq L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)$ 的例子:

例 3.1(在 $L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)$ 中而不在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的函数) 设 $h(x) = |x|^{-\frac{n}{p}}$, 显见积分 $\int_{\mathbb{R}^n} |h(x)|^p dx$ 发散, 故 $h \notin L^p(\mathbb{R}^n)$. 但任取 $\lambda > 0$ 知

$$d_h(\lambda) = \mu(\{x \in \mathbb{R}^n : |h(x)| > \lambda\}) = \lambda^{-p} \nu_n,$$

其中 ν_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积, 于是

$$\|h\|_{L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda d_h(\lambda)^{\frac{1}{p}}\} = \nu_n^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

事实上, 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 嵌入关系 3.10 是 L^p 嵌入 1.12 的精细化. 此即下述命题:

命题 3.11 (L^p 嵌入在弱型空间下的精细化)

设 (X, μ) 是测度空间, $E \subset X$ 满足 $\mu(E) < \infty$, 且对某取定的 $0 < p < \infty$ 有 $f \in L^{p, \infty}(X, \mu)$. 则对 $0 < q < p$ 有:

$$\int_E |f(x)|^q d\mu(x) \leq \frac{p}{p-q} \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \|f\|_{L^{p, \infty}(X, \mu)}^q.$$

特别地, 若 $\mu(X) < \infty, 0 < q < p$, 则

$$L^p(X, \mu) \hookrightarrow L^{p, \infty}(X, \mu) \hookrightarrow L^q(X, \mu).$$

♠

证明 $L^p(X, \mu) \hookrightarrow L^{p, \infty}(X, \mu)$ 在前文已经说明了, 下面说明 $L^{p, \infty}(X, \mu) \hookrightarrow L^q(X, \mu)$. 取定 $\alpha > 0$. 一方面, 注意到

$$E \cap \{|f| > \alpha\} \subset E \Rightarrow \mu(E \cap \{|f| > \alpha\}) \leq \mu(E).$$

另一方面, 根据 $\|\cdot\|_{L^{p, \infty}(X, \mu)}$ 的定义知

$$E \cap \{|f| > \alpha\} \subset \{|f| > \alpha\} \Rightarrow \mu(E \cap \{|f| > \alpha\}) \leq \mu(\{|f| > \alpha\}) \leq \alpha^{-p} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^p.$$

因此

$$\mu(E \cap \{|f| > \alpha\}) \leq \min(\mu(E), \alpha^{-p} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^p).$$

记 $B = \mu(E)^{-\frac{1}{p}} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}$, 由 L^p 范数的等价计算式 (3.5) 知:

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^q d\mu(x) &= q \int_0^\infty \alpha^{q-1} \mu(E \cap \{|f| > \alpha\}) d\alpha \\ &\leq q \int_0^\infty \alpha^{q-1} \min(\mu(E), \alpha^{-p} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^p) d\alpha \\ &\leq q \int_0^B \alpha^{q-1} \mu(E) d\alpha + q \int_B^\infty \alpha^{q-1} \alpha^{-p} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^p d\alpha \\ &= \mu(E) B^q + \frac{q}{p-q} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^p B^{q-p} \\ &= \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^q + \frac{q}{p-q} \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^q \\ &= \frac{p}{p-q} \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \|f\|_{L^{p, \infty}(X)}^q. \end{aligned}$$

特别在 $\mu(X) < \infty$ 时, 令 $E = X$ 知

$$\|f\|_{L^q(X)}^q = \int_X |f(x)|^q d\mu(x) \leq \frac{p}{p-q} \mu(X)^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X)}^q < \infty,$$

故 $L^{p,\infty}(X, \mu) \hookrightarrow L^q(X, \mu)$. □

通过对 L^p 范数等价表达式(3.5)的更细致讨论, 可以将加和插值1.14精细化. 此即下述命题:

命题 3.12 (加和插值在弱型空间下的精细化)

设 f 是 (X, μ) 上的可测函数, 其满足对任意 $\alpha > 0$ 均有 $d_f(\alpha) < \infty$. 取定 $\gamma > 0$, 记 $f_\gamma = f\chi_{|f|>\gamma}$, $f^\gamma = f - f_\gamma = f\chi_{|f|\leq\gamma}$, 则

$$d_{f_\gamma}(\alpha) = \begin{cases} d_f(\alpha), & \alpha > \gamma, \\ d_f(\gamma), & \alpha \leq \gamma, \end{cases}$$

$$d_{f^\gamma}(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha \geq \gamma, \\ d_f(\alpha) - d_f(\gamma), & \alpha < \gamma. \end{cases}$$

若 $f \in L^p(X, \mu)$, 则

$$\begin{aligned} \|f_\gamma\|_{L^p(X)}^p &= p \int_\gamma^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha + \gamma^p d_f(\gamma), \\ \|f^\gamma\|_{L^p(X)}^p &= p \int_0^\gamma \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha - \gamma^p d_f(\gamma), \\ \int_{\gamma < |f| \leq \delta} |f|^p d\mu &= p \int_\gamma^\delta d_f(\alpha) \alpha^{p-1} d\alpha - \delta^p d_f(\delta) + \gamma^p d_f(\gamma). \end{aligned}$$

从而当 $f \in L^{p,\infty}(X, \mu)$ 时, 对任意 $q > p$ 有 $f^\gamma \in L^q(X, \mu)$, 对任意 $q < p$ 有 $f_\gamma \in L^q(X, \mu)$, 故在 $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty$ 时有 $L^{p,\infty}(X, \mu) \subset L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$. ♠

证明 $d_{f_\gamma}, d_{f^\gamma}$ 的 d_f 表示是显见的. 对于 f_γ, f^γ 的 L^p 范数等价表达式, 知

$$\begin{aligned} \|f_\gamma\|_{L^p(X)}^p &= p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_{f_\gamma}(\alpha) d\alpha = p \int_0^\gamma \alpha^{p-1} d_f(\gamma) d\alpha + p \int_\gamma^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha = p \int_\gamma^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha + \gamma^p d_f(\gamma), \\ \|f^\gamma\|_{L^p(X)}^p &= p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_{f^\gamma}(\alpha) d\alpha = p \int_0^\gamma \alpha^{p-1} (d_f(\alpha) - d_f(\gamma)) d\alpha = p \int_0^\gamma \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha - \gamma^p d_f(\gamma). \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \int_{\gamma < |f| \leq \delta} |f|^p d\mu &= \int_X |f|^p (\chi_{|f|>\gamma} \chi_{|f|\leq\delta}) d\mu = \|(f_\gamma)^\delta\|_{L^p(X)}^p \\ &= p \int_0^\delta d_{f_\gamma}(\alpha) \alpha^{p-1} d\alpha - \delta^p d_{f_\gamma}(\delta) \\ &= p \int_0^\gamma d_{f_\gamma}(\alpha) \alpha^{p-1} d\alpha + p \int_\gamma^\delta d_{f_\gamma}(\alpha) \alpha^{p-1} d\alpha - \delta^p d_{f_\gamma}(\delta) \\ &= p \int_0^\gamma d_f(\gamma) \alpha^{p-1} d\alpha + p \int_\gamma^\delta d_{f_\gamma}(\alpha) \alpha^{p-1} d\alpha - \delta^p d_f(\delta) \\ &= p \int_\gamma^\delta d_f(\alpha) \alpha^{p-1} d\alpha - \delta^p d_f(\delta) + \gamma^p d_f(\gamma). \end{aligned}$$

现若 $f \in L^{p,\infty}(X, \mu)$, 则 $d_f(\alpha)$ 能被 α^{-p} 控制. 因为在 $q > p$ 时 $q - p - 1 > 1$, 故 $\alpha^{q-1} d_f(\alpha)$ 在零点附近可积, 从而 $f^\gamma \in L^q(X, \mu)$, 同理可说明 $q < p$ 时 $f_\gamma \in L^q(X, \mu)$. 这说明在 $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty$ 时, f 作为 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 中的元素能被表为 $L^{p_0}(X, \mu)$ 中的元素与 $L^{p_1}(X, \mu)$ 中的元素之和, 亦即 $L^{p,\infty}(X, \mu) \subset L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$. □

3.8.1.2 弱 L^p 空间的收敛性

给出一个空间的范数后, 自然会去研究空间关于该范数的完备性如何, 该范数诱导的收敛强弱如何. $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 的完备性这里先按下不表, 下面的命题说明 $L^{p,\infty}$ 意义下的收敛强于依测度收敛, 弱于 L^p 意义下的收敛.

定义 3.13 (依测度收敛)

设 $f, f_n (n = 1, 2, \dots)$ 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数, 称序列 f_n 依测度收敛到 f , 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 (\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon). \quad (3.24)$$

注 上述定义等价于

$$\forall \varepsilon > 0 (\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0). \quad (3.25)$$

(3.25) $\Rightarrow$ (3.24) 是显然的, 下面说明 (3.24) $\Rightarrow$ (3.25). 取定 $\varepsilon > 0$ 与 $0 < \delta < \varepsilon$, 根据 (3.24) 式知存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $n > n_0$ 时

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \delta\}) < \delta.$$

根据 $\delta < \varepsilon$ 知

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \leq \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \delta\}),$$

于是

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \delta, \quad \forall n > n_0,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \leq \delta. \quad (3.26)$$

又因为 (3.26) 式对全体 $0 < \delta < \varepsilon$ 均成立, 故令 $\delta \rightarrow 0$ 即得 (3.25) 式.

命题 3.13 ($L^{p,\infty}$ 的收敛强弱比较)

设 $0 < p \leq \infty, f, f_k \in L^{p,\infty}(X, \mu) (k = 1, 2, \dots)$, 则

- (i) 若 $f, f_k \in L^p(X, \mu) (k = 1, 2, \dots)$, 且 $f_k \rightarrow f (L^p(X, \mu))$, 则 $f_k \rightarrow f (L^{p,\infty}(X, \mu))$;
- (ii) 若 $f_k \rightarrow f (L^{p,\infty}(X, \mu))$, 则 f_k 依测度收敛到 f .

证明 $p = \infty$ 时 (i) 无所可证, 而 (ii) 是实变函数的课程中已知的结论⁵. 下设 $0 < p < \infty$, 若 $f, f_k \in L^p(X, \mu) (k = 1, 2, \dots)$, $f_k \rightarrow f (L^p(X, \mu))$, 则有

$$\|f_k - f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)} \leq \|f_k - f\|_{L^p(X, \mu)} \Rightarrow \lambda^p \mu(\{x \in X : |f_k(x) - f(x)| > \lambda\}) \leq \int_X |f_k(x) - f(x)|^p d\mu, \quad \forall \lambda > 0,$$

于是由 $\int_X |f_k(x) - f(x)|^p d\mu \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ 知 $\lambda^p \mu(\{x \in X : |f_k(x) - f(x)| > \lambda\}) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 亦即 $f_k \rightarrow f (L^{p,\infty}(X, \mu))$.

若 $f_k \rightarrow f (L^{p,\infty}(X, \mu))$, 根据定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K > 0 \forall k > K (\|f_k - f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)} = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda \mu(\{x \in X : |f_k(x) - f(x)| > \lambda\})^{\frac{1}{p}}\} < \varepsilon^{\frac{1}{p}+1}),$$

令 $\lambda = \varepsilon$ 即知

$$\mu(\{x \in X : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

这正是依测度收敛的定义. □

注意 $L^{p,\infty}$ 意义下的收敛是严格强于依测度收敛的, 下例表明存在依测度收敛但不在 $L^{p,\infty}$ 意义下收敛的序列:

⁵即一致收敛强于依测度收敛.

例 3.2 取定 $0 < p < \infty$, 在 $[0, 1]$ 上定义函数

$$f_{k,j}(x) = k^{\frac{1}{p}} \chi_{(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k})}(x), \quad k \geq 1, 1 \leq j \leq k.$$

现考虑序列 $\{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{2,2}, f_{3,1}, f_{3,2}, f_{3,3}, \dots\}$, 观察到

$$|\{x \in [0, 1] : f_{k,j}(x) > 0\}| = \frac{1}{k},$$

于是序列 $\{f_{k,j}\}_{(k,j)}$ 依测度收敛到 0. 同时注意

$$\|f_{k,j}\|_{L^{p,\infty}[0,1]} = \sup_{\alpha > 0} \{\alpha |\{x \in [0, 1] : f_{k,j}(x) > \alpha\}|^{\frac{1}{p}}\} \geq \sup_{k \geq 1} \frac{(k - \frac{1}{k})^{\frac{1}{p}}}{k^{\frac{1}{p}}} = 1.$$

这表明序列 $\{f_{k,j}\}_{(k,j)}$ 并不在 $L^{p,\infty}$ 意义下收敛.

3.8.1.3 弱 L^p 空间上的一个初等插值

类似于 L^p 范数的对数凸性 1.13, 在 $L^{p,\infty}$ 空间之间也有类似的插值命题:

命题 3.14 ($L^{p,\infty}(X, \mu)$ 的一个初等插值)

设 (X, μ) 是 σ 有限测度空间, $0 < p < q \leq \infty$, $f \in L^{p,\infty}(X, \mu) \cap L^{q,\infty}(X, \mu)$, 则对任意 $r \in (p, q)$ 都有 $f \in L^r(X, \mu)$, 且

$$\|f\|_{L^r(X, \mu)} \leq \left(\frac{r}{r-p} + \frac{r}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^{\frac{\frac{1}{r}-\frac{1}{q}}{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}} \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^{\frac{\frac{1}{r}-\frac{1}{p}}{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}}. \quad (3.27)$$

证明 首先设 $q < \infty$, 任取 $\lambda > 0$, 根据 $\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}$ 的定义知:

$$\begin{cases} \lambda^p d_f(\lambda) \leq \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p, \\ \lambda^q d_f(\lambda) \leq \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q, \end{cases}$$

得

$$d_f(\lambda) \leq \min \left(\frac{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p}{\lambda^p}, \frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\lambda^q} \right). \quad (3.28)$$

为了分开讨论 $\frac{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p}{\lambda^p}$, $\frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\lambda^q}$, 求解 $\frac{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p}{\lambda^p} = \frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\lambda^q}$ 得 $\lambda = \left(\frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p} \right)^{\frac{1}{q-p}}$, 为简便记

$$B = \left(\frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p} \right)^{\frac{1}{q-p}}. \quad (3.29)$$

于是

$$d_f(\lambda) \leq \begin{cases} \frac{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p}{\lambda^p}, & 0 < \lambda \leq B, \\ \frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\lambda^q}, & B < \lambda < \infty. \end{cases}$$

下面估计 f 的 L^r 范数, 由 (3.28), (3.29) 式与等价计算式 (3.5) 知

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^r(X, \mu)}^r &\stackrel{(A)}{=} r \int_0^\infty \lambda^{r-1} d_f(\lambda) d\lambda \leq r \int_0^\infty \lambda^{r-1} \min \left(\frac{\|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p}{\lambda^p}, \frac{\|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q}{\lambda^q} \right) d\lambda \\ &= r \int_0^B \lambda^{r-1-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p d\lambda + r \int_B^\infty \lambda^{r-1-q} \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q d\lambda \\ &= \frac{r}{r-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p B^{r-p} + \frac{r}{q-r} \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^q B^{r-q} \\ &= \frac{r}{r-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^{p-p\frac{r-p}{q-p}} \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^{q\frac{r-p}{q-p}} + \frac{r}{q-r} \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^{q+q\frac{r-q}{q-p}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^{p\frac{r-q}{q-p}} \\ &= \left(\frac{r}{r-p} + \frac{r}{q-r} \right) \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^{\frac{1-\frac{r}{q}}{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}} \|f\|_{L^{q,\infty}(X, \mu)}^{\frac{\frac{r}{q}-1}{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}}, \end{aligned}$$

其中 (A) 基于 L^p 范数的等价计算式 3.5, 这里便需要 (X, μ) 的 σ 有限性, 另因 $r-p > 0, r-q < 0$, 故 $\int_0^B \lambda^{r-1-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X, \mu)}^p d\lambda$,

$\int_B^\infty \lambda^{r-1-q} \|f\|_{L^{q,\infty}(X,\mu)}^q d\lambda < \infty$. 两边同取 $\frac{1}{r}$ 次幂即得欲证.

再设 $q = \infty$. 因为当 $\lambda > \|f\|_{L^\infty(X,\mu)}$ 时 $d_f(\lambda) = 0$, 故只需考虑 $\lambda \leq \|f\|_{L^\infty(X,\mu)}$ 的情况, 此时 $d_f(\lambda) \leq \lambda^{-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^p$, 进而

$$\|f\|_{L^r(X,\mu)}^r \leq \frac{r}{r-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^p \|f\|_{L^\infty(X,\mu)}^{r-p}.$$

这正是 $q = \infty$ 时的命题. $\square$

3.8.1.4 弱 $L^p(p > 1)$ 空间的可赋范性

本节选自 [LG1] 的习题, 列于此处旨在为线性算子的 l^2 值延拓定理 4.14 的证明作准备.

前面我们讨论了弱 $L^p(0 < p \leq \infty)$ 空间的可赋范性 3.9, 事实上弱 L^p 空间上也可能赋范数. 为介绍这一结果, 首先需要下述引理:

引理 3.3

设 (X, μ) 是测度空间, $E \subset X$ 满足 $\mu(E) < \infty$, 函数 $f \in L^{p,\infty}(X, \mu) (0 < p < \infty)$. 若 $0 < q < p$, 则

$$\int_E |f(x)|^q d\mu(x) \leq \frac{p}{p-q} \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^q.$$

证明 根据 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(E,\mu)}$ 的定义易知对任意 $\lambda > 0$ 均有 $\mu(E \cap \{|f| > \lambda\}) \leq \min(\mu(E), \lambda^{-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^p)$, 进而由 L^p 范数的等价计算式 (3.5) 知:

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^q d\mu(x) &= q \int_0^\infty \lambda^{q-1} \mu(\{x \in E : |f(x)| > \lambda\}) d\lambda \\ &= q \int_0^\infty \lambda^{q-1} \mu(E \cap \{|f| > \lambda\})^{1-\frac{q}{p}} \mu(E \cap \{|f| > \lambda\})^{\frac{q}{p}} d\lambda \\ &\leq q \int_0^\infty \lambda^{q-1} \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \lambda^{-q} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^q d\lambda \\ &= \frac{p}{p-q} \mu(E)^{1-\frac{q}{p}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^q. \end{aligned}$$

引理即证. $\square$

现取 (X, μ) 是 σ 有限测度空间, $0 < p < \infty$, 取定 $0 < r < p$ 并定义

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} = \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{-\frac{1}{r} + \frac{1}{p}} \left(\int_E |f(x)|^r d\mu(x) \right)^{\frac{1}{r}}, \quad (3.30)$$

其中上确界在 X 的全体有限测度子集 E 中取. 下面说明 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 与 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 是等价的: 在引理 3.3 中代入 $q = r$, 并在式子两端取 $\frac{1}{q}$ 次幂可知

$$\mu(E)^{-\frac{1}{r} + \frac{1}{p}} \left(\int_E |f(x)|^r d\mu(x) \right)^{\frac{1}{r}} \leq \left(\frac{p}{p-r} \right)^{\frac{1}{r}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}.$$

在上式两端对 E 取上确界即得

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \leq \left(\frac{p}{p-r} \right)^{\frac{1}{r}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}, \quad \forall f \in L^{p,\infty}(X,\mu).$$

另一方面, 因为 (X, μ) 是 σ 有限的⁶, 故可记 $X = \bigcup_{k=1}^\infty X_k$, 其中 $\mu(X_k) < \infty (k = 1, 2, \dots)$, 且 $X_1 \subset \dots \subset X_k \subset$

⁶ (X, μ) 的 σ 有限性实际上是必要的条件, 这是因为如果空间不具有 σ 有限性, 可取 $X = \{1, 2\}, \mu(\{1\}) = 1, \mu(\{2\}) = \infty$, 此时 (X, μ) 显然不是 σ 有限的. 取 $f(x) = 1$ 可知 $\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} = \infty$, 于是 $f \notin L^{p,\infty}(X, \mu)$, 但 $\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} = 1$.

... 于是在(3.30)式中取 $E = E_{\lambda,k} := \{x \in X_k : |f(x)| > \lambda\}$ 有:

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} &= \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{-\frac{1}{r} + \frac{1}{p}} \left(\int_E |f(x)|^r d\mu(x) \right)^{\frac{1}{r}} \\ &\geq \mu(E_{\lambda,k})^{-\frac{1}{r} + \frac{1}{p}} \left(\int_{E_{\lambda,k}} |f(x)|^r d\mu(x) \right)^{\frac{1}{r}} \\ &\geq \mu(E_{\lambda,k})^{-\frac{1}{r} + \frac{1}{p}} \left(\int_{E_{\lambda,k}} \lambda^r d\mu(x) \right)^{\frac{1}{r}} = \lambda \mu(E_{\lambda,k})^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

在上式两端令 $k \rightarrow \infty$ 即得

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \geq \lambda \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\})^{\frac{1}{p}}, \quad \forall \lambda > 0,$$

在上式两端对 $\lambda > 0$ 取上确界即得

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \geq \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}.$$

至此可得不等式

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \leq \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \leq \left(\frac{p}{p-r} \right)^{\frac{1}{r}} \|f\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}, \quad \forall f \in L^{p,\infty}(X,\mu). \quad (3.31)$$

下面我们用 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 构造 $L^{p,\infty}(X,\mu)$ ($0 < p < \infty$) 上的度量:

定理 3.11 ($L^{p,\infty}(0 < p < \infty)$ 空间的度量化)

设 (X, μ) 是 σ 有限测度空间, $0 < p < \infty$, 则在 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 上可赋度量.

证明 取 $0 < \varepsilon < p$, $r = \min(p - \varepsilon, 1)$, 记

$$d(f, g) = \|f - g\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^r, \quad f, g \in L^{p,\infty}(X, \mu).$$

下面说明 d 是 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 上的度量. 其对称性与非负性是显见的; 若 $d(f, g) = 0$, 由(3.31)式知 $\|f - g\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} = 0$, 由 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 的正定性知 $f = g$, 因此 d 是正定的. 下面证明 d 的三角不等式: 任取 $f, g, h \in L^{p,\infty}(X, \mu)$, 有

$$\begin{aligned} d(f, g) &= \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E |f(x) - g(x)|^r d\mu(x) \\ &= \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)|^r d\mu(x) \\ &\leq \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E (|f(x) - h(x)|^r + |h(x) - g(x)|^r) d\mu(x) \\ &\leq \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E |f(x) - h(x)|^r d\mu(x) + \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E |h(x) - g(x)|^r d\mu(x) \\ &= d(f, h) + d(h, g), \end{aligned}$$

因此 d 是 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 上的度量. □

另外, 由(3.31)式可知度量 d 诱导的拓扑与拟范数 $\|\cdot\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}$ 诱导的拓扑是等价的. 如果记 $n(f) = d(f, 0)$, 则容易验证 $r = 1$ 时 $n(f)$ 称为 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ 上的范数.

最后, 根据上述结果, 还可以得到空间 $L^{p,\infty}(X, \mu)$ ($0 < p < \infty$) 中的 Fatou 引理:

定理 3.12 ($L^{p,\infty}(X, \mu)$ ($0 < p < \infty$) 中的 Fatou 引理)

设 (X, μ) 是 σ 有限测度空间, $0 < p < \infty$, 则对 X 上的任意可测函数列 $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 均有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)} \leq C_p \liminf_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)},$$

其中 C_p 是只依赖于 p 的常数.

证明 知

$$\begin{aligned}
 \|\liminf_{n \rightarrow \infty} |g_n|\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^r &\stackrel{(A)}{\leq} \|\liminf_{n \rightarrow \infty} |g_n|\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^r \\
 &= \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} |g_n(x)|^r d\mu(x) \\
 &\stackrel{(B)}{\leq} \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E |g_n(x)|^r d\mu(x) \\
 &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 < \mu(E) < \infty} \mu(E)^{\frac{r}{p}-1} \int_E |g_n(x)|^r d\mu(x) \\
 &\stackrel{(C)}{\leq} \frac{p}{p-r} \liminf_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_{L^{p,\infty}(X,\mu)}^r,
 \end{aligned}$$

其中 (A),(C) 是(3.31)式; (B) 是经典的 Fatou 引理. 取定 r 并在上式两端取 $\frac{1}{r}$ 次幂即得欲证. $\square$

3.8.1.5 弱 L^p 空间上的不等式

调和与分析中的 Hölder 不等式与 Young 不等式在弱 L^p 空间上均有推广. 本小节我们给出这两个推广并进行证明.

定理 3.13 (弱型 Hölder 不等式)

设 $f_j \in L^{p_j,\infty}(X)$ ($0 < p_j < \infty, 1 \leq j \leq k$), 记

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \cdots + \frac{1}{p_k},$$

则

$$\|f_1 \cdots f_k\|_{L^{p,\infty}(X)} \leq p^{-\frac{1}{p}} \prod_{j=1}^k p_j^{\frac{1}{p_j}} \prod_{j=1}^k \|f_j\|_{L^{p_j,\infty}(X)}.$$



证明 根据 $\|\cdot\|_{L^{p_j,\infty}(X)}$ 的齐次性, 不妨设对全体 j 均有 $\|f_j\|_{L^{p_j,\infty}(X)} = 1$. 要估计 $\|f_1 \cdots f_k\|_{L^{p,\infty}(X)}$, 就要估计 $d_{f_1 \cdots f_k}(\alpha)$. 任取 $\alpha > 0$, 因为

$$|f_1 \cdots f_k| > \alpha \Rightarrow \left(|f_1| > \frac{\alpha}{s_1} \vee |f_2| > \frac{s_1}{s_2} \vee \cdots \vee |f_{k-1}| > \frac{s_{k-2}}{s_{k-1}} \vee |f_k| > s_{k-1} \right),$$

故

$$\begin{aligned}
 \mu(\{|f_1 \cdots f_k| > \alpha\}) &\leq \mu\left(\left\{|f_1| > \frac{\alpha}{s_1}\right\}\right) + \mu\left(\left\{|f_2| > \frac{s_1}{s_2}\right\}\right) + \cdots + \mu\left(\left\{|f_{k-1}| > \frac{s_{k-2}}{s_{k-1}}\right\}\right) + \mu(\{|f_k| > s_{k-1}\}) \\
 &\stackrel{(A)}{\leq} \left(\frac{s_1}{\alpha}\right)^{p_1} + \left(\frac{s_2}{s_1}\right)^{p_2} + \cdots + \left(\frac{s_{k-1}}{s_{k-2}}\right)^{p_{k-1}} + \left(\frac{1}{s_{k-1}}\right)^{p_k}.
 \end{aligned} \tag{3.32}$$

其中 (A) 是利用 $\|f_j\|_{L^{p_j,\infty}(X)} = 1$ 的定义. 记 $x_1 = \frac{s_1}{\alpha}, x_2 = \frac{s_2}{s_1}, \cdots, x_k = \frac{1}{s_{k-1}}$, 下面用 Lagrange 乘数法在 $x_1 \cdots x_k = \frac{1}{\alpha}$ 的限制下求 $x_1^{p_1} + \cdots + x_k^{p_k}$ 的最小值. 构造 Lagrange 乘子为

$$L(\lambda, x_1, \cdots, x_k) = x_1^{p_1} + \cdots + x_k^{p_k} - \lambda \left(x_1 \cdots x_k - \frac{1}{\alpha} \right),$$

令

$$\begin{cases} p_1 x_1^{p_1-1} - \lambda x_2 \cdots x_k = 0, \\ \vdots \\ p_k x_k^{p_k-1} - \lambda x_1 \cdots x_{k-1} = 0, \\ x_1 x_2 \cdots x_k = \frac{1}{\alpha}. \end{cases}$$

因为 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \cdots + \frac{1}{p_{k-1}}$, 故由上述方程可解得

$$\begin{cases} \lambda = \alpha^{1-p} p_1^{\frac{p}{p_1}} \cdots p_k^{\frac{p}{p_k}}, \\ x_j^{p_j} = \alpha^{-p} p_1^{\frac{p}{p_1}} \cdots p_k^{\frac{p}{p_k} - 1} p_k^{\frac{p}{p_k}}, \end{cases}$$

此时

$$x_1^{p_1} + \cdots + x_k^{p_k} = \alpha^{-p} (p_1^{-1} + \cdots + p_k^{-1}) \prod_{j=1}^k p_k^{\frac{p}{p_j}} = \alpha^{-p} \frac{1}{p} \prod_{j=1}^k p_k^{\frac{p}{p_j}}.$$

因为 $s_1, \dots, s_{k-1}$ 两两独立, 故 $\mu(\{|f_1 \cdots f_k| > \alpha\})$ 不能超过(3.32)右式的最小值, 亦即

$$\mu(\{|f_1 \cdots f_k| > \alpha\}) \leq \alpha^{-p} \frac{1}{p} \prod_{j=1}^k p_k^{\frac{p}{p_j}} \Rightarrow \alpha^p \mu(\{|f_1 \cdots f_k| > \alpha\}) \leq \frac{1}{p} \prod_{j=1}^k p_k^{\frac{p}{p_j}},$$

故

$$\|f_1 \cdots f_k\|_{L^{p,\infty}(X)}^p \leq \frac{1}{p} \prod_{j=1}^k p_k^{\frac{p}{p_j}},$$

此即欲证. □

定理 3.14 (弱型 Young 不等式)

设 G 是装备左不变 Haar 测度 λ 的局部紧群, 且对 G 的任意可测子集 A 均有 $\lambda(A) = \lambda(A^{-1})$. 另设 $1 \leq p < \infty, 1 < q, r < \infty$ 满足

$$\frac{1}{q} + 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{r}. \quad (3.33)$$

则存在常数 $C_{p,q,r} > 0$ 使得对任意 $f \in L^p(G)$ 与任意 $g \in L^{r,\infty}(G)$, 卷积 $f * g$ 都是 λ a.e. 存在的, 且

$$\|f * g\|_{L^{q,\infty}(G)} \leq C_{p,q,r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)} \|f\|_{L^p(G)}. \quad (3.34)$$

证明 类似于经典 Young 不等式 1.9 的证明, 我们首先对 $|f|, |g|$ 证明(3.34)式, 在该式成立后可得在 λ a.e. 意义下有 $|f| * |g| < \infty$, 进而 $f * g$ 在 λ a.e. 意义下存在, 且 $|f * g| \leq |f| * |g|$, 一般情形至此即证. 故可设 $f, g \geq 0$ 在 λ a.e. 意义下成立. 下面把函数 g 进行拆分, 设 M 是待定的正实数, 定义 $g_1 = g\chi_{|g| \leq M}, g_2 = g\chi_{|g| > M}$, 由加和插值在弱型空间下的精细化 3.12 知

$$d_{g_1}(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha \geq M, \\ d_g(\alpha) - d_g(M), & \alpha < M, \end{cases} \quad (3.35)$$

$$d_{g_2}(\alpha) = \begin{cases} d_g(\alpha), & \alpha > M, \\ d_g(M), & \alpha \leq M. \end{cases} \quad (3.36)$$

由分布函数的性质 3.2(iii) 知对任意 $\beta > 0$ 有

$$d_{f*g}(\beta) \leq d_{f*g_1}\left(\frac{\beta}{2}\right) + d_{f*g_2}\left(\frac{\beta}{2}\right), \quad (3.37)$$

因此只需分别估计 $f * g_1$ 和 $f * g_2$ 的分布函数即可. 由加和插值在弱型空间下的精细化 3.12 知对任意 $s \in (r, \infty)$ 有 $g_1 \in L^s(G)$, 对任意 $t \in (0, r)$ 有 $g_2 \in L^t(G)$, 且

$$\begin{aligned} \int_G g_1(x)^s d\lambda(x) &= s \int_0^M \alpha^{s-1} d_g(\alpha) d\alpha - M^s d_g(M) \\ &\leq s \int_0^M \alpha^{s-1-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r d\alpha - M^s d_g(M) \\ &= \frac{s}{s-r} M^{s-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r - M^s d_g(M). \end{aligned} \quad (3.38)$$

$$\begin{aligned}
\int_G g_2(x)^t d\lambda(x) &= t \int_0^M \alpha^{t-1} d_g(\alpha) d\alpha + M^t d_g(M) \\
&\leq t \int_0^M \alpha^{t-1-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r d\alpha + M^t d_g(M) \\
&\leq \frac{t}{r-t} M^{t-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r + M^{t-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r \\
&= \frac{r}{r-t} M^{t-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r.
\end{aligned} \tag{3.39}$$

因为 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p'} + \frac{1}{q}$, 故 $1 < r < p'$. 取 $t = 1, s = p'$, 由 Hölder 不等式与 (3.38) 式知在 $p' < \infty$ 时有

$$|(f * g_1)(x)| \leq \|f\|_{L^p(G)} \|g_1\|_{L^{p'}(G)} \leq \|f\|_{L^p(G)} \left(\frac{p'}{p'-r} M^{p'-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r \right)^{\frac{1}{p'}}, \tag{3.40}$$

而在 $p' = \infty$ 时有

$$|(f * g_1)(x)| \leq \|f\|_{L^p(G)} M. \tag{3.41}$$

现取

$$M = \begin{cases} (\beta^{p'} 2^{-p'} r q^{-1} \|f\|_{L^p(G)}^{-p'} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^{-r})^{\frac{1}{p'-r}}, & p' < \infty, \\ \frac{\beta}{2\|f\|_{L^1(G)}}, & p' = \infty. \end{cases}$$

可以验证这样选取的 M 满足

$$d_{f*g_1} \left(\frac{\beta}{2} \right) = 0.$$

另一方面, 由 (3.39) 式与经典的 Young 不等式, 令 $t = 1$ 可得

$$\|f * g_2\|_{L^p(G)} \leq \|f\|_{L^p(G)} \|g_2\|_{L^1(G)} \leq \|f\|_{L^p(G)} \frac{r}{r-1} M^{1-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r. \tag{3.42}$$

现在对前面取定的 M , 由 (3.42) 式与 Chebyshev 不等式得

$$\begin{aligned}
d_{f*g}(\beta) &\leq d_{f*g_2} \left(\frac{\beta}{2} \right) \\
&\leq (2\|f * g_2\|_{L^p(G)} \beta^{-1})^p \\
&\leq (2r\|f\|_{L^p(G)} M^{1-r} \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^r (r-1)^{-1} \beta^{-1})^p \\
&= C_{p,q,r}^q \beta^{-q} \|f\|_{L^p(G)}^q \|g\|_{L^{r,\infty}(G)}^q,
\end{aligned} \tag{3.43}$$

此即欲求不等式. 另外, 上述过程表明常数 $C_{p,q,r}$ 在 $r \rightarrow 1$ 时与 $(r-1)^{-\frac{p}{q}}$ 同速率爆破. $\square$

3.8.2 Lorentz 空间

3.8.2.1 递降重排

[CR] 中给出了递降重排的引入动机: 对非负有限序列 $\{a_i\}_{i=1}^n, \{b_i\}_{i=1}^n$ 而言, 在代数上称 $\{b_i\}$ 是 $\{a_i\}$ 的重排, 就是说 $b_i = a_{\sigma(i)} (i = 1, 2, \dots, n)$, 其中 σ 是 $1, 2, \dots, n$ 的某个排列. 在更一般的测度空间中, 排列的概念可以换成保测变换. 于是在这个意义下, 对非负可测函数 f, g 而言, 称 g 是 f 的重排, 就是说 $g = f \circ \sigma$, 其中 σ 是某个保测变换. 这个概念的拓展虽说是良定义的, 但还不够宽泛, 没法满足我们的一些研究要求. 例如上述重排意义下, 对称性没法得到保证, 即 g 可能是 f 的重排, 而 f 不是 g 的重排.

另一种理解保测变换的角度是从分布函数入手, 在这个意义下称非负函数 f, g 互为重排 (或者在更精确的术语下称等测), 指的是它们的分布函数相同. 这个概念拓展显然是对称的, 它也可以用来研究不同测度空间上函数的等测性. 特别来说, 对每个可测函数 f 而言, 在上述重排意义下都可以定义这么一个特殊的重排: 它在 $[0, \infty)$ 上递降且与 f 等测. 这个重排记作 f^* , 它就称为 f 的递降重排, 递降重排对应的离散情况便是序列从大到小排列.

下面开始严格的叙述. 设 f 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数, 其递降重排定义如下:

定义 3.14 (递降重排)

若 f 是定义在 X 上的复值函数, 则 f 的递降重排 f^* 是定义在 $[0, \infty)$ 上的函数:

$$f^*(t) = \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t\} = \inf\{s \geq 0 : d_f(s) \leq t\}. \quad (3.44)$$

其中 $\inf \emptyset = \infty$.



根据定义显见若 $\forall \alpha \geq 0 (d_f(\alpha) > t)$, 则 $f^*(t) = \infty$. 另外 $f^*(t)$ 是关于 t 的递减函数, 这是因为若 $t_1 < t_2$, 根据 $d_f(s)$ 的递增性知若 s_0 满足 $d_f(s_0) \leq t_2$, 则对任意 $0 < s < s_0$ 均有 $d_f(s) \leq t_2$. 现已知

$$d_f(s) \leq t_1 \Rightarrow d_f(s) \leq t_2,$$

故

$$\{s > 0 : d_f(s) \leq t_1\} \subset \{s > 0 : d_f(s) \leq t_2\},$$

于是

$$\inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t_2\} \leq \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t_1\},$$

至此即得 $f^*(t_2) \leq f^*(t_1)$, 亦即 $f^*(t)$ 是关于 t 的递减函数. 同时, 因为 $d_f(s) \leq \mu(X)$ 对任意 $s > 0$ 均成立, 故 $t > \mu(X)$ 时 $f^*(t) = 0$, 亦即 $\text{supp } f^* \subset [0, \mu(X)]$.

下面系统说明 f^* 的诸性质:

命题 3.15 (递降重排的性质)

若 f, g, f_n 是 μ 可测函数, $k \in \mathbb{C}, 0 \leq t, s, t_1, t_2 < \infty$, 则:

- (i) 当 $\alpha > 0$ 时 $f^*(d_f(\alpha)) \leq \alpha$;
- (ii) $d_f(f^*(t)) \leq t$;
- (iii) $f^*(t) > s$ 当且仅当 $t < d_f(s)$, 亦即 $\{t \geq 0 : f^*(t) > s\} = [0, d_f(s))$;
- (iv) 若 $|g| \leq |f|$ 是 μ 几乎处处成立的, 则 $g^* \leq f^*$, 且 $|f|^* = f^*$;
- (v) $(kf)^* = |k|f^*$;
- (vi) $(f+g)^*(t_1+t_2) \leq f^*(t_1) + g^*(t_2)$;
- (vii) $(fg)^*(t_1+t_2) \leq f^*(t_1)g^*(t_2)$;
- (viii) 若 $|f_n| \uparrow |f|$ 是 μ 几乎处处成立的, 则 $f_n^* \uparrow f^*$;
- (ix) 若 $|f| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n|$ 是 μ 几乎处处成立的, 则 $f^* \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n^*$;
- (x) f^* 在 $[0, \infty)$ 上右连续;
- (xi) 若 $f^*(t) < \infty, c > 0, \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq f^*(t) - c\}) < \infty$, 则 $t \leq \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq f^*(t)\})$;
- (xii) $d_f = d_{f^*}$;
- (xiii) 当 $0 < p < \infty$ 时 $(|f|^p)^* = (f^*)^p$;
- (xiv) 当 $0 < p < \infty$ 时 $\int_X |f(x)|^p d\mu = \int_0^\infty f^*(t)^p dt$;
- (xv) $\|f\|_{L^\infty(X)} = f^*(0)$;
- (xvi) 当 $0 < q < \infty$ 时 $\sup_{t>0} t^q f^*(t) = \sup_{\alpha>0} \alpha (d_f(\alpha))^q$.



证明 (i) 根据定义知

$$f^*(d_f(\alpha)) = \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq d_f(\alpha)\}.$$

前面已经说过 $d_f(s)$ 是关于 s 的递增函数, 故 $d_f(s) \leq d_f(\alpha) \Rightarrow s \leq \alpha$, 进而 $f^*(d_f(\alpha)) \leq \alpha$.

(ii) 根据定义知

$$d_f(f^*(t)) = d_f(\inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t\}) \leq t.$$

(iii) $f^*(t) > s$ 等价于

$$f^*(t) = \inf\{r > 0 : d_f(r) \leq t\} > s,$$

这又等价于 $s \notin \{r > 0 : d_f(r) \leq t\}$, 亦即 $d_f(s) > t$.

(iv) 当 $|g| \leq |f|$ 是 μ 几乎处处成立的, 则根据分布函数的性质 3.2(i) 知

$$\forall \lambda > 0 (d_g(\lambda) \leq d_f(\lambda)),$$

这说明

$$d_f(\lambda) \leq t \Rightarrow d_g(\lambda) \leq t,$$

亦即

$$\{\lambda > 0 : d_f(\lambda) \leq t\} \subset \{\lambda > 0 : d_g(\lambda) \leq t\}.$$

于是

$$\inf\{\lambda > 0 : d_g(\lambda) \leq t\} \leq \inf\{\lambda > 0 : d_f(\lambda) \leq t\},$$

此即 $g^* \leq f^*$. 因为 d_f 本身只关于 $|f|$, 故 f 与 $|f|$ 在作用 d_f 后是等价的, 亦即 $|f|^* = f^*$.

(v) 当 $k = 0$ 时命题是显然的. 当 $k \neq 0$ 时任取 $t \geq 0$, 知

$$(kf)^*(t) = \inf\{s > 0 : d_{kf}(s) \leq t\}.$$

根据分布函数的性质 3.2(ii) 知 $d_{kf}(s) = d_f(\frac{s}{|k|})$, 于是

$$(kf)^*(t) = \inf\{|k|s > 0 : d_f(s) \leq t\} = |k| \int \{s > 0 : d_f(s) \leq t\} = |k|f^*(t).$$

(vi) 设 $A = \{s_1 > 0 : d_f(s_1) \leq t_1\}$, $B = \{s_2 > 0 : d_g(s_2) \leq t_2\}$, $S = \{s > 0 : d_{f+g}(s) \leq t_1 + t_2\}$, 则对任意 $s_1 \in A, s_2 \in B$, 根据分布函数的性质 3.2(iii) 有

$$d_{f+g}(s_1 + s_2) \leq d_f(s_1) + d_g(s_2) \leq t_1 + t_2 \Rightarrow s_1 + s_2 \in S,$$

这说明 $A + B \subset S$, 因而 $\inf S \leq \inf(A + B) = \inf A + \inf B$, 此即 $(f + g)^*(t_1 + t_2) \leq f^*(t_1) + f^*(t_2)$.

(vii) 设 $A = \{s_1 > 0 : d_f(s_1) \leq t_1\}$, $B = \{s_2 > 0 : d_g(s_2) \leq t_2\}$, $P = \{s > 0 : d_{fg}(s) \leq t_1 + t_2\}$, 则对任意 $s_1 \in A, s_2 \in B$, 根据分布函数的性质 3.2(iv) 有

$$d_{fg}(s_1 s_2) \leq d_f(s_1) + d_g(s_2) \leq t_1 + t_2 \Rightarrow s_1 s_2 \in P,$$

这说明 $A \cdot B \subset P$, 因而 $\inf P \leq \inf(A \cdot B) = \inf A \cdot \inf B$, 此即 $(fg)^*(t_1 + t_2) \leq f^*(t_1)g^*(t_2)$.

(viii) 当 $|f_n| \uparrow |f|$ 是 μ 几乎处处成立的, 根据分布函数的性质 3.2 知 $d_{f_n} \uparrow d_f$, 于是对任意 $s, t > 0$ 有

$$d_f(s) \leq t \Rightarrow d_{f_n}(s) \leq t,$$

亦即

$$\{s > 0 : d_f(s) \leq t\} \subset \{s > 0 : d_{f_n}(s) \leq t\}.$$

于是

$$\inf\{s > 0 : d_{f_n}(s) \leq t\} \leq \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t\}.$$

另根据单调收敛定理与 $d_{f_n} \uparrow d_f$ 知 $\inf\{s > 0 : d_{f_n}(s) \leq t\} \rightarrow \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t\}$, 此即 $f_n^* \uparrow f^*$.

(ix) 设 $F_n = \inf_{m \geq n} |f_m|$, $h = \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n| = \sup_{n \geq 1} F_n$. 因为 $F_n \uparrow h$, 故由 (viii) 知 $F_n^* \uparrow h^*$. 由 $|f| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n|$ 知 $|f| \leq h$, 进而由 (iv) 知 $f^* \leq h^* = \sup_{n \geq 1} F_n^*$. 因为 $m \geq n$ 时 $F_n \leq |f_m|$, 由 (iv) 知 $F_n^* \leq f_m^*$, 因而 $F_n^* \leq \inf_{m \geq n} f_m^*$. 综上即得

$$f^* \leq h^* = \sup_{n \geq 1} F_n^* \leq \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} f_m^* = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n^*.$$

(x) 若 $f^*(t_0) = 0$, 则根据 f^* 的递减性知对任意 $t > t_0$ 总有 $f^*(t) = 0$, 因而 f^* 在 t_0 处右连续. 现设 $f^*(t_0) > 0$, 取 α 满足 $0 < \alpha < f^*(t_0)$, 另取 $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ 是递降到零的正数列, 则因为 $f^*(t_0) > f^*(t_0) - \alpha$, 根据 (iii) 知 $d_f(f^*(t_0) - \alpha) > t_0$. 因为 $t_n \downarrow 0$, 故存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $n \geq n_0$ 均有 $d_f(f^*(t_0) - \alpha) > t_0 + t_n$. 由 (iii) 知 $f^*(t_0) - \alpha < f^*(t_0 + t_n)$, 又根据 f^* 的递减性知 $f^*(t_0 + t_n) \leq f^*(t_0)$, 夹逼即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^*(t_0 + t_n) = f^*(t_0)$.

(xi) 取定 $c > 0, n \in \mathbb{N}$ 可知 $f^*(t) > f^*(t) - \frac{c}{n}$, 另由 $\mu(\{x \in X : |f(x)| \geq f^*(t) - c\}) < \infty$ 知对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均

有 $\mu(\{x \in X : |f(x)| > f^*(t) - \frac{\varepsilon}{n}\}) < \infty$, 于是由 (iii) 知

$$t < d_f(f^*(t) - \frac{\varepsilon}{n}) = \mu\left(\left\{x \in X : |f(x)| > f^*(t) - \frac{\varepsilon}{n}\right\}\right).$$

根据单调收敛定理, 在上式两端令 $n \rightarrow \infty$ 即得

$$t \leq \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq f^*(t)\}).$$

(xii) 由 (iii) 知对任意 $s \geq 0$ 有

$$d_{f^*}(s) = \mu(\{t > 0 : f^*(t) > s\}) = \mu([0, d_f(s))) = d_f(s).$$

(xiii) 任取 $s \geq 0$ 知

$$d_{|f|^p}(s) = \mu(\{x \in X : |f(x)|^p > s\}) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > s^{\frac{1}{p}}\}) = d_f(s^{\frac{1}{p}}),$$

于是对任意 $t \geq 0$ 有

$$(|f|^p)^*(t) = \inf\{s > 0 : d_{|f|^p}(s) \leq t\} = \inf\{s > 0 : d_f(s^{\frac{1}{p}}) \leq t\} = (\inf\{s > 0 : d_f(s) \leq t\})^p = (f^*)^p(t).$$

(xiv) 知

$$\begin{aligned} \int_X |f(x)|^p d\mu &\stackrel{(A)}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda \\ &\stackrel{(B)}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{f^*}(\lambda) d\lambda \\ &\stackrel{(C)}{=} \int_0^\infty |f^*(t)|^p dt, \end{aligned}$$

其中 (A),(C) 是 L^p 范数的等价计算式 3.5, (B) 是性质 (xii).

(xv) 根据定义知

$$f^*(0) = \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq 0\},$$

而

$$d_f(s) < 0 \Rightarrow \mu(\{x \in X : |f(x)| > s\}) \leq 0 \Rightarrow \mu(\{x \in X : |f(x)| > s\}) = 0.$$

另一方面 $\|f\|_{L^\infty(X)}$ 的定义正是

$$\|f\|_{L^\infty(X)} := \inf\{s : \mu(\{x \in X : |f(x)| > s\}) = 0\},$$

此即欲证.

(xvi) 任取 $\alpha > 0$, 不失一般性可设 $d_f(\alpha) > 0$, 设 ε 满足 $0 < \varepsilon < d_f(\alpha)$, 则因为 $d_f(\alpha) > d_f(\alpha) - \varepsilon$, 由 (iii) 知 $f^*(d_f(\alpha) - \varepsilon) > \alpha$, 于是

$$\sup_{t>0} t^q f^*(t) \geq (d_f(\alpha) - \varepsilon)^q f^*(d_f(\alpha) - \varepsilon) > (d_f(\alpha) - \varepsilon)^q \alpha.$$

两边令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并对 $\alpha > 0$ 取上确界即得 $\sup_{t>0} t^q f^*(t) \geq \sup_{\alpha>0} \alpha (d_f(\alpha))^q$. 另一方面, 取 $t > 0$ 并不失一般性设 $f^*(t) > 0$, 取 ε 满足 $0 < \varepsilon < f^*(t)$, 则因为 $f^*(t) > f^*(t) - \varepsilon$, 由 (iii) 知 $d_f(f^*(t) - \varepsilon) > t$, 于是

$$\sup_{\alpha>0} \alpha (d_f(\alpha))^q \geq (f^*(t) - \varepsilon) (d_f(f^*(t) - \varepsilon))^q > (f^*(t) - \varepsilon) t^q.$$

两边令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并对 $t > 0$ 取上确界即得 $\sup_{t>0} t^q f^*(t) \leq \sup_{\alpha>0} \alpha (d_f(\alpha))^q$, 欲证因而成立. $\square$

3.8.2.2 Lorentz 空间的定义与性质

在了解递降重排的诸性质后, 下面可以给出 Lorentz 空间的定义了:

定义 3.15 (Lorentz 空间)

设 f 是测度空间 (X, μ) 上的可测函数, $0 < p, q \leq \infty$, 定义

$$\|f\|_{L^{p,q}} = \begin{cases} (\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} f^*(t))^q \frac{dt}{t})^{\frac{1}{q}}, & q < \infty, \\ \sup_{t>0} t^{\frac{1}{p}} f^*(t), & q = \infty, \end{cases}$$

则记满足 $\|f\|_{L^{p,q}} < \infty$ 的全体 f 构成的空间为 $L^{p,q}(X, \mu)$, 称之为指标为 p, q 的 Lorentz 空间.



类似于 L^p 空间与弱 L^p 空间, $L^{p,q}(X, \mu)$ 中的两个函数相等指的是它们 μ 几乎处处相等. 由递降重排的性质 3.15(xvi) 知 $L^{p,\infty}$ 正是弱 L^p 空间, 又因为弱 L^∞ 空间正是 L^∞ , 故 $L^{\infty,\infty} = L^\infty$. 另外由 $d_f = d_{f^*}$ 与 L^p 范数的等价计算式知 $L^{p,p} = L^p$.

注 容易验证对任意 $0 < p, r < \infty$ 与 $0 < q \leq \infty$ 有

$$\| |g|^r \|_{L^{p,q}} = \|g\|_{L^{pr,qr}}^r. \quad (3.45)$$

若在 $\mathbb{R}^n$ 上设伸缩算子为 $\delta^\varepsilon(f)(x) = f(\varepsilon x)$, $\varepsilon > 0$, 则从定义出发可说明 $d_{\delta^\varepsilon(f)}(\alpha) = \varepsilon^{-n} d_f(\alpha)$, $(\delta^\varepsilon(f))^*(t) = f^*(\varepsilon^n t)$, 于是结合 Lorentz 范数的定义知

$$\|\delta^\varepsilon(f)\|_{L^{p,q}} = \varepsilon^{-\frac{n}{p}} \|f\|_{L^{p,q}}. \quad (3.46)$$

例 3.3(简单函数的 Lorentz 范数) 下面示范性地计算简单函数的 Lorentz 范数. 设 $f(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{E_j}(x)$, 其中 $\{E_j\}_{j=1}^N$ 是两两不交的集列, $a_1 > \dots > a_N > 0$.




图 3.3: 简单函数计算示意, 其中 d_f 的几何直观是在 f 的图像中令红线上移, 观察 $f(x)$ 在红线之下部分的测度; f^* 的几何直观是在 d_f 的图像中令红线上移, 观察令 d_f 到达红线之下的首个元素.

从定义出发显见

$$d_f(\alpha) = \sum_{j=0}^N B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(\alpha),$$

其中

$$B_j = \sum_{i=1}^j \mu(E_i), \quad a_{N+1} = B_0 = 0, \quad a_0 = \infty.$$

知当 $B_0 \leq t < B_1$ 时, 使得 $d_f(s) \leq t$ 的最小的 $s > 0$ 为 a_1 , 类似当 $B_1 \leq t < B_2$ 时, 使得 $d_f(s) \leq t$ 的最小的 $s > 0$ 为 a_2 . 以此类推可知

$$f^*(t) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{[B_{j-1}, B_j)}(t).$$

于是在 $0 < p, q < \infty$ 时有

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{p,q}} &= \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} f^*(t))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^N \int_{B_{j-1}}^{B_j} a_j^q t^{\frac{q}{p}-1} dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\frac{p}{q} \sum_{j=1}^N a_j^q (B_j - B_{j-1})^{\frac{q}{p}} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\frac{p}{q} \right)^{\frac{1}{q}} (a_1^q B_1^{\frac{q}{p}} + a_2^q (B_2^{\frac{q}{p}} - B_1^{\frac{q}{p}}) + \cdots + a_N^q (B_N^{\frac{q}{p}} - B_{N-1}^{\frac{q}{p}}))^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

另有

$$\|f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{1 \leq j \leq N} a_j B_j^{\frac{1}{p}}.$$

下面计算 $\|f\|_{L^{\infty,q}}$. 当 $q < \infty$ 时知

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{\infty,q}} &= \left(\int_0^\infty (f^*(t))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{j=1}^N \int_{B_{j-1}}^{B_j} a_j^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\frac{p}{q} \sum_{j=1}^N a_j^q \log \frac{B_j}{B_{j-1}} \right)^{\frac{1}{q}} = \infty, \end{aligned}$$

最后等于 ∞ 是因为 $B_0 = 0$, 这说明能使得 $\|\cdot\|_{L^{\infty,q}} < \infty$ 的简单函数只能是零函数. 现当 $0 < q < \infty$ 时, 对于一般的非零函数 $g \in L^{\infty,q}(X, \mu)$ 知总存在非零简单函数 s 使得 $0 \leq s \leq g$, 又因为 $\|s\|_{L^{\infty,q}} = \infty$, 故 $\|g\|_{L^{\infty,q}} = \infty$. 于是 $0 < q < \infty$ 时必有 $L^{\infty,q}(X, \mu) = \{0\}$.

命题 3.16 ($L^{p,q}$ 范数的等价计算式)

若 $0 < p < \infty, 0 < q \leq \infty$, 则

$$\|f\|_{L^{p,q}} = \begin{cases} p^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^\infty (d_f(s))^{\frac{1}{p}} s^q \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{q}}, & q < \infty, \\ \sup_{s>0} s d_f(s)^{\frac{1}{p}}, & q = \infty. \end{cases} \quad (3.47)$$

证明 $q = \infty$ 时欲证即为递减重排的性质 3.15(xvi), 下设 $q < \infty$. 若 f 为例 3.3 中给出的简单函数, 则已知

$$d_f(s) = \sum_{j=1}^N B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(s),$$

其中 $a_{N+1} = 0$. 现在一方面例 3.3 已经表明

$$\|f\|_{L^{p,q}} = \left(\frac{p}{q} \right)^{\frac{1}{q}} (a_1^q B_1^{\frac{q}{p}} + a_2^q (B_2^{\frac{q}{p}} - B_1^{\frac{q}{p}}) + \cdots + a_N^q (B_N^{\frac{q}{p}} - B_{N-1}^{\frac{q}{p}}))^{\frac{1}{q}},$$

另一方面

$$\begin{aligned}
 p^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^\infty (d_f(s)^{\frac{1}{p}} s)^q \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{q}} &= p^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{j=1}^N \int_{a_{j+1}}^{a_j} B_j^{\frac{1}{p}} s^{q-1} ds \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &= p^{\frac{1}{q}} \left(\frac{1}{q} \sum_{j=1}^N B_j^{\frac{1}{p}} (a_j^q - a_{j+1}^q) \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &= \left(\frac{p}{q} \right)^{\frac{1}{q}} (a_1^q B_1^{\frac{q}{p}} + a_2^q (B_2^{\frac{q}{p}} - B_1^{\frac{q}{p}}) + \cdots + a_N^q (B_N^{\frac{q}{p}} - B_{N-1}^{\frac{q}{p}}))^{\frac{1}{q}}.
 \end{aligned}$$

对于一般情况, 给定可测函数 f , 根据实变函数的结论知总能找到非负简单函数列 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得 $f_n \uparrow |f|$ 是 μ 几乎处处成立的. 根据分布函数的性质 3.2(vii) 与递降重排的性质 3.15(viii) 知 $d_{f_n} \uparrow d_f, f_n^* \uparrow f^*$, 进而由单调收敛定理知:

$$\begin{aligned}
 \|f\|_{L^{p,q}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^{p,q}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} p^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^\infty (d_{f_n}(s)^{\frac{1}{p}} s)^q \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &= p^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^\infty (d_f(s)^{\frac{1}{p}} s)^q \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{q}}.
 \end{aligned}$$

此即欲证. □

现在已经知道了 $L^{p,p} = L^p \subset L^{p,\infty}$, 一个自然的问题是一般的 Lorentz 空间有怎样的包含关系? 下面的结果表明对任意固定的 p , Lorentz 空间 $L^{p,q}$ 都关于指标 q 的递增而扩大.

命题 3.17 ($L^{p,q}$ 关于 q 的递增性)

若 $0 < p \leq \infty, 0 < q < r \leq \infty$, 则存在仅关于 p, q, r 的常数 $c_{p,q,r}$ 使得

$$\|f\|_{L^{p,r}} \leq c_{p,q,r} \|f\|_{L^{p,q}}. \quad (3.48)$$

也就是说 $L^{p,q}$ 是 $L^{p,r}$ 的子空间. ♠

证明 当 $p = \infty$ 时总有 $L^{\infty,q} = \{0\}$, 命题显然成立, 下设 $p < \infty$. 知

$$\begin{aligned}
 t^{\frac{1}{p}} f^*(t) &= \left(\frac{q}{p} \int_0^t (s^{\frac{1}{p}} f^*(s))^q \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &\stackrel{(A)}{\leq} \left(\frac{q}{p} \int_0^t (s^{\frac{1}{p}} f^*(s))^q \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &\leq \left(\frac{q}{p} \right)^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^{p,q}},
 \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 f^* 递减. 现在在上式两端对 $t > 0$ 取上确界知

$$\|f\|_{L^{p,\infty}} \leq \left(\frac{q}{p} \right)^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^{p,q}}. \quad (3.49)$$

这便证明了 (3.48) 式在 $r = \infty$ 时的情况. 当 $r < \infty$ 时, 知

$$\begin{aligned}
 \|f\|_{L^{p,r}} &= \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} f^*(t))^{r-q+q} \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{r}} \\
 &\leq \left(\left(\sup_{t>0} t^{\frac{1}{p}} f^*(t) \right)^{r-q} \int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} f^*(t))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{r}} \\
 &= \|f\|_{L^{p,\infty}}^{\frac{r-q}{r}} \|f\|_{L^{p,q}}^{\frac{q}{r}}.
 \end{aligned} \quad (3.50)$$

将 (3.49) 式代入 (3.50) 式, 取 $c_{p,q,r} = \left(\frac{q}{p} \right)^{\frac{r-q}{r}} \|f\|_{L^{p,\infty}}^{\frac{r-q}{r}} \|f\|_{L^{p,q}}^{\frac{q}{r}}$ 即得欲证. □

不幸的是, 泛函 $\|\cdot\|_{L^{p,q}}$ 并不满足三角不等式. 这是因为考虑定义在 $[0, 1]$ 上的函数 $f(t) = t, g(t) = 1 - t$, 知

$$d_f(s) = \mu(\{x \in [0, 1] : |f(x)| > s\}) = \begin{cases} 1 - s, & 0 \leq s \leq 1, \\ 0, & s > 1, \end{cases}$$

$$d_g(s) = \mu(\{x \in [0, 1] : |g(x)| > s\}) = \begin{cases} 1 - s, & 0 \leq s \leq 1, \\ 0, & s > 1. \end{cases}$$

于是

$$f^*(\alpha) = \inf\{s > 0 : d_f(s) \leq \alpha\} = (1 - \alpha)\chi_{[0,1]}(\alpha),$$

$$g^*(\alpha) = \inf\{s > 0 : d_g(s) \leq \alpha\} = (1 - \alpha)\chi_{[0,1]}(\alpha).$$

另一方面由 $(f + g)(t) = \chi_{[0,1]}(t)$ 知 $d_{f+g}(s) = \chi_{[0,1]}(s), (f + g)^*(\alpha) = \chi_{[0,1]}(\alpha)$. 现根据定义知当 $0 < p, q < \infty$ 时:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{L^{p,q}} &= \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}}(f + g)^*(t))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \left(\int_0^1 t^{\frac{q}{p}-1} dt \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\frac{p}{q} \right)^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{p,q}} + \|g\|_{L^{p,q}} &= 2 \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}}(1 - t)\chi_{[0,1]}(t))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= 2 \left(\int_0^1 t^{\frac{q}{p}-1}(1 - t)^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} = 2(B(\frac{q}{p}, q + 1)). \end{aligned}$$

在数学分析中有结论

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)},$$

于是 $\|f + g\|_{L^{p,q}} \leq \|f\|_{L^{p,q}} + \|g\|_{L^{p,q}}$ 等价于

$$\frac{p}{q} \leq 2^q \frac{\Gamma(q + 1)\Gamma(\frac{q}{p})}{\Gamma(q + 1 + \frac{q}{p})}.$$

取 $p = q = 1$ 便足以说明上式不成立了. 然而, 因为对任意 $t > 0$, 根据递降重排的性质 3.15(vi) 知

$$(f + g)^*(t) \leq f^*\left(\frac{t}{2}\right) + g^*\left(\frac{t}{2}\right),$$

故

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{L^{p,q}} &\leq \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}}(f^*(\frac{t}{2}) + g^*(\frac{t}{2})))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= 2^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}}(f^*(t) + g^*(t)))^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} 2^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^\infty t^{\frac{q}{p}} c_q (f^*(t)^q + g^*(t)^q) \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} 2^{\frac{1}{p}} c'_q (\|f\|_{L^{p,q}} + \|g\|_{L^{p,q}}), \end{aligned}$$

其中 $c'_q = \max(1, 2^{\frac{1-q}{q}})$, (B),(C) 的放缩依照 q 取值的不同基于 (1.8),(1.9) 两式. 另若 $\|f\|_{L^{p,q}} = 0$, 则 $f^*(t)$ 必 μ 几乎处处为零, 因而 $f = 0$ 是 μ 几乎处处成立的. 这说明 $L^{p,q}(X, \mu)$ 对全体 $0 < p, q \leq \infty$ 均构成拟赋范线性空间 ($p = \infty$ 或 $q = \infty$ 的情况显见), 下面研究该空间的完备性.

定理 3.15 (Lorentz 空间的完备性)

若 (X, μ) 是测度空间, 则对任意 $0 < p, q \leq \infty$ 而言, $L^{p,q}(X, \mu)$ 均关于其对应的拟范数 $\|\cdot\|_{L^{p,q}}$ 完备, 因而其为拟 Banach 空间.



证明 若 $p = \infty$, 则 $L^{p,q}(X, \mu) = \{0\}$ 或 $L^\infty(X, \mu)$, 此时结论显然成立, 下设 $p < \infty$, 首先证明一个引理:

引理 3.4 (依 $L^{p,q}$ 收敛与依测度收敛的关系)

设 $0 < p, q \leq \infty, f, f_k \in L^{p,q}(X, \mu) (k = 1, 2, \dots)$, 若 $f_k \rightarrow f (L^{p,q})$, 则 f_k 依测度收敛到 f .

当 $q = \infty$ 时, 这正是命题 3.13(ii). 下设 $q < \infty$, 由递降重排的性质 3.15(xvi) 与 (3.49) 式知

$$\sup_{t>0} t^{\frac{1}{p}} f^*(t) = \sup_{\alpha>0} \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\frac{q}{p}\right)^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^{p,q}}, \quad \forall f \in L^{p,q}(X, \mu),$$

这说明 $f_k \rightarrow f (L^{p,q}) \Rightarrow f_k \rightarrow f (L^{p,\infty})$, 因而 f_k 依测度收敛到 f .

回到原命题, 设 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $L^{p,q}(X, \mu)$ 中的基本列, 则 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 同样是依测度基本列, 因而根据 Riesz 引理知存在子列 $\{f_{k_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$ 在 μ 几乎处处的意义下收敛到某个 f . 现固定 j_0 , 根据递降重排的性质 3.15(ix), 因为 $|f - f_{k_{j_0}}| = \lim_{j \rightarrow \infty} |f_{k_j} - f_{k_{j_0}}|$, 故

$$(f - f_{k_{j_0}})^*(t) \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} (f_{k_j} - f_{k_{j_0}})^*(t). \quad (3.51)$$

于是

$$t^{\frac{q}{p}} ((f - f_{k_{j_0}})^*(t))^q \leq t^{\frac{q}{p}} (\liminf_{j \rightarrow \infty} (f_{k_j} - f_{k_{j_0}})^*(t))^q,$$

因而

$$\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} (f - f_{k_{j_0}})^*(t))^q \frac{dt}{t} \leq \int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} \liminf_{j \rightarrow \infty} (f_{k_j} - f_{k_{j_0}})^*(t))^q \frac{dt}{t}.$$

由 Fatou 引理知

$$\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} \liminf_{j \rightarrow \infty} (f_{k_j} - f_{k_{j_0}})^*(t))^q \frac{dt}{t} \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_0^\infty (t^{\frac{1}{p}} (f_{k_j} - f_{k_{j_0}})^*(t))^q \frac{dt}{t}.$$

于是

$$\|f - f_{k_{j_0}}\|_{L^{p,q}}^q \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \|f_{k_j} - f_{k_{j_0}}\|_{L^{p,q}}^q. \quad (3.52)$$

现在在 (3.52) 式中令 $j_0 \rightarrow \infty$, 因为 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 本身是基本列, 故 $\liminf_{j \rightarrow \infty} \|f_{k_j} - f_{k_{j_0}}\|_{L^{p,q}}^q \rightarrow 0$, 这说明 f_{k_j} 依 $L^{p,q}$ 收敛到 $f \in L^{p,q}$. 又因为

$$\|f - f_k\|_{L^{p,q}} \lesssim \|f - f_{k_j}\|_{L^{p,q}} + \|f_{k_j} - f_k\|_{L^{p,q}},$$

在上式两端令 $k \rightarrow \infty, j \rightarrow \infty$ 即知 f_k 依 $L^{p,q}$ 收敛到 f , 命题得证. $\square$

注 [CY] 中提到了下述 Aoki-Rolewicz 定理:

定理 3.16 (Aoki-Rolewicz)

若 X 是拟 Banach 空间, 则存在 $0 < p < 1$ 与 X 上的某等价范数 $\square \cdot \square$ 使得对任意 $x, y \in X$ 均有

$$\square x + y \square^p \leq \square x \square^p + \square y \square^p.$$

依照该定理可说明 $p, q \geq 1$ 时 $L^{p,q}$ 是可赋范的, 进而此时 $L^{p,q}$ 就是 Banach 空间.

在实变函数中已经知道对任意测度空间 (X, μ) 与 $0 < p < \infty$ 而言, 简单函数空间均在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密, 一个自然的问题是 Lorentz 空间是否也有这样的性质. 下面的结果表明 $q \neq \infty$ 时该命题依旧成立:

定理 3.17

若 $0 < q < \infty$, 则 (X, μ) 上的简单函数构成的空间在 $L^{p,q}(X, \mu)$ 中稠密.

证明 $p = \infty$ 时 $L^{p,q}(X, \mu) = \{0\}$, 结论显见, 下设 $p < \infty$. 取 $f \in L^{p,q}(X, \mu)$, 不失一般性可设 $f \geq 0$. 因为 $f \in L^{p,q}(X, \mu) \subset L^{p,\infty}(X, \mu)$, 故

$$\|f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\varepsilon>0} \varepsilon d_f(\varepsilon)^{\frac{1}{p}} \lesssim \|f\|_{L^{p,q}} < \infty,$$

于是对任意 $\varepsilon > 0$ 均有

$$\varepsilon \mu(\{x \in X : f(x) > \varepsilon\})^{\frac{1}{p}} \lesssim \|f\|_{L^{p,q}} < \infty.$$

考虑 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即知对任意 $A > 0$, $\mu(\{x \in X : f(x) > A\})$ 均有限, 且 $\lim_{A \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : f(x) > A\}) = 0$, 根据极限的定义知对 $n = 1, 2, \dots$ 对应存在 $A_n > 0$ 使得 $\mu(\{x \in X : f(x) > A_n\}) < \frac{1}{2^n}$.

现对固定的 n 定义函数

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=0}^{1+2^n A_n} \frac{k}{2^n} \chi_{\{\frac{k}{2^n} < f \leq \frac{k+1}{2^n}\}}(x) \chi_{\{\frac{1}{2^n} < f \leq A_n\}}(x).$$

知 $\text{supp } \varphi_n \subset \{x \in X : \frac{1}{2^n} < f(x) \leq A_n\}$, 而 $\mu(\{x \in X : f(x) > \frac{1}{2^n}\}) < \infty \Rightarrow \mu(\{x \in X : \frac{1}{2^n} < f(x) \leq A_n\}) < \infty$, 于是 φ_n 必是有限简单函数, 且对任意 $x \in \{x \in X : \frac{1}{2^n} < f(x) \leq A_n\}$ 均有

$$f(x) - \frac{1}{2^n} < \varphi_n(x) \leq f(x),$$

于是

$$\mu(\{x \in X : |f(x) - \varphi_n(x)| > \frac{1}{2^n}\}) < \frac{1}{2^n},$$

根据递降重排的性质 3.15(iii) 知 $t \geq \frac{1}{2^n}$ 时 $(f - \varphi_n)^*(t) \leq \frac{1}{2^n}$, 因而

$$(f - \varphi_n)^*(t) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

且对任意 $t > 0$ 均有 $\varphi_n^*(t) \leq f^*(t)$. 根据递降重排的性质 3.15(iv) 知 $f - \varphi_n \leq f \Rightarrow (f - \varphi_n)^*(t) \leq f^*(t)$, 于是由 Lebesgue 控制收敛定理知 $\|\varphi_n - f\|_{L^{p,q}} \rightarrow 0$, 命题即证. $\square$

注 上面讨论的都是 $q < \infty$ 的情况, 对于 $L^{p,\infty}$ 而言, 这个结论对任意 $0 < p \leq \infty$ 都是不成立的. 但可以证明有限测度集示性函数的可数线性组合构成的函数空间在 $L^{p,\infty}(X, \mu)$, 该空间称为可数简单函数空间.

3.8.2.3 Lorentz 空间的共轭空间

对于拟 Banach 空间 $(Z, \|\cdot\|_Z)$, 其共轭空间 Z^* 定义为 Z 上全体连续线性泛函 T 构成的空间, 其上赋范

$$\|T\|_{Z^*} = \sup_{\|x\|_Z=1} |T(x)|.$$

泛函分析中有下述结论:

定理 3.18

若 X 是赋范线性空间, Y 是 Banach 空间, $\mathbb{K}$ 是背景数域, $L(X, Y)$ 表示由 X 到 Y 的连续线性算子的全体构成的空间, 在其上规定线性运算:

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(x) = \alpha_1 T_1(x) + \alpha_2 T_2(x), \quad \forall x \in X, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in L(X, Y).$$

另规定

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} = \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y,$$

则 $(L(X, Y), \|\cdot\|_{X \rightarrow Y})$ 是 Banach 空间.



类似于该定理的证明, 可以说明当 X 是拟赋范线性空间时上述结论依旧成立. 特别地, 拟 Banach 空间的共轭空间依旧是 Banach 空间.

针对 Lorentz 空间, 我们希望知道 $L^{p,q}$ 的共轭空间 $(L^{p,q})^*$ 是怎样的? 对建立在一般测度空间上的 Lorentz 空间而言, 要得到这个问题的答案需要克服诸多技术上的困难, 因此我们把讨论的测度空间限制在 σ 有限非原子测度空间上, 这会使得后面的证明更为简单.

定义 3.16 (原子, 非原子测度空间)

测度空间 (X, μ) 中的一个可测子集 A 称为一个原子, 若 $\mu(A) > 0$, 且对任意可测集 $B \subset A$ 而言, 要么 $\mu(B) = 0$, 要么 $\mu(B) = \mu(A)$. 测度空间 (X, μ) 称为非原子的, 如果其不包含原子. 也就是说, X 非原子当且仅当对任意 $A \subset X$, 只要 $\mu(A) > 0$, 就总能找到 $B \subsetneq A$ 使得 $\mu(B) > 0$ 且 $\mu(A \setminus B) > 0$.



赋 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 就是非原子测度空间, 而任何赋计数测度的测度空间都是原子测度空间. 利用 Zorn 引理可以证明非原子空间的下述性质:

命题 3.18

若 (X, μ) 是非原子测度空间, $A \subset X$ 可测, 且 $\mu(A) > 0$, 则任取 $0 < \alpha < \mu(A)$, 总能找到可测集 $B \subset A$ 使得 $\mu(B) = \alpha$.



下面讨论 $L^{p,q}$ 的共轭空间, 为了后面叙述方便, 首先介绍几个引理:

引理 3.5 (Hardy-Littlewood 不等式)

若 f, g 是 σ 有限测度空间 (X, μ) 上的可测函数, 则

$$\int_X |f(x)g(x)|d\mu(x) \leq \int_0^\infty f^*(t)g^*(t)dt.$$



证明 为此先说明对测度空间 (X, μ) 上的非负可积函数 g 与可测子集 A 而言, 总有

$$\int_A g(x)d\mu(x) \leq \int_0^{\mu(A)} g^*(t)dt. \quad (3.53)$$

这是因为先设 $g(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{E_j}(x)$ 是非负有限简单函数, 其中 $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是不交列, $a_1 > \dots > a_N > 0$. 知一方面

$$\int_A g(x)d\mu(x) = \sum_{j=1}^N a_j \mu(A \cap E_j),$$

另一方面

$$g^*(t) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{[B_{j-1}, B_j)}(t),$$

其中 $B_j = \sum_{i=1}^j \mu(E_i)$, $B_0 = 0$. 现若 $\mu(A) \geq B_N$, 则

$$\int_0^{\mu(A)} g^*(t)dt = \sum_{j=1}^N a_j \mu(E_j) \geq \sum_{j=1}^N a_j \mu(A \cap E_j) = \int_A g(x)d\mu(x).$$

而若 $\mu(A) < B_N$, 设 $\mu(A) \in [B_{k-1}, B_k)$, 这意味着 $\mu(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i) \leq \mu(A) < \mu(\bigcup_{i=1}^k E_i)$, 现有

$$\int_0^{\mu(A)} g^*(t)dt = \sum_{j=1}^{k-1} a_j \mu(E_j) + a_k(\mu(A) - B_{k-1}),$$

根据可测集的性质知

$$\sum_{j=1}^{k-1} a_j \mu(E_j) = \sum_{j=1}^{k-1} a_j (\mu(A \cap E_j) + \mu(E_j \setminus A)).$$

于是欲证可转化为

$$\sum_{j=1}^{k-1} a_j \mu(E_j \setminus A) + a_k \left(\mu(A) - \sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j) \right) \geq \sum_{j=k}^N a_j \mu(A \cap E_j).$$

因为

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{k-1} a_j \mu(E_j \setminus A) + a_k \left(\mu(A) - \sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j) \right) &\geq a_k \left(\sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j \setminus A) + \mu(A) - \sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j) \right) \\ \sum_{j=k}^N a_j \mu(A \cap E_j) &\leq a_k \sum_{j=k}^N \mu(A \cap E_j), \end{aligned}$$

故只需证

$$\sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j \setminus A) + \mu(A) - \sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j) \geq \sum_{j=k}^N \mu(A \cap E_j).$$

根据 $\{E_j\}_{j=1}^N$ 的不交性知 $\sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j \setminus A) + \mu(A) = \mu(A \cup (\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i))$, 于是

$$\sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j \setminus A) + \mu(A) - \sum_{j=1}^{k-1} \mu(E_j) = \mu\left(\left(A \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right)\right) \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right)\right),$$

同样因为 $\{E_j\}_{j=1}^N$ 互不相交, 知

$$\left(A \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right)\right) \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right) \supset \bigcup_{j=k}^N (A \cap E_j),$$

于是

$$\mu\left(\left(A \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right)\right) \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} E_i\right)\right) \geq \sum_{j=k}^N \mu(A \cap E_j).$$

g 为有限简单函数的情况至此即证, 又因为非负可积函数可由有限简单函数单调逼近, 故由单调收敛定理即得(3.53)式, 命题得证. $\square$

引理 3.6 (非原子测度空间的性质)

设 (X, μ) 是非原子测度空间.

- (i) 若 $A_0 \subset A_1 \subset X, 0 < \mu(A_1) < \infty, \mu(A_0) \leq t \leq \mu(A_1)$, 则存在 $E_t \subset A_1$ 使得 $\mu(E_t) = t$.
- (ii) 若 φ 是 $[0, \infty)$ 上的非负连续递减函数, 且 $t \geq \mu(X)$ 时 $\varphi(t) = 0$, 则存在 X 上的可测函数 f 使得 $t > 0$ 时 $f^*(t) = \varphi(t)$.
- (iii) 对 $A \subset X$ 与 X 上的可积函数 g , 若 $0 < \mu(A) < \infty$, 则存在 $\tilde{A} \subset X$ 使得 $\mu(\tilde{A}) = \mu(A)$, 且

$$\int_{\tilde{A}} |g(x)| d\mu(x) = \int_0^{\mu(A)} g^*(s) ds.$$

- (iv) 若 X 是 σ 有限的, $f \in L^\infty(X, \mu), g \in L^1(X, \mu)$, 则

$$\sup_{h: d_h = d_f} \left| \int_X h(x) g(x) d\mu(x) \right| = \int_0^\infty f^*(s) g^*(s) ds,$$

其中上确界在全体与 f 分布函数相等的函数 h 中取.



证明 (i) 首先设 $A_0 = \emptyset$. 因为 X 是非原子的, 故下面可分两种情况进行讨论:

若对任意 $A \subset X$, 总存在⁷ $B \subset A_1$ 使得 $\frac{1}{10}\mu(A) \leq \mu(B) \leq \frac{9}{10}\mu(A)$, 则 $0 \leq t \leq \mu(A_1)$ 总共只能有下述两种情况:

- $t = 0$ 或 $t = \mu(A_1)$, 此时命题显然成立.
- $0 < t < \mu(A_1)$. 此时对 A_1 应用假设条件得到 $B_1 \subset A_1$ 满足 $\frac{1}{10}\mu(A_1) \leq \mu(B_1) \leq \frac{9}{10}\mu(A_1)$. 若 $t = \mu(B_1)$, 结论已经证毕. 若 $t > \mu(B_1)$, 则对 $A_1 \setminus B_1$ 再应用假设条件, 得到 $B_2^+ \subset A_1 \setminus B_1$ 满足 $\frac{1}{10}\mu(A_1 \setminus B_1) \leq \mu(B_2^+) \leq \frac{9}{10}\mu(A_1 \setminus B_1)$; 若 $t < \mu(B_1)$, 则对 B_1 再应用假设条件, 得到 $B_2^- \subset B_1$ 满足 $\frac{1}{10}\mu(B_1) \leq \mu(B_2^-) \leq \frac{9}{10}\mu(B_1)$. 在第一种情况下, 将 t 与 $\mu(B_1) + \mu(B_2^+)$ 再进行比较, 回到讨论伊始; 在第二种情况下, 将 t 与 $\mu(B_2^-)$ 再进

⁷[LG1] 对应部分 (pg.75 Ex.1.4.5 Hint) 中原意为 $B \subset X$, 但结合其后文的相反情况与实际证明, 这里可能需要 $B \subset A_1$, 勘误网上并未提及这一点.

行比较, 回到讨论伊始. 根据闭区间套原理, 该迭代程序必定会生成一个趋向于 t 的由不交集的测度构成的序列, 取该测度列对应的集列的极限即得欲求.

若存在 $A_1 \subset X$ 使得对任意 $B \subset A_1$ 而言, 要么 $\mu(B) < \frac{1}{10}\mu(A_1)$, 要么 $\mu(B) > \frac{9}{10}\mu(A_1)$, 不失一般性可将 μ 规范化, 令 $\mu(A_1) = 1$, 下面证明这种情况实际上是不存在的. 设 $\mu_1 = \sup\{\mu(C) : C \subset A_1, \mu(C) < \frac{1}{10}\}$, 根据上确界的定义知存在 $B_1 \subset A_1$ 使得 $\frac{1}{2}\mu_1 \leq \mu(B_1) \leq \mu_1$. 再设 $A_2 = A_1 \setminus B_1$, 取 $\mu_2 = \sup\{\mu(C) : C \subset A_2, \mu(C) < \frac{1}{10}\}$, 类似设置 B_2 等. 依此可定义集列 $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots$ 与实数 $\frac{1}{10} \geq \mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_3 \geq \cdots$. 取 $C \subset A_{n+1}$ 满足 $\mu(C) < \frac{1}{10}$, 则根据 A_{n+1} 的定义知 $C \cup B_n \subset A_n$, 且 $\mu(C \cup B_n) < \mu(C) + \mu(B_n) = \frac{1}{5} < \frac{9}{10}$. 但因为 A_1 的全体子集 B 要么满足 $\mu(B) < \frac{1}{10}\mu(A_1) = \frac{1}{10}$, 要么满足 $\mu(B) > \frac{9}{10}\mu(A_1) = \frac{9}{10}$, 故 $C \cup B_n$ 作为 A_1 的子集, 只能有 $\mu(C \cup B_n) < \frac{1}{10}$, 这说明 $C \cup B_n$ 能被囊入 μ_n 的计算中, 于是

$$\mu_n \geq \mu(C \cup B_n) \stackrel{(A)}{=} \mu(C) + \mu(B_n) \geq \mu(C) + \frac{1}{2}\mu_n$$

其中 (A) 是因为 C 与 B_n 本身不交. 这说明 $\mu_{n+1} \leq \frac{1}{2}\mu_n$, 因而 $\mu(A_n) \geq \frac{4}{5}$ 对全体 $n = 1, 2, \cdots$ 均成立. 现考虑 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 由单调收敛定理知 $\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \geq \frac{4}{5} > 0$, 进而由假设条件可推知它是一个原子, 这与 X 的非原子性相矛盾! 命题即证.

(ii) 首先设 φ 是在 $[0, \infty)$ 上右连续递减的简单函数, 且满足命题要求的其余条件. 设 $\varphi(x) = \sum_{k=1}^K a_k \chi_{[b_{k-1}, b_k)}(x)$, 其中 $a_1 > a_2 > \cdots > a_K, \mu(X) \geq b_K > b_{K-1} > \cdots > b_0 = 0$. 取两两不交的集列 $\{E_k\}_{k=1}^K$ 满足 $\mu(E_k) = b_k - b_{k-1}$, 设 $f(x) = \sum_{k=1}^K a_k \chi_{E_k}(x)$, 则 f 即为欲求.

现对于一般的非负连续递减函数 φ , 根据实变函数的结论知总能找到非负简单函数列 φ_n 在几乎处处的意义下收敛到 φ . 对每个 φ_n 按照上述方法取 f_n , 且通过适当调整 $\{E_k\}_{k=1}^K$ 使得 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有 μ 几乎处处意义下的极限, 记该极限为 f , 知 f 即为欲求.

(iii) 设 $t = \mu(A), A_1 = \{x \in X : |g(x)| > g^*(t)\}, A_2 = \{x \in X : |g(x)| \geq g^*(t)\}$, 显见 $A_1 \subset A_2$. 另一方面根据递降重排的性质 3.15(ii), (xi) 知 $\mu(A_1) \leq t \leq \mu(A_2)$, 进而由 (i) 可知可选取 $\tilde{A}$ 使得 $A_1 \subset \tilde{A} \subset A_2$ 且 $\mu(\tilde{A}) = t = \mu(A)$, 于是

$$\int_{\tilde{A}} g(x) d\mu(x) = \int_X g(x) \chi_{\tilde{A}}(x) d\mu(x) \stackrel{(B)}{=} \int_0^\infty (g \chi_{\tilde{A}})^*(s) ds \stackrel{(C)}{=} \int_0^{\mu(\tilde{A})} g^*(s) ds.$$

其中 (B) 基于递降重排的性质 3.15(xiv), (C) 是因为 $\text{supp}(g \chi_{\tilde{A}}) \subset \tilde{A}$, 故 $s > \mu(\tilde{A})$ 时必有 $(g \chi_{\tilde{A}})^*(s) = 0$.

(iv) 不失一般性, 设 $f, g \geq 0$. 先设 f 是有限简单函数, 记 $f(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{A_j}(x)$, 其中 $a_1 > a_2 > \cdots > a_N > 0, A_j$ 两两不交. 将 f 另写为 $\sum_{j=1}^N b_j \chi_{B_j}$, 其中 $b_j = a_j - a_{j+1}, B_j = \bigcup_{k=1}^j A_k$. 显见 $\{B_j\}_{j=1}^N$ 是递增列, 对每个 B_j 仿照 (iii) 的证明过程对应选取 $\tilde{B}_j$, 则 $\tilde{B}_1 \subset \cdots \subset \tilde{B}_N$, 且函数 $f_1 = \sum_{j=1}^N b_j \chi_{\tilde{B}_j}$ 的分布函数与 f 相等, 进而 $f_1^* = f^*$. 现由 (iii) 知

$$\begin{aligned} \int_X f_1(x) g(x) d\mu(x) &= \sum_{j=1}^N b_j \int_X g(x) \chi_{\tilde{B}_j}(x) d\mu(x) \\ &= \sum_{j=1}^N b_j \int_0^{\mu(\tilde{B}_j)} g^*(s) ds \\ &= \int_0^\infty g^*(s) \sum_{j=1}^N b_j \chi_{[0, \mu(\tilde{B}_j))}(s) ds \\ &= \int_0^\infty f^*(s) g^*(s) ds. \end{aligned}$$

对一般情况, 因为 $f \in L^\infty(X, \mu)$ 总能被有限简单函数列 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 递增逼近, 依照单调收敛定理即得命题. $\square$

引理 3.7 (Hardy 不等式)

若 $0 < b < \infty, 1 \leq p < \infty$, 则

$$\begin{aligned} \left(\int_0^\infty \left(\int_0^x |f(t)| dt \right)^p x^{-b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \frac{p}{b} \left(\int_0^\infty |f(t)|^p t^{p-b-1} dt \right)^{\frac{1}{p}}, \\ \left(\int_0^\infty \left(\int_x^\infty |f(t)| dt \right)^p x^{b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \frac{p}{b} \left(\int_0^\infty |f(t)|^p t^{p+b-1} dt \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$



证明 对第一式, 在乘法群 $(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})$ 上设 $g(x) = |f(x)|x^{1-\frac{b}{p}}, h(x) = x^{-\frac{b}{p}}\chi_{[1,\infty)}(x)$, 知:

$$\begin{aligned} (g * h)(x) &= \int_0^\infty t^{-\frac{b}{p}} \chi_{[1,\infty)}(t) \left| f\left(\frac{x}{t}\right) \right| \left(\frac{x}{t}\right)^{1-\frac{b}{p}} \frac{dt}{t} \\ &= x^{1-\frac{b}{p}} \int_1^\infty t^{-2} \left| f\left(\frac{x}{t}\right) \right| dt = x^{-\frac{b}{p}} \int_0^x |f(t)| dt, \end{aligned}$$

另有

$$\begin{aligned} \|g\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} &= \left(\int_0^\infty (|f(x)|x^{1-\frac{b}{p}})^p \frac{dx}{x} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\int_0^\infty |f(x)|^p x^{p-b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ \|h\|_{L^1(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} &= \int_0^\infty x^{-\frac{b}{p}} \chi_{[1,\infty)}(x) \frac{dx}{x} = \frac{p}{b}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left(\int_0^\infty \left(\int_0^x |f(t)| dt \right)^p x^{-b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}} &= \left(\int_0^\infty \left(x^{-\frac{b}{p}} \int_0^x |f(t)| dt \right)^p \frac{dx}{x} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|g * h\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \|g\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} \|h\|_{L^1(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} \\ &= \frac{p}{b} \left(\int_0^\infty |f(x)|^p x^{p-b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

对第二式, 在乘法群 $(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})$ 上设 $g(x) = |f(x)|x^{1+\frac{b}{p}}, h(x) = x^{\frac{b}{p}}\chi_{(0,1]}(x)$, 知:

$$\begin{aligned} (g * h)(x) &= \int_0^\infty t^{\frac{b}{p}} \chi_{(0,1]}(t) \left| f\left(\frac{x}{t}\right) \right| \left(\frac{x}{t}\right)^{1+\frac{b}{p}} \frac{dt}{t} \\ &= x^{1+\frac{b}{p}} \int_0^1 t^{-2} \left| f\left(\frac{x}{t}\right) \right| dt = x^{\frac{b}{p}} \int_x^\infty |f(t)| dt, \end{aligned}$$

另有

$$\begin{aligned} \|g\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} &= \left(\int_0^\infty (|f(x)|x^{1+\frac{b}{p}})^p \frac{dx}{x} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\int_0^\infty |f(x)|^p x^{p+b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ \|h\|_{L^1(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} &= \int_0^1 x^{\frac{b}{p}} \chi_{(0,1]}(x) \frac{dx}{x} = \frac{p}{b}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \left(\int_0^\infty \left(\int_x^\infty |f(t)| dt \right)^p x^{b-1} dx \right)^{\frac{1}{p}} &= \left(\int_0^\infty \left(\int_x^\infty x^{\frac{b}{p}} |f(t)| dt \right)^p \frac{dx}{x} \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &= \|g * h\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} \\
 &\stackrel{(B)}{\leq} \|g\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} \|h\|_{L^1(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x})} \\
 &= \frac{p}{b} \left(\int_0^\infty |f(t)|^p t^{p+b-1} dt \right)^{\frac{1}{p}},
 \end{aligned}$$

其中 (A), (B) 均为局部紧群上关于卷积的 Minkowski 不等式 1.10. □

定理 3.19 ($L^{p,q}$ 的共轭空间)

若 (X, μ) 是非原子 σ 有限测度空间, 则

- (i) 当 $0 < p < 1, 0 < q \leq \infty$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = \{0\}$;
- (ii) 当 $p = 1, 0 < q \leq 1$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = L^\infty(X, \mu)$;
- (iii) 当 $p = 1, 1 < q < \infty$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = \{0\}$;
- (iv) 当 $p = 1, q = \infty$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* \neq \{0\}$;
- (v) 当 $1 < p < \infty, 0 < q \leq 1$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = L^{p',\infty}(X, \mu)$;
- (vi) 当 $1 < p < \infty, 1 < q < \infty$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = L^{p',q'}(X, \mu)$;
- (vii) 当 $1 < p < \infty, q = \infty$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* \neq \{0\}$;
- (viii) 当 $p = q = \infty$ 时 $(L^{p,q}(X, \mu))^* \neq \{0\}$.



证明 为了方便研究 $(L^{p,q}(X, \mu))^*$ 的形式, 首先考虑刻画 $(L^{p,q}(X, \mu))^*$ 中的元素. 因为 X 是 σ 有限的, 故可记 $X = \bigcup_{N=1}^\infty K_N$, 其中 $\{K_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ 是递增集列, 且对任意 $N \in \mathbb{N}$ 均有 $\mu(K_N) < \infty$. 设 $\mathcal{A}$ 是定义 μ 的 σ 代数, 记 $\mathcal{A}_N = \{A \cap K_N : A \in \mathcal{A}\}$. 取定 $T \in (L^{p,q}(X, \mu))^* (0 < p, q < \infty)$, 对每个 $N = 1, 2, \dots$ 考虑 $\mathcal{A}_N$ 上定义的测度 $\sigma_N(E) = T(\chi_E)$, 知

$$|\sigma_N(E)| = |T(\chi_E)| \leq \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|\chi_E\|_{L^{p,q}} \lesssim \|T\|_{(L^{p,q})^*} \mu(E)^{\frac{1}{p}}.$$

这说明 σ_N 关于 μ 在 $\mathcal{A}_N$ 上的限制绝对连续, 因而根据 Radon-Nikodym 定理知存在唯一⁸复值可测函数 g_N 满足 $\int_{K_N} |g_N(x)| d\mu < \infty$, 且

$$\int_{K_N} f(x) d\sigma_N = \int_{K_N} g_N(x) f(x) d\mu, \quad \forall f \in L^1(K_N, \mathcal{A}_N, \sigma_N). \quad (3.54)$$

因为 $\{K_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ 是递增列, 故 $\mathcal{A}_N \subset \mathcal{A}_{N+1}$, 因而在 $\mathcal{A}_N$ 上 $\sigma_N = \sigma_{N+1}$, 于是在 K_N 上 $g_N = g_{N+1}$ 是 μ 几乎处处成立的, 这说明在 X 上存在一个良定义的可测函数 g 使得其在诸 K_N 上的限制恰为 g_N . 但另一方面, 线性泛函 $f \mapsto T(f)$ 与 $f \mapsto \int_{K_N} f d\sigma_N$ 在 f 为支在 K_N 上的简单函数时是相等的, 进而根据简单函数空间在 $L^1(K_N, \mathcal{A}_N, \sigma_N) \cap L^{p,q}(X, \mu)$ 中的稠密性知它们在 $L^1(K_N, \mathcal{A}_N, \sigma_N) \cap L^{p,q}(X, \mu)$ 中也应相等, 故(3.54)式在 $f \in L^1(K_N, \mathcal{A}_N, \sigma_N) \cap L^{p,q}(X, \mu)$ 时也应等于 $T(f)$.

根据 $\mu(K_N) < \infty$ 知若 $f \in L^\infty(K_N, \mu)$, 则 $f \in L^{p,q}(K_N, \mu) \cap L^\infty(K_N, \sigma_N)$, 而 $L^\infty(K_N, \sigma_N) \subset L^1(K_N, \mathcal{A}_N, \sigma_N)$, 故由(3.54)式与前述讨论知

$$T(f) = \int_X g(x) f(x) d\mu, \quad \forall f \in L^\infty(K_N). \quad (3.55)$$

至此即知对 $L^{p,q}(X, \mu) (0 < p, q < \infty)$ 上的任意线性泛函 T , 总存在函数 g 使得对任意 $N = 1, 2, \dots$ 均有 $\int_{K_N} |g(x)| d\mu < \infty$, 且(3.55)式对任意 $f \in L^\infty(K_N)$ 成立. 下面分别验证 (i)-(viii).

(i) 当 $0 < p < 1$ 时, 往证 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = \{0\}$. 设 $f = \sum_n a_n \chi_{E_n}$ 是 X 上的有限简单函数 (在 $q = \infty$ 时设之为可数简单函数). 因为 X 是非原子的, 故可将每个 E_n 拆分为集列 $\{E_{j,n}\}_{j=1}^m$ 的不交并, 且 $\mu(E_{j,n}) = \frac{1}{m} \mu(E_n) (j =$

⁸在相差一个 μ 零测集的意义下.

$1, \dots, m$). 记 $f_j = \sum_n a_n \chi_{E_{j,n}}$, 计算可知 $\|f_j\|_{L^{p,q}} = m^{-\frac{1}{p}} \|f\|_{L^{p,q}}$. 现若 $T \in (L^{p,q}(X, \mu))^*$, 则

$$|T(f)| \leq \sum_{j=1}^m |T(f_j)| \leq \|T\|_{(L^{p,q})^*} \sum_{j=1}^m \|f_j\|_{L^{p,q}} = \|T\|_{(L^{p,q})^*} m^{1-\frac{1}{p}} \|f\|_{L^{p,q}}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 注意到 $p < 1$, 知 $|T(f)| \leq 0$, 于是只能有 $T = 0$. 根据简单函数空间 (或可数函数空间) 在 $L^{p,q}(X, \mu)$ (或 $L^{p,\infty}(X, \mu)$) 中的稠密性即知 T 总将 f 映为 0 , 此即 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = \{0\}$.

(ii) 当 $p = 1, 0 < q \leq 1$ 时, 往证 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = L^\infty(X, \mu)$. 任取 $h \in L^\infty(X, \mu)$, 知对任意 $f \in L^{1,q}(X, \mu)$ 均有

$$\left| \int_X f(x)h(x)d\mu \right| \leq \|h\|_{L^\infty(X, \mu)} \|f\|_{L^1(X, \mu)} \lesssim \|h\|_{L^\infty(X, \mu)} \|f\|_{L^{1,q}},$$

于是 h 确实对应 $L^{1,q}(X, \mu)$ 上的一个线性泛函. 反之, 若 $T \in (L^{1,q}(X, \mu))^* (q \leq 1)$, 则在 (3.55) 式中令 $f = \chi_E, K \subset K_N$ 知应有

$$\left| \int_E g(x)d\mu \right| = |T(\chi_E)| \leq \|T\|_{(L^{1,q})^*} \|\chi_E\|_{L^{1,q}} \|T\|_{(L^{1,q})^*} q^{-\frac{1}{q}} \mu(E).$$

根据 E 的任意性知只能有 $|g(x)| \leq q^{-\frac{1}{q}} \|T\|_{(L^{1,q})^*}$ 在每个 K_N 上 μ 几乎处处成立, 于是 $\|g\|_{L^\infty} \leq q^{-\frac{1}{q}} \|T\|_{(L^{1,q})^*} < \infty$, 因而 $g \in L^\infty(X, \mu)$. 综上即得 $(L^{1,q}(X, \mu))^* = L^\infty(X, \mu)$.

(iii) 当 $p = 1, 1 < q < \infty$ 时, 往证 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = \{0\}$. 设 $T \in (L^{1,q}(X, \mu))^*$, 根据 (3.55) 式知

$$|T(f)| = \left| \int_X f(x)g(x)d\mu \right| \leq \|T\|_{(L^{1,q})^*} \|f\|_{L^{1,q}}, \quad \forall f \in L^\infty(K_N). \quad (3.56)$$

往证 $g = 0$ 是 μ 几乎处处成立的. 用反证法, 设存在 E_0 使得 $\mu(E_0) > 0$, 且在 E_0 上 $|g(x)| \geq \delta$, 则根据 X 的非原子性知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(E_0 \cap K_N) > 0$. 取 $f(x) = \frac{g(x)}{|g(x)|^2} \chi_{E_0 \cap K_N}(x) h(x) \chi_{h \leq M}(x)$, 其中 h 是一个非负函数, 则 (3.56) 式表明对任意 $h \geq 0$ 均有

$$\|h \chi_{h \leq M}\|_{L^1(E_0 \cap K_N)} \leq \|T\|_{(L^{1,q})^*} \left\| \frac{1}{|g|} h \chi_{h \leq M} \right\|_{L^{1,q}(E_0 \cap K_N)} \leq \frac{1}{\delta} \|T\|_{(L^{1,q})^*} \|h \chi_{h \leq M}\|_{L^{1,q}(E_0 \cap K_N)}.$$

现令 $M \rightarrow \infty$ 知对任意 $h \geq 0$ 均有 $\|h\|_{L^1(E_0 \cap K_N)} \lesssim \|h\|_{L^{1,q}(E_0 \cap K_N)}$, 于是 $L^{1,q}(E_0 \cap K_N) \subset L^1(E_0 \cap K_N)$. 又因为本身有 $L^1(E_0 \cap K_N) \subset L^{1,q}(E_0 \cap K_N)$, 故只能有 $L^1(E_0 \cap K_N) = L^{1,q}(E_0 \cap K_N)$, 但可以证明这在 X 是非原子空间时是不成立的⁹, 故只能有 $g = 0$ 在 μ 几乎处处意义下成立, 因而 $T = 0$, 此即欲证.

(iv) $p = 1, q = \infty$ 的情况是很特殊的. 根据 $L^{p,q}$ 关于 q 的递增性 3.17 知 $L^{1,\infty}$ 上的每个连续线性泛函在 $L^{1,q}(1 < q < \infty)$ 上的限制均为连续线性泛函, 而根据 (iii) 知 $(L^{1,q}(X, \mu))^* = \{0\} (1 < q < \infty)$, 故至少在输入简单函数时, 该线性泛函只能输出 0 . 然而, $(L^{1,\infty}(X, \mu))^*$ 确实包含非平凡线性泛函, 参见 [LG1] 在此处给出的文献.

(v) 当 $1 < p < \infty, 0 < q \leq 1$, 往证 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = L^{p',\infty}(X, \mu)$. 根据 Hardy-Littlewood 不等式 3.5 知

$$\int_X |f(x)g(x)|d\mu(x) \leq \int_0^{\mu(X)} (|fg|)^*(t)dt \stackrel{(A)}{=} \frac{1}{2} \int_0^{2\mu(X)} (|fg|)^*(u)du,$$

其中 (A) 是令 $u = 2t$. 根据递降重排的性质 3.15(iv),(vii) 知

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{2\mu(X)} (|fg|)^*(u)du &\leq \frac{1}{2} \int_0^{2\mu(X)} |f|^*\left(\frac{u}{2}\right) |g|^*\left(\frac{u}{2}\right) du = \int_0^{\mu(X)} |f|^*(t) |g|^*(t) dt \\ &= \int_0^{\mu(X)} f^*(t) g^*(t) dt \leq \int_0^\infty f^*(t) g^*(t) dt. \end{aligned}$$

至此引理即证.

回到原命题, 根据引理 3.5 与 $L^{p,q}$ 关于 q 的递增性 3.17 知在 $f \in L^{p,q}(X, \mu), h \in L^{p',\infty}(X, \mu)$ 时有:

$$\begin{aligned} \int_X |f(x)h(x)|d\mu(x) &\leq \int_0^\infty f^*(t)h^*(t)dt = \int_0^\infty t^{\frac{1}{p}} f^*(t) t^{\frac{1}{p'}} h^*(t) \frac{dt}{t} \\ &\leq \|f\|_{L^{p,1}} \|h\|_{L^{p',\infty}} \leq C_{p,q} \|f\|_{L^{p,q}} \|h\|_{L^{p',\infty}}, \end{aligned}$$

因此每个 $h \in L^{p',\infty}(X, \mu)$ 都能诱导 $L^{p,q}(X, \mu)$ 上的一个有界线性泛函 $f \mapsto \int_X hf d\mu$, 且其算子范数至多为 $C_{p,q} \|h\|_{L^{p',\infty}}$. 相反地, 设 $T \in (L^{p,q}(X, \mu))^* (1 < p < \infty, 0 < q \leq 1)$, 并设 g 对全体 $f \in L^\infty(K_N)$ 均满足 (3.55) 式.

⁹有空则补充证明.

取 $f(x) = \frac{\overline{g(x)}}{|g(x)|} \chi_{K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\}}(x) (\alpha > 0)$, 根据 T 的有界性知

$$\left| \int_X f(x)g(x)d\mu(x) \right| \leq \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|f\|_{L^{p,q}},$$

代入前述 f 知

$$\begin{aligned} \left| \int_X f(x)g(x)d\mu(x) \right| &= \left| \int_{K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\}} \frac{|g(x)|^2}{|g(x)|} d\mu(x) \right| \\ &\geq \alpha \mu(K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\}) \\ \|f\|_{L^{p,q}} &= \|\chi_{K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\}}\|_{L^{p,q}} \\ &= \left(\frac{p}{q}\right)^{\frac{1}{q}} \mu(K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

于是

$$\alpha \mu(K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\}) \leq \left(\frac{p}{q}\right)^{\frac{1}{q}} \|T\|_{(L^{p,q})^*} \mu(K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}},$$

两边同乘 $\mu(K_N \cap \{x \in X: |g(x)| > \alpha\})^{-\frac{1}{p}}$, 令 $N \rightarrow \infty$ 并在两端对 $\alpha > 0$ 取上确界即得 $\|g\|_{L^{p',\infty}} \leq \left(\frac{p}{q}\right)^{\frac{1}{q}} \|T\|_{(L^{p,q})^*} < \infty$, 这说明 $g \in L^{p',\infty}(X, \mu)$, 命题即证.

(vi) 若 $1 < p < \infty, 1 < q < \infty$, 往证 $(L^{p,q}(X, \mu))^* = L^{p',q'}(X, \mu)$. 根据 Hardy-Littlewood 不等式 3.5 与 Hölder 不等式知

$$\left| \int_X f(x)\varphi(x)d\mu(x) \right| \leq \int_0^\infty t^{\frac{1}{p}} f^*(t) t^{\frac{1}{p'}} \varphi^*(t) \frac{dt}{t} \leq \|f\|_{L^{p,q}} \|\varphi\|_{L^{p',q'}},$$

于是每个 $\varphi \in L^{p',q'}(X, \mu)$ 均能确定 $L^{p,q}(X, \mu)$ 上的一个有界线性泛函, 且其算子范数至多为 $\|\varphi\|_{L^{p',q'}}$. 相反地, 设 $T \in (L^{p,q}(X, \mu))^*$, 由 (3.55) 式知 T 由与某个局部可积函数 g 相乘再积分来确定, 故只需证明 $g \in L^{p',q'}(X, \mu)$. 设 $g_{N,M}(x) = g(x) \chi_{K_N}(x) \chi_{\{x \in X: |g(x)| \leq M\}}(x)$, 则对任意 $M, N = 1, 2, \dots$ 均有 $(g_{N,M})^* \leq g^*$, 进而由递降重排的性质 3.15(iv), (viii) 知 $M, N \rightarrow \infty$ 时 $(g_{N,M})^* \uparrow g^*$.

现任取 $f \in L^{p,q}(X, \mu)$ 是有界函数, 知

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f^*(t)(g_{N,M})^*(t)dt &\stackrel{(B)}{=} \sup_{h: d_h = d_f} \left| \int_X h(x)g_{N,M}(x)d\mu(x) \right| \\ &= \sup_{h: d_h = d_f} \left| \int_{K_N} h(x) \chi_{\{x \in X: |g(x)| \leq M\}}(x) g(x) d\mu(x) \right| \\ &= \sup_{h: d_h = d_f} |T(h \chi_{K_N} \chi_{\{x \in X: |g(x)| \leq M\}})| \\ &\leq \sup_{h: d_h = d_f} \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|h \chi_{K_N} \chi_{\{x \in X: |g(x)| \leq M\}}\|_{L^{p,q}} \\ &\leq \sup_{h: d_h = d_f} \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|h\|_{L^{p,q}} \\ &\stackrel{(C)}{=} \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|f\|_{L^{p,q}}, \end{aligned} \tag{3.57}$$

其中 (B) 基于非原子测度空间的性质 3.6(iv), (C) 基于 $L^{p,q}$ 范数的等价计算式 3.16. 为了说明 $\|g\|_{L^{p',q'}} < \infty$, 现需在 (3.57) 式中代入特定的 f 进行估计. 根据非原子测度空间的性质 3.6(ii) 知可选取 X 上的函数 f 使得

$$f^*(t) = \int_{\frac{t}{2}}^\infty s^{\frac{q'}{p'}-1} (g_{N,M})^*(s) s^{q'-1} \frac{ds}{s}. \tag{3.58}$$

根据 $g_{N,M}$ 的构造可知 $(g_{N,M})^*(s) \leq M \chi_{[0, \mu(K_N)]}(s)$, 于是 (3.58) 右式的积分至少是收敛的, 进而有 $f^* \leq c_{p,q} M^{q'-1}$, 这说明 f 本身有界, 且 $t > 2\mu(K_N)$ 时 $f^*(t) = 0$. 故 f 支在一个测度至多为 $2\mu(K_N)$ 的集合上, 因而依照 (3.58) 式定义的 f 有界且在 $L^{p,q}(X, \mu)$ 中.

现在计算 f 的 $L^{p,q}$ 范数知

$$\begin{aligned}\|f\|_{L^{p,q}} &= \left(\int_0^\infty t^{\frac{q}{p}} \left(\int_{\frac{t}{2}}^\infty s^{\frac{q'}{p'}-1} (g_{N,M})^*(s)^{q'-1} \frac{ds}{s} \right)^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\stackrel{(D)}{\leq} C_1(p, q) \left(\int_0^\infty (t^{\frac{1}{p'}} (g_{N,M})^*(t))^{q'} \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= C_1(p, q) \|g_{N,M}\|_{L^{p',q'}}^{\frac{q'}{q}} < \infty,\end{aligned}\quad (3.59)$$

其中 (D) 是 Hardy 不等式 3.7 中 $b = \frac{q}{p}$ 的情况. 现由 (3.57), (3.59) 两式知

$$\int_0^\infty f^*(t) (g_{N,M})^*(t) dt \leq \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|f\|_{L^{p,q}} \leq C_1(p, q) \|T\|_{(L^{p,q})^*} \|g_{N,M}\|_{L^{p',q'}}^{q'-1}. \quad (3.60)$$

另一方面由

$$f^*(t) = \int_{\frac{t}{2}}^\infty s^{\frac{q'}{p'}-1} (g_{N,M})^*(s)^{q'-1} \frac{ds}{s} \geq \int_{\frac{t}{2}}^t s^{\frac{q'}{p'}-1} (g_{N,M})^*(s)^{q'-1} \frac{ds}{s},$$

知

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f^*(t) (g_{N,M})^*(t) dt &\geq \int_0^\infty \left(\int_{\frac{t}{2}}^t s^{\frac{q'}{p'}-1} (g_{N,M})^*(s)^{q'-1} \frac{ds}{s} \right) (g_{N,M})^*(t) dt \\ &\stackrel{(E)}{\geq} \int_0^\infty (g_{N,M})^*(t)^{q'} \left(\int_{\frac{t}{2}}^t s^{\frac{q'}{p'}-1} \frac{ds}{s} \right) dt \\ &= C_2(p, q) \|g_{N,M}\|_{L^{p',q'}}^{q'}.\end{aligned}\quad (3.61)$$

结合 (3.60), (3.61) 两式, 根据 $\|g_{N,M}\|_{L^{p',q'}} < \infty$ 知 $\|g_{N,M}\|_{L^{p',q'}} \leq C(p, q) \|T\|_{(L^{p,q})^*}$, 令 $N, M \rightarrow \infty$ 即知 $\|g\|_{L^{p',q'}} \leq C(p, q) \|T\|_{(L^{p,q})^*} < \infty$, 这便说明了 $g \in L^{p',q'}(X, \mu)$, 命题得证.

(vii) $1 < p < \infty, q = \infty$ 时, $L^{p,q}$ 的共轭空间研究实际上就是弱 L^p 的共轭空间研究, 具体讨论参见 [LG1] 于此处给出的文献.

(viii) $p = q = \infty$ 时, $L^{p,q}$ 的共轭空间研究实际上就是 L^∞ 的共轭空间研究, 它实际上是全体有界有限可加集函数构成的空间, 这在 [KY] 中有所介绍. $\square$

注 $L^{p,q}$ 的共轭空间 3.19 中有些结论在 X 为原子空间时不再成立. 例如 $l^\infty(\mathbb{Z}) \subset (l^p(\mathbb{Z}))^* (0 < p < 1)$, 因而 $(l^p(\mathbb{Z}))^* \neq \{0\}$.

Terence Tao 的讲义 **Introduction, estimates, L^p theory, interpolation** 中介绍了刻画 $L^{p,q}(X, \mu)$ 的另一种办法: 将 f 分解成次阶梯函数或拟阶梯函数之和. 下面简要介绍相关内容:

定义 3.17 (次阶梯函数, 拟阶梯函数)

- 称 f 为高度为 H , 宽度为 W 的次阶梯函数, 如果 $\text{supp } f \subset E, |f(x)| \leq H$ 几乎处处成立, 且 $\mu(E) \leq W$.
- 称 f 为高度为 H , 宽度为 W 的拟阶梯函数, 如果 $\text{supp } f \subset E, |f(x)| \sim H$ 在 E 上几乎处处成立, 且 $\mu(E) \sim W$.

注 从单位区间 $[0, 1]$ 的二进延拓可知高度为 1, 宽度为 W 的非负次阶梯函数 f 总是可以被分解成 $\sum_{k=1}^\infty 2^{-k} f_k$, 其中 f_k 是高度为 1, 宽度至多为 W 的标准阶梯函数. 根据齐次性可知对其它高度有类似的结果, 于是与阶梯函数相关的估计可以自然地过渡到次阶梯函数上去 (进而过渡到拟阶梯函数上).

定理 3.20 ($L^{p,q}$ 的刻画)

设 f 是函数, $0 < p < \infty, 1 \leq q \leq \infty, 0 < A < \infty$, 则下述命题在相差一个常数的意义下等价:

- $\|f\|_{L^{p,q}} \lesssim_{p,q} A$.
- 存在分解 $f = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m$, 其中每个 f_m 都是高度为 2^m , 宽度为 $0 < W_m < \infty$ 的拟阶梯函数, $\{f_m\}_{m \in \mathbb{Z}}$

的支集两两不交, 且

$$\|2^m W_m^{\frac{1}{p}}\|_{l_m^q(\mathbb{Z})} \lesssim_{p,q} A,$$

其中 l_m^q 表示 l^q 范数是对变量 m 取的.

(iii) 存在点态上界 $|f| \leq \sum_{m \in \mathbb{Z}} 2^m \chi_{E_m}$, 其中

$$\|2^m \mu(E_m)^{\frac{1}{p}}\|_{l_m^q(\mathbb{Z})} \lesssim_{p,q} A.$$

(iv) 存在分解 $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n$, 其中每个 f_n 都是宽度为 2^n , 高度为 $0 < H_n < \infty$ 的次阶梯函数, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 的支集两两不交, H_n 关于 n 的递增而不增, 在 f_n 的支集上有界 $H_{n+1} \leq |f_n| \leq H_n$, 且

$$\|H_n 2^{\frac{n}{p}}\|_{l_n^q(\mathbb{Z})} \lesssim_{p,q} A. \quad (3.62)$$

(v) 存在点态上界 $|f| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} H_n \chi_{E_n}$, 其中 $\mu(E_n) \lesssim_{p,q} A$, 且 (3.62) 式成立.



3.8.2.4 某些重要结果在 Lorentz 空间上的推广

回忆 Marcinkiewicz 插值定理 3.4, 该定理讨论的是算子同时满足弱 (p_0, p_0) 不等式与弱 (p_1, p_1) 不等式时是否能成为强 (p, p) 型算子. 实际上, 对指标 (p, p) 的讨论可以拓展到一般的 (p, q) 型算子上, 与之相关的定理拓展称为非对角型 Marcinkiewicz 插值定理. 为介绍该定理, 首先需要引入一些定义.

对测度空间 (X, μ) , 设 $S(X)$ 为 X 上的全体有限简单函数构成的空间, $S_0^+(X)$ 为 $S(X)$ 中全体形如 $\sum_{i=m}^n 2^{-i} \chi_{A_i}$ (其中 $m < n$ 是正整数, A_i 是 X 的有限测度子集) 的函数所构成的集合, 其中 A_i 不需要互异或不交. 通过定义显见 $S_0^+(X)$ 中两个元素的和依旧在 $S_0^+(X)$ 中. 另定义 $S_0^{real}(X) = S_0^+(X) - S_0^+(X)$ 为全体形如 $f_1 - f_2$ ($f_1, f_2 \in S_0^+(X)$) 的函数所构成的空间, $S_0(X)$ 为全体形如 $h_1 + ih_2$ ($h_1, h_2 \in S_0^{real}(X)$) 的函数所构成的空间.

定义 3.18 (拟线性算子, 次线性算子)

定义在 $S_0(X)$ 上的算子 T 称为拟线性算子, 如果存在 $K \geq 1$ 使得

$$|T(\lambda f)| = |\lambda| |T(f)| \text{ 且 } |T(f+g)| \leq K(|T(f)| + |T(g)|)$$

对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与任意 $f, g \in S_0(X)$ 均成立. 当 $K = 1$ 时, 称 T 为次线性算子.



定义 3.19 (受限的弱 (p, q) 型算子)

设 (X, μ) 是测度空间, T 是定义在有限简单函数空间 $S(X)$ 上的线性算子, $0 < p, q \leq \infty$. 称 T 是受限的弱 (p, q) 型算子, 如果

$$\|T(\chi_A)\|_{L^{q,\infty}} \leq C \mu(A)^{\frac{1}{p}} \quad (3.63)$$

对 X 的全体有限测度子集 A 均成立. 估计式 (3.63) 同时称为受限的弱型估计^a.

^a受限的弱型估计与标准的弱型估计区别在于受限的弱型估计仅仅是对有限简单函数做的, 而标准的弱型估计针对的是一般可测函数, 它未必能表成有限简单函数.



将上述定义与 $L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 上的初等插值 3.14 结合可得下述宝宝实插值定理¹⁰:

定理 3.21 (宝宝实插值)

若算子 T 既是受限的弱 (p_0, q_0) 型算子, 又是受限的 (p_1, q_1) 型算子, 那它也是受限的弱 (p, q) 型算子, 其中

¹⁰虽说这个名字还挺可爱, 但是这个名字源于 Terence Tao 的讲义 *Introduction, estimates, L^p theory, interpolation*, 原文就是 baby real interpolation.

p, q 是由某个 $\theta \in (0, 1)$ 经由关系式

$$\begin{aligned}\frac{1}{p} &= \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \\ \frac{1}{q} &= \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.\end{aligned}$$

所确定的.



证明 不妨设 $q_0 < q_1$. 从定义出发, 对 $T: S(X) \rightarrow S(X)$ 而言, 任取 X 上的某有限测度子集 A 有:

$$\begin{aligned}\|T(\chi_A)\|_{L^{q_0, \infty}} &\lesssim_{p_0, q_0} \mu(A)^{\frac{1}{p_0}}, \\ \|T(\chi_A)\|_{L^{q_1, \infty}} &\lesssim_{p_1, q_1} \mu(A)^{\frac{1}{p_1}}.\end{aligned}\tag{3.64}$$

显见 $T(\chi_A) \in L^{q_0, \infty}(X, \mu) \cap L^{q_1, \infty}(X, \mu)$, 故由 $L^{p, \infty}(X, \mu)$ 上的初等插值 3.14 知对任意的 $q \in (q_0, q_1)$ 而言均有 $T(\chi_A) \in L^q(X, \mu)$, 且

$$\|T(\chi_A)\|_{L^q(X, \mu)} \lesssim_{q, q_0, q_1} \|T(\chi_A)\|_{L^{q_0, \infty}}^{\frac{\frac{1}{q} - \frac{1}{q_1}}{\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_1}}} \|T(\chi_A)\|_{L^{q_1, \infty}}^{\frac{\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q}}{\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_1}}}.$$

显见存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得 $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$, 于是 $\frac{1}{q} - \frac{1}{q_0} = \theta(\frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_0})$, $\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q} = (1-\theta)(\frac{1}{q_0} - \frac{1}{q_1})$, 代入上式可得

$$\|T(\chi_A)\|_{L^q(X, \mu)} \lesssim_{q, q_0, q_1} \|T(\chi_A)\|_{L^{q_0, \infty}}^{1-\theta} \|T(\chi_A)\|_{L^{q_1, \infty}}^{\theta}.\tag{3.65}$$

又因为 $L^q(X, \mu) \hookrightarrow L^{q, \infty}(X, \mu)$, 故

$$\|T(\chi_A)\|_{L^{q, \infty}(X, \mu)} \lesssim_q \|T(\chi_A)\|_{L^q(X, \mu)}.\tag{3.66}$$

结合 (3.64)-(3.66) 式得

$$\begin{aligned}\|T(\chi_A)\|_{L^{q, \infty}(X, \mu)} &\lesssim_{q, q_0, q_1} \|T(\chi_A)\|_{L^{q_0, \infty}}^{1-\theta} \|T(\chi_A)\|_{L^{q_1, \infty}}^{\theta} \\ &\lesssim_{q, q_0, q_1, p_0, p_1} \mu(A)^{\frac{1-\theta}{p_0}} \mu(A)^{\frac{\theta}{p_1}} = \mu(A)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

此即欲证. □

现在希望把宝实插值 3.21 的结果推广到 $S_0(X)$ 上, 此即下述定理:

定理 3.22 (非对角的 Marcinkiewicz 插值定理)

设 $0 < r \leq \infty, 0 < p_0 \neq p_1 \leq \infty, 0 < q_0 \neq q_1 \leq \infty, (X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间. 设 T 是输入 X 上的简单函数, 输出 Y 上的可测函数的拟线性算子. 若存在 $M_0, M_1 < \infty$ 使得下述受限的弱型估计对 X 中的任意有限测度子集 A 成立:

$$\|T(\chi_A)\|_{L^{q_0, \infty}(Y, \nu)} \leq M_0 \mu(A)^{\frac{1}{p_0}},\tag{3.67}$$

$$\|T(\chi_A)\|_{L^{q_1, \infty}(Y, \nu)} \leq M_1 \mu(A)^{\frac{1}{p_1}},\tag{3.68}$$

则只要 $0 < \theta < 1$ 且

$$\begin{aligned}\frac{1}{p} &= \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \\ \frac{1}{q} &= \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},\end{aligned}\tag{3.69}$$

就存在常数 $C_*(p_0, q_0, p_1, q_1, K, r, \theta) < \infty$ 使得对任意 $f \in S_0(X)$ 均有

$$\|T(f)\|_{L^{q, r}(Y, \nu)} \leq C_*(p_0, q_0, p_1, q_1, K, r, \theta) M_0^{1-\theta} M_1^{\theta} \|f\|_{L^{p, r}(X, \mu)}.\tag{3.70}$$

另外, 若 $0 < p, r < \infty$, 且 T 是线性 (或以非负函数为输出的次线性) 算子, 则它可以唯一延拓成从 $L^{p, r}(X, \mu)$ 到 $L^{q, r}(Y, \nu)$ 中的算子, 且该延拓能使得 (3.70) 式对全体 $f \in L^{p, r}(X, \mu)$ 均成立.



这个定理的证明实在太过冗杂且并非必要, 这里就省略了. 非对角的 Marcinkiewicz 插值定理 3.22 中最后的延拓依赖于下述类似于 Lebesgue 空间理论中简单函数逼近定理的命题:

命题 3.19 (Lorentz 空间中的简单函数逼近)

对任意 $0 < p, r < \infty$, 空间 $S_0(X)$ 均在 $L^{p,r}(X, \mu)$ 中稠密.

证明 取 $f \in L^{p,r}(X, \mu)$, 设 $f \geq 0$. 根据 $L^{p,q}$ 范数的等价计算式 3.16 与 d_f 在 $[0, \infty)$ 上递减的事实, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有:

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{p,r}(X, \mu)}^r &= p \int_0^\infty (s d_f(s)^{\frac{1}{p}})^r \frac{ds}{s} \\ &\geq p \int_0^{2^{-n}} s^{r-1} (d_f(s))^{\frac{r}{p}} ds \\ &\geq p \int_0^{2^{-n}} s^{r-1} (d_f(2^{-n}))^{\frac{r}{p}} ds \\ &= \frac{p 2^{-nr}}{r} (d_f(2^{-n}))^{\frac{r}{p}}. \end{aligned}$$

这说明 $d_f(2^{-n}) < \infty$. 类似可知

$$\|f\|_{L^{p,r}(X, \mu)}^r \geq p \int_0^{2^n} (d_f(s))^{\frac{r}{p}} s^{r-1} ds = \frac{p 2^{nr}}{r} (d_f(2^n))^{\frac{r}{p}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 为了让 $\frac{p 2^{nr}}{r} (d_f(2^n))^{\frac{r}{p}} = \|f\|_{L^{p,r}(X, \mu)}^r < \infty$, 只能有 $d_f(2^n) \rightarrow 0$, 于是从极限定义出发知对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $k_n \in \mathbb{N}$ 使得

$$d_f(2^{k_n}) = \mu(\{x \in X : f(x) > 2^{k_n}\}) < 2^{-n}.$$

现设 $E_n = \{x \in X : 2^{-n} < f(x) \leq 2^{k_n}\}$, 显见对每个 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\mu(E_n) \leq d_f(2^{-n}) < \infty$. 现将 $f \chi_{E_n}$ 依照二进制展开, 亦即 $f \chi_{E_n}(x) = \sum_{j=-k_n}^\infty d_j(x) 2^{-j}$, 其中 $d_j(x)$ 为 0 或 1. 取 $B_j = \{x \in E_n : d_j(x) = 1\}$, 则 $\mu(B_j) \leq \mu(E_n)$, 且 $f \chi_{E_n}$ 可表为 $f \chi_{E_n}(x) = \sum_{j=-k_n}^\infty 2^{-j} \chi_{B_j}(x)$.

记 $f_n(x) = \sum_{j=-k_n}^\infty 2^{-j} \chi_{B_j}(x)$, 显见 $f_n \in S_0^+(X)$, 且 $f_n \leq f \chi_{E_n} \leq f$. 另知当 $x \in E_n$ 时有

$$f(x) - f_n(x) = \sum_{j=n+1}^\infty 2^{-j} \chi_{B_j}(x) \leq 2^{-n},$$

而当 $x \notin E_n$, 知此时 $f_n(x) = 0$, 且要么 $f(x) > 2^{k_n}$, 要么 $f(x) \leq 2^{-n}$, 进而

$$d_{f-f_n}(2^{-n}) = \mu(E_n \cap \{f - f_n > 2^{-n}\}) + \mu(E_n^c \cap \{f - f_n > 2^{-n}\}) < 2^{-n},$$

于是对 $2^{-n} \leq t < \infty$ 有

$$(f - f_n)^*(t) \leq (f - f_n)^*(2^{-n}) = \inf\{s > 0 : d_{f-f_n}(s) \leq 2^{-n}\} \leq 2^{-n}.$$

因为 n 是任取的, 故对全体 $t \in (0, \infty)$ 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f - f_n)^*(t) = 0$. 现由递降重排的性质 3.15(iv)-(vi) 知对任意 $t \in (0, \infty)$ 有

$$(f - f_n)^*(t) \leq f^*\left(\frac{t}{2}\right) + f_n^*\left(\frac{t}{2}\right) \leq 2f^*\left(\frac{t}{2}\right).$$

现因 $f \in L^{p,r}(X, \mu)$, 故由 Lebesgue 控制收敛定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^{p,r}(X, \mu)} = 0$, 而 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S_0(X)$, 这便对非负的 f 证明了命题.

现对复值函数 $f \in L^{p,r}(X, \mu)$, 记 $f = (f_1 - f_2) + i(f_3 - f_4)$, 其中 $f_j (j = 1, 2, 3, 4)$ 是 $L^{p,r}(X, \mu)$ 上的非负函数. 由前述结论知存在序列 $\{f_n^j\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S_0^+(X) (j = 1, 2, 3, 4)$ 使得 $f_n^j \rightarrow f_j (L^{p,r}(X, \mu))$. 记 $f_n = f_n^1 - f_n^2 + i(f_n^3 - f_n^4)$, 由 $\|\cdot\|_{L^{p,r}(X, \mu)}$ 是拟范数知

$$\|f - f_n\|_{L^{p,r}(X, \mu)} \lesssim_{p,r} \sum_{j=1}^4 \|f_j - f_n^j\|_{L^{p,r}(X, \mu)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

命题即证. □

先前非对角的 Marcinkiewicz 插值定理 3.22 意义在于由两个受限的弱型估计导出一个标准的弱型估计, 下面说明在一定条件下两个受限的弱型估计还能导出一个强 (p, q) 型估计:

推论 3.7

设 T 是非对角的 Marcinkiewicz 插值定理 3.22 中的拟线性算子, $0 < p_0 \neq p_1 \leq \infty, 0 < q_0 \neq q_1 \leq \infty$. 若 T 关于常数 M_0 有受限的弱 (p_0, q_0) 型估计, 关于常数 M_1 有受限的弱 (p_1, q_1) 型估计, 且存在 $0 < \theta < 1$ 使得

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1},$$

$$\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

另外 $p \leq q$, 则 T 对全体 $f \in S_0(X)$ 而言均满足下述强 (p, q) 型估计:

$$\|T(f)\|_{L^q(Y, \nu)} \lesssim_{p_0, q_0, p_1, q_1, \theta} M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^p(X, \mu)}. \quad (3.71)$$

另外, 若 T 是线性 (或以非负函数为输出的次线性) 算子, 则它可以唯一延拓成从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^q(Y, \nu)$ 中的算子, 且该延拓能使得 (3.71) 式对全体 $f \in L^p(X, \mu)$ 均成立. ♥

证明 因为 $\theta \in (0, 1)$, 故必有 $p, q < \infty$. 设 $r = q$, 根据 $L^{p, q}$ 关于 q 的递增性 3.17 与 $p \leq q = r$ 知 $L^p = L^{p, p} \hookrightarrow L^{p, q} = L^{p, r}$, 于是 $\|f\|_{L^{p, r}(X, \mu)} \lesssim \|f\|_{L^p(X, \mu)}$. 于是根据非对角的 Marcinkiewicz 插值定理 3.22 可知

$$\begin{aligned} \|T(f)\|_{L^{q, r}(Y, \nu)} &= \|T(f)\|_{L^{q, q}(Y, \nu)} = \|T(f)\|_{L^q(Y, \nu)} \\ &\lesssim_{p_0, q_0, p_1, q_1, \theta} M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^{p, r}(X, \mu)} \\ &\lesssim_{p_0, q_0, p_1, q_1, \theta} M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^p(X, \mu)}. \end{aligned}$$

□¹¹

3.9 补充: Orlicz 空间

本小节选自 Terence Tao 的讲义 **Introduction, estimates, L^p theory, interpolation**. Orlicz 空间在奇异积分理论中有重要作用, 同时它的一个特殊形式 $L \log L$ 可以提供某种更精细的可积性: 在 PDE 理论中有时会出现一个结论对 L^1 不成立, 但对任意 $\varepsilon > 0$ 而言该结论对 $L^{1+\varepsilon}$ 均成立, 这就需要一个属于 L^1 与 $L^{1+\varepsilon}$ 之间的可积性来精细化这一结论成立的条件, $L \log L$ 便扮演这样的角色.

不同于 L^p -弱 L^p -Lorentz 空间在指标上作的推广, Orlicz 空间的推广动机基于当 $1 \leq p < \infty$ 时有

$$\|f\|_{L^p(X, \mu)} \leq 1 \Leftrightarrow \int_X |f(x)|^p d\mu(x) \leq 1.$$

设 $\Phi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 是函数, 现在问是否存在某个范数 $\|f\|_{\Phi(L)}$ 使得

$$\|f\|_{\Phi(L)} \leq 1 \Leftrightarrow \int_X \Phi(|f(x)|) d\mu(x) \leq 1. \quad (3.72)$$

因为范数本身需要齐次, 故对任意 $A > 0$ 有

$$\|f\|_{\Phi(L)} \leq A \Leftrightarrow \int_X \Phi\left(\frac{|f(x)|}{A}\right) d\mu(x) \leq 1.$$

特别若 $A < A'$, 则应有

$$\int_X \Phi\left(\frac{|f(x)|}{A}\right) d\mu(x) \leq 1 \Rightarrow \int_X \Phi\left(\frac{|f(x)|}{A'}\right) d\mu(x) \leq 1.$$

为保证这一性质, 一个自然的要求就是令 Φ 递增. 为满足零范数的情况, 另要求 $\Phi(0) = 0$.

另外, 为了让 $\|\cdot\|_{\Phi(L)}$ 成为范数, 单位球 $\{f: \|f\|_{\Phi(L)} \leq 1\}$ 还需为凸集. 由 (3.72) 式可知这便要求 Φ 本身是凸函数. 至此即可将所有条件整合在一起, 得到若 $\Phi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 是递增的凸函数, 且 $\Phi(0) = 0$, 则

$$\|f\|_{\Phi(L)} := \inf \left\{ A > 0 : \int_X \Phi\left(\frac{|f(x)|}{A}\right) d\mu(x) \leq 1 \right\}$$

¹¹ 延拓存在唯一性的证明这里先省略了, 有时间的话回来补充.

正是空间 $\Phi(L) := \{f : \|f\|_{\Phi(L)}\} < \infty$ 上的范数¹².

若令 $\Phi(x) := x^p$, 则 $\Phi(L)$ 此时就是经典的 L^p ($1 \leq p < \infty$) 空间. L^∞ 并非 Orlicz 空间, 但可以把它看做 $\Phi(x)$ 在 $x > 1$ 时为 ∞ , 在 $x \leq 1$ 时为零的极限情况 (或更不严谨的说是 $\Phi(x) = x^{+\infty}$). 在 L^p 空间之外, 还可以定义下述常见的 Orlicz 空间:

- $L \log L$, 其中 $\Phi(x) := x \log(2+x)$;
- e^L , 其中 $\Phi(x) := e^x - 1$;
- e^{L^2} , 其中 $\Phi(x) := e^{x^2} - 1$.

$\Phi(x)$ 中常数 (比如 2 和 1) 的选取并不重要. 注意若函数 $\Phi, \tilde{\Phi}$ 是可比较的, 那么它们所诱导的 Orlicz 范数也可比较, 亦即若 $\Phi \lesssim \tilde{\Phi}$, 则 $\|f\|_{\Phi(L)} \lesssim \|f\|_{\tilde{\Phi}(L)}$ ¹³. 这方面与极大算子理论结合的一个经典结果由 [ST6] 给出:

定理 3.23

若 f 是支在紧集 B 上的可积函数, 则 $Mf \in L^1(B)$ 当且仅当 $f \log^+ f \in L^1(B)$.



3.10 一个外插值定理

本节选自 [LG1] 的习题, 列于此处旨在为偶函数诱导的奇异积分算子 L^p 有界性定理 4.7 的证明作准备.

前面所提及的 Riesz-Thorin 插值定理与 Marcinkiewicz 插值定理都是内插值的相关定理, 事实上还有“外插值”这一说法:

定理 3.24 (外插值)

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是测度空间, $\mu(X) < \infty, \nu(Y) < \infty$. 若对每个 $1 < p \leq 2$ 而言, T 都是 $L^p(X) \rightarrow L^p(Y)$ 的可数次可加算子, 且其算子范数 $\|T\|_{L^p(X) \rightarrow L^p(Y)} \leq A(p-1)^{-\alpha}$, 其中 $A, \alpha > 0$ 是固定的常数^a, 则对 X 上的任意可测函数 f 均有

$$\int_Y |T(f)| d\nu \leq 6A(1 + \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left[\int_X |f| (\log_2^+ |f|)^\alpha d\mu + C_\alpha + \mu(X)^{\frac{1}{2}} \right],$$

其中 $C_\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} k^\alpha (\frac{2}{3})^k$.

^a可数次可加意为对任意 $f_j \in L^p(X)$, 只要 $\sum_j f_j \in L^p(X)$, 就有 $|T(\sum_j f_j)| \leq \sum_j |T(f_j)|$.



证明 任取 X 上的可测函数 f , 根据可测性知它可以写成

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(x) \chi_{S_k}(x),$$

其中 $S_k = \{x \in X : 2^k \leq |f(x)| < 2^{k+1}\}$ ($k \geq 1$), $S_0 = \{x \in X : |f(x)| < 2\}$. 当 $k \geq 1$ 时, 有:

$$\begin{aligned} \int_Y |T(f \chi_{S_k})| d\nu &= \int_Y |T(f \chi_{S_k})| \cdot 1 d\nu \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \left(\int_Y |T(f \chi_{S_k})|^{\frac{k+1}{k}} d\nu \right)^{\frac{k}{k+1}} \left(\int_Y d\nu \right)^{\frac{1}{k+1}} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} A \left(\frac{k+1}{k} - 1 \right)^{-\alpha} \left(\int_X |f \chi_{S_k}|^{\frac{k+1}{k}} d\mu \right)^{\frac{k}{k+1}} \nu(Y)^{\frac{1}{k+1}} \\ &= Ak^\alpha \nu(Y)^{\frac{1}{k+1}} \left(\int_{S_k} |f|^{\frac{k+1}{k}} d\mu \right)^{\frac{k}{k+1}} \\ &\stackrel{(C)}{\leq} Ak^\alpha \nu(Y)^{\frac{1}{k+1}} \left(\int_{S_k} 2^{(k+1)\frac{k+1}{k}} d\mu \right)^{\frac{k}{k+1}} \end{aligned}$$

¹²这种范数定义称为 Luxemburg 范数

¹³一般来说 $L \log L$ 上用于诱导范数的函数有 $x \log^+ x$ 和 $x \log(C+x)$ 两种取法, 实践中我们通常用前一种取法.

$$= 2A\nu(Y)^{\frac{1}{k+1}} 2^k k^\alpha \mu(S_k)^{\frac{k}{k+1}},$$

其中 (A) 是 Hölder 不等式, (B) 利用了 T 的算子范数, (C) 基于 S_k 的构造. 注意对 $k \geq 1$ 还有 $\nu(Y)^{\frac{1}{k+1}} \leq \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}}$, 现对 $k \geq 1$ 将上式关于 k 求和:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \int_Y |T(f\chi_{S_k})| d\nu &\leq \sum_{k=1}^{\infty} 2A\nu(Y)^{\frac{1}{k+1}} 2^k k^\alpha \mu(S_k)^{\frac{k}{k+1}} \\ &\leq 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \sum_{k=1}^{\infty} 2^k k^\alpha \mu(S_k)^{\frac{k}{k+1}} \\ &= 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ \mu(S_k) \geq 3^{-k-1}}} 2^k k^\alpha \mu(S_k)^{\frac{k}{k+1}} + \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ \mu(S_k) \leq 3^{-k-1}}} 2^k k^\alpha \mu(S_k)^{\frac{k}{k+1}} \right) \\ &\leq 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ \mu(S_k) \geq 3^{-k-1}}} 2^k k^\alpha \mu(S_k)^{\frac{k}{k+1}} + \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ \mu(S_k) \leq 3^{-k-1}}} \left(\frac{2}{3}\right)^k k^\alpha \right) \\ &= 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 3^{k+1}\mu(S_k) \geq 1}} \left(\frac{2}{3}\right)^k k^\alpha (3^{k+1}\mu(S_k))^{\frac{k}{k+1}} + C_\alpha \right) \\ &= 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 3^{k+1}\mu(S_k) \geq 1}} \left(\frac{2}{3}\right)^k k^\alpha 3^{k+1} \mu(S_k) + C_\alpha \right) \\ &\leq 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(3 \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 3^{k+1}\mu(S_k) \geq 1}} 2^k k^\alpha \mu(S_k) + C_\alpha \right) \\ &= 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(3 \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 3^{k+1}\mu(S_k) \geq 1}} \int_{S_k} 2^k k^\alpha d\mu + C_\alpha \right) \\ &\leq 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(3 \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ 3^{k+1}\mu(S_k) \geq 1}} \int_{S_k} |f|(\log_2^+ |f|)^\alpha d\mu + C_\alpha \right) \\ &\leq 2A \max(1, \nu(Y))^{\frac{1}{2}} \left(3 \int_X |f|(\log_2^+ |f|)^\alpha d\mu + C_\alpha \right), \end{aligned} \quad (3.73)$$

而当 $k=0$ 时有

$$\begin{aligned} \int_Y |T(f\chi_{S_0})| d\nu &\leq \int_Y |T(f\chi_{S_0})| \cdot 1 d\nu \leq \left(\int_Y |T(f\chi_{S_0})|^2 d\nu \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_Y d\nu \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \nu(Y)^{\frac{1}{2}} A \left(\int_X |f\chi_{S_0}|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} = A\nu(Y)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{S_0} |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq A\nu(Y)^{\frac{1}{2}} 4 \left(\int_{S_0} d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq A\nu(Y)^{\frac{1}{2}} 4\mu(X)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned} \quad (3.74)$$

结合(3.73),(3.74)两式, 由 T 的可数次可加性即得欲证. $\square$

注 可以看出外插值定理3.24描述的是由 T 在小范围内的性质可以推得 T 在大范围内的性质, 这与内插值所对应的“先看端点情况, 再看中值情况”在某种意义上是相反的.

第四章 卷积型奇异积分算子

从本章起往后的章节主要参考 [LG1].

奇异积分的研究动机主要来源于它与调和分析中一些最重要的问题的联系, 例如 Fourier 级数的收敛性. Hilbert 变换则是所有奇异积分的原型, 它是 Fourier 级数 L^p 收敛性研究的一大抓手. 在数学史上, Hilbert 变换理论脱胎于复分析的技巧. 随着 Calderón-Zygmund 学派的发展与一维理论在高维的拓展, 实分析方法渐渐取代了原先的复分析方法. 高维理论的框架已经得到了一次次验证, 它为奇异积分打开了通往数学其它领域的大门. 现如今, 奇异积分已经深深地和 PDE, 算子理论, 多复值函数等等领域结合在了一起. 本章研究通过与缓增分布的卷积定义的奇异积分, 这类奇异积分称为卷积型奇异积分算子.

4.1 Hilbert 变换与 Riesz 变换

研究奇异积分算子之前, 首先需要仔细研究 Hilbert 变换, 它是奇异积分理论后续发展的源泉所在.

4.1.1 Hilbert 变换的定义和基本性质

Hilbert 变换的引入有几种等价的方法, 这里我们先把它定义为一个主值分布, 后面会讨论其它的等价定义.

设缓增分布 $W_0 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 定义为:

$$\langle W_0, \varphi \rangle = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \frac{1}{\pi} \int_{|x| \geq 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad (4.1)$$

下面说明 W_0 确实是缓增分布. 因为函数 $\frac{1}{x}$ 在 $[-1, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, 1]$ 上的积分为 0, 故(4.1)右式第一项中的 $\varphi(x)$ 可以换成 $\varphi(x) - \varphi(0)$. 根据微分中值定理有

$$\left| \int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx \right| \leq \int_{|x| < 1} \|\varphi'\|_{L^\infty(\mathbb{R})} dx \leq C \|\varphi'\|_{L^\infty(\mathbb{R})}, \quad (4.2)$$

又因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故(4.1)右式至少是有意义的¹. 另一方面知

$$\left| \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right| \leq \int_{|x| > 1} \|x\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \frac{1}{x^2} dx \leq C \|x\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R})}. \quad (4.3)$$

于是结合(4.2),(4.3)两式可知

$$|\langle W_0, \varphi \rangle| \leq C(\|\varphi'\|_{L^\infty(\mathbb{R})} + \|x\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R})}).$$

根据缓增分布的等价刻画2.28知 W_0 确为缓增分布.

定义 4.1 (截断 Hilbert 变换, Hilbert 变换)

函数 $f \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ (高度为 ε) 的截断 Hilbert 变换定义为

$$H^{(\varepsilon)}(f)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{|y| \geq \varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy = \frac{1}{\pi} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{f(y)}{x-y} dy. \quad (4.4)$$

$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的 Hilbert 变换定义为

$$H(\varphi)(x) = (W_0 * \varphi)(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H^{(\varepsilon)}(\varphi)(x). \quad (4.5)$$

根据 Hölder 不等式显见 $H^{(\varepsilon)}(f)$ 对全体 $f \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ 都是良定义的². 但对 Schwartz 函数

¹考虑 Schwartz 函数的等价刻画2.22, 此时可取 $|\varphi(x)| \leq \frac{C}{1+|x|}$, 于是 $\int_{|x| \geq 1} \frac{|\varphi(x)|}{x} dx \leq \int_{|x| \geq 1} \frac{C dx}{x(1+|x|)} \leq 2 \int_1^\infty \frac{C dx}{x^2} < \infty$.

²对 $f \in L^p(\mathbb{R})$, 在 $p > 1$ 时 $\int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{f(y)}{x-y} dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{\chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y)}{x-y} dy \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} \cdot \left(\int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{dy}{|x-y|^{p'}} \right)^{\frac{1}{p'}} < \infty$, 而 $p = 1$ 时 $\int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{|f(y)|}{|x-y|} dy \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} |f(y)| dy \leq \frac{1}{\varepsilon} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} < \infty$.

φ 而言, 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x-y)}{y} dy$ 并不一定对全体 $x \in \mathbb{R}$ 都绝对收敛³. 不过这个积分可以定义为绝对收敛积分族 $\int_{|y| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x-y)}{y} dy$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时的极限⁴. 这样的极限称为主值积分, 记作 p.v. 于是根据这个记号, Schwartz 函数 φ 的 Hilbert 变换可以写成:

$$H(\varphi)(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x-y)}{y} dy = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(y)}{x-y} dy. \quad (4.6)$$

注 前面我们是对 Schwartz 函数定义的 Hilbert 变换, 实际上 Hilbert 变换本身可以作用在更广的一类函数上. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数, 且在每个 $x \in \mathbb{R}$ 附近满足 Hölder 条件, 亦即

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists \varepsilon_x > 0 \exists C_x > 0 \exists \delta_x > 0 (|x-y| < \delta_x \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq C_x |x-y|^{\varepsilon_x}).$$

则

$$\begin{aligned} H^{(\varepsilon)}(f)(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{\varepsilon_x < |x-y| < \delta_x} \frac{f(y)}{x-y} dy + \frac{1}{\pi} \int_{|x-y| \geq \delta_x} \frac{f(y)}{x-y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\varepsilon_x < |x-y| < \delta_x} \frac{f(y) - f(x)}{x-y} dy + \frac{1}{\pi} \int_{|x-y| \geq \delta_x} \frac{f(y)}{x-y} dy. \end{aligned}$$

显见上右式两个积分均收敛⁵, 于是 $H^{(\varepsilon)}(f)(x)$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时存在极限.

例 4.1 对区间 $[a, b]$ 的示性函数 $\chi_{[a,b]}$ 而言有

$$H(\chi_{[a,b]})(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x-a}{x-b} \right|, \quad (4.7)$$

这是因为对固定的 x , 选取 $\varepsilon < \min(|x-a|, |x-b|)$. 当 $b < x$ 时知

$$\begin{aligned} H^{(\varepsilon)}(\chi_{[a,b]})(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{x+\varepsilon}^{\infty} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{x-\varepsilon} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy \\ &= 0 + \frac{1}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{x-y} = \frac{1}{\pi} (\log |x-a| - \log |x-b|) = \frac{1}{\pi} \log \frac{x-a}{x-b}. \end{aligned}$$

当 $x < a$ 时知

$$\begin{aligned} H^{(\varepsilon)}(\chi_{[a,b]})(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{x+\varepsilon}^{\infty} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{x-\varepsilon} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{x-y} + 0 = \frac{1}{\pi} (\log |x-a| - \log |x-b|) = \frac{1}{\pi} \log \frac{|x-a|}{|x-b|}. \end{aligned}$$

当 $x \in (a, b)$ 时知

$$\begin{aligned} H^{\varepsilon}(\chi_{[a,b]})(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{x+\varepsilon}^{\infty} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{x-\varepsilon} \frac{\chi_{[a,b]}(y)}{x-y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{x+\varepsilon}^b \frac{dy}{x-y} + \frac{1}{\pi} \int_a^{x-\varepsilon} \frac{dy}{x-y} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\log \frac{|x-a|}{\varepsilon} + \log \frac{\varepsilon}{|x-b|} \right) = \frac{1}{\pi} \log \frac{|x-a|}{|x-b|}. \end{aligned} \quad (4.8)$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即可. 注意到(4.8)式中 ε 的消去本质上是因为 $\frac{1}{x}$ 在对称区间 $\varepsilon < |x| < c$ 上积分为零. 另若 x 靠近 a 或 b ,

³例如取 $\varphi_0(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上为 1, 在 $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ 上为 0, 再对 φ_0 磨光化得到 φ , 显见 $\varphi(0) = 1$, 而 $\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\varphi(x-y)}{y} \right| dy \geq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dy}{|y|}$ 不绝对收敛.

⁴极限的存在性就是缓增分布 W_0 的良好定性.

⁵第一个等号到第二个等号是因为 $\int_{\varepsilon_x < |x-y| < \delta_x} \frac{dy}{x-y} = 0$, 第二个等号后第一项有控制 $\int_{\varepsilon_x < |x-y| < \delta_x} \left| \frac{f(y)-f(x)}{x-y} \right| dy \leq \int_{\varepsilon_x < |x-y| < \delta_x} |x-y|^{\varepsilon_x-1} dy < \infty$, 第二项有 $\int_{|x-y| \geq \delta_x} \left| \frac{f(y)}{x-y} \right| dy \leq \frac{2}{\delta_x} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} < \infty$, 其中最后一个不等号基于 f 的可积性.

则 $H(\chi_{[a,b]})(x)$ 会以对数速度爆破, 而若 $x \rightarrow \infty$, 则 $H(\chi_{[a,b]})(x)$ 会以 $\frac{1}{|x|}$ 的速度衰减⁶.

例 4.2 设 $\log^+ x$ 在 $x \geq 1$ 时等于 $\log x$, 其余情况等于 0⁷. 上例的情况实际上可以更精确地写成

$$H^{(\varepsilon)}(\chi_{[a,b]})(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \log^+ \frac{|x-a|}{\max(\varepsilon, |x-b|)}, & x > b \\ -\frac{1}{\pi} \log^+ \frac{|x-b|}{\max(\varepsilon, |x-a|)}, & x < a \\ \frac{1}{\pi} \log^+ \frac{|x-a|}{\varepsilon} - \frac{1}{\pi} \log^+ \frac{|x-b|}{\varepsilon}, & a < x < b. \end{cases}$$

下面利用 Fourier 变换给出 Hilbert 变换的另一种刻画, 为此我们需要计算(4.1)式中定义的缓增分布 W_0 的 Fourier 变换. 固定 $\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 函数, 有:

$$\begin{aligned} \langle \widehat{W_0}, \varphi \rangle &= \langle W_0, \widehat{\varphi} \rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|\xi| \geq \varepsilon} \widehat{\varphi}(\xi) \frac{d\xi}{\xi} \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\frac{1}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq \varepsilon} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-i2\pi x \xi} dx \frac{d\xi}{\xi} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \left(\frac{1}{\pi} \int_{\frac{1}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq \varepsilon} e^{-i2\pi x \xi} \frac{d\xi}{\xi} \right) dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \left(\frac{-i}{\pi} \int_{\frac{1}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq \varepsilon} \sin(2\pi x \xi) \frac{d\xi}{\xi} \right) dx \\ &\stackrel{(B)}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \left(\left(\frac{-i}{\pi} \operatorname{sgn} x \right) \int_{\frac{2\pi}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq 2\pi\varepsilon} \sin(|x|\xi) \frac{d\xi}{\xi} \right) dx. \end{aligned} \quad (4.9)$$

其中 (A) 是因为代入 $e^{-i2\pi x \xi} = \cos(2\pi x \xi) - i \sin(2\pi x \xi)$ 后, $\frac{\cos(2\pi x \xi)}{\xi}$ 关于 ξ 是奇函数, 在对称区间上积分为零.

(B) 是将 $2\pi\xi$ 看成了新的 ξ , 并代入了 $\sin(x\xi) = \operatorname{sgn}(x) \sin(|x|\xi)$. 要使得(4.9)最后的式子有意义, 就希望控制 $\int_{\frac{2\pi}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq 2\pi\varepsilon} \sin(|x|\xi) \frac{d\xi}{\xi}$. 事实上, 存在常数 $M > 0$ 使得对任意 $0 < a < b < \infty$ 总有 $|\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx| \leq M$, 这是因为只需讨论 $a < \pi < b$ 的情况⁸, 此时

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| &\leq \left| \int_a^\pi \frac{\sin x}{x} dx \right| + \left| \int_\pi^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \\ &\leq \int_0^\pi dx + \left| \frac{\cos b}{b} + \frac{1}{\pi} + \int_\pi^b \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \\ &\leq \pi + \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} + \int_\pi^\infty \frac{dx}{x^2} = M. \end{aligned} \quad (4.10)$$

进一步, 在数学分析的课程中已经知道⁹ $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 于是

$$\int_{\frac{2\pi}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq 2\pi\varepsilon} \frac{\sin(|x|\xi)}{\xi} d\xi \rightarrow \pi, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理即得

$$\langle \widehat{W_0}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) (-i \operatorname{sgn} x) dx. \quad (4.11)$$

这说明在缓增分布的意义下有

$$\widehat{W_0}(\xi) = -i \operatorname{sgn} \xi. \quad (4.12)$$

⁶精确来讲此时衰减速度等同于 $\log(1 + \frac{1}{x})$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时的速度.

⁷该函数在偶函数核的奇异积分算子部分会再次接触.

⁸ $0 < a < b < \pi$ 时是显然的, $\pi < a < b < \infty$ 时在 $(\pi, 2\pi)$ 上知 $|\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx| = -\int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \leq -\frac{1}{\pi} \int_a^b \sin x dx \leq M$, 之后的每一段类似如此.

⁹Dirichlet 积分的结论.

特别地, (4.12)式表明 $\widehat{W}_0$ 是 (有界) 函数. 利用(4.12)式与 Fourier 反演定理知¹⁰

$$H(f)(x) = (\widehat{f}(\xi)(-i \operatorname{sgn} \xi))^\vee(x). \quad (4.13)$$

该式子给出了 Hilbert 变换的另一种定义¹¹. 由(4.13)式与 Plancherel 定理立得¹²

$$\|H(f)\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}, \quad (4.14)$$

也就是说 H 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的等距变换.

另外, 注意到 $(-i \operatorname{sgn} \xi)^2 = -1$, 故 H 还满足¹³

$$H^2 = HH = -I, \quad (4.15)$$

其中 I 是恒同算子. H 的伴随算子通过下式唯一定义¹⁴:

$$\langle f, H(g) \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{H(g)(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} H^*(f)(x) \overline{g(x)} dx = \langle H^*(f), g \rangle.$$

显见 H^* 对应的 Fourier 乘子为¹⁵ $-i \operatorname{sgn} \xi = i \operatorname{sgn} \xi$, 于是 $H^* = -H$. 同理对 H^t 有 $H^t = -H$.

4.1.2 Hilbert 变换与解析函数的联系

下面研究 Hilbert 变换与 Poisson 核的关系. 回忆 Poisson 核在函数上的作用, 知对实值函数 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$) 有

$$(P_y * f)(x) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{(x-t)^2 + y^2} dt. \quad (4.16)$$

因为函数 $t \mapsto ((x-t)^2 + y^2)^{-1}$ 在 $y > 0$ 时是 $L^{p'}$ 函数, 故由 Hölder 不等式知积分(4.16)绝对收敛.

现设 $\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z$ 分别代表复数 z 的实部和虚部, 观察到¹⁶

$$(P_y * f)(x) = \operatorname{Re} \left(\frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{x-t+iy} dt \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{z-t} dt \right),$$

其中 $z = x + iy$. 现在对于定义在 $\mathbb{R}_+^2 = \{z = x + iy : y > 0\}$ 上的函数

$$F_f(z) = \frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{z-t} dt,$$

显见 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} F_f(z) = 0$, 故其在 $\mathbb{R}_+^2$ 上解析¹⁷. 根据前面的讨论已经知道 $F_f(x + iy)$ 的实部为 $(P_y * f)(x)$, 而其虚部为:

$$\operatorname{Im} \left(\frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{x-t+iy} dt \right) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)(x-t)}{(x-t)^2 + y^2} dt =: (f * Q_y)(x),$$

其中 Q_y 称为共轭 Poisson 核:

$$Q_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}. \quad (4.17)$$

现记 $u_f(x + iy) = (f * P_y)(x)$, $v_f(x + iy) = (f * Q_y)(x)$, 因为 $F_f = u_f + iv_f$ 是解析函数, 故 u_f, v_f 互为共轭调和函数¹⁸. 前面在 Poisson 的恒等逼近定理2.9中已经说明了在 $y \rightarrow 0$ 时有 $P_y * f \rightarrow f$ ($L^p(\mathbb{R})$), 现在自然希望知道 $f * Q_y$ 在 $y \rightarrow 0$ 时有怎样的极限, 此即下述定理:

¹⁰因为 $H(f)$ 作为 Schwartz 函数和缓增分布的卷积是 C^∞ 函数, 故可以应用 Fourier 反演定理. 回忆 $H(f)(x) = (W_0 * f)(x)$, 两边同时应用 Fourier 变换与逆变换, 左式不变, 右式为 $(\widehat{W_0 * f})^\vee = (\widehat{W_0} \widehat{f})^\vee = (\widehat{f}(-i \operatorname{sgn} \xi))^\vee$.

¹¹注意至此为止 Hilbert 变换都是对 Schwartz 函数作的, [JD] 表明这个定义方式可以把 Hilbert 变换的定义进一步延拓到 L^2 上.

¹²这是因为 $\|H(f)\|_{L^2} = \|\widehat{H(f)}\|_{L^2} = \|\widehat{f}(-i \operatorname{sgn} \xi)\|_{L^2} = \|\widehat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$, 最后一个等号把范数写开即得.

¹³ $H^2(f) = H((\widehat{f}(\xi)(-i \operatorname{sgn} \xi)^\vee)) = (\widehat{f}(\xi)(-i \operatorname{sgn} \xi)(-i \operatorname{sgn} \xi))^\vee = f$.

¹⁴唯一性是因为若 $(H^*)'$ 也满足该式子, 则 $\int_{\mathbb{R}} (H^*(f) - (H^*)'(f)) \bar{g} dx = 0$, 根据 g 的任意性只能有 $H^*(f) = (H^*)'(f)$ 几乎处处成立.

¹⁵参见 [LG1]pg.151: 若 $T = (\widehat{f}m)^\vee$, 则 $T^* = (\widehat{f\bar{m}})^\vee, T^t = (\widehat{f\bar{m}})^\vee$.

¹⁶ $\frac{i}{x-t+iy} = \frac{i(x-t)+y}{(x-t)^2+y^2}$.

¹⁷ $F_f(z)$ 的良好性是因为设 $z = x_z + iy_z$ ($x_z \in \mathbb{R}, y_z > 0$), 当 $y_z \neq 0$ 时 $F_f(z)$ 显然是良定义的. 对于其解析性, 从 [Zo] 的观点出发可以验证求导与积分在这里是可换的, 于是只需要看 $\frac{1}{z-t}$ 在 $z \in \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}, t \in \mathbb{R}$ 时是否解析即可, 而这是显然的.

¹⁸解析函数的实部和虚部均为调和函数, 这两个函数互为共轭调和函数.

定理 4.1 (共轭 Poisson 核的逼近定理)

设 $1 \leq p < \infty$, 则对任意 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 而言, $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$f * Q_\varepsilon - H^{(\varepsilon)}(f) \rightarrow 0 \quad (4.18)$$

同时在 L^p 和 a.e. 的意义下成立. 另外对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 与 a.e. $x \in \mathbb{R}$ 均有

$$F_\varphi(x + iy) = \frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(t)}{x + iy - t} dt \rightarrow \varphi(x) + iH(\varphi)(x), \quad y \rightarrow 0^+. \quad (4.19)$$



证明 在待证的(4.18)式中, 对每个 ε 有

$$\begin{aligned} (Q_\varepsilon * f)(x) - \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} \frac{f(x-t)}{t} dt &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{t}{t^2 + \varepsilon^2} f(x-t) dt - \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} \frac{f(x-t)}{t} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{t}{t^2 + \varepsilon^2} - \frac{\chi_{|t| \geq \varepsilon}(t)}{t} \right) f(x-t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} (f * \psi_\varepsilon)(x), \end{aligned}$$

其中 $\psi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} \psi(\frac{x}{\varepsilon})$, 且

$$\psi(t) = \begin{cases} \frac{t}{t^2+1} - \frac{1}{t}, & |t| \geq 1, \\ \frac{t}{t^2+1}, & |t| < 1. \end{cases} \quad (4.20)$$

显见 ψ 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 且 $\int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$. 另外, 可积函数

$$\Psi(t) = \begin{cases} \frac{1}{t^2+1}, & |t| \geq 1, \\ 1, & |t| < 1. \end{cases} \quad (4.21)$$

是 ψ 的正递减控制径向函数 (径向递减主部), 亦即其作为偶函数在 $[0, \infty)$ 上递减, 且满足 $|\psi| \leq \Psi$. 根据恒等逼近定理的推广 3.1¹⁹, 代入 $a = 0$ 知 $f * \psi_\varepsilon \rightarrow 0 (L^p(\mathbb{R}^n))$. 另由恒等逼近族微分定理的推广 3.4²⁰, 代入 $a = 0$ 知 $f * \psi_\varepsilon \rightarrow 0$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 a.e. 成立. 至此即得(4.18)式.

(4.19)式是(4.18)式的一个推论, 因为

$$F_\varphi(x + iy) = (\varphi * P_y)(x) + i(\varphi * Q_y)(x) \xrightarrow{(A)} \varphi(x) + iH^{(y)}(\varphi)(x) \xrightarrow{(B)} \varphi(x) + iH(\varphi)(x), \quad y \rightarrow 0^+,$$

其中 (A) 基于 Poisson 核的恒等逼近定理与(4.18)式; (B) 是 Hilbert 变换 (通过截断 Hilbert 变换逼近) 的定义. $\square$

注 之后会说明对 $f \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ 而言, $H^{(\varepsilon)}(f)$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时都将在 a.e. (且当 $p > 1$ 时同样在 L^p) 意义下收敛到某函数 $\tilde{H}(f)$. 通过这种方式定义的线性算子 $\tilde{H}$ 是对 Schwartz 函数定义的 Hilbert 变换 H 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的延拓, 同样将其记为 H . 因此对 $f \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ 总有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * Q_\varepsilon)(x) = H(f)(x), \quad \text{a.e.}$$

而在 L^p 意义下, 基于共轭 Poisson 核的逼近定理 4.1 知上述收敛性依旧成立.

4.1.3 Hilbert 变换的 L^p 有界性

Hilbert 变换 L^p 有界性的证明有多种方法. Stein 和 Weiss 在 [STW] 中证明了下述引理:

¹⁹ 定理 3.1 本身需要的条件有三条: 存在常数 $c > 0$ 使得 $\|\psi_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq c$ 对任意 ε 成立, $\int_{\mathbb{R}} \psi_\varepsilon(x) dx = a$ 对任意 ε 成立, 对任意 $\delta > 0$ 均有 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \delta} |\psi_\varepsilon(x)| dx = 0$. 其中第一条就是引入 Ψ 的原因, 第二条是 $\int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$ 中将 t 换成 $\frac{t}{\varepsilon}$ 得到的, 第三条基于 ψ 本身到无穷远处积分的收敛性.

²⁰ 见 [LG1]pg.97 Cor.2.1.19, 直接套用即可.

引理 4.1

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是测度有限的可测集, 则

$$d_{H(\chi_E)}(\alpha) = \frac{4|E|}{e^{\pi\alpha} - e^{-\pi\alpha}}, \alpha > 0.$$



又注意到 $x \geq 0$ 时总有 $x \leq \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, 于是对实轴上的全体有限测度集 E 均有

$$d_{H(\chi_E)}(\alpha) = |\{x \in \mathbb{R} : |H(\chi_E)(x)| > \alpha\}| = \frac{4|E|}{e^{\pi\alpha} - e^{-\pi\alpha}} \leq \frac{4|E|}{2\pi\alpha} = \frac{2}{\pi} \frac{|E|}{\alpha}, \alpha > 0, \quad (4.22)$$

这说明 H 满足受限的弱 (1,1) 型估计. 另一方面, H 的 L^2 等距性(4.14)表明 H 满足强 (2,2) 型估计, 进而它必满足受限的弱 (2,2) 型估计. 现在在非对角的 Marcinkiewicz 插值定理3.22中令 $p_0 = q_0 = 1, p_1 = q_1 = 2$, 记 $p = q = r \in (p_0, p_1) = (1, 2)$, 则由 H 的线性性知对任意 $f \in L^{p,r}(\mathbb{R}) = L^p(\mathbb{R})$ 均有

$$\|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} = \|H(f)\|_{L^{q,r}(\mathbb{R})} \lesssim_p \|f\|_{L^{p,r}(\mathbb{R})} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R})},$$

于是 H 作为 $L^p(\mathbb{R}) (1 < p < 2)$ 上的算子均有界. 当 $2 < p < \infty$, 根据 $H^* = -H$ 与 L^p 作为 $L^{p'}$ 的共轭空间这一事实可知:

$$\begin{aligned} \|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} H(f)(x) \cdot g(x) dx \right| = \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot H^*(g)(x) dx \right| \\ &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot (-H(g)(x)) dx \right| = \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot H(g)(x) dx \right| \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} \|H(g)\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} = C_{p'} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} \end{aligned}$$

这便说明了 H 作为 $L^p(\mathbb{R}) (2 < p < \infty)$ 上的算子的有界性²¹.

下面介绍 Riesz 的证明方法, 这套方法的优势在于可以给出 $p = 2^k$ 时 Hilbert 变换的 L^p 范数.

定理 4.2 (Riesz)

任取 $1 < p < \infty$, 均存在正常数 C_p 使得

$$\|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}, \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

另外, 若 $2 \leq p < \infty$, 则 $C_p \leq 2p$; 若 $1 < p \leq 2$, 则 $C_p \leq \frac{2p}{p-1}$, 因此 Hilbert 变换 H 在 $L^p(\mathbb{R}) (1 < p < \infty)$ 上有有界延拓.



证明 第一部分: 我们首先证明对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 均有

$$(H(f))^2 = f^2 + 2H(fH(f)) \quad (4.23)$$

a.e. 成立. (4.23)式有两种证明方法, 下面逐一介绍.

第一种方法: 考虑定义在上半平面的解析函数²²

$$F_f(z) = \frac{i}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(t)}{z-t} dt$$

²¹这一套思路跟 [JD] 的思路 (后面会提到) 是差不多的, 难点也是此消彼长: [JD] 上的证明花了很大笔墨去说明 H 不仅仅满足受限的弱型估计, 实际上它满足标准的弱型估计, 方法就是 Calderón-Zygmund 分解, 之后就不需要再用非对角的 Marcinkiewicz 插值定理, 而是直接用经典的 Marcinkiewicz 插值定理得到结果; [LG1] 上的这一证明并不需要 H 是标准的弱型估计, 从而标准的 Marcinkiewicz 插值定理在这里没法套用, 因而必须考虑非对角的 Marcinkiewicz 插值定理.

²²这个函数已经在前面共轭 Poisson 核的逼近定理4.1处引入过了.

下面计算其平方. 固定 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Im} z > 0$ 与 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则对任意固定的 $\varepsilon > 0$ 均有:

$$\begin{aligned}
 F_f(z)^2 &= \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(t)f(s)}{(z-t)(z-s)} dt ds \\
 &= \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{|t-s|>\varepsilon} + \int_{|t-s|\leq\varepsilon} \right) \frac{f(t)f(s)}{(z-t)(z-s)} ds dt \\
 &= \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} \int_{|t-s|>\varepsilon} \frac{f(t)f(s)}{t-s} \left(\frac{1}{z-t} - \frac{1}{z-s} \right) dt ds - \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{|t-s|\leq\varepsilon} \frac{f(t)f(s)}{(z-t)(z-s)} dt ds \\
 &= \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} f(t) \int_{|t-s|>\varepsilon} \frac{f(s)}{t-s} ds \frac{dt}{z-t} - \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} f(s) \int_{|t-s|>\varepsilon} \frac{f(t)}{t-s} dt \frac{ds}{z-s} - \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{|t-s|\leq\varepsilon} \frac{f(t)f(s)}{(z-t)(z-s)} dt ds.
 \end{aligned}$$

因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 根据 Schwartz 函数的等价刻画 2.22 可以说明上式诸被积函数均被 L^1 函数控制. 现在根据截断 Hilbert 变换的定义知

$$F_f(z)^2 = \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} f(t) H^{(\varepsilon)}(f)(t) \frac{dt}{z-t} + \left(\frac{i}{\pi}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} f(s) H^{(\varepsilon)}(f)(s) \frac{ds}{z-s} - \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{|t-s|\leq\varepsilon} \frac{f(t)f(s)}{(z-t)(z-s)} dt ds.$$

在上式两端令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$F_f(z)^2 = i \frac{i}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{2f(t)H(f)(t)}{z-t} dt. \quad (4.24)$$

现在在 (4.24) 式中令 $z = x + iy$ 并让 $y \rightarrow 0^+$, 在共轭 Poisson 核的逼近定理 4.1 的结论 (4.19) 式中考虑 $F_{2fH(f)}$ 可知在 a.e. 意义下有²³

$$F_f(z)^2 \rightarrow i(2fH(f)(x) + iH(2fH(f))(x)),$$

另一方面, 因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 故 $F_f(z) \rightarrow f(x) + iH(f)(x) (y \rightarrow 0^+)$ a.e. 成立, 于是 $F_f(z)^2 \rightarrow (f(x) + iH(f)(x))^2 (y \rightarrow 0^+)$ a.e. 成立, 根据极限的唯一性知

$$(f + iH(f))^2 = f^2 - H(f)^2 + i2fH(f) = i(2fH(f) + iH(2fH(f)))$$

a.e. 成立, 比较两边实部即得 $f^2 - H^2(f) = -H(2fH(f))$, 此即欲证.

第二种方法: 记 $m(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi)$, 对 (4.23) 右式作用 Fourier 变换知

$$\begin{aligned}
 \widehat{f^2}(\xi) + 2[H(fH(f))]^\wedge(\xi) &= (\widehat{f} * \widehat{f})(\xi) + 2m(\xi)(\widehat{f} * \widehat{H(f)})(\xi) \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) d\eta + 2m(\xi) \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) m(\eta) d\eta \quad (4.25)
 \end{aligned}$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) d\eta + 2m(\xi) \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) m(\xi - \eta) d\eta, \quad (4.26)$$

对 (4.25), (4.26) 两式取平均可得

$$\widehat{f^2}(\xi) + 2[H(fH(f))]^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) [1 + m(\xi)(m(\eta) + m(\xi - \eta))] d\eta.$$

又因为 $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0)\}$ 时根据 $m(\xi)$ 的定义有:

$$1 + m(\xi)m(\eta) + m(\xi)m(\xi - \eta) = m(\eta)m(\xi - \eta),$$

故

$$\begin{aligned}
 &\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) [1 + m(\xi)(m(\eta) + m(\xi - \eta))] d\eta \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \widehat{f}(\xi - \eta) m(\eta)m(\xi - \eta) d\eta = \int_{\mathbb{R}} \widehat{H(f)}(\eta) \widehat{H(f)}(\xi - \eta) d\eta = (\widehat{H(f)} * \widehat{H(f)})(\xi).
 \end{aligned}$$

至此即得

$$\widehat{f^2}(\xi) + 2[H(fH(f))]^\wedge(\xi) = (\widehat{H(f)} * \widehat{H(f)})(\xi).$$

两边作 Fourier 逆变换并利用 Fourier 反演定理即得 (4.23) 式.

²³ 因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 而 $H(f)$ 本质上是 Schwartz 函数与缓增分布的卷积, 故由 Schwartz 函数与缓增分布卷积的刻画 2.19 知 $H(f) \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且根据 L^2 保距性可知 $H(f)$ 在远处不会爆破, 因此 $2fH(f)$ 依旧是 Schwartz 函数.

第二部分: 在证明(4.23)式后, 下面研究 $p = 2^k$ 时 H 的 L^p 估计. 根据 Hilbert 变换的 L^2 等距性(4.14)知 H 在 $p = 2^k, k = 1$ 时 L^p 算子范数为 1, 下面考虑归纳法: 设 $p = 2^k$ 时 H 满足 $\|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} \leq c_p$, 则对非零实值函数²⁴ $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 有

$$\begin{aligned} \|H(f)\|_{L^{2p}(\mathbb{R})} &= \|(H(f))^2\|_{L^p(\mathbb{R})}^{\frac{1}{2}} = \|f^2 + 2H(fH(f))\|_{L^p(\mathbb{R})}^{\frac{1}{2}} \\ &\leq (\|f^2\|_{L^p(\mathbb{R})} + 2\|H(fH(f))\|_{L^p(\mathbb{R})})^{\frac{1}{2}} \\ &\leq (\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}^2 + 2c_p\|fH(f)\|_{L^p(\mathbb{R})})^{\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} (\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}^2 + 2c_p\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}\|H(f)\|_{L^{2p}(\mathbb{R})})^{\frac{1}{2}}, \end{aligned} \quad (4.27)$$

其中 (A) 是 Hölder 不等式. 据此可知 $\|H(f)\|_{L^{2p}(\mathbb{R})} < \infty$, 由归纳原理即知 $p = 2^k (k \in \mathbb{N})$ 时总有 $\|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} < \infty$. 另外根据(4.27)式可知当 $\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})} \neq 0$ 时有²⁵

$$\left(\frac{\|H(f)\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}}{\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}} \right)^2 - 2c_p \frac{\|H(f)\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}}{\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}} - 1 \leq 0, \quad p = 2^k,$$

解得

$$\frac{\|H(f)\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}}{\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})}} \leq c_p + \sqrt{c_p^2 + 1},$$

因此 H 在 $L^{2p}(\mathbb{R})$ 上的算子范数不大于

$$c_{2p} \leq c_p + \sqrt{c_p^2 + 1}. \quad (4.28)$$

至此我们已经说明了在 $p = 2^k (k = 1, 2, \dots)$ 时 H 是 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界线性算子, 根据 Riesz-Thorin 插值定理 2.24 知对全体 $p \geq 2$ 而言, H 都是 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界线性算子²⁶. 又因为 H 是反自伴算子 (即 $H^* = -H$), 根据对偶性即知 H 也是 $L^p(\mathbb{R}) (1 < p \leq 2)$ 上的有界线性算子²⁷.

第三部分: 下面给出 H 具体的算子范数上界. 回忆三角恒等式

$$\cot \frac{x}{2} = \cot x + \sqrt{1 + \cot^2 x}, \quad 0 < x \leq \frac{\pi}{2},$$

而函数 $x \mapsto x + \sqrt{1 + x^2}$ 本身是单增的, 故若 $c_p \leq \cot \frac{\pi}{2p}$, (4.28)式就表明

$$c_{2p} \leq c_p + \sqrt{c_p^2 + 1} \leq \cot \frac{\pi}{2p} + \sqrt{1 + \cot^2 \frac{\pi}{2p}} = \cot \frac{\pi}{2 \cdot 2p}.$$

因为 $1 = \cot \frac{\pi}{4} = \cot \frac{\pi}{2 \cdot 2}$, 归纳可知 $\cot \frac{\pi}{2p}$ 确为 $p = 2^k (k = 1, 2, \dots)$ 时 H 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的一个算子范数上界. 根据对偶性知 $\cot \frac{\pi}{2p'} = \tan \frac{\pi}{2p}$ 即为 $p = \frac{2^k}{2^k - 1} (k = 1, 2, \dots)$ 时 H 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的一个算子范数上界²⁸. 此时这两种上界已经可以刻画 $p \rightarrow 1$ 与 $p \rightarrow \infty$ 时算子范数 $\|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})}$ 的表现了. 事实上, 因为 $p \geq 2$ 时 $\cot \frac{\pi}{2p} \leq p$, 故由 Riesz-Thorin 插值定理知 $2 \leq p < \infty$ 时有²⁹ $\|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} \leq 2p$, 根据对偶性即知 $1 < p \leq 2$ 时 $\|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} \leq \frac{2p}{p-1}$, 定理至此即证. $\square$

注 事实上可以证明 Hilbert 变换 H 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的算子范数当 $2 \leq p < \infty$ 时就是 $\cot \frac{\pi}{2p}$, 而当 $1 < p \leq 2$ 时就是 $\tan \frac{\pi}{2p}$.

²⁴因为 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $S(\mathbb{R})$ 中稠密, 故只需要对 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 中的函数说明结论, 之后取极限即可.

²⁵ $\|f\|_{L^{2p}(\mathbb{R})} = 0$ 不用讨论了: 此时 f 必为 0, 而命题对 0 显然成立.

²⁶例如当 $k = 1, 2$, 则已知 H 同时是 $L^2(\mathbb{R})$ 与 $L^4(\mathbb{R})$ 上的有界线性算子, 从线性性可知它当然是 $L^2(\mathbb{R}) + L^4(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) + L^4(\mathbb{R})$ 的有界线性算子, 套用 Riesz-Thorin 插值定理即得只要 $\frac{1}{p} \in (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}) \Rightarrow p \in (2, 4)$, 总能得到 H 是 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界线性算子.

²⁷仿照前面 [JD] 的 Riesz-Kolmogorov 定理证法即得.

²⁸当 $p = \frac{2^k}{2^k - 1}$ 时, 知 $p' = 2^k$, 于是

$$\|H(f)\|_{L^p} = \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} H(f)(x)g(x)dx \right| = \sup_{\|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)H(g)(x)dx \right| \leq \|f\|_{L^p} \|H\|_{L^{p'} \rightarrow L^{p'}} \leq c_{p'} \|f\|_{L^p}$$

²⁹如果记 $k_p = \inf\{k \in \mathbb{N} : p \leq 2^k\}$, $p^* = 2^{k_p}$, 则显见 $\frac{p^*}{2} \leq p \leq p^* \leq 2p$. 现在已知 $c_2 = 1$, 对固定的 $p \geq 2$, 已知 $1 \leq c_{p^*} \leq \cot \frac{\pi}{2p^*}$, 于是对 $p \in (1, p^*)$ 作 Riesz-Thorin 插值, 取 $\theta \in (0, 1)$ 满足 $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{p^*}$, 知 $\|H\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq c_{p^*}^\theta = (\cot \frac{\pi}{2p^*})^\theta \leq \cot \frac{\pi}{2p} \leq p^* \leq 2p$. 这便是 $2p$ 的由来. $1 < p \leq 2$ 的情形完全类似于上一注的说明.

注 我们或许会好奇 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时 Hilbert 变换的 L^p 有界性是怎样的. 例4.1中计算的 $\chi_{[a,b]}$ 的 Hilbert 变换显然是无界且不可积的 (其中不可积是因为它在 $x \rightarrow \infty$ 时行为类似于 $\frac{1}{|x|}$). 在无穷远附近的这一行为暗示了 Hilbert 变换可能将 $L^1(\mathbb{R})$ 映入 $L^{1,\infty}(\mathbb{R})$ (因为 $\frac{1}{|x|}$ 正是在 $L^{1,\infty}$ 中而不在 L^1 中的函数). 事实也正是如此, 该命题称为 Kolmogorov 定理.

注 [JD] 中也给出了 Hilbert 变换 L^p 有界性的一种经典证明方法, 这种方法需要用到 Calderón-Zygmund 分解:

定理 4.3 (Riesz-Kolmogorov)

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则有下列两个断言成立:

(i) (Kolmogorov) H 是弱 $(1, 1)$ 型算子:

$$|\{x \in \mathbb{R} : |H(f)(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

(ii) (M. Riesz) H 是强 (p, p) 型算子:

$$\|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$



证明 (i) 固定 $\lambda > 0$, 设 f 非负. 根据 Calderón-Zygmund 分解定理3.2, 知存在函数 $g, b \in \mathbb{R}$ 与不交区间列 $\{I_j\}$ 使得

- (a) $f(x) = g(x) + b(x)$;
- (b) $\|g\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$, 且 $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq 2\lambda$;
- (c) $b(x) = \sum_j b_j(x)$, 其中 $\text{supp } b_j \subset I_j$;
- (d) $\int_{I_j} b_j(x) dx = 0$;
- (e) $\|b_j\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq 2\lambda |I_j|$;
- (f) $|\Omega| \leq \sum_j |I_j| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$.

其中 $\Omega = \bigcup_j I_j$. 现根据 (a) 与 Hilbert 变换的线性性知 $H(f) = H(g) + H(b)$, 故

$$|\{x \in \mathbb{R} : |H(f)(x)| > \lambda\}| \leq \left| \left\{x \in \mathbb{R} : |H(g)(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \right| + \left| \left\{x \in \mathbb{R} : |H(b)(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \right|.$$

现在要证明 H 是弱 $(1, 1)$ 型算子, 就是分别要证明

$$\begin{cases} |\{x \in \mathbb{R} : |H(g)(x)| > \frac{\lambda}{2}\}| \lesssim \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R})}}{\lambda}, \\ |\{x \in \mathbb{R} : |H(b)(x)| > \frac{\lambda}{2}\}| \lesssim \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R})}}{\lambda}. \end{cases}$$

对第一项, 应用 Hilbert 变换的 L^2 等距性(4.14)有:

$$\begin{aligned} \left| \left\{x \in \mathbb{R} : |H(g)(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \right| &= \int_{\{x: |H(g)(x)| > \frac{\lambda}{2}\}} 1 dx = \int_{\{x: \frac{2}{\lambda} |H(g)(x)| > 1\}} 1 dx \\ &\leq \int_{\{x: \frac{2}{\lambda} |H(g)(x)| > 1\}} \left(\frac{2}{\lambda} |H(g)(x)| \right)^2 dx \leq \frac{4}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} |H(g)(x)|^2 dx \\ &= \frac{4}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} |g(x)|^2 dx \stackrel{(A)}{\leq} \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx \stackrel{(B)}{\leq} \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx, \end{aligned}$$

其中 (A), (B) 均基于 Calderón-Zygmund 分解的结论 (b).

对第二项, 设 $2I_j$ 是与 I_j 同心, 长度增倍的区间, 并设 $\Omega^* = \bigcup_j 2I_j$, 则 $|\Omega^*| \leq 2|\Omega|$, 且

$$\begin{aligned} \left| \left\{x \in \mathbb{R} : |H(b)(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \right| &\leq |\Omega^*| + \left| \left\{x \notin \Omega^* : |H(b)(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\} \right| \\ &\leq 2|\Omega| + \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{\lambda} \chi_{x \notin \Omega^* : |H(b)(x)| > \frac{\lambda}{2}}(x) dx \\ &\stackrel{(C)}{\leq} 2 \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R})}}{\lambda} + \frac{2}{\lambda} \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega^*} |H(b)(x)| dx, \end{aligned}$$

其中 (C) 基于 Calderón-Zygmund 分解的结论 (f). 至此只需要证明 $\int_{\mathbb{R} \setminus \Omega^*} |H(b)(x)| dx \lesssim \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$ 即可, 为此注意

到

$$|H(b)(x)| = |H(\sum_j b_j)(x)| \leq \sum_j |H(b_j)(x)|, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}$$

在 $\sum_j b_j$ 是有限和时, 上式是显然的. 而当 $\sum_j b_j$ 是无限和时, 根据 Calderón-Zygmund 分解的结论 (c) 知 $\sum_j b_j$ 在 L^2 意义下收敛到 b , 故根据 Hilbert 变换的 L^2 等距性知 $H(\sum_{j=1}^J b_j) = \sum_{j=1}^J Hb_j =: \{S_J\}_J$ 也在 L^2 意义下收敛到 Hb . 又因为 L^p 意义下的收敛能导出依测度收敛, 故 $\{S_J\}_J$ 依测度收敛到 Hb , 再由依测度收敛的 Riesz 定理知存在子列 $\{S_{J_k}\}_k$ 几乎处处收敛到 Hb , 上述不等式进而依旧成立. 于是说明 $\int_{\mathbb{R} \setminus \Omega^*} |H(b)(x)| dx \lesssim \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$, 只需说明

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \lesssim \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

因为 $\text{supp } b_j \subset I_j$, 故当 $x \notin 2I_j$ 时, 式子

$$H(b_j)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{I_j} \frac{b_j(y)}{x-y} dy$$

依旧有意义. 记 I_j 的心为 c_j , 根据 Calderón-Zygmund 分解的性质 (d) 知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |H(b_j)(x)| dx &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \left| \int_{I_j} \frac{b_j(y)}{x-y} dy \right| dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \left| \int_{I_j} b_j(y) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right) dy \right| dx \\ &\leq \frac{1}{\pi} \int_{I_j} |b_j(y)| \left(\int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|y-c_j|}{|x-y||x-c_j|} dx \right) dy \\ &\stackrel{(D)}{\leq} \frac{1}{\pi} \int_{I_j} |b_j(y)| \left(\int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} dx \right) dy, \end{aligned}$$

其中 (D) 是因为 $|y-c_j| < \frac{I_j}{2}, |x-y| > \frac{x-c_j}{2}$ (见图 4.1).




图 4.1: c_j, y, x 示意图

现在计算 (D) 右式的内层积分, 不妨设 $I_j = (-a, a), c_j = 0$, 有

$$\int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} dx = \left(\int_{-\infty}^{-2a} + \int_{2a}^{\infty} \right) \frac{2a}{|x|^2} dx = 4a \left(-\frac{1}{\infty} + \frac{1}{2a} \right) = 2,$$

故

$$\begin{aligned} \sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |H(b_j)(x)| dx &\leq \frac{2}{\pi} \sum_j \int_{I_j} |b_j(y)| dy = \frac{2}{\pi} \sum_j \int_{I_j} \left| f(y) - \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f(x) dx \right| dy \\ &\leq \frac{2}{\pi} \sum_j \left(\int_{I_j} |f(x)| dx + \int_{I_j} |f(x)| dx \right) \leq \frac{4}{\pi} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}, \end{aligned}$$

至此, f 非负时的 Kolmogorov 定理得证, 又因为 Calderón-Zygmund 分解定理 3.2 实际上对任意复值函数 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 均成立, 故上述方法可以完全套用到一般复值函数 f 上, Kolmogorov 定理得证.

(ii) 根据 Kolmogorov 定理知 H 是弱 $(1, 1)$ 型算子, 又根据 Hilbert 变换的 L^2 等距性 (4.14) 知 H 是强 $(2, 2)$ 型算子, 故根据 Marcinkiewicz 插值定理 3.4 可知 H 是强 (p, p) ($1 < p < 2$) 型算子. 若 $p > 2$, 则根据 Hilbert 变换的反

自伴性 (即 $H^* = -H$) 与 $p < 2$ 时的结论知

$$\begin{aligned}\|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} H(f)(x) \overline{g(x)} dx \right| = \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot \overline{H^*(g)(x)} dx \right| \\ &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot \overline{H(g)(x)} dx \right| \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \|H(g)\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} = C_{p'} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}.\end{aligned}$$

□

为了进一步研究 Hilbert 变换在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的延拓, 就需要研究用于定义 Hilbert 变换的截断 Hilbert 变换的收敛性, 而收敛性的研究就离不开极大函数, 这引出了下述定义:

定义 4.2 (极大 Hilbert 变换)

极大 Hilbert 变换定义为下述算子:

$$H^{(*)}(f)(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |H^{(\varepsilon)}(f)(x)|, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty). \quad (4.29)$$



根据 Hölder 不等式, $H^{(\varepsilon)}(f)$ 对全体 $f \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ 均为收敛积分, 因而 $H^{(*)}(f)$ 对 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 良定义, 但也存在一些特殊的 x 使得 $H^{(*)}(f)(x) = \infty$:

例 4.3 回忆对示性函数 $\chi_{[a,b]}$ 作的 Hilbert 变换, 知 $H(\chi_{[a,b]})(x) = \frac{1}{\pi} \log \frac{|x-a|}{|x-b|}$, 于是可以验证

$$H^{(*)}(\chi_{[a,b]})(x) = \frac{1}{\pi} \left| \log \frac{|x-a|}{|x-b|} \right|.$$

但一般来说 $H^{(*)}(f)(x) \neq |H(f)(x)|$ (比如把 f 取成两不交闭区间的示性函数).

根据 Hilbert 变换 H 的定义可知当 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 时 $H^{(\varepsilon)}(f)$ 点态收敛到 $H(f)$, 这是出于 $\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-y)}{y} dy$ 点态有意义与 f 的连续性. 现在如果对 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 成立估计 $\|H^{(*)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 根据算子族的点态收敛定理 3.2 与 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中的稠密性即知对 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 同样有 $H^{(\varepsilon)}(f) \rightarrow H(f)$ 几乎处处成立, 据此即可给出 $L^p(\mathbb{R})$ 上的 Hilbert 变换定义. 这个延拓相较于 Riesz 定理 4.2 要更详细一些, 因为 Riesz 定理只断言存在有界延拓, 却没有给出刻画它的方法. 下面的定理就总结了这些想法:

定理 4.4 (极大 Hilbert 变换的 L^p 有界性)

若 $1 < p < \infty$, 则

$$\|H^{(*)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C \max\{p, (p-1)^{-1}\} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}. \quad (4.30)$$

另外对全体 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $H^{(\varepsilon)}(f)$ 都在 L^p 与几乎处处的意义下收敛到 $H(f)$.



证明 [LG2] 中具体给出了 $\max\{p, (p-1)^{-1}\}$ 这一上界³⁰, 下面只证明 $\|H^{(*)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$ 这一结论.

回忆 Poisson 核 P_ε 与共轭 Poisson 核 Q_ε 的定义 (4.16), (4.17). 现在取定 $1 < p < \infty$, 先断言下式在 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 时成立:

$$f * Q_\varepsilon = H(f) * P_\varepsilon, \quad \varepsilon > 0, \quad (4.31)$$

于是有等式

$$H^{(\varepsilon)}(f) = H^{(\varepsilon)}(f) - f * Q_\varepsilon + H(f) * P_\varepsilon. \quad (4.32)$$

回忆 (4.20) 式中定义的 ψ , 可知

$$H^{(\varepsilon)}(f)(x) - (f * Q_\varepsilon)(x) = -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x-y) \psi_\varepsilon(y) dy. \quad (4.33)$$

又因为 ψ 能被依 (4.21) 式定义的 Ψ 控制, 故由推论 3.2 知

$$\sup_{\varepsilon > 0} |H^{(\varepsilon)}(f)(x) - (f * Q_\varepsilon)(x)| \leq \frac{1}{\pi} \|\Psi\|_{L^1(\mathbb{R})} M(f)(x), \quad (4.34)$$

³⁰根据 [LG2]pg.229Thm4.2.4(4.2.4) 式, 原本有 $\|T^{(*)}(f)\|_{L^p} \leq C_n(A+B) \max(p, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p}$ (且无勘误), 但这里勘误网将结论修改为 $\max(p, (p-1)^{-2})$, 可能最后是勘误有问题吧.

其中 M 是 Hardy-Littlewood 极大函数. 又因为 P_1 也是正递减可积径向函数, 故根据正递减可积径向函数生成的恒等逼近族性质 3.4 知

$$\sup_{\varepsilon>0} |(H(f) * P_\varepsilon)(x)| \leq \|P_1\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} M(H(f))(x) = M(H(f)). \quad (4.35)$$

现由 (4.32), (4.34), (4.35) 三式知对任意 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 有

$$\begin{aligned} \sup_{\varepsilon>0} |H^{(\varepsilon)}(f)(x)| &\leq \sup_{\varepsilon>0} |H^{(\varepsilon)}(f)(x) - (f * Q_\varepsilon)(x)| + \sup_{\varepsilon>0} |(H(f) * P_\varepsilon)(x)| \\ &\leq \frac{1}{\pi} \|\Psi\|_{L^1(\mathbb{R})} M(f)(x) + M(H(f)), \end{aligned}$$

这便得到了 Cotlar 不等式

$$|H^{(*)}(f)(x)| \leq \frac{1}{\pi} \|\Psi\|_{L^1(\mathbb{R})} M(f)(x) + M(H(f)). \quad (4.36)$$

回忆 Hardy-Littlewood 极大函数的强 (p, p) 型不等式 3.8 知 $\|M(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, $\|M(H(f))\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim_p \|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 又根据 Riesz 定理 4.2 知 $\|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 故 $\|H^{(*)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 这便说明了 $H^{(*)}$ 的 L^p 有界性.

下面证明最开始的断言 (4.31) 式. 只需证明 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的情况即可, 这是因为对任意 $1 < p < \infty$, 已经有³¹ $P_\varepsilon, Q_\varepsilon \in L^{p'}(\mathbb{R})$, 而根据 $\overline{\mathcal{S}(\mathbb{R})} = L^p(\mathbb{R})$ 知对任意 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 均存在序列 $\{\phi_j\}_{j \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 使得 $\|f - \phi_j\|_{L^p(\mathbb{R})} \rightarrow 0$, 所以在 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的情况成立后, 对 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 的情况利用 Lebesgue 控制收敛定理把极限拿进卷积产生的积分号内就完成证明了. 现在当 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 时, 对 (4.31) 式两边作 Fourier 变换知只需证明

$$\widehat{f} \cdot \widehat{Q_\varepsilon} = \widehat{H(f)} \cdot \widehat{P_\varepsilon},$$

又因为 $\widehat{P_\varepsilon}(\xi) = e^{-2\pi\varepsilon|\xi|}$, $\widehat{H(f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi)(-i \operatorname{sgn} \xi)$, 故只需证明

$$\widehat{f}(\xi) \cdot \widehat{Q_\varepsilon}(\xi) = \widehat{f}(\xi)(-i \operatorname{sgn} \xi) \cdot e^{-2\pi\varepsilon|\xi|}.$$

亦即只需证

$$((-i \operatorname{sgn} \xi) \cdot e^{-2\pi|\xi|})^\vee(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + 1}. \quad (4.37)$$

而

$$\begin{aligned} ((-i \operatorname{sgn} \xi) e^{-2\pi|\xi|})^\vee(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi|\xi|} (-i \operatorname{sgn} \xi) e^{i2\pi x \xi} d\xi \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{-2\pi\xi} \sin(2\pi x \xi) d\xi \\ &\stackrel{(A)}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\xi} \sin(x\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (e^{-\xi})'' \sin(x\xi) d\xi \\ &= -\frac{x}{\pi} \int_0^{\infty} (e^{-\xi})' \cos(x\xi) d\xi \\ &\stackrel{(B)}{=} -\frac{x}{\pi} \left(-1 + x \int_0^{\infty} e^{-\xi} \sin(x\xi) d\xi \right), \end{aligned}$$

由 (A)=(B) 即得 (4.37) 式.

到此为止, 因为 $H^{(*)}$ 是强 (p, p) 型算子, 故其必为弱 (p, p) 型算子, 于是由算子族的点态收敛性 3.3, $\overline{\mathcal{S}(\mathbb{R})} = L^p(\mathbb{R})$ 与 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow H^{(\varepsilon)}(f) \rightarrow H(f)$ a.e. 知函数族 $\{H^{(\varepsilon)}(f)\}_{\varepsilon>0}$ 在 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 时 a.e. 收敛到 $H(f)$. 对于 L^p 收敛性, 因为 $\|H^{(\varepsilon)}(f) - H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|H^{(\varepsilon)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} + \|H(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} < \infty$, 根据 Lebesgue 控制收敛定理即得结论. $\square$

³¹ 所以接下来谈的卷积总有意义.

4.1.4 Riesz 变换

本节默认 $n \geq 2$. 回忆前文研究 Hilbert 变换时对象都是一维函数 $f \in L^p(\mathbb{R})$, 下面研究 Hilbert 变换的 n 维情况, 此时需要的 n 个算子来描述类似于 $\mathbb{R}$ 上 Hilbert 变换所做的事, 这些算子称为 Riesz 变换.

在定义 Hilbert 变换时曾引入了缓增分布 W_0 , 现在同样引入 $\mathbb{R}^n$ 上的缓增分布 $W_j (1 \leq j \leq n)$: 对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\langle W_j, \varphi \rangle = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| \geq \varepsilon} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} \varphi(y) dy,$$

下面验证 W_j 确为缓增分布, 重写上式有

$$\langle W_j, \varphi \rangle = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{1 > |y| \geq \varepsilon} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} \varphi(y) dy + \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{|y| \geq 1} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} \varphi(y) dy.$$

设 $y^* = (y_1, \dots, y_{j-1}, y_{j+1}, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n-1}$, $y = (y_j, y^*)$, 因为 $\int_{1 > |y| \geq \varepsilon} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} dy = 0$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 与任意 $1 \leq j \leq n$ 均成立, 故

$$\begin{aligned} \left| \int_{1 > |y| \geq \varepsilon} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} \varphi(y) dy \right| &= \left| \int_D \int_{1 > |y_j| \geq \varepsilon} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} (\varphi(y_j, y^*) - \varphi(0, y^*)) dy_j dy^* \right| \\ &\leq \int_D \int_{1 > |y_j| \geq \varepsilon} \frac{y_j^2}{|y|^n} |\partial_j \varphi(\xi_{y_j}, y^*)| dy_j dy^* \\ &\leq \int_D \int_{1 > |y_j| \geq \varepsilon} |\partial_j \varphi(\xi_{y_j}, y^*)| dy_j dy^* \\ &\lesssim \|\partial_j \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

另一方面

$$\left| \int_{|y| \geq 1} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} \varphi(y) dy \right| \leq \int_{|y| \geq 1} \|y_j \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \frac{dy}{|y|^{n+1}} \lesssim \|y_j \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

于是 $\langle W_j, \varphi \rangle \lesssim \|\partial_j \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \|y_j \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, 因而 $W_j \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 特别注意 W_j 的系数 $\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}}$ 恰是 $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n$ 上的 Poisson 核所对应的系数.

定义 4.3 (Riesz 变换)

对 $1 \leq j \leq n$ 与 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 而言, f 的第 j 个 Riesz 变换定义为与 W_j 的卷积, 即:

$$R_j(f)(x) = (f * W_j)(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} f(y) dy. \quad (4.38)$$

上述定义中主值积分的意义与 Hilbert 变换的情形(4.6)是相同的. 实际上只要可积函数 f 满足 Hölder 条件, 亦即

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \exists C_x > 0 \exists \varepsilon_x > 0 \exists \delta_x > 0 \forall y \in \mathbb{R}^n (|y - x| < \delta_x \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq C_x |x - y|^{\varepsilon_x}).$$

则 Riesz 变换的定义依旧成立.

下面利用 Fourier 变换给出 Riesz 变换 R_j 的等价刻画, 为此需要计算 W_j 的 Fourier 变换.

命题 4.1 (Riesz 变换的 Fourier 变换刻画)

第 j 个 Riesz 变换 R_j 的 Fourier 变换对应与函数 $-\frac{i\xi_j}{|\xi|}$ 相乘的算子, 亦即对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$R_j(f)(x) = (-\frac{i\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi))^\vee(x). \quad (4.39)$$

证明 该命题的证明本质上就是重写一遍 Hilbert 变换对应命题的证明, 不过其中多了一些技术上的困难. 取定 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq j \leq n$, 知:

$$\langle \widehat{W_j}, \varphi \rangle = \langle W_j, \widehat{\varphi} \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|\xi| \geq \varepsilon} \widehat{\varphi}(\xi) \frac{\xi_j}{|\xi|^{n+1}} d\xi \\
&= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\frac{1}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq \varepsilon} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx \frac{\xi_j}{|\xi|^{n+1}} d\xi \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left(\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\frac{1}{\varepsilon} \geq |\xi| \geq \varepsilon} e^{-i2\pi x \cdot \xi} \frac{\xi_j}{|\xi|^{n+1}} d\xi \right) dx \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left(\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \int_{\varepsilon \leq r \leq \frac{1}{\varepsilon}} e^{-i2\pi r x \cdot \theta} \frac{r}{r^{n+1}} r^{n-1} dr \theta_j d\theta \right) dx \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left(-i \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \int_{\varepsilon \leq r \leq \frac{1}{\varepsilon}} \sin(2\pi r x \cdot \theta) \frac{dr}{r} \theta_j d\theta \right) dx \\
&\stackrel{(A)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \left(-i \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \int_0^\infty \sin(2\pi r x \cdot \theta) \frac{dr}{r} \theta_j d\theta \right) dx \\
&\stackrel{(B)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left(-i \frac{\pi}{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(x \cdot \theta) \theta_j d\theta \right) dx \\
&\stackrel{(C)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \left(-i \varphi(x) \frac{x_j}{|x|} \right) dx, \tag{4.40}
\end{aligned}$$

其中 (A) 是将 $\int_{\varepsilon \leq r \leq \frac{1}{\varepsilon}} \sin(2\pi r x \cdot \theta) \frac{dr}{r}$ 视作关于 θ 的被积函数, 类似于 (4.10) 式可证 $|\int_{\varepsilon}^{\frac{1}{\varepsilon}} \sin(2\pi r x \cdot \theta) \frac{dr}{r}|$ 被某个一致的常数控制, 于是根据 Lebesgue 控制收敛定理可对前述被积函数取 $\varepsilon \rightarrow 0$; (B) 是恒等式 $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$; 而 (C) 的成立基于恒等式

$$-i \frac{\pi}{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(x \cdot \theta) \theta_j d\theta = -i \frac{x_j}{|x|}, \tag{4.41}$$

为此需要证明对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 均有

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(\xi \cdot \theta) \theta_j d\theta = \frac{2\pi^{\frac{n+1}{2}}}{\Gamma(\frac{n+1}{2})} \frac{\xi_j}{|\xi|}. \tag{4.42}$$

首先注意到

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(\theta_k) \theta_j d\theta = \begin{cases} 0, & k \neq j, \\ \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\theta_j| d\theta, & k = j. \end{cases} \tag{4.43}$$

其中 $k = j$ 的情况无所可证, 而 $k \neq j$ 的情况是因为此时 $\operatorname{sgn}(\theta_k)$ 是固定常数, 而 $\mathbb{S}^{n-1}$ 与 θ_j 均关于原点对称.

显见只需对单位向量 $\xi \in \mathbb{S}^{n-1}$ 证明 (4.42) 式即可, 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是满足 $Ae_j = \xi$ 的正交阵, 解得 $a_{kj} = \xi_k (k = 1, \dots, n)$, 于是

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(\xi \cdot \theta) \theta_j d\theta &= \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(Ae_j \cdot \theta) \theta_j d\theta \\
&= \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(e_j \cdot A^t \theta) (AA^t \theta)_j d\theta \\
&= \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(e_j \cdot \theta) (A\theta)_j d\theta \\
&= \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(\theta_j) (a_{j1}\theta_1 + \dots + \xi_j \theta_j + \dots + a_{jn}\theta_n) d\theta \\
&= \xi_j \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \operatorname{sgn}(\theta_j) \theta_j d\theta \\
&= \frac{\xi_j}{|\xi|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\theta_j| d\theta.
\end{aligned}$$

下面计算 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\theta_j| d\theta$, 因为 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 地位是等同的, 故只需计算 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\theta_1| d\theta$ 即可, 为此需要特别推导下述换元公式:

引理 4.2

若 $n \geq 2$, f 是定义在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的函数, 则

$$\int_{R\mathbb{S}^{n-1}} f(x) d\sigma(x) = \int_{-R}^R \int_{\sqrt{R^2-s^2}\mathbb{S}^{n-2}} f(s, \theta) d\theta \frac{Rds}{\sqrt{R^2-s^2}},$$

其中 $R\mathbb{S}^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq R\}$.



这是因为考虑球极坐标换元:

$$x_1 = R \cos \varphi_1,$$

$$x_2 = R \sin \varphi_1 \cos \varphi_2,$$

$$\vdots$$

$$x_{n-1} = R \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1},$$

$$x_n = R \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1},$$

并设 $x(\varphi) = (x_1(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}), \dots, x_n(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}))$, $J(n, R, \varphi)$ 是球极坐标变换对应的 Jacobi 行列式, 则

$$\int_{R\mathbb{S}^{n-1}} f(x) d\sigma(x) = \int_0^\pi d\varphi_1 \cdots \int_0^\pi d\varphi_{n-2} \int_0^{2\pi} f(x(\varphi)) J(n, R, \varphi) d\varphi_{n-1}.$$

再设

$$\varphi' = (\varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}),$$

$$x' = x'(\varphi') = (\cos \varphi_2, \sin \varphi_2 \cos \varphi_3, \dots, \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}),$$

可得

$$\int_{R\mathbb{S}^{n-1}} f(x) d\sigma(x) = \int_0^\pi \frac{Rd\varphi_1}{(R \sin \varphi_1)^{2-n}} \int_0^\pi \cdots \int_0^{2\pi} f(R \cos \varphi_1, R \sin \varphi_1 x'(\varphi')) J(n-1, 1, \varphi') d\varphi'.$$

而

$$\int_0^\pi \cdots \int_0^{2\pi} f(R \cos \varphi_1, R \sin \varphi_1 x'(\varphi')) J(n-1, 1, \varphi') d\varphi' = \int_{\mathbb{S}^{n-2}} f(R \cos \varphi_1, R \sin \varphi_1 x') d\sigma(x'),$$

故

$$\int_{R\mathbb{S}^{n-1}} f(x) d\sigma(x) = \int_0^\pi R^{n-1} (\sin \varphi_1)^{n-2} d\varphi_1 \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(R \cos \varphi_1, R \sin \varphi_1 x') d\sigma(x').$$

考虑换元

$$\begin{cases} s = R \cos \varphi_1, \\ ds = -R \sin \varphi_1 d\varphi_1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 \in (0, \pi), \\ \sqrt{R^2 - s^2} = R \sin \varphi_1, \end{cases}$$

可得

$$\int_{R\mathbb{S}^{n-1}} f(x) d\sigma(x) = \int_{-R}^R \left(\int_{\mathbb{S}^{n-2}} f(s, \sqrt{R^2 - s^2} \theta) d\theta \right) (\sqrt{R^2 - s^2})^{n-2} \frac{Rds}{\sqrt{R^2 - s^2}}.$$

对内部积分换元即得引理.

回到定理的证明, 知:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\theta_1| d\theta &\stackrel{(D)}{=} \int_{-1}^1 |s| \int_{\sqrt{1-s^2}\mathbb{S}^{n-2}} d\varphi \frac{ds}{(1-s^2)^{\frac{1}{2}}} = \nu_{n-2} \int_{-1}^1 |s| (1-s^2)^{\frac{n-3}{2}} ds \\ &= 2\nu_{n-2} \int_0^1 s (1-s^2)^{\frac{n-3}{2}} ds = -\nu_{n-2} \int_0^1 (1-s^2)^{\frac{n-3}{2}} d(1-s^2) \\ &= \nu_{n-2} \int_0^1 u^{\frac{n-3}{2}} du = \frac{2\nu_{n-2}}{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n+1}{2})}, \end{aligned}$$

其中 (D) 是因为在上面介绍的换元公式中 s 正是 x 在 x_1 所对应的坐标轴上的投影, 现在 $|\theta_1|$ 表示单位向量 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ 的第一个分量的绝对值, 它与 s 的含义是一样的; ν_{n-2} 是 $\mathbb{S}^{n-2}$ 的面积. 至此(4.42)式得证, 命题进而得证. $\square$

利用 Riesz 变换的 Fourier 变换刻画 4.1, 可以证明下面两个在 PDE 中有重要应用的命题:

命题 4.2 (Riesz 变换的平方和)

设 I 是恒同算子, 则在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有

$$-I = \sum_{j=1}^n R_j^2. \quad (4.44)$$



证明 由 Riesz 变换的 Fourier 变换刻画 4.1 知对任意 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} R_j^2(f)(x) &= R_j \left(\left(-\frac{i\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi) \right)^\vee \right)(x) \\ &= \left(-\frac{i\xi_j}{|\xi|} \left(-\frac{i\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi) \right)^\vee \right)(x) \\ &= \left(-\frac{\xi_j^2}{|\xi|} \widehat{f}(\xi) \right)^\vee(x), \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{j=1}^n R_j^2(f)(x) = \left(-\sum_{j=1}^n \frac{\xi_j^2}{|\xi|} \widehat{f}(\xi) \right)^\vee(x) = -f(x).$$

□

注 [UN],[JD] 中均指出 Riesz 变换的平方和 4.2 对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 均成立. 这是因为显见 (4.44) 式对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 均成立, 而 $\overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n)} = L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$), 故由后文将证明的 Riesz 变换的 L^p 有界性可得 (4.44) 式对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 均成立.

命题 4.3 (二阶导数的 Riesz 变换表示)

若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq j, k \leq n$, 则

$$\partial_j \partial_k \varphi(x) = -R_j R_k \Delta \varphi(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$



证明 对欲证式左式取 Fourier 变换可得:

$$\begin{aligned} (\partial_j \partial_k \varphi)^\wedge(\xi) &= (i2\pi\xi_j)(i2\pi\xi_k)\widehat{\varphi}(\xi) \\ &= -\left(-\frac{i\xi_j}{|\xi|}\right)\left(-\frac{i\xi_k}{|\xi|}\right)(-4\pi^2|\xi|^2)\widehat{\varphi}(\xi) \\ &= -(R_j R_k \Delta \varphi)^\wedge(\xi), \end{aligned}$$

两边同取 Fourier 逆变换即得欲证.

□

现在如果能给出 R_j 在某种意义上 (诸如 L^p 或几乎处处等) 作为算子的有界性, 则命题 4.3 表明对二阶 PDEs 而言, 交叉项 $\partial_j \partial_k u$ 可以被对角项 Δu 在这种意义上控制, 这便可能将一般的二阶线性 PDEs 转化成本科阶段学习过的 Laplace 方程, 热方程与波方程, 进而推导出某些相似的性质. 下面给出一例 Riesz 变换在 PDE 中的应用:

例 4.4 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 是给定的函数, $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 Laplace 方程

$$\Delta u = f. \quad (4.45)$$

下面尝试将 u 的全体二阶导数用 f 的各 Riesz 变换来表示. 注意如果 $(\partial_j \partial_k u + R_j R_k(f))^\wedge$ 的支集在 $\{0\}$ 中, 则由频率支在原点的缓增分布刻画 2.6 知 $(\partial_j \partial_k u + R_j R_k(f))^\wedge$ 是多项式, 亦即存在依赖于 j, k 的 n 元多项式 P 使得

$$\partial_j \partial_k u = -R_j R_k(f) + P.$$

这便将 u 的任意二阶导数用 f 的 Riesz 变换表示了出来. 现在验证确实有 $\text{supp}(\partial_j \partial_k u + R_j R_k(f))^\wedge \subset \{0\}$, 为此选定 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\psi(0) = 0$ (亦即 $0 \notin \text{supp } \psi$), 则因为 $\text{supp } \psi$ 至少是闭集, 知存在 0 的某邻域 U_0 使得 ψ 在其中均为 0 , 于是可以选取一个 C^∞ 函数 η 使得其在 0 的某邻域 $U_1 \subset U_0$ 中为 0 , 而在 $\text{supp } \psi$ 中为 1 . 定义

$$\zeta(\xi) = -\eta(\xi) \left(-\frac{i\xi_j}{|\xi|} \right) \left(-\frac{i\xi_k}{|\xi|} \right).$$

因为已经通过 η 去除了 ζ 在 0 点处可能的奇异性, 故可以验证 ζ 及其各阶导数均为有界的 C^∞ 函数, 且

$$\eta(\xi)(i2\pi\xi_j)(i2\pi\xi_k) = \zeta(\xi)(-4\pi^2|\xi|^2).$$

现在在方程(4.45)两端同取 Fourier 变换得到

$$(-4\pi^2|\xi|^2)\widehat{u}(\xi) = \widehat{f}(\xi).$$

在上式两端同乘 ζ (因为 ζ 的任意阶导数均在 $L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中, 故两端同乘 ζ 之后得到的式子不会改变原有式子的有界性, 可微性与可积性, 因而这个操作是合法的) 可得

$$\zeta(\xi)(-4\pi^2|\xi|^2)\widehat{u} = \zeta(\xi)\widehat{\Delta u} = \zeta(\xi)\widehat{f}(\xi).$$

现对任意 $1 \leq j, k \leq n$ 有:

$$\begin{aligned} \langle (\partial_j \partial_k u)^\wedge, \psi \rangle &= \langle (i2\pi\xi_j)(i2\pi\xi_k)\widehat{u}, \psi \rangle \\ &= \langle (i2\pi\xi_j)(i2\pi\xi_k)\widehat{u}, \eta\psi \rangle \\ &= \langle \eta(\xi)(i2\pi\xi_j)(i2\pi\xi_k)\widehat{u}, \psi \rangle \\ &= \langle \zeta(\xi)(-4\pi^2|\xi|^2)\widehat{u}, \psi \rangle \\ &= \langle \zeta(\xi)\widehat{f}(\xi), \psi \rangle \\ &= \langle -\eta(\xi) \left(-\frac{i\xi_j}{|\xi|} \right) \left(-\frac{i\xi_k}{|\xi|} \right) \widehat{f}(\xi), \psi \rangle \\ &= \langle -\eta(\xi)(R_j R_k(f))^\wedge(\xi), \psi \rangle \\ &= -\langle (R_j R_k(f))^\wedge, \eta\psi \rangle \\ &= -\langle (R_j R_k(f))^\wedge, \psi \rangle, \end{aligned}$$

亦即 $\langle (\partial_j \partial_k u + R_j R_k(f))^\wedge, \psi \rangle = 0$ 对任意支集不包含 0 的 Schwartz 函数 ψ 成立, 由缓增分布支集的定义即知 $(\partial_j \partial_k u + R_j R_k(f))^\wedge$ 支在 $\{0\}$ 上.

4.2 齐次奇异积分与旋转法

到目前为止我们已经学习了 Hilbert 变换和 Riesz 变换, 并特别讨论了 Hilbert 变换的 L^p 有界性. 本节将给出 Riesz 变换的 L^p 性质.

4.2.1 齐次奇异积分与极大奇异积分

$\mathbb{R}^n$ 上的奇异积分算子可以看成 $\mathbb{R}^n$ 上 Riesz 变换的某种一般化. 现取定 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 观察到积分核

$$K_\Omega(x) = \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n}, \quad x \neq 0 \quad (4.46)$$

是阶为 $-n$ 的齐次函数, 它的性质类似于函数 $\frac{x_j}{|x|^{n+1}}$. 因为 K_Ω 可能在 0 点处有奇异性, 故如果要和 K_Ω 作卷积, 被积函数总可能出现某个奇异点, 所以依旧需要仿照引入 Hilbert 变换与 Riesz 变换的方法来首先引入缓增分布 W_Ω :

$$\langle W_\Omega, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} K_\Omega(x) \varphi(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq \frac{1}{\varepsilon}} K_\Omega(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n). \quad (4.47)$$

根据 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$ 可以说明 W_Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上良定义的缓增分布, 这是因为此时 K_Ω 在以原点为中心的全体环上积分均为 0, 于是

$$\begin{aligned}
|\langle W_\Omega, \varphi \rangle| &= \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} (\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \varphi(x) dx \right| \\
&\leq \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \leq 1} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^{n-1}} dx + \sup_{y \in \mathbb{R}^n} |y| |\varphi(y)| \int_{|x| \geq 1} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^{n+1}} dx \\
&= \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \leq 1} |x| \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^n} dx + \sup_{y \in \mathbb{R}^n} |y| |\varphi(y)| \int_{|x| \geq 1} \frac{1}{|x|} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^n} dx \\
&\leq \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \leq 1} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^n} dx + \sup_{y \in \mathbb{R}^n} |y| |\varphi(y)| \int_{|x| \geq 1} \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^n} dx \\
&\lesssim \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + \sum_{|\alpha| \leq 1} \|x^\alpha \varphi(x)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}.
\end{aligned}$$

至此即证 $W_\Omega \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 显见在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上分布 W_Ω 与函数 K_Ω 是重合的.

Hilbert 变换与 Riesz 变换对应的积分核都是 K_Ω 的特殊情况. 例如定义在单位球面 $\mathbb{S}^0 = \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$ 上的函数 $\Omega(\theta) = \frac{\theta}{\pi|\theta|} = \frac{1}{\pi} \operatorname{sgn} \theta$ 给出了 Hilbert 变换, 而定义在 $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $\Omega(\theta) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{\theta_j}{|\theta|}$ 给出了第 j 个 Riesz 变换.

定义 4.4 (截断奇异积分)

设 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 对 $0 < \varepsilon < N$, $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 定义截断奇异积分为:

$$T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x) = \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy. \quad (4.48)$$

根据 Young 不等式, 对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned}
\|T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \left\| f * \frac{1}{|\cdot|^n} \right\|_{L^p(\{x \in \mathbb{R}^n : \varepsilon \leq |x| \leq N\})} \\
&\leq \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \cdot \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} \frac{dy}{|y|^n} \cdot \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
&\lesssim_{\varepsilon, N} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},
\end{aligned}$$

故对每个给定的 ε 与 N , (4.48) 式均对 x 几乎处处有限, 因而截断奇异积分是良定义的. 记 T_Ω 是以分布 W_Ω 为积分核的奇异积分算子, 即:

$$T_\Omega(f)(x) = (f * W_\Omega)(x) = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x), \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

这一算子的良定义性同样是由 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$ 而来的, 事实上 [JD] 给出了下述命题:

命题 4.4

只要定义在单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的函数 Ω 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 那么极限 $\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x)$ 对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均存在, 其中 $T_\Omega^{(\varepsilon, N)}$ 按 (4.48) 式定义.

证明 知

$$\begin{aligned}
\left| \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} T_{\Omega}^{(\varepsilon, N)}(f) \right| &= \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |y| < 1} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{1 \leq |y| \leq N} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right| \\
&\leq \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |y| < 1} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} (f(x-y) - f(x)) dy \right| + \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{1 \leq |y| \leq N} |y| f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^{n+1}} dy \right| \\
&\lesssim \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^{n-1}} dy + \sup_{\tau \in \mathbb{R}^n} |\tau f(\tau)| \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{1 \leq |y| \leq N} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^{n+1}} dy \\
&= \|\nabla f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|y| \leq 1} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy + \sup_{\tau \in \mathbb{R}^n} |\tau f(\tau)| \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{1 \leq |y| \leq N} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\
&\lesssim \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} (\|\nabla f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{\tau \in \mathbb{R}^n} |\tau f(\tau)|) < \infty.
\end{aligned}$$

□

算子族 $\{T_{\Omega}^{(\varepsilon, N)}\}_{0 < \varepsilon < N < \infty}$ 诱导的极大奇异积分定义为

$$T_{\Omega}^{(*)}(f) = \sup_{0 < N < \infty} \sup_{0 < \varepsilon < N} |T_{\Omega}^{(\varepsilon, N)}(f)|. \quad (4.49)$$

注意到若 $\Omega \in L^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$, 则 $\frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n}$ 在 $|y| \rightarrow \infty$ 时形同 $\frac{1}{|y|^n}$, 此时其为 $\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)$ 上的可积函数, 故(4.48)式中的上截断界 N 此时不再需要了. 这种情况下极大奇异积分可以定义为

$$T_{\Omega}^{(*)}(f) = \sup_{\varepsilon > 0} |T_{\Omega}^{(\varepsilon)}(f)|, \quad (4.50)$$

其中对 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R})$, $\varepsilon > 0$, $x \in \mathbb{R}^n$ 而言, $T_{\Omega}^{(\varepsilon)}(f)(x)$ 定义为绝对收敛积分:

$$T_{\Omega}^{(\varepsilon)}(f)(x) = \int_{|y| \geq \varepsilon} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy.$$

下面研究 $\Omega \in L^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$ 时 $T_{\Omega}^{(*)}$ 与 $T_{\Omega}^{(**)}$ 的关系, 注意到

$$\left| \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right| \leq \sup_{0 < N < \infty} |T_{\Omega}^{(\varepsilon, N)}(f)(x)|, \quad (4.51)$$

现对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 在(4.51)左式中令 $N \rightarrow \infty$, 知极限在积分绝对收敛的意义下存在, 于是由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\left| \int_{|y| \geq \varepsilon} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right| \leq \sup_{0 < N < \infty} |T_{\Omega}^{(\varepsilon, N)}(f)(x)|,$$

再在上式两端同时对 $\varepsilon > 0$ 取上确界即知 $T_{\Omega}^{(*)}$ 被 $T_{\Omega}^{(**)}$ 点态控制. 根据定义知 $T_{\Omega}^{(\varepsilon, N)} = T_{\Omega}^{(\varepsilon)} - T_{\Omega}^{(N)}$, 两边同对 ε, N 取上确界可得 $T_{\Omega}^{(**)} \leq 2T_{\Omega}^{(*)}$, 故当 $\Omega \in L^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$ 时 $T_{\Omega}^{(*)}$ 与 $T_{\Omega}^{(**)}$ 是点态等价的. 特别对 Hilbert 变换与 Riesz 变换而言, 上面的论述表明 $H^{(**)}$ 与 $H^{(*)}$ 等价, $R_j^{(**)}$ 与 $R_j^{(*)}$ 等价.

有一族乘子可以由上面所讨论的奇异积分算子来表示. 回忆零阶齐次函数的刻画2.44, 只要 m 是零阶齐次函数, 且其在球面上无穷可微, 那么 $m^\vee$ 可表为

$$m^\vee = c\delta_0 + W_\Omega,$$

其中 $c \in \mathbb{C}$ 是常数, Ω 是 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上积分为零的光滑函数. 因此只要一个卷积算子对应的乘子是 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的零阶齐次光滑函数, 它就形如 $cI + T_\Omega$, 其中 c 是常数, I 是恒同算子.

例 4.5 设 $P(\xi) = \sum_{|\alpha|=k} b_\alpha \xi^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 k 阶齐次多项式, 且其仅在 0 点处为 0 , α 是 k 阶多重指标, 则函数

$$m(\xi) = \frac{\xi^\alpha}{P(\xi)} \quad (4.52)$$

在球面上无穷可微, 且其为零阶齐次函数. 现在算子 $f \mapsto (m\hat{f})^\vee$ 就可以表为 $f \mapsto cf + W_\Omega * f$, 其中 $\Omega \in C^\infty(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$. 本节就会讨论当 Ω 在球面上具有某种光滑性时其所对应的奇异积分算子的 L^p 有界性. 特别地, 可以据此说明由(4.52)式定义的 $m(\xi) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$).

4.2.2 齐次奇异积分的 L^2 有界性

下面计算 W_Ω 的 Fourier 变换, 它有助于判断算子 $f \mapsto K_\Omega * f$ 是否是 L^2 有界的. 我们给出下述结果:

命题 4.5 (W_Ω 的 Fourier 变换)

若 $n \geq 2, \Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 则 W_Ω 的 Fourier 变换是由下式定义的 (几乎处处有限的) 函数:

$$\widehat{W_\Omega}(\xi) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \left(\log \frac{1}{|\xi \cdot \theta|} - \frac{i\pi}{2} \operatorname{sgn}(\xi \cdot \theta) \right) d\theta. \quad (4.53)$$

注 在着手证明命题4.5前, 需要说明下述几件事情:

首先, (4.53)右式对几乎处处的 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有定义且有限, 根据 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 知只需说明 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \log \frac{1}{|\xi \cdot \theta|} d\theta < \infty$. 现记 $\xi = |\xi| \xi', \xi' \in \mathbb{S}^{n-1}$, 知

$$\log \frac{1}{|\xi \cdot \theta|} = \log \frac{1}{|\xi|} + \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|}.$$

因为 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) d\theta = 0$, 故 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \log \frac{1}{|\xi|} d\theta = 0$, 于是只需验证对几乎处处的 $\xi' \in \mathbb{S}^{n-1}$ 有

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\theta < \infty \quad (4.54)$$

即可. 在(4.54)左式关于 $\xi' \in \mathbb{S}^{n-1}$ 积分有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\xi' d\theta &= \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \log \frac{1}{|\xi_1|} d\xi d\theta \\ &\stackrel{(A)}{=} \nu_{n-2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \int_{-1}^1 \left(\log \frac{1}{|s|} \right) (1-s^2)^{\frac{n-3}{2}} ds d\theta \\ &= C_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} < \infty, \end{aligned}$$

其中 (A) 基于引理4.2与 $n \geq 2$. 现若在某个正测集 $D \subset \mathbb{S}^{n-1}$ 上有 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\theta = \infty$, 则必有

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\xi' d\theta \geq \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \int_D \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\xi' d\theta = \infty,$$

矛盾! 因此(4.54)式对几乎处处的 $\xi' \in \mathbb{S}^{n-1}$ 成立.

另外, 因为(4.53)右式是关于 ξ 的零阶齐次函数, 故其为 $\mathbb{R}^n$ 上的关于 ξ 的局部可积函数.

在正式证明 W_Ω 的 Fourier 变换4.5前, 还需要下述引理:

引理 4.3

若 a 是非零实数, 则存在常数 M 使得对 $0 < \varepsilon < N < \infty$ 有

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon}^N \frac{\cos(ra) - \cos(r)}{r} dr = \log \frac{1}{|a|}, \quad (4.55)$$

$$\forall N > \varepsilon > 0 \left(\left| \int_{\varepsilon}^N \frac{\cos(ra) - \cos(r)}{r} dr \right| \leq 2 \left| \log \frac{1}{|a|} \right| \right), \quad (4.56)$$

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon}^N \frac{e^{-ira} - \cos(r)}{r} dr = \log \frac{1}{|a|} - i\frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} a, \quad (4.57)$$

$$\forall N > \varepsilon > 0 \left(\left| \int_{\varepsilon}^N \frac{e^{-ira} - \cos(r)}{r} dr \right| \leq 2 \left| \log \frac{1}{|a|} \right| + M \right). \quad (4.58)$$

证明 首先证明(4.55),(4.56)式. 根据 Newton-Leibniz 公式知

$$\begin{aligned}\int_{\varepsilon}^N \frac{\cos(ra) - \cos(r)}{r} dr &= \int_{\varepsilon}^N \frac{\cos(r|a|) - \cos(r)}{r} dr \\ &= - \int_{\varepsilon}^N \int_1^{|a|} \sin(tr) dt dr \\ &= - \int_1^{|a|} \int_{\varepsilon}^N \sin(tr) dr dt \\ &= - \int_1^{|a|} \frac{\cos(\varepsilon t)}{t} dt + \int_N^{|a|} \frac{\cos(t)}{t} dt,\end{aligned}$$

依此可得

$$\left| \int_{\varepsilon}^N \frac{\cos(ra) - \cos(r)}{r} dr \right| \leq \int_1^{|a|} \frac{dt}{t} + \int_N^{|a|} \frac{dt}{t} = 2 \left| \log \frac{1}{|a|} \right|.$$

另外注意到 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $-\int_1^{|a|} \frac{\cos(\varepsilon t)}{t} dt \rightarrow -\log |a|$, 而 $N \rightarrow \infty$ 时 $\int_N^{|a|} \frac{\cos(t)}{t} dt \rightarrow 0$, (4.55)式进而得证.

再证明(4.57),(4.58)式, 注意

$$\left| \int_{\varepsilon}^N \frac{\sin(ra)}{r} dr \right| = \left| \int_{\varepsilon|a|}^{N|a|} \frac{\sin(r)}{r} dr \right| \quad (4.59)$$

在 $\varepsilon \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$ 时趋向 $\frac{\pi}{2}$, 且依照(4.10)式知存在 $M > 0$ 使得对任意 $N, \varepsilon > 0$ 均有 $|\int_{\varepsilon}^N \frac{\sin(ra)}{r} dr| \leq M$. 现由 Euler 恒等式与(4.55),(4.56)式即得结果. $\square$

下面证明 W_{Ω} 的 Fourier 变换4.5:

证明 设 $\xi' = \frac{\xi}{|\xi|}$, 则

$$\begin{aligned}\langle \widehat{W_{\Omega}}, \varphi \rangle &= \langle W_{\Omega}, \widehat{\varphi} \rangle \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \widehat{\varphi}(x) dx \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq N} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \widehat{\varphi}(x) dx \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \int_{\varepsilon \leq |x| \leq N} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx d\xi \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \int_{\varepsilon \leq r \leq N} e^{-i2\pi r \theta \cdot \xi} \frac{dr}{r} d\theta d\xi \\ &\stackrel{(A)}{=} \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \int_{\varepsilon \leq r \leq N} (e^{-i2\pi r |\xi| \theta \cdot \xi'} - \cos(2\pi r |\xi|)) \frac{dr}{r} d\theta d\xi \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \int_{\frac{\varepsilon}{2\pi|\xi|} \leq r \leq \frac{N}{2\pi|\xi|}} \frac{e^{-ir\theta \cdot \xi'} - \cos(r)}{r} dr d\theta d\xi \\ &\stackrel{(B)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \left(\log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} - \frac{i\pi}{2} \operatorname{sgn}(\xi \cdot \theta) \right) d\theta d\xi,\end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) d\theta = 0$, 而 $\cos(2\pi r |\xi|)$ 本质上与 θ 无关; (B) 能将积分与极限号交换是基于(4.58)式与 Lebesgue 控制收敛定理. 命题至此即证. $\square$

推论 4.1

若 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 则对几乎处处 $\xi' \in \mathbb{S}^{n-1}$ 而言, 积分

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\theta \quad (4.60)$$

均绝对收敛. 另外, 算子 $T_{\Omega} : f \mapsto f * W_{\Omega}$ 将 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 映到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$\operatorname{ess\,sup}_{\xi' \in \mathbb{S}^{n-1}} \left| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\theta \right| < \infty. \quad (4.61)$$



证明 为说明(4.60)式的绝对收敛性, 考虑将其关于 ξ' 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上积分, 类似于(4.54)式有界性的证明即得结论. 另外, 由 W_Ω 的 Fourier 变换 4.5 知(4.61)式成立当且仅当 $\widehat{W_\Omega} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 根据 $\mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R}^n)$ 的刻画 2.29 又知后者等价于 T_Ω 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的, 命题即证. $\square$

特别强调(4.61)式的成立是因为存在 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 使得 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$ 的同时有

$$\operatorname{ess\,sup}_{\xi' \in \mathbb{S}^{n-1}} \left| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \log \frac{1}{|\xi' \cdot \theta|} d\theta \right| = \infty,$$

因此并非所有 Ω 均能诱导出 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子. 然而, 只要 Ω 是 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的奇函数 (即 $\Omega(-\theta) = -\Omega(\theta)$ 对任意 $\theta \in \mathbb{S}^{n-1}$ 成立), 则(4.61)式必成立, 这是因为 $\log \frac{1}{|\xi \cdot \theta|}$ 关于 θ 是偶函数, 因而其与关于 θ 的奇函数的乘积在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的积分必为零. 因此, 只要 Ω 是奇函数, 其诱导的奇异积分 T_Ω 就必是 L^2 有界的.

4.2.3 旋转法

在讨论完 Ω 为奇函数时形如 T_Ω 的奇异积分算子的 L^2 有界性后, 下面来研究它们的 L^p 有界性. 当 Ω 为奇函数时, 一般通过旋转法这一步骤来研究算子 T_Ω . 这个方法基于有向 Hilbert 变换:

定义 4.5 (有向 Hilbert 变换)

取定单位向量 $\theta \in \mathbb{R}^n$, 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 定义 f 方向为 θ 的有向 Hilbert 变换为:

$$\mathcal{H}_\theta(f)(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - t\theta) \frac{dt}{t}. \quad (4.62)$$

(4.62)式是良定义的, 因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 表明 $\frac{f(x-t\theta)}{t}$ 在无穷远处衰减足够快, 而在 0 附近通过加减 $f(x)$ 可知积分同样收敛.

类似于前面极大 Hilbert 变换与极大 Riesz 变换的定义, 这里也可以定义有向极大 Hilbert 变换. 对 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 与 $0 < \varepsilon < N < \infty$ 有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{\varepsilon \leq |t| \leq N} f(x - t\theta) \frac{dt}{t}, \\ \mathcal{H}_\theta^{(**)}(f)(x) &= \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |\mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| \end{aligned}$$

对任意固定的 $0 < \varepsilon < N < \infty$ 与 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}(f)$ 都是几乎处处有定义的. 这是因为根据 Minkowski 积分不等式有:

$$\|\mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{2}{\pi} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \log \frac{N}{\varepsilon} < \infty,$$

因此 $\mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}(f)(x)$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有限. 这同时也说明 $\mathcal{H}_\theta^{(**)}(f)$ 对 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 也是良定义的.

下面利用旋转法来证明奇函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性:

定理 4.5 (奇函数诱导的齐次奇异积分算子与极大奇异积分算子的 L^p 有界性)

若 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 是奇函数, 则对任意 $1 < p < \infty$ 而言, T_Ω 与 $T_\Omega^{(**)}$ 均是 L^p 有界的. 特别地, T_Ω 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的定义在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中有有界延拓 (延拓得到的算子依旧记为 T_Ω).

证明 设 $e_j \in \mathbb{S}^{n-1}$ 是单位向量. 根据有向 Hilbert 变换的定义, 算子 $\mathcal{H}_{e_1}$ 可以视作仅对第一个变量作用 Hilbert 变换, 而对其余变量作用恒同算子. 根据 Riesz 定理 4.2, Hilbert 变换本身是 $L^p(\mathbb{R})$ 有界的, 因而 $\mathcal{H}_{e_1}$ 也是 L^p 有界的, 且其范数等同于 Hilbert 变换的 L^p 范数 (即 $\|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})}$). 对任意 $A \in O(n)$, 因为 $f(x - tAe_1) = f(A(A^{-1}x - te_1))$, 故:

$$\mathcal{H}_{A(e_1)}(f)(x) = \mathcal{H}_{e_1}(f \circ A)(A^{-1}x). \quad (4.63)$$

这说明 $\mathcal{H}_\theta$ 的 L^p 有界性可由 $\mathcal{H}_{e_1}$ 的 L^p 有界性导出. 至此可知对任意 $1 < p < \infty$ 与任意 $\theta \in \mathbb{S}^{n-1}$ 而言, $\mathcal{H}_\theta$ 均是 L^p 有界的, 且 $\sup_{\theta \in \mathbb{S}^{n-1}} \|\mathcal{H}_\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})}$.

恒等式(4.63)对 $\mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}$ 与 $\mathcal{H}_\theta^{(**)}$ 依旧成立, 于是由极大 Hilbert 变换的 L^p 有界性^{4.4}可得 $\mathcal{H}_\theta^{(**)}$ 的 $L^p(1 < p < \infty)$ 有界性.

下面说明奇函数 Ω 诱导的奇异积分 T_Ω 恰为有向 Hilbert 变换 $\mathcal{H}_\theta$ 的某种平均, 这是因为对 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 有:

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} f(x-y) dy &\stackrel{(A)}{=} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \int_\varepsilon^N f(x-r\theta) \frac{dr}{r} d\theta \\ &\stackrel{(B)}{=} - \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \int_\varepsilon^N f(x+r\theta) \frac{dr}{r} d\theta, \end{aligned}$$

其中 (A) 是极坐标换元, (B) 基于换元 $\theta \mapsto -\theta$ 与 Ω 是奇函数. 根据上式知

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} d(x-y) dy &= \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \int_\varepsilon^N \frac{f(x-r\theta) - f(x+r\theta)}{2} \frac{dr}{r} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \mathcal{H}_\theta^{(\varepsilon, N)}(f)(x) d\theta. \end{aligned} \quad (4.64)$$

在(4.64)式两端对 $0 < \varepsilon < N < \infty$ 取上确界知

$$T_\Omega^{(**)}(f)(x) \leq \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \mathcal{H}_\theta^{(**)}(f)(x) d\theta. \quad (4.65)$$

另在(4.64)式两端令 $\varepsilon \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$, 由 Lebesgue 控制收敛定理³²可知对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$T_\Omega(f)(x) = \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \mathcal{H}_\theta(f)(x) d\theta. \quad (4.66)$$

现在由(4.65), (4.66)式, $\mathcal{H}_\theta$ 与 $\mathcal{H}_\theta^{(**)}$ 的 L^p 有界性及 Minkowski 积分不等式知:

$$\begin{aligned} \|T_\Omega\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} &= \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \|T_\Omega(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &= \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \mathcal{H}_\theta(f)(x) d\theta \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \frac{\pi}{2} \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\Omega(\theta) \mathcal{H}_\theta(f)(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\mathcal{H}_\theta(f)(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\Omega(\theta)| d\theta \\ &\leq \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \|\mathcal{H}_\theta(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} d\theta \\ &\leq \frac{\pi}{2} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \sup_{\theta \in \mathbb{S}^{n-1}} \|\mathcal{H}_\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \frac{\pi}{2} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} < \infty, \end{aligned}$$

³²可以用 Lebesgue 控制收敛定理是因为注意到 $\mathbb{S}^{n-1}$ 是测度有限的区域, 所以 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1}) \Rightarrow \Omega \in L^{p'}(\mathbb{S}^{n-1}) (p' \in (1, \infty))$, 利用指标为 (p', p) 的 Hölder 不等式即得可积性.

且

$$\begin{aligned}
\|T_{\Omega}^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} &= \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \|T_{\Omega}^{(**)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \mathcal{H}_{\theta}^{(**)}(f)(x) d\theta \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leq \frac{\pi}{2} \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (|\Omega(\theta)| \mathcal{H}_{\theta}^{(**)}(f)(x))^p dx \right)^{\frac{1}{p}} d\theta \\
&= \frac{\pi}{2} \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}_{\theta}^{(**)}(f)(x)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\Omega(\theta)| d\theta \\
&\leq \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}_{\theta}^{(**)}(f)(x)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\Omega(\theta)| d\theta \\
&= \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \|\mathcal{H}_{\theta}^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} d\theta \\
&\leq \frac{\pi}{2} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \sup_{\theta \in \mathbb{S}^{n-1}} \|\mathcal{H}_{\theta}^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq \frac{\pi}{2} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \|H^{(*)}\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} < \infty,
\end{aligned}$$

由此即知 Ω 为奇函数时 T_{Ω} 与 $T_{\Omega}^{(**)}$ 均是 L^p 有界的. □

推论 4.2 (Riesz 变换与极大 Riesz 变换的 L^p 有界性)

Riesz 变换 R_j 与极大 Riesz 变换 $R_j^{(*)}$ 均是 $L^p(1 < p < \infty)$ 有界的. ♥

证明 回忆 Riesz 变换的积分核 $\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{x_j}{|x|^{n+1}}$, 知其为奇函数, 且在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上可积, 故根据奇函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性 4.5 知 R_j 是 $L^p(1 < p < \infty)$ 有界的. 因为 R_j 的积分核在无穷远处的衰减近似于 $|x|^{-n}$, 故由卷积的 Young 不等式知 $R_j^{(*)}(f)$ 对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 良定义. 注意到 $R_j^{(*)}$ 被 $2R_j^{(**)}$ 点态控制, 而 $R_j^{(**)}$ 已知是 $L^p(1 < p < \infty)$ 有界的, 故欲证成立.

注 由奇函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性 4.5 的证明进一步可知, 只要 Ω 是 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的奇函数, 就有

$$\begin{aligned}
\|T_{\Omega}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \begin{cases} ap, & p \geq 2, \\ a(p-1)^{-1}, & 1 < p \leq 2. \end{cases} \\
\|T_{\Omega}^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \begin{cases} ap, & p \geq 2, \\ a(p-1)^{-1}, & 1 < p \leq 2. \end{cases}
\end{aligned}$$

其中 $a > 0$ 与 p, n 无关. 特别当 $\Omega(\theta) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{\theta_j}{|\theta|}$ 时, 回忆 Riesz 变换的 Fourier 变换刻画 4.1 的证明, 知

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{|\theta_j|}{|\theta|} d\theta = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \cdot \frac{2\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma(\frac{n+1}{2})} = \frac{2}{\pi}.$$

于是上述结果可以给出 Riesz 变换的一个 L^p 估计:

$$\|R_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{\pi} \|H\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} \leq \begin{cases} 2p, & 2 \leq p < \infty, \\ \frac{2p}{p-1}, & 1 < p \leq 2. \end{cases} \quad (4.67)$$

4.2.4 补充: 任意自一维算子出发的旋转法

本节选自 [JD]. 先前的旋转法只介绍了利用有向 Hilbert 变换证明某种 L^p 有界性的方法, 事实上这一套方法对任意一维算子都是成立的. 一般来说, 设 T 是在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界的一维算子, $u \in \mathbb{S}^{n-1}$. 从 T 出发可按下述方法构造一个在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界的算子 T_u : 设 $L_u = \{\lambda u : \lambda \in \mathbb{R}\}$, $L_u^{\perp}$ 是其在 $\mathbb{R}^n$ 中的正交补, 根据正交分解原理知任

意取定 $x \in \mathbb{R}^n$, 总存在唯一的 $x_1 \in \mathbb{R}$ 与 $\bar{x} \in L_u^\perp$ 使得 $x = x_1 u + \bar{x}$. 现在定义 $T_u(f)(x)$ 为

$$T_u(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto T_u(f)(x) := T(f((\cdot)u + \bar{x}))(x_1),$$

若 $\|T\|_{L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})} = C_p$, 则根据 Fubini 定理知:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |T_u f(x)|^p dx &= \int_{L_u^\perp} \int_{\mathbb{R}} |T(f((\cdot)u + \bar{x}))(x_1)|^p dx_1 d\bar{x} \\ &\leq C_p^p \int_{L_u^\perp} \int_{\mathbb{R}} |f((\cdot)u + \bar{x})(x_1)|^p dx_1 d\bar{x} \\ &= C_p^p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx, \end{aligned}$$

这样得到的算子包括有向 Hardy-Littlewood 极大函数

$$M_u(f)(x) = \sup_{h>0} \frac{1}{2h} \int_{-h}^h |f(x - tu)| dt$$

以及有向 Hilbert 变换

$$\mathcal{H}_u(f)(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|t|>\varepsilon} f(x - tu) \frac{dt}{t}.$$

因为经由算子 T 诱导得到的算子 T_u 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上一致有界, 故它们的任意凸组合依旧是 L^p 有界算子. 另外还有下述结果:

命题 4.6 (一维算子诱导的有向算子的 L^p 有界性)

设 T 是在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界的一维算子, 且其算子范数为 C_p , T_u 是 T 诱导得到的有向算子. 对任意 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$, 定义 T_Ω 为

$$T_\Omega(f)(x) := \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(u) T_u(f)(x) d\sigma(u),$$

则算子 T_Ω 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 且其算子范数至多为 $C_p \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}$.

证明 任取 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 知

$$\begin{aligned} \|T_\Omega(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(u) T_u(f)(x) d\sigma(u) \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_u(f)(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\Omega(u)| d\sigma(u) \\ &\leq \int_{\mathbb{S}^{n-1}} C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} |\Omega(u)| d\sigma(u) = C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 Minkowski 不等式, 命题至此即证. $\square$

注 特别对有向 Hardy-Littlewood 极大算子 M_u 而言, 可以仿照上述证明说明对任意 $u \in \mathbb{S}^{n-1}$, M_u 都是 L^p 有界的, 其中 M 的 L^p 有界性在极大算子的强 (p, p) 型不等式 3.5 中已经说明过了.

4.2.5 具偶积分核的奇异积分

对定义在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的任意函数 Ω , 显见总能把它写成某个奇函数与某个偶函数的和:

$$\Omega_e(u) = \frac{1}{2}(\Omega(u) + \Omega(-u)), \quad \Omega_o(u) = \frac{1}{2}(\Omega(u) - \Omega(-u)).$$

上一小节说明了具奇积分核的奇异积分是 L^p 有界的, 现在为了研究具一般核的奇异积分, 就需要研究具偶积分核的奇异积分. 本小节总设 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 是偶函数, 且 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$. 根据 Riesz 变换的平方和 4.2 知在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ (实际上是在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$)) 中有

$$T_\Omega = - \sum_{j=1}^n R_j R_j T_\Omega. \quad (4.68)$$

如果 $R_j T_\Omega$ 可表为某个奇函数 Ω_j 诱导的形如 T_{Ω_j} 的奇异积分算子, 那么 T_Ω 的 L^p 有界性就可以藉由恒等式(4.68)与 T_{Ω_j} 作为奇函数诱导的齐次奇异积分的有界性4.5得到了. 事实上, $R_j T_\Omega$ 确实具有奇积分核, 但这个积分核可能并不在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上可积. 要想得到 $R_j T_\Omega$ 的可积性, 就需要 Ω 本身有额外的对数可积性:

$$c_\Omega = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log(1 + |\Omega(\theta)|) d\theta < \infty. \quad (4.69)$$

对数可积性(4.69)要强于 L^1 可积性, 这是因为函数 $x \mapsto x(1 - \log(1 + x))$ 在 $x \geq 0$ 时大于某固定常数 C_0 , 于是

$$\begin{aligned} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} &\leq \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log(1 + |\Omega(\theta)|) d\theta + \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| (1 - \log(1 + |\Omega(\theta)|)) d\theta \\ &\leq c_\Omega + C_0 \nu_{n-1} \leq C_n (c_\Omega + 1), \end{aligned}$$

这说明 $\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}$ 总会被 $c_\Omega + 1$ 的某与 n 相关的常数倍控制. 下面介绍本节主要结果:

定理 4.6 (偶函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性)

若 $n \geq 2$, Ω 是在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上满足对数可积性(4.69)的偶函数, 且 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 则 Ω 诱导的奇异积分算子 T_Ω 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 上有界, 且

$$\|T_\Omega\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \max\{(p-1)^{-2}, p^2\} (c_\Omega + 1).$$

♡

注 如果定理4.6中的算子 T_Ω 还是弱 $(1, 1)$ 型的, 那么 T_Ω 的 L^p 范数估计还能提升为 $\|T_\Omega\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n (p-1)^{-1} (c_\Omega + 1)$.

证明 设 W_Ω 是 T_Ω 对应的分布核. 已知 W_Ω 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与函数 $\Omega(x/|x|)|x|^{-n}$ 重合. 根据 W_Ω 的 Fourier 变换4.5与 Ω 是偶函数知

$$\widehat{W_\Omega}(\xi) = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) \log \frac{1}{|\xi \cdot \theta|} d\theta, \quad (4.70)$$

这说明 $\widehat{W_\Omega}$ 同样是偶函数. 现根据 Ω 的对数可积性可推知 $\widehat{W_\Omega}$ 有界, 这是因为注意到当 $A \geq 1, B > 0$ 时对 B 求导可证

$$AB \leq A \log(1 + A) + e^B,$$

于是

$$\left| \Omega(\theta) \log \frac{1}{\xi \cdot \theta} \right| = \left| 2\Omega(\theta) \cdot \frac{1}{2} \log \frac{1}{\xi \cdot \theta} \right| \leq 2|\Omega(\theta)| \log(1 + 2|\Omega(\theta)|) + \frac{1}{|\xi \cdot \theta|^{\frac{1}{2}}}.$$

由 Ω 的对数可积性知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} 2|\Omega(\theta)| \log(1 + 2|\Omega(\theta)|) d\theta &\leq 2 \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log(2 + 2|\Omega(\theta)|) d\theta \\ &= 2 \log 2 \cdot \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| d\theta + 2 \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log(1 + |\Omega(\theta)|) d\theta \\ &< \infty. \end{aligned}$$

另因为 ξ 与 θ 趋近正交时 $|\xi \cdot \theta|$ 趋零的速度近似于 $\cos x$ 在 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时趋零的速度, 故 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{1}{|\xi \cdot \theta|^{\frac{1}{2}}} d\theta < \infty$, 因而 $\widehat{W_\Omega} < \infty$, 从而

$$\|T_\Omega(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\widehat{f} \cdot \widehat{W_\Omega}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\widehat{W_\Omega}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\widehat{W_\Omega}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

故 T_Ω 是 L^2 有界的.

下面说明 T_Ω 的 L^p 有界性, 回忆在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有 $-I = \sum_{j=1}^n R_j^2$ 知

$$T_\Omega = - \sum_{j=1}^n R_j T_j, \quad (4.71)$$

其中 $T_j = R_j T_\Omega$. 因为 T_Ω 与每个 R_j 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上都是良定义且有界的, 故(4.71)式至少在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中是有意义的

算子恒等式. 现对于 T_j 有:

$$T_j(f)(x) = R_j(T_\Omega(f))(x) = R_j(f * W_\Omega)(x) = \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega f}(\xi) \right)^\vee(x),$$

于是 T_j 对应的积分核是 $(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega})^\vee$, 记之为 K_j . 到目前为止, 我们只知道 K_j 是一个缓增分布, 且 $\widehat{K_j}(\xi) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega}(\xi)$. 接下来我们首先需要说明 K_j 与在某个环上可积的函数重合, 为此记

$$W_\Omega = W_\Omega^0 + W_\Omega^1 + W_\Omega^\infty,$$

其中

$$\begin{aligned} \langle W_\Omega^0, \varphi \rangle &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| \leq \frac{1}{2}} \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \varphi(x) dx, \\ W_\Omega^1(x) &= \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \chi_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2}(x), \\ W_\Omega^\infty(x) &= \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n} \chi_{|x| > 2}(x). \end{aligned}$$

显见 $W_\Omega^1, W_\Omega^\infty$ 都是函数, 而对于 W_Ω^0 来说, 前面已经证明过其为缓增分布. 现固定 $j \in \{1, \dots, n\}$, 记

$$K_j = K_j^0 + K_j^1 + K_j^\infty,$$

其中

$$\begin{aligned} K_j^0 &= \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega^0}(\xi) \right)^\vee, \\ K_j^1 &= \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega^1}(\xi) \right)^\vee, \\ K_j^\infty &= \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega^\infty}(\xi) \right)^\vee. \end{aligned}$$

K_j^1, K_j^∞ 显然是良定义的, 因为通过球坐标换元可知 $\widehat{W_\Omega^1}, \widehat{W_\Omega^\infty}$ 在零点处均为零. 对于 K_j^0 , 因为 W_Ω^0 是紧支分布 ($\text{supp } W_\Omega^0 \subset B(0, \frac{1}{2})$), 由紧支分布 Fourier 变换的性质 2.21 知 $\widehat{W_\Omega^0} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 于是 $-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega^0}$ 至少是缓增分布, 其 Fourier 逆变换自然也是良定义的.

现定义环

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \frac{2}{3} < |x| < \frac{3}{2} \right\}.$$

对某个支在 A 上的光滑函数 ϕ , 有

$$\begin{aligned} \langle K_j^0, \phi \rangle &= \left\langle \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega^0}(\xi) \right)^\vee, \phi \right\rangle = \left\langle -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega^0}(\xi), \phi^\vee(\xi) \right\rangle = \left\langle \widehat{W_\Omega^0}(\xi), -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \phi^\vee(\xi) \right\rangle \\ &= \left\langle W_\Omega^0, \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \phi^\vee(\xi) \right)^\wedge \right\rangle = \left\langle W_\Omega^0, \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{\phi}(-\xi) \right)^\wedge \right\rangle = \left\langle W_\Omega^0, \left(i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{\phi}(\xi) \right)^\vee \right\rangle \\ &= -\langle W_\Omega^0, R_j(\phi) \rangle = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < \frac{1}{2}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} R_j(\phi)(y) dy \\ &= -\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < \frac{1}{2}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{y_j - x_j}{|y - x|^{n+1}} \phi(x) dx \right) dy, \end{aligned}$$

特别注意上最后一式得到的积分 $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{y_j - x_j}{|y - x|^{n+1}} \phi(x) dx$ 在正常意义而非主值意义下存在, 这是因为 $\text{supp } \phi \subset A$ 决定了 $|x| > \frac{2}{3}$, 而外层积分区域决定了 $|y| < \frac{1}{2}$, 这说明 $|y - x| \geq \frac{1}{6}$, 亦即前述积分的被积函数并无奇异性. 这说明至少在 A 内, K_j^0 与函数

$$x \mapsto -\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < \frac{1}{2}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \frac{y_j - x_j}{|y - x|^{n+1}} dy$$

重合, 下面说明该函数在 A 上有界:

$$\left| \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < \frac{1}{2}} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right| \stackrel{(A)}{=} \left| \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{|y| < \frac{1}{2}} \left(\frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} - \frac{x_j}{|x|^{n+1}} \right) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{|y| < \frac{1}{2}} |g(x-y) - g(x)| \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\
&\stackrel{(B)}{\lesssim_n} \int_{|y| \leq \frac{1}{2}} |y| \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \lesssim_n \int_{|y| \leq \frac{1}{2}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \lesssim_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} < \infty,
\end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(y) dy = 0$, (B) 基于 $g(x) = \frac{x_j}{|x|^{n+1}}$ 的微分中值定理, 其中 $|Dg|$ 有一致上界是因为 $|x-y| \geq \frac{1}{6}, x \in A$. 至此可知 K_j^0 在 A 上是与一个有界函数重合的, 又由 A 的有界性可知 K_j^0 在 A 上可积. 同样在 $x \in A$ 时有

$$\begin{aligned}
&\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \left| \int_{|y| > 2} \frac{x_j - y_j}{|x-y|^{n+1}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right| \leq \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{|y| > 2} \frac{|x_j - y_j|}{|x-y|^{n+1}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\
&\lesssim_n \int_{|y| > 2} \frac{1}{|x-y|^n} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\
&\lesssim_n \int_{|y| > 2} \frac{1}{(|y| - \frac{3}{2})^n} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\
&\lesssim_n \int_{|y| > 2} \frac{1}{|y|^{2n}} |\Omega(y/|y|)| dy \\
&\lesssim_n \int_2^\infty \frac{1}{|r|^{2n}} dr \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| J(r, \theta) d\theta \\
&\lesssim_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \int_2^\infty \frac{dr}{r^{n+1}} < \infty.
\end{aligned}$$

这说明至少在环 A 内, K_j^∞ 与有界函数

$$x \mapsto \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{|y| > 2} \frac{x_j - y_j}{|x-y|^{n+1}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy$$

重合, 又由 A 的有界性可知 K_j^∞ 在 A 上可积. 最后来讨论 K_j^1 的可积性, 因为 $\{x : \frac{1}{2} \leq |x| \leq 2\} \cap A \neq \emptyset$, 故若依旧仿照对 K_0^j 的讨论, 可以得到

$$\langle K_j^1, \phi \rangle = -\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{\frac{1}{2} \leq |y| \leq 2} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{y_j - x_j}{|y-x|^{n+1}} \phi(x) dx \right) dy, \text{ supp } \phi \subset A,$$

此时 $\frac{1}{|y-x|^{n+1}}$ 势必爆破, 所以现在没法再通过有界性说明可积性了. 事实上, 这里需要考虑 W_Ω^1 的对数可积性(4.69):

$$\begin{aligned}
\int_{|x| \leq 2} |W_\Omega^1(x)| \log(1 + |W_\Omega^1(x)|) dx &= \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^n} \log\left(1 + \frac{|\Omega(x/|x|)|}{|x|^n} \chi_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2}(x)\right) dx \\
&\leq \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{|\Omega(\theta)|}{r^n} \log\left(1 + \frac{|\Omega(\theta)|}{r^n}\right) d\theta \right) r^{n-1} dr \\
&\leq \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log(1 + 2^n |\Omega(\theta)|) d\theta \right) \frac{dr}{r} \\
&\leq \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \log(2^n + 2^n |\Omega(\theta)|) d\theta \\
&\leq \log 4 \cdot \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| (n \log 2 + \log(1 + |\Omega(\theta)|)) d\theta \\
&\leq \log 4 \cdot (n \log 2 \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + c_\Omega) < \infty.
\end{aligned}$$

现在显见 $|A| < \infty$, 由三角不等式知 Riesz 变换 R_j 对每个 $1 < p \leq 2$ 均是 $L^p(A) \rightarrow L^p(A)$ 的可数次可加算子, 且由 Riesz 变换的 L^p 估计知 $1 < p \leq 2$ 时其范数至多为 $4\pi(p-1)^{-1}$, 于是由外插值定理 3.24 可知 $K_j^1 = R_j(W_\Omega^1)$ 是

球 $|x| \leq \frac{3}{2}$ 上的可积函数, 且

$$\begin{aligned} \int_A |K_j^1(x)| dx &\leq C_n \left(\int_{|x| \leq 2} |W_\Omega^1(x)| \log_2^+ |W_\Omega^1(x)| dx + 1 \right) \\ &\lesssim_n \int_{|x| \leq 2} |W_\Omega^1(x)| \log(1 + |W_\Omega^1(x)|) dx + 1 \\ &\lesssim_n c_\Omega + 1. \end{aligned}$$

至此便说明了 K_j 在 A 上与某个可积函数重合, 从而其在测试函数上的作用可表为积分的形式. 另外, 因为 $\widehat{K_j}$ 是零阶齐次函数³³, 故由齐次分布的简单性质 2.43(c) 知 K_j 是 $-n$ 阶齐次分布, 因此根据定义知对全体测试函数 φ 与全体 $\lambda > 0$ 均有

$$\langle K_j, \delta^\lambda(\varphi) \rangle = \langle K_j, \varphi \rangle, \quad (4.72)$$

其中 $\delta^\lambda(\varphi)(x) = \varphi(\lambda x)$. 但对支在环 $\frac{3}{4} < |x| < \frac{4}{3}$ 上的 C_0^∞ 函数 φ 与 $\lambda \in (\frac{8}{9}, \frac{9}{8})$, 知 $\delta^{\lambda^{-1}}(\varphi)$ 支在 A 上, 因而可将 (4.72) 式写成:

$$\int_{\mathbb{R}^n} K_j(x) \varphi(x) dx \stackrel{(C)}{=} \int_{\mathbb{R}^n} K_j(x) \varphi(\lambda^{-1}x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \lambda^n K_j(\lambda x) \varphi(x) dx, \quad (4.73)$$

其中 (C) 是因为 (4.72) 式表明 $\langle K_j, \varphi \rangle = \langle K_j, \delta^{\lambda^{-1}}(\varphi) \rangle$, 同时 (4.73) 式之所以可写成在 $\mathbb{R}^n$ 上的积分, 是因为前面限定了 $\text{supp } \varphi \subset \{x \in \mathbb{R}^n : \frac{3}{4} < |x| < \frac{4}{3}\} \subset A$, 因此由 K_j 在 A 上的可积性可得 (4.73) 式中积分的合法性. 现在很自然地根据 φ 的任意性, 希望 $K_j(x) = \lambda^n K_j(\lambda x)$ 对任意 $\frac{8}{9} < |x| < \frac{9}{8}$ 与 $\frac{8}{9} < \lambda < \frac{9}{8}$ 均成立, 特别是取 $\lambda = |x|^{-1}$ 时成立. 但不幸的是, 我们只能得到对任意 $\lambda \in (\frac{8}{9}, \frac{9}{8})$, $K_j(x) = \lambda^n K_j(\lambda x)$ 在某个挖去依赖于 λ 的零测集的环上成立³⁴. 于是定义 K_j 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的限制, 就需要更精确的结论.

对 $[\frac{8}{9}, \frac{9}{8}]$ 的任意子区间 J , 由 (4.73) 式知对每个固定的 $\lambda \in (\frac{8}{9}, \frac{9}{8})$, $\lambda^n K_j(\lambda x)$ 总能在挖去某个零测集后视作与 λ 无关的函数 $K_j(x)$, 于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} K_j(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_J \lambda^n K_j(\lambda x) d\lambda \right) \varphi(x) dx,$$

其中

$$\int_J \lambda^n K_j(\lambda x) d\lambda = \frac{1}{|J|} \int_J \lambda^n K_j(\lambda x) d\lambda.$$

因为 φ 是支在环 $\frac{3}{4} < |x| < \frac{4}{3}$ 的任意 C_0^∞ 函数, 故对 $[\frac{8}{9}, \frac{9}{8}]$ 的任意子区间 J 而言, 都存在环³⁵ $A' = \{x : \frac{27}{32} < |x| < \frac{32}{27}\}$ 的零测子集 E_J 使得对任意 $x \in A' \setminus E_J$ 均有

$$K_j(x) = \int_J \lambda^n K_j(\lambda x) d\lambda. \quad (4.74)$$

现取 $J_0 = [\sqrt{\frac{8}{9}}, \sqrt{\frac{9}{8}}]$, 下面说明存在 A' 的零测子集 E 使得对任意 $x \in A' \setminus E$ 均有

$$\int_{J_0} \lambda^n K_j(\lambda x) d\lambda = \int_{rJ_0} \lambda^n K_j(\lambda x) d\lambda, \quad (4.75)$$

其中 $r \in J_0$ 是任意的. 事实上, 设 $E = \bigcup_{r \in J_0 \cap \mathbb{Q}} E_{rJ_0}$, 其中 E_{rJ_0} 是 $rJ_0 \subset [\frac{8}{9}, \frac{9}{8}]$ 中的某零测子集, 则显见 $E \subset [\frac{8}{9}, \frac{9}{8}]$ 依旧是零测集. 现在从 (4.74) 式出发, 分别取 $J = J_0$ 和 $J = rJ_0$ 即知 (4.75) 对任意 $x \in A' \setminus E$ 与任意 $r \in J_0 \cap \mathbb{Q}$ 均成立. 但如果固定 $x \in A' \setminus E$, 不难看出 (4.75) 右式是关于 r 的函数, 且其在 $J_0 \cap \mathbb{Q}$ 为常数且连续, 因而它必关于全体 $r \in J_0$ 都为常数, 断言因而成立.

³³这是因为 $\widehat{K_j}(\xi) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega}(\xi)$, 而 $\frac{\xi_j}{|\xi|}$ 和 $\widehat{W_\Omega}(\xi)$ 都是零阶齐次函数.

³⁴因为在写下 $\langle K_j, \delta^\lambda(\varphi) \rangle = \langle K_j, \varphi \rangle$ 的这一刻起, x 就已经消失了, 也就是说这个式子最终的结果不应该依赖于 x , 而前面所谈的想法是指对每个 x 都对对应取一个 λ , 这与式子本身所谈的“固定一个 λ 后遍历全体 x ”的想法是不符合的. 所以从 (4.73) 式中得到的结果只能表述成对每个固定的 λ 的函数等式.

³⁵ A' 之所以这么写, 是因为希望保证 $\frac{3}{4} < |\lambda x| < \frac{4}{3}$, 结合 $\lambda \in (\frac{8}{9}, \frac{9}{8})$ 即得 $\frac{27}{32} < |x| < \frac{32}{27}$.

记 $x = \delta\theta$, 其中 $\frac{27}{32} < \delta < \frac{32}{27}, \theta \in \mathbb{S}^{n-1}$, 则根据 Fubini 定理³⁶知存在 $\delta \in (\frac{27}{32}, \frac{32}{27})$ 使得

$$\int_{J_0} \lambda^n K_j(\lambda\delta\theta) d\lambda = \int_{rJ_0} \lambda^n K_j(\lambda\delta\theta) d\lambda \quad (4.76)$$

对几乎全体 $\theta \in \mathbb{S}^{n-1}$ 与全体 $r \in J_0$ 均成立. 现固定这样的 δ 并记之为 δ_0 , 再定义 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的函数 Ω_j 为:

$$\Omega_j(\theta) = \int_{J_0} \delta_0^n \lambda^n K_j(\lambda\delta_0\theta) d\lambda = \int_{rJ_0} \delta_0^n \lambda^n K_j(\lambda\delta_0\theta) d\lambda, \quad \forall r \in J_0.$$

因为 K_j 在环 A 上可积, 故函数 Ω_j 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上几乎处处有定义, 且在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上可积.

记 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, 设 $\Psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是非负且非零的径向函数, 其支在环 $\frac{32}{27\sqrt{2}} < |x| < \frac{27\sqrt{2}}{32}$ 上. 注意到对任意 $r \in J_0$ 均有

$$\Omega_j(\theta) = \int_{r^{-1}J_0} \delta_0^n \lambda^n K_j(\lambda\delta_0\theta) d\lambda = \int_{J_0} \delta_0^n r^n \lambda^n K_j(r\lambda\delta_0\theta) d\lambda,$$

在上式两端同乘 $\Psi(re_1)$, 关于 θ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上积分, 然后关于测度 $\frac{dr}{r}$ 在 $(0, \infty)$ 上积分, 得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \Psi(re_1) \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega_j(\theta) d\theta &= \int_0^\infty \Psi(re_1) \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{J_0} \delta_0^n r^n \lambda^n K_j(r\lambda\delta_0\theta) d\lambda \right) d\theta \\ &= \int_{J_0} \int_0^\infty \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \delta_0^n \lambda^n K_j(\lambda\delta_0 r\theta) \Psi(re_1) r^n d\theta \frac{dr}{r} d\lambda \\ &\stackrel{(D)}{=} \int_{J_0} \int_{\mathbb{R}^n} \delta_0^n \lambda^n K_j(\lambda\delta_0 x) \Psi(x) dx d\lambda \\ &= \int_{J_0} \int_{\mathbb{R}^n} K_j(x) \Psi((\lambda\delta_0)^{-1}x) dx d\lambda \\ &= \int_{J_0} \langle K_j, \Psi((\lambda\delta_0)^{-1}(\cdot)) \rangle d\lambda \\ &\stackrel{(E)}{=} \int_{J_0} \langle K_j, \Psi \rangle d\lambda = \langle K_j, \Psi \rangle, \end{aligned}$$

其中 (D) 是将极坐标换回欧氏坐标, 并考虑了 Ψ 是径向函数, (E) 是因为 K_j 是 $-n$ 阶齐次分布. 另一方面, 知存在常数 c'_Ψ 使得

$$\begin{aligned} \langle K_j, \Psi \rangle &= \langle \widehat{K_j}, \widehat{\Psi} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{-i\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega}(\xi) \widehat{\Psi}(\xi) d\xi \\ &= \int_0^\infty \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{-ir\theta_j}{r|\theta|} \widehat{W_\Omega}(r\theta) \widehat{\Psi}(r\theta) r^n d\theta \\ &= \int_0^\infty \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{-ir\theta_j}{r|\theta|} \widehat{W_\Omega}(\theta) \widehat{\Psi}(re_1) r^n d\theta \\ &= \int_0^\infty r^{n-1} \widehat{\Psi}(re_1) dr \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{-i\theta_j}{|\theta|} \widehat{W_\Omega}(\theta) d\theta \\ &\stackrel{(F)}{=} c'_\Psi \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{-i\theta_j}{|\theta|} \widehat{W_\Omega}(\theta) d\theta \stackrel{(G)}{=} 0, \end{aligned}$$

其中 (F) 是因为 $\Psi \in C^\infty$ 提供了足够的光滑性, 因而 $\widehat{\Psi}$ 在 $r \rightarrow \infty$ 时有足够的衰减性, 这便保证了积分的收敛; (G) 是因为 $\frac{-i\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega}(\xi)$ 是奇函数. 这说明 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega_j(\theta) d\theta = 0$. 又因为先前已经说明过 $\Omega_j \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$, 故 W_{Ω_j} 良定义, 下面说明

$$K_j = W_{\Omega_j}. \quad (4.77)$$

³⁶Fubini 定理是在哪里用的? 个人认为 δ 的存在性 (以及 [LG1] 上提到的几乎处处 δ 都满足这个性质) 的原因在于 (4.75) 式是对 $x \in A' \in E$ 而非全体 $x \in A$ 成立的, 而 $x = \delta\theta$ 是 $x \in A'$ 的一种记法.

要阐明(4.77)式, 首先说明当 φ 支在环 $\frac{8}{9} < |x| < \frac{9}{8}$ 上时有 $\langle K_j, \varphi \rangle = \langle W_{\Omega_j}, \varphi \rangle$. 由(4.74)式可知:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} K_j(x) \varphi(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\oint_{J_0} K_j(\delta_0 \lambda x) \delta_0^n \lambda^n d\lambda \right) \varphi(x) dx \\ &= \int_0^\infty \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(r\theta) d\theta \oint_{J_0} K_j(\delta_0 \lambda r \theta) \delta_0^n \lambda^n r^n d\lambda \\ &= \int_0^\infty \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(r\theta) d\theta \oint_{rJ_0} K_j(\delta_0 \lambda' \theta) \delta_0^n (\lambda')^n d\lambda' \\ &= \int_0^\infty \frac{dr}{r} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega_j(\theta) \varphi(r\theta) d\theta \\ &= \langle W_{\Omega_j}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

现在对任意给定的 C_0^∞ 函数 φ , 只要其支在环 $M^{-1} < |x| < M$ 上 (其中 $M > 0$), 就可以通过单位分解将 φ 写成光滑函数 φ_k 的有限和, 其中每个 φ_k 都支在形如 $\frac{8s}{9} < |x| < \frac{9s}{8}$ ($s > 0$) 的环上, 而这些环可以通过伸缩变换回到 $\frac{8}{9} < |x| < \frac{9}{8}$ 内. 因为 K_j 和 W_{Ω_j} 都是 $-n$ 阶齐次分布, 故伸缩变换实际上不改变它们的值. 又因为它们都在环 $\frac{8}{9} < |x| < \frac{9}{8}$ 上重合, 故对每个 $s > 0$, 它们必在环 $\frac{8s}{9} < |x| < \frac{9s}{8}$ 上重合, 因此对全体 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 均有 $\langle K_j, \varphi \rangle = \langle W_{\Omega_j}, \varphi \rangle$, 这说明 $K_j - W_{\Omega_j}$ 支在原点. 又注意到 $K_j - W_{\Omega_j}$ 是 $-n$ 阶齐次分布, 故其必为 $b\delta_0$, 亦即 Dirac 测度的常数倍. 因为 $\widehat{K_j}$ 是奇函数, 故 K_j 是奇函数, 从而由前述等式关系知 W_{Ω_j} 也是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的奇函数, 因此 Ω_j 是奇函数. 现称 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是奇分布, 如果 $\tilde{u} = -u$, 其中 $\tilde{u}$ 定义为

$$\langle \tilde{u}, \psi \rangle = \langle u, \tilde{\psi} \rangle, \quad \forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \quad \tilde{\psi}(x) = \psi(-x).$$

可知 $K_j - W_{\Omega_j}$ 是奇分布³⁷, 因而 $b\delta_0$ 是奇分布. 但如果 $b\delta_0$ 是奇分布, 就必有 $b = 0$, 这是因为任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle \widetilde{b\delta_0}, \varphi \rangle = \langle b\delta_0, \tilde{\varphi} \rangle = b\varphi(0) = \langle b\delta_0, \varphi \rangle \Rightarrow \widetilde{b\delta_0} = b\delta_0.$$

因此, 对每个 j 均存在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的奇函数 Ω_j , 使得 $\|\Omega_j\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}$ 被 c_Ω 的常数倍控制的同时, 还有(4.77)式成立.

现在根据(4.71), (4.77)两式有

$$T_\Omega = - \sum_{j=1}^n R_j T_{\Omega_j},$$

再考虑奇函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性4.5与 Riesz 变换的 L^p 有界性4.2即得 T_Ω 的 L^p 有界性. $\square$

实际上, 齐次奇异积分算子的 L^p 有界性4.5, 4.6不只对奇函数与偶函数成立. 只要 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足对数可积性(4.69), 就可以将其记作 $\Omega = \Omega_e + \Omega_o$, 其中 Ω_e, Ω_o 分别是偶函数与奇函数, 再应用它们诱导的齐次奇异积分算子各自所对应的 L^p 有界性即得 Ω 诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性.

4.2.6 偶积分核的极大奇异积分

对偶函数诱导的极大奇异积分而言, 有类似于奇函数情况4.5的结论:

定理 4.7 (偶函数诱导的极大奇异积分算子的 L^p 有界性)

设 $n \geq 2$, Ω 是 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的可积偶函数, 其具有对数可积性(4.69), 并满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$, 则其按(4.49)式所对应的极大奇异积分 $T_\Omega^{(**)}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 上有界, 且后者的算子范数至多为 $\max(p^2, (p-1)^{-2})(c_\Omega + 1)$ 的常数倍 (该常数依赖于维数).

证明 对 $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, 取其方向为 θ 的有向 Hardy-Littlewood 极大函数为

$$M_\theta(f)(x) = \sup_{a>0} \frac{1}{a} \int_0^a |f(x - r\theta)| dr. \quad (4.78)$$

回忆一维算子诱导的有向算子的 L^p 有界性4.6的注, 知 M_θ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子, 且回忆(3.21)式可知其算子范数至多为 $Cp(p-1)^{-1}$, 其中 C 是与 p 无关的常数.

³⁷只要奇函数是缓增分布, 那它就必是奇分布, 这是因为设 f 是满足前述条件的函数, 任取 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\langle \tilde{f}, \psi \rangle = \langle f, \tilde{\psi} \rangle = \langle f, \psi(-\cdot) \rangle = \langle f(-\cdot), \psi \rangle = \langle -f, \psi \rangle$.

现取 Φ 是光滑径向函数, 且其满足

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq \frac{1}{4}, \\ 1, & |x| \geq \frac{3}{4}. \end{cases}$$

另外对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $0 \leq \Phi(x) \leq 1$. 对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 与 $0 < \varepsilon < N < \infty$, 引入光滑截断奇异积分³⁸

$$\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \left(\Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) f(x-y) dy$$

与其对应的极大奇异积分算子

$$\tilde{T}_\Omega^{(**)}(f) = \sup_{0 < N < \infty} \sup_{0 < \varepsilon < N} |\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)|. \quad (4.79)$$

下面说明 $\tilde{T}_\Omega^{(**)}$ 与 $T_\Omega^{(**)}$ 是“足够靠近”的, 这样一来要讨论 $T_\Omega^{(**)}$ 的 L^p 有界性, 只需讨论 $\tilde{T}_\Omega^{(**)}$ 的 L^p 有界性. 任取 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$), 知

$$\begin{aligned} & ||\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| - |T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x)|| \leq |\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x) - T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| \\ & = \left| \left(\int_{|y| \geq \frac{\varepsilon}{4}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) f(x-y) dy - \int_{|y| \geq \frac{N}{4}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \Phi\left(\frac{y}{N}\right) f(x-y) dy \right) \right. \\ & \quad \left. - \left(\int_{|y| \geq \varepsilon} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) f(x-y) dy - \int_{|y| \geq N} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \Phi\left(\frac{y}{N}\right) f(x-y) dy \right) \right| \\ & \leq \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \left(\frac{4}{\varepsilon} \int_{\frac{\varepsilon}{4}}^{\varepsilon} |f(x-r\theta)| dr + \frac{4}{N} \int_{\frac{N}{4}}^N |f(x-r\theta)| dr \right) d\theta \\ & \leq \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| \left(4 \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} |f(x-r\theta)| dr + 4 \frac{1}{N} \int_0^N |f(x-r\theta)| dr \right) d\theta \\ & \leq 8 \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| M_\theta(f)(x) d\theta. \end{aligned}$$

在上式两端对 $N > \varepsilon > 0$ 取上确界, 并由 M_θ 的 L^p 有界性可得:

$$\begin{aligned} \|\tilde{T}_\Omega^{(**)}(f) - T_\Omega^{(**)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} & \leq 8 \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |\Omega(\theta)| M_\theta(f)(x) d\theta \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ & \leq 8 \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} M_\theta(f)(x)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\Omega(\theta)| d\theta \\ & \leq 8Cp(p-1)^{-1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} |\Omega(\theta)| d\theta \\ & \leq 8C\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \max(1, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

因此, 后面只需证明光滑截断极大奇异积分算子 $\tilde{T}_\Omega^{(**)}$ 的 L^p 有界性即可.

为了证明 $\tilde{T}_\Omega^{(**)}$ 的 L^p 有界性, 首先可设命题中的偶函数 Ω 是有界函数. 这是因为如果对全体有界偶函数 Ω 均有

$$\|\tilde{T}_\Omega^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_m \max(p^2, (p-1)^{-2})(c_\Omega + 1),$$

则对一般偶函数 $\Omega \in L \log L(\mathbb{S}^{n-1})$, 可设 $\Omega^m = \Omega_{\chi_{|\Omega| \leq m}} - \kappa^m$, 其中 κ^m 是为了对任意 m , 使得 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega^m d\sigma = 0$

³⁸该算子之所以是截断算子, 是因为当 $|y| \leq \frac{1}{4}\varepsilon$ 与 $|y| \geq \frac{3}{4}N$ 时均有 $\Phi(\frac{y}{\varepsilon}) - \Phi(\frac{y}{N}) = 0$.

而添加的. 现在对任意³⁹ $x \in \mathbb{R}^n$, 在 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 时有

$$\begin{aligned}\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \left(\Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) f(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\liminf_{m \rightarrow \infty} \Omega^m(y/|y|)}{|y|^n} \left(\Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) f(x-y) dy \\ &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega^m(y/|y|)}{|y|^n} \left(\Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) f(x-y) dy \\ &= \liminf_{m \rightarrow \infty} \tilde{T}_{\Omega^m}^{(\varepsilon, N)}(f)(x) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \tilde{T}_{\Omega^m}^{(**)}(f)(x).\end{aligned}$$

在上式两端对 $\varepsilon, N > 0$ 取上确界, 考虑 Fatou 引理与 $L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密的事实可得:

$$\begin{aligned}\|\tilde{T}_\Omega^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\liminf_{m \rightarrow \infty} \tilde{T}_{\Omega^m}^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|\tilde{T}_{\Omega^m}^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C_n C(p) \liminf_{m \rightarrow \infty} (c_{\Omega^m} + 1) = C_n C(p) (c_\Omega + 1).\end{aligned}$$

因此只需验证 Ω 为 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(\theta) d\theta = 0$ 的有界偶函数的情况即可. 和偶函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性 4.6 证明中的处理一样, 设

$$\begin{aligned}T_j &= R_j T_\Omega, \\ K_j &= \left(-i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{W_\Omega} \right)^\vee, \\ \Omega_j(\theta) &= \oint_{J_0} \delta_0^n \lambda^n K_j(\lambda \delta_0 \theta) d\lambda,\end{aligned} \tag{4.80}$$

其中 $J_0 = [\sqrt{\frac{8}{9}}, \sqrt{\frac{9}{8}}]$, 另设

$$F_j = R_j(\Omega(x/|x|)\Phi(x)|x|^{-n}),$$

取 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{aligned}\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \frac{\Omega(\frac{y}{\varepsilon}/|\frac{y}{\varepsilon}|)}{|\frac{y}{\varepsilon}|^n} \Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} \frac{\Omega(\frac{y}{N}/|\frac{y}{N}|)}{|\frac{y}{N}|^n} \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) f(x-y) dy \\ &\stackrel{(A)}{=} - \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \frac{\Omega(\frac{y}{\varepsilon}/|\frac{y}{\varepsilon}|)}{|\frac{y}{\varepsilon}|^n} \Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} \frac{\Omega(\frac{y}{N}/|\frac{y}{N}|)}{|\frac{y}{N}|^n} \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) \sum_{i=1}^n R_j^2 f(x-y) dy \\ &\stackrel{(B)}{=} - \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{\varepsilon^n} F_j\left(\frac{\cdot}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} F_j\left(\frac{\cdot}{N}\right) \right) * R_j(f) \right)(x),\end{aligned}$$

其中 (A) 源自 Riesz 变换的平方和 4.2 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上也成立, 而 (B) 是因为在下诸式有意义的情况下选取 f, g , 有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f(y) R_j(g)(x-y) dy &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) (W_\Omega * g)(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} W_\Omega(x-y-z) g(z) dz \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) W_\Omega(x-z-y) dy \right) g(z) dz = \int_{\mathbb{R}^n} R_j(f)(x-z) g(z) dz.\end{aligned}$$

于是 (B) 所蕴含的过程为

$$\begin{aligned}&- \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \frac{\Omega(\frac{y}{\varepsilon}/|\frac{y}{\varepsilon}|)}{|\frac{y}{\varepsilon}|^n} \Phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} \frac{\Omega(\frac{y}{N}/|\frac{y}{N}|)}{|\frac{y}{N}|^n} \Phi\left(\frac{y}{N}\right) \right) \sum_{i=1}^n R_j^2 f(x-y) dy \\ &= - \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} R_j \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \frac{\Omega(\frac{\cdot}{\varepsilon}/|\frac{\cdot}{\varepsilon}|)}{|\frac{\cdot}{\varepsilon}|^n} \Phi\left(\frac{\cdot}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} \frac{\Omega(\frac{\cdot}{N}/|\frac{\cdot}{N}|)}{|\frac{\cdot}{N}|^n} \Phi\left(\frac{\cdot}{N}\right) \right) (y) R_j(f)(x-y) dy \\ &= - \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{\varepsilon^n} F_j\left(\frac{\cdot}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} F_j\left(\frac{\cdot}{N}\right) \right) * R_j(f) \right)(x).\end{aligned}$$

³⁹ 这是否应该改为几乎处处? 就算将 $\tilde{T}_\Omega^{(\varepsilon, N)}$ 视作 f 与 $\frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} (\Phi(\frac{y}{\varepsilon}) - \Phi(\frac{y}{N}))$ 的卷积并声称 Φ 是光滑函数, 也会因为 Ω 的可积 (而可能潜藏的不连续) 性导致光滑性的损失吧?

现有

$$\begin{aligned} -\tilde{T}_{\Omega}^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} F_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) - \frac{1}{N^n} F_j \left(\frac{x-y}{N} \right) \right) R_j(f)(y) dy \\ &= A_1^{(\varepsilon, N)}(f)(x) + A_2^{(\varepsilon, N)}(f)(x) + A_3^{(\varepsilon, N)}(f)(x), \end{aligned} \quad (4.81)$$

其中

$$\begin{aligned} A_1^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{|x-y| \leq \varepsilon} F_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) R_j(f)(y) dy - \sum_{j=1}^n \frac{1}{N^n} \int_{|x-y| \leq N} F_j \left(\frac{x-y}{N} \right) R_j(f)(y) dy, \\ A_2^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \chi_{|x-y| > \varepsilon}(y) \left(F_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) - K_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \right) \right) R_j(f)(y) dy \\ &\quad - \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{N^n} \chi_{|x-y| > N}(y) \left(F_j \left(\frac{x-y}{N} \right) - K_j \left(\frac{x-y}{N} \right) \right) \right) R_j(f)(y) dy, \\ A_3^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \chi_{|x-y| > \varepsilon}(y) K_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) - \frac{1}{N^n} \chi_{|x-y| > N}(y) K_j \left(\frac{x-y}{N} \right) \right) R_j(f)(y) dy. \end{aligned}$$

下面的任务就是分别证明 $\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_1^{(\varepsilon, N)}|$, $\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_2^{(\varepsilon, N)}|$, $\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_3^{(\varepsilon, N)}|$ 的 L^p 有界性了.

对于 $A_2^{(\varepsilon, N)}$, 由 F_j 与 K_j 的定义可知在 $|z| \geq 1$ 时有:

$$\begin{aligned} F_j(z) - K_j(z) &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |y|} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} (\Phi(y) - 1) \frac{z_j - y_j}{|z - y|^{n+1}} dy \\ &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \int_{|y| \leq \frac{3}{4}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} (\Phi(y) - 1) \left(\frac{z_j - y_j}{|z - y|^{n+1}} - \frac{z_j}{|z|^{n+1}} \right) dy. \end{aligned}$$

根据微分中值定理, 在 $|z| \geq 1$ 时上式最后一项可由下式控制:

$$C_n \int_{|y| \leq \frac{3}{4}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} \frac{y}{|z|^{n+1}} dy = C'_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} |z|^{-(n+1)}.$$

根据这一估计, 对 $A_2^{(\varepsilon, N)}(f)(x)$ 作为和式时的第 j 项有:

$$\begin{aligned} &\left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \chi_{|x-y| > \varepsilon}(y) \left(F_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) - K_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \right) - \frac{1}{N^n} \chi_{|x-y| > N}(y) \left(F_j \left(\frac{x-y}{N} \right) - K_j \left(\frac{x-y}{N} \right) \right) \right) R_j(f)(y) dy \right| \\ &\leq \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{1}{\varepsilon^n} \left| F_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) - K_j \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \right| |R_j(f)(y)| dy + \int_{|x-y| > N} \frac{1}{N^n} \left| F_j \left(\frac{x-y}{N} \right) - K_j \left(\frac{x-y}{N} \right) \right| |R_j(f)(y)| dy \\ &\leq C_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(|x-y|/\varepsilon)^{n+1}} + \frac{1}{N^n} \int_{|x-y| > N} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(|x-y|/N)^{n+1}} \right), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} C_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(|x-y|/\varepsilon)^{n+1}} &= C_n \frac{2^{n+1} \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}}{\varepsilon^n} \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(2|x-y|/\varepsilon)^{n+1}} \\ &\leq C_n \frac{2 \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}}{2^{-n} \varepsilon^n} \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(1 + |x-y|/\varepsilon)^{n+1}}. \end{aligned}$$

同理可得

$$C_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \frac{1}{N^n} \int_{|x-y| > N} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(|x-y|/N)^{n+1}} \leq C_n \frac{2 \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}}{2^{-n} N^n} \int_{|x-y| > N} \frac{|R_j(f)(y)| dy}{(1 + |x-y|/N)^{n+1}}.$$

又因为 $K(x) = \frac{1}{(1+|x|)^{n+1}}$ 时 $\mathbb{R}^n$ 上的正递减可积径向函数, 故由正递减可积径向函数生成的恒等逼近族性质 3.4 知

$$\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_2^{(\varepsilon, N)}(f)| \leq C_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} M(R_j(f)),$$

其中 M 是 Hardy-Littlewood 极大算子. 根据极大函数强 (p, p) 型不等式 3.8 的注可知 M 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的有界算子, 且其算子范数至多为 $C_n \max(1, (p-1)^{-1})$, 其中 C_n 是只关于维数的常数. 又根据 Riesz 变换的 L^p 有

界性4.2的注知 $\|R_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)}$ 至多为 $C'_n \max(p, (p-1)^{-1})$, 其中 C'_n 是只关于维数的常数, 故

$$\left\| \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_2^{(\varepsilon, N)}(f)| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \max(p, (p-1)^{-2}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (4.82)$$

对于 $A_3^{(\varepsilon, N)}$, 回忆偶函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性4.6证明中的(4.77)式, 已经说明了若 $\Omega_j \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足

$$\|\Omega_j\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \leq C_n(c_\Omega + 1), \quad (4.83)$$

就有⁴⁰

$$K_j(x) = \frac{\Omega_j(x/|x|)}{|x|^n}.$$

因此对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_3^{(\varepsilon, N)}(f)| &= \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} \left| \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \chi_{|x-y| > \varepsilon}(y) K_j\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \frac{1}{N^n} \chi_{|x-y| > N}(y) K_j\left(\frac{x-y}{N}\right) \right) R_j(f)(y) dy \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} \left| \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{1}{\varepsilon^n} \varepsilon^n \frac{\Omega_j((x-y)/|x-y|)}{|x-y|^n} R_j(f)(y) dy \right. \\ &\quad \left. - \int_{|x-y| > N} \frac{1}{N^n} N^n \frac{\Omega_j((x-y)/|x-y|)}{|x-y|^n} R_j(f)(y) dy \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} \left| \int_{\varepsilon < |x-y| < N} \frac{\Omega_j((x-y)/|x-y|)}{|x-y|^n} R_j(f)(y) dy \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n T_{\Omega_j}^{(**)}(R_j(f)). \end{aligned}$$

回忆 Ω_j 的构造(4.80), 在偶函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性4.6的证明中已经说明了 K_j 是奇函数, 故 Ω_j 是奇函数, 因而由奇函数诱导的极大奇异积分算子的 L^p 有界性4.5的注知

$$\begin{aligned} \|T_{\Omega_j}^{(**)}(R_j(f))\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq C_n \|\Omega_j\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \max(p, (p-1)^{-1}) \|R_j(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C'_n(c_\Omega + 1) \max(p, (p-1)^{-1}) \max(p, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &= C'_n(c_\Omega + 1) \max(p^2, (p-1)^{-2}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned} \quad (4.84)$$

最后讨论 $A_1^{(\varepsilon, N)}(f)$. 要想证明 $\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} A_1^{(\varepsilon, N)}$ 的 L^p 有界性, 首先说明存在 $\mathbb{R}^n$ 上的非负零阶其次函数 G_j 使得

$$|F_j(x)| \leq G_j(x), \quad |x| \leq 1, \quad (4.85)$$

且

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} |G_j(\theta)| d\theta \leq C_n c_\Omega. \quad (4.86)$$

为证明(4.85)式, 注意到若 $|x| \leq \frac{1}{8}$, 则

$$\begin{aligned} |F_j(x)| &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \Phi(y) \frac{x_j - y_j}{|x-y|^{n+1}} dy \right| \\ &\leq C_n \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \Phi(y) \frac{x_j - y_j}{|x-y|^{n+1}} \right| dy \\ &\leq C_n \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \right| \cdot \frac{|x_j - y_j|}{|x-y|^{n+1}} dy \\ &\leq C_n \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} \right| \cdot \frac{1}{|x-y|^n} dy \\ &\leq C'_n \int_{|y| \geq \frac{1}{4}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^{2n}} dy \end{aligned}$$

⁴⁰(4.77)式本身是说明 K_j 和 W_j 作为缓增分布相等, 但偶函数诱导的齐次奇异积分算子的 L^p 有界性4.6的证明中已经指出在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上 K_j 与可积函数重合, 因此可以得到 K_j 和 W_j 作为函数的相等.

$$\leq C_n'' \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}.$$

现取定 x 满足 $\frac{1}{8} \leq |x| \leq 1$, 记

$$\begin{aligned} |F_j(x)| &\leq \Phi(x)|K_j(x)| + |F_j(x) - \Phi(x)K_j(x)| \\ &\leq |K_j(x)| + \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} (\Phi(y) - \Phi(x)) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right| \\ &= |K_j(x)| + \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} (P_1(x) + P_2(x) + P_3(x)), \end{aligned}$$

其中⁴¹

$$\begin{aligned} P_1(x) &= \left| \int_{|y| \leq \frac{1}{16}} \left(\frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} - \frac{x_j}{|x|^{n+1}} \right) (\Phi(y) - \Phi(x)) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right|, \\ P_2(x) &= \left| \int_{\frac{1}{16} \leq |y| \leq 2} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} (\Phi(y) - \Phi(x)) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right|, \\ P_3(x) &= \left| \int_{|y| \geq 2} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} (\Phi(y) - \Phi(x)) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \right|. \end{aligned}$$

又因为 $\frac{1}{8} \leq |x| \leq 1$, 对 $x \mapsto \frac{x_j}{|x|^{n+1}}$ 使用微分中值定理, 并由 Φ 的构造知

$$P_1(x) \leq C_n \int_{|y| \leq \frac{1}{16}} \frac{|y|}{|x|^{n+1}} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy \leq C_n' \int_{|y| \leq \frac{1}{16}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \leq C_n'' \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})},$$

另有

$$P_3(x) \leq C_n \int_{|y| \geq 2} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^{2n}} dy \leq C_n' \int_{|y| \geq 2} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \leq C_n'' \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}.$$

对于 $P_2(x)$, 利用估计⁴² $|\Phi(y) - \Phi(x)| \leq C|x - y|$ 可知

$$\begin{aligned} P_2(x) &\leq \int_{\frac{1}{16} \leq |y| \leq 2} \frac{C}{|x - y|^{n-1}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\ &\leq 4C \int_{\frac{1}{16} \leq |y| \leq 2} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|x - y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dy \\ &\leq 4C \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|x - y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dy. \end{aligned}$$

回忆 $K_j(x) = \frac{\Omega_j(x/|x|)}{|x|^n}$, 现可设

$$G_j(x) = C_n \left(\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + |\Omega_j(x/|x|)| + |x|^{n-\frac{3}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|x - y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dy \right), \quad (4.87)$$

下面说明(4.87)式给出的 $G_j(x)$ 正是 $\mathbb{R}^n$ 上满足(4.85),(4.86)式的非负零阶齐次函数. 首先说明 G_j 是零阶齐次函数:

$$\begin{aligned} G_j(\lambda x) &= C_n \left(\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + |\Omega_j(x/|x|)| + |\lambda x|^{n-\frac{3}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|\lambda x - y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dy \right) \\ &= C_n \left(\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + |\Omega_j(x/|x|)| + |\lambda|^{n-\frac{3}{2}} |x|^{n-\frac{3}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|\lambda|^{n-1}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|x - \frac{y}{\lambda}|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dy \right) \\ &= C_n \left(\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + |\Omega_j(x/|x|)| + |\lambda|^{n-\frac{1}{2}} |x|^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|\lambda|^{n-\frac{1}{2}}} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|x - \frac{y}{\lambda}|^{n-1} |\frac{y}{\lambda}|^{n-\frac{1}{2}}} |\lambda|^n d\frac{y}{|\lambda|} \right) \\ &= G_j(x). \end{aligned}$$

G_j 的零阶齐次性即证. 再由前述对 P_1, P_2, P_3 的估计知(4.87)式给出的 $G_j(x)$ 满足(4.85)式, 且显见其在环 $\frac{1}{2} \leq$

⁴¹特别注意 $P_1(x)$ 的构造中, 因为 $\Phi(y)$ 是径向函数 (因而是偶函数), 故 $\int_{|y| \leq \frac{1}{16}} \frac{x_j}{|x|^{n+1}} (\Phi(y) - \Phi(x)) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy = 0$.

⁴²这个估计依旧是对 Φ 应用微分中值定理而得到的.

$|x| \leq 2$ 上可积. 最后往证 $G_j(x)$ 满足(4.86)式, 为此将重积分

$$I = \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|x-y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dx$$

分为 $\frac{1}{4} \leq |y| \leq 4$, $|y| > 4$, $|y| < \frac{1}{4}$ 三份. 对 $\frac{1}{4} \leq |y| \leq 4$ 的这一份有:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{\frac{1}{4} \leq |y| \leq 4} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|x-y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dx &\leq C_n \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{\frac{1}{4} \leq |y| \leq 4} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|x-y|^{n-1}} dx \\ &= C_n \int_{\frac{1}{4} \leq |y| \leq 4} |\Omega(y/|y|)| \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \frac{dx}{|y-x|^{n-1}} dy \\ &\leq C_n \int_{\frac{1}{4} \leq |y| \leq 4} |\Omega(y/|y|)| \int_{|x-y| \leq 6} \frac{dx}{|y-x|^{n-1}} dy \\ &\leq C'_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}. \end{aligned}$$

对 $|y| > 4$ 的这一份, 因为先前已经圈定 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$, 故 $|x-y|^{-n+1} \leq (\frac{|y|}{2})^{-n+1}$, 因而有:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{|y| > 4} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|x-y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dx &\leq 2^{n-1} \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{|y| > 4} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^{n-\frac{1}{2}+n-1}} dy dx \\ &\leq C_n \int_{|y| > 4} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^{2n-\frac{3}{2}}} dy \\ &\leq C'_n \int_{|y| > 4} \frac{|\Omega(y/|y|)|}{|y|^n} dy \\ &\leq C''_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}. \end{aligned}$$

最后, 对 $|y| < \frac{1}{4}$ 的这一份, 同样因为已经圈定 $\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2$, 故 $|x-y|^{-n+1} \leq (\frac{1}{4})^{-n+1}$, 因而有:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{|y| < \frac{1}{4}} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|x-y|^{n-1} |y|^{n-\frac{1}{2}}} dx &\leq 4^{n-1} \int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} \int_{|y| < \frac{1}{4}} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|y|^{n-\frac{1}{2}}} dy dx \\ &\leq C_n \int_{|y| < \frac{1}{4}} \frac{|\Omega(y/|y|)| dy}{|y|^n} dy \\ &\leq C'_n \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}. \end{aligned}$$

因而由(4.83),(4.87)两式可得

$$\int_{\frac{1}{2} \leq |x| \leq 2} |G_j(x)| dx \leq C_n (\|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + \|\Omega_j\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} + \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})}) \leq C_n c_\omega.$$

根据 G_j 是零阶齐次函数即知(4.86)式成立.

最后回到 $\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_1^{(\varepsilon, N)}(f)|$ 的 L^p 有界性的讨论, 知:

$$\begin{aligned} \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_1^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| &= \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} \left| \sum_{j=1}^n \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{|x-y| \leq \varepsilon} F_j\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) R_j(f)(y) dy - \sum_{j=1}^n \frac{1}{N^n} \int_{|x-y| \leq N} F_j\left(\frac{x-y}{N}\right) R_j(f)(y) dy \right| \\ &\leq \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{\varepsilon^n} \left| \int_{|x-y| \leq \varepsilon} F_j\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) R_j(f)(y) dy \right| + \frac{1}{N^n} \left| \int_{|x-y| \leq N} F_j\left(\frac{x-y}{N}\right) R_j(f)(y) dy \right| \right) \\ &\leq 2 \sup_{\varepsilon > 0} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{|z| \leq \varepsilon} \left| F_j\left(\frac{z}{\varepsilon}\right) \right| |R_j(f)(x-z)| dz \\ &\leq 2 \sup_{\varepsilon > 0} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon r^{n-1} dr \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left| F_j\left(\frac{r\theta}{\varepsilon}\right) \right| |R_j(f)(x-r\theta)| d\theta \\ &\leq 2 \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |G_j(\theta)| \left(\sup_{\varepsilon > 0} \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon |R_j(f)(x-r\theta)| r^{n-1} dr \right) d\theta \\ &\leq 4 \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |G_j(\theta)| M_\theta(R_j(f))(x) d\theta. \end{aligned}$$

结合(4.86)式与有向 Hardy-Littlewood 极大函数的 L^p 有界性可得:

$$\begin{aligned}
 \left\| \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_1^{(\varepsilon, N)}(f)| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq 4 \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |G_j(\theta)| \|M_\theta(R_j(f))\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} d\theta \\
 &\leq 4C_n c_\Omega \sup_{\theta \in \mathbb{S}^{n-1}} \left(\sum_{j=1}^n \|M_\theta(R_j(f))\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \right) \\
 &\leq C'_n c_\Omega \max(p, (p-1)^{-1}) \sum_{j=1}^n \|R_j(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
 &\leq C''_n c_\Omega \max(p, (p-1)^{-1}) \max(p, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
 &\leq C''_n c_\Omega \max(p^2, (p-1)^{-2}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.
 \end{aligned} \tag{4.88}$$

最后, 结合(4.81),(4.82),(4.84),(4.88)四式即得

$$\begin{aligned}
 \|\tilde{T}_\Omega^{(**)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \left\| \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |\tilde{T}_\Omega^{\varepsilon, N}(f)| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
 &\leq \left\| \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_1^{(\varepsilon, N)}| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \left\| \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_2^{(\varepsilon, N)}| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \left\| \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |A_3^{(\varepsilon, N)}| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
 &\lesssim_n \max(p^2, (p-1)^{-2}) (c_\Omega \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|\Omega\|_{L^1(\mathbb{S}^{n-1})} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + (c_\Omega + 1) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}) \\
 &\lesssim_n (c_\Omega + 1) \max(p^2, (p-1)^{-2}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.
 \end{aligned}$$

命题即证. □

下面的推论是偶函数诱导的极大奇异积分算子的 L^p 有界性4.7与算子族的点态收敛性3.2结合得到的:

推论 4.3

设 $n \geq 2$, Ω 满足偶函数诱导的极大奇异积分算子的 L^p 有界性4.7中的条件, 则对任意 $1 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$ 时函数 $T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)$ 在 L^p 和几乎处处的意义下收敛到 $T_\Omega(f)$. ♥

证明 几乎处处收敛性恰是算子族的点态收敛性3.2的直接结论. 对 L^p 收敛性而言, 因为对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有 $|T_\Omega^{(\varepsilon, N)}(f)| \leq T_\Omega^{(**)}(f)$, 而 $T_\Omega^{(**)}(f) \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故 L^p 收敛性是通过应用 Lebesgue 控制收敛定理得到的. □

4.3 Calderón-Zygmund 分解与奇异积分

奇异积分算子在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的表现相较于 $L^p(\mathbb{R}^n) (1 < p < \infty)$ 的情况来说是一个更为复杂的话题, 从例4.1中可见奇异积分并不是从 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的有界算子. 本节将要说明奇异积分把 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 映入更大的空间 $L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 这一结果进而加强了它们的 L^p 有界性.

4.3.1 Calderón-Zygmund 分解

远在讨论二进极大函数时, 我们就已经介绍过 Calderón-Zygmund 分解3.7了. 这一分解方法在奇异积分理论的研究中是十分有用的, 因而在这里我们重新提一下它的内容. 当然, 在奇异积分理论之外, Calderón-Zygmund 分解本身作为一个强有力的停时构造也有许多其它有趣的应用.

注 “停时”一词原先是随机过程理论中的内容, 下面是这一概念在随机过程中的定义:

定义 4.6 (σ -代数流 (滤基)^{ABAH})

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间, $T \subset \mathbb{R}$. 称 $\mathbb{F}_T = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ 是在 $\mathcal{F}$ 中的某个 σ -代数流 (滤基), 如果对 $s \leq t (s, t \in T)$ 有 $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$, 且对全体 $t \in T$ 有 $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}$. ♣

定义 4.7 (停时^{ABAH})

映射 $\tau: \Omega \rightarrow T \cup \{\infty\}$ 称作相对于 σ -代数流 $\mathbb{F}$ 的停时, 如果对任意 $t \in T$ 都有 $\{\omega: \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. ♣

回忆 $\mathbb{R}^n$ 上的一个二进方体 Q_k 指的是集合

$$[2^k m_1, 2^k(m_1 + 1)) \times \cdots \times [2^k m_n, 2^k(m_n + 1)),$$

其中 $k, m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$. 两个二进方体要么不交, 要么其中一个另一个的子集.

定理 4.8 (Calderón-Zygmund 分解)

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\alpha > 0$, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 g, b 使得:

- (i) $f(x) = g(x) + b(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$.
- (ii) $\|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$, 且 $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq 2^n \alpha$.
- (iii) $b(x) = \sum_j b_j(x)$, 其中每个 b_j 都支在某个二进方体 Q_j 上, 且 $j \neq k$ 时前述二进方体 Q_j, Q_k 是不交的.
- (iv) $\int_{Q_j} b_j(x) dx = 0$.
- (v) $\|b_j\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{n+1} \alpha |Q_j|$.
- (vi) $\sum_j |Q_j| \leq \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha}$.



注 先前已经提过, Calderón-Zygmund 分解 4.8 中的 g 称为分解中的好函数, 因为它可积且有界; b 称为坏函数, 因为它包含了 f 的奇异部分, 但这也不是随意选取的, 因为 (iv) 已经说明 b 的积分均值为零. 根据 (i), (ii), 坏函数 b 也是可积的, 且

$$\|b\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq 2\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

根据 (ii), 好函数 g 是有界可积的, 于是对任意 $1 \leq p \leq \infty$ 均有 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 进一步根据 L^p 范数的对数凸性 1.13 知

$$\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}} \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^{1-\frac{1}{p}} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}} (2^n \alpha)^{1-\frac{1}{p}} = 2^{\frac{n}{p'}} \alpha^{\frac{1}{p'}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}}. \quad (4.89)$$

下面 (不辞辛劳地) 再次给出 Calderón-Zygmund 分解的具体证明:

证明 将 $\mathbb{R}^n$ 分割成由相同大小的不交二进方体组成的网格 (即考虑分解 $\mathbb{R}^n = \bigcup_j Q_j$), 同时令该网格内的任一方体 Q 均满足

$$|Q| \geq \frac{1}{\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

因为 $\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} < \infty, \alpha > 0$, 故这样的网格是肯定可以构造出来的. 称该网格中的二进方体为第 0 代方体. 现通过边长减半的方式, 将每个第 0 代方体划分成 2^n 个全等的子二进方体, 据此得到的新网格中的每个方体称为第 1 代方体. 现选取全体满足

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x)| dx > \alpha \quad (4.90)$$

的第 1 代方体 Q , 记它们所构成的集合为 $S^{(1)}$. 同样通过边长减半的方式, 将每个第 1 代方体划分成 2^n 个全等的子二进方体, 据此得到的新网格中的每个方体称为第 2 代方体. 选取全体满足 (4.90) 式的第 2 代方体 Q , 并记它们所构成的集合为 $S^{(2)}$.




图 4.2: 选取过程示意, 其中黄色点是 f 的一个爆破点

将上述过程一直进行下去, 可以得到被选取的方体族 $\bigcup_{m=1}^{\infty} S^{(m)}$. 显见 $\bigcup_{m=1}^{\infty} S^{(m)}$ 是可列集, 且它所包含的二进方体均满足 (vi)⁴³. 根据二进方体的性质显见前面所选取的这些二进方体均不交 (否则如果有某两个二进方

⁴³ 集族 $\bigcup_{m=1}^{\infty} S^{(m)}$ 是可能为空的, 此时 $b = 0, g = f$.

体相交, 其中一个必是另一个的子集, 但根据选取规则它们中便只有一个会被选取), 现定义

$$\begin{cases} b_j(x) = \left(f(x) - \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(y) dy \right) \chi_{Q_j}(x), \\ b(x) = \sum_j b_j(x), \\ g(x) = f(x) - b(x). \end{cases}$$

下面说明上面构造的 b_j, b, g 满足要求, 特别只需说明 (ii), (v) 即可. 对某个被选取的方体 Q_j , 根据选取规则知总会存在某个未被选取的二进方体 Q' 包含它, 且 Q' 的边长恰为 Q_j 边长的两倍, 称 Q' 为 Q_j 的父代. 因为 Q_j 的父代 Q' 并未被选取, 根据选取规则知

$$\frac{1}{|Q'|} \int_{Q'} |f(x)| dx \leq \alpha,$$

于是

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} |f(x)| dx \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q'} |f(x)| dx = \frac{2^n}{|Q'|} \int_{Q'} |f(x)| dx \leq 2^n \alpha, \quad (4.91)$$

因而

$$\int_{Q_j} |b_j(x)| dx \leq \int_{Q_j} |f(x)| dx + |Q_j| \left| \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(x) dx \right| \leq 2 \int_{Q_j} |f(x)| dx \leq 2^{n+1} \alpha |Q_j|.$$

这便说明了 (v).

下面说明 (ii), 显见

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j, \\ \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(y) dy, & x \in Q_j, \end{cases} \quad (4.92)$$

从而由 (4.91) 式知

$$\|g\|_{L^\infty(Q_j)} = \left| \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f(y) dy \right| \leq 2^n \alpha.$$

故只需说明 g 在 $\bigcup_j Q_j$ 之外同样有界即可. 事实上, 任取 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$, 对每个 $k = 0, 1, 2, \dots$, 总存在唯一第 k 代未被选取的方体 $Q_x^{(k)}$ 包含 x , 进而对每个 $k \geq 0$ 根据选取过程均有:

$$\left| \frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} f(y) dy \right| \leq \frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} |f(y)| dy \leq \alpha, \quad (4.93)$$

再根据闭区间套原理知 $\bigcap_k Q_x^{(k)} = \{x\}$, 另由 Lebesgue 微分定理 3.5 知对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$ 均有

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} f(y) dy.$$

故由 (4.93) 式知 $|f(x)| \leq \alpha$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$ 均成立, 故 $|g(x)| \leq \alpha$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$ 均成立. 最后, 由选取过程与 (4.92) 式可知 $\|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$, 这便说明了 (ii), 定理得证. $\square$

类似于极大函数的弱 (1,1) 型不等式 3.8 的证明, Calderón-Zygmund 分解也可以用于证明一般奇异积分算子的弱 (1,1) 型不等式.

4.3.2 一般奇异积分

下面我们将要研究的一般奇异积分的积分核是在原点之外与某函数重合的缓增分布, 它通过下述方式构造: 设 K 是定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的可测函数, 且其在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的任意紧子集上可积, 另有尺寸条件⁴⁴

$$\sup_{R>0} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)| dx = A_1 < \infty. \quad (4.94)$$

⁴⁴原文为 size condition.

注意这一条件比标准的尺寸估计

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x|^n |K(x)| < \infty \quad (4.95)$$

要弱,但它已经足以导出 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 时积分核 $K(x) = \frac{\Omega(x/|x|)}{|x|^n}$ 的尺寸性质了. 特别还有尺寸条件(4.94)的下述等价提法:

命题 4.7 (一般奇异积分核尺寸条件的等价提法)

若 $K \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 可测, 则(4.94)式成立当且仅当

$$\sup_{R>0} \frac{1}{R} \int_{|x| \leq R} |K(x)| |x| dx < \infty. \quad (4.96)$$

证明 一方面

$$\frac{1}{2R} \int_{|x| \leq 2R} |K(x)| |x| dx \geq \frac{1}{2R} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)| |x| dx \geq \frac{1}{2} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)| dx,$$

于是

$$\sup_{R>0} \frac{1}{R} \int_{|x| \leq R} |K(x)| |x| dx = \sup_{R>0} \frac{1}{2R} \int_{|x| \leq 2R} |K(x)| |x| dx \geq \frac{1}{2} \sup_{R>0} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)| dx = \frac{A_1}{2}.$$

另一方面

$$\frac{1}{R} \int_{|x| \leq R} |K(x)| |x| dx = \frac{1}{R} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^{-k-1}R \leq |x| \leq 2^{-k}R} |K(x)| |x| dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \int_{2^{-k-1}R \leq |x| \leq 2^{-k}R} |K(x)| dx,$$

于是

$$\sup_{R>0} \frac{1}{R} \int_{|x| \leq R} |K(x)| |x| dx \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \sup_{R>0} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)| dx = 2A_1.$$

故

$$\frac{A_1}{2} \leq \sup_{R>0} \frac{1}{R} \int_{|x| \leq R} |K(x)| |x| dx \leq 2A_1.$$

亦即(4.94),(4.96)两式等价, 命题因而成立. $\square$

(4.94)式已经足以使 $K(x)$ 在 $|x| > \delta$ (δ 是任意正数) 时成为缓增分布, 这是因为对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{|x| \geq 1} |K(x)\varphi(x)| dx \leq \sum_{m=0}^{\infty} \int_{2^{m+1} \geq |x| \geq 2^m} \frac{|K(x)|(1+|x|)^N |\varphi(x)|}{(1+2^m)^N} dx \leq \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A_1}{(1+2^m)^N} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1+|x|)^N |\varphi(x)|.$$

上右式被 φ 的某 Schwartz 半范有限的常数倍所控制, 因而 K 确为 $|x| > \delta$ 上的缓增分布.

现在自然要问, 有没有办法能将函数 K 延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上? 设 W 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的缓增分布, 且其为定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数 K 的延拓, 并设

$$\langle W, \varphi \rangle = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq \delta_j} K(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \quad (4.97)$$

其中 $\{\delta_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是随 $j \rightarrow \infty$ 而递减趋零的序列. 下面的命题说明了缓增分布 W 的合法性的充要条件:

命题 4.8 (一般积分核对应缓增分布的合法性)

若可测函数 $K \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 满足尺寸条件(4.94), 则其能诱导形如(4.97)式的缓增分布 W 当且仅当

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{1 \geq |x| \geq \delta_j} K(x) dx = L < \infty. \quad (4.98)$$

其中 $\delta_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$.

证明 当 K 能使得依(4.97)式定义的缓增分布 W 是合法的, 根据尺寸条件的等价提法4.7知

$$\int_{|x| \leq 1} |K(x)| |x| dx \leq 2A_1 < \infty.$$

下面说明对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 函数 $K(x)(\varphi(x) - \varphi(0))$ 均在 $|x| \leq 1$ 上绝对可积. 事实上由微分中值定理可得估计

$$|K(x)(\varphi(x) - \varphi(0))| \leq |K(x)||x|\|\nabla\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

对不等式两端在 $|x| \leq 1$ 上积分得到

$$\int_{|x| \leq 1} |K(x)(\varphi(x) - \varphi(0))| dx \leq \|\nabla\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|x| \leq 1} |K(x)||x| dx \leq 2A_1 \|\nabla\varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty. \quad (4.99)$$

现取定 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 并令 $\varphi(0) = 1$, 知

$$\int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x) dx = \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)\varphi(x) dx - \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx,$$

在等式两端令 $j \rightarrow \infty$ 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x) dx = \langle W, \varphi \rangle - \int_{|x| \leq 1} K(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx < \infty.$$

这便是(4.98)式.

相反地, 若(4.98)式成立, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)\varphi(x) dx = \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)\varphi(0) dx + \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx,$$

在等式两端令 $k \rightarrow \infty$, 由(4.98), (4.99)式知

$$\begin{aligned} \langle W, \varphi \rangle &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)\varphi(x) dx \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)\varphi(0) dx + \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx < \infty. \end{aligned}$$

故 W 的定义是合法的. $\square$

注意就算缓增分布 W 存在, 它也未必唯一, 因为极限 $\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq \delta_j} K(x)\varphi(x) dx$ 实际上依赖于序列 $\{\delta_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 的选取. 两个不同的趋零序列可能导出两个不同的形如(4.97)式的缓增分布 W , 且它们同时在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与 K 重合.

现当 K 满足(4.98)式时, 即可定义

$$\langle W, \varphi \rangle = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq \delta_j} K(x)\varphi(x) dx, \quad (4.100)$$

根据一般积分核对应缓增分布的合法性4.8即知极限(4.100)对全体 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均成立, 且其结果为

$$\langle W, \varphi \rangle = \int_{|x| \leq 1} K(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \varphi(0)L + \int_{|x| \geq 1} K(x)\varphi(x) dx.$$

另由前述计算可知 W 确为缓增分布.

下面分别设 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数 K 满足特定的光滑性条件. 一般来说我们会讨论三种光滑性条件, 即梯度条件:

$$|\nabla K(x)| \leq A_2 |x|^{-n-1}, \quad x \neq 0, \quad (4.101)$$

弱 Lipschitz 条件:

$$|K(x-y) - K(x)| \leq A_2 \frac{|y|^\delta}{|x|^{n+\delta}}, \quad |x| \geq 2|y|, \quad (4.102)$$

以及 Hörmander 条件:

$$\sup_{y \neq 0} \int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx = A_2, \quad (4.103)$$

其中 $A_2 < \infty$. 容易验证 Hörmander 条件(4.103)弱于 Lipschitz 条件(4.102), 而 Lipschitz 条件又弱于梯度条件(4.101).

4.3.3 从 L^p 有界性到弱 $(1, 1)$ 型有界性

下面的定理给出了 Calderón-Zygmund 分解的最经典的应用.

定理 4.9 (一般奇异积分算子 L^p 有界性的延拓)

若存在 $A_1, A_2 < \infty$ 使得 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数 K 满足尺寸条件(4.94)^a与 Hörmander 条件(4.103), 设 $W \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是由(4.97)式定义的与 K 相关的缓增分布. 若存在 $1 < r \leq \infty$ 使得算子 $T: \varphi \mapsto W * \varphi$ 在 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 上具有有界延拓, 且其算子范数至多为 B , 则 T 可以延拓为 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 其算子范数满足

$$\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C_n(A_2 + B), \quad (4.104)$$

另外对任意 $1 < p < \infty$, T 也可以延拓为 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 的算子, 其算子范数满足

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_2 + B), \quad (4.105)$$

其中 C_n, C'_n 是依赖于维数, 而与 r, p 无关的常数.

^a这一条件可以替换为 K 在不包含原点的任意紧集上可积.



证明 首先考虑 $r < \infty$ 的情形. 取定 $\alpha > 0$, 考虑支在不交二进方体上的示性函数的有限线性组合构成的阶梯函数 f , 这类函数构成的空间显然在全体 L^p 空间中均稠密, 于是只要(4.104)式对这些函数成立, 通过稠密性即可说明 T 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上有有界延拓, 且延拓后的算子依旧满足(4.104)式. 下面说明结论对依前述构造得到的 f 成立.

对 f 应用高度为 $\gamma\alpha$ 的 Calderón-Zygmund 分解 (其中 γ 是待定系数), 可得

$$f(x) = g(x) + b(x) = g(x) + \sum_j b_j(x),$$

其中 g, b 满足 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(i)-(vi) (α 替换为 $\gamma\alpha$). 因为 f 本身是支在不交二进方体上的示性函数的有限线性组合, 故对 f 作 Calderón-Zygmund 分解只需有限个二进方体 Q_j . 根据 Calderón-Zygmund 分解的过程, 每个 b_j 都支在中心为 y_j 的二进方体 Q_j 上, 且 Q_j 互不相交. 设 $l(Q)$ 表示方体 Q 的边长, Q_j^* 表示与 Q_j 同心, 各边平行且 $l(Q_j^*) = 2\sqrt{n}l(Q_j)$ 的唯一方体. 根据 f 的有界性, 知 b_j 是支在 $\overline{Q_j}$ 内的有界函数, 因而 $b_j \in L^r(\mathbb{R}^n)$. 又因为算子 T 本身在 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 上有有界延拓, 故对每个 j 而言, $T(b_j)$ 都是良定义的 L^r 函数. 现对任意 j 与任意 $x \notin Q_j^*$ 有

$$T(b_j)(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{k \geq |x-y| \geq \delta_k} K(x-y)b_j(y)dy \stackrel{(A)}{=} \int_{Q_j} K(x-y)b_j(y)dy,$$

其中 (A) 是因为由 K 的尺寸条件(4.94)知 K 在不包含原点的任意紧环上可积, 而由 $x \notin Q_j^*$ 知 $0 \notin x - Q_j$, 于是 $x - Q_j$ 总能囊入某个不包含原点的紧环, 进而 K 在 $x - Q_j$ 上可积, 另由 b_j 在 Q_j 上有界即知 (A) 右式绝对收敛, 从而 (A) 基于 Lebesgue 控制收敛定理而成立.

现由 b_j 的消去律 (即 $\int_{Q_j} b_j(x)dx = 0$) 可得:

$$\begin{aligned} \int_{(\cup_i Q_i^*)^c} \sum_j |T(b_j)(x)|dx &= \int_{(\cup_i Q_i^*)^c} \sum_j \left| \int_{Q_j} b_j(y)(K(x-y) - K(x-y_j))dy \right| dx \\ &\leq \sum_j \int_{\cap_i (Q_i^*)^c} \int_{Q_j} |b_j(y)| |K(x-y) - K(x-y_j)| dy dx \\ &\leq \sum_j \int_{(Q_j^*)^c} \int_{Q_j} |b_j(y)| |K(x-y) - K(x-y_j)| dy dx \\ &= \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| \int_{(Q_j^*)^c} |K(x-y) - K(x-y_j)| dx dy \\ &= \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| \int_{-y_j + (Q_j^*)^c} |K(x - (y - y_j)) - K(x)| dx dy \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| \int_{|x| \geq 2|y-y_j|} |K(x - (y - y_j)) - K(x)| dx dy \\ &\stackrel{(C)}{\leq} A_2 \sum_j \|b_j\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \stackrel{(D)}{\leq} A_2 2^{n+1} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} < \infty, \end{aligned}$$

其中 (B) 是因为当 $x \in -y_j + (Q_j^*)^c$ 时, 由 $l(Q_j^*) - |y_j| \geq \frac{1}{2}l(Q_j^*)$ 知 $|x| \geq \frac{1}{2}l(Q_j^*) = \sqrt{n}l(Q_j)$, 而由 $y - y_j \in -y_j + Q_j$ 知 $|y - y_j| \leq \frac{\sqrt{n}}{2}l(Q_j)$, 这便有 $|x| \geq 2|y - y_j|$ (如图 4.3); (C) 是 Hörmander 条件 (4.103), (D) 是 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(vi), (vi).




图 4.3: x, y_j, Q_j, Q_j^* 关系示意图

至此即得

$$\int_{(\cup_i Q_i^*)^c} \sum_j |T(b_j)(x)| dx \leq 2^{n+1} A_2 \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.106)$$

进而

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : |T(f)(x)| > \alpha\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R}^n : |T(g)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| + |\{x \in \mathbb{R}^n : |T(b)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| \\ &\leq \int_{\{x \in \mathbb{R}^n : |T(g)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} \left(\frac{2}{\alpha} |T(g)(x)|\right)^r dx + |\bigcup_i Q_i^*| + |\{x \notin \bigcup_i Q_i^* : |T(\sum_j b_j)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| \\ &\leq \frac{2^r}{\alpha^r} \|T(g)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}^r + |\bigcup_i Q_i^*| + |\{x \notin \bigcup_i Q_i^* : |\sum_j T(b_j)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| \\ &\leq \frac{2^r}{\alpha^r} B^r \|g\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}^r + \sum_i |Q_i^*| + \int_{\{x \notin \bigcup_i Q_i^* : |\sum_j T(b_j)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}} \frac{2}{\alpha} \sum_j |T(b_j)(x)| dx \\ &\stackrel{(E)}{\leq} \frac{2^r}{\alpha^r} B^r 2^{\frac{nr}{r}} (\gamma \alpha)^{\frac{r}{r}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + (2\sqrt{n})^n \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\gamma \alpha} + \frac{2}{\alpha} 2^{n+1} A_2 \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \left(\frac{(2^{n+1} B \gamma)^r}{2^n \gamma} + \frac{(2\sqrt{n})^n}{\gamma} + 2^{n+2} A_2 \right) \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha}. \end{aligned}$$

其中 (E) 基于 (4.89) 式, Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(vi) 与 (4.106) 式. 取 $\gamma = 2^{-(n+1)} B^{-1}$ 即得

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |T(f)(x)| > \alpha\}| \leq (2B + (2\sqrt{n})^n 2^{n+1} B + 2^{n+2} A_2) \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha}.$$

取 $C_n = 2 + 2^{n+1} (2\sqrt{n})^n + 2^{n+2}$ 即得 (4.104) 式.

现已知 T 是弱 $(1, 1)$ 型算子与强 (r, r) 型算子, 故由推论 3.1 可知 $1 < p < r$ 时 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有有界延拓, 且

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n (A_2 + B) (p-1)^{-\frac{1}{p}}.$$

对于 $p > r$ 的场景, 考虑 T 的伴随算子 T^* :

$$\langle T(f), g \rangle = \langle f, T^*(g) \rangle,$$

因为 T 本身是线性算子, 故 T^* 的积分核在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与函数 $K^*(x) = \overline{K(-x)}$ 重合. 由 K 满足尺寸条件 (4.94) 与 Hörmander 条件 (4.103) 知 K^* 同样满足尺寸条件 (4.94) 与 Hörmander 条件 (4.103), 进而由 T 可视作 $L^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow$

$L^r(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子知 $T^* : L^{r'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{r'}(\mathbb{R}^n)$ 同样是有界线性算子, 且其积分核 K^* 同样满足定理条件. 逐字逐句地挪用前述证明并注意到 $1 < p' < r'$, 可知 T^* 作为 $L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的算子满足

$$\|T^*\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n(A_2 + B)(p' - 1)^{-\frac{1}{p'}},$$

于是 $p > r > 1$ 时有

$$\begin{aligned} \|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} &= \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \|T(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1} |\langle T(f), g \rangle| \\ &= \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1} |\langle f, T^*(g) \rangle| \\ &\leq \sup_{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|T^*(g)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1} C'_n(A_2 + B)(p' - 1)^{-\frac{1}{p'}} \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C'_n(A_2 + B)(p' - 1)^{-\frac{1}{p'}} = C'_n(A_2 + B)(p - 1)^{1 - \frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

综上知 $1 < p < \infty$ 时有

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n(A_2 + B) \max((p - 1)^{-\frac{1}{p}}, (p - 1)^{1 - \frac{1}{p}}).$$

又由 $\max((p - 1)^{-\frac{1}{p}}, (p - 1)^{1 - \frac{1}{p}}) \leq \max((p - 1)^{-1}, p)$ 即得(4.105)式.

对于 $r = \infty$ 的情形, 前面关于稠密性的分析依旧成立 (因为目标空间是 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$), 它们与 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 并没有直接联系), 因此依旧只需对支在不交二进方体上的示性函数的有限线性组合构成的阶梯函数 f 证明结论即可. 同样对这样的 f 应用高度为 $\gamma\alpha$ 的 Calderón-Zygmund 分解 (其中 γ 是待定系数), 并逐字逐句挪用前述设定与论证, 可得

$$\int_{(\cup_i Q_i^c)^c} \sum_j |T(b_j)(x)| dx \leq 2^{n+1} A_2 \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},$$

根据 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(ii) 知 $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq 2^n \gamma \alpha$, 因而 $\|T(g)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq 2^n \gamma \alpha B$. 取 $\gamma = (2^{n+1} B)^{-1}$ 可知 $\|T(g)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{\alpha}{2}$, 亦即 $|\{x \in \mathbb{R}^n : |T(g)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| = 0$, 于是

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : |T(f)(x)| > \alpha\}| &\leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : |T(g)(x)| > \frac{\alpha}{2} \right\} \right| + \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : |T(b)(x)| > \frac{\alpha}{2} \right\} \right| \\ &\leq \left(\frac{(2\sqrt{n})^n}{\gamma} + 2^{n+2} A_2 \right) \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha} = ((2\sqrt{n})^n 2^{n+1} B + 2^{n+2} A_2) \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha}, \end{aligned}$$

取 $C_n = 2^{n+1} (2\sqrt{n})^n + 2^{n+2}$ 即得(4.104)式.

现已知 T 是弱 $(1, 1)$ 型算子与强 (∞, ∞) 型算子, 故由推论 3.1 可知 $1 < p < \infty$ 时 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有有界延拓, 且

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n(A_2 + B)(p - 1)^{-\frac{1}{p}}.$$

又由 $(p - 1)^{-\frac{1}{p}} \leq \max((p - 1)^{-1}, p)$ 即得(4.105)式. □

4.3.4 对极大奇异积分的讨论

本节讨论极大奇异积分, 并在积分核的特定光滑性条件与相关线性算子的有界性条件下给出它们的有界性.

设 K 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的积分核, 且其对 $x \neq 0$ 满足尺寸条件

$$|K(x)| \leq A_1 |x|^{-n}. \quad (4.107)$$

进而对任意 $1 \leq p < \infty$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 函数 $K^{(\varepsilon)}(x) = K(x) \chi_{|x| \geq \varepsilon}(x) \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, 且根据 L^p 范数的定义容易说明

$$\|K^{(\varepsilon)}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq c_{p,n} A_1 \varepsilon^{-\frac{n}{p}}. \quad (4.108)$$

因此, 由 Hölder 不等式可知积分

$$(f * K^{(\varepsilon)})(x) = \int_{|y| \geq \varepsilon} f(x-y)K(y)dy$$

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$) 均绝对收敛.

现设 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$, 定义积分核 K 诱导的截断奇异积分 $T^{(\varepsilon)}(f)$ 为

$$T^{(\varepsilon)}(f) = f * K^{(\varepsilon)}.$$

同样定义积分核 K 诱导的极大截断奇异积分算子为

$$T^{(*)}(f) = \sup_{\varepsilon > 0} |(f * K^{(\varepsilon)})| = \sup_{\varepsilon > 0} |T^{(\varepsilon)}(f)|.$$

根据前述绝对收敛性可知算子 $T^{(*)}$ 至少是良定义的, 但它可能在 $\mathbb{R}^n$ 上的某些点处取值为 ∞ .

下面考虑积分核 K 在以原点为中心的环上具有可积性的情况, 这一条件实际上比(4.107)式更弱. 准确来说, 设 K 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的可测函数, 且其在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的任意紧子集上可积, 亦即存在常数 $A_1 < \infty$ 使得

$$\sup_{R > 0} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)|dx \leq A_1 < \infty. \quad (4.109)$$

当积分核 K 仅仅满足可积性条件(4.109)时, 它在 $|x| \geq \varepsilon$ 上很可能不具有 $p'(p' > 1)$ 阶可积性, 因而我们不能再断言 $T^{(\varepsilon)}$ 一定会输出绝对收敛积分. 为了克服这里定义上的困难, 我们考虑双重截断: 定义双重截断积分核 $K^{(\varepsilon, N)}$ 为

$$K^{(\varepsilon, N)}(x) = K(x)\chi_{\varepsilon \leq |x| \leq N}(x), \quad (4.110)$$

于是由可积性条件(4.109)知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |K^{(\varepsilon, N)}(x)|dx = \int_{\varepsilon \leq |x| \leq N} |K(x)|dx \leq A_1 \left(\left\lceil \log_2 \frac{N}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \right),$$

这说明 $K^{(\varepsilon, N)}$ 在以原点为中心的环上具有可积性. 现定义双重截断积分 $T^{(\varepsilon, N)}$ 为

$$T^{(\varepsilon, N)}(f) = f * K^{(\varepsilon, N)},$$

根据 Young 不等式(1.9)知当 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 时有

$$\|T^{(\varepsilon, N)}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |K^{(\varepsilon, N)}(x)|dx < \infty.$$

因此算子 $T^{(\varepsilon, N)}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 上是良定义的. 这一结果同时说明对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|T^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| < \infty.$$

现对 $\bigcup_{1 \leq p \leq \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的函数, 定义积分核 K 诱导的双重截断极大奇异积分 $T^{(**)}$ 为

$$T^{(**)}(f) = \sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} |T^{(\varepsilon, N)}(f)|. \quad (4.111)$$

对 $f \in \bigcup_{1 \leq p \leq \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 与几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n$ 而言, 数值 $T^{(**)}(f)(x)$ 当然是良定义的⁴⁵, 但它也有可能取到 ∞ .

但这并不意味着在可积性条件(4.109)下没法再去定义极大截断奇异积分算子 $T^{(*)}$ 了. 下面说明输入紧支可积函数 g 时, $T^{(*)}(g)$ 依旧是良定义的. 设 $\text{supp } g \subset B(0, R)$, 取 $x \in B(0, M)$, $N = M + R$, 则

$$|T^{(\varepsilon)}(g)(x)| \leq (|g| * |K^{(\varepsilon, N)}|)(x).$$

因为 $g, K^{(\varepsilon, N)}$ 都是 L^1 函数, 故 $T^{(\varepsilon)}(g)$ 在 $B(0, M)$ 上几乎处处有限, 因此用于定义 $T^{(\varepsilon)}(g)(x)$ 的积分在 $B(0, R)$ 上绝对收敛. 又因为 $R > 0$ 是任意的, 故 $T^{(\varepsilon)}(g)(x)$ 良定义且在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限.

当然, $T^{(*)}$ 与 $T^{(**)}$ 之间也有联系. 若 K 满足尺寸条件(4.107), 则

$$\left| \int_{\varepsilon \leq |y|} f(x-y)K(y)dy \right| \leq \sup_{N > 0} \left| \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} f(x-y)K(y)dy \right|,$$

⁴⁵ 就算 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} |T^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| = \infty$, 也不妨碍 $T^{(**)}$ 的良定义性. 极大算子 $T^{(**)}$ 的良定义只需要对每个取定的 ε, N 而言, $T^{(\varepsilon, N)}(f)(x)$ 均有限即可.

因而对全体 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$T^{(*)}(f) \leq T^{(**)}(f).$$

另知 $T^{(\varepsilon, N)}(f) = T^{(\varepsilon)}(f) - T^{(N)}(f)$, 于是

$$T^{(**)}(f) \leq 2T^{(*)}(f).$$

这说明只要积分核 K 满足尺寸条件(4.107), 则算子 $T^{(**)}$ 与 $T^{(*)}$ 就是可比的, 它们的有界性进而等价.

定理 4.10 (Cotlar 不等式)

设 $0 < A_1, A_2, A_3 < \infty$, K 定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上, 其满足尺寸条件

$$|K(x)| \leq A_1 |x|^{-n}, \quad x \neq 0, \quad (4.112)$$

光滑性条件

$$|K(x-y) - K(x)| \leq A_2 |y|^\delta |x|^{-n-\delta}, \quad |x| \geq 2|y| > 0, \quad (4.113)$$

与消失性条件

$$\sup_{0 < r < R < \infty} \left| \int_{r < |x| < R} K(x) dx \right| \leq A_3. \quad (4.114)$$

设 $W \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 K 依照(4.97)诱导的缓增分布, $T: \varphi \mapsto W * \varphi$, 则存在常数 $C_{n, \delta}$ 满足下述不等式:

$$T^{(*)}(f) \leq M(T(f)) + C_{n, \delta}(A_1 + A_2 + A_3)M(f), \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \quad (4.115)$$

其中 M 是 Hardy-Littlewood 极大算子.

证明 设 φ 是递减径向光滑函数, $\text{supp } \varphi \subset B(0, \frac{1}{2})$, $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$. 对函数 g 与正数 ε , 记 $g_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} g(\varepsilon^{-1}x)$. 对分布 W 而言, 类似地定义唯一分布 W_ε 为

$$\langle W_\varepsilon, \psi \rangle := \varepsilon^{-n} \langle W, \psi_{\varepsilon^{-1}} \rangle.$$

显见函数 $K_{\varepsilon^{-1}}(x) = \varepsilon^n K(\varepsilon x)$ 关于 $\varepsilon > 0$ 一致地满足(4.112)-(4.114)式.

记 $K^{(\varepsilon)}(x) = K(x)\chi_{|x| \geq \varepsilon}(x)$, 取定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 显见

$$f * K^{(\varepsilon)} = f * ((K_{\varepsilon^{-1}})^{(1)})_\varepsilon = f * (W * \varphi_\varepsilon) + f * ((K_{\varepsilon^{-1}})^{(1)} - W_{\varepsilon^{-1}} * \varphi)_\varepsilon. \quad (4.116)$$

下面对任意 $\varepsilon > 0$ 与任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 证明估计

$$|((K_{\varepsilon^{-1}})^{(1)} - W_{\varepsilon^{-1}} * \varphi)(x)| \leq C(A_1 + A_2 + A_3)(1 + |x|)^{-n-\delta}. \quad (4.117)$$

根据 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$ 知在 $|x| \geq 1$ 时可将(4.117)左式记作

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} (K_{\varepsilon^{-1}}(x) - K_{\varepsilon^{-1}}(x-y))\varphi(y) dy \right|.$$

因为 $\text{supp } \varphi \subset B(0, \frac{1}{2})$, 故 $|x| \geq 2|y|$, 于是光滑性条件(4.113)表明:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} (K_{\varepsilon^{-1}}(x) - K_{\varepsilon^{-1}}(x-y))\varphi(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} A_2 |y|^\delta |x|^{-n-\delta} |\varphi(y)| dy \stackrel{(A)}{\leq} c \frac{A_2}{(1 + |x|)^{n+\delta}},$$

其中 (A) 是因为 φ 是紧支函数. 至此便在 $|x| \geq 1$ 时证明了(4.117)式. 当 $|x| < 1$ 时, 对(4.117)左式有

$$|((K_{\varepsilon^{-1}})^{(1)} - W_{\varepsilon^{-1}} * \varphi)(x)| = |(W_{\varepsilon^{-1}} * \varphi)(x)| = \left| \lim_{\delta_j \rightarrow 0} \int_{|x-y| \geq \delta_j} K_{\varepsilon^{-1}}(x-y)\varphi(y) dy \right|, \quad (4.118)$$

其中 $\delta_j \downarrow 0$. (4.118)式绝对值内的表达式可以被分为三部分:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{|x-y| > \frac{1}{8}} K_{\varepsilon^{-1}}(x-y)\varphi(y) dy, \\ I_2 &= \int_{|x-y| \leq \frac{1}{8}} (\varphi(y) - \varphi(x)) dy, \\ I_3 &= \varphi(x) \lim_{\delta_j \rightarrow 0} \int_{\frac{1}{8} \geq |x-y| \geq \delta_j} K_{\varepsilon^{-1}}(x-y) dy. \end{aligned}$$

对 I_1 知 $\frac{1}{8} \leq |x-y| \leq |x|+|y| \leq 1+\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 因而由尺寸条件(4.112)知 I_1 可被 A_1 的倍数控制. 根据 φ 的光滑性与微分中值定理知 $|\varphi(x)-\varphi(y)| \leq c|x-y|$, 进而由尺寸条件(4.112)与极坐标换元知 I_2 也可被 A_1 的倍数控制. 最后, 由消失性条件(4.114)与 φ 的有界性知 I_3 可被 A_3 的倍数控制. 结合上述讨论即知 $|x| < 1$ 时(4.117)式依旧成立.

现由正递减可积径向函数生成的恒等逼近族性质的推论3.2可知

$$\sup_{\varepsilon>0} |f * ((K_{\varepsilon-1})^{(1)} - K_{\varepsilon-1} * \varphi)_\varepsilon| \leq c(A_1 + A_2 + A_3)M(f).$$

最后, 在(4.116)式两端对 $\varepsilon > 0$ 取上确界, 由(4.117)式与正递减可积径向函数生成的恒等逼近族性质的推论3.2可得估计

$$T^{(*)}(f) \leq M(f * W) + C(A_1 + A_2 + A_3)M(f),$$

其中 C 依赖于 n, δ . (4.115)式进而得证. □

4.3.5 从极大奇异积分的强 $(2, 2)$ 型有界性到弱 $(1, 1)$ 型有界性

下面对极大奇异积分给出类似于一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓4.9的命题:

定理 4.11 (双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性的延拓)

设 $K(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数, 其满足对应常数为 $A_1 < \infty$ 的尺寸条件(4.94)与对应常数为 $A_2 < \infty$ 的 Hörmander 条件(4.103). 另设算子 $T^{(**)}$ 依(4.111)式定义, 其作为 $L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 的算子时算子范数至多为 B , 则 $T^{(**)}$ 可视作 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 且其算子范数满足

$$\|T^{(**)}\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C_n(A_1 + A_2 + B),$$

其中 C_n 是只关于维数的常数. ♡

证明 该定理的证明基本可以看成在一般奇异积分算子 L^p 有界性的延拓定理4.9证明上加了一点东西. 取定 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 对其应用高度为 $\gamma\alpha$ 的 Calderón-Zygmund 分解 ($\gamma, \alpha > 0$). 依照 Calderón-Zygmund 分解可记 $f(x) = g(x) + b(x)$, 其中 $b(x) = \sum_j b_j(x)$, 且每个 b_j 均支在二进方体 Q_j 上. 定义 Q_j^* 是与 Q_j 同心, 各边长平行, 且 $l(Q_j^*) = 5\sqrt{n}l(Q_j)$ 的方体 (边长的倍数关系是与定理4.9证明里 Q_j^* 的构造中唯一不同的地方). 证明中最主要的改变体现在对

$$\left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : |T^{(**)}(b)(x)| > \frac{\alpha}{2} \right\} \right| \quad (4.119)$$

这一项的处理上. 现在只需说明当 $\gamma \leq (2^{n+5}A_1)^{-1}$ 时有

$$|\{x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : |T^{(**)}(b)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| \leq 2^{n+8}A_2 \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha}. \quad (4.120)$$

定理就得证了. 这是因为逐字逐句仿照一般奇异积分算子 L^p 有界性的延拓定理4.9的证明可以说明

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |T^{(**)}(g)(x)| > \frac{\alpha}{2}\}| + |\bigcup_j Q_j^*| \leq \left(2^{n+2}B^2\gamma + \frac{(5\sqrt{n})^n}{\gamma} \right) \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha}.$$

将上述估计与(4.120)式结合, 取 $\gamma = (2^{n+5}(A_1 + A_2 + B))^{-1} \leq (2^{n+5}A_1)^{-1}$ 即得估计

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |T^{(**)}(f)(x)| > \alpha\}| \leq C_n(A_1 + A_2 + B) \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha},$$

其中 $C_n = 2^{-3} + (5\sqrt{n})^n 2^{n+5} + 2^{n+8}$.

下面证明(4.120)式, 这又只需说明对 $x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c$ 有

$$T^{(**)}(b)(x) \leq 4E_1(x) + 2^{n+2}\alpha\gamma E_2(x) + 2^{n+3}\alpha\gamma A_1 \quad (4.121)$$

即可, 其中

$$E_1(x) = \sum_j \int_{Q_j} |K(x-y) - K(x-y_j)| |b_j(y)| dy,$$

$$E_2(x) = \sum_j \int_{Q_j} |K(x-y) - K(x-y_j)| dy,$$

而 y_j 是 Q_j 的中心.

只要(4.121)式成立, 就可以很轻松地得到(4.120)式了. 这是因为若取 γ 满足 $\gamma \leq (2^{n+5}A_1)^{-1}$, 就有 $2^{n+3}\alpha\gamma A_1 < \frac{\alpha}{4} < \frac{\alpha}{3}$, 于是由(4.121)式与 $\frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha}{12} + \frac{\alpha}{12}$ 知

$$\begin{aligned} & \left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : |T^{(**)}(b)(x)| > \frac{\alpha}{2} \right\} \right| \\ & \leq \left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : 4E_1(x) > \frac{\alpha}{12} \right\} \right| + \left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : 2^{n+2}\alpha\gamma E_2(x) > \frac{\alpha}{12} \right\} \right| + \left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : 2^{n+3}\alpha\gamma A_1 > \frac{\alpha}{3} \right\} \right| \\ & = \left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : 4E_1(x) > \frac{\alpha}{12} \right\} \right| + \left| \left\{ x \in \left(\bigcup_j Q_j^* \right)^c : 2^{n+2}\alpha\gamma E_2(x) > \frac{\alpha}{12} \right\} \right| \\ & \leq \int_{\{x \in (\bigcup_j Q_j^*)^c : 4E_1(x) > \frac{\alpha}{12}\}} \frac{48}{\alpha} E_1(x) dx + \int_{\{x \in (\bigcup_j Q_j^*)^c : 2^{n+2}\alpha\gamma E_2(x) > \frac{\alpha}{12}\}} 2^{n+2}\alpha\gamma \cdot 12 \frac{E_2(x)}{\alpha} dx \\ & = \frac{48}{\alpha} \int_{(\bigcup_j Q_j^*)^c} E_1(x) dx + 2^{n+6}\gamma \int_{(\bigcup_j Q_j^*)^c} E_2(x) dx, \end{aligned} \quad (4.122)$$

进一步有

$$\begin{aligned} \int_{(\bigcup_j Q_j^*)^c} E_1(x) dx &= \int_{(\bigcup_j Q_j^*)^c} \left(\sum_j \int_{Q_j} |K(x-y) - K(x-y_j)| |b_j(y)| dy \right) dx \\ &\leq \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| \int_{(Q_j^*)^c} |K(x-y) - K(x-y_j)| dx dy \\ &\stackrel{(C)}{\leq} \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| \int_{|x-y_j| \geq 2|y-y_j|} |K(x-y) - K(x-y_j)| dx dy \\ &\stackrel{(D)}{\leq} A_2 \sum_j \int_{Q_j} |b_j(y)| dy = A_2 \sum_j \|b_j\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \stackrel{(E)}{\leq} A_2 2^{n+1} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned} \quad (4.123)$$

其中 (C) 是因为当 $x \in (Q_j^*)^c$ 时有 $|x-y_j| \geq \frac{1}{2}l(Q_j^*) = \frac{5}{2}\sqrt{n}l(Q_j)$, 而 $|y-y_j| \leq \frac{\sqrt{n}}{2}l(Q_j)$, 故 $|x-y_j| \geq 2|y-y_j|$ (见图 4.4); (D) 是 Hörmander 条件 4.103, (E) 是 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(v).




图 4.4: Q_j, Q_j^* 示意图

类似地, 对 E_2 有

$$\begin{aligned} \int_{(\bigcup_j Q_j^*)^c} E_2(x) dx &\leq \sum_j \int_{Q_j} dy \int_{|x-y_j| \geq 2|y-y_j|} |K(x-y) - K(x-y_j)| dx \\ &\leq \sum_j \int_{Q_j} A_2 dy \leq A_2 \sum_j |Q_j| \stackrel{(F)}{\leq} A_2 \frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha\gamma}, \end{aligned} \quad (4.124)$$

其中 (F) 是 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(vi). 结合 (4.122)-(4.124) 式即得 (4.120) 式.

现在的主要任务就是证明 (4.121) 式了. 因为 $b(x) = \sum_j b_j(x)$, 要估计 $T^{(**)}(b)$, 依照双重截断极大奇异积分的定义与三角不等式知只需给出每个 $|T^{(\varepsilon, N)}(b_j)|$ 关于 ε, N 的一致估计, 为此考虑

$$|T^{(\varepsilon, N)}(b_j)| \leq |T^{(\varepsilon)}(b_j)| + |T^{(N)}(b_j)|, \quad (4.125)$$

其中截断奇异积分 $T^{(\varepsilon)}(b_j)$ 是良定义的, 这是因为设 x 在紧集 K_0 内, 取 $M > 0$ 使得 $K_0 - Q_j$ 在球 $B(0, M)$ 内, 则

$$|T^{(\varepsilon)}(b_j)(x)| = \left| \int_{Q_j} K^{(\varepsilon)}(x-y) b_j(y) dy \right| \leq (|b_j| * |K^{(\varepsilon, M)}|)(x).$$

因为上右式是两个 L^1 函数的卷积, 故其几乎处处有限, 因此 $T^{(\varepsilon)}(b_j)(x)$ 所对应的积分绝对收敛, 进而其对几乎处处 x 均良定义. 类似可以说明 $T^{(N)}(b_j)$ 是良定义的.

下面对 $T^{(\varepsilon)}$ 作估计, 这些过程也能套用到 $T^{(N)}$ 上. 取定 $x \notin \bigcup_j Q_j^*, \varepsilon > 0$, 定义

$$\begin{aligned} J_1(x, \varepsilon) &= \{j : \forall y \in Q_j (|x-y| < \varepsilon)\}, \\ J_2(x, \varepsilon) &= \{j : \forall y \in Q_j (|x-y| > \varepsilon)\}, \\ J_3(x, \varepsilon) &= \{j : \exists y \in Q_j (|x-y| = \varepsilon)\}. \end{aligned} \quad (4.126)$$

注意到 $x \notin \bigcup_j Q_j^*, j \in J_1(x, \varepsilon)$ 时有

$$T^{(\varepsilon)}(b_j)(x) = \int_{Q_j} K^{(\varepsilon)}(x-y) b_j(y) dy = 0,$$

另在 $x \notin \bigcup_j Q_j^*, j \in J_2(x, \varepsilon)$ 时有

$$K^{(\varepsilon)}(x-y) = K(x-y),$$

于是

$$\sup_{\varepsilon > 0} |T^{(\varepsilon)}(b_j)(x)| \leq \sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_2(x, \varepsilon)} T(b_j)(x) \right| + \sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_3(x, \varepsilon)} T(b_j \chi_{|x-\cdot| \geq \varepsilon})(x) \right|.$$

又因为

$$\sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_2(x, \varepsilon)} T(b_j)(x) \right| \leq \sum_j |T(b_j)(x)| \leq E_1, \quad (4.127)$$

故只需估计

$$\sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_3(x, \varepsilon)} T(b_j \chi_{|x-\cdot| \geq \varepsilon})(x) \right|$$

即可.

下面进行一些几何上的观察: 根据图 4.4, 取定 $\varepsilon > 0$ 与指标 $j \in J_3(x, \varepsilon)$ 对应的方体 Q_j . 注意我们此时讨论的是 $x \in (\bigcup_j Q_j^*)^c$ 的情况, 于是

$$\varepsilon = |x-y| \geq \frac{1}{2}(l(Q_j^*) - l(Q_j)) = \frac{1}{2}(5\sqrt{n}-1)l(Q_j) \geq 2\sqrt{n}l(Q_j). \quad (4.128)$$

因为 $j \in J_3(x, \varepsilon)$, 根据 $J_3(x, \varepsilon)$ 的定义知存在 $y_0 \in Q_j$ 使得

$$|x-y_0| = \varepsilon.$$

由(4.128)式知

$$\begin{aligned}\frac{\varepsilon}{2} &\leq \varepsilon - \sqrt{nl}(Q_j) \leq |x - y_0| - |y - y_0| \leq |x - y|, \\ |x - y| &\leq |x - y_0| + |y - y_0| \leq \varepsilon + \sqrt{nl}(Q_j) \leq \frac{3\varepsilon}{2},\end{aligned}$$

于是

$$\bigcup_{j \in J_3(x, \varepsilon)} Q_j \subset B\left(x, \frac{3\varepsilon}{2}\right) \setminus B\left(x, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

现记

$$c_j(\varepsilon) = \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} b_j(y) \chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y) dy,$$

根据 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(v) 可得估计

$$|c_j(\varepsilon)| \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} 2^{n+1} \alpha \gamma \chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y) dy \leq 2^{n+1} \alpha \gamma,$$

因而

$$\begin{aligned}& \sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_3(x, \varepsilon)} \int_{Q_j} K(x-y) b_j(y) \chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y) dy \right| \\& \leq \sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_3(x, \varepsilon)} \int_{Q_j} K(x-y) (b_j(y) \chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y) - c_j(\varepsilon)) dy \right| + \sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_3(x, \varepsilon)} c_j(\varepsilon) \int_{Q_j} K(x-y) dy \right| \\& \stackrel{(G)}{\leq} \sup_{\varepsilon > 0} \left| \sum_{j \in J_3(x, \varepsilon)} \int_{Q_j} (K(x-y) - K(x-y_j)) (b_j(y) \chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y) - c_j(\varepsilon)) dy \right| + 2^{n+1} \alpha \gamma \sup_{\varepsilon > 0} \int_{B(x, \frac{3\varepsilon}{2}) \setminus B(x, \frac{\varepsilon}{2})} |K(x-y)| dy \\& \leq \sum_j \int_{Q_j} |K(x-y) - K(x-y_j)| (|b_j(y)| + 2^{n+1} \alpha \gamma) dy + 2^{n+1} \alpha \gamma \sup_{\varepsilon > 0} \int_{\frac{\varepsilon}{2} \leq |x-y| \leq \frac{3\varepsilon}{2}} |K(x-y)| dy \\& \leq E_1(x) + 2^{n+1} \alpha \gamma E_2(x) + 2^{n+1} \alpha \gamma (2A_1),\end{aligned} \tag{4.129}$$

其中 (G) 是因为 $\int_{Q_j} K(x-y_j) (b_j(y) \chi_{|x-y| \geq \varepsilon}(y) - c_j(\varepsilon)) dy = 0$. 结合(4.129), (4.127), (4.125) 式, 并考虑将上述过程对 $\sup_{N > 0} |T^{(N)}(b_j)(x)|$ 逐字逐句地重复一次所得的类似结果, 即得(4.121)式. $\square$

双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理 4.11 的意义在于: 只要知道了存在序列 $\varepsilon_j \downarrow 0, N_j \uparrow \infty$ 使得点态极限 $\lim_{j \rightarrow \infty} T^{(\varepsilon_j, N_j)}(f)$ 对在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的某稠密子空间内的全体 f 均几乎处处存在, 则由双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理 4.11 与算子族的点态收敛性 3.2 可知 $\lim_{j \rightarrow \infty} T^{(\varepsilon_j, N_j)}(f)$ 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 均几乎处处存在⁴⁶.

如果奇异积分的积分核形如 $\Omega(x/|x|)|x|^{-n}$, 其中 $\Omega \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ (如 Hilbert 变换与 Riesz 变换), 则依(4.110)式定义的截断积分核 K 的上界就不再需要了 (因为此时 K 在 $|x|$ 足够大时与 $|x|^{-n}$ 表现类似, 这便说明 K 在远处的 $p'(p' > 1)$ 阶可积性与 $\frac{1}{r}$ 的 $p'(p' > 1)$ 阶可积性应该等价, 后者在远处当然是可积的), 此时通过 Hölder 不等式可说明

$$T_\Omega^{(\varepsilon)}(f)(x) = \int_{|y| \geq \varepsilon} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy$$

对 $f \in \bigcup_{1 \leq p < \infty} L^p(\mathbb{R}^n)$ 均良定义, 且

$$T_\Omega^{(\varepsilon)}(f)(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon \leq |y| \leq N} f(x-y) \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^n} dy.$$

推论 4.4 (极大 Hilbert 变换与极大 Riesz 变换的弱 (1, 1) 型有界性)

极大 Hilbert 变换 $H^{(*)}$ 与极大 Riesz 变换 $R_j^{(*)}$ 是弱 (1, 1) 型算子. 另外, 极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H^{(\varepsilon)}(f)$ 与 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} R_j^{(\varepsilon)}(g)$ 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n), g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 都是几乎处处存在的.



⁴⁶ 怎么将定理内容本身的 L^2 与这里的稠密子空间联系起来?

证明 因为 Hilbert 变换的积分核 $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}$ 与 Riesz 变换的积分核 $\frac{x_j}{|x|^{n+1}} \in \mathbb{R}^n$ 均满足梯度条件(4.101), 故它们必满足 Hörmander 条件(4.103). 另外显见这两个积分核均满足尺寸条件(4.94), 故由双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理4.11立得 $H^{(*)}$ 与 $R_j^{(*)}$ 的弱 $(1,1)$ 型估计. 极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H^{(\varepsilon)}(f)$ 与 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} R_j^{(\varepsilon)}(g)$ 的存在性可结合算子族的点态收敛性3.2, Hilbert 变换的 L^2 性质??(i), 极大 Hilbert 变换的 $L^p(1 < p < \infty)$ 有界性4.4以及 Riesz 变换与极大 Riesz 变换的 $L^p(1, \infty)$ 有界性4.2得到, 这是因为这两个极限对 Schwartz 函数当然是存在的, 由双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理4.11即得结论. $\square$

由 Marcinkiewicz 插值定理的推论3.1可进一步得到下述结论:

推论 4.5

在双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理4.11的条件下, $T^{(**)}$ 可视作 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < 2$) 的算子, 且

$$\|T^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{C_n(A_1 + A_2 + B)}{p-1},$$

其中 C_n 是只关于维数的常数.



4.4 L^p 有界性的充分条件

前面我们已经用 Calderón-Zygmunde 分解证明了奇异积分算子与极大奇异积分算子在已知算子自身 L^2 有界时的弱 $(1,1)$ 型有界性. 一个问题顺势而生: 那么怎样的充分条件可以导出这些算子的 L^2 有界性呢? 更确切地说, 我们需要对 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数 K 添加怎样的充分条件, 才能让其所诱导的奇异积分算子与极大奇异积分算子是 L^2 有界算子? 在对齐次奇异积分的讨论中, 我们已经知道如果 K 形如 $K(x) = \Omega(x/|x|)|x|^{-n}$ (其中 $\Omega \in L^1(\mathbb{S}^{n-1})$ 满足 $\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \Omega(x) dx = 0$), 则(4.61)式就是 T 具有 L^2 有界性的充要条件, 而 $T^{(*)}$ 的 L^2 有界性需要更强的光滑性条件⁴⁷(对数可积性条件)(4.69).

对本节所考虑的一般积分核 K (其对应的算子不必与伸缩变换可换⁴⁸), 这里并不打算讨论其所诱导的算子 L^2 有界性的充要条件, 而只研究充分条件. 本节提到的 K 均为定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的局部可积函数, 其满足尺寸条件

$$\sup_{R>0} \int_{R \leq |x| \leq 2R} |K(x)| dx = A_1 < \infty, \quad (4.130)$$

光滑性条件

$$\sup_{y \neq 0} \int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx = A_2 < \infty, \quad (4.131)$$

与消失性条件

$$\sup_{0 < R_1 < R_2 < \infty} \left| \int_{R_1 < |x| < R_2} K(x) dx \right| = A_3 < \infty, \quad (4.132)$$

其中 $A_1, A_2, A_3 > 0$. 如前文所言, 光滑性条件(4.131)又称为 Hörmander 条件. 本节说明满足上述三个条件的积分核 K 所诱导的卷积算子具有 L^p 有界性.

4.4.1 奇异积分 L^p 有界性的充分条件: Calderón-Zygmund 定理

首先说明在条件(4.130)-(4.132)成立时, 存在形如(4.97)式的缓增分布 W , 且其在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与 K 重合. 这是因为消失性条件(4.132)表明存在序列 $\delta_j \downarrow 0$ 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j < |x| \leq 1} K(x) dx = L,$$

进而由一般积分核对应缓增分布的合法性4.8可知这样的缓增分布 W 是存在的. 注意此时有 $|L| \leq A_3$.

⁴⁷为什么这里会把对数可积性条件称作光滑性条件?

⁴⁸与伸缩变换可换是齐次函数对应算子的性质, 此时积分核的伸缩变换对应常数可以提出.

回忆在利用(4.97)式定义缓增分布 W 时, 提到过这样定义的缓增分布未必唯一. 但如果缓增分布 W, W' 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上均与 K 重合, 它们的差 $W - W'$ 就只能支在零点.

定理 4.12 (Calderón-Zygmund)

设 K 满足条件(4.130)-(4.132), W 是形如(4.97)式且在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与 K 重合的缓增分布, 则

$$\sup_{0 < \varepsilon < N < \infty} \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} |(K\chi_{\varepsilon < |\cdot| < N})^\wedge(\xi)| \leq 15(A_1 + A_2 + A_3), \quad (4.133)$$

进而

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} |\widehat{W}(\xi)| \leq 15(A_1 + A_2 + A_3). \quad (4.134)$$

从而算子 $T: \varphi \mapsto W * \varphi$ 可视作 $L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 其满足

$$\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \leq 15(A_1 + A_2 + A_3),$$

它也可视作 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 其满足

$$\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C_n(A_1 + A_2 + A_3),$$

最后, 也可将其视为 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 的算子, 且满足

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3),$$

其中 C_n, C'_n 是只关于维数的常数.



证明 当(4.133)式成立时, 记 $K^{(\varepsilon, N)}(x) = K(x)\chi_{\varepsilon < |x| < N}(x)$, 由(4.133)式这一关于 ε, δ 的一致估计与 Plancherel 定理 2.23 知对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|f * K^{(\delta_j, j)}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq 15(A_1 + A_2 + A_3)\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.135)$$

且估计(4.135)关于 j 一致. 由估计(4.135), 缓增分布 W 的定义式(4.97)与 Fatou 引理可得

$$\begin{aligned} \|f * W\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} &= \left\| \int_{\mathbb{R}^n} f(\cdot - y) \left(\lim_{j \rightarrow \infty} K(y)\chi_{\delta_j < |y| < j} \right) dy \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \liminf_{j \rightarrow \infty} \|f * K^{(\delta_j, j)}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq 15(A_1 + A_2 + A_3)\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 (A) 中蕴含的 Fatou 引理需要下界条件⁴⁹, 而这已由 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 K 的尺寸条件(4.130)保证了. 至此已知

$$\|f * W\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq 15(A_1 + A_2 + A_3)\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

由 Plancherel 定理 2.23 即得(4.134)式, 另由一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 知 $T: f \mapsto f * W$ 可延拓为 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 进而可延拓为 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 的算子, 其算子范数上界可由一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 计算得到.

下面证明(4.133)式, 考虑将 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 分为下述几种情况:

- 情况一: $\varepsilon < |\xi|^{-1} < N$. 此时可记

$$\widehat{K^{(\varepsilon, N)}}(\xi) = I_1(\xi) + I_2(\xi),$$

其中

$$\begin{aligned} I_1(\xi) &= \int_{\varepsilon < |x| < |\xi|^{-1}} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \\ I_2(\xi) &= \int_{|\xi|^{-1} < |x| < N} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx. \end{aligned}$$

针对 I_1 有

$$I_1(\xi) = \int_{\varepsilon < |x| < |\xi|^{-1}} K(x) dx + \int_{\varepsilon < |x| < |\xi|^{-1}} K(x) (e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) dx. \quad (4.136)$$

⁴⁹ 存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 使得 $f * K^{(\delta_j, j)} \geq g$.

进而由消失性条件(4.132), 微分中值定理与尺寸条件(4.130)知

$$|I_1(\xi)| \leq A_3 + 2\pi|\xi| \int_{|x| < |\xi|^{-1}} |x| |K(x)| dx \leq A_3 + 2\pi(2A_1).$$

显见上式是关于 ε 的一致估计. 下面还需得到 $I_2(\xi)$ 关于 N 的一致估计. 记 $z = \frac{\xi}{2|\xi|^2}$, 知 $e^{i2\pi z \cdot \xi} = -1$ 且 $2|z| = |\xi|^{-1}$, 作换元 $x = x' - z$ 知可将 I_2 记为

$$\begin{aligned} I_2(\xi) &= - \int_{|\xi|^{-1} < |x' - z| < N} K(x' - z) e^{-i2\pi x' \cdot \xi} dx' \\ &= - \int_{|\xi|^{-1} < |x - z| < N} K(x - z) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx. \end{aligned}$$

对 I_2 的两个表达式取平均可得

$$I_2(\xi) = \frac{1}{2} \int_{|\xi|^{-1} < |x| < N} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx - \frac{1}{2} \int_{|\xi|^{-1} < |x - z| < N} K(x - z) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx.$$

由积分等式

$$\int_A F dx - \int_B G dx = \int_B (F - G) dx + \int_{A \setminus B} F dx - \int_{B \setminus A} F dx, \quad (4.137)$$

可记 $I_2(\xi) = J_1(\xi) + J_2(\xi) + J_3(\xi) + J_4(\xi) + J_5(\xi)$, 其中

$$J_1(\xi) = \frac{1}{2} \int_{|\xi|^{-1} < |x - z| < N} (K(x) - K(x - z)) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad (4.138)$$

$$J_2(\xi) = \frac{1}{2} \int_{\substack{|\xi|^{-1} < |x| < N \\ |x - z| \leq |\xi|^{-1}}} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad (4.139)$$

$$J_3(\xi) = \frac{1}{2} \int_{\substack{|\xi|^{-1} < |x| < N \\ |x - z| \geq N}} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad (4.140)$$

$$J_4(\xi) = -\frac{1}{2} \int_{\substack{|\xi|^{-1} < |x - z| < N \\ |x| \leq |\xi|^{-1}}} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad (4.141)$$

$$J_5(\xi) = -\frac{1}{2} \int_{\substack{|\xi|^{-1} < |x - z| < N \\ |x| \geq N}} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx. \quad (4.142)$$

因为 $2|z| = |\xi|^{-1} \neq 0$, 故在 Hörmander 条件(4.131)中将 x 换成 $x - z$, y 换成 $-z$ 可知 $|J_1(\xi)| \leq \frac{1}{2} A_2$.

注意到在(4.139)式中有 $|\xi|^{-1} \leq |x| \leq \frac{3}{2}|\xi|^{-1}$, 在(4.141)式中有 $\frac{1}{2}|\xi|^{-1} \leq |x| \leq |\xi|^{-1}$, 故由尺寸条件(4.130)可知 $|J_2(\xi)| \leq \frac{1}{2} A_1$, $|J_4(\xi)| \leq \frac{1}{2} A_1$. 最后, 在(4.140)式中有 $\frac{1}{2}N < |x| < N$ (因为 $|x| > N - \frac{1}{2}|\xi|^{-1} \geq \frac{1}{2}N$), 类似地在(4.142)式中有 $N \leq |x| < \frac{3}{2}N$, 故由尺寸条件(4.130)知 $|J_3(\xi)| \leq \frac{1}{2} A_1$, $|J_5(\xi)| \leq \frac{1}{2} A_1$.

- 情况二: $\varepsilon < N \leq |\xi|^{-1}$. 此时记

$$\widehat{K^{(\varepsilon, N)}}(\xi) = \int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = \int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) dx + \int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) (e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) dx.$$

根据消失性条件(4.132), 微分中值定理与一般奇异积分核尺寸条件的等价提法4.7可知

$$\left| \int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) dx + \int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) (e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) dx \right| \leq A_3 + 2\pi|\xi| \int_{|x| \leq |\xi|^{-1}} |K(x)| |x| dx \leq A_3 + 4\pi A_1.$$

另若 $\xi = 0$, 则

$$\int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = \int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) dx.$$

它同样能被 A_3 控制.

- 情况三: $|\xi|^{-1} \leq \varepsilon < N$. 此时记

$$\int_{\varepsilon < |x| < N} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx = \int_{|\xi|^{-1} < |x| < N} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx - \int_{|\xi|^{-1} < |x| < \varepsilon} K(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx,$$

上右式两项均形如 I_2 , 进而用类似的方法可以说明上式被 $2A_1 + \frac{1}{2}A_2$ 控制.

综上, 对全体 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有估计 $|\widehat{K^{(\varepsilon, N)}}(\xi)| \leq 15(A_1 + A_2 + A_3)$, (4.133)式进而成立. $\square$

4.4.2 满足充分条件的一个例子

下面给出一个满足条件(4.130)-(4.132)的分布例子.

例 4.6 设 τ 是非零实数, $K(x) = \frac{1}{|x|^{n+i\tau}}$ 是定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数. 对序列 $\delta_k \downarrow 0$ 与 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 在极限存在时定义

$$\langle W, \varphi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\delta_k \leq |x|} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^{n+i\tau}}. \quad (4.143)$$

可以选取序列 δ_k 使得 W 是在 $\mathbb{R}^n$ 上良定义的缓增分布. 例如取 $\delta_k = e^{-2\pi \frac{k}{\tau}}$, 此时

$$\int_{\delta_k \leq |x| \leq 1} \frac{dx}{|x|^{n+i\tau}} = \omega_{n-1} \frac{1 - (e^{-2\pi \frac{k}{\tau}})^{-i\tau}}{-i\tau} = 0,$$

因而

$$\langle W, \varphi \rangle = \int_{|x| \leq 1} (\varphi(x) - \varphi(0)) \frac{dx}{|x|^{n+i\tau}} + \int_{|x| \geq 1} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^{n+i\tau}}. \quad (4.144)$$

由微分中值定理与 Schwartz 空间对多项式乘积的封闭性可证

$$|\langle W, \varphi \rangle| \leq C(\|\nabla \varphi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \|\varphi(\cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}).$$

因而 $W \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 另外, 若 φ 支在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上, 则

$$\langle W, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} K(x) \varphi(x) dx,$$

这说明 W 在零点之外与函数 K 重合. 现在显见 K 满足尺寸条件(4.130)与 Hörmander 条件(4.131), 对于消失性条件(4.132), 知

$$\left| \int_{R_1 < |x| < R_2} \frac{dx}{|x|^{n+i\tau}} \right| = \omega_{n-1} \left| \frac{R_1^{-i\tau} - R_2^{-i\tau}}{-i\tau} \right| \leq \frac{2\omega_{n-1}}{|\tau|}.$$

由 τ 非零即知 K 满足消失性条件(4.132).

注 我们需要特别强调: 极限(4.143)未必对所有趋零序列 $\{\delta_k\}$ 均成立. 例如取 $\delta_k = e^{-\pi \frac{k}{\tau}}$, 极限(4.143)就不存在. 另外, 就算选取的序列 $\{\delta_k\}$ 能使得极限(4.143)存在, 根据所取序列的不同 (例如令 $\delta_k = e^{-\pi \frac{2k+1}{\tau}}$), 我们也将得到在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与函数 $K(x) = |x|^{-n-i\tau}$ 重合的另一分布 W_1 .

另外, 就算 $K(x)$ 本身是 $-n - i\tau$ 阶齐次函数, 依(4.143)式定义的缓增分布 W 也未必是 $-n - i\tau$ 阶齐次分布. 事实上, 在零点外与函数 $|x|^{-n-i\tau}$ 重合的 $-n - i\tau$ 阶齐次分布只有一种, 即分布 $u_{-n-i\tau}$ 的常数倍, 其中分布 u_z 依(2.82)式定义:

$$\langle u_z, f \rangle := \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\pi^{\frac{z+n}{2}}}{\Gamma(\frac{z+n}{2})} |x|^z f(x) dx, \quad z \in \mathbb{C}, f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n),$$

由(2.83)式可知

$$\langle u_{-n-i\tau}, \varphi \rangle = \int_{|x| \geq 1} \varphi(x) \frac{\pi^{-i\frac{\tau}{2}}}{\Gamma(-i\frac{\tau}{2})} |x|^{-n-i\tau} dx + \int_{|x| \leq 1} (\varphi(x) - \varphi(0)) \frac{\pi^{-i\frac{\tau}{2}}}{\Gamma(-i\frac{\tau}{2})} |x|^{-n-i\tau} dx + \frac{\omega_{n-1} \pi^{-i\frac{\tau}{2}}}{-i\tau \Gamma(-i\frac{\tau}{2})} \varphi(0).$$

与(4.144)式对比知 $u_{-n-i\tau} - c_1 W = c_2 \delta_0$, 其中 c_1, c_2 是某非零常数. 因为在原点处的 Dirac 测度不是 $-n - i\tau$ 阶齐次分布, 故 W 也不会是 $-n - i\tau$ 阶齐次分布.

另知

$$\widehat{u_{-n-i\tau}} = u_{i\tau} = c_3 |\xi|^{i\tau},$$

于是恒等式 $u_{-n-i\tau} - c_1 W = c_2 \delta_0$ 也能用于导出 W 的 Fourier 变换的表达式, 进而给出 Calderón-Zygmund 定理 4.12 不同于前述方法的另一种证明.

4.4.3 消失性条件的必要性

尽管条件(4.130)-(4.132)是 L^2 有界性的充分条件, 它们却不一定是必要条件. 本小节说明在给出尺寸条件(4.130)的情况下, 消失性条件(4.132)将是必要的.

命题 4.9

设 K 是定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上, 且满足尺寸条件(4.130)的函数; W 是由 K 依(4.97)式诱导的定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的缓增分布. 若算子 $T: f \mapsto W * f$ 是 L^2 有界的 (该条件也等价于 $\widehat{W} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$), 则函数 K 必满足消失性条件(4.132).



证明 取光滑径向函数 φ 满足 $\text{supp } \varphi \subset B(0, 2)$, $0 \leq \varphi \leq 1$, 且 $|x| \leq 1$ 时 $\varphi(x) = 1$. 对 $R > 0$ 定义 $\varphi^R(x) = \varphi(\frac{x}{R})$, 则

$$(W * \varphi^R)(0) = \langle W, \varphi^R \rangle = \langle \widehat{W}, \widehat{\varphi^R} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{W}(\xi) R^n \widehat{\varphi}(R\xi) d\xi,$$

于是

$$|(W * \varphi^R)(0)| \leq \|\widehat{W}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\widehat{\varphi}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \|\widehat{\varphi}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.145)$$

且上述估计关于 $R > 0$ 一致. 取定 $0 < R_1 < R_2 < \infty$, 若 $R_2 \leq 2R_1$, 则

$$\left| \int_{R_1 < |x| < R_2} K(x) dx \right| \leq \int_{R_1 < |x| < 2R_1} |K(x)| dx \leq A_1.$$

这便是消失性条件(4.132). 现设 $2R_1 < R_2$, 根据尺寸条件(4.130)知消失性条件(4.132)中 $R_1 < |x| < 2R_1$ 的部分已经被 A_1 一致控制了, 故只需说明 $2R_1 < |x| < R_2$ 的部分也具有统一控制. 因为 $\varphi^{R_2} - \varphi^{R_1}$ 支在原点之外, 故缓增分布 W 在该函数上的作用可以写成 K 与该函数的 L^2 内积的形式. 知:

$$\int_{\mathbb{R}^n} K(x)(\varphi^{R_2}(x) - \varphi^{R_1}(x)) dx = \int_{2R_1 < |x| < R_2} K(x) dx + \int_{R_1 < |x| < 2R_1} K(x)(1 - \varphi^{R_1}(x)) dx + \int_{R_2 < |x| < 2R_2} K(x)\varphi^{R_2}(x) dx.$$

因为 $0 \leq \varphi \leq 1$, 故由尺寸条件(4.130)可知上右式后两项将被 $3A_1$ 控制. 对上左式, 由(4.145)式知

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} K(x)(\varphi^{R_2}(x) - \varphi^{R_1}(x)) dx \right| \leq |(W * \varphi^{R_2})(0)| + |(W * \varphi^{R_1})(0)| \leq 2\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \|\widehat{\varphi}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_{2R_1 < |x| < R_2} K(x) dx \right| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(x)(\varphi^{R_2}(x) - \varphi^{R_1}(x)) dx \right| \\ &\quad + \left| \int_{R_1 < |x| < 2R_1} K(x)(1 - \varphi^{R_1}(x)) dx + \int_{R_2 < |x| < 2R_2} K(x)\varphi^{R_2}(x) dx \right| \\ &\leq 2\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \|\widehat{\varphi}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + 3A_1, \end{aligned}$$

因此 K 必满足消失性条件(4.132), 且其对应常数满足

$$A_3 \leq 3A_1 + 2\|\widehat{\varphi}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \leq c(A_1 + \|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)}).$$

命题至此即证. □

4.4.4 极大奇异积分算子 L^p 有界性的充分条件

对极大奇异积分算子 $T^{(**)}$ 而言, 有类似于 Calderón-Zygmund 定理4.12的结论.

定理 4.13 (极大奇异积分算子 L^p 有界性的充分条件)

若 K 满足尺寸条件(4.130), Hörmander 条件(4.131)与消失性条件(4.132), 且 $T^{(**)}$ 依(4.111)式定义, 则 $T^{(**)}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 的有界算子, 且

$$\|T^{(**)}\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3),$$

其中 C_n 是只关于维数的常数. ♡

证明 若 K 满足条件(4.130)-(4.132), 根据消失性条件(4.132)知存在序列 $\delta_j \downarrow 0$ 使得极限

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j < |x| \leq 1} K(x) dx$$

存在. 因此对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 可定义缓增分布:

$$\langle W, \varphi \rangle = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j \leq |x| \leq j} K(x) \varphi(x) dx,$$

进而可以定义算子 $T: f \mapsto f * W (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. 由 Calderón-Zygmund 定理 4.12 知 T 是强 $(2, 2)$ 型算子, 进而由一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 可知 T 是强 $(p, p) (1 < p < \infty)$ 型算子, 且

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3). \quad (4.146)$$

另外 T 也是弱 $(1, 1)$ 型算子, 记经过这些延拓后得到的算子依旧为 T .

现取定 $1 < p < \infty, f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 则

$$\begin{aligned} T^{(\varepsilon, N)}(f)(x) &= \int_{\varepsilon \leq |x-y| < N} K(x-y) f(y) dy = T^{(\varepsilon)}(f)(x) - T^{(N)}(f)(x) \\ &= \int_{|x-y| \geq \varepsilon} K(x-y) f(y) dy - \int_{|x-y| \geq N} K(x-y) f(y) dy \\ &= \int_{|x-y| \geq \varepsilon} (K(x-y) - K(z_1-y)) f(y) dy + \int_{|x-y| \geq \varepsilon} K(z_1-y) f(y) dy \\ &\quad - \int_{|x-y| \geq N} (K(x-y) - K(z_2-y)) f(y) dy - \int_{|x-y| \geq N} K(z_2-y) f(y) dy \\ &\stackrel{(A)}{=} \int_{\varepsilon \leq |x-y|} (K(x-y) - K(z_1-y)) f(y) dy + T(f)(z_1) - T(f\chi_{|x-\cdot| < \varepsilon})(z_1) \\ &\quad - \int_{N \leq |x-y|} (K(x-y) - K(z_2-y)) f(y) dy - T(f)(z_2) + T(f\chi_{|x-\cdot| < N})(z_2), \end{aligned} \quad (4.147)$$

其中 (A) 是因为 $\{y: |x-y| \geq \varepsilon\} = \mathbb{R}^n \setminus \{y: |x-y| < \varepsilon\}$, z_1, z_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意选取的点, 且它们满足 $|z_1 - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}, |z_2 - x| \leq \frac{N}{2}$. 因为 f 具有紧支集, 故对每个给定的 ε, N 而言, $T^{(\varepsilon)}(f)(x)$ 与 $T^{(N)}(f)(x)$ 都是对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n$ 收敛的积分, 因而 (4.147) 式至少是有意义的.

现在在 (4.147) 式两端取绝对值, 并在 $|z_1 - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}, |z_2 - x| \leq \frac{N}{2}$ 上取球平均可得:

$$\begin{aligned} |T^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| &\leq \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^n \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} |K(x-y) - K(z_1-y)| |f(y)| dy dz_1 \\ &\quad + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^n \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} |T(f)(z_1)| dz_1 \\ &\quad + \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^n \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} |T(f\chi_{|x-\cdot| < \varepsilon})(z_1)|^p dz_1 \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\quad + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N}\right)^n \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} \int_{|x-y| \geq N} |K(x-y) - K(z_2-y)| |f(y)| dy dz_2 \\ &\quad + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N}\right)^n \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} |T(f)(z_2)| dz_2 \\ &\quad + \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N}\right)^n \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} |T(f\chi_{|x-\cdot| < N})(z_2)|^p dz_2 \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

其中 ν_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积. 由 Hörmander 条件 (4.131) 与估计 (4.146) 可知对任意具有紧支集的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 有:

$$\begin{aligned} |T^{(\varepsilon, N)}(f)(x)| &\leq \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} |K(x-y) - K(z_1-y)| dy dz_1 \\ &\quad + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N}\right)^n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} \int_{|x-y| \geq N} |K(x-y) - K(z_2-y)| dy dz_2 \\ &\quad + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^n \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} |T(f)(z_1)| dz_1 + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N}\right)^n \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} |T(f)(z_2)| dz_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3) \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} |f(z_1) \chi_{|x-z_1| < \varepsilon}(z_1)|^p dz_1 \right)^{\frac{1}{p}} \\
& + C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3) \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} |f(z_2) \chi_{|x-z_2| < N}(z_2)|^p dz_2 \right)^{\frac{1}{p}} \\
& \stackrel{(B)}{\leq} \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon} \right)^n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} A_2 dz_1 + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N} \right)^n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} A_2 dz_2 \\
& + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon} \right)^n \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} |T(f)(z_1)| dz_1 + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N} \right)^n \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} |T(f)(z_2)| dz_2 \\
& + C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3) \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon} \right)^n \int_{|x-z_1| < \varepsilon} |f(z_1)|^p dz_1 \right)^{\frac{1}{p}} \\
& + C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3) \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N} \right)^n \int_{|x-z_2| < N} |f(z_2)|^p dz_2 \right)^{\frac{1}{p}} \\
& \leq \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon} \right)^n \int_{|z_1-x| \leq \frac{\varepsilon}{2}} |T(f)(z_1)| dz_1 + \frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N} \right)^n \int_{|z_2-x| \leq \frac{N}{2}} |T(f)(z_2)| dz_2 \\
& + C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3) \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{\varepsilon} \right)^n \int_{|x-z_1| < \varepsilon} |f(z_1)|^p dz_1 \right)^{\frac{1}{p}} \\
& + C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_1 + A_2 + A_3) \left(\frac{1}{\nu_n} \left(\frac{2}{N} \right)^n \int_{|x-z_2| < N} |f(z_2)|^p dz_2 \right)^{\frac{1}{p}} + 2A_1.
\end{aligned}$$

根据紧支函数在 $L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性与上述估计在 $L^p \cap L^\infty$ 意义下的封闭性知上述估计对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 均成立 (此时就没有紧支条件了). 对全体 $0 < \varepsilon < N$ 与 $N > 0$ 取上确界可知对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 均有估计

$$T^{(**)}(f)(x) \leq 2A_2 \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + S_p(f)(x), \quad (4.148)$$

其中 S_p 是按下式定义的次线性算子⁵⁰

$$S_p(f)(x) = 2M(T(f))(x) + 3^{n+1}C_n(A_1 + A_2 + A_3) \max(p, (p-1)^{-1})(M(|f|^p)(x))^{\frac{1}{p}},$$

其中 M 是 Hardy-Littlewood 极大算子.

对 Hardy-Littlewood 极大算子 M 而言, 已由极大函数的弱 (1,1) 型不等式与强 (p, p) 型不等式 3.8 知它是 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 与 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的有界算子, 进而由估计 (4.146) 知 S_p 可视为 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的算子, 且

$$\|S_p\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \widetilde{C}_n(A_1 + A_2 + A_3) \max(p, (p-1)^{-1}), \quad (4.149)$$

其中 $\widetilde{C}_n$ 是只关于维数的常数.

现记 $f(x) = f_\alpha(x) + f^\alpha(x)$, 其中

$$f_\alpha(x) = f(x) \chi_{|f(x)| \leq \frac{\alpha}{16A_2}}(x), \quad f^\alpha(x) = f(x) \chi_{|f(x)| > \frac{\alpha}{16A_2}}.$$

因为 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故 $f_\alpha \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^p(\mathbb{R}^n)$, $f^\alpha \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^p(\mathbb{R}^n)$. 另外显见

$$\|f^\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \left(\frac{16A_2}{\alpha} \right)^{p-1} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p. \quad (4.150)$$

对函数 f^α 应用高度为 $\alpha\gamma$ 的 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8, 记 $f^\alpha(x) = g^\alpha(x) + b^\alpha(x)$, 其中 g^α, b^α 分别对应分解中的好函数与坏函数. 由 (4.89) 式与 Hölder 不等式知

$$\|g^\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{\frac{n}{p'}} (\alpha\gamma)^{\frac{1}{p'}} \|f^\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{p}} \leq 2^{\frac{n+4}{p'}} (A_2\gamma)^{\frac{1}{p'}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (4.151)$$

现在由 (4.148) 式, 三角不等式与 S_p 的次线性性可知

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : T^{(**)}(f)(x) > \alpha\}| \leq b_1 + b_2 + b_3, \quad (4.152)$$

⁵⁰定义中的 3 按照原式放缩的话应该是 2 吧? 不过这里对结论没有什么影响.

其中

$$\begin{aligned} b_1 &= \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : 2A_2 \|f_\alpha\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + S_p(f_\alpha)(x) > \frac{\alpha}{4} \right\} \right| \\ b_2 &= \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : 2A_2 \|g^\alpha\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + S_p(g^\alpha)(x) > \frac{\alpha}{4} \right\} \right| \\ b_3 &= \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : T^{(**)}(b^\alpha)(x) > \frac{\alpha}{2} \right\} \right|. \end{aligned}$$

根据 f_α 的定义显见 $2A_2 \|f_\alpha\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{\alpha}{8}$. 为使 $2A_2 \|g^\alpha\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, 利用 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(ii) 并令 $\gamma = 2^{-n-5}(A_1 + A_2)^{-1}$ 可知

$$2A_2 \|g^\alpha\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq A_2 2^{n+1} \alpha \gamma \leq \alpha 2^{-4} < \frac{\alpha}{8},$$

于是

$$\begin{aligned} b_1 &\leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : S_p(f_\alpha)(x) > \frac{\alpha}{8} \right\} \right|, \\ b_2 &\leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : S_p(g^\alpha)(x) > \frac{\alpha}{8} \right\} \right|. \end{aligned} \quad (4.153)$$

因为 $\gamma = 2^{-n-5}(A_1 + A_2)^{-1} \leq (2^{n+5}A_1)^{-1}$, 由 (4.120) 式可知

$$b_3 \leq \left| \bigcup_j Q_j^* \right| + 2^{n+8} A_2 \frac{\|f^\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha} \leq \left(\frac{(5\sqrt{n})^n}{\gamma} + 2^{n+8} A_2 \right) \frac{\|f^\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\alpha},$$

进而由 (4.150) 式知

$$b_3 \leq C_n (A_1 + A_2)^p \alpha^{-p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p. \quad (4.154)$$

对 (4.153) 式应用 Chebyshev 不等式, 并结合 (4.149) 式可知

$$\begin{aligned} b_1 &\leq \left(\frac{8}{\alpha} \right)^p \|S_p(f_\alpha)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \left(\frac{8}{\alpha} \right)^p \tilde{C}_n^p (A_1 + A_2 + A_3)^p \max(p, (p-1)^{-1})^p \|f_\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p, \\ b_2 &\leq \left(\frac{8}{\alpha} \right)^p \|S_p(g^\alpha)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \left(\frac{8}{\alpha} \right)^p \tilde{C}_n^p (A_1 + A_2 + A_3)^p \max(p, (p-1)^{-1})^p \|g^\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p. \end{aligned}$$

另知 $\|f_\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 故

$$b_1 + b_2 \leq \left(\frac{8}{\alpha} \right)^p \tilde{C}_n^p (A_1 + A_2 + A_3)^p \max(p, (p-1)^{-1})^p (\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p + \|g^\alpha\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p). \quad (4.155)$$

结合 (4.155), (4.154), (4.151) 式可得

$$\|T^{(**)}(f)\|_{L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C_n (A_1 + A_2 + A_3) \max(p, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (4.156)$$

最后, 我们还需要把 (4.156) 左式的 $L^{p,\infty}$ 范数改为 L^p 范数. 为了突破插值理论的限制⁵¹, 不可避免地需要使用双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理 4.11, 为此首先需要得到 $T^{(**)}$ 的强 (2,2) 型有界性. 当 $p = 2$ 时, 由 $L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 知 (4.156) 式自然蕴含了 $T^{(**)}$ 的强 (2,2) 型有界性, 而这进一步已经得到了欲证, 下面便考虑 $p \neq 2$ 的情况. 在 $p \neq 2$ 时, 总能通过对偶说明 $T^{(**)}$ 也是弱 (p', p') 型有界的, 且 2 必定在 p, p' 之间, 故由 Marcinkiewicz 插值定理 3.4 可知 $T^{(**)}$ 是强 (2,2) 型有界的, 进而由双重截断极大奇异积分算子 L^2 有界性延拓定理 4.11 知 $T^{(**)}$ 是弱 (1,1) 型有界的. 于是当 $2 < p < \infty$ 时, 为了通过插值获得强 (p, p) 型不等式, 可以尝试获得弱 (Bp, Bp) 型不等式 (其中 $B > 1$ 是待定系数), 根据对偶性知只需获得弱 $(\frac{Bp}{Bp-1}, \frac{Bp}{Bp-1})$ 型不等式. 为了求解系数 B , 要求 $\frac{Bp}{Bp-1} < p \Rightarrow \frac{1+B}{B} < p$. 特别取 $\frac{1+B}{B} < 2$ 即知 B 有解, 取符合条件的 B 即得 $T^{(**)}$ 的强 (p, p) 型不等式. 而当 $1 < p < 2$ 时, 根据 Marcinkiewicz 插值定理 3.4 可得 $T^{(**)}$ 的强 $(\frac{1+p}{2}, \frac{1+p}{2})$ 型不等式, 通过对偶性可得强 $(\frac{p+1}{p-1}, \frac{p+1}{p-1})$ 型不等式, 又因为容易验证 $1 < p < 2$ 时 $\frac{1+p}{2} < p < \frac{p+1}{p-1}$, 故由 Riesz-Thorin 插值定理 2.24 即得 $T^{(**)}$ 的强 (p, p) 型不等式. 至此命题即证. $\square$

⁵¹ 如果仅仅考虑插值理论, 我们只能知道从弱 (p, p) 型有界能推出弱 (p', p') 型有界, 而插值只能进一步得到强 (r, r) 型有界, 其中 r 在 p, p' 之间, 这没法得出强 (p, p) 型有界.

4.5 向量值不等式

出现在 Fourier 分析中的很多非线性表达式 (比如极大函数与平方函数) 都可以看成线性量在某个 Banach 空间中的取值, 这一观点成为了 Banach 值算子系统研究的动机. 下面我们通过一个例子来说明这一想法. 设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是测度空间, T 是作用在 $L^p(X, \mu)$ 上的线性算子, 其在 (Y, ν) 上的可测函数空间中取值. 下面这一看上去非线性的不等式

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(Y, \nu)} \leq C_p \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(X, \mu)} \quad (4.157)$$

通过视角的改变即可转换为线性不等式. 记 $L^p(X, l^2)$ 为 X 上所有满足下式的序列 $\{f_j\}_j$ 构成的 Banach 空间:

$$\|\{f_j\}_j\|_{L^p(X, l^2)} = \left(\int_X \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{\frac{p}{2}} d\mu \right)^{\frac{1}{p}} < \infty. \quad (4.158)$$

定义作用在这些序列上的线性算子为

$$T(\{f_j\}_j) = \{T(f_j)\}_j. \quad (4.159)$$

则(4.157)式等价于不等式

$$\|T(\{f_j\}_j)\|_{L^p(Y, l^2)} \leq C_p \|\{f_j\}_j\|_{L^p(X, l^2)}, \quad (4.160)$$

其中 T 是作用在 X 上取值在 l^2 空间中的 L^p 函数构成空间的线性算子. 这便是向量值不等式的基本想法: 类似于(4.157)式的非线性不等式可以看成作用在合适的 Banach 空间, 且在合适的 Banach 空间中取值的算子的线性范数估计.

4.5.1 线性算子的 l^2 值延拓

下面的结果在向量值不等式的研究中是经典且基本的.

定理 4.14 (线性算子的 l^2 值延拓)

设 $0 < p, q < \infty, (X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, 则有下列命题成立:

- (a) 若 $T: L^p(X) \rightarrow L^q(Y)$ 是算子范数为 N 的有界线性算子, 则 T 具有 l^2 值延拓, 即对 $L^p(X)$ 中的全体复值函数 f_j 均有:

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^q(Y)} \leq C_{p,q} N \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(X)}, \quad (4.161)$$

其中 $C_{p,q}$ 是常数, 在 $p \leq q$ 时 $C_{p,q} = 1$. 另外, 若 T 将实 L^p 函数以算子范数 N_{real} 映为实 L^q 函数, 则(4.161)式对实函数 f_j 也成立, 且 N 此时换为 N_{real} .

- (b) 若 $T: L^p(X) \rightarrow L^{q,\infty}(Y)$ 是算子范数为 M 的有界线性算子, 则 T 具有 l^2 值延拓, 即:

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{q,\infty}(Y)} \leq D_{p,q} M \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(X)}, \quad (4.162)$$

其中 $D_{p,q}$ 是仅依赖于 p, q 的常数. 另外, 若 T 将实 L^p 函数以算子范数 M_{real} 映为实 $L^{q,\infty}$ 函数, 则(4.162)式对实函数 f_j 也成立, 且 M 此时换为 M_{real} .



要证明延拓定理4.14, 首先需要作下述准备:

引理 4.4

对任意 $0 < r < \infty$, 记

$$A_r = \left(\frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})}{\pi^{\frac{r+1}{2}}} \right)^{\frac{1}{r}}, \quad B_r = \left(\frac{\Gamma(\frac{r}{2} + 1)}{\pi^{\frac{r}{2}}} \right)^{\frac{1}{r}}. \quad (4.163)$$

则对任意 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n|^r e^{-\pi|x|^2} dx \right)^{\frac{1}{r}} = A_r (\lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (4.164)$$

其中 $dx = dx_1 \cdots dx_n$. 另外对任意 $w_1, w_2, \dots, w_n \in \mathbb{C}$ 有

$$\left(\int_{\mathbb{C}^n} |w_1 z_1 + \dots + w_n z_n|^r e^{-\pi|z|^2} dz \right)^{\frac{1}{r}} = B_r (|w_1|^2 + \dots + |w_n|^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (4.165)$$

其中 $dz = dz_1 \cdots dz_n$, 若记 $z_j = x_j + iy_j$, 则 $dz = dx_1 dy_1 \cdots dx_n dy_n$.



证明 在(4.164)式两端同时除以 $(\lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2)^{\frac{1}{2}}$, 可知只需讨论 $\lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2 = 1$ 的情形. 设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^t$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个标准列向量, 另设 $n \times n$ 正交阵 $A \in O(n)$ 满足 $A^{-1}e_1 = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^t$, 则 Ax 的第一个坐标为:

$$(Ax)_1 = Ax \cdot e_1 = x \cdot A^t e_1 = x \cdot A^{-1} e_1 = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n.$$

现在在(4.164)式中换元 $y = Ax$ 并注意到 $|Ax| = |x|$, 知

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n|^r e^{-\pi|x|^2} dx \right)^{\frac{1}{r}} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} |y_1|^r e^{-\pi|y|^2} dy \right)^{\frac{1}{r}} \stackrel{(A)}{=} \left(2 \int_0^\infty t^r e^{-\pi t^2} dt \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \left(\int_0^\infty s^{\frac{r-1}{2}} e^{-\pi s} ds \right)^{\frac{1}{r}} = \left(\frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})}{\pi^{\frac{r+1}{2}}} \right)^{\frac{1}{r}} = A_r, \end{aligned}$$

此即(4.164)式, 其中 (A) 是因为 $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi|x|^2} dx = 1$.

(4.165)式的证明几乎是一样的. 通过相同的操作可设

$$|w_1|^2 + \dots + |w_n|^2 = 1.$$

设 ε_1 是 $\mathbb{C}^n$ 中第一个元素为 1, 其余元素均为 0 的列向量, 并设 $n \times n$ 酉矩阵⁵² $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^{-1}\varepsilon_1 = (\overline{w_1}, \dots, \overline{w_n})^t$. 则 $(\mathcal{A}z)_1 = w_1 z_1 + \dots + w_n z_n$, 且 $|\mathcal{A}z| = |z|$. 因此在(4.165)式中换元 $\zeta = \mathcal{A}z$ 知:

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{C}^n} |\zeta_1|^r e^{-\pi|\zeta|^2} d\zeta \right)^{\frac{1}{r}} &= \left(\int_{\mathbb{C}} |\zeta_1|^r e^{-\pi|\zeta_1|^2} d\zeta_1 \right)^{\frac{1}{r}} \stackrel{(B)}{=} \left(2\pi \int_0^\infty t^r e^{-\pi t^2} t dt \right)^{\frac{1}{r}} \\ &\stackrel{(C)}{=} \left(\pi \int_0^\infty s^{\frac{r}{2}} e^{-\pi s} ds \right)^{\frac{1}{r}} = \left(\frac{\Gamma(\frac{r}{2} + 1)}{\pi^{\frac{r}{2}}} \right)^{\frac{1}{r}} = B_r, \end{aligned}$$

其中 (B) 是极坐标换元, (C) 是换元 $s = t^2$. □

下面证明线性算子的 l^2 值延拓定理4.14.

证明 该证明依赖于(4.165)式与引理4.4.

⁵²即 $\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^*$, 其中 $\mathcal{A}^*$ 表示 $\mathcal{A}$ 的共轭转置, 亦即其中各元素均为 $\mathcal{A}^t$ 对应元素的共轭, 且 $u \cdot \overline{\mathcal{A}v} = \mathcal{A}^* u \cdot v$ 对任意 $u, v \in \mathbb{C}^n$ 均成立.

(a): 先设 $q < p$, 依照(4.163)式定义 B_r , 并设序列 $\{f_j\}_j$ 的指标在 $\mathbb{N}$ 中. 知:

$$\begin{aligned}
\left\| \left(\sum_{j=1}^n |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^q(Y)}^q &= \int_Y \left(\sum_{j=1}^n |T(f_j)(y)|^2 \right)^{\frac{q}{2}} d\nu \\
&\stackrel{(A)}{=} (B_q)^{-q} \int_Y \int_{\mathbb{C}^n} |z_1 T(f_1)(y) + \cdots + z_n T(f_n)(y)|^q e^{-\pi|z|^2} dz d\nu \\
&= (B_q)^{-q} \int_{\mathbb{C}^n} \int_Y |T(z_1 f_1 + \cdots + z_n f_n)(y)|^q d\nu e^{-\pi|z|^2} dz \\
&\stackrel{(B)}{\leq} (B_q)^{-q} N^q \int_{\mathbb{C}^n} \left(\int_X |z_1 f_1(x) + \cdots + z_n f_n(x)|^p d\mu \right)^{\frac{q}{p}} e^{-\pi|z|^2} dz \\
&\stackrel{(C)}{\leq} (B_q)^{-q} N^q \left(\int_{\mathbb{C}^n} \int_X |z_1 f_1(x) + \cdots + z_n f_n(x)|^p d\mu e^{-\pi|z|^2} dz \right)^{\frac{q}{p}} \\
&\stackrel{(D)}{=} (B_q)^{-q} N^q \left(B_p^p \int_X (|f_1(x)|^2 + \cdots + |f_n(x)|^2)^{\frac{p}{2}} d\mu \right)^{\frac{q}{p}} \\
&= (B_p B_q^{-1})^q N^q \left\| \left(\sum_{j=1}^n |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(X)}^q.
\end{aligned}$$

其中 (A) 是在(4.165)式中取 $w_i = T(f_j)(y)$, $r = q$, 再在(4.165)式两端同时取 q 次幂, 将所得等式右端代入 (A) 左端得到的 (A) 右端; (B) 是因为 T 作为 $L^p(X) \rightarrow L^q(Y)$ 的算子, 其算子范数为 N ; (C) 是在 $\int_{\mathbb{C}^n}$ 这一层积分中用测度为 $e^{-\pi|z|^2} dz$ 的 Hölder 不等式, 且分别为 1 和 $\left(\int_X |z_1 f_1 + \cdots + z_n f_n|^p d\mu \right)^{\frac{q}{p}}$ 分配指标 $\left(\frac{p}{q} \right)'$, $\frac{p}{q}$; (D) 是在(4.165)式中取 $w_i = f_i(x)$, $r = p$, 再在(4.165)式两端同时取 p 次幂, 将所得等式左端代入 (D) 左端得到的 (D) 右端. 现在在上式令 $n \rightarrow \infty$ 即得(4.161)式在 $q < p$ 时的情况, 其中 $C_{p,q} = B_p B_q^{-1}$.

下面讨论 $q \geq p$ 的情况, 在同样的记号下知

$$\begin{aligned}
\left\| \left(\sum_{j=1}^n |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^q(Y)}^q &= \int_Y \left(\sum_{j=1}^n |T(f_j)(y)|^2 \right)^{\frac{q}{2}} d\nu \\
&\stackrel{(E)}{=} (B_q)^{-q} \int_Y \int_{\mathbb{C}^n} |z_1 T(f_1)(y) + \cdots + z_n T(f_n)(y)|^q e^{-\pi|z|^2} dz d\nu \\
&\stackrel{(F)}{\leq} (N B_q^{-1})^q \int_{\mathbb{C}^n} \left(\int_X |z_1 f_1(x) + \cdots + z_n f_n(x)|^p d\mu \right)^{\frac{q}{p}} e^{-\pi|z|^2} dz \\
&= (N B_q^{-1})^q \left\| \int_X |z_1 f_1(x) + \cdots + z_n f_n(x)|^p d\mu \right\|_{L^{\frac{q}{p}}(\mathbb{C}^n, e^{-\pi|z|^2} dz)}^{\frac{q}{p}} \\
&\stackrel{(G)}{\leq} (N B_q^{-1})^q \left\{ \int_X \| |z_1 f_1(x) + \cdots + z_n f_n(x)|^p \|_{L^{\frac{q}{p}}(\mathbb{C}^n, e^{-\pi|z|^2} dz)} d\mu \right\}^{\frac{q}{p}} \\
&= (N B_q^{-1})^q \left\{ \int_X \left(\int_{\mathbb{C}^n} |z_1 f_1(x) + \cdots + z_n f_n(x)|^q e^{-\pi|z|^2} dz \right)^{\frac{p}{q}} d\mu \right\}^{\frac{q}{p}} \\
&\stackrel{(H)}{=} (N B_q^{-1})^q \left\{ \int_X (B_q)^p \left(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \right)^{\frac{p}{2}} d\mu \right\}^{\frac{q}{p}} \\
&= N^q \left\| \left(\sum_{j=1}^n |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(X)}^q.
\end{aligned}$$

其中 (E) 与 (A) 所蕴含的过程完全相同; (F) 与 (B) 所蕴含的过程完全相同; (G) 是测度为 $e^{-\pi|z|^2} dz$ 的积分形式 Minkowski 不等式 1.8; (H) 是在(4.165)式中取 $w_i = f_i(x)$, $r = q$, 再在(4.165)式两端同时取 q 次幂, 将所得等式左端代入 (H) 左端得到的 (H) 右端. 现在在上式令 $n \rightarrow \infty$ 即得(4.161)式在 $q \geq p$ 时的情况, 其中 $C_{p,q} = 1$.

如果 T 将实值函数映为复值函数, 则将前述过程中的 f_j 取为复值函数, 将 B_p 换为 A_p , B_q 换为 A_q , N 换为 N_{real} , 采用(4.165)式的过程全部换成采用(4.164)式, 逐字逐句重复证明即得结论.

(b): 不等式(4.162)的证明需要用到(4.161)式与(3.31)式:

$$\|g\|_{L^{q,\infty}(Y,\nu)} \leq \sup_{0 < \nu(E) < \infty} \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \left(\int_E |g(y)|^r d\nu \right)^{\frac{1}{r}} \leq \left(\frac{q}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}} \|g\|_{L^{q,\infty}(Y,\nu)},$$

其中 $0 < r < q$, 上确界在 Y 的全有限测度子集 E 中取. 由(3.31)式可知:

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{q,\infty}(Y,\nu)} &\leq \sup_{0 < \nu(E) < \infty} \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \left(\int_E \left(\sum_j |T(f_j)(y)|^2 \right)^{\frac{r}{2}} d\nu \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \sup_{0 < \nu(E) < \infty} \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \left(\int_Y \left(\sum_j |\chi_E(y)T(f_j)(y)|^2 \right)^{\frac{r}{2}} d\nu \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \sup_{0 < \nu(E) < \infty} \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \left\| \left(\sum_j |\chi_E T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^r(Y,\nu)} \\ &\stackrel{(I)}{\leq} \sup_{0 < \nu(E) < \infty} \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} C_{p,r} \|T_E\|_{L^p(X,\mu) \rightarrow L^q(Y,\nu)} \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(X,\mu)} \\ &= \sup_{0 < \nu(E) < \infty} \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} C_{p,r} \|T_E\|_{L^p(X,\mu) \rightarrow L^q(Y,\nu)} \left(\int_X \left(\sum_j |f_j(x)|^2 \right)^{\frac{p}{2}} d\mu \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned} \quad (4.166)$$

其中 (I) 是(4.161)式, $T_E(f) := \chi_E T(f)$. 又因为对任意 $f \in L^p(X)$, 由(3.31)式与 $\|T\|_{L^p(X,\mu) \rightarrow L^{q,\infty}(Y,\nu)} = M$ 可知:

$$\nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \|T_E(f)\|_{L^r(Y,\nu)} \leq \nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \|T(f)\|_{L^r(Y,\nu)} \leq \left(\frac{q}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}} \|T(f)\|_{L^{q,\infty}(Y,\nu)} \leq \left(\frac{q}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}} M \|f\|_{L^p(X,\mu)}.$$

于是对任意有限测度集 E 有估计:

$$\nu(E)^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r}} \|T_E\|_{L^p(X,\mu) \rightarrow L^r(Y,\nu)} \leq \left(\frac{q}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}} M. \quad (4.167)$$

现将(4.167)式代回(4.166)式可得

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{q,\infty}(Y,\nu)} \leq \sup_{0 < \nu(E) < \infty} C_{p,r} \left(\frac{q}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}} M \left(\int_X \left(\sum_j |f_j(x)|^2 \right)^{\frac{p}{2}} d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

取 $D_{p,q} = C_{p,r} \left(\frac{q}{q-r} \right)^{\frac{1}{r}}$ (并在取定 $0 < r < p$ 后) 即得(4.162)式. 注意 $r \geq p$ 时 $C_{p,r} = 1$, $r < p$ 时 $C_{p,r} = B_p B_r^{-1}$.

若 T 将实值函数映为实值函数, 则将前述过程中的 f_j 取为实值函数, 将 M 换为 M_{real} , B_r 换为 A_r , B_q 换为 A_q , 逐字逐句重复证明即得结论. $\square$

4.5.2 线性算子 l^r 值延拓的应用

下面展示线性算子 l^2 值延拓定理4.14的一个应用:

例 4.7 在实轴上记 $I_j = [b_j, \infty) (j \in \mathbb{Z})$, $T_j : \varphi \mapsto (\chi_{I_j} \hat{\varphi})^\vee$, 则有下列两条不等式成立:

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}, \quad (4.168)$$

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R})} \leq C \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^1(\mathbb{R})}, \quad (4.169)$$

其中 $1 < p < \infty$. 要证明这件事, 首先观察到算子 $T = \frac{1}{2}(I + iH)$ 可以记作 $\varphi \mapsto (\chi_{[0,\infty)} \hat{\varphi})^\vee$, 这是因为由 Hilbert 变换的 Fourier 变换刻画知 $H : \varphi \mapsto ((-i \operatorname{sgn}(\cdot)) \hat{\varphi})^\vee$, 于是 $\frac{1}{2}(I + iH) : \varphi \mapsto \frac{1}{2}(\hat{\varphi} + (\operatorname{sgn}(\cdot)) \hat{\varphi})^\vee$, 而

$1 + \operatorname{sgn} x = \chi_{[0, \infty)}(x)$. 进而对每个 T_j 均有:

$$\begin{aligned} T_j(f) &= (\chi_{I_j}(\xi) \widehat{f}(\xi))^\vee = (\chi_{[0, \infty)}(\xi - b_j) \widehat{f}(\xi))^\vee \\ &= e^{i2\pi b_j x} (\chi_{[0, \infty)}(\xi) \widehat{f}(\xi + b_j))^\vee \\ &= e^{i2\pi b_j x} (\chi_{[0, \infty)}(\xi) (e^{-i2\pi b_j(\cdot)} f)^\wedge(\xi))^\vee \\ &= e^{i2\pi b_j x} T(e^{-i2\pi b_j(\cdot)} f). \end{aligned}$$

进一步记 $g_j(x) = e^{-i2\pi b_j x} f(x)$, 则(4.168), (4.169)式可分别写为

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T(g_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} &\leq C_p \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |g_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}, \\ \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T(g_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{1, \infty}(\mathbb{R})} &\leq C \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |g_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^1(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

根据 Hilbert 变换的强 (p, p) 型不等式与弱 $(1, 1)$ 型不等式 4.3 知 T 同时是 $L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})$ 与 $L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^{1, \infty}(\mathbb{R})$ 上的有界线性算子, 进而在线性算子 l^2 值延拓定理 4.14 的 (4.161) 式中代入 $q = p$, 在 (4.162) 式中代入 $p = q = 1$ 即得 (4.168), (4.169) 式. $\square$

根据线性算子 l^2 值延拓定理 4.14 已经知道 $L^p(X, \mu) \rightarrow L^q(Y, \nu)$ (或 $L^p(X, \mu) \rightarrow L^{q, \infty}(Y, \nu)$) 的任意有界线性算子都有 l^2 值延拓, 我们自然会问: 那它们是否也会有 l^r ($r \neq 2$) 延拓? 在 r 满足某种特定条件时答案是肯定的, 此即下述推论:

推论 4.6 (线性算子的 l^r 值延拓)

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $T : L^p(X) \rightarrow L^p(Y)$ ($1 < p < \infty$) 是有界线性算子, 且 $\|T\|_{L^p(X) \rightarrow L^p(Y)} = A$, 另设 r 位于 p 和 2 之间, 则

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(Y)} \leq A \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(X)}. \quad (4.170)$$

证明 首先说明对 $L^p(X)$ 中的全体复值函数 f_j 均有

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right\|_{L^p(Y)} \leq A \left\| \left(\sum_j |f_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right\|_{L^p(X)}, \quad (4.171)$$

这是因为对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right\|_{L^p(Y)}^p &= \int_Y \left(\sum_{j=1}^n |T(f_j)(y)|^p \right) d\nu = \sum_{j=1}^n \int_Y |T(f_j)(y)|^p d\nu \\ &\leq \sum_{j=1}^n A^p \int_X |f_j(x)|^p d\mu = A^p \int_X \left(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^p \right) d\mu. \end{aligned}$$

在式子两端令 $n \rightarrow \infty$ 并同取 $\frac{1}{p}$ 次幂即得 (4.171) 式.

现已知延拓算子 $\mathbf{T}(\{f_j\}_j) = \{T(f_j)\}_j$ 同时在 $L^p(X, l^p) \rightarrow L^p(Y, l^p)$ 和 $L^p(X, l^2) \rightarrow L^p(Y, l^2)$ 上具有算子范数 A , 进而根据 l^r 值 Lebesgue 空间的 Riesz-Thorin 插值定理 4.18 可知 $\mathbf{T}$ 在 $L^p(X, l^r) \rightarrow L^p(Y, l^r)$ 上算子范数的一个上界为 A , 其中 r 在 p 和 2 之间. $\square$

注 线性算子 l^r 值延拓定理 4.6 中 r 在 p 和 2 之间这一条件是必要的. 例如若取 $1 < p < 2, r < p, X = Y = \mathbb{R}$, 设线性算子 T 为

$$T(f)(x) = \widehat{f}(x) \chi_{[0, 1]}(x),$$

则显见 T 是 L^p 有界的, 且 $\|T(f)\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|T(f)\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$. 现取 $f_j(x) = \chi_{[j-1, j]}(x)$ ($j = 1, \dots, N$), 则计算可得

$$\left(\sum_{j=1}^N |T(f_j)(x)|^r \right)^{\frac{1}{r}} = N^{\frac{1}{r}} \left| \frac{e^{-i2\pi x} - 1}{-i2\pi x} \chi_{[0, 1]}(x) \right|,$$

且

$$\left(\sum_{j=1}^N |f_j(x)|^r\right)^{\frac{1}{r}} = \chi_{[0,N]}(x).$$

于是如果(4.170)式成立, 对任意 $N > 1$ 就应有 $N^{\frac{1}{r}} \leq CN^{\frac{1}{p}}$ (其中 C 是常数), 但在 $p > r$ 时总能找到足够大的 N 不满足该式, 矛盾!

前面已经说明了 $r \neq 2$ 时一般的线性算子 l^r 值延拓未必成立, 但会不会对 Fourier 分析中的算子而言, 确有它们的一般 l^r 值延拓呢? 例如在 $1 < p, r < \infty$ 时对 Hilbert 变换 H 而言, 不等式

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |H(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_{p,r} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \quad (4.172)$$

是否成立? 答案是肯定的, 不等式(4.172)确实成立, 且它的首次证明运用的是复分析技巧. 下一节我们将把前面提到的 Calderón-Zygmund 分解定理应用到 Banach 值函数上, 进一步研究一般奇异积分类似于(4.172)式的不等式.

4.5.3 一般 Banach 值延拓

4.5.3.1 补充: Banach 值函数的测度与积分

⁵³ 设 B 是复数域上的 Banach 空间, 其范数为 $\|\cdot\|_B$, 记其共轭空间为 B^* (其范数为 $\|\cdot\|_{B^*}$), 另设 (X, μ) 是测度空间. 为讨论 Banach 值延拓算子的各种性质, 首先需要作下述理论准备:

定义 4.8 (Banach 值函数的弱可测, 有限取值与强可测)

称 Banach 值函数 $F : (X, \mu) \rightarrow B$ 是弱 μ 可测的, 如果对任意 $u \in B^*$, 数值函数

$$u(F(\cdot)) : X \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto \langle u, F(x) \rangle$$

都是 μ 可测的; 称其为有限取值函数, 如果存在 X 中有有限个不交 μ 可测子集构成的集列 $\{X_j\}_{j=1}^n$ 满足 $\mu(X_j) < \infty$ ($j = 1, \dots, n$), F 在每个 X_j 上均为 B 中的非零常值, 且在 $X \setminus \bigcup_{j=1}^n X_j$ 上有 $F(s) = \theta$ (θ 为 B 中的零元); 称其为强 μ 可测的, 如果存在 X 上的有限取值函数列 μ a.e. 强收敛到 F .



注 Banach 值函数的有限取值性对应的是实分析中的简单函数, 亦即有限个示性函数的线性组合. 另外, 从强 μ 可测性出发可推知弱 μ 可测性, 这是因为若 F 是强 μ 可测函数, 则可设有限取值函数列 $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 在 X 中 μ a.e. 强收敛到 F . 因为每个有限取值函数 F_j 都是弱 μ 可测的, 故根据 μ 可测函数空间对极限的封闭性知对任意 $u \in B^*$ 而言, 数值函数 $x \mapsto \lim_{j \rightarrow \infty} \langle u, F_j(x) \rangle$ 也是可测函数. 再由 μ a.e. 强收敛性知

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \langle u, F_j(x) \rangle = \langle u, \lim_{j \rightarrow \infty} F_j(x) \rangle = \langle u, F(x) \rangle,$$

故 F 是弱 μ 可测的.

定义 4.9 (可分取值, μ 几乎处处可分取值)

称 Banach 值函数 $F : (X, \mathcal{B}, \mu) \rightarrow B$ 是可分取值函数, 如果其值域 $\{F(x) : x \in X\}$ 是 B 的可分子空间; 称其为 μ a.e. 可分取值函数, 如果存在 X 的 μ 零测子集 X_0 使得 $\{F(x) : x \in X \setminus X_0\}$ 是 B 的可分子空间.



定理 4.15 (Pettis)

$F : (X, \mu) \rightarrow B$ 是强 μ 可测函数当且仅当其为弱 μ 可测的 μ a.e. 可分取值函数.



证明 若 F 是强 μ 可测函数, 则其必为弱 μ 可测函数. 另外, 根据强 μ 可测的定义知存在 X 上的有限取值函数列 $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ μ a.e. 收敛到 F , 由有限取值性可知全体 F_j 值域之并 $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} \{F_j(x) : x \in X\}$ 是可列集, 而 F 在忽略零测集 X_0 下的值域 $\{F(x) : x \in X \setminus X_0\} \subset \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{N}} \{F_j(x) : x \in X\}}$, 后者显然可分, 因此 F 也是 μ a.e. 可分取值函数.

⁵³ 本小节选自 [KY].

若 F 是弱 μ 可测的 μ a.e. 可分取值函数, 不失一般性, 可设 F 本身就是可分取值函数, 进而可设 B 本身是可分空间 (否则可将 B 替换为包含值域 $\{F(x) : x \in X\}$ 的最小闭子空间). 下面首先证明数值函数 $x \mapsto \|F(x)\|_B$ 是 μ 可测函数, 为此需要下述 (在末尾会补充证明的) 引理:

引理 4.5

若 B 是可分 Banach 空间 (其上范数为 $\|\cdot\|_B$), B^* 为其共轭空间 (其上范数为 $\|\cdot\|_{B^*}$), 则存在序列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B^*$ 使得 $\|u_n\|_{B^*} \leq 1$, 且对任意 $u_0 \in B^*$, 只要 $\|u_0\|_{B^*} \leq 1$, 就存在 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的子列 $\{u_{n'}\}$ 使得 $\lim_{n' \rightarrow \infty} \langle u_{n'}, x \rangle = \langle u_0, x \rangle$ 对任意 $x \in B$ 均成立.



现对任意 $a \in \mathbb{R}$, 记

$$A = \{x \in X : \|F(x)\|_B \leq a\}, \quad A_u = \{x \in X : |\langle u, F(x) \rangle| \leq a, u \in B^*\}.$$

若能说明 $A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_{u_j}$, 则根据 F 的弱 μ 可测性知每个 A_{u_j} 都是 μ 可测集, 再由可测集族关于任意交的封闭性知 A 是 μ 可测集, 因而 $\|F(x)\|_B$ 是 X 上的 μ 可测函数. 现任取 $x \in A$, 根据 A 的构造知 $\|F(x)\|_B \leq a$, 于是只要 $\|u\|_{B^*} \leq 1$, 就有 $|\langle u, F(x) \rangle| \leq \|u\|_{B^*} \|F(x)\|_B \leq a$, 亦即 $x \in A_u$, 这说明 $A \subset \bigcap_{\|u\|_{B^*} \leq 1} A_u$. 又根据 Hahn-Banach 定理的推论, 对每个取定的 x , 总存在 $u_x \in B^*$ 使得 $\|u_x\|_{B^*} = 1$ 且 $\langle u_x, F(x) \rangle = \|F(x)\|_B$, 于是

$$\bigcap_{\|u\|_{B^*} \leq 1} A_u \subset \bigcap_{\|u\|_{B^*} = 1} A_u \subset \bigcap_{x \in X} A_{u_x} \subset A.$$

另外根据引理 4.5 知存在序列 $\{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 使得只要 $\|u\|_{B^*} \leq 1$, u 就可以表为该序列某子列的点态极限, 因而 $\|u\|_{B^*} \leq 1$ 时 A_u 总能表为集列 $\{A_{u_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$ 的某子列的极限 $\bigcap_{j'} A_{u_{j'}}$, 这说明

$$\bigcap_{\|u\|_{B^*} \leq 1} A_u = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_{u_j},$$

因此 $A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_{u_j}$.

现因 F 是可分取值函数, 根据定义知其值域 $\{F(x) : x \in X\} \subset B$ 可分, 进而可设它被可列个半径不大于 $\frac{1}{n}$ 的开球 $S_{j,n} (j = 1, 2, \dots)$ 覆盖. 设 $S_{j,n}$ 对应的球心为 $f_{j,n}$, 容易证明函数 $F(\cdot) - f_{j,n} : x \mapsto F(x) - f_{j,n}$ 同样是弱 μ 可测函数, 进而重复上述证明可知 $\|F(x) - f_{j,n}\|_B$ 是 μ 可测函数, 于是 $\{x \in X : \|F(x) - f_{j,n}\|_B \leq \frac{1}{n}\}$ 是 μ 可测集, 亦即 $B_{j,n} = \{x \in X : F(x) \in S_{j,n}\}$ 是 μ 可测集, 记 $S = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{j,n}$. 现取

$$F_n(x) = f_{i,n}, \quad x \in B'_{i,n} = B_{i,n} \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} B_{j,n},$$

则因为 $S = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{j,n} = \bigcup_{j=1}^{\infty} B'_{j,n}$, 知对任意 $x \in S$ 均有 $\|F(x) - F_n(x)\|_B < \frac{1}{n}$, 又因为 $B'_{i,n}$ 是 μ 可测集, 故每个 $F_n(x)$ 都是强 μ 可测函数, 进而 $F(x)$ 作为强 μ 可测函数的依范数极限也应是强 μ 可测的, 定理证毕. $\square$

下面证明引理 4.5.

证明 因为 B 是可分空间, 故可设序列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 B 中强稠密⁵⁴, 考虑映射

$$\varphi_n : \begin{cases} S' = \{u \in B^* : \|u\|_{B^*} \leq 1\} \rightarrow l^2(n) = \left\{(\xi_1, \dots, \xi_n) : \|(\xi_1, \dots, \xi_n)\|_{l^2(n)} := \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2\right)^{\frac{1}{2}} < \infty\right\}, \\ u \mapsto \varphi_n(u) = (\langle u, x_1 \rangle, \dots, \langle u, x_n \rangle), \end{cases}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 而言, 空间 $l^2(n)$ 显然是可分的, 因此 φ_n 的值域也是可分的, 故在 n 取定时存在 S' 中的序列 $\{u_{n,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得 $\{\varphi_n(u_{n,k}) : k \in \mathbb{N}\}$ 在 φ_n 的值域 $\varphi_n(S')$ 中稠密. 因此对每个取定的 n , 任意 $\varepsilon > 0$ 与任意 $u \in S'$, 总存在足够大的 k_n 使得

$$\max_{1 \leq j \leq n} |\langle u, x_j \rangle - \langle u_{n,k_n}, x_j \rangle| \leq \|\varphi_n(u - u_{n,k_n})\|_{l^2(n)} < \varepsilon.$$

现通过对角线论证可说明对任意 $u_0 \in S'$, 总存在序列 $\{u_{n,k_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得 $|\langle u_0, x_i \rangle - \langle u_{n,k_n}, x_i \rangle| < \frac{1}{n} (i = 1, \dots, n)$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle u_{n,k_n}, x_i \rangle = \langle u_0, x_i \rangle (i = 1, 2, \dots)$. 现在回忆 Banach-Steinhaus 定理的推论:

⁵⁴即 B 中的每个元素都是该序列某子列的依范数极限.

推论 4.7

若 B 是 Banach 空间, $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B^*$, $u_0 \in B^*$, 则 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u$ 当且仅当

(i) $\|u_n\|_{B^*}$ 关于 n 一致有界;

(ii) 对 B 的一个稠密子集上的全体 x 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle u_n, x \rangle = \langle u, x \rangle$.

其中

$$w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u \Leftrightarrow \forall x \in B \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \langle u_n, x \rangle = \langle u, x \rangle \right).$$

利用推论 4.7 即知对任意 $x \in B$ 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle u_n, x \rangle = \langle u, x \rangle$. □

在给出 Banach 值函数的测度后, 就可以仿照实值函数的 Lebesgue 积分去定义 Banach 值函数的积分了. 设 (X, μ) 是测度空间, B 是 Banach 空间, $u : (X, \mu) \rightarrow B$ 是简单取值函数. 根据简单取值函数的定义, 设 u 在 X_i 上取值为 $u_i \neq \theta (i = 1, \dots, n)$, 其中 θ 是 B 中的零元, X_i 两两不交, $\mu(X_i) < \infty$, 且在 $X \setminus \bigcup_{i=1}^n X_i$ 上 $u = \theta$. 因为现在所谈论的是有限和, 故和式 $\sum_{i=1}^n u_i \mu(X_i) \in B$ 自然有意义, 称该和式为 u 在 X 上的 μ 积分, 记作 $\int_S u(x) d\mu$. 通过对和式取极限, 就可以定义一般函数的 μ 积分, 此即下述定义:

定义 4.10 (Bochner μ 可积, Bochner μ 积分)

设 (X, μ) 是测度空间, B 是 Banach 空间, 称函数 $u : (X, \mu) \rightarrow B$ 是 Bochner μ 可积^a的, 如果存在有限取值函数列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mu$ a.e. 强收敛到 u , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \|u(x) - u_n(x)\|_B d\mu = 0. \quad (4.173)$$

对任意 $E \subset X$, Banach 值函数 u 在 E 上的 Bochner μ 积分^b定义为

$$\int_E u(x) d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \chi_E(x) u_n(x) d\mu, \quad (4.174)$$

其中极限是依范数意义下的.

^a在不会混淆的情况下简称为 Bochner 可积.

^b在不会混淆的情况下简称为 Bochner 积分.

下面说明上述定义是合理的, 亦即说明极限(4.173)的成立不会导出矛盾, 且在 u 是 Bochner μ 可积函数时强极限(4.174)确实存在, 另外极限值不依赖于逼近序列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的选取. 当 u 能被有限取值函数列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 μ a.e. 依范数意义下逼近, 根据强 μ 可测的定义知 u 是强 μ 可测函数, 故由 Pettis 定理 4.15 的证明可知 $\|u(\cdot) - u_n(\cdot)\|_B$ 是 X 上的 μ 可测函数, 因而极限(4.173)作为 X 上 μ 可测函数的积分, 它的成立自然不会导出矛盾. 若现已知 u 是 Bochner μ 可积函数, 则有:

$$\begin{aligned} \left\| \int_E u_n(x) d\mu - \int_E u_k(x) d\mu \right\|_B &= \left\| \int_E (u_n(x) - u_k(x)) d\mu \right\|_B \stackrel{(A)}{\leq} \int_E \|u_n(x) - u_k(x)\|_B d\mu \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \int_X \|u_n(x) - u(x)\|_B d\mu + \int_X \|u(x) - u_k(x)\|_B d\mu. \end{aligned}$$

其中 (A), (B) 均为范数 $\|\cdot\|_B$ 的三角不等式. 因为序列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mu$ a.e. 强收敛到 u , 故上右式在 $n, k \rightarrow \infty$ 时趋零, 因而序列 $\left\{ \int_E u_n(x) d\mu \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 B 中的基本列, 根据 B 的完备性知该序列存在强极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E u_n(x) d\mu$, 且该极限值不依赖于序列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的选取. 至此即知 Bochner μ 可积与 Bochner μ 积分均是良定义的.

定理 4.16 (Bochner)

强 μ 可测函数 u 是 Bochner μ 可积的, 当且仅当 $\|u(\cdot)\|_B$ 是 μ 可积函数.

证明 若 u 是 Bochner μ 可积函数, 知对任意 $x \in X$ 均有 $\|u(x)\|_B \leq \|u_n(x)\|_B + \|u(x) - u_n(x)\|_B$, 进而由 $\|u_n\|_B$ 的 μ 可积性与 Bochner μ 可积的定义(4.173)知

$$\int_E \|u(x)\|_B d\mu \leq \int_E \|u_n(x)\|_B d\mu + \int_E \|u(x) - u_n(x)\|_B d\mu, \quad \forall E \subset X.$$

又因为

$$\int_E |\|u_n(x)\|_B - \|u_k(x)\|_B| d\mu \leq \int_E \|u_n(x) - u_k(x)\|_B d\mu,$$

故 $\{\int_E \|u_n(x)\|_B d\mu\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 B 中的基本列, 从而根据 B 的完备性知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \|u_n(x)\|_B d\mu$ 存在, 进而结合(4.173)式知

$$\int_E \|u(x)\|_B d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E \|u_n(x)\|_B d\mu, \quad \forall E \subset X,$$

特别取 $E = X$ 即得 $\|u\|_B$ 的 μ 可积性.

若 $\|u(\cdot)\|_B$ 是 μ 可积函数, 因为 u 本身是强 μ 可测函数, 故可设有限取值函数列 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ μ a.e. 强收敛到 u . 记

$$v_n(x) = \begin{cases} u_n(x), & \|u_n(x)\|_B \leq \frac{3}{2}\|u(x)\|_B, \\ 0, & \|u_n(x)\|_B > \frac{3}{2}\|u(x)\|_B. \end{cases}$$

于是根据构造可知有限取值函数列 $\{v_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $\|v_n(x)\|_B \leq \frac{3}{2}\|u(x)\|_B (\forall x \in X)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u(x) - v_n(x)\|_B = 0$ μ a.e. 成立, 故由 $\|u\|_B$ 的 μ 可积性, 估计 $\|u(x) - v_n(x)\|_B \leq \frac{5}{2}\|u(x)\|_B$ 与 Lebesgue 控制收敛定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \|u(x) - v_n(x)\|_B d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} \|u(x) - v_n(x)\|_B d\mu = 0.$$

这正是 u 的 Bochner μ 可积性的定义. □

根据定义与上述证明立得下述推论:

推论 4.8 (Bochner 积分的放大不等式, μ 绝对连续性与 σ 可加性)

对 Bochner μ 可积函数 u 有

$$\int_E \|u(x)\|_B d\mu \geq \left\| \int_E u(x) d\mu \right\|_B, \quad \forall E \subset X. \quad (4.175)$$

另外 u 的 Bochner μ 积分是 μ 绝对连续的, 即下述强极限成立:

$$\lim_{\mu(E) \rightarrow 0} \int_E u(x) d\mu = 0. \quad (4.176)$$

同时若 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j$, 其中 E_j 两两不交, 则下述强极限成立:

$$\int_{\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j} u(x) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \int_{E_j} u(x) d\mu. \quad (4.177)$$

推论 4.9 (有界线性算子在 Bochner 积分上的作用)

设 B, Y 是 Banach 空间, $T: B \rightarrow Y$ 是有界线性算子. 若 u 是在 B 中取值的 Bochner μ 可积函数, 则 Tu 是在 Y 中取值的 Bochner μ 可积函数, 且对任意 $E \subset X$ 有

$$\int_E Tu(x) d\mu = T \left(\int_E u(x) d\mu \right).$$

证明 设有限取值函数列 $\{v_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 满足

$$\|v_n(x)\|_B \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \|u(x)\|_B \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) = u(x), \quad \mu \text{ a.e..}$$

则根据 T 的线性性与连续性知

$$\int_E Tv_n(x) d\mu = T \left(\int_E v_n(x) d\mu \right).$$

由 T 的有界性知

$$\|Tv_n(x)\|_Y \leq \|T\|_{B \rightarrow Y} \|v_n(x)\|_B \leq \|T\|_{B \rightarrow Y} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \|u(x)\|_B, \quad \mu \text{ a.e..}$$

最后由 T 的连续性知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Tv_n(x) = Tu(x), \quad \mu \text{ a.e..}$$

故 Tu 是 Bochner μ 可积函数, 且

$$\int_E Tu(x)d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E Tv_n(x)d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} T \left(\int_E v_n(x)d\mu \right) = T \left(\int_E u(x)d\mu \right).$$

□

4.5.3.2 Banach 值函数的 Lebesgue 空间

设 (X, μ) 是测度空间, B 是 Banach 空间 (其上范数为 $\|\cdot\|_B$). 记 $L^p(X)$ 是经典的 Lebesgue 空间 $L^p(X, \mu)$, 其中的元素是 $X \rightarrow \mathbb{C}$ 的函数. 记 $L^p(X) \otimes B$ 为 B 中的系数在 $L^p(X)$ 中的有限线性组合的全体, 亦即

$$L^p(X) \otimes B := \left\{ \sum_{j=1}^n f_j u_n : f_j \in L^p(X), u_j \in B (j=1, \dots, n), n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (4.178)$$

依下式定义 $L^p(X, B) (0 < p < \infty)$:

$$L^p(X, B) := \left\{ F : F \text{ 是 } X \text{ 到 } B \text{ 的强可测函数}, \|F(\cdot)\|_B \|_{L^p(X)} := \left(\int_X \|F(x)\|_B^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} < \infty \right\}. \quad (4.179)$$

在 $p = \infty$ 时 (4.179) 式中的范数修改为

$$\|F\|_B \|_{L^\infty(X)} := \inf_{\substack{E \subset X \\ \mu(E)=0}} \sup_{x \in X \setminus E} \|F(x)\|_B.$$

类似地定义 $L^{p,\infty}(X, B) (0 < p \leq \infty)$:

$$L^{p,\infty}(X, B) := \{ F : F \text{ 是 } X \text{ 到 } B \text{ 的强可测函数}, \|F(\cdot)\|_B \|_{L^{p,\infty}(X)} < \infty \}. \quad (4.180)$$

称 $L^p(X, B)$ (或 $L^{p,\infty}(X, B)$) 为 X 上在 B 中取值函数的 L^p (或 $L^{p,\infty}$) 空间, 其范数为 $\| \cdot \|_B \|_{L^p(X)}$ (或 $\| \cdot \|_B \|_{L^{p,\infty}(X)}$).

Banach 值函数的 Lebesgue 空间理论中有类似于实值函数 Lebesgue 空间中简单函数逼近定理与光滑函数逼近定理的结论:

命题 4.10 ($L^p(X, B)$ 的简单函数逼近与光滑函数逼近)

设 B 是 Banach 空间, (X, μ) 是 σ 有限测度空间.

- (a) 集合 $\{ \sum_{j=1}^m \chi_{E_j} u_j : m \in \mathbb{N}, u_j \in B, E_j \subset X \text{ 两两不交}, \mu(E_j) < \infty (j=1, \dots, m) \}$ 在 $L^p(X, B) (0 < p < \infty)$ 中稠密;
- (b) 集合 $\{ \sum_{j=1}^m \chi_{E_j} u_j : m \in \mathbb{N}, u_j \in B, E_j \subset X \text{ 两两不交} (j=1, \dots, m), X = \bigcup_{j=0}^\infty E_j \}$ 在 $L^\infty(X, B)$ 中稠密;
- (c) 全体形如 $\sum_{j=1}^m \varphi_j u_j$ (其中 $m \in \mathbb{N}, u_j \in B, \varphi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) (j=1, \dots, m)$) 构成的空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n, B) (1 \leq p < \infty)$ 中稠密.



证明 若对取定的 $0 < p \leq \infty$ 有 $F \in L^p(X, B)$, 则根据 Bochner 定理 4.16 知 $\|F(\cdot)\|_B$ 是 μ 可积函数, 因而 F 是 Bochner μ 可积函数, 自然 F 也应是强 μ 可测函数, 于是由 Pettis 定理 4.15 知 F 是 μ a.e. 可分取值函数, 根据定义知存在 $X_0 \subset X$ 使得 $\mu(X \setminus X_0) = 0$, 且 $\{F(x) : x \in X_0\} =: B_0$ 是 B 的可分子空间. 设序列 $\{u_j\}_{j=1}^\infty$ 是 B_0 的稠密子集.

(a) 对 $p < \infty$ 的情况, 因为 X 是 σ 有限的, 且 $\mu(X \setminus X_0) = 0$, 故根据 Lebesgue 积分的绝对连续性知对任意 $\varepsilon > 0$ 总存在 $X_1 \subset X_0$ 使得 $\mu(X_1) < \infty$, 且

$$\int_{X \setminus X_1} \|F(x)\|_B^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{3}.$$

取

$$\widetilde{B}(u_j, \varepsilon) = \{ u \in B_0 : \|u - u_j\|_B < \varepsilon (3\mu(X_1))^{-\frac{1}{p}} \},$$

既然 $\{u_j\}_{j=1}^\infty$ 在 B_0 中稠密, 自然有 $B_0 \subset \bigcup_{j=1}^\infty \widetilde{B}(u_j, \varepsilon)$. 现设 $A_1 = \widetilde{B}(u_1, \varepsilon), A_j = \widetilde{B}(u_j, \varepsilon) \setminus (\bigcup_{i=1}^{j-1} \widetilde{B}(u_i, \varepsilon)) (j \geq 2)$. 显见 $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ 两两不交, 且 $\bigcup_{j=1}^\infty A_j = \bigcup_{j=1}^\infty \widetilde{B}(u_j, \varepsilon)$. 令 $E_j = \{x \in X : F(x) \in A_j\} \cap X_1$, 则 $X_1 = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$,

且 $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ 两两不交⁵⁵. 因为 $\mu(X)_1 = \sum_{j=1}^\infty \mu(E_j) < \infty$, 故对每个 $j \in \mathbb{N}$ 均有 $\mu(E_j) < \infty$, 且由 Lebesgue 积分的绝对连续性知存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_{\bigcup_{j=m+1}^\infty E_j} \|F(x)\|_B^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{3}. \quad (4.181)$$

另一方面, 显见 $\sum_{j=1}^m \chi_{E_j} u_j$ 是强 μ 可测的. 根据 E_j 的构造可知任取 $x \in E_j$ 均有 $\|F(x) - u_j\|_B < \varepsilon(\mu(X_1))^{-\frac{1}{p}} (j = 1, \dots, m)$, 结合(4.181)式即知

$$\begin{aligned} \int_X \left\| F(x) - \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) u_j \right\|_B^p d\mu &= \int_{X \setminus X_1} \|F(x)\|_B^p d\mu + \int_{\bigcup_{j=m+1}^\infty E_j} \|F(x)\|_B^p d\mu + \int_{\bigcup_{j=1}^m E_j} \left\| \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) [F(x) - u_j] \right\|_B^p d\mu \\ &< \frac{\varepsilon^p}{3} + \frac{\varepsilon^p}{3} + \frac{\varepsilon^p}{3} = \varepsilon^p. \end{aligned}$$

(a) 至此得证.

(b) 对 $p = \infty$ 的情况, 记 $B(u_j, \varepsilon) = \{u \in B_0 : \|u - u_j\|_B < \varepsilon\}$, 根据 $\{u_j\}_{j=1}^\infty$ 在 B_0 中的稠密性立得 $B_0 \subset \bigcup_{j=1}^\infty B(u_j, \varepsilon)$. 取 $A_1 = B(u_1, \varepsilon)$, 并在 $k \geq 2$ 时定义 $A_j = B(u_j, \varepsilon) \setminus (\bigcup_{i=1}^{j-1} B(u_i, \varepsilon))$. 令 $E_j = \{x \in X : F(x) \in A_j\} (j \geq 1)$, $E_0 = X \setminus (\bigcup_{j=1}^\infty E_j)$. 易知 $\mu(E_0) = 0$. 类似于 $p < \infty$ 的情况, 可见 $\{E_j\}_{j=0}^\infty$ 两两不交, 且 $X_0 \subset \bigcup_{j=0}^\infty E_j$. 现取 $u_0 = 0$, 知 $\sum_{j=0}^\infty \chi_{E_j} u_j$ 是强 μ 可测的. 因为对任意 $x \in E_j$ 与 $j \geq 0$ 均有 $\|F(x) - u_j\|_B < \varepsilon$, 故

$$\left\| F(\cdot) - \sum_{j=0}^\infty \chi_{E_j}(\cdot) u_j \right\|_{L^\infty(X, B)} = \left\| \sum_{j=0}^\infty \chi_{E_j}(\cdot) (F(\cdot) - u_j) \right\|_{L^\infty(X, B)} < \varepsilon,$$

这便完成了 $p = \infty$ 时的证明.

(c) 取定光滑函数 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\text{supp } \varphi \subset \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$, $\|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$. 对全体 $x \in \mathbb{R}^n$ 与 $\delta > 0$, 记 $\varphi_\delta(x) = \delta^{-n} \varphi(\frac{x}{\delta})$. 现在对每个在 (a) 中逼近 f 的函数 $\sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) u_j \in L^p(\mathbb{R}^n) \otimes B$, 取函数 $\sum_{j=1}^m (\chi_{E_j} * \varphi_\delta)(x) u_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B$. 根据恒等逼近定理 3.1 可知 $\|\chi_{E_j} * \varphi_\delta - \chi_{E_j}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 (\delta \rightarrow 0) (1 \leq p < \infty)$, 因此

$$\left\| \sum_{j=1}^m (\chi_{E_j} * \varphi_\delta)(\cdot) u_j - \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(\cdot) u_j \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} \leq \sum_{j=1}^m \|\chi_{E_j} * \varphi_\delta - \chi_{E_j}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|u_j\|_B \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0.$$

(c) 至此即证. $\square$

注意到谈论 Banach 值函数的 Lebesgue 空间时, 我们是对 $\|F(x)\|_B$ 这一实值函数进行讨论, 而并没有讨论 Bochner 积分在其中的作用. 通过对比 $L^1(X) \otimes B$ 与 Bochner 积分的定义可知, 对任意 $F \in L^1(X) \otimes B$, 记 $F = \sum_{j=1}^m f_j u_j$, 则:

$$\begin{aligned} \left\| \int_X F(x) d\mu \right\|_B &= \sup_{\|u^*\|_{B^*} \leq 1} \left| \left\langle u^*, \sum_{j=1}^m \left(\int_X f_j(x) d\mu \right) u_j \right\rangle \right| = \sup_{\|u^*\|_{B^*} \leq 1} \left| \int_X \left\langle u^*, \sum_{j=1}^m f_j(x) u_j \right\rangle d\mu \right| \\ &\leq \int_X \sup_{\|u^*\|_{B^*} \leq 1} \left| \left\langle u^*, \sum_{j=1}^m f_j(x) u_j \right\rangle \right| d\mu = \int_X \|F(x)\|_B d\mu = \|F\|_{L^1(X, B)}. \end{aligned}$$

因此线性算子

$$F \mapsto I_F = \int_X F(x) d\mu$$

是 $L^1(X) \otimes B \rightarrow B$ 的有界算子. 根据 $L^1(X, B)$ 的简单函数逼近定理 4.10 可知 $L^1(X, B)$ 中的每个元素都是 $L^1(x) \otimes B$ 中某序列的依范数极限, 因此由上述线性算子的连续性知其在 $L^1(X, B)$ 上有唯一有界延拓, 这一有界延拓正是前面提到的 Bochner 积分. 因此, $L^1(X, B)$ 实际上是 X 到 B 的全体 Bochner 可积函数构成的空间. 另外, 容易说明 $F: X \rightarrow B$ 的 Bochner 积分是 B 中唯一一个满足

$$\left\langle u^*, \int_X F(x) d\mu \right\rangle = \int_X \langle u^*, F(x) \rangle d\mu \quad (4.182)$$

的元素, 这说明 B^* 中的元素在 Bochner 积分上的作用等价于该元素与被积函数上作用的 Lebesgue 积分. 因此, 类似于 Lebesgue 空间的共轭空间诸性质, 在 $X = \mathbb{R}^n$ 时有下述命题成立:

⁵⁵ 因为 F 只能把一个值输出为一个值, 故不存在两不同元映回同一元素的情况.

命题 4.11 ($L^p(X, B)$ 的共轭空间性质)

设 B 是 Banach 空间, $1 \leq p \leq \infty$.

(a) 对任意 $F \in L^p(\mathbb{R}^n, B)$ 有

$$\|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} = \sup_{\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right|.$$

因此 $L^p(\mathbb{R}^n, B)$ 可等距嵌入 $(L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*))^*$.

(b) 对任意 $G \in L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)$ 有

$$\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} = \sup_{\|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right|.$$

因此 $L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)$ 可等距嵌入 $(L^p(\mathbb{R}^n, B))^*$.

证明 (a) 一方面, 由 Hölder 不等式知

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\langle G(x), F(x) \rangle| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \|G(x)\|_{B^*} \|F(x)\|_B dx \leq \|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)},$$

因此

$$\sup_{\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right| \leq \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)}.$$

另一方面, 对 $F \in L^p(\mathbb{R}^n, B)$, 取定 $\varepsilon > 0$, 根据 $L^p(X, B)$ 的简单函数逼近定理 4.10 知存在 $F_\varepsilon(x) = \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) u_j$ ($m \in \mathbb{N}$, 或在 $p = \infty$ 时 $m = \infty$) 使得 $\|F_\varepsilon - F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} < \frac{\varepsilon}{2}$, 其中 $\{E_j\}_{j=1}^m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的不交子集, $u_j \in B$. 因为 $F_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}^n, B)$, 故 $\|F(\cdot)\|_B \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 从而由经典 Lebesgue 空间的共轭空间性质知

$$\|F(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\|h\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1} |\langle h, \|F_\varepsilon(\cdot)\|_B \rangle_{L^2}| = \sup_{\|h\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \|F_\varepsilon(x)\|_B dx \right|,$$

其中 $\langle f, g \rangle_{L^2} = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx$. 根据上确界的定义知对前述给定的 ε , 总存在 $h \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|h\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1$, 且

$$\|F_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \|F_\varepsilon(x)\|_B^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \|F_\varepsilon(x)\|_B dx + \frac{\varepsilon}{4}. \quad (4.183)$$

若 $1 \leq p < \infty$, 因为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 此时在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 故可进一步选取 $h \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 是紧支有界函数, 因此必有 $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 根据算子范数的上确界定义, 知对每个 $u_j \in B$, 均对应存在 $u_j^* \in B^*$ 使得 $\|u_j^*\|_{B^*} = 1$, 且

$$\|u_j\|_B < \langle u_j^*, u_j \rangle + \frac{\varepsilon}{4(\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + 1)}. \quad (4.184)$$

现取 $G(x) = \sum_{j=1}^m h(x) \chi_{E_j}(x) u_j^*$, 显见 G 是值域在 B^* 中的强可测函数, 且 $\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \leq 1$. 现由 (4.183), (4.184) 式知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F_\varepsilon(x) \rangle dx &= \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) \langle u_j^*, u_j \rangle dx \\ &\geq \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \sum_{j=1}^m \left(\|u_j\|_B - \frac{\varepsilon}{4(\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + 1)} \right) \chi_{E_j}(x) dx \\ &\geq \|F_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} - \frac{\varepsilon}{4} - \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

由 Hölder 不等式知

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F_\varepsilon(x) - F(x) \rangle dx \right| \leq \|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \|F - F_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} < \frac{\varepsilon}{2},$$

因此

$$\begin{aligned}\|F_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F_\varepsilon(x) \rangle dx + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \sup_{\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right| + \varepsilon,\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 (a)⁵⁶.

(b) 通过与 (a) 类似的过程可得

$$\sup_{\|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right| \leq \|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)},$$

下证

$$\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \leq \sup_{\|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right|.$$

证明过程与 (a) 也是类似的. 对 $G \in L^{p'}(\mathbb{R}^n, B)$, 取定 $\varepsilon > 0$, 根据 $L^{p'}(\mathbb{R}^n, B)$ 的简单函数逼近定理 4.10 知存在 $G_\varepsilon(x) = \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) u_j^*(m \in \mathbb{N}$, 或在 $p = 1$ 时 $m = \infty$) 使得 $\|G_\varepsilon - G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} < \frac{\varepsilon}{2}$, 其中 $\{E_j\}_{j=1}^m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的不交子集, $u_j^* \in B^*$. 因为 $G_\varepsilon \in L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)$, 故由经典 Lebesgue 空间的共轭空间性质知对前述给定的 ε , 存在非负函数 h 使得 $\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq 1$, 且

$$\|G_\varepsilon\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \|G_\varepsilon(x)\|_{B^*}^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} < \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \|G_\varepsilon(x)\|_{B^*} dx + \frac{\varepsilon}{4}. \quad (4.185)$$

在 $1 < p \leq \infty$ 时, 可以取 $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 为有界紧支函数, 因而必有 $\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} < \infty$. 知每个 $u_j^* \in B^*$ 均对应存在 $u_j \in B$ 使得 $\|u_j\|_B = 1$, 且

$$\|u_j^*\|_{B^*} < \langle u_j^*, u_j \rangle + \frac{\varepsilon}{4(\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + 1)}. \quad (4.186)$$

现取 $F(x) = \sum_{j=1}^m h(x) \chi_{E_j}(x) u_j$, 显见 F 是值域在 B 中的强可测函数, 且 $\|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} \leq 1$. 由 (4.185), (4.186) 式可得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \langle G_\varepsilon(x), F(x) \rangle dx &= \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \sum_{j=1}^m \chi_{E_j}(x) \langle u_j^*, u_j \rangle dx \\ &\geq \int_{\mathbb{R}^n} h(x) \sum_{j=1}^m \left(\|u_j^*\|_{B^*} - \frac{\varepsilon}{4(\|h\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + 1)} \right) \chi_{E_j}(x) dx \\ &\geq \|G_\varepsilon\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} - \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$ 均有

$$\|G_\varepsilon\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B^*)} \leq \sup_{\|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), F(x) \rangle dx \right| + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 (b)⁵⁷. □

定义 4.11 (有界线性算子的有界 Banach 值延拓)

设 X, Y 是测度空间, $T: L^p(X) \rightarrow L^q(Y)$ ($0 < p, q \leq \infty$) (或 $L^p(X) \rightarrow L^{q,\infty}(Y)$ ($0 < p, q \leq \infty$)) 是线性算子. 定义作用在 $L^p(X) \otimes B$ 上的算子 T 为:

$$T\left(\sum_{j=1}^m f_j u_j\right) = \sum_{j=1}^m T(f_j) u_j.$$

若 T 有 $L^p(X, B) \rightarrow L^q(Y, B)$ (或 $L^p(X, B) \rightarrow L^{q,\infty}(Y, B)$) 的有界延拓, 就称 T 具有有界 B 值延拓. 此时

⁵⁶ $p = \infty$ 怎么处理? 此时不能很好的再去刻画 $(L^\infty(\mathbb{R}^n))^*$ 了.

⁵⁷ 问题同上.

将 T 的 B 值延拓记为 $\mathbf{T}$.



例 4.8 令 $B = l^r (1 \leq r < \infty)$, 则强可测函数 $F : X \rightarrow B$ 本质上是可测函数 $f_j : X \rightarrow \mathbb{C}$ 所构成的序列 $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}$, 而空间 $L^p(X, l^r)$ 由在 X 上的全体满足

$$\|\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}\|_{L^p(X, l^r)} = \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(X)} < \infty$$

的复值可测函数列 $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 构成. 空间 $L^p(X) \otimes l^r$ 由全体有限和

$$\sum_{j=1}^m (a_{j1}, a_{j2}, a_{j3}, \dots) g_j, \quad g_j \in L^p(X), (a_{j1}, a_{j2}, a_{j3}, \dots) \in l^r, j = 1, \dots, m$$

构成. 显见 $L^p(X) \otimes l^r$ 是 $L^p(X, l^r)$ 的子空间. 现取定 $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}} \in L^p(X, l^r)$, 记 $F_m = e_1 f_1 + \dots + e_m f_m$, 其中 e_j 是第 j 项为 1, 其余项均为 0 的序列. 知 $F_m \in L^p(X) \otimes l^r$, 且根据 $L^p(X, B)$ 的简单函数逼近定理 4.10 知 F_m 依 $L^p(X, l^r)$ 范数逼近 f . 这表明 $L^p(X) \otimes l^r$ 在 $L^p(X, l^r)$ 中稠密.

若 T 是 $L^p(X) \rightarrow L^q(Y)$ 的有界线性算子, 则定义 $\mathbf{T}$ 为

$$\mathbf{T}(\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}) = \{T(f_j)\}_{j \in \mathbb{N}}.$$

根据定义 4.11, T 具有有界 l^r 值延拓当且仅当不等式

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^q(Y)} \leq C \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(X)}$$

成立.

定义 4.12 (正算子)

称作用在可测函数上的线性算子 T 为正算子, 如果 $f \geq 0 \Rightarrow T(f) \geq 0$.



容易验证正算子的下述性质:

$$\begin{cases} f \leq g \Rightarrow T(f) \leq T(g), \\ |T(f)| \leq T(|f|), \\ \sup_j |T(f_j)| \leq T(\sup_j |f_j|), \end{cases} \quad (4.187)$$

其中 f, g, f_j 是可测函数. 对于正算子的向量值延拓, 我们有下列结果:

命题 4.12 (正算子 B 值延拓的存在性)

设 $0 < p, q \leq \infty$, $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $T : L^p(X) \rightarrow L^q(Y)$ (或 $L^p(X) \rightarrow L^{q, \infty}(Y)$) 是正线性算子, 且其算子范数为 A . 若 B 是 Banach 空间, 则 T 具有 B 值延拓 $\mathbf{T} : L^p(X, B) \rightarrow L^q(Y, B)$ (或 $L^p(X, B) \rightarrow L^{q, \infty}(Y, B)$), 且 $\mathbf{T}$ 的算子范数不超过 A .



证明 先考虑 $B = l^r (1 \leq r \leq \infty)$ 的情形. 当 $r = 1$, 由正算子性质 (4.187) 知

$$\left\| \sum_j |T(f_j)| \right\|_{L^q(Y)} \leq \left\| \sum_j T(|f_j|) \right\|_{L^q(Y)} = \left\| T \left(\sum_j |f_j| \right) \right\|_{L^q(Y)} \leq A \left\| \sum_j |f_j| \right\|_{L^p(X)},$$

因此根据 $L^p(X, B)$ 的简单函数逼近定理 4.10 可知 $\mathbf{T}$ 具有 $L^p(X, B) \rightarrow L^q(Y, B)$ 的有界延拓. 当 $r = \infty$, 同样由正算子性质 (4.187) 知

$$\left\| \sup_j |T(f_j)| \right\|_{L^q(Y)} \leq \left\| T(\sup_j |f_j|) \right\|_{L^q(Y)} \leq A \left\| \sup_j |f_j| \right\|_{L^p(X)},$$

结论同理可得. 现对 $1 < r < \infty$ 的情形, 由 l^r 值 Lebesgue 空间的 Riesz-Thorin 插值定理 4.18 可知

$$\left\| \left(\sum_j |T(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^q(Y)} \leq A \left\| \left(\sum_j |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(X)},$$

此即欲证.

对于一般 Banach 空间 B 的情况, 首先承认下述不等式:

$$\|T(F)(x)\|_B \leq T(\|F\|_B)(x), \quad x \in X. \quad (4.188)$$

因而

$$\|T(F)\|_B \|_{L^q(Y)} \leq \|T(\|F\|_B)\|_{L^q(Y)} \leq A \|F\|_B \|_{L^p(X)},$$

此即欲证. 下面证明(4.188)式, 取 $F(x) = \sum_{j=1}^n f_j(x)u_j$, 知:

$$\begin{aligned} \|T(F)(x)\|_B &= \left\| \sum_{j=1}^n T(f_j)(x)u_j \right\|_B = \sup_{\|u^*\|_{B^*} \leq 1} \left| \left\langle u^*, \sum_{j=1}^n T(f_j)(x)u_j \right\rangle \right| \\ &= \sup_{\|u^*\|_{B^*} \leq 1} \left| T\left(\sum_{j=1}^n f_j \langle u^*, u_j \rangle\right)(x) \right| \stackrel{(A)}{\leq} T\left(\sup_{\|u^*\|_{B^*} \leq 1} \left| \left\langle u^*, \sum_{j=1}^n f_j u_j \right\rangle \right| \right)(x) \\ &= T\left(\left\| \sum_{j=1}^n f_j u_j \right\|_B\right)(x) = T(\|F\|_B)(x), \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 T 是正算子. 现由范数的连续性与 T 的连续性, 结合 $L^p(X, B)$ 的简单函数逼近 4.10(a)(b) 即得(4.188)式.

4.5.4 补充: Banach 值函数空间的插值

本节主要介绍 Riesz-Thorin 插值定理 2.24 与 Marcinkiewicz 插值定理 3.4 在 Banach 值函数的 Lebesgue 空间上的版本.

定理 4.17 (一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Riesz-Thorin 插值定理)

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $0 < p_0, p_1 \leq \infty, 1 \leq q_0, q_1 \leq \infty, p_0 > p_1$. 对 $0 < \theta < 1$, 设 p, q 满足

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}. \quad (4.189)$$

设 B_1, B_2 是 Banach 空间, T 是以范数 A_0 将 $L^{p_0}(X, B_1)$ 映入 $L^{q_0}(Y, B_2)$, 且以范数 A_1 将 $L^{p_1}(X, B_1)$ 映入 $L^{q_1}(Y, B_2)$ 的线性算子, 则 T 具有作为 $L^p(X, B_1) \rightarrow L^q(Y, B_2)$ 的线性延拓, 且延拓后的算子范数不超过 $c_\theta A_0^{1-\theta} A_1^\theta$, 其中 c_θ 是仅关于 θ 的常数.



证明 我们将证明过程分为下述四部分.

第一部分: 设 $i \in \{0, 1\}$, 若 $F_j \in L^{p_i}(B_1) (j = 1, \dots, m)$ 的支集两两不交, 则

$$\max_{j=1, \dots, m} \|T(F_j)\|_{B_2} \|_{L^{q_i}(Y)} \leq A_i \left\| \sum_{j=1}^m F_j \right\|_{L^{p_i}(X, B_1)}. \quad (4.190)$$

为此首先说明对任意 $y \in Y$ 均有

$$\max_{j=1, \dots, m} \|T(F_j)(y)\|_{B_2} \leq \frac{1}{2^m} \sum_{\varepsilon_k = \pm 1} \left\| \sum_{k=1}^m \varepsilon_k T(F_k)(y) \right\|_{B_2}, \quad (4.191)$$

这是因为任意取定 $j_0 \in \{1, \dots, m\}$, 对应有

$$\begin{aligned} \sum_{\varepsilon_k = \pm 1} \left\| \sum_{k=1}^m \varepsilon_k T(F_k)(y) \right\|_{B_2} &= \sum_{\substack{\varepsilon_k = \pm 1 \\ k \neq j_0}} \left\| T(F_{j_0})(y) + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j_0}} \varepsilon_k T(F_k)(y) \right\|_{B_2} + \sum_{\substack{\varepsilon_k = \pm 1 \\ k \neq j_0}} \left\| -T(F_{j_0})(y) + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j_0}} \varepsilon_k T(F_k)(y) \right\|_{B_2} \\ &\geq \sum_{\substack{\varepsilon_k = \pm 1 \\ k \neq j_0}} \left\| 2T(F_{j_0})(y) + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j_0}} \varepsilon_k T(F_k)(y) - \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j_0}} \varepsilon_k T(F_k)(y) \right\|_{B_2} \\ &= 2^{m-1} \|2T(F_{j_0})(y)\|_{B_2} = 2^m \|T(F_{j_0})(y)\|_{B_2}. \end{aligned}$$

(4.191)式因而得证. 又因为 $F_j (j = 1, \dots, m)$ 的支集两两不交, 故对任意 $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^m \subset \{0, 1\}$ 有

$$\left| \sum_{k=1}^m \varepsilon_k F_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^m F_k(x) \right|,$$

因此

$$\begin{aligned} \left\| \max_{j=1, \dots, m} \|T(F_j)\|_{B_2} \right\|_{L^{q_i}(Y)} &\leq \frac{1}{2^m} \left\| \sum_{\varepsilon_k = \pm 1} \left\| \sum_{k=1}^m \varepsilon_k T(F_k) \right\|_{B_2} \right\|_{L^{q_i}(Y)} = \frac{1}{2^m} \sum_{\varepsilon_k = \pm 1} \left\| T \left(\sum_{k=1}^m \varepsilon_k F_k \right) \right\|_{B_2} \right\|_{L^{q_i}(Y)} \\ &\leq \frac{A_i}{2^m} \sum_{\varepsilon_k = \pm 1} \left\| \sum_{k=1}^m \varepsilon_k F_k \right\|_{B_1} \right\|_{L^{p_i}(X)} = \frac{A_i}{2^m} \sum_{\varepsilon_k = \pm 1} \left\| \sum_{k=1}^m F_k \right\|_{B_1} \right\|_{L^{p_i}(X)} = A_i \left\| \sum_{j=1}^m F_j \right\|_{L^{p_i}(X, B_1)}. \end{aligned}$$

此即(4.190)式.

第二部分: 设 F 是从 X 映入 B_1 的某稠密子空间的有限取值函数, 且 $\|F\|_{B_1} \|F\|_{L^p(X)} = 1$. 取定 $\lambda > 1$, 对全体满足 $\|F(x)\|_{B_1} \neq 0$ 的 $x \in X$, 知存在足够大的 N 使得 $\lambda^{-N} < \|F(x)\|_{B_1} \leq \lambda^N$. 记 $F_j(x) = F(x) \cdot \chi_{\Omega_j}(x)$, 其中 $\Omega_j = \{x \in X : \lambda^j < \|F(x)\|_{B_1} \leq \lambda^{j+1}\}$. 记 $a = \frac{p}{p_1} - \frac{p}{p_0}$, 则有

$$\left\| \sum_j \lambda^{-ja\theta} F_j \right\|_{L^{p_0}(X, B_1)}^{p_0} \leq \lambda^{a\theta p_0}, \quad (4.192)$$

且

$$\left\| \sum_j \lambda^{ja(1-\theta)} F_j \right\|_{L^{p_1}(X, B_1)}^{p_1} \leq 1. \quad (4.193)$$

这是因为此时显见

$$F(x) = \sum_{j=-N}^N F_j(x),$$

另由(4.189)式可知

$$\theta = \frac{\frac{1}{p} - \frac{1}{p_0}}{\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_0}} = \frac{\frac{1}{q} - \frac{1}{q_0}}{\frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_0}} \Rightarrow a\theta = 1 - \frac{p}{p_0}.$$

同样由(4.189)式与 $p_0 > p_1$ 可知 $p_0 > p > p_1$, 结合 F_j 的支集两两不交可知:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=-N}^N \lambda^{-ja\theta} F_j \right\|_{L^{p_0}(X, B_1)}^{p_0} &= \int_X \left(\sum_{j=-N}^N \lambda^{-ja\theta} \|F_j(x)\|_{B_1} \right)^{p_0} dx = \int_X \sum_{j=-N}^N \lambda^{-j(p_0-p)} \|F_j(x)\|_{B_1}^{p_0} dx \\ &= \sum_{j=-N}^N \lambda^{-j(p_0-p)} \int_X \|F_j(x)\|_{B_1}^{p_0} dx = \sum_{j=-N}^N \lambda^{-j(p_0-p)} \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^{p_0} dx \\ &= \sum_{j=-N}^N \lambda^{-j(p_0-p)} \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^{p_0-p} \|F(x)\|_{B_1}^p dx \\ &\leq \sum_{j=-N}^N \lambda^{-j(p_0-p) + (p_0-p)(j+1)} \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^p dx \\ &= \lambda^{p_0-p} \sum_{j=-N}^N \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^p dx = \lambda^{p_0-p} \|F\|_{B_1}^p \|F\|_{L^p(X)}^p = \lambda^{p_0-p} = \lambda^{a\theta p_0}. \end{aligned}$$

此即(4.192)式. 另一方面计算可得

$$a(1-\theta) = \frac{p}{p_1} - 1,$$

于是

$$\left\| \sum_{j=-N}^N \lambda^{ja(1-\theta)} F_j \right\|_{L^{p_1}(X, B_1)}^{p_1} = \int_X \left(\sum_{j=-N}^N \lambda^{ja(1-\theta)} \|F_j(x)\|_{B_1} \right)^{p_1} dx = \int_X \sum_{j=-N}^N \lambda^{j(p-p_1)} \|F_j(x)\|_{B_1}^{p_1} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=-N}^N \lambda^{j(p-p_1)} \int_X \|F_j(x)\|_{B_1}^{p_1} dx = \sum_{j=-N}^N \lambda^{j(p-p_1)} \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^{p_1} dx \\
&= \sum_{j=-N}^N \lambda^{j(p-p_1)} \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^{p_1-p} \|F(x)\|_{B_1}^p dx \\
&\leq \sum_{j=-N}^N \lambda^{j(p-p_1)+j(p_1-p)} \int_{\Omega_j} \|F(x)\|_{B_1}^p dx \\
&= \sum_{j=-N}^N \|F(x)\|_{B_1}^p dx = \|F\|_{B_1}^p \|F\|_{L^p(X)}^p = 1.
\end{aligned}$$

此即(4.193)式.

第三部分: 记

$$\begin{aligned}
g_0(y) &= \max_{-N \leq j \leq N} \lambda^{-ja\theta} \|T(F_j)(y)\|_{B_2}, \\
g_1(y) &= \max_{-N \leq j \leq N} \lambda^{ja(1-\theta)} \|T(F_j)(y)\|_{B_2}.
\end{aligned}$$

其中 $y \in Y$, 则

$$\|g_0\|_{L^{q_0}(Y)} \leq A_0 \lambda^{a\theta}, \quad (4.194)$$

且

$$\|g_1\|_{L^{q_1}(Y)} \leq A_1. \quad (4.195)$$

这是因为结合(4.190),(4.192)两式可知

$$\begin{aligned}
\|g_0\|_{L^{q_0}(Y)} &= \left\| \max_{-N \leq j \leq N} \lambda^{-ja\theta} \|T(F_j)\|_{B_2} \right\|_{L^{q_0}(Y)} = \left\| \max_{-N \leq j \leq N} \|T(\lambda^{-ja\theta} F_j)\|_{B_2} \right\|_{L^{q_0}(Y)} \\
&\leq A_0 \left\| \sum_{j=-N}^N \lambda^{-ja\theta} F_j \right\|_{L^{p_0}(X, B_1)} \leq A_0 \lambda^{a\theta}.
\end{aligned}$$

另一方面, 结合(4.191),(4.193)两式可知

$$\begin{aligned}
\|g_1\|_{L^{q_1}(Y)} &= \left\| \max_{-N \leq j \leq N} \lambda^{ja(1-\theta)} \|T(F_j)\|_{B_2} \right\|_{L^{q_1}(Y)} = \left\| \max_{-N \leq j \leq N} \|T(\lambda^{ja(1-\theta)} F_j)\|_{B_2} \right\|_{L^{q_1}(Y)} \\
&\leq A_1 \left\| \sum_{j=-N}^N \lambda^{ja(1-\theta)} F_j \right\|_{L^{p_1}(X, B_1)} \leq A_1.
\end{aligned}$$

第四部分: 现在任取 $y \in Y$, 往证

$$\|T(F)(y)\|_{B_2} \leq \sum_{j=-N}^N \|T(F_j)(y)\|_{B_2} \leq g_0(y)^{1-\theta} g_1(y)^\theta \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1} \right). \quad (4.196)$$

(4.196)式中第一个不等号是显然的. 对于第二个不等号, 设存在 $-N \leq j_0 \leq N$ 使得 $j \leq j_0$ 时 $\lambda^{ja} \leq \frac{g_1(y)}{g_0(y)}$, $j > j_0$

时 $\lambda^{ja} > \frac{g_1(y)}{g_0(y)}$. 于是

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=-N}^N \|T(F_j)(y)\|_{B_2} &= \sum_{j=-N}^{j_0} \|T(F_j)(y)\|_{B_2} + \sum_{j=j_0+1}^N \|T(F_j)(y)\|_{B_2} \\
 &= \sum_{j=-N}^{j_0} \lambda^{ja\theta} \lambda^{-ja\theta} \|T(F_j)(y)\|_{B_2} + \sum_{j=j_0+1}^N \lambda^{-ja(1-\theta)} \lambda^{ja(1-\theta)} \|T(F_j)(y)\|_{B_2} \\
 &\leq \sum_{j=-N}^{j_0} \lambda^{ja\theta} g_0(y) + \sum_{j=j_0+1}^N \lambda^{-ja(1-\theta)} g_1(y) \\
 &\leq \sum_{j=-\infty}^{j_0} \lambda^{ja\theta} g_0(y) + \sum_{j=j_0+1}^{\infty} \lambda^{-ja(1-\theta)} g_1(y) \\
 &= \frac{1}{1-\lambda^{-a\theta}} \lambda^{j_0 a \theta} g_0(y) + \frac{1}{1-\lambda^{-a(1-\theta)}} \lambda^{-(j_0+1)a(1-\theta)} g_1(y) \\
 &\leq \left(1 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1}\right) \left(\frac{g_1(y)}{g_0(y)}\right)^{\theta} g_0(y) + \left(1 + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right) \left(\frac{g_0(y)}{g_1(y)}\right)^{1-\theta} g_1(y) \\
 &= g_0(y)^{1-\theta} g_1(y)^{\theta} \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right).
 \end{aligned}$$

此即(4.196)式. 在(4.196)式两端关于 y 取经典的 L^q 范数, 可知:

$$\begin{aligned}
 \|T(F)\|_{L^q(Y, B_2)} &\leq \left\| g_0^{1-\theta} g_1^{\theta} \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right) \right\|_{L^q(Y)} \\
 &= \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right) \left(\int_Y |g_0(y)|^{(1-\theta)q} |g_1(y)|^{\theta q} dy\right)^{\frac{1}{q}} \\
 &\stackrel{(A)}{\leq} \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right) \left(\int_Y |g_0(y)|^{(1-\theta)q \cdot \frac{q_0}{(1-\theta)q}} dy\right)^{\frac{1}{q} \cdot \frac{(1-\theta)q}{q_0}} \left(\int_Y |g_1(y)|^{\theta q \cdot \frac{q_1}{\theta q}} dy\right)^{\frac{1}{q} \cdot \frac{\theta q}{q_1}} \\
 &= \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right) \|g_0\|_{L^{q_0}(Y)}^{1-\theta} \|g_1\|_{L^{q_1}(Y)}^{\theta} \\
 &\leq \left(2 + \frac{1}{\lambda^{a\theta} - 1} + \frac{1}{\lambda^{a(1-\theta)} - 1}\right) \lambda^{a\theta(1-\theta)} A_0^{1-\theta} A_1^{\theta}.
 \end{aligned}$$

⁵⁸ 其中 (A) 是 Hölder 不等式. 回忆最初 $\lambda > 1$ 是任意取定的, 现在令 $\lambda = (1 + \sqrt{2})^{\frac{1}{a}}$ 即得 $\|T(F)\|_{L^q(Y, B_2)} \leq c_{\theta} A_0^{1-\theta} A_1^{\theta}$ (其中 c_{θ} 是仅关于 θ 的常数). 最后, 因为在第二部分开头已经设定了 $\|F\|_{B_1} \|L^p(X)\| = 1$, 根据一般 Banach 值 Lebesgue 空间上范数的齐次性即得欲证. $\square$

对于 l^r 值 Lebesgue 空间而言, 还有下述更具体的 Riesz-Thorin 插值定理成立:

定理 4.18 (l^r 值 Lebesgue 空间的 Riesz-Thorin 插值定理)

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $1 < p_0, q_0, p_1, q_1, r_0, s_0, r_1, s_1 < \infty$, 且存在 $0 < \theta < 1$ 使得

$$\begin{aligned}
 \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} &= \frac{1}{p}, \quad \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1} = \frac{1}{q}, \\
 \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1} &= \frac{1}{r}, \quad \frac{1-\theta}{s_0} + \frac{\theta}{s_1} = \frac{1}{s}.
 \end{aligned} \tag{4.197}$$

设 T 是将 $L^{p_0}(X)$ 映入 $L^{q_0}(Y)$, 将 $L^{p_1}(X)$ 映入 $L^{q_1}(Y)$ 的有界线性算子, 定义作用在 X 上的复值函数列上的向量值算子 T 为 $T(\{f_j\}_{j \in \mathbb{Z}}) = \{T(f_j)\}_{j \in \mathbb{Z}}$. 若 T 以范数 M_0 将 $L^{p_0}(X, l^{r_0}(\mathbb{C}))$ 映入 $L^{q_0}(Y, l^{s_0}(\mathbb{C}))$, 以范数 M_1 将 $L^{p_1}(X, l^{r_1}(\mathbb{C}))$ 映入 $L^{q_1}(Y, l^{s_1}(\mathbb{C}))$, 则 T 以至多为 $M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}$ 的范数将 $L^p(X, l^r(\mathbb{C}))$ 映入 $L^q(Y, l^s(\mathbb{C}))$.



⁵⁸ 这里得到的系数无论如何都会在 $\theta \rightarrow 0$ 和 $\theta \rightarrow 1$ 时爆破吧?

证明 设 $S_0(X) \otimes l^r(\mathbb{C})$ 由全体形如

$$f(x) = \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \{a_{k,l} e^{i\alpha_{k,l}}\}_{l \in \mathbb{Z}},$$

的 l^r 值函数构成, 其中 A_k 是 X 中两两不交的有限测度子集; $\alpha_{k,l} \in \mathbb{R}$; 当 $l \in I$ 时 $a_{k,l} > 0$, $l \in \mathbb{Z} \setminus I$ 时 $a_{k,l} = 0$, 其中 I 是 $\mathbb{Z}$ 的有限子集. 结合紧支序列空间在 $l^r(\mathbb{C})$ ($r < \infty$) 中的稠密性与 $L^p(X, B)$ 的简单函数逼近 4.10(a) 可知 $S_0(X) \otimes l^r(\mathbb{C})$ 在 $L^p(X, l^r(\mathbb{C}))$ ($0 < p < \infty$) 中稠密. 根据 $L^p(X, B)$ 的共轭空间性质 4.11(a) 知现在需要给出

$$\|T(f)\|_{L^q(Y, l^s)} = \sup_{\substack{g \in S_0(Y) \otimes l^{s'}(\mathbb{C}) \\ \|g\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))} \leq 1}} \left| \int_Y T(f)(y) \cdot g(y) d\nu(y) \right|$$

的估计, 其中 $\cdot$ 表示序列内积; 上确界在全体形如

$$g(y) = \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \{b_{j,l} e^{i\beta_{j,l}}\}_{l \in \mathbb{Z}}$$

的 $l^{s'}$ 值函数中取, 其中 $b_{j,l} > 0$, $\beta_{j,l} \in \mathbb{R}$, B_j 是 Y 中两两不交的有限测度子集, 且 $\|g\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))} \leq 1$. 记

$$\begin{aligned} P(z) &= \frac{p}{p_0}(1-z) + \frac{p}{p_1}z, \\ Q(z) &= \frac{q'}{q'_0}(1-z) + \frac{q'}{q'_1}z, \\ R(z) &= \frac{r}{r_0}(1-z) + \frac{r}{r_1}z, \\ S(z) &= \frac{s'}{s'_0}(1-z) + \frac{s'}{s'_1}z. \end{aligned}$$

现对 $z \in \bar{S} := \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\}$, 定义

$$\begin{aligned} f_z(x) &= \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \left\{ \frac{a_{k,l}^{R(z)}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(z)-P(z)}} e^{i\alpha_{k,l}} \right\}_{l \in \mathbb{Z}}, \\ g_z(y) &= \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \left\{ \frac{b_{j,l}^{S(z)}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(z)-Q(z)}} e^{i\beta_{j,l}} \right\}_{l \in \mathbb{Z}}. \end{aligned}$$

则

$$T(f_z)(y) = \sum_{k=1}^m T(\chi_{A_k})(y) \left\{ \frac{a_{k,l}^{R(z)}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{P(z)-P(z)}} e^{i\alpha_{k,l}} \right\}_{l \in \mathbb{Z}}.$$

另外定义

$$F(z) = \int_Y T(f_z)(y) \cdot g_z(y) d\nu(y),$$

因为

$$\int_Y T(\chi_{A_k})(y) \chi_{B_j}(y) d\nu(y) \leq \|T(\chi_{A_k})\|_{L^{q_0}(Y)} \|\chi_{B_j}\|_{L^{q'_0}(Y)} < \infty,$$

故 $F(z)$ 对 $z \in \bar{S}$ 是良定义的. 现根据线性性可得

$$F(z) = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{l \in \mathbb{Z}} \frac{a_{k,l}^{R(z)} e^{i\alpha_{k,l}}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(z)-P(z)}} \frac{b_{j,l}^{S(z)} e^{i\beta_{j,l}}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(z)-Q(z)}} \int_Y T(\chi_{A_k})(y) \chi_{B_j}(y) d\nu(y). \quad (4.198)$$

因为 $a_{k,l}, \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}, b_{j,l}, \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}$ 都是严格正的, 故 F 是关于 z 的解析函数.

现在若 $\operatorname{Re} z = 0$, 设 $z = it$, 则

$$\begin{aligned} |a_{k,l}^{R(it)}| &= a_{k,l}^{\frac{r}{r_0}}, \quad |b_{j,l}^{S(it)}| = b_{j,l}^{\frac{s'}{s'_0}}, \\ \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(it)-P(it)} &= \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{r}{r_0} - \frac{p}{p_0}}, \end{aligned}$$

$$|\|\{b_{j,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(it)-Q(it)}| = \|\{b_{j,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{s'}{s'_0} - \frac{q'}{q'_0}}.$$

根据 A_k 两两不交知

$$\begin{aligned} \|\mathbf{f}_{it}\|_{L^{p_0}(X, l^{r_0}(\mathbb{C}))} &= \left(\int_X \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \frac{a_{k,l}^{R(it)}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(it)-P(it)}} e^{i\alpha_{k,l}} \right|^{r_0} \right)^{\frac{p_0}{r_0}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\int_X \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \frac{a_{k,l}^{R(it)}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(it)-P(it)}} e^{i\alpha_{k,l}} \right|^{r_0} \right)^{\frac{p_0}{r_0}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\int_X \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \frac{a_{k,l}^{\frac{r}{r_0}}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{r}{r_0} - \frac{p}{p_0}}} \right|^{r_0} \right)^{\frac{p_0}{r_0}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\int_X \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \left(\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{pr_0}{p_0} - r} \sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{k,l}^r \right)^{\frac{p_0}{r_0}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{p - \frac{rp_0}{r_0}} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{k,l}^r \right)^{\frac{p_0}{r_0}} \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{p - \frac{rp_0}{r_0}} \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{rp_0}{r_0}} \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^p \right)^{\frac{1}{p_0}} = \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^{\frac{p}{p_0}}. \end{aligned}$$

类似地, 根据 B_j 两两不交知

$$\begin{aligned} \|\mathbf{g}_{it}\|_{L^{q'_0}(Y, l^{s'_0}(\mathbb{C}))} &= \left(\int_Y \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \frac{b_{j,l}^{S(it)}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(it)-Q(it)}} e^{i\beta_{j,l}} \right|^{s'_0} \right)^{\frac{q'_0}{s'_0}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_0}} \\ &= \left(\int_Y \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \frac{b_{j,l}^{S(it)}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(it)-Q(it)}} e^{i\beta_{j,l}} \right|^{s'_0} \right)^{\frac{q'_0}{s'_0}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_0}} \\ &= \left(\int_Y \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \frac{b_{j,l}^{\frac{s'}{s'_0}}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{q'}{q'_0} - \frac{s'}{s'_0}}} \right|^{s'_0} \right)^{\frac{q'_0}{s'_0}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_0}} \\ &= \left(\int_Y \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \left(\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{q's'_0}{q'_0} - s'} \sum_{l \in \mathbb{Z}} b_{j,l}^{s'} \right)^{\frac{q'_0}{s'_0}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_0}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \nu(B_j) \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{q' - \frac{s'q'_0}{s'_0}} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} b_{j,l}^{s'} \right)^{\frac{q'_0}{s'_0}} \right)^{\frac{1}{q'_0}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \nu(B_j) \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{q' - \frac{s'q'_0}{s'_0}} \|\{b_{j,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{s'q'_0}{s'_0}} \right)^{\frac{1}{q'_0}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \nu(B_j) \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{q'} \right)^{\frac{1}{q'_0}} = \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^{\frac{q'}{q'_0}}. \end{aligned}$$

现在根据 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned} |F(it)| &\leq \int_Y \|\mathbf{T}(\mathbf{f}_{it})(y)\|_{l^{s_0}(\mathbb{C})} \|\mathbf{g}_{it}(y)\|_{l^{s'_0}(\mathbb{C})} d\nu(y) \\ &\leq \|\|\mathbf{T}(\mathbf{f}_{it})\|_{l^{s_0}(\mathbb{C})}\|_{L^{q_0}(Y)} \|\|\mathbf{g}_{it}\|_{l^{s'_0}(\mathbb{C})}\|_{L^{q'_0}(Y)} \\ &\leq M_0 \|\mathbf{f}_{it}\|_{L^{p_0}(X, l^{r_0}(\mathbb{C}))} \|\mathbf{g}_{it}\|_{L^{q'_0}(Y, l^{s'_0}(\mathbb{C}))} \\ &= M_0 \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^{\frac{p}{p_0}} \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^{\frac{q'}{q'_0}}. \end{aligned}$$

另一方面, 若 $\operatorname{Re} z = 1$, 设 $z = 1 + it$, 则

$$\begin{aligned} |a_{k,l}^{R(1+it)}| &= a_{k,l}^{\frac{r}{r_1}}, \quad |b_{j,l}^{S(1+it)}| = b_{j,l}^{\frac{s'}{s'_1}}, \\ \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(1+it)-P(1+it)} &= \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{r}{r_1}-\frac{p}{p_1}}, \\ \|\{b_{j,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(1+it)-Q(1+it)} &= \|\{b_{j,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{s'}{s'_1}-\frac{q'}{q'_1}}. \end{aligned}$$

根据 A_k 两两不交知

$$\begin{aligned} \|\mathbf{f}_{1+it}\|_{L^{p_1}(X, l^{r_1}(\mathbb{C}))} &= \left(\int_X \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \frac{a_{k,l}^{R(1+it)}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(1+it)-P(1+it)}} e^{i\alpha_{k,l}} \right|^{r_1} \right)^{\frac{p_1}{r_1}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= \left(\int_X \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \left| \frac{a_{k,l}^{R(1+it)}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{R(1+it)-P(1+it)}} e^{i\alpha_{k,l}} \right|^{r_1} \right)^{\frac{p_1}{r_1}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= \left(\int_X \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \left| \frac{a_{k,l}^{\frac{r}{r_1}}}{\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{r}{r_1}-\frac{p}{p_1}}} \right|^{r_1} \right)^{\frac{p_1}{r_1}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= \left(\int_X \sum_{k=1}^m \chi_{A_k}(x) \left(\|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{pr_1}{p_1}-r} \sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{k,l}^{\frac{r}{r_1}} \right)^{\frac{p_1}{r_1}} d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{p-\frac{rp_1}{r_1}} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{k,l}^{\frac{r}{r_1}} \right)^{\frac{p_1}{r_1}} \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{p-\frac{rp_1}{r_1}} \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^{\frac{rp_1}{r_1}} \right)^{\frac{1}{p_1}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \|\{a_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(\mathbb{C})}^p \right)^{\frac{1}{p_1}} = \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^{\frac{p}{p_1}}. \end{aligned}$$

类似地, 根据 B_j 两两不交知

$$\begin{aligned} \|\mathbf{g}_{1+it}\|_{L^{q'_1}(Y, l^{s'_1}(\mathbb{C}))} &= \left(\int_Y \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \frac{b_{j,l}^{S(1+it)}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(1+it)-Q(1+it)}} e^{i\beta_{j,l}} \right|^{s'_1} \right)^{\frac{q'_1}{s'_1}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_1}} \\ &= \left(\int_Y \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \left| \frac{b_{j,l}^{S(1+it)}}{\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{S(1+it)-Q(1+it)}} e^{i\beta_{j,l}} \right|^{s'_1} \right)^{\frac{q'_1}{s'_1}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_1}} \\ &= \left(\int_Y \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \left| b_{j,l}^{\frac{s'}{s'_1}} \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{q'_1}{s'_1}-\frac{s'}{s'_1}} \right|^{s'_1} \right)^{\frac{q'_1}{s'_1}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_1}} \\ &= \left(\int_Y \sum_{j=1}^n \chi_{B_j}(y) \left(\|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{q'_1 s'_1}{q'_1}-s'} \sum_{l \in \mathbb{Z}} b_{j,l}^{\frac{s'}{s'_1}} \right)^{\frac{q'_1}{s'_1}} d\nu(y) \right)^{\frac{1}{q'_1}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \nu(B_j) \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{q'-\frac{s'q'_1}{s'_1}} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} b_{j,l}^{\frac{s'}{s'_1}} \right)^{\frac{q'_1}{s'_1}} \right)^{\frac{1}{q'_1}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \nu(B_j) \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{q'-\frac{s'q'_1}{s'_1}} \|\{b_{j,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{\frac{s'q'_1}{s'_1}} \right)^{\frac{1}{q'_1}} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \nu(B_j) \|\{b_{k,l}\}_{l \in \mathbb{Z}}\|_{l^{s'}(\mathbb{C})}^{q'} \right)^{\frac{1}{q'_1}} = \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^{\frac{q'}{q'_1}}. \end{aligned}$$

现在根据 Hölder 不等式可知

$$|F(1+it)| \leq \int_Y \|\mathbf{T}(\mathbf{f}_{1+it})(y)\|_{l^{s_1}(\mathbb{C})} \|\mathbf{g}_{1+it}(y)\|_{l^{s'_1}(\mathbb{C})} d\nu(y)$$

$$\begin{aligned}
&\leq \|T(\mathbf{f}_{1+it})\|_{l^{s_1}(\mathbb{C})} \|L^{q_0}(Y)\| \|\mathbf{g}_{1+it}\|_{l^{s'_1}(\mathbb{C})} \|L^{q'_1}(Y) \\
&\leq M_1 \|\mathbf{f}_{1+it}\|_{L^{p_1}(X, l^{r_1}(\mathbb{C}))} \|\mathbf{g}_{1+it}\|_{L^{q'_1}(Y, l^{s'_1}(\mathbb{C}))} \\
&= M_1 \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^{\frac{p}{p_1}} \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^{\frac{q'}{q'_1}}.
\end{aligned}$$

回忆 Hadamard 三线引理:

引理 4.6 (Hadamard 三线引理)

设 F 是开带 $S = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ 上的解析函数, 且在 $\bar{S}$ 上有界连续, 亦即存在 $0 < B_0, B_1 < \infty$ 使得 $\operatorname{Re} z = 0$ 时 $|F(z)| \leq B_0$, $\operatorname{Re} z = 1$ 时 $|F(z)| \leq B_1$. 则对任意的 $0 \leq \theta \leq 1$, 在 $\operatorname{Re} z = \theta$ 时有 $|F(z)| \leq B_0^{1-\theta} B_1^\theta$.



前面已经说明了依(4.198)式定义的 F 满足引理条件, 故对任意 $0 \leq \theta \leq 1$, 在 $\operatorname{Re} z = \theta$ 时有

$$\begin{aligned}
|F(\theta)| &\leq (M_0 \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^{\frac{p}{p_0}} \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^{\frac{q'}{q'_0}})^{1-\theta} (M_1 \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^{\frac{p}{p_1}} \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^{\frac{q'}{q'_1}})^\theta \\
&= M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}^\theta \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))}^\theta
\end{aligned}$$

易知 $P(\theta) = Q(\theta) = R(\theta) = S(\theta) = 1$, 于是 $\mathbf{f}_\theta = \mathbf{f}, \mathbf{g}_\theta = \mathbf{g}$, 因此

$$F(\theta) = \int_Y T(\mathbf{f})(y) \cdot \mathbf{g}(y) d\nu(y),$$

于是

$$\begin{aligned}
\|T(\mathbf{f})\|_{L^q(Y, l^s)} &\leq \sup_{\substack{\mathbf{g} \in S_0(Y) \otimes l^{s'}(\mathbb{C}) \\ \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))} \leq 1}} \left| \int_Y T(\mathbf{f})(y) \cdot \mathbf{g}(y) d\nu(y) \right| \\
&\leq \sup_{\substack{\mathbf{g} \in S_0(Y) \otimes l^{s'}(\mathbb{C}) \\ \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))} \leq 1}} M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))} \|\mathbf{g}\|_{L^{q'}(Y, l^{s'}(\mathbb{C}))} \\
&\leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|\mathbf{f}\|_{L^p(X, l^r(\mathbb{C}))}.
\end{aligned}$$

最后, 根据 $\mathbf{f}$ 的任意性与 $S_0(X) \otimes l^r(\mathbb{C})$ 在 $L^p(X, l^r(\mathbb{C}))$ 中的稠密性即得欲证. □

下面介绍 Banach 值 Lebesgue 空间之间的 Marcinkiewicz 插值定理.

定理 4.19 (一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Marcinkiewicz 插值定理)

设 $(X, \mu), (Y, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1$ 满足

$$\frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} = \frac{1}{p}.$$

设 B_1, B_2 是 Banach 空间, T 是定义在 $L^{p_0}(X, B_1) + L^{p_1}(X, B_1)$ 上的算子, 它满足对任意 $y \in Y$ 与任意 $F, G \in L^{p_0}(X, B_1) + L^{p_1}(X, B_1)$ 而言均有

$$\|T(F+G)(y)\|_{B_2} \leq \|T(F)(y)\|_{B_2} + \|T(G)(y)\|_{B_2}. \quad (4.199)$$

现若 T 以范数 A_0 将 $L^{p_0}(X, B_1)$ 映入 $L^{p_0, \infty}(Y, B_2)$, 以范数 A_1 将 $L^{p_1}(X, B_1)$ 映入 $L^{p_1, \infty}(Y, B_2)$, 则 T 以至多为 $2 \left(\frac{p}{p-p_0} + \frac{p}{p_1-p} \right)^{\frac{1}{p}} A_0^{1-\theta} A_1^\theta$ 的范数将 $L^p(X, B_1)$ 映入 $L^p(Y, B_2)$.

另外, 若 $p_0 = 1$, T 以范数 A_0 将 $L^1(X, B_1)$ 映入 $L^{1, \infty}(Y, B_2)$, 以范数 A_1 将 $L^{p_1}(X, B_1)$ 映入 $L^{p_1}(Y, B_2)$, 则 T 以至多为 $C_\theta(p-1)^{-\frac{1}{p}} A_0^{1-\theta} A_1^\theta$ 的范数将 $L^p(X, B_1)$ 映入 $L^p(Y, B_2)$.



证明 给定 $f \in L^p(X, B_1)$, 任取 $\lambda > 0$, 将 f 分解为 $f_0 + f_1$:

$$f_0 = f \chi_{\{x \in X: \|f(x)\|_{B_1} > c\lambda\}},$$

$$f_1 = f \chi_{\{x \in X: \|f(x)\|_{B_1} \leq c\lambda\}}.$$

其中 c 是待定系数. 知

$$\begin{aligned}\|f_0\|_{L^{p_0}(X, B_1)}^{p_0} &= \int_X \|f_0(x)\|_{B_1}^{p_0} d\mu(x) = \int_X \|f_0(x)\|_{B_1}^{p_0-p} \|f_0(x)\|_{B_1}^p d\mu(x) \\ &\leq (c\lambda)^{p_0-p} \int_X \|f_0(x)\|_{B_1}^p d\mu(x) = (c\lambda)^{p_0-p} \|f_0\|_{L^p(X, B_1)}^p \leq (c\lambda)^{p_0-p} \|f\|_{L^p(X, B_1)}^p < \infty,\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}\|f_1\|_{L^{p_1}(X, B_1)}^{p_1} &= \int_X \|f_1(x)\|_{B_1}^{p_1} d\mu(x) = \int_X \|f_1(x)\|_{B_1}^{p_1-p} \|f_1(x)\|_{B_1}^p d\mu(x) \\ &\leq (c\lambda)^{p_1-p} \int_X \|f_1(x)\|_{B_1}^p d\mu(x) = (c\lambda)^{p_1-p} \|f_1\|_{L^p(X, B_1)}^p \leq (c\lambda)^{p_1-p} \|f\|_{L^p(X, B_1)}^p < \infty.\end{aligned}$$

因此 $f_0 \in L^{p_0}(X, B_1)$, $f_1 \in L^{p_1}(X, B_1)$. 进一步根据(4.199)式知对任意 $y \in Y$ 均有

$$\|T(f)(y)\|_{B_2} \leq \|T(f_0)(y)\|_{B_2} + \|T(f_1)(y)\|_{B_2}. \quad (4.200)$$

(4.201)式表明

$$d_{\|T(f)\|_{B_2}}(\lambda) \leq d_{\|T(f_0)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_{\|T(f_1)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right).$$

下面对 p_1 的情况进行分类讨论.

第一种情况: $p_1 = \infty$. 此时取 $c = \frac{1}{2A_1}$, 知

$$\|T(f_1)\|_{L^{p_1, \infty}(Y, B_2)} \leq A_1 \|f_1\|_{L^{\infty, \infty}(Y, B_2)} = A_1 \| \|f_1\|_{B_2} \|_{L^\infty(Y)} \leq A_1 c\lambda = \frac{\lambda}{2}.$$

于是 $d_{\|T(f_1)\|_{B_2}}(\frac{\lambda}{2}) = 0$. 因此

$$d_{\|T(f)\|_{B_2}}(\lambda) \leq d_{\|T(f_0)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) = \nu(\{y \in Y : \|T(f_0)(y)\|_{B_2} > \frac{\lambda}{2}\}) \leq \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, B_1)}\right)^{p_0}.$$

故

$$\begin{aligned}\|T(f)\|_{L^p(Y, B_2)}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{\|T(f)\|_{B_2}}(\lambda) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(d_{\|T(f_0)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_{\|T(f_1)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right) d\lambda \\ &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{\|T(f_0)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, B_1)} \right)^{p_0} d\lambda \\ &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} (2A_0)^{p_0} \int_X \|f_0(x)\|_{B_1}^{p_0} d\mu(x) d\lambda \\ &= p(2A_0)^{p_0} \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} \int_{\{x \in X : \|f(x)\|_{B_1} > c\lambda\}} \|f(x)\|_{B_1}^{p_0} d\mu(x) d\lambda \\ &= p(2A_0)^{p_0} \int_X \|f(x)\|_{B_2}^{p_0} \int_0^{\frac{\|f(x)\|_{B_2}}{c}} \lambda^{p-1-p_0} d\lambda d\mu(x) \\ &= \frac{p(2A_0)^{p_0}}{(p-p_0)c^{p-p_0}} \int_X \|f(x)\|_{B_2}^p d\mu(x) \\ &= \frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} (2A_1)^{p-p_0} \|f\|_{L^p(X, B_1)}^p.\end{aligned}$$

第二种情况: $p_1 < \infty$. 此时有

$$\begin{aligned}d_{\|T(f_0)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) &\leq \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, B_1)}\right)^{p_0}, \\ d_{\|T(f_1)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) &\leq \left(\frac{2A_1}{\lambda} \|f_1\|_{L^{p_1}(X, B_1)}\right)^{p_1}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\|T(f)\|_{L^p(Y, B_2)}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{\|T(f)\|_{B_2}}(\lambda) d\lambda \leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(d_{\|T(f_0)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) + d_{\|T(f_1)\|_{B_2}}\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right) d\lambda \\ &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\frac{2A_0}{\lambda} \|f_0\|_{L^{p_0}(X, B_1)} \right)^{p_0} d\lambda + p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\frac{2A_1}{\lambda} \|f_1\|_{L^{p_1}(X, B_1)} \right)^{p_1} d\lambda\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq p(2A_0)^{p_0} \int_X \|f(x)\|_{B_1}^{p_0} \int_0^{\frac{\|f(x)\|_{B_1}}{c}} \lambda^{p-1-p_0} d\mu(x) d\lambda + p(2A_1)^{p_1} \int_X \|f(x)\|_{B_1}^{p_1} \int_{\frac{\|f(x)\|_{B_1}}{c}}^\infty \lambda^{p-1-p_1} d\mu(x) d\lambda \\
&\leq p \left(\frac{(2A_0)^{p_0}}{(p-p_0)c^{p-p_0}} + \frac{(2A_1)^{p_1}}{(p_1-p)c^{p-p_1}} \right) \int_X \|f(x)\|_{B_1}^p d\lambda \\
&= \left(\frac{p2^{p_0}}{p-p_0} \frac{A_0^{p_0}}{c^{p-p_0}} + \frac{p2^{p_1}}{p_1-p} \frac{A_1^{p_1}}{c^{p-p_1}} \right) \|f\|_{L^p(X, B_1)}^p.
\end{aligned}$$

取 c 使得 $(2A_0c)^{p_0} = (2A_1c)^{p_1}$ 即得欲证.

现若 $p_0 = 1$, T 以范数 A_0 将 $L^1(X, B_1)$ 映入 $L^{1,\infty}(Y, B_2)$, 以范数 A_1 将 $L^{p_1}(X, B_1)$ 映入 $L^{p_1}(Y, B_2)$, 则根据 $L^{p_1}(Y, B_2) \hookrightarrow L^{p_1,\infty}(Y, B_2)$ 知 T 同样以范数 A_1 将 $L^{p_1}(X, B_1)$ 映入 $L^{p_1,\infty}(Y, B_2)$, 于是由前述结论与 $1 < \frac{1+p}{2} < p < p_1$ 知

$$\begin{aligned}
\|T\|_{L^{\frac{1+p}{2}}(X, B_1) \rightarrow L^{\frac{1+p}{2}}(Y, B_2)} &\leq 2 \left(\frac{1+p}{2} \right)^{\frac{2}{1+p}} \left(\frac{2}{p-1} + \frac{2}{p_1-(p+1)} \right)^{\frac{2}{p+1}} A_0^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{1-\frac{2}{1+p}}{1-\frac{1}{p_1}}} \\
&= 2 \left(\frac{p+1}{p-1} + \frac{p+1}{p_1-(p+1)} \right)^{\frac{2}{1+p}} A_0^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{1-\frac{2}{1+p}}{1-\frac{1}{p_1}}}.
\end{aligned}$$

再由一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Riesz-Thorin 插值定理 4.17 与 $\frac{1+p}{2} < p < p_1$ 知

$$\begin{aligned}
\|T\|_{L^p(X, B_1) \rightarrow L^p(Y, B_2)} &\leq c_\theta \left(2 \left(\frac{p+1}{p-1} + \frac{p+1}{p_1-(p+1)} \right)^{\frac{2}{1+p}} A_0^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{1-\frac{2}{1+p}}{1-\frac{1}{p_1}}} \right)^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{\frac{2}{1+p}-\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}}} \\
&= c_\theta \left(2 \left(\frac{\frac{p+1}{2}}{\frac{p+1}{2}-1} + \frac{\frac{p+1}{2}}{p_1-\frac{p+1}{2}} \right)^{\frac{2}{p+1}} \right)^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{(1-\frac{1}{p_1})(\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}) + \frac{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}}}}.
\end{aligned} \tag{4.201}$$

因为

$$\frac{(1-\frac{2}{p+1})(\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1})}{(1-\frac{1}{p_1})(\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1})} + \frac{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}} = \frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{p_1}}, \tag{4.202}$$

且

$$\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{\frac{2}{p+1}-\frac{1}{p_1}} \leq \frac{p+1}{2p}, \tag{4.203}$$

又因为 $\frac{p+1}{2} < \frac{p_1+1}{2}$, 故 $p_1 - \frac{p+1}{2} > \frac{p+1}{2} - 1$, 因而

$$\frac{\frac{p+1}{2}}{p_1 - \frac{p+1}{2}} < \frac{\frac{p+1}{2}}{\frac{p+1}{2} - 1}. \tag{4.204}$$

将 (4.202)-(4.204) 式代入 (4.201) 式可得

$$\|T\|_{L^p(X, B_1) \rightarrow L^p(Y, B_2)} \leq c_\theta 2^{1+\frac{1}{p}} \left(\frac{p+1}{p-1} \right)^{\frac{1}{p}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{p_1}}}.$$

最后由 $(p+1)^{\frac{1}{p}} < 2(p > 1)$ 并记 $C_\theta = 8c_\theta$ 可得

$$\|T\|_{L^p(X, B_1) \rightarrow L^p(Y, B_2)} \leq C_\theta (p-1)^{-\frac{1}{p}} A_0^{\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1}}} A_1^{\frac{1-\frac{1}{p}}{1-\frac{1}{p_1}}}.$$

此即欲证. $\square$

4.6 向量值奇异积分

下面讨论向量值奇异积分的相关结果, 其中向量值奇异积分意为作用在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 输出值在 Banach 空间中的奇异积分算子.

4.6.1 Banach 值奇异积分算子

设 B_1, B_2 是 Banach 空间, 记 $\mathcal{L}(B_1, B_2)$ 为 $B_1 \rightarrow B_2$ 的全体有界线性算子构成的空间. 现考虑在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 中取值, 输出到 $\mathcal{L}(B_1, B_2)$ 的积分核 $\mathbf{K}$. 也就是说, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $\mathbf{K}(x)$ 都是 $B_1 \rightarrow B_2$ 的有界线性算子, 且其范数为 $\|\mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2} < \infty$. 于是对任意 $v \in B_1$ 与任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 均有

$$\|\mathbf{K}(x)(v)\|_{B_2} \leq \|\mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2} \|v\|_{B_1}.$$

现设存在常数 $A < \infty$ 使得 $\mathbf{K}(x)$ 满足尺寸条件:

$$\|\mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2} \leq A|x|^{-n} \quad (4.205)$$

与正则性条件:

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \geq 2|y|} \|\mathbf{K}(x-y) - \mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2} dx \leq A < \infty. \quad (4.206)$$

另外, 设存在序列 $\varepsilon_k \downarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ 与 $\mathbf{K}_0 \in \mathcal{L}(B_1, B_2)$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \int_{\varepsilon_k \leq |y| \leq 1} \mathbf{K}(y) dy - \mathbf{K}_0 \right\|_{B_1 \rightarrow B_2} = 0. \quad (4.207)$$

在上述诸假设下, 现定义作用在 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$ 上的算子 $\mathbf{T}$ 为: 对任意 $f_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), u_i \in B_1$ 有

$$\begin{aligned} \mathbf{T}\left(\sum_{i=1}^m f_i u_i\right)(x) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_k \leq |y|} \mathbf{K}(y) \left(\sum_{i=1}^m f_i(x-y) u_i\right) dy \\ &= \sum_{i=1}^m \int_{|y| \leq 1} (f_i(x-y) - f_i(x)) \mathbf{K}(y)(u_i) dy + \sum_{i=1}^m f_i(x) \mathbf{K}_0(u_i) + \int_{|y| > 1} \sum_{i=1}^m f_i(x-y) \mathbf{K}(y)(u_i) dy. \end{aligned} \quad (4.208)$$

其中对每个 $i \in \{1, \dots, m\}$ 均有

$$\int_{|y| \leq 1} |f_i(x-y) - f_i(x)| \|\mathbf{K}(y)(u_i)\|_{B_2} dy \leq \|\nabla f_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_i\|_{B_1} \int_{|y| \leq 1} |y| \|\mathbf{K}(y)\|_{B_1 \rightarrow B_2} dy.$$

根据尺寸条件(4.205)知上述积分收敛, 因此函数

$$(f_i(x-y) - f_i(x)) \mathbf{K}(y)(u_i)$$

是 B_2 上的 Bochner 可积函数, 故

$$\int_{|y| \leq 1} (f_i(x-y) - f_i(x)) \mathbf{K}(y)(u_i) dy$$

在 B_2 中良定义. 另外, 因为 $m < \infty$, 故存在 $M > 0$ 使得 $\text{supp } f_i \subset B(0, M) (i = 1, \dots, m)$, 于是积分

$$\int_{|y| > 1} \sum_{i=1}^m f_i(x-y) \mathbf{K}(y)(u_i) dy$$

实际上支在 $1 \leq |y| \leq |x| + M$ 上, 故根据尺寸条件(4.205)知该积分同样在 B_2 中良定义.

下面介绍类似于一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.9的结论:

定理 4.20 (Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性的延拓)

设 B_1, B_2 是 Banach 空间, 存在 $A > 0$ 与 $\mathbf{K}_0 \in \mathcal{L}(B_1, B_2)$ 使得 $\mathbf{K}(x)$ 满足条件(4.205)-(4.207). $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{K}$ 依照(4.208)式诱导的 Banach 值奇异积分算子. 若存在 $1 < r \leq \infty$ 使得 $\mathbf{T}$ 是以范数 $B_\star$ 将 $L^r(\mathbb{R}^n, B_1)$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n, B_2)$ 的有界线性算子, 则对任意 $1 \leq p < \infty$ 而言, $\mathbf{T}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n, B_1)$ 上均有良定义的延拓. 另外, 存在仅关于维数 n 的常数 C_n, C'_n 使得对任意 $F \in L^1(\mathbb{R}^n, B_1)$ 均有

$$\|\mathbf{T}(F)\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq C'_n (A + B_\star) \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}, \quad (4.209)$$

且对任意 $1 < p < \infty$ 与 $F \in L^p(\mathbb{R}^n, B_1)$ 均有

$$\|\mathbf{T}(F)\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq C_n \max(p, (p-1)^{-1}) (A + B_\star) \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_1)}. \quad (4.210)$$



证明 尽管 T 在整个 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1) \cap L^r(\mathbb{R}^n, B_1)$ 上均有定义, 简便起见我们还是选择研究 T 在 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1) \cap L^r(\mathbb{R}^n, B_1)$ 的某稠密子空间上的限制. 记

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \otimes B_1 := \left\{ \sum_{i=1}^m \chi_{R_i} u_i : R_i \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 中的不交二进方体, } u_i \in B_1, 1 \leq i \leq m, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

事实上, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1)$ 中稠密 (进而在 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1) \cap L^r(\mathbb{R}^n, B_1)$ 中稠密), 为此根据 $L^p(X, B)$ 的光滑函数逼近 4.10(c) 知只需用 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$ 中的元素在 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1)$ 的意义下逼近 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$ 中的元素即可, 而这由 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的元素总能被不交二进方体示性函数的有限线性组合在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的意义下逼近这一事实即可推知. 下面对 r 的情况进行分类讨论.

第一种情况: $r = \infty$. 此时取定 $F = \sum_{i=1}^m \chi_{R_i} u_i \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$, 因为 R_i 两两不交, 故对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $\|F(x)\|_{B_1} = \sum_{i=1}^m \chi_{R_i}(x) \|u_i\|_{B_1}$, 显见 $\|F(x)\|_{B_1}$ 依旧是不交二进方体示性函数的有限线性组合. 现在对 $\|F\|_{B_1}$ 应用高度为 $\gamma\alpha$ 的 Calderón-Zygmund 分解, 其中 $\gamma = 2^{-n-1} B_\star^{-1}$ 与一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 证明中 γ 的取法相同. 因为 $\|F\|_{B_1} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 根据 Calderón-Zygmund 分解定理 4.8(vi) 知存在有限闭二进方体列 $\{Q_j\}_j$ 使得 $\sum_j |Q_j| \leq (\gamma\alpha)^{-1} \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}$. 依此定义分解的好函数

$$G(x) = \begin{cases} F(x), & x \notin \bigcup_j Q_j \\ \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} F(x) dx, & x \in Q_j \end{cases}$$

与坏函数 $B(x) = F(x) - G(x)$. 显见 $B(x) = \sum_j B_j(x)$, 其中每个 B_j 均支在 Q_j 上, 且 $\int_{Q_j} B_j(x) dx = 0$. 下面说明

$$\|G\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)} \leq \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}, \quad (4.211)$$

$$\|G\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n, B_1)} \leq 2^n \gamma \alpha, \quad (4.212)$$

$$\|B_j\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)} \leq 2^{n+1} \gamma \alpha |Q_j|. \quad (4.213)$$

对于 (4.211) 式, 知

$$\begin{aligned} \|G\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)} &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx + \sum_j \int_{Q_j} \left\| \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} F(y) dy \right\|_{B_1} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx + \sum_j \left\| \int_{Q_j} F(y) dy \right\|_{B_1} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx + \sum_j \int_{Q_j} \|F(y)\|_{B_1} dy \\ &= \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}. \end{aligned}$$

对于 (4.212) 式, 回忆 Calderón-Zygmund 分解中二进方体的选取规则, 知每个选出的 Q_j 均满足

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx > \gamma \alpha, \quad (4.214)$$

且总对应存在某个未被选取的二进方体 Q'_j 满足 $Q_j \subset Q'_j$, $l(Q'_j) = 2l(Q_j)$, 另外根据选取规则知

$$\frac{1}{|Q'_j|} \int_{Q'_j} \|F(x)\|_{B_1} dx \leq \gamma \alpha,$$

于是

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q'_j} \|F(x)\|_{B_1} dx = \frac{2^n}{|Q'_j|} \int_{Q'_j} \|F(x)\|_{B_1} dx \leq 2^n \gamma \alpha.$$

现知在每个 Q_j 上均有

$$\|G(x)\|_{B_1} = \left\| \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} F(x) dx \right\|_{B_1} \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx \leq 2^n \gamma \alpha,$$

而对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$ 与任意 $k = 0, 1, 2, \dots$, 总存在唯一未被选取的第 k 代二进方体 $Q_x^{(k)}$ 包含 x . 现对每个

$k \geq 0$ 均有

$$\left\| \frac{1}{Q_x^{(k)}} \int_{Q_x^{(k)}} F(y) dy \right\|_{B_1} \leq \frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} \|F(y)\|_{B_1} dy \leq \gamma \alpha. \quad (4.215)$$

另外知 $\bigcap_{k=0}^{\infty} Q_x^{(k)} = \{x\}$, 于是由 Lebesgue 微分定理 3.5 知对几乎处处 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$ 有

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{i=1}^m \chi_{R_i}(x) u_i = \sum_{i=1}^m \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} \chi_{R_i}(y) dy \right) u_i \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} \sum_{i=1}^m \chi_{R_i}(y) u_i dy = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{|Q_x^{(k)}|} \int_{Q_x^{(k)}} F(y) dy. \end{aligned}$$

又根据 (4.215) 式知 $\|F(x)\|_{B_1} \leq \gamma \alpha$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$, 因此 $\|G(x)\| \leq \gamma \alpha$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_j Q_j$. 至此即得 (4.212) 式.

对于 (4.213) 式, 知

$$B_j(x) = \left(F(x) - \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} F(y) dy \right) \chi_{Q_j}(x),$$

因此

$$\int_{Q_j} \|B_j(x)\|_{B_1} dx \leq \int_{Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx + |Q_j| \left\| \int_{Q_j} F(x) dx \right\|_{B_1} \leq 2 \int_{Q_j} \|F(x)\|_{B_1} dx \leq 2^{n+1} \gamma \alpha |Q_j|.$$

因为 $\|\mathbf{T}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n, B_1) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n, B_2)} = B_\star$, 故

$$\|\mathbf{T}(G)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq B_\star \|G\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n, B_1)} \leq 2^n \gamma \alpha B_\star = \frac{\alpha}{2}.$$

因此 $\{x \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{T}(G)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\} = \emptyset$, 故

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{T}(F)(x)\|_{B_2} > \alpha\}| \leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{T}(B)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2} \right\} \right|.$$

现取 $Q_j^* = 2\sqrt{n}Q_j$, 知

$$\begin{aligned} & \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{T}(B)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2} \right\} \right| \\ & \leq \left| \bigcup_j Q_j^* \right| + \left| \left\{ x \notin \bigcup_j Q_j^* : \|\mathbf{T}(B)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2} \right\} \right| \\ & \leq (2\sqrt{n})^n \sum_j |Q_j| + \frac{2}{\alpha} \int_{(\bigcup_j Q_j^*)^c} \|\mathbf{T}(B)(x)\|_{B_2} dx \\ & \stackrel{(A)}{\leq} \frac{(2\sqrt{n})^n}{\gamma} \frac{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\alpha} + \frac{2}{\alpha} \sum_j \int_{(Q_j^*)^c} \|\mathbf{T}(B_j)(x)\|_{B_2} dx, \end{aligned}$$

其中 (A) 右端第一项基于 (4.214) 式, 第二项基于 $B = \sum_j B_j$. 为了得到 $\mathbf{T}$ 的弱 (1,1) 型估计, 现在只需估计上式最后一项. 记 y_j 是方体 Q_j 的中心, 因为 $\int_{Q_j} B_j(x) dx = 0$, 故

$$\begin{aligned} \sum_j \int_{(Q_j^*)^c} \|\mathbf{T}(B_j)(x)\|_{B_2} dx &= \sum_j \int_{(Q_j^*)^c} \left\| \int_{Q_j} (K(x-y) - K(x-y_j))(B_j(y)) dy \right\|_{B_2} dx \\ &\leq \sum_j \int_{(Q_j^*)^c} \int_{Q_j} \|(K(x-y) - K(x-y_j))(B_j(y))\|_{B_2} dy dx \\ &\leq \sum_j \int_{(Q_j^*)^c} \int_{Q_j} \|K(x-y) - K(x-y_j)\|_{B_1 \rightarrow B_2} \|B_j(y)\|_{B_2} dy dx \\ &= \sum_j \int_{Q_j} \|B_j(y)\|_{B_2} \int_{(Q_j^*)^c} \|K(x-y) - K(x-y_j)\|_{B_1 \rightarrow B_2} dx dy \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \sum_j \int_{Q_j} \|B_j(y)\|_{B_2} \int_{|x-y_j| \geq 2|y-y_j|} \|K(x-y) - K(x-y_j)\|_{B_1 \rightarrow B_2} dx dy \\ &\stackrel{(C)}{\leq} A \sum_j \|B_j\|_{L^1(Q_j, B_1)} \stackrel{(D)}{\leq} 2^{n+1} A \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}, \end{aligned}$$

其中 (B) 根据 Q_j^* 的构造而来; (C) 是正则性条件(4.206); (D) 是(4.213)式与 $\sum_j |Q_j| \leq (\gamma\alpha)^{-1} \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}$. 因此

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(F)(x)\|_{B_2} > \alpha\}| &\leq \frac{(2\sqrt{n})^n \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\gamma} + \frac{2}{\alpha} 2^{n+1} A \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)} \\ &= ((2\sqrt{n})^n 2^{n+2} B_\star + 2^{n+1} A) \frac{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\alpha} \\ &\leq C'_n (A + B_\star) \frac{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\alpha}, \end{aligned}$$

其中 $C'_n = (2\sqrt{n})^n 2^{n+1} + 2^{n+2}$. 因此 T 具有以至多为 $C'_n (A + B_\star)$ 的范数将 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1)$ 映入 $L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n, B_2)$ 的延拓. 现在根据一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Marcinkiewicz 插值定理4.19知对任意 $1 < p < r = \infty$ 而言均有(4.210)式成立.

第二种情况: $1 < r < \infty$. 取定 $F = \sum_{i=1}^m \chi_{R_i} u_i \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$, 根据 R_i 的不交性知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $\|F(x)\|_{B_1} = \sum_{i=1}^m \chi_{R_i}(x) \|u_i\|_{B_1}$, 因此函数 $x \mapsto \|F(x)\|_{B_1}$ 依旧是不交二进方体示性函数的有限线性组合. 下面对 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $x \mapsto \|F(x)\|_{B_1}$ 应用 Calderón-Zygmund 分解, 进而给出形如(4.209)式的弱型估计. 现记 $F = G + B$, 其中 G, B 的构造方法和性质 ((4.211)-(4.213)式) 与 $r = \infty$ 的情况完全相同. 但需要注意的是, 此时集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(G)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\}$ 不再是空集, 其测度满足:

$$\begin{aligned} &|\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(G)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\}| \\ &\leq \int_{\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(G)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\}} \left(\frac{2\|T(G)(x)\|_{B_2}}{\alpha} \right)^r dx \\ &\leq \frac{2^r}{\alpha^r} \int_{\mathbb{R}^n} \|T(G)(x)\|_{B_2}^r dx \leq \frac{2^r}{\alpha^r} \int_{\mathbb{R}^n} B_\star^r \|G(x)\|_{B_1}^r dx \\ &= \left(\frac{2B_\star}{\alpha} \right)^r \|G\|_{L^r(\mathbb{R}^n, B_1)}^r \stackrel{(E)}{\leq} \frac{2B_\star}{\alpha} \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}. \end{aligned}$$

其中 (E) 是因为由(4.211),(4.212)式与 L^p 范数的对数凸性1.13知

$$\| \|G\|_{B_1} \|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq \| \|G\|_{B_1} \|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{r}} \| \|G\|_{B_1} \|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^{1-\frac{1}{r}} \leq 2^{\frac{n}{r'}} (\gamma\alpha)^{\frac{1}{r'}} \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}^{\frac{1}{r}},$$

结合 $\gamma = 2^{-n-1} B_\star^{-1}$ 即得 (E) 右式. 现在逐字逐句地重复 $r = \infty$ 时对坏函数的估计可得

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(B)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\}| \leq ((2\sqrt{n})^n 2^{n+2} B_\star + 2^{n+1} A) \frac{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\alpha},$$

于是

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(F)(x)\|_{B_2} > \alpha\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(G)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\}| + |\{x \in \mathbb{R}^n : \|T(B)(x)\|_{B_2} > \frac{\alpha}{2}\}| \\ &\leq \left(\frac{2B_\star}{\alpha} + (2\sqrt{n})^n 2^{n+2} B_\star + 2^{n+1} A \right) \frac{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\alpha} \\ &\leq C'_n (A + B_\star) \frac{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1)}}{\alpha}, \end{aligned}$$

其中 $C'_n = 2 + (2\sqrt{n})^n 2^{n+1} + 2^{n+1}$. 至此即得 $\|T\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_1) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq C'_n (A + B_\star)$.

现在当 $1 < p < r$ 时, 因为 T 以至多为 $C'_n (A + B_\star)$ 的范数将 $L^1(\mathbb{R}^n, B_1)$ 映入 $L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n, B_2)$, 以范数 A 将 $L^r(\mathbb{R}^n, B_1)$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n, B_2)$, 故由一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Marcinkiewicz 插值定理4.19与 $(p-1)^{-\frac{1}{p}} \leq (p-1)^{-1} (1 < p < 2)$ 知

$$\|T(F)\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq C_n (p-1)^{-1} (A + B_\star) \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_1)}, \quad (4.216)$$

其中 $1 < p < \min(r, 2)$, C_n 是与 r, p, B_1, B_2 无关的常数.

对 $p > r$ 的情况, 我们用对偶性来证明. 因为 $K(x)$ 是 $B_1 \rightarrow B_2$ 的算子, 故其伴随 $K^*(x)$ 是 $B_2^* \rightarrow B_1^*$ 的算子. 显见 $\|K^*(x)\|_{B_2^* \rightarrow B_1^*} = \|K(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2}$, 因此 K^* 同样满足尺寸条件(4.205), 同理可知 K^* 也满足正则性条件(4.206). 对于条件(4.207), 因为对任意 $\varepsilon_k \downarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ 均有:

$$\left\| \int_{\varepsilon_k \leq |y| \leq 1} K^*(y) dy - K_0^* \right\|_{B_2^* \rightarrow B_1^*} = \left\| \int_{\varepsilon_k \leq |y| \leq 1} K(y) dy - K_0 \right\|_{B_1 \rightarrow B_2} \rightarrow 0,$$

故 K^* 也满足条件(4.207).

现设 $\mathbf{T}'$ 是积分核为 $\mathbf{K}^*(-x)$ 的 Banach 值算子, 显见 $\mathbf{T}'$ 在 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$ 上良定义. 现对 $F(y) = \sum_{i=1}^m f_i(y)w_i^* \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_2^*$, $G(z) = \sum_{j=1}^l g_j(z)v_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$, 往证下述对偶关系:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{T}'(F)(x), G(x) \rangle dx = \int_{\mathbb{R}^n} \langle F(z), \mathbf{T}(G)(z) \rangle dz. \quad (4.217)$$

事实上, 对每个指标 $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, l\}$ 均有

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|y| \geq \varepsilon_k} \mathbf{K}^*(-y)(f_i(x-y)w_i^*)dy, g_j(x)v_j \right\rangle dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|y| \geq \varepsilon_k} \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{K}^*(-y)(f_i(x-y)w_i^*), g_j(x)v_j \rangle dx dy \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|y| \geq \varepsilon_k} \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{K}^*(-y)(f_i(z)w_i^*), g_j(z+y)v_j \rangle dz dy \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|y| \geq \varepsilon_k} \int_{\mathbb{R}^n} \langle f_i(z)w_i^*, \mathbf{K}(-y)(g_j(z+y)v_j) \rangle dz dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle f_i(z)w_i^*, \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|y| \geq \varepsilon_k} \mathbf{K}(y)(g_j(z-y)v_j)dy \right\rangle dz, \end{aligned}$$

其中要说明积分换序合理, 就是要说明

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left\langle \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|y| \geq \varepsilon_k} \mathbf{K}^*(-y)(f_i(x-y)w_i^*)dy, g_j(x)v_j \right\rangle dx < \infty.$$

现在已知

$$\begin{aligned} \mathbf{T}'(f_i w_i^*)(x) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_k \leq |y|} \mathbf{K}^*(-y)f_i(x-y)w_i^* dy \\ &= \int_{|y| \leq 1} (f_i(x-y) - f_i(x))\mathbf{K}^*(-y)(w_i^*)dy + f_i(x)\mathbf{K}_0^*(w_i^*) + \int_{|y| > 1} f_i(x-y)\mathbf{K}^*(-y)(w_i^*)dy, \end{aligned}$$

因此只需说明

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle \int_{|y| \leq 1} (f_i(x-y) - f_i(x))\mathbf{K}^*(-y)(w_i^*)dy, g_j(x)v_j \right\rangle dx \right| < \infty, \quad (4.218)$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle f_i(x)\mathbf{K}_0^*(w_i^*), g_j(x)v_j \rangle dx \right| < \infty, \quad (4.219)$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle \int_{|y| > 1} f_i(x-y)\mathbf{K}^*(-y)(w_i^*)dy, g_j(x)v_j \right\rangle dx \right| < \infty. \quad (4.220)$$

对于(4.218)式, 结合(4.182)式与尺寸条件(4.205)知

$$\begin{aligned} & \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle \int_{|y| \leq 1} (f_i(x-y) - f_i(x))\mathbf{K}^*(-y)(w_i^*)dy, g_j(x)v_j \right\rangle dx \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \int_{|y| \leq 1} \langle (f_i(x-y) - f_i(x))\mathbf{K}^*(-y)(w_i^*), g_j(x)v_j \rangle dy dx \right| \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{|y| \leq 1} |(f_i(x-y) - f_i(x))g_j(x)\langle w_i^*, \mathbf{K}(-y)(v_j) \rangle| dy dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{|y| \leq 1} \|\nabla f_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \cdot |y| \cdot |g_j(x)| \cdot \|w_i^*\|_{B_2^*} \cdot \|\mathbf{K}(-y)(v_j)\|_{B_1} dy dx \\ &\leq \|\nabla f_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|w_i^*\|_{B_2^*} \int_{\mathbb{R}^n} |g_j(x)| \int_{|y| \leq 1} |y| \cdot \|\mathbf{K}(-y)\|_{B_1 \rightarrow B_2} \cdot \|v_j\|_{B_1} dy dx \\ &\leq \|\nabla f_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|w_i^*\|_{B_2^*} \|v_j\|_{B_1} \int_{\mathbb{R}^n} |g_j(x)| \int_{|y| \leq 1} |y| \cdot A|y|^{-n} dy dx < \infty. \end{aligned}$$

对于(4.219)式, 由伴随算子的定义与 $\mathbf{K}_0$ 的有限性即证. 最后对于(4.220)式, 因为 $f_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 故关于 y 的积分实际上是有限区域上的积分, 式子即证. 至此即得(4.217)式.

下面说明 $\mathbf{T}'$ 是 $L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_2^*) \rightarrow L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_1^*)$ 的有界线性算子. 事实上, 取定 $F \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_2^*$, 根据(4.217)式

知对任意 $G \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$ 均有

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle T'(F)(x), G(x) \rangle dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle F(x), T(G)(x) \rangle dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \|F(x)\|_{B_2^*} \|T(G)(x)\|_{B_2} dx \\ &\leq \|F\|_{L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)} \|T(G)\|_{L^r(\mathbb{R}^n, B_2)} \\ &\leq \|F\|_{L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)} B_* \|G\|_{L^r(\mathbb{R}^n, B_1)}, \end{aligned}$$

根据 $L^p(X, B)$ 的共轭空间性质 4.11(b) 可得

$$\|T'(F)\|_{L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_1^*)} = \sup_{\substack{\|G\|_{L^r(\mathbb{R}^n, B_1)} \leq 1 \\ G \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1}} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle T'(F)(x), G(x) \rangle dx \right| \leq B_* \|F\|_{L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)}.$$

目前为止, 我们已经知道了满足条件 (4.205)-(4.207) (将 K_0 对应换为 K_0^*) 的积分核 $K^*(-x)$ 诱导的算子 T' 具有 $L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_2^*) \rightarrow L^{r'}(\mathbb{R}^n, B_1^*)$ 的有界延拓. 因此逐字逐句地重复 $1 < p < r$ 时应用 Calderón-Zygmund 分解的过程可知 T' 具有 $L^1(\mathbb{R}^n, B_2^*) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n, B_1^*)$ 的延拓, 且其满足

$$\|T'(F)\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n, B_1^*)} \leq C'_n (A + B_*) \|F\|_{L^1(\mathbb{R}^n, B_2^*)}.$$

因为 $p > r > 1 \Rightarrow 1 < p' < r'$, 故根据一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Marcinkiewicz 插值定理 4.19 与 $(p'-1)^{\frac{1}{p'}} \leq p$ 知 T' 具有 $L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_2^*) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_1^*)$ 的延拓, 且

$$\|T'(F)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_1^*)} \leq C_n p (A + B_*) \|F\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)}. \quad (4.221)$$

最后将算子 T' 与 T 联系起来. 取 $F = \sum_{i=1}^m \varphi_i u_i \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \otimes B_1$, 下面说明 $\|T(F)\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_2)} < \infty$. 因为 $m < \infty$, 故存在 $R > 0$ 使得 $\text{supp } \varphi_i \subset B(0, R) (i = 1, \dots, m)$, 因此 $|x| \geq 2R$ 时根据尺寸条件 (4.205) 知

$$\left\| \int_{|y| \leq R} K(x-y) \left(\sum_{i=1}^m \varphi_i u_i \right) dy \right\|_{B_2} \leq A \left(\frac{|x|}{2} \right)^{-n} \sum_{i=1}^m \|\varphi_i\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|u_i\|_{B_1}, \quad (4.222)$$

(4.222) 右式在 $|x| \geq 2R$ 上显然是 $p(p > 1)$ 阶可积的. 另由 (4.208) 式知 (4.222) 左式是有界的, 因此其在 $|x| \leq 2R$ 上 p 阶可积. 现在对取定的 $r < p < \infty$, 由 $L^p(X, B)$ 的共轭空间性质 4.11(a) 知

$$\begin{aligned} \|T(F)\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_2)} &\leq \sup_{\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle G(x), T(F)(x) \rangle dx \right| \\ &= \sup_{\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \langle T'(G)(x), F(x) \rangle dx \right| \\ &\leq \sup_{\|G\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_2^*)} \leq 1} \|T'(G)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n, B_1^*)} \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_1)} \\ &\leq C_n p (A + B_*) \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_1)}. \end{aligned}$$

结合 (4.216) 式即知 $r < \infty, p \in (1, \min(r, 2)) \cup (r, \infty)$ 时 (4.210) 式成立. 对于 $p \in [\min(r, 2), r]$ 的情形, 利用一般 Banach 值 Lebesgue 空间的 Riesz-Thorin 插值定理 4.17 即得结论. $\square$

4.6.2 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理的应用

下面研究 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.20 的几个重要推论.

推论 4.10 (Calderón-Zygmund 定理在 $L^p(\mathbb{R}^n, l^r)$ 上的拓展)

设 $A, B > 0, W_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的缓增分布列, 且它们的 Fourier 变换一致有界 (即 $|\widehat{W_j}| < B (j \in \mathbb{Z})$). 设对每个 j 而言, 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上存在函数 K_j 使得 W_j 与之满足 (4.97) 式, 且

$$|K_j(x)| \leq A|x|^{-n}, \quad x \neq 0, \quad (4.223)$$

$$\lim_{\varepsilon_k \rightarrow 0} \int_{1 \geq |x| \geq \varepsilon_k} K_j(x) dx = L_j, \quad (4.224)$$

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \geq 2|y|} \sup_{j \in \mathbb{Z}} |K_j(x-y) - K_j(x)| dx \leq A. \quad (4.225)$$

则存在常数 $C_n, C'_n > 0$ 使得对任意 $1 < p, r < \infty$ 均有

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |W_j * f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leq C'_n \max(r, (r-1)^{-1})(A+B) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \\ \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |W_j * f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq C_n c(p, r)(A+B) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 $c(p, r) = \max(p, (p-1)^{-1}) \max(r, (r-1)^{-1})$.



证明 设 $T_j : \varphi \mapsto W_j * \varphi$, 由 Young 不等式与 Plancherel 定理知

$$\|T_j(\varphi)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\widehat{W_j \varphi}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\widehat{W_j}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq B \|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

因此 $\|T\|_{L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)} \leq B$, 于是由 Calderón-Zygmund 定理 4.12 知 T_j 是弱 $(1, 1)$ 型算子, 且 (关于 j 一致地) 以至多为 $\max(r, (r-1)^{-1})(A+B)$ 某常数倍的范数将 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n)$ ($1 < r < \infty$). 现取 $N \in \mathbb{N}$, 令

$$B_1 = B_2 = l_N^r(\mathbb{R}^n) := \{\{f_j\}_{|j| \leq N} : \|\{f_j\}_{|j| \leq N}\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} < \infty\},$$

定义

$$\mathbf{T}(\{f_j\}_{|j| \leq N}) = \{W_j * f_j\}_{|j| \leq N}, \{f_j\}_{j \in \mathbb{Z}} \in L^r(\mathbb{R}^n, l_N^r(\mathbb{R}^n)).$$

则

$$\begin{aligned} \|\mathbf{T}(\{f_j\}_{|j| \leq N})\|_{L^r(\mathbb{R}^n, l_N^r)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=-N}^N |T_j(f_j)(x)|^r dx \right)^{\frac{1}{r}} = \left(\sum_{j=-N}^N \int_{\mathbb{R}^n} |T_j(f_j)(x)|^r dx \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \left(\sum_{j=-N}^N \|T_j(f_j)\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}^r \right)^{\frac{1}{r}} \leq \max(r, (r-1)^{-1})(A+B) \left(\sum_{j=-N}^N \|f_j\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}^r \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \max(r, (r-1)^{-1})(A+B) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=-N}^N |f_j(x)|^r dx \right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \max(r, (r-1)^{-1})(A+B) \|\{f_j\}_{|j| \leq N}\|_{L^r(\mathbb{R}^n, l_N^r)}. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{T}$ 以至多为 $\max(r, (r-1)^{-1})(A+B)$ 的范数将 $L^r(\mathbb{R}^n, l_N^r(\mathbb{R}^n))$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n, l_N^r(\mathbb{R}^n))$. 知 $\mathbf{T}$ 的积分核 $\mathbf{K} \in \mathcal{L}(l_N^r(\mathbb{R}^n), l_N^r(\mathbb{R}^n))$ 为

$$\mathbf{K}(x)(\{t_j\}_{|j| \leq N}) = \{K_j(x)t_j\}_{|j| \leq N}, \{t_j\}_{|j| \leq N} \in l_N^r(\mathbb{R}^n).$$

因为对任意 $\{t_j\}_{|j| \leq N} \in l_N^r(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\begin{aligned} \|(\mathbf{K}(x-y) - \mathbf{K}(x))(\{t_j\}_{|j| \leq N})\|_{l_N^r(\mathbb{R}^n)} &= \|\{(K_j(x-y) - K_j(x))t_j\}_{|j| \leq N}\|_{l_N^r(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \sup_{|j| \leq N} |K_j(x-y) - K_j(x)| \|\{t_j\}_{|j| \leq N}\|_{l_N^r(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

故

$$\|\mathbf{K}(x-y) - \mathbf{K}(x)\|_{l_N^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow l_N^r(\mathbb{R}^n)} \leq \sup_{|j| \leq N} |K_j(x-y) - K_j(x)|,$$

因此由 (4.225) 式知

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \geq 2|y|} \|\mathbf{K}(x-y) - \mathbf{K}(x)\|_{l_N^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow l_N^r(\mathbb{R}^n)} dx \leq \sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \geq 2|y|} \sup_{|j| \leq N} |K_j(x-y) - K_j(x)| dx \leq A < \infty,$$

故 $\mathbf{K}$ 满足条件 (4.207). 另外令 $\mathbf{K}_0 = \{L_j\}_{|j| \leq N}$, 由 (4.223), (4.224) 式知 $\mathbf{K}$ 同样满足尺寸条件 (4.205) 与正则性条件 (4.206), 于是根据 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.20 即得对应 Banach 空间为 $l_N^r(\mathbb{R}^n)$ 时的结论,

令 $N \rightarrow \infty$ 即得欲证. □

如果更进一步, 设 Calderón-Zygmund 定理在 $L^p(\mathbb{R}^n, l^r)$ 上的拓展 4.10 中提到的 $\widehat{W}_i$ 均相等, 则还有下述推论:

推论 4.11

设 $W \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换是函数, 且存在常数 $B > 0$ 使得 $|\widehat{W}_j| \leq B$, 另外在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上存在局部可积函数 K 使得 W_j 与之满足 (4.97) 式, 且

$$\begin{aligned} |K(x)| &\leq A|x|^{-n}, \quad x \neq 0, \\ \lim_{\varepsilon_k \rightarrow 0} \int_{\varepsilon_k \leq |x| \leq 1} K(x) dx &= L, \\ \sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx &\leq A. \end{aligned} \quad (4.226)$$

令 $T: f \mapsto W * f$, 则存在常数 $C_n, C'_n > 0$ 使得对任意 $1 < p, r < \infty$ 均有

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leq C'_n \max(r, (r-1)^{-1})(A+B) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \\ \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq C_n c(p, r)(A+B) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 $c(p, r) = \max(p, (p-1)^{-1}) \max(r, (r-1)^{-1})$. 特别地, 上述不等式对 Hilbert 变换与 Riesz 变换均成立. ♥

另外, 可以从 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.20 自身出发推知其向量值版本:

命题 4.13 (Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理的向量值版本)

设 $1 < p, r < \infty, B_1, B_2$ 是 Banach 空间, 依照 (4.208) 式定义的 T 是以范数 $B = B(r)$ 将 $L^r(\mathbb{R}^n, B_1)$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n, B_2)$ 的有界线性算子. 另设存在常数 $A > 0$ 与算子 $K_0 \in \mathcal{L}(B_1, B_2)$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $K(x)$ 都是满足条件 (4.205)-(4.207) 的 $B_1 \rightarrow B_2$ 的有界线性算子. 则存在正常数 C_n, C'_n 使得对任意 B_1 值函数 F_j 有:

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|T(F_j)\|_{B_2}^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leq C'_n (A+B) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|F_j\|_{B_1}^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \\ \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|T(F_j)\|_{B_2}^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq C_n (A+B) c(p) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|F_j\|_{B_1}^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 $c(p) = \max(p, (p-1)^{-1})$. ♠

证明 设

$$l^r(B_1) := \left\{ \{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}} : u_j \in B_1, j \in \mathbb{Z}, \|\{u_j\}\|_{l^r(B_1)} = \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|u_j\|_{B_1}^r \right)^{\frac{1}{r}} < \infty \right\},$$

现考虑定义在 $L^r(\mathbb{R}^n, l^r(B_1))$ 上的算子 S :

$$S(\{F_j\}_{j \in \mathbb{Z}}) := \{T(F_j)\}_{j \in \mathbb{Z}}.$$

因为

$$\|S(\{F_j\}_{j \in \mathbb{Z}})\|_{L^r(\mathbb{R}^n, l^r(B_2))} = \|\{T(F_j)\}_{j \in \mathbb{Z}}\|_{L^r(\mathbb{R}^n, l^r(B_2))} = \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|T(F_j)\|_{B_2}^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leq B \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|F_j\|_{B_1}^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^r(\mathbb{R}^n)},$$

故 S 以至多为 B 的范数将 $L^r(\mathbb{R}^n, l^r(B_1))$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n, l^r(B_2))$. 另知 S 的积分核为 $\widetilde{K}(x) \in \mathcal{L}(l^r(B_1), l^r(B_2))$:

$$\widetilde{K}(x)(\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}}) = \{K(x)(u_j)\}_{j \in \mathbb{Z}},$$

其中 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{T}$ 的积分核. 下面说明对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 均有

$$\|\widetilde{K}(x)\|_{l^r(B_1) \rightarrow l^r(B_2)} = \|\mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2}. \quad (4.227)$$

这是因为任取 $\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}} \subset B_1$ 与 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 有

$$\|\widetilde{K}(x)(\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}})\|_{l^r(B_2)} = \|\{\mathbf{K}(x)(u_j)\}_{j \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(B_2)} \leq \|\mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2} \|\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(B_1)},$$

于是 $\|\widetilde{K}(x)\|_{l^r(B_1) \rightarrow l^r(B_2)} \leq \|\mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2}$. 另一方面, 对任意 $\varepsilon > 0$ 选取 $u \in B_1$ 使得 $\|u\|_{B_1} = 1$ 的同时有

$$\|\mathbf{K}(x)(u)\|_{B_2} \geq \|\mathbf{K}\|_{B_1 \rightarrow B_2} - \varepsilon.$$

现在在序列 $\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 中取 $u_1 = u$, 其余项均为 0 , 则 $\|\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(B_1)} = 1$, 于是

$$\|\widetilde{K}(x)(\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}})\|_{l^r(B_2)} = \|\{\mathbf{K}(x)(u_j)\}_{j \in \mathbb{Z}}\|_{l^r(B_2)} \geq \|\mathbf{K}\|_{B_1 \rightarrow B_2} - \varepsilon$$

由此立得(4.227)式, 进一步对 $x \neq y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\|\widetilde{K}(x-y) - \widetilde{K}(x)\|_{l^r(B_1) \rightarrow l^r(B_2)} = \|\mathbf{K}(x-y) - \mathbf{K}(x)\|_{B_1 \rightarrow B_2}.$$

另外, 定义 $\widetilde{K}_0 \in \mathcal{L}(l^r(B_1), l^r(B_2))$ 为

$$\widetilde{K}_0(\{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}}) = \{\mathbf{K}_0(u_j)\}_{j \in \mathbb{Z}}, \quad \{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}} \in l^r(B_1),$$

则极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_k \leq |y| \leq 1} \widetilde{K}(y) dy = \widetilde{K}_0$$

在 $\mathcal{L}(l^r(B_1), l^r(B_2))$ 的意义下成立.

至此, 我们已经说明了 $\mathcal{L}(l^r(B_1), l^r(B_2))$ 中的算子 $\widetilde{K}(x)$ 满足条件(4.205)-(4.207), 故由 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.20知 $\widetilde{K}$ 所诱导的算子 $\mathbf{S}$ 满足(4.209),(4.210)式, 此即欲证. $\square$

4.6.3 极大函数的向量值估计: Fefferman-Stein 不等式

下面我们讨论向量值不等式在某些非线性算子上的应用. 现取定 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数 Φ , 对 $t > 0$ 定义 $\Phi_t(x) = t^{-n}\Phi(t^{-1}x)$. 设 Φ 满足下述正则性条件:

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \geq 2|y|} \sup_{t > 0} |\Phi_t(x-y) - \Phi_t(x)| dx = A_\Phi < \infty. \quad (4.228)$$

现在考察 $L^1(\mathbb{R}^n) + L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 的极大算子

$$M_\Phi(f)(x) = \sup_{t > 0} |(f * \Phi_t)(x)|,$$

我们希望得到 M_Φ 的 L^p 估计. 首先, 当 $p = \infty$ 时利用放大不等式即得:

$$\|M_\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \quad (4.229)$$

从前述向量值不等式的视角出发, 可设 $B_1 = \mathbb{C}, B_2 = L^\infty(\mathbb{R}^+)$, 下面尝试将 M_Φ 视作将 B_1 值函数映成 B_2 值函数⁵⁹的线性⁶⁰算子 $f \mapsto \{f * \Phi_\delta\}_{\delta > 0}$.

更确切地说, 取定 $\delta_0 > 0$, 对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 均可定义将 $B_1 = \mathbb{C}$ 映入 $B_2 = L^\infty((\delta_0, \infty))$ 的有界线性算子 $\mathbf{K}_\Phi(x)$:

$$\mathbf{K}_\Phi(x)(c) = \{c\Phi_\delta(x)\}_{\delta > \delta_0}, \quad c \in \mathbb{C},$$

于是

$$\|\mathbf{K}_\Phi(x)\|_{\mathbb{C} \rightarrow L^\infty((\delta_0, \infty))} = \sup_{\delta > \delta_0} |\Phi_\delta(x)|.$$

⁵⁹这里的 $L^\infty(\mathbb{R}^+)$ 是对下标 δ 说的, 也就是说 $L^\infty(\mathbb{R}^+)$ 中的每个元素都是关于 $\delta > 0$ 的函数, 因此 $\{f * \Phi_\delta\}_{\delta > 0}$ 实际上可以写成 $(f * \Phi_\delta)(\delta)$, 为避免符号上的混乱并追求与经典视角的统一才选择将 δ 写成下标.

⁶⁰需要提醒的是, 这里的线性指的是 $K(\alpha c_1 + \beta c_2) = \alpha K(c_1) + \beta K(c_2)$, 所以不用纠结于 $L^\infty(\mathbb{R}^+)$ 中有没有加法结构.

现在(4.228)式表明积分核 $\mathbf{K}_\Phi$ 满足正则性条件(4.206). 若存在 $C, \varepsilon > 0$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|\Phi(x)| \leq C(1 + |x|)^{-n-\varepsilon}, \quad (4.230)$$

则存在常数 $A < \infty$ 使得

$$\sup_{\delta > \delta_0} |\Phi_\delta(x)| \leq A|x|^{-n},$$

因此 $\mathbf{K}_\Phi$ 也满足尺寸条件(4.205). 最后, 根据估计(4.230)知极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \Phi_\delta(y) dy = \int_{|y| \leq 1} \Phi_\delta(y) dy$$

关于 $\delta > \delta_0$ 一致成立, 故 $\mathbf{K}_\Phi$ 满足条件(4.207).

现在定义将 $\mathbb{R}^n$ 上的复值函数映成 B_1 值函数的线性算子 $\mathbf{M}_\Phi$ 为

$$\mathbf{M}_\Phi(f) = f * \mathbf{K}_\Phi = \{f * \Phi_\delta\}_{\delta > \delta_0}.$$

可见 $\mathbf{M}_\Phi$ 以至多为 $\|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$ 的范数将 $L^\infty(\mathbb{R}^n, B_1)$ 映入 $L^\infty(\mathbb{R}^n, B_2)$, 这是因为⁶¹

$$\|\mathbf{M}_\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n, B_2)} = \|\sup_{\delta > \delta_0} |f * \Phi_\delta|\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

现在应用 $r = \infty$ 时的 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.20, 可得对任意 $1 < p < \infty$ 均有

$$\|\mathbf{M}_\Phi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq C_n \max(p, (p-1)^{-1})(A_\Phi + \|\Phi\|_{L^1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.231)$$

结合插值与(4.229)式, 可进一步将(4.231)式优化为⁶²

$$\|\mathbf{M}_\Phi(f)\|_{L^r(\mathbb{R}^n, B_2)} \leq C_n \max(1, (r-1)^{-1})(A_\Phi + \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}) \|f\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall 1 < r < \infty. \quad (4.232)$$

最后, 令 $\delta_0 \downarrow 0$ 并利用 Lebesgue 单调收敛定理即得 $\delta_0 = 0$ 时的估计⁶³.

现在利用(4.232)式给出次线性算子 M_Φ 的向量值估计:

推论 4.12 (极大算子的向量值不等式)

设 Φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上满足正则性条件(4.228)的可积函数, 则存在只关于维数的常数 C_n, C'_n 使得对任意 $1 < p, r < \infty$ 均有下述向量值不等式成立:

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |M_\Phi(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n c(r) (A_\Phi + \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.233)$$

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |M_\Phi(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n c(p, r) (A_\Phi + \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (4.234)$$

其中 $c(r) = 1 + (r-1)^{-1}$, $c(p, r) = (1 + (r-1)^{-1})(p + (p-1)^{-1})$.

证明 类似于前文, 先取 $B_1 = \mathbb{C}, B_2 = L^\infty((\delta_0, \infty))$, 为了应用 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理的向量值版本4.13, 首先需要说明存在 $r \in (1, \infty)$ 使得 $\mathbf{M}_\Phi$ 是 $L^r(\mathbb{R}^n, B_1) \rightarrow L^r(\mathbb{R}^n, B_2)$ 的有界线性算子, 而(4.232)式确认了此事, 进而(4.233), (4.234)两式正是命题4.13的结论. 再令 $\delta_0 \downarrow 0$ 即得结论. $\square$

特别地, 对 Hardy-Littlewood 极大算子也有类似估计, 这是 Fefferman 与 Stein 的结果:

定理 4.21 (Fefferman-Stein 向量值极大不等式)

对 $1 < p, r < \infty$, Hardy-Littlewood 极大函数 M 满足下述向量值不等式:

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |M(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n (1 + (r-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.235)$$

⁶¹注意此时 $L^\infty(\mathbb{R}^n, B_1)$ 就是 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

⁶²并没有推出来这个系数是怎样通过插值进行优化的... 但这样的优化或许会有些“鸡肋”.

⁶³[LG1] 的勘误指出这里一定要取 $\delta_0 > 0$, 再通过单调收敛定理进行证明. 但我目前并没有弄清楚直接用 0 上手会有什么问题.

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |M(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n c(p, r) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.236)$$

其中 $c(p, r) = (1 + (r - 1)^{-1})(p + (p - 1)^{-1})$.



证明 证明的关键在于注意到取定 $\mathbb{R}^n$ 上的某个正递减径向 Schwartz 函数 Φ 满足 $|x| \leq 1$ 时 $\Phi(x) \geq 1$, 则 Hardy-Littlewood 极大函数 $M(f)$ 能被函数 $M_\Phi(|f|)$ 的常数倍点态控制, 进而用极大算子的向量值不等式 4.12 得到结论.

现在需要验证满足上述条件的函数 Φ 同时可以满足正则性条件 (4.228). 首先说明

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} (|f| * \Phi_{2^j}) \leq M_\Phi(|f|) \leq 2^n \sup_{j \in \mathbb{Z}} (|f| * \Phi_{2^j}), \quad (4.237)$$

(4.237) 左式是显然的, 对于 (4.237) 右式, 已知对每个 $t > 0$, 总存在 $j_t \in \mathbb{Z}$ 使得 $2^{j_t-1} < t \leq 2^{j_t}$, 于是根据 Φ 的递减性与径向性知

$$\begin{aligned} (|f| * \Phi_t)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| t^{-n} \Phi(t^{-1}y) dy \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| (2^{j_t-1})^{-n} \Phi(2^{j_t}y) dy \\ &= 2^n (|f| * \Phi_{2^{j_t}})(x) \leq 2^n \sup_{j \in \mathbb{Z}} (|f| * \Phi_{2^j}). \end{aligned}$$

至此即得 (4.237) 式, 该式说明极大算子 M_Φ 与二进极大算子

$$M_\Phi^d(f) := \sup_{j \in \mathbb{Z}} |f * \Phi_{2^j}|$$

是等价的. 下面说明 $M(f)$ 能被 $M_\Phi^d(|f|)$ 点态控制, 这是因为对任意 $r > 0$ 与任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\begin{aligned} \frac{1}{|B_r|} \int_{B(0,r)} |f(x-y)| dy &\leq \frac{1}{\nu_n r^n} \int_{B(0,r)} |\Phi(\frac{y}{r})| \cdot |f(x-y)| dy = \frac{1}{\nu_n} \int_{B(0,r)} |\Phi_r(y)| \cdot |f(x-y)| dy \\ &\leq \frac{1}{\nu_n} \int_{\mathbb{R}^n} |\Phi_r(y)| \cdot |f(x-y)| dy \leq \frac{1}{\nu_n} M_\Phi(|f|) \leq \frac{2^n}{\nu_n} M_\Phi^d(|f|). \end{aligned} \quad (4.238)$$

至此只要能说明

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \int_{|x| \leq 2|y|} \sup_{j \in \mathbb{Z}} |\Phi_{2^j}(x-y) - \Phi_{2^j}(x)| dx = C_n < \infty, \quad (4.239)$$

就能说明将 (4.233), (4.234) 两式中的 M_Φ 替换为 M_Φ^d 得到的结论依旧成立. 下面着重证明 (4.239) 式, 知:

$$\begin{aligned} &\int_{|x| \geq 2|y|} \sup_{j \in \mathbb{Z}} |\Phi_{2^j}(x-y) - \Phi_{2^j}(x)| dx \\ &\leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{|x| \geq 2|y|} |\Phi_{2^j}(x-y) - \Phi_{2^j}(x)| dx \\ &= \sum_{2^j > |y|} \int_{|x| \geq 2|y|} |\Phi_{2^j}(x-y) - \Phi_{2^j}(x)| dx + \sum_{2^j \leq |y|} \int_{|x| \geq 2|y|} |\Phi_{2^j}(x-y) - \Phi_{2^j}(x)| dx \\ &\leq \sum_{2^j > |y|} \int_{|x| \geq 2|y|} \frac{|y| |\nabla \Phi(\frac{x-\theta y}{2^j})|}{2^{(n+1)j}} dx + \sum_{2^j \leq |y|} \int_{|x| \geq 2|y|} (|\Phi_{2^j}(x-y)| + |\Phi_{2^j}(x)|) dx \\ &\leq \sum_{2^j > |y|} \int_{|x| \geq 2|y|} \frac{|y|}{2^{(n+1)j}} \frac{C_N dx}{(1 + |2^{-j}(x-\theta y)|)^N} + 2 \sum_{2^j \leq |y|} \int_{|x| \geq |y|} |\Phi_{2^j}(x)| dx \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \sum_{2^j > |y|} \int_{|x| \geq 2|y|} \frac{|y|}{2^{(n+1)j}} \frac{C_N dx}{(1 + |2^{-j-1}x|)^N} + 2 \sum_{2^j \leq |y|} \int_{|x| \geq 2^{-j}|y|} |\Phi(x)| dx \\ &\leq \sum_{2^j > |y|} \int_{|x| \geq 2^{-j}|y|} \frac{|y|}{2^j} \frac{C_N dx}{(1 + |x|)^N} + 2 \sum_{2^j \leq |y|} C_N (2^{-j}|y|)^{-N} \\ &\leq C_N \sum_{2^j > |y|} \frac{y}{2^j} + C_N \leq 3C_N, \end{aligned}$$

其中 $C_N > 0$ 是依赖于 $N > n$ 的常数, $\theta \in [0, 1]$, (A) 是因为 $|x| \geq 2|y|$ 时 $|x - \theta| \geq \frac{|x|}{2}$.

现在将(4.233),(4.234)两式应用到 M_{Φ}^d 上, 由(4.238)式知 $M(f) \leq \frac{2^n}{\nu_n} M_{\Phi}^d(|f|)$, 进而可得欲求向量值不等式. $\square$

注 (4.235),(4.236)两式在 $r = \infty$ 时也成立, 为此只需注意到 $\sup_{j \in \mathbb{Z}} M(f_j) \leq M(\sup_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|)$. 同样, (4.233),(4.234)两式也有类似结果. 最后, (4.234),(4.236)两式在 $p = r = \infty$ 时也成立.

4.7 补充: 概率论引论

本节选自 [CMWS], 旨在对概率论中的一些基本概念与技巧进行介绍. 此举一是为了铺垫调和分析中的概率方法, 二是介绍在分析中很有用的一些概率直觉. 事实上, 调和分析中的一些思想从概率论的视角来看是显见的.

4.7.1 概率空间, 独立性

概率空间 $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ 指的是某个赋正测度 $\mathbb{P}$ 的测度空间, 且 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. σ 代数 Σ 中的元素 $A, B, \dots$ 称为**事件**, $\mathbb{P}(A)$ 称为事件 A 的**概率**. 在测度 $\mathbb{P}$ 下的可测实值 (或复制) 函数称为**随机变量**. 概率论可以说是围绕**独立**这一概念展开的: 称事件 A, B 独立当且仅当 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 这实际上也是概率论符合直觉的约定. 更一般的, 称 Σ 的有限多个 σ 子代数独立, 如果对任意 $A_j \in \Sigma_j$ 均有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_j A_j\right) = \prod_j \mathbb{P}(A_j).$$

有限多个随机变量 $\{X_j\}_j$ 独立当且仅当 σ 代数 $\{X_j^{-1}(\mathcal{B})\}_j$ 独立, 其中 $\mathcal{B}$ 是随机变量对应数域上的 **Borel** σ 代数. 独立随机变量的一个经典例子是投币序列, 该序列 (至少在直观上) 是通过重复投掷正面以概率 $p \in (0, 1)$ 朝上, 反面以概率 $q = 1 - p$ 朝上的硬币得到的. 这种序列又称为 **Bernoulli 序列**. 称一个硬币是**公平的**, 指的是 $p = q = \frac{1}{2}$. 从数学上看, 显见任何长度为 N 的这种序列都可以对应一个乘积空间, 该空间由元素 $\omega = \{\omega_j\}_{j=1}^N$ 构成, 其中事件 $\omega_j \in \{0, 1\}$, 且

$$\Omega_N := \{0, 1\}^N, \quad \mathbb{P}(\omega) = \prod_{j=1}^N (p\chi_{\{\omega_j=0\}} + q\chi_{\{\omega_j=1\}}).$$

这里 Σ 包含 Ω_N 的全体子集, 在事件 A 发生时 $\chi_A = 1$, 反之 $\chi_A = 0$. 给出前述序列第 j 项的随机变量可以简单看作对应的坐标映射 (或投影映射), 即 $X_j(\omega) := \omega_j$. 根据 Ω_N 上概率测度的定义可见这些变量是独立的. 另一种 (对公平硬币) 得到相同随机变量的方法是构造 **Rademacher 函数**:

$$r_j(t) = \text{sgn}(\sin(2\pi 2^j t)), \quad 0 < t < 1, j = 0, 1, 2, \dots$$




图 4.5: r_0, r_1 示意图.

Rademacher 函数对应的空间是赋 Lebesgue 测度的区间 $[0, 1]$. 显见

$$\mathbb{P}(\{r_{j_1} = \varepsilon_1, \dots, r_{j_n} = \varepsilon_n\}) = 2^{-n}, \quad \forall n \geq 1, \varepsilon_i = \pm 1.$$

这说明 r_j 是独立随机变量⁶⁴. 直观上来看, 这件事也是显然的, 参见图4.5. 根据 Rademacher 函数的构造可见, 就算知道了 r_j 的取值, 也不能推知其它任何 Rademacher 函数的取值⁶⁵, 进而就算知道任意有限个 Rademacher 函数的取值, 也没法推知其它任何 Rademacher 函数的取值. 把区间缩放成 $p:q$ 的比例即得一般投币序列的情况. 事实上, 任何只取有限值的随机变量都可以通过相同的构造给出某个 $[0,1]$ 上独立变量的无穷列.

从概率论的视角来看, 随机变量究竟定义在哪个概率空间上是完全不重要的. 给定实值随机变量的有限列 $\{X_j\}_{j=1}^N$, 我们需要的所有信息都可以通过这些变量的 (联合) 分布函数给出, 即:

$$F_N(\lambda_1, \dots, \lambda_N) := \mathbb{P}(\{X_1 > \lambda_1, \dots, X_n > \lambda_N\}), \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

例如前文谈到的随机变量独立性在分布函数的语言下可表为:

$$F_N(\lambda_1, \dots, \lambda_N) := \prod_{j=1}^N \mathbb{P}(\{X_j > \lambda_j\}). \quad (4.240)$$

称有限 (或无限) 随机变量列 X_j **独立等分布**, 如果该随机变量列中的每个随机变量的分布函数都是一样的, 且 (4.240) 式对该随机变量列的任意子列均成立. 独立等分布简记为 i.i.d. 严格来说, 这样关注分布函数是因为我们总是能将把一个分布函数与一个随机变量联系起来. 这是因为任取不减函数 $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, 只要它右连续且满足

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} F(\lambda) = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} F(\lambda) = 1,$$

就可以定义正半轴 $(0, \infty)$ 上的概率测度为

$$\mathbb{P}((\lambda, \infty)) := F(\lambda).$$

进而正半轴上的函数 $x \mapsto x$ 正是在该概率测度下分布函数为 F 的随机变量. 进一步, 为了用这一分布构造任意有限 i.i.d. 序列, 可在 $\mathbb{R}^N$ 上取乘积测度. 最后, 为了从有限 i.i.d. 序列过渡到无限 i.i.d. 序列, 我们需要无穷次乘积空间上的 Kolmogorov 定理, 这一过程具有技巧性, 在此就省略了. 特别地, 对于投币序列来说, Rademacher 函数就是一个具体的构造方法.

4.7.2 Rademacher 函数的相关结论

根据 Rademacher 函数之间的独立性, 实际上可得对任意函数 f_j 均有

$$\int_0^1 \prod_{j=0}^n f_j(r_j(t)) dt = \prod_{j=0}^n \int_0^1 f_j(r_j(t)) dt. \quad (4.241)$$

下面给出 (4.241) 式的具体证明. 因为 $r_0(t) \equiv 1$, 故可将 (4.241) 右式写成

$$f_0(1) \prod_{j=1}^n \int_0^1 f_j(r_j(t)) dt.$$

同样, 根据 Rademacher 函数的构造, 对任意取定的 $j \geq 1$ 而言, $r_j(t)$ 都在 $[0, 1]$ 上一半为 1, 一半为 -1, 因此总有

$$\int_0^1 f_j(r_j(t)) dt = \frac{f_j(1) + f_j(-1)}{2}, \quad j \geq 1.$$

故对 (4.241) 右式进一步有

$$\begin{aligned} f_0(1) \prod_{j=1}^n \int_0^1 f_j(r_j(t)) dt &= f_0(1) \prod_{j=1}^n \frac{f_j(1) + f_j(-1)}{2} \\ &= \frac{f_0(1)}{2^n} \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{j \in S} f_j(1) \prod_{j \notin S} f_j(-1). \end{aligned}$$

因为函数 $\prod_{j=1}^n f_j(r_j(t))$ 在 $I_k = [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}]$ ($k = 0, 1, \dots, 2^n - 1$) 上的限制恰为 $\prod_{j \in S} f_j(1) \prod_{j \notin S} f_j(-1)$, 故 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集 S 与区间 I_k 之间存在一一对应. 故当 S 取遍 $\{1, \dots, n\}$ 的全体子集时, 与 $\prod_{j \in S} f_j(1) \prod_{j \notin S} f_j(-1)$

⁶⁴ 因为对任意 $j \in \mathbb{N}$ 与任意 ε_i 而言, $\mathbb{P}(\{r_j = \varepsilon_i\})$ 总是 $\frac{1}{2}$.

⁶⁵ 这句话是从未知输入的情况去谈的. 也就是说就算知道了 $r_j(t) = 1$, 在不知道 t 具体值的情况下, 没法谈 $r_k(t)$ ($k \neq 1$) 取什么值.

对应的区间 I_k 取遍 $k = 0, 1, \dots, 2^n - 1$, 因此

$$\frac{f_0(1)}{2^n} \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{j \in S} f_j(1) \prod_{j \notin S} f_j(-1) = \frac{f_0(1)}{2^n |I_k|} \sum_{k=0}^{2^n-1} \int_{I_k} \prod_{j=1}^n f_j(r_j(t)) dt = \int_0^1 \prod_{j=0}^n f_j(r_j(t)) dt.$$

(4.241)式至此得证.

下面这条性质是 Rademacher 函数在分析学中重要性的基石:

定理 4.22 (Khintchine 不等式)

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意实值平方可和序列 $\{a_j\}, \{b_j\}$ 有:

$$B_p \left(\sum_j |a_j + ib_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left\| \left(\sum_j (a_j + ib_j) r_j \right) \right\|_{L^p[0,1]} \leq A_p \left(\sum_j |a_j + ib_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (4.242)$$

其中 $0 < A_p, B_p < \infty$ 是仅依赖于 p 的常数.



注 Khintchine 不等式反映了 Rademacher 函数系在 L^p (特别在 $p \neq 2$ 时) 中的正交性. Khintchine 最初证明了该不等式的一个特殊形式, 并用此估计了特定随机游走的渐近行为. 之后这一不等式几乎同时被 Littlewood 和 Paley, Zygmund 系统研究, 他们证明了上面阐述的一般情形.

证明 Khintchine 不等式的证明基于下述函数的指数衰减分布函数不等式:

$$F(t) = \sum_j (a_j + ib_j) r_j(t), \quad t \in [0, 1],$$

其中 a_j, b_j 是平方可和实数. 我们首先在下述三条假设下给出上述 F 的分布函数不等式:

- (i) 序列 $\{b_j\}$ 恒为零.
- (ii) 序列 $\{a_j\}$ 中仅有有限项非零.
- (iii) $\{a_j\}$ 满足 $(\sum_j |a_j|^2)^{\frac{1}{2}} = 1$.

设 $\rho > 0$, 由 (i)-(iii) 及 (4.241) 式知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{\rho \sum_j a_j r_j(t)} dt &= \prod_j \int_0^1 e^{\rho a_j r_j(t)} dt \\ &= \prod_j \frac{e^{\rho a_j} + e^{-\rho a_j}}{2} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \prod_j e^{\frac{1}{2} \rho^2 a_j^2} = e^{\frac{1}{2} \rho^2 \sum_j a_j^2} = e^{\frac{1}{2} \rho^2}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为对全体 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \leq e^{\frac{1}{2}x^2}$, 通过 Taylor 展开即可验证该式. 因为同样的过程对 $-\sum_j a_j r_j(t)$ 也成立, 故

$$\int_0^1 e^{\rho |F(t)|} dt \leq 2e^{\frac{1}{2} \rho^2}.$$

由此知

$$e^{\rho \alpha} |\{t \in [0, 1] : |F(t)| > \alpha\}| \leq \int_0^1 e^{\rho |F(t)|} dt \leq 2e^{\frac{1}{2} \rho^2},$$

取 $\rho = \alpha$ 即得分布函数不等式:

$$d_F(\alpha) = |\{t \in [0, 1] : |F(t)| > \alpha\}| \leq 2e^{\frac{1}{2} \alpha^2 - \alpha^2} = 2e^{-\frac{1}{2} \alpha^2}.$$

现由 L^p 范数的等价计算式 (3.5) 可得:

$$\|F\|_{L^p[0,1]}^p = \int_0^1 p \alpha^{p-1} d_F(\alpha) d\alpha \leq \int_0^\infty p \alpha^{p-1} 2e^{-\frac{\alpha^2}{2}} d\alpha = 2^{\frac{p}{2}} p \Gamma\left(\frac{p}{2}\right).$$

又因为在条件 (i)-(iii) 下容易验证 $\|F\|_{L^2[0,1]} = 1$, 故此时

$$\|F\|_{L^p[0,1]} \leq \sqrt{2} \left(p \Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \right)^{\frac{1}{p}} \|F\|_{L^2[0,1]}.$$

下面逐步去除条件 (i)-(iii). 条件 (ii) 可以通过用有限项非零序列逼近无限项非零序列的极限过程去除, 而条件 (iii) 通过 scaling 变换即可去除. 为去除条件 (i), 设 a_j, b_j 均为实数, 则在 $p > 2$ 时有:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_j (a_j + ib_j)r_j \right\|_{L^p[0,1]} &\leq \left\| \sum_j a_j r_j \right\|_{L^p[0,1]} + \left\| \sum_j b_j r_j \right\|_{L^p[0,1]} \\ &\leq \left\| \sum_j a_j r_j \right\|_{L^p[0,1]} + \left\| \sum_j b_j r_j \right\|_{L^p[0,1]} \\ &\leq \sqrt{2} \left(p\Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \right)^{\frac{1}{p}} \left(\left(\sum_j |a_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_j |b_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right) \\ &\leq \sqrt{2} \left(p\Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \right)^{\frac{1}{p}} \sqrt{2} \left(\sum_j |a_j + ib_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

故在 $p > 2$ 时可令 $A_p = 2(p\Gamma(p/2))^{\frac{1}{p}}$. 因为在 $0 < p \leq 2$ 时显见 $\|F\|_{L^p[0,1]} \leq \|F\|_{L^2[0,1]}$, 故不等式 $\|F\|_{L^p[0,1]} \leq A_p \|F\|_{L^2[0,1]}$ 成立, 其中

$$A_p = \begin{cases} 1, & 0 < p \leq 2, \\ 2p^{\frac{1}{p}} \Gamma\left(\frac{p}{2}\right)^{\frac{1}{p}}, & 2 < p < \infty. \end{cases}$$

根据 Sterling 公式知 $p \rightarrow \infty$ 时 A_p 与 $\sqrt{p}$ 行为一致.

下面讨论反向不等式 $B_p \|F\|_{L^2[0,1]} \leq \|F\|_{L^p[0,1]}$. 显见 $p \geq 2$ 时 $\|F\|_{L^2[0,1]} \leq \|F\|_{L^p[0,1]}$, 故 $p \geq 2$ 时可取 $B_p = 1$. 现考虑 $0 < p < 2$ 的情况, 取 s 满足 $2 < s < \infty$, 并取 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{1}{2} = \frac{1-\theta}{p} + \frac{\theta}{s}.$$

由 L^p 范数的对数凸性知

$$\|F\|_{L^2[0,1]} \leq \|F\|_{L^p[0,1]}^{1-\theta} \|F\|_{L^s[0,1]}^{\theta} \leq \|F\|_{L^p[0,1]}^{1-\theta} A_s^{\theta} \|F\|_{L^2[0,1]}^{\theta}.$$

进而

$$\|F\|_{L^2[0,1]} \leq A_s^{\frac{\theta}{1-\theta}} \|F\|_{L^p[0,1]}.$$

因此不等式 $B_p \|F\|_{L^2[0,1]} \leq \|F\|_{L^p[0,1]}$ 成立, 其中

$$B_p = \begin{cases} 1, & 2 \leq p < \infty, \\ \sup_{s>2} A_s^{-\frac{\frac{1}{p}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{s}}}, & 0 < p < 2. \end{cases}$$

观察到函数 $s \mapsto A_s^{-(\frac{1}{p}-\frac{1}{2})/(\frac{1}{2}-\frac{1}{s})}$ 在 $s \rightarrow 2^+$ 与 $s \rightarrow \infty$ 时趋零, 根据连续性可知该函数必在 $(2, \infty)$ 上的某点 $s = s(p)$ 处达到最大值. 特别地, 在 $p < 2$ 时取 $s = 4$ 可得 $B_p \geq 16 \times 256^{-\frac{1}{p}}$. $\square$

另外, Khintchine 不等式 4.22 还有弱型形式:

定理 4.23 (弱型空间上的 Khintchine 不等式)

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意实值平方可和序列 $\{a_j\}, \{b_j\}$ 有:

$$4^{-\frac{1}{p}} B_{\frac{p}{2}} \left(\sum_j |a_j + ib_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left\| \left(\sum_j (a_j + ib_j)r_j \right) \right\|_{L^{p,\infty}[0,1]} \leq A_p \left(\sum_j |a_j + ib_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (4.243)$$

其中 $0 < A_p, B_p < \infty$ 是仅依赖于 p 的常数.

证明 对于 (4.243) 右式, 由 $L^p[0,1] \subset L^{p,\infty}[0,1]$ 与 Khintchine 不等式 (4.242) 右式即得. 对于反向不等式, 由命题 3.11 知 $L^{p,\infty}[0,1] \subset L^{\frac{p}{2}}[0,1]$, 且

$$\|F\|_{L^{\frac{p}{2}}[0,1]} \leq 4^{\frac{1}{p}} \|F\|_{L^{[p,\infty]}[0,1]},$$

故

$$\begin{aligned} B_{\frac{p}{2}} \left(\sum_j |a_j + ib_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \left\| \left(\sum_j (a_j + ib_j) r_j \right) \right\|_{L^{\frac{p}{2}}[0,1]} \\ &\leq 4^{\frac{1}{p}} \left\| \left(\sum_j (a_j + ib_j) r_j \right) \right\|_{L^{p,\infty}[0,1]}, \end{aligned}$$

此即欲证的反向不等式. □

Khinchine 不等式4.22还能延拓到多变量情形. 对正整数 n , 记

$$F_n(t_1, \dots, t_n) = \sum_{j_1} \cdots \sum_{j_n} c_{j_1, \dots, j_n} r_{j_1}(t_1) \cdots r_{j_n}(t_n), \quad t_j \in [0, 1],$$

其中 $c_{j_1, \dots, j_n}$ 是复数列, F_n 是定义在 $[0, 1]^n$ 上的函数.

定理 4.24 (多变量情形的 Khinchine 不等式)

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意 n 元复值平方可积列 $\{c_{j_1, \dots, j_n}\}_{j_1, \dots, j_n}$, 关于 F_n 成立下述不等式:

$$B_p^n \left(\sum_{j_1} \cdots \sum_{j_n} |c_{j_1, \dots, j_n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|F_n\|_{L^p[0,1]^n} \leq A_p^n \left(\sum_{j_1} \cdots \sum_{j_n} |c_{j_1, \dots, j_n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

其中 A_p, B_p 是 Khinchine 不等式4.22中的常数. ♡

第五章 Littlewood-Paley 分解与乘子

本章我们研究 Fourier 变换的正交性质. 这种正交性在 L^2 上是很容易理解的, 但在其他函数空间中这种性质就不那么显然了. 平方函数给出了一种表示与量化 L^p 以及其他函数空间中 Fourier 变换正交性的方法, 这类函数由 Littlewood 和 Paley 最先引入, 随后发展的一系列理论就以他们的名字来命名了. Littlewood-Paley 理论在刻画函数空间上的贡献是卓然的.

历史上, Littlewood-Paley 理论最先出现在一维 Fourier 级数的背景下, 并在复函数理论中得到发展. 随着实变量方法的进步, 这一整套理论渐渐独立于复方法, 延拓到了 $\mathbb{R}^n$ 中. 本章我们也会循着这一过程进行研究. 事实表明, Littlewood-Paley 理论与前面介绍的 Calderón-Zygmund 理论有密不可分的联系. 这一联系深刻且深远, 它体现在两套理论的主要结果是可以互推的.

Littlewood-Paley 理论的为例在本章中的一些例子中得以充分体现, 这些例子包括特定乘子理论的推导, 即研究有界函数成为 L^p 乘子的充分条件的理论. 作为 Littlewood-Paley 理论的一个结果, 我们也会证明缺项部分 Fourier 积分 $\int_{|\xi| \leq 2^N} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi$ 几乎处处收敛到 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^p 函数 f .

5.1 Littlewood-Paley 理论

作为一切的开始, 我们首先需要说清楚当谈及 Fourier 变换的正交性时指的是什么东西. 如果定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f_j 具有支在不交集上的 Fourier 变换 $\widehat{f}_j$, 且

$$\left\| \sum_j f_j \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \sum_j \|f_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2, \quad (5.1)$$

则称这些函数正交. 不幸的是, 如果(5.1)中的 2 被替换为 $p \neq 2$, 等号两边的量就可能变得不可比较. Littlewood-Paley 理论提供了(5.1)式的一个替代不等式用以表明 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中也可以谈论某种正交性. 该不等式的最初动机源于一维缺项 Fourier 级数的研究, 其中缺项序列定义为:

定义 5.1 (缺项序列)

称正整数序列 $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ 是缺项序列, 如果存在常数 $A > 1$ 使得对全体 $k \in \mathbb{N}$ 均有 $\lambda_{k+1} \geq A\lambda_k$.

关于缺项序列有下述定理成立:

定理 5.1 (缺项 Fourier 级数范数的等价性)

设 $1 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots$ 是常数为 $A > 1$ 的缺项序列, 记 $\Lambda = \{\lambda_k : k \in \mathbb{N}\}$, 则对任意 $1 \leq p < \infty$, 均存在常数 $C_p(A)$ 使得对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 只要 $\widehat{f}(k) = 0 (k \in \mathbb{Z} \setminus \Lambda)$, 就有

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq C_p(A) \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}. \quad (5.2)$$

另外, (5.2) 式的反向不等式也成立, 因此缺项 Fourier 级数的全体 $L^p(1 \leq p < \infty)$ 范数均等价.

证明 首先设 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 是非零函数, 定义

$$f_N(x) = \sum_{j=1}^N \widehat{f}(\lambda_j) e^{i2\pi \lambda_j x}. \quad (5.3)$$

对给定的 $2 \leq p < \infty$, 取整数 m 满足 $2m > p$, 并取正整数 r 使得 $A^r > m$, 则可将 f_N 写成 r 个函数 $\varphi_s (s = 1, \dots, r)$ 的和, 其中每个 φ_s 的 Fourier 系数只可能在缺项集

$$U := \{\lambda_{kr+s} : k \in \mathbb{Z} \cup \{0\}\} = \{\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots\}$$

上不为零. 从缺项序列的定义出发可见序列 $\{\mu_k\}_k$ 是常数为 A^r 的缺项序列, 进而

$$\int_0^1 |\varphi_s(x)|^{2m} dx = \int_0^1 \varphi_s(x)^m \overline{\varphi_s(x)^m} dx = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi_s^m}(\alpha) \overline{\widehat{\varphi_s^m}(\alpha)}.$$

现利用 Fourier 系数的乘法公式 2.13(iii) 知

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi_s^m}(\alpha) &= \widehat{\varphi_s^{m-1} \varphi_s}(\alpha) = \sum_{\alpha_1 \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi_s^{m-1}}(\alpha_1) \widehat{\varphi_s}(\alpha - \alpha_1) \\ &= \sum_{\alpha_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{\alpha_2 \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi_s^{m-2}}(\alpha_2) \widehat{\varphi_s}(\alpha_1 - \alpha_2) \widehat{\varphi_s}(\alpha - \alpha_1) \\ &= \cdots = \sum_{\substack{\beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{Z} \\ \beta_1 + \dots + \beta_m = \alpha}} \widehat{\varphi_s}(\beta_1) \cdots \widehat{\varphi_s}(\beta_m) \\ &\stackrel{(A)}{=} \sum_{\substack{1 \leq j_1, \dots, j_m \leq N \\ \mu_{j_1} + \dots + \mu_{j_m} = \alpha}} \widehat{\varphi_s}(\beta_1) \cdots \widehat{\varphi_s}(\beta_m), \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $\widehat{\varphi_s}(\alpha)$ 只可能在 $\alpha \in U$ 时不为零. 因此

$$\int_0^1 |\varphi_s(x)|^{2m} dx = \sum_{\substack{1 \leq j_1, \dots, j_m, k_1, \dots, k_m \leq N \\ \mu_{j_1} + \dots + \mu_{j_m} = \mu_{k_1} + \dots + \mu_{k_m}}} \widehat{\varphi_s}(\mu_{j_1}) \cdots \widehat{\varphi_s}(\mu_{j_m}) \overline{\widehat{\varphi_s}(\mu_{k_1})} \cdots \overline{\widehat{\varphi_s}(\mu_{k_m})}. \quad (5.4)$$

下面断言若 $\mu_{j_1} + \dots + \mu_{j_m} = \mu_{k_1} + \dots + \mu_{k_m}$, 则

$$\max(\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}) = \max(\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m}). \quad (5.5)$$

这是因为若 $\max(\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}) > \max(\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m})$, 则

$$\max(\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}) \leq \mu_{k_1} + \dots + \mu_{k_m} \leq m \max(\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m}),$$

若记 $\mu_{j_0} = \max(\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m})$, $\mu_{k_0} = \max(\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m})$, 则由 $\{\mu_k\}_k$ 是常数为 A^r 的缺项序列知它至少是递增列, 因此 $j_0 > k_0 \Rightarrow j_0 \geq k_0 + 1$, 于是

$$\mu_{j_0} \geq \mu_{k_0+1} \geq A^r \mu_{k_0} \Rightarrow \max(\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}) \geq A^r \max(\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m}),$$

因此 $A^r \leq m$, 但这与 r 的选取方式矛盾了. 同理也可以否定 $\max(\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}) < \max(\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m})$ 的情形, 因此 (5.5) 式成立. 由此可以归纳说明¹ 若 $\mu_{j_1} + \dots + \mu_{j_m} = \mu_{k_1} + \dots + \mu_{k_m}$, 则

$$\{\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m}\} = \{\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}\}.$$

也就是说 $\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m}$ 与 $\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}$ 是同一组正整数. 现在由这一事实与 (5.4) 右和式中所蕴含的排列知

$$\int_0^1 |\varphi_s(x)|^{2m} dx \leq m! \sum_{j_1=1}^N \cdots \sum_{j_m=1}^N |\widehat{\varphi_s}(\mu_{j_1})|^2 \cdots |\widehat{\varphi_s}(\mu_{j_m})|^2 = m! (\|\varphi_s\|_{L^2(\mathbb{T})}^2)^m.$$

这表明对任意 $s \in \{1, 2, \dots, r\}$ 均有 $\|\varphi_s\|_{L^{2m}(\mathbb{T})} \leq (m!)^{\frac{1}{2m}} \|\varphi_s\|_{L^2(\mathbb{T})}$, 因此

$$\begin{aligned} \|f_N\|_{L^p(\mathbb{T})} &\leq \|f_N\|_{L^{2m}(\mathbb{T})} = \left\| \sum_{s=1}^r \varphi_s \right\|_{L^{2m}(\mathbb{T})} \leq \sum_{s=1}^r \|\varphi_s\|_{L^{2m}(\mathbb{T})} \\ &\leq \sqrt{r} \left(\sum_{s=1}^r \|\varphi_s\|_{L^{2m}(\mathbb{T})}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{r} (m!)^{\frac{1}{2m}} \left(\sum_{s=1}^r \|\varphi_s\|_{L^2(\mathbb{T})}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{(B)}{=} \sqrt{r} (m!)^{\frac{1}{2m}} \|f_N\|_{L^2(\mathbb{T})}, \end{aligned}$$

其中 (B) 是因为 $\{\varphi_s\}_{s=1}^r$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中正交. 现取 $r = [\log_A m] + 1$, $m = [\frac{p}{2}] + 1$, 则对任意形如 (5.3) 式的 f_N 均有

$$\|f_N\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq c_p(A) \|f_N\|_{L^2(\mathbb{T})}, \quad p \geq 2, \quad (5.6)$$

其中 $c_p(A) = \sqrt{1 + [\log_A([\frac{p}{2}] + 1)]([\frac{p}{2}] + 1)!}^{\frac{1}{2([\frac{p}{2}] + 1)}}$.

现在要将 (5.6) 式中的 f_N 换回 f , 回忆在证明最开始我们假设了 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 于是由 Fourier 级数的 L^2 收敛

¹ 在 $\mu_{k_1}, \dots, \mu_{k_m}$ 与 $\mu_{j_1}, \dots, \mu_{j_m}$ 中同时去除最大的那项, 剩下的项组成的和式依旧相等, 重复该操作即可.

性2.2知 f_N 在 L^2 意义下收敛到 f , 因而根据 Riesz 引理知存在子列 $\{f_{N_j}\}_j$ 几乎处处收敛到 f , 于是由 Fatou 引理与(5.6)式可知 $1 < p < \infty$ 时有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^p dx &= \int_0^1 \liminf_{j \rightarrow \infty} |f_{N_j}(x)|^p dx \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_{N_j}(x)|^p dx \\ &\leq c_p(A)^p \liminf_{j \rightarrow \infty} \|f_{N_j}\|_{L^2(\mathbb{T})}^p = c_p(A)^p \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^p, \end{aligned}$$

于是

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq c_p(A) \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}, \quad p \geq 2. \quad (5.7)$$

现由 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 可知 $f \in L^4(\mathbb{T})$, 进而 $f \in L^4(\mathbb{T}) \cap L^1(\mathbb{T})$, 进而结合 L^p 范数的对数凸性1.13与(5.7)式可知

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})} \leq \|f\|_{L^4(\mathbb{T})}^{\frac{2}{3}} \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}^{\frac{1}{3}} \leq 6^{\frac{1}{3}} (1 + [\log_A 3])^{\frac{1}{3}} \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^{\frac{2}{3}} \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}^{\frac{1}{3}}.$$

于是只要设 $0 < \|f\|_{L^2(\mathbb{T})} < \infty$, 就有

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})} \leq 6^{\frac{1}{2}} (1 + [\log_A 3]) \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}. \quad (5.8)$$

最后根据 Hölder 不等式易得

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}, \quad 1 \leq p < 2, \quad (5.9)$$

现在综合(5.7)-(5.9)式并令 $C_p(A) = c_p(A) 6^{\frac{1}{2}} (1 + [\log_A 3])$ 即得(5.2)式.

下面将上述结果延拓到 $L^1(\mathbb{T})$ 中. 任取 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 满足 $\widehat{f}(k) = 0 (k \in \mathbb{Z} \setminus \Lambda)$, 考察函数 $f * F_M$, 其中 F_M 是 Fejer 核, $M \in \mathbb{N}$. 利用 $F_M = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t)$ 与 $\{e^{i2\pi kt}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 的正交性可知存在常数 B 使得 $\|F_M\|_{L^2(\mathbb{T})} \leq B < \infty$, 因此由 Young 不等式知 $f * F_M \in L^2(\mathbb{T})$, 由 Fejer 核的恒等逼近定理知 $f * F_m \rightarrow f$ 在 $L^p (1 \leq p < \infty)$ 意义下成立, 且由 $\widehat{f}(k)$ 的缺项性知 $\widehat{f * F_M}(k) = 0 (k \in \mathbb{Z} \setminus \Lambda)$, 故由前述讨论可得不等式

$$\|f * F_M\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq C_p(A) \|f * F_M\|_{L^1(\mathbb{T})}, \quad (5.10)$$

最后令 $M \rightarrow \infty$ 即得(5.2)式. $\square$

在缺项 Fourier 级数范数的等价性5.1中取 $f(x) = \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k x}$, $A = 2$ 可知对任意 $1 < p < \infty$, 一方面有

$$\left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^p[0,1]} \leq C_p \left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^1[0,1]} \leq C_p \left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^2[0,1]} = C_p \left(\sum_{k=1}^N |a_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

另一方面在 $p \geq 2$ 时显见

$$\left(\sum_{k=1}^N |a_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^p[0,1]}.$$

而 $1 < p < 2$ 时再次利用缺项 Fourier 级数范数的等价性5.1可得

$$\left(\sum_{k=1}^N |a_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq C_p \left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^1[0,1]} \leq C_p \left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^p[0,1]}.$$

因此

$$\left\| \sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k(\cdot)} \right\|_{L^p[0,1]} \approx \left(\sum_{k=1}^N |a_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (5.11)$$

也就是说, 对 $\sum_{k=1}^N a_k e^{i2\pi 2^k x}$ 的 L^p 范数进行计算所得到的结果几乎都可以 (在忽略常数倍的意义下) 照搬到 L^2 范数的情形. 类似的结果在更一般的二进指数指标范围 $\{2^k + 1, \dots, 2^{k+1} - 1\}$ 中也是成立的, 因为该范围中每个指标对应的指数函数与其它指标对应的函数均无关. 特别地, $\mathbb{T}$ 中函数的 L^p 可积性并不会被前述二进方体中其 Fourier 系数的随机符号影响². 这就是 Littlewood-Paley 理论背后的直觉性思考.

从上述讨论出发, 下面介绍连续情形的 Littlewood-Paley 算子.

²[LG1] 中这段的原文并没有读懂...

定义 5.2 (Littlewood-Paley 算子)

设 Ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, $j \in \mathbb{Z}$. 定义 Ψ 所诱导的 Littlewood-Paley 算子 Δ_j 为

$$\Delta_j(f) = f * \Psi_{2^{-j}},$$

其中 $\Psi_{2^{-j}}(x) = 2^{jn} \Psi(2^j x) (x \in \mathbb{R}^n)$.



由 L^1 函数 Fourier 变换的性质立得对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有 $\widehat{\Psi_{2^{-j}}}(\xi) = \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$. 另外注意当 Ψ 是 Schwartz 函数而 f 是缓增分布时, 值 $\Delta_j(f)$ 是良定义的函数.

Littlewood-Paley 算子的定义依赖于函数 Ψ 的选取, 在一般情况下我们都选取 Ψ 是具有紧支频率³的光滑函数. 观察到若 $\widehat{\Psi}$ 支在环 $0 < c_1 < |\xi| < c_2 < \infty$ 上, 则 Δ_j 的 Fourier 变换支在环 $c_1 2^j < |\xi| < c_2 2^j$ 上, 这是因为

$$\widehat{\Delta_j(f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi) \widehat{\Psi_{2^{-j}}}(\xi) = \widehat{f}(\xi) \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi),$$

故

$$\widehat{\Delta_j(f)}(\xi) \neq 0 \Rightarrow c_1 < 2^{-j}|\xi| < c_2 \Rightarrow c_1 2^j < |\xi| < c_2 2^j.$$

也就是说, Δ_j 的频率在 $|\xi| \approx 2^j$ 附近局部化了. 因此 Δ_j 可以用于将函数在 $|\xi| \approx 2^j$ 附近的频率独立出来.

Littlewood-Paley 算子 Δ_j 诱导的平方函数定义为

$$f \mapsto \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

这个二次表达式捕捉了函数 f 的内在正交性.

定理 5.2 (Littlewood-Paley)

若 Ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积 C^1 函数, 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) dx = 0$ 且

$$|\Psi(x)| + |\nabla \Psi(x)| \leq B(1 + |x|)^{-n-1}. \quad (5.12)$$

则存在常数 $C_n < \infty$ 使得对全体 $1 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n B \max(p, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.13)$$

另存在 $C'_n < \infty$ 使得对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n B \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.14)$$

相反地, 设 Ψ 是 Schwartz 函数, 它要么满足

$$\widehat{\Psi}(0) = 0 \wedge \forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 = 1 \right), \quad (5.15)$$

要么满足

$$0 \notin \text{supp } \widehat{\Psi} \wedge \forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1 \right). \quad (5.16)$$

则存在常数 $C_{n,\Psi}$ 使得对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 只要存在 $1 < p < \infty$ 使得

$$\left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \in L^p(\mathbb{R}^n),$$

就存在唯一的多项式 Q 使得缓增分布 $f - Q$ 与某 L^p 函数重合, 且

$$\|f - Q\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,\Psi} B \max(p, (p-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.17)$$

³即 $\widehat{\Psi}$ 紧支.

因此若对某个 $1 < p < \infty$ 有 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \approx \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$



证明 我们首先证明(5.13)式在 $p = 2$ 时的情形. 由 Plancherel 定理知任取 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j=-N}^N |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=-N}^N |\Delta_j(f)(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{j=-N}^N \int_{\mathbb{R}^n} |\Delta_j(f)(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{j=-N}^N \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{\Delta_j(f)}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{j=-N}^N \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\xi)|^2 |\widehat{\Psi_{2^{-j}}}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{j=-N}^N \|\widehat{\Psi_{2^{-j}}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{j=-N}^N \|\widehat{\Psi_{2^{-j}}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \right)^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

现在在上式两端令 $N \rightarrow \infty$, 根据 Beppo Levi 非负渐升列收敛定理可得

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|\widehat{\Psi_{2^{-j}}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \right)^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

因此要证明 $p = 2$ 时的(5.13)式, 只需证明存在 $C_n < \infty$ 使得对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 \leq C_n B^2. \quad (5.18)$$

因为 Ψ 满足(5.12)式, 故 $\Psi \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 因此由 L^1 函数 Fourier 变换的可积性2.18知 Ψ 的 Fourier 反演公式成立. 另因 $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) dx = 0$, 故

$$\widehat{\Psi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi x \cdot \xi} \Psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} (e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) \Psi(x) dx, \quad (5.19)$$

注意到一方面

$$|(e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) \Psi(x)| \leq 2|\Psi(x)|,$$

另一方面由微分中值定理知

$$|(e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) \Psi(x)| \leq 2\pi |\xi| |x| |\Psi(x)|.$$

于是

$$|(e^{-i2\pi x \cdot \xi} - 1) \Psi(x)| \leq 4\sqrt{\pi |\xi|} |x|^{\frac{1}{2}} |\Psi(x)|.$$

因此

$$|\widehat{\Psi}(\xi)| \leq \sqrt{4\pi |\xi|} \int_{\mathbb{R}^n} |x|^{\frac{1}{2}} |\Psi(x)| dx \leq C_n B |\xi|^{\frac{1}{2}}, \quad (5.20)$$

现对每个 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \neq 0$, 设 j 满足 $|\xi_j| \geq |\xi_k| (\forall k \in \{1, \dots, n\})$. 在(5.14)右式关于 ∂_j 分部积分得

$$\begin{aligned} \widehat{\Psi}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \prod_{k \neq j} dx_k \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi x \cdot \xi} \Psi(x) dx_j \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} (-i2\pi \xi_j)^{-1} e^{-i2\pi x \cdot \xi} (\partial_j \Psi)(x) dx, \end{aligned}$$

于是根据 $\sqrt{n}|\xi_j| \geq |\xi|$ 知

$$|\widehat{\Psi}(\xi)| \leq \sqrt{n} |\xi|^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla \Psi(x)| dx \leq C_n B |\xi|^{-1}. \quad (5.21)$$

下面断言若 Ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 且存在 $\varepsilon, \varepsilon' > 0$ 使得 $|\widehat{\Psi}(\xi)| \leq B \min(|\xi|^\varepsilon, |\xi|^{-\varepsilon'})$, 则存在常数 $C_{\varepsilon, \varepsilon'} < \infty$ 使得

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} \left(\int_0^\infty |\widehat{\Psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{2}} + \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq C_{\varepsilon, \varepsilon'} B. \quad (5.22)$$

为此只需证明对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\int_0^\infty |\widehat{\Psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} \leq C_{\varepsilon, \varepsilon'} B^2, \quad (5.23)$$

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 \leq C_{\varepsilon, \varepsilon'} B^2 \quad (5.24)$$

即可. 对于(5.23)式知

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |\widehat{\Psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} &= \int_{t \leq \frac{1}{|\xi|}} |\widehat{\Psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} + \int_{t > \frac{1}{|\xi|}} |\widehat{\Psi}(t\xi)|^2 \frac{dt}{t} \\ &\leq \int_{t \leq \frac{1}{|\xi|}} B^2 |t\xi|^{2\varepsilon} \frac{dt}{t} + \int_{t > \frac{1}{|\xi|}} B^2 |t\xi|^{-2\varepsilon'} \frac{dt}{t} \\ &= B^2 \int_0^{\frac{1}{|\xi|}} |\xi|^{2\varepsilon} t^{2\varepsilon-1} dt + B^2 \int_{\frac{1}{|\xi|}}^\infty |\xi|^{-2\varepsilon'} t^{-2\varepsilon'-1} dt \\ &= C_{\varepsilon, \varepsilon'}^1 B^2, \end{aligned}$$

对于(5.24)式知

$$\begin{aligned} \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 &\leq \sum_{2^{-j}|\xi| \leq 2^{-\frac{j}{2}}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 + \sum_{2^{-j}|\xi| > 2^{-\frac{j}{2}}} |\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)|^2 \\ &\leq \sum_{2^{-j}|\xi| \leq 2^{-\frac{j}{2}}} B^2 |2^{-j}\xi|^{2\varepsilon} + \sum_{2^{-j}|\xi| > 2^{-\frac{j}{2}}} B^2 |2^{-j}\xi|^{-2\varepsilon'} \\ &\leq B^2 \left(\sum_{2^{-j}|\xi| \leq 2^{-\frac{j}{2}}} 2^{-j\varepsilon} + \sum_{2^{-j}|\xi| > 2^{-\frac{j}{2}}} 2^{j\varepsilon'} \right) \\ &= C_{\varepsilon, \varepsilon'}^2 B^2, \end{aligned}$$

取 $C_{\varepsilon, \varepsilon'} = (C_{\varepsilon, \varepsilon'}^1)^{\frac{1}{2}} + (C_{\varepsilon, \varepsilon'}^2)^{\frac{1}{2}}$ 即得(5.22)式.

回到原来的证明, 在(5.22)式中代入 $\varepsilon = \frac{1}{2}, \varepsilon' = 1$ 即得(5.18)式.

下面研究(5.13)式在 $p \neq 2$ 的情形. 从向量值不等式的视角出发, 将(5.13), (5.14)两式看成向量值不等式: 定义作用在 $\mathbb{R}^n$ 上函数的算子 T 为:

$$T(f)(x) = \{\Delta_j(f)(x)\}_{j \in \mathbb{Z}},$$

则(5.13), (5.14)两式分别为 T 在将 $L^p(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 映入 $L^p(\mathbb{R}^n, l^2)$ 时与将 $L^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 映入 $L^{1, \infty}(\mathbb{R}^n, l^2)$ 时的有界性. 刚刚我们证明的是 $p = 2$ 时对应的有界性, 因此 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.20的第一个条件已经满足了. 观察到算子 T 能写成

$$T(f)(x) = \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \Psi_{2^{-j}}(x-y) f(y) dy \right\}_{j \in \mathbb{Z}} = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{K}(x-y)(f(y)) dy,$$

其中对每个 $x \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{K}(x)$ 都是 $\mathbb{C} \rightarrow l^2$ 的有界线性算子:

$$\mathbf{K}(x)(a) = \{\Psi_{2^{-j}}(x)a\}_{j \in \mathbb{Z}}. \quad (5.25)$$

显见

$$\|\mathbf{K}(x)\|_{\mathbb{C} \rightarrow l^2} = \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Psi_{2^{-j}}(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

于是为了应用 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.20, 就需要验证存在 C_n 使得

$$\|\mathbf{K}(x)\|_{\mathbb{C} \rightarrow l^2} \leq C_n B |x|^{-n}, \quad (5.26)$$

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \mathbf{K}(y) dy = \left\{ \int_{|y| \leq 1} \Psi_{2^{-j}}(y) dy \right\}_{j \in \mathbb{Z}}, \quad (5.27)$$

$$\sup_{y \neq 0} \int_{|x| \geq 2|y|} \|\mathbf{K}(x-y) - \mathbf{K}(x)\|_{\mathbb{C} \rightarrow l^2} dx \leq C_n B. \quad (5.28)$$

对于(5.26)式, 对每个取定的 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 设 $j_x \in \mathbb{Z}$ 满足 $2^{-j_x} \leq |x| \leq 2^{-j_x+1}$, 则由(5.12)式知

$$\begin{aligned}
 \|K(x)\|_{\mathbb{C} \rightarrow l^2}^2 &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Psi_{2^{-j}}(x)|^2 \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \frac{2^{2jn} B^2}{(1 + 2^j |x|)^{2n+2}} \\
 &= \sum_{j \leq j_x} \frac{2^{2jn} B^2}{(1 + 2^j |x|)^{2n+2}} + \sum_{j > j_x} \frac{2^{2jn} B^2}{(1 + 2^j |x|)^{2n+2}} \\
 &\leq B^2 \sum_{j \leq j_x} 2^{2jn} + B^2 \sum_{j > j_x} \frac{2^{2jn}}{2^{(2n+2)j} |x|^{2n+2}} \\
 &\leq B^2 \frac{2^{-2j_x n}}{1 - 2^{-2n}} + \frac{4}{3} B^2 |x|^{-2n-2} 2^{-2j_x} \\
 &\leq B^2 \frac{2^{2n}}{2^{2n} - 1} |x|^{-2n} + \frac{4}{3} B^2 |x|^{-2n},
 \end{aligned}$$

取 $C_n = B^2(\frac{2^{2n}}{2^{2n}-1} + \frac{4}{3})$ 即可.

对于(5.27)式, 任取 $N > 0, a \in \mathbb{C}$, 设 $K_0^N(x)(a) = \{\Psi_{2^{-j}}(x)a\}_{|j| \leq N}$, 则

$$\begin{aligned}
 &\left\| \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} K(y)(a) dy - \int_{|y| \leq 1} K_0^N(y)(a) dy \right\|_{l^2} \\
 &\leq \left\| \int_{|y| < \varepsilon} \{\Psi_{2^{-j}}(y)a\}_{|j| \leq N} dy \right\|_{l^2} + \left\| \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \{\Psi_{2^{-j}}(y)a\}_{|j| > N} dy \right\|_{l^2} \\
 &\leq \int_{|y| < \varepsilon} \left(\sum_{|j| \leq N} |\Psi_{2^{-j}}(y)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} a dy + \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \left(\sum_{|j| > N} |\Psi_{2^{-j}}(y)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} a dy \\
 &\leq a \int_{|y| < \varepsilon} \sum_{|j| \leq N} |\Psi_{2^{-j}}(y)| dy + a \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \sum_{|j| > N} |\Psi_{2^{-j}}(y)| dy \\
 &\leq a \int_{|y| < \varepsilon} \sum_{|j| \leq N} \frac{2^{jn} B}{(1 + 2^j |y|)^{n+1}} dy + a \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \sum_{|j| > N} \frac{2^{jn} B}{(1 + 2^j |y|)^{n+1}} dy \\
 &\leq a \sum_{|j| \leq N} \int_{|y| < \varepsilon} \frac{2^{jn} B}{1 + 2^{j(n+1)} |y|^{n+1}} dy + a \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \sum_{|j| > N} \frac{2^{jn} B}{1 + 2^{j(n+1)} |y|^{n+1}} dy \\
 &\leq a \sum_{|j| \leq N} 2^{-j} \int_{|y| < \varepsilon} \frac{B}{2^{-j(n+1)} + |y|^{n+1}} dy + a \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} \sum_{|j| > N} \frac{2^{-j} B}{2^{-j(n+1)} + |y|^{n+1}} dy \\
 &\leq a \sum_{|j| \leq N} 2^{-j} \frac{B}{2^{-j(n+1)}} (2\varepsilon)^n + a \sum_{j < -N} 2^{-j} \frac{B}{2^{-j(n+1)}} + a \sum_{j > N} \frac{2^{-j} B}{|y|^{n+1}} \\
 &= aB \frac{2^n}{2^n - 1} (1 - 2^{-Nn}) \varepsilon^n + aB 2^{-Nn} \frac{2^n}{2^n - 1} + CaB 2^{1-N} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right),
 \end{aligned}$$

其中 C 是常数. 令 $2^{-N} \frac{1}{\varepsilon} < \varepsilon^n$ 可知

$$aB \frac{2^n}{2^n - 1} (1 - 2^{-Nn}) \varepsilon^n + aB 2^{-Nn} \frac{2^n}{2^n - 1} + CaB 2^{1-N} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \leq aB \left(\frac{\varepsilon^n}{2} + \varepsilon^{n(n+1)} + 2C\varepsilon^n + 2C\varepsilon^{n+1} \right).$$

因此对每个固定的 $N > 0$ 与任意 $a \in \mathbb{C}$ 均有

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left\| \int_{\varepsilon \leq |y| \leq 1} K(y)(a) dy \right\|_{l^2} = \left\| \int_{|y| \leq 1} K^N(y)(a) dy \right\|_{l^2}.$$

又因为上右式随着 N 的增加而单调增, 故在上式中令 $N \rightarrow \infty$, 由 Lebesgue 单调收敛定理即得欲证.

对于(5.28)式, 因为 Ψ 是 C^1 函数, 故在 $|x| \geq 2|y|$ 时有

$$\begin{aligned}
 |\Psi_{2^{-j}}(x-y) - \Psi_{2^{-j}}(x)| &\leq 2^{j(n+1)} |\nabla \Psi(2^j(x-\theta y))| |y| \\
 &\leq B 2^{j(n+1)} (1 + 2^j |x - \theta y|)^{-(n+1)} |y| \\
 &\stackrel{(A)}{\leq} B 2^{jn} (1 + 2^{j-1} |x|)^{-(n+1)} 2^j |y|,
 \end{aligned} \tag{5.29}$$

其中 $\theta \in [0, 1]$, (A) 是因为 $|x - \theta y| \geq \frac{1}{2}|x|$. 另有

$$\begin{aligned} |\Psi_{2^{-j}}(x - y) - \Psi_{2^{-j}}(x)| &\leq 2^{jn} |\Psi(2^j(x - y))| + 2^{jn} |\Psi(2^j x)| \\ &\leq B 2^{jn} (1 + 2^j |x - y|)^{-(n+1)} + B 2^{jn} (1 + 2^j |x|)^{-(n+1)} \\ &\leq B 2^{jn} (1 + 2^{j-1} |x|)^{-(n+1)} + B 2^{jn} (1 + 2^j |x|)^{-(n+1)} \\ &\leq 2B 2^{jn} (1 + 2^{j-1} |x|)^{-(n+1)}. \end{aligned} \quad (5.30)$$

对(5.29),(5.30)式取几何平均知对任意 $\gamma \in [0, 1]$ 均有

$$|\Psi_{2^{-j}}(x - y) - \Psi_{2^{-j}}(x)| \leq 2^{1-\gamma} B 2^{jn} (2^j |y|)^\gamma (1 + 2^{j-1} |x|)^{-(n+1)}. \quad (5.31)$$

于是当 $|x| \geq 2|y|$ 时有

$$\begin{aligned} \|K(x - y) - K(y)\|_{C \rightarrow l^2} &= \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Psi_{2^{-j}}(x - y) - \Psi_{2^{-j}}(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Psi_{2^{-j}}(x - y) - \Psi_{2^{-j}}(x)| \\ &= \sum_{2^j < \frac{2}{|x|}} |\Psi_{2^{-j}}(x - y) - \Psi_{2^{-j}}(x)| + \sum_{2^j \geq \frac{2}{|x|}} |\Psi_{2^{-j}}(x - y) - \Psi_{2^{-j}}(x)| \\ &\leq \sum_{2^j < \frac{2}{|x|}} 2B 2^{jn} 2^j |y| (1 + 2^{j-1} |x|)^{-(n+1)} + \sum_{2^j \geq \frac{2}{|x|}} 2^{\frac{1}{2}} B 2^{jn} 2^{\frac{j}{2}} |y|^{\frac{1}{2}} (1 + 2^{j-1} |x|)^{-(n+1)} \\ &\leq 2B |y| \sum_{2^j < \frac{2}{|x|}} 2^{j(n+1)} + 2^{\frac{1}{2}} B |y|^{\frac{1}{2}} |x|^{-(n+1)} \sum_{2^j \geq \frac{2}{|x|}} 2^{jn + \frac{j}{2} - (n+1)(j-1)} \\ &\leq 2B |y| \frac{2^{n+1}}{2^{n+1} - 1} \frac{2}{|x|^{n+1}} + B |y|^{\frac{1}{2}} |x|^{-n-\frac{1}{2}} 2^{n+1} \frac{2^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} - 1} \\ &\leq C_n B (|y| |x|^{-n-1} + |y|^{\frac{1}{2}} |x|^{-n-\frac{1}{2}}). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{|x| \geq 2|y|} \|K(x - y) - K(x)\|_{C \rightarrow l^2} dx &\leq C_n B \left(|y| \int_{|x| \geq 2|y|} \frac{dx}{|x|^{n+1}} + |y|^{\frac{1}{2}} \int_{|x| \geq 2|y|} \frac{dx}{|x|^{n+\frac{1}{2}}} \right) \\ &\leq C'_n B (|y| \cdot \frac{1}{2|y|} + |y|^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2^{\frac{3}{2}} |y|^{\frac{1}{2}}}) \leq C''_n B. \end{aligned}$$

因此(5.28)式成立. 进而根据 Banach 值奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.20即得(5.13),(5.14)两式.

下面证明反向不等式. 设 Ψ 满足(5.15)式, 根据条件知存在 $1 < p < \infty$ 使得对 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 有 $(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2)^{\frac{1}{2}} \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 设 Δ_j^* 是 Δ_j 的伴随算子, 其定义为 $\widehat{\Delta_j^* f} = \widehat{f \Psi_{2^{-j}}}$. 对 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 下面说明级数 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j(f)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 根据 Cauchy 准则, 只需说明部分和序列 $u_N = \sum_{|j| < N} \Delta_j^* \Delta_j(f)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 也就是说, 如果我们把 u_N 作用到 Schwartz 函数 g 上, 产生的数值列应该是基本列. 现由对偶性, Cauchy-Schwartz 不等式与 Hölder 不等式可知 $M > N$ 时有:

$$\begin{aligned} |\langle u_N, g \rangle - \langle u_M, g \rangle| &= \left| \left\langle \sum_{N \leq |j| < M} \Delta_j^* \Delta_j(f), g \right\rangle \right| = \left| \sum_{N \leq |j| < M} \langle \Delta_j(f), \Delta_j(g) \rangle \right| \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{N \leq |j| < M} \Delta_j(f)(x) \Delta_j(g)(x) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j(f)(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j(g)(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \right| \\ &\leq \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \end{aligned}$$

$$\leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}.$$

其中 (B) 是因为 $\Delta_j(f)$ 此时是函数, 故 $\Delta_j(f)$ 在 $\Delta_j(g)$ 上的作用能写成 L^2 内积的形式. 因为 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$ 可被 $\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$ 控制, 因此若取 $M > N \geq N_0(g)$, 则根据 Cauchy 准则知 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$ 可充分小. 又因为根据条件有 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty$, 因此 $\langle u_N, g \rangle$ 确实是关于 N 的收敛数列, 于是可设它收敛到 $\Lambda(g)$. 现只需证明映射 $g \mapsto \Lambda(g)$ 是缓增分布即可. 显见 $\Lambda(g)$ 是线性泛函, 且由已证明的 (5.13) 式知

$$\begin{aligned} |\Lambda(g)| &\leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C_{p'} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

又因为 $\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}$ 能被 g 的 Schwartz 半范有限和控制, 故 Λ 确为缓增分布. 缓增分布 Λ 正是缓增分布级数 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j$ 的收敛分布.

现在在 (5.15) 式的假设下, 缓增分布 $f - \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j(f)$ 的 Fourier 变换支在原点, 这是因为任取 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 只要 $0 \notin \text{supp } g$, 就有

$$\begin{aligned} \left\langle \left(f - \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j(f) \right)^\wedge, g \right\rangle &= \left\langle \widehat{f} - \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\Delta_j^* \Delta_j(f))^\wedge, g \right\rangle = \langle \widehat{f}, g \rangle - \left\langle \sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Delta_j f} \widehat{\Psi_{2^{-j}}}, g \right\rangle \\ &= \langle \widehat{f}, g \rangle - \left\langle \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi_{2^{-j}}}|^2 \widehat{f}, g \right\rangle = \langle \widehat{f}, g \rangle - \left\langle \widehat{f}, \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Psi_{2^{-j}}}|^2 g \right\rangle = 0. \end{aligned}$$

因此 $\text{supp}(f - \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j(f)) \subset \{0\}$. 根据频率支在原点的缓增分布刻画 2.6 知存在多项式 Q 使得 $f - Q = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j(f)$. 现设 g 是 Schwartz 函数, 有

$$\begin{aligned} |(f - Q, \bar{g})| &= \left| \left\langle \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^* \Delta_j(f), \bar{g} \right\rangle \right| = \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}} \langle \Delta_j^* \Delta_j(f), \bar{g} \rangle \right| \\ &= \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}} \langle \Delta_j(f), \overline{\Delta_j(g)} \rangle \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j(f) \overline{\Delta_j(g)} dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \\ &\leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(C)}{\leq} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} C_n B \max(p', (p' - 1)^{-1}) \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned} \tag{5.32}$$

其中 (C) 是已证明的 (5.13) 式. 在上式两端对 $\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1$ 取上确界可知缓增分布 $f - Q$ 是 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函. 根据 Riesz 表示定理, $f - Q$ 与某个 L^p 函数重合, 且它满足估计

$$\|f - Q\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n B \max(p, (p - 1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

下面说明 Q 的唯一性. 若 Q_1 作为多项式同样满足 $f - Q_1 \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $Q - Q_1$ 必是 L^p 函数, 但多项式中唯一能成为 L^p 函数的只有零多项式, 故 $Q = Q_1$ 点态成立, 这便在 (5.15) 式的条件下证明了 (5.17) 式.

Ψ 满足 (5.16) 式情况的证明这里先按下不表⁴. □

注 现在对 Littlewood-Paley 定理 5.2 作一些观察. 如果 $\widehat{\Psi}$ 是实值函数, 则 Δ_j 是自伴算子. 这是因为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Delta_j(f) \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f \Psi_{2^{-j}}} \widehat{g} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f \Psi_{2^{-j}}} \widehat{g} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f \overline{\Delta_j(g)} dx.$$

⁴[LG1] 中提到和后面的推论证明类似, 但应该还是有些本质上的区别: Ψ 紧不紧支的问题. 如何证明这里的结论?

另外, 如果 Ψ 是径向函数, 则 Δ_j 是自转置算子, 即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Delta_j(f)g dx = \int_{\mathbb{R}^n} f \Delta_j(g) dx.$$

这是因为

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \Delta_j(f)g dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) \Psi_{2^{-j}}(x-y) dy \right) g(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \Psi_{2^{-j}}(y-x) g(x) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f \Delta_j(g) dx. \end{aligned}$$

现设 Ψ 要么是径向函数, 要么具有实值 Fourier 变换. 另设 Ψ 满足(5.12)式, 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) dx = 0$, 则不等式

$$\left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j(f_j) \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n B \max(p, (p-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (5.33)$$

对函数列 $\{f_j\}_j$ 成立. 这是因为设

$$T(f) = \{\Delta_j(f)\}_j$$

则在 Ψ 是径向函数时, 任取 $\{g_j\}_j$, 根据自转置性有

$$\langle T(f), \{g_j\}_j \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j \in \mathbb{Z}} f \Delta_j(g_j) dx \Rightarrow T^*(\{g_j\}_j) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j(g_j),$$

而在 Ψ 具有实值 Fourier 变换时, 根据自伴性有

$$\langle T(f), \{g_j\}_j \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j \in \mathbb{Z}} f \overline{\Delta_j(g_j)} dx \Rightarrow T^*(\{g_j\}_j) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j(g_j),$$

现由不等式(5.13)知算子 T 将 $L^p(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 映入 $L^p(\mathbb{R}^n, l^2)$, 进而根据对偶性可知 T^* 将 $L^{p'}(\mathbb{R}^n, l^2)$ 映入 $L^{p'}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$. 如果把 p 换成 p' , 这就正是(5.33)式. 又因为 p 可以取 $(1, \infty)$ 中的任意数, 进而(5.33)式得证.

5.1.1 向量版本的阐述

下面给出 Littlewood-Paley 定理5.2的向量值拓展. 此即下述命题:

命题 5.1 (Littlewood-Paley 定理的向量值版本)

设 Ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积 C^1 函数, $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) dx = 0$, 且 Ψ 满足(5.12)式. 设 Δ_j 是 Ψ 所诱导的 Littlewood-Paley 算子, 则存在常数 $C_n < \infty$ 使得对任意 $1 < p, r < \infty$ 与任意 L^p 函数列 $\{f_j\}_j$ 均有

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\Delta_k(f_j)|^2 \right)^{\frac{r}{2}} \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n B \widetilde{C}_{p,r} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $\widetilde{C}_{p,r} = \max(p, (p-1)^{-1}) \max(r, (r-1)^{-1})$. 另外, 存在 $C'_n > 0$ 使得对任意 L^1 函数列 $\{f_j\}_j$ 均有

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\Delta_k(f_j)|^2 \right)^{\frac{r}{2}} \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C'_n B \max(r, (r-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

特别有

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n B \widetilde{C}_{p,r} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.34)$$

证明 记 $B_1 = \mathbb{C}, B_2 = l^2$, 对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 定义算子

$$T(f) = \{\Delta_k(f)\}_{k \in \mathbb{Z}}.$$

在 Littlewood-Paley 定理5.2的证明中我们已经说明了 T 具有满足条件(5.26)-(5.28)的核 K , 另由 Littlewood-Paley 定理的结论(5.13)可知必存在 $r \in (1, \infty)$ 使得 T 将 $L^r(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n, l^2)$. 现由 Banach 值奇异积分算子 L^p

有界性延拓定理的向量值版本4.13可得命题的前两个结论. 又因为显见

$$|\Delta_j(f_j)| \leq \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\Delta_k(f_j)|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

进而(5.34)式成立.

5.1.2 平方函数二进和的 L^p 估计

现在选定 Schwartz 函数 Ψ , 其 Fourier 变换在环 $2^{-1} \leq |\xi| \leq 2^2$ 上紧支, 且 Ψ 满足(5.15)式. (显见如果 $\widehat{\Psi}$ 只支在环 $1 \leq |\xi| \leq 2$ 上, (5.15)式是不可能成立的. 这就是为什么支集环的两端点必须在 1 两端.) Littlewood-Paley 算子 $f \mapsto \Delta_j(f)$ 表示的是函数 f 在二进环 $|\xi| \approx 2^j$ 附近的光滑截断频率局部化. Littlewood-Paley 定理5.2表明这些局部化构成的平方函数与原来函数的 L^p 范数是可比较的. 也就是说, 这个平方函数刻画了原来函数的 L^p 范数. 这就是 Littlewood-Paley 理论的主要特点.

有人可能会问: 如果 Littlewood-Paley 算子 Δ_j 被换成非光滑版本

$$f \mapsto (\chi_{2^j \leq |\xi| < 2^{j+1}} \widehat{f}(\xi))^{\vee}(x), \quad (5.35)$$

此时 Littlewood-Paley 定理5.2是否依旧成立? 这一问题有个令人震惊的答案, 该答案表明一维 Fourier 分析与高维 Fourier 分析可能存在某些本质性的不同. (5.35)式中的算子构成的平方函数可以用与 Δ_j 相同的方法来刻画 $L^p(\mathbb{R})$, 但并不能用统一方法来刻画 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($n > 1, p \neq 2$). 这其中的关键点在于除非 $p = 2$, 否则单位圆盘的示性函数在 $n \geq 2$ 时不是 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^p 乘子. 下面介绍前面提到的一维结果.

对于 $j \in \mathbb{Z}$, 定义一维算子

$$\Delta_j^{\#}(f)(x) = (\widehat{f} \chi_{I_j})^{\vee}(x), \quad (5.36)$$

其中

$$I_j = [2^j, 2^{j+1}) \cup (-2^{j+1}, -2^j],$$

可见 $\Delta_j^{\#}$ 是算子 Δ_j 中把函数 $\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$ 替换为集合 $2^j \leq |\xi| < 2^{j+1}$ 的示性函数而得到的.

定理 5.3 (一维情况下 $\Delta_j^{\#}$ 诱导平方函数的 L^p 估计)

存在常数 C_1 使得对任意 $1 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\frac{\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}}{C_1(p + (p-1)^{-1})^2} \leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^{\#}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_1(p + (p-1)^{-1})^2 \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}. \quad (5.37)$$



证明 取 $\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 函数 ψ , 令 $\text{supp } \widehat{\psi} \subset \{2^{-1} \leq |\xi| \leq 2^2\}$, 且在集合 $\{1 \leq |\xi| \leq 2\}$ 上 $\widehat{\psi} \equiv 1$. 记 Δ_j 是 ψ 诱导的 Littlewood-Paley 算子. 显见 $\text{supp } \widehat{\psi_{2^{-j}} \psi} \subset \{2^{j-1} \leq |\xi| \leq 2^{j+2}\}$, 且在 $\{2^j \leq |\xi| \leq 2^{j+1}\} = I_j$ 上 $\widehat{\psi_{2^{-j}} \psi} \equiv 1$. 观察到 $\Delta_j \Delta_j^{\#} = \Delta_j^{\#} \Delta_j = \Delta_j^{\#}$, 这是因为

$$\begin{aligned} \Delta_j \Delta_j^{\#}(f) &= (\widehat{\psi_{2^{-j}} \Delta_j^{\#}(f)})^{\vee} = (\widehat{\psi_{2^{-j}} \chi_{I_j} f})^{\vee} = (\chi_{I_j} \widehat{f})^{\vee} = \Delta_j^{\#}(f) \\ &= (\chi_{I_j} \widehat{\psi_{2^{-j}} f})^{\vee} = (\chi_{I_j} \widehat{\Delta_j(f)})^{\vee} = \Delta_j^{\#} \Delta_j(f). \end{aligned}$$

为继续证明, 下面需要证明一个引理:

引理 5.1

对任意 $j \in \mathbb{Z}$, 设 I_j 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $T_j : f \mapsto (\chi_{I_j} \widehat{f})^{\vee}$, 则存在常数 $C > 0$ 使得对任意 $1 < p, r < \infty$ 与 $\mathbb{R}$ 上

的任意平方可积函数 f 均有

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} &\leq C \max(r, (r-1)^{-1}) \max(p, (p-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}, \\ \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R})} &\leq C \max(r, (r-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$



首先说明若 $I_j = (a, b)$, 则

$$T_j = \frac{i}{2}(M^a H M^{-a} - M^b H M^{-b}),$$

其中 $M^a(f)(x) = f(x)e^{i2\pi ax}$, H 是 Hilbert 变换. 这是因为

$$\begin{aligned} \frac{i}{2} M^a H M^{-a}(f) &= \frac{i}{2} M^a(H(fe^{-i2\pi a(\cdot)})) = \frac{i}{2} M^a(((fe^{-i2\pi a(\cdot)})^\wedge(\xi)(-i \operatorname{sgn} \xi))^\vee) \\ &= \frac{1}{2} M_a((\widehat{f}(\cdot + a)(\operatorname{sgn}(\cdot)))^\vee) = \frac{1}{2}(\widehat{f}(\cdot + a)(\operatorname{sgn}(\cdot)))^\vee(x)e^{i2\pi ax} \\ &= \frac{1}{2}(\widehat{f} \operatorname{sgn}(\cdot - a))^\vee(x). \end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{i}{2} M^b H M^{-b}(f) = \frac{1}{2}(\widehat{f} \operatorname{sgn}(\cdot - b))^\vee(x).$$

因此

$$\left(\frac{i}{2} M^a H M^{-a} - \frac{i}{2} M^b H M^{-b} \right)(f) = \frac{1}{2}(\widehat{f}(\operatorname{sgn}(\cdot - a) - \operatorname{sgn}(\cdot - b)))^\vee = (\widehat{f} \chi_{I_j})^\vee = T_j(f)$$

对区间 $I_j = (a_j, b_j)$ 成立. 设 $T_j^1 : f \mapsto \frac{i}{2} M^{a_j} H M^{-a_j}(f)$, $T_j^2 : f \mapsto -\frac{i}{2} M^{b_j} H M^{-b_j}(f)$, 则只需对 $k = 1, 2$ 证明

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j^k(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} &\leq C \max(r, (r-1)^{-1}) \max(p, (p-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}, \\ \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j^k(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^{1,\infty}(\mathbb{R})} &\leq C \max(r, (r-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^1(\mathbb{R})} \end{aligned}$$

即可. 下面着重说明 $k = 1$ 的情况, 记 $g_j(x) = e^{-i2\pi a_j x} f_j(x)$, 显见 $|g_j(x)| = |f_j(x)|$, 且

$$|T_j^1(g_j)| = \left| \frac{i}{2} M^{a_j} H(g_j) \right| = \frac{1}{2} |H(g_j)|,$$

因此

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j^1(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} = \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |H(g_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

现由推论 4.11 即得结论, $k = 2$ 的情况类似可证, 至此引理得证.

回到原来的证明, 根据引理 5.1 可知

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} &= \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\# \Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \\ &\leq C \max(p, (p-1)^{-1}) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C B \max(p, (p-1)^{-1})^2 \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 Littlewood-Paley 定理的结论 (5.13).

对于反向不等式, 下面的证明类似于 Littlewood-Paley 中反向不等式 (5.17) 的证明. 显见对任意 $j \in \mathbb{Z}$ 均有

$\chi_{I_j}(0) = 0$. 又因为 $I_j \cap I_{j+1} = \emptyset$, 故对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 均有

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\chi_{I_j}(x)|^2 = 1.$$

因为 χ_{I_j} 本身是轴对称的实值函数, 故 $\Delta_j^\#$ 同时是自伴算子与自转置算子. 任取 $f \in L^p(\mathbb{R})$, 下面说明 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中收敛, 这便只需说明 $u_N = \sum_{|j| < N} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中收敛. 现任取 $g \in L^{p'}(\mathbb{R})$ 知 $M > N$ 时有:

$$\begin{aligned} |\langle u_N, g \rangle - \langle u_M, g \rangle| &= \left| \sum_{N \leq |j| < M} \langle \Delta_j^\#(f), \Delta_j^\#(g) \rangle \right| \leq \left| \int_{\mathbb{R}} \sum_{N \leq |j| < M} \Delta_j^\#(f) \Delta_j^\#(g) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \right| \\ &\leq \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \\ &\leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

根据前面已证明的结论知 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^p(\mathbb{R})}$ 被 $\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$ 控制, 又因为 $f \in L^p(\mathbb{R})$, 故 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^p(\mathbb{R})} < \infty$. 同样根据已知结论知 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(g)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^{p'}(\mathbb{R})}$ 被 $\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})}$ 控制, 故可以通过增大 M, N 使得 $\|(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(g)|^2)^{\frac{1}{2}}\|_{L^{p'}(\mathbb{R})}$ 任意小. 这说明 $\langle u_N, g \rangle$ 确为关于 N 的收敛列, 设其收敛到 $\Lambda(g)$, 进一步可以说明 Λ 是 $L^{p'}(\mathbb{R})$ 上的线性泛函, 因此 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 确为 L^p 函数.

通过与 Littlewood-Paley 定理的(5.17)式证明中完全相同的步骤, 可以说明 $f - \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 的 Fourier 变换支在原点, 因此存在唯一多项式 Q 使得 $f - Q$ 作为缓增分布与某个 L^p 函数重合. 又因为 f 本身就是 L^p 函数, 故 $Q \equiv 0$. 最后知

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} |\langle f, \bar{g} \rangle| = \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \left\langle \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f), \bar{g} \right\rangle \right| \\ &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\#(f) \Delta_j^\#(\bar{g}) dx \right| \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \\ &\leq \sup_{\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \leq 1} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} C_1(p' + \frac{1}{p' - 1})^2 \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \\ &\leq C_1(p + (p - 1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

反向不等式至此得证. $\square$

下面介绍一维情况下 $\Delta_j^\#$ 诱导平方函数 L^p 估计5.3的高维版本, 其中需要将二进区间换成二进矩体. 前文已经表明, 如果把二进区间换成二进环 (而非矩体), 实际上不能得到类似的结果.

现在先约定一些符号. 对 $j \in \mathbb{Z}$, 用 I_j 表示定理5.3中提到的二进区间 $[2^j, 2^{j+1}) \cup (-2^{j+1}, -2^j]$. 对 $j_1, \dots, j_n \in \mathbb{Z}$, 记 $\mathbb{R}^n$ 中的二进矩体为

$$R_{j_1, \dots, j_n} = I_{j_1} \times \dots \times I_{j_n}.$$

严格来说, $R_{j_1, \dots, j_n}$ 本身不是矩体, 而是 2^n 个矩体的并, 但是方便起见我们还是称它为矩体. 另外为了符号的便利性, 记

$$R_j = R_{j_1, \dots, j_n}, \quad j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{Z}^n.$$

观察到如果 $\mathbf{j}, \mathbf{j}' \in \mathbb{Z}^n$ 不同, 则矩体 $R_{\mathbf{j}}, R_{\mathbf{j}'}$ 的内部是不交的, 同时全体 $R_{\mathbf{j}}$ 的并正是 $\mathbb{R}^n \setminus (\bigcup_{k=1}^n \{x_k = 0\})$. 也就是说, 集族 $\{R_{\mathbf{j}}\}_{\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^n}$ 可以铺满 $\mathbb{R}^n$, 该集族称为 $\mathbb{R}^n$ 的二进分解. 约定

$$\Delta_{\mathbf{j}}^{\#}(f)(x) = (\widehat{f}\chi_{R_{\mathbf{j}}})^{\vee}(x), \quad (5.38)$$

利用这些符号, 可以得到定理5.3的高维版本:

定理 5.4 (高维情况下 $\Delta_{\mathbf{j}}^{\#}$ 诱导平方函数的 L^p 估计)

对 $\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 函数 ψ , 设其满足 $\int_{\mathbb{R}} \psi(x)dx = 0$, 定义算子

$$\Delta_{\mathbf{j}}(f)(x) = (\widehat{\psi}(2^{-j_1}\xi_1) \cdots \widehat{\psi}(2^{-j_n}\xi_n) \widehat{f}(\xi))^{\vee}(x), \quad (5.39)$$

其中 $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{Z}^n$, 则存在只关于维数的常数 C_n 使得

$$\left\| \left(\sum_{\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_{\mathbf{j}}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n (p + (p-1)^{-1})^n \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.40)$$

另设 $\Delta_{\mathbf{j}}^{\#}$ 是依(5.38)式定义的算子, 则存在正常数 C_n 使得对任意 $1 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\frac{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{C_n (p + (p-1)^{-1})^{2n}} \leq \left\| \left(\sum_{\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_{\mathbf{j}}^{\#}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n (p + (p-1)^{-1})^{2n} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.41)$$

证明 先证明(5.40)式. 由 $\Delta_{\mathbf{j}}(f)$ 的定义可知若 $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{Z}^n$, 则

$$\Delta_{\mathbf{j}}(f) = \Delta_{j_1}^{(1)} \cdots \Delta_{j_n}^{(n)}(f),$$

其中 $\Delta_{j_r}^{(r)}$ 是一维算子: $f \mapsto (\widehat{f}\widehat{\psi}(2^{-j_r}\xi_r))^{\vee}$, 其中 $\widehat{f}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 关于 x_r 的 Fourier 变换. 现在可以说明确(5.40)式就是一维情形的推论, 例如当 $n = 2$ 时, 由 Littlewood-Paley 定理的向量值版本5.1知

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_{\mathbf{j}}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}^p &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\Delta_{j_1}^{(1)} \Delta_{j_2}^{(2)}(f)(x_1, x_2)|^2 \right)^{\frac{p}{2}} dx_1 \right] dx_2 \\ &\leq C^p \max(p, (p-1)^{-1})^p \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\Delta_{j_2}^{(2)}(f)(x_1, x_2)|^2 \right)^{\frac{p}{2}} dx_1 \right] dx_2 \\ &= C^p \max(p, (p-1)^{-1})^p \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\Delta_{j_2}^{(2)}(f)(x_1, x_2)|^2 \right)^{\frac{p}{2}} dx_2 \right] dx_1 \\ &\leq C^{2p} \max(p, (p-1)^{-1})^{2p} \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} |f(x_1, x_2)|^p dx_2 \right] dx_1 \\ &= C^{2p} \max(p, (p-1)^{-1})^{2p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}^p. \end{aligned}$$

$n > 2$ 的情形归纳即得.

下面证明(5.41)右式. 取 Schwartz 函数 ψ 满足 $\text{supp } \widehat{\psi} \subset [-4, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 4]$, 且在 $[-2, -1] \cup [1, 2]$ 上 $\widehat{\psi} \equiv 1$, 则容易验证 $\widehat{\psi}(2^{-j_1}\xi_1) \cdots \widehat{\psi}(2^{-j_n}\xi_n)$ 在矩体 $R_{\mathbf{j}}$ 上恒为 1, 故

$$\Delta_{\mathbf{j}}^{\#} = \Delta_{\mathbf{j}}^{\#} \Delta_{\mathbf{j}}.$$

类似于一维情况为了给出平方函数上界估计而证明的引理5.1, 这里我们也需要先证明下述引理:

引理 5.2

设 $R_{\mathbf{j}}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上各边平行于坐标轴的矩体, $S : f \mapsto (\widehat{f}\chi_{R_{\mathbf{j}}})^{\vee}$, $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_n)$, 则存在只关于维数的常数 $C_n < \infty$ 使得对任意 $1 < p, r < \infty$ 与 $\mathbb{R}^n$ 上的任意平方可积函数 $f_{\mathbf{j}}$ 均有

$$\left\| \left(\sum_{\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^n} |S_{\mathbf{j}}(f_{\mathbf{j}})|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \max(r, (r-1)^{-1})^n \max(p, (p-1)^{-1})^n \left\| \left(\sum_{\mathbf{j} \in \mathbb{Z}^n} |f_{\mathbf{j}}|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

容易证明若 $f_j \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则对每个分量而言 f_j 同样是 L^2 函数. 现设 $n = 2, R_j = I_{j_1} \times I_{j_2}$, 方便起见, 记

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{x_k}[f](\xi_k) &= \int_{\mathbb{R}} f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) e^{i2\pi x_k \xi_k} dx_k, \\ \mathcal{F}_{x_k}^{-1}[f](x_k) &= \int_{\mathbb{R}} f(\xi_1, \dots, \xi_k, \dots, \xi_n) e^{i2\pi \xi_k x_k} d\xi_k,\end{aligned}$$

则知

$$\begin{aligned}\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |S_j(f_j)|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\widehat{f_{(j_1, j_2)}}(\xi_1, \xi_2) \chi_{I_{j_1}}(\xi_1) \chi_{I_{j_2}}(\xi_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_1 \right] dx_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\mathcal{F}_{x_1}^{-1}[\mathcal{F}_{x_2}^{-1}[\mathcal{F}_{x_1}[\mathcal{F}_{x_2}[f_{(j_1, j_2)}]] \chi_{I_{j_2}} \chi_{I_{j_1}}]](x_1, x_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_1 \right] dx_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\mathcal{F}_{x_1}^{-1}[\mathcal{F}_{x_2}^{-1}[\mathcal{F}_{x_1}[\mathcal{F}_{x_2}[f_{(j_1, j_2)}]] \chi_{I_{j_2}}] \chi_{I_{j_1}}](x_1, x_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_1 \right] dx_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\mathcal{F}_{x_1}^{-1}[\mathcal{F}_{x_1}[\mathcal{F}_{x_2}^{-1}[\mathcal{F}_{x_2}[f_{(j_1, j_2)}]] \chi_{I_{j_2}}]] \chi_{I_{j_1}}](x_1, x_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_1 \right] dx_2 \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \int_{\mathbb{R}} \left[C_{p,r} \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} |\mathcal{F}_{x_2}^{-1}[\mathcal{F}_{x_2}[f_{(j_1, j_2)}]] \chi_{I_{j_2}}](x_1, x_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_1 \right] dx_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left[C_{p,r} \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} |\mathcal{F}_{x_2}^{-1}[\mathcal{F}_{x_2}[f_{(j_1, j_2)}]] \chi_{I_{j_2}}](x_1, x_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_2 \right] dx_1 \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \int_{\mathbb{R}} \left[C_{p,r}^2 \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} |f_{(j_1, j_2)}(x_1, x_2)|^r \right)^{\frac{p}{r}} dx_2 \right] dx_1 = C_{p,r}^2 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |f_j|^r \right)^{\frac{1}{r}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}^p,\end{aligned}$$

其中 (A), (B) 是引理 5.1, $C_{p,r} = C \max(r(r-1)^{-1}) \max(p, (p-1)^{-1})$. $n > 2$ 的情形归纳即得. 引理至此得证.

回到原来的证明, 由引理 5.2 与 (5.40) 式可知

$$\begin{aligned}\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j^\# \Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C \max(p, (p-1)^{-1})^n \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq CB \max(p, (p-1)^{-1})^{2n} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

这便是 (5.41) 右式.

在 $1 < p < \infty$ 时, (5.41) 左式的证明类似于 Littlewood-Paley 定理中结论 (5.17) 的证明. 任取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\text{supp } \hat{f} \cap (\bigcup_{1 \leq k \leq n} \{x_k = 0\}) = \emptyset$, 下面说明 $\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 若记 $|j| = |j_1| + \dots + |j_n|$, 这便只需说明 $u_N = \sum_{|j| < N} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 任取 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 知 $M > N$ 时

$$\begin{aligned}|\langle u_N, g \rangle - \langle u_M, g \rangle| &= \left| \sum_{N \leq |j| \leq M} \langle \Delta_j^\#(f), \Delta_j^\#(g) \rangle \right| \leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{N \leq |j| \leq M} \Delta_j^\#(f) \Delta_j^\#(g) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \right| \\ &\leq \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j^\#(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{N \leq |j| < M} |\Delta_j^\#(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

最后得到的式子随着 M, N 的增大可以任意小, 进而 $\langle u_N, g \rangle$ 是关于 N 的收敛列, 设其极限为 $\Lambda(g)$, 进而可以说明 Λ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函, 因此 $\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \Delta_j^\# \Delta_j^\#(f)$ 确实是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的函数. 通过与 (5.32) 式相同的步骤与 f 是

Schwartz 函数即得 Schwartz 函数情况下的(5.41)左式.

现在对于一般的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 根据稠密性可知 f 可由频率紧支在坐标平面 $\{x_k = 0\} (k = 1, \dots, n)$ 外的 Schwartz 函数列在 L^p 意义下逼近, 进而在 Schwartz 函数情况下的(5.41)左式两端对逼近序列取极限即得 L^p 情况下的(5.41)左式, 其中平方函数 L^p 范数收敛性需要用到前面已经证明的(5.41)右式. 至此定理即证. $\square$

观察到只要 Schwartz 函数 ψ 选的足够好, 则(5.40)式的反向不等式也成立. 准确来说, 设 $\widehat{\psi}(\xi)$ 是 $\mathbb{R}$ 中支在集合 $\frac{9}{10} \leq |\xi| \leq \frac{21}{10}$ 上的光滑实值偶函数, 且其满足

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\psi}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \quad (5.42)$$

就有:

推论 5.1 (Δ_j 诱导平方函数的下界估计)

设 ψ 满足(5.42)式, Δ_j 依(5.39)式定义, f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^p 函数, 满足 $(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2)^{\frac{1}{2}} \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 则存在只关于维数和 ψ 的常数 C_n 使得平方函数下界估计

$$\frac{\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{C_n(p + (p-1)^{-1})^n} \leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (5.43)$$

成立.



证明 如果已知的是 $\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\widehat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2 = 1$ 而非(5.42)式, 就可以仿照 Littlewood-Paley 定理中下界估计(5.17)的方法进行证明. 在已知(5.42)式的情况下, 我们给出另一种证明方法.

首先对 Schwartz 函数 f 证明(5.43)式, 知

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \Delta_j(f) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} (\Delta_j(f))^\wedge \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \widehat{\psi}(2^{-j_1}\xi_1) \cdots \widehat{\psi}(2^{-j_n}\xi_n) \widehat{f}(\xi) \right)^2 d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j_n \in \mathbb{Z}} \cdots \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \widehat{\psi}(2^{-j_1}\xi_1) \cdots \widehat{\psi}(2^{-j_n}\xi_n) \right)^2 \widehat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi)^2 d\xi = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2, \end{aligned}$$

因此级数 $\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \Delta_j(f)$ 在 L^2 意义下收敛到 f , 进而它也在 $\mathcal{S}'$ 意义下收敛到 f . 现取 g 同样是 Schwartz 函数, 用内积 $\langle f, \bar{g} \rangle$ 表示分布 $\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \Delta_j(f)$ 在测试函数 $\bar{g}$ 上的作用:

$$\begin{aligned} |\langle f, \bar{g} \rangle| &= \left| \left\langle \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \Delta_j(f), \bar{g} \right\rangle \right| = \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \langle \Delta_j(f), \bar{g} \rangle \right| \\ &\stackrel{(A)}{=} \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \sum_{\substack{k=(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n \\ \exists r (|k_r - j_r| \leq 1)}} \langle \Delta_j(f), \overline{\Delta_k(g)} \rangle \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \sum_{\substack{k=(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n \\ \exists r (|k_r - j_r| \leq 1)}} |\Delta_j(f)| |\Delta_k(g)| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \left(|\Delta_j(f)| \sum_{\substack{k=(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n \\ \exists r (|k_r - j_r| \leq 1)}} |\Delta_k(g)| \right) dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^n \\ \exists j \exists r (|k_r - j_r| \leq 1)}} |\Delta_k(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \\ &\leq 3^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_k(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq 3^n \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_k(g)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq C_n^{-1} \max(p', (p' - 1)^{-1})^n \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},
\end{aligned} \tag{5.44}$$

其中 (A) 是因为对每个固定的变量 x_r , 考察与 x_r 有关的指标 j_r, k_r , 知在 x_r 方向上有

$$\langle \Delta_{j_r}(f), \overline{\Delta_{k_r}(g)} \rangle = \langle \widehat{\Delta_{j_r}(f)}, \widehat{\Delta_{k_r}(g)} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\psi}(2^{-j_r} \xi_r) \widehat{\psi}(2^{-k_r} \xi_r) \widehat{f}(\xi_r) \widehat{g}(\xi_r) d\xi_r.$$

已知

$$\begin{aligned}
\text{supp } \widehat{\psi}(2^{-j_r}(\cdot)) &\subset \left\{ \frac{9}{10} \cdot 2^{j_r} \leq |\xi_r| \leq \frac{21}{10} \cdot 2^{j_r} \right\}, \\
\text{supp } \widehat{\psi}(2^{-k_r}(\cdot)) &\subset \left\{ \frac{9}{10} \cdot 2^{k_r} \leq |\xi_r| \leq \frac{21}{10} \cdot 2^{k_r} \right\},
\end{aligned}$$

于是要想 $\langle \Delta_{j_r}(f), \overline{\Delta_{k_r}(g)} \rangle \neq 0$, 就需要

$$\frac{9}{10} \cdot 2^{j_r} \leq \frac{21}{10} \cdot 2^{k_r}, \quad \frac{9}{10} \cdot 2^{k_r} \leq \frac{21}{10} \cdot 2^{j_r}.$$

于是 $k_r - 1 \leq j_r \leq k_r + 1$, 亦即 $|k_r - j_r| \leq 1$. 现在在 (5.44) 式两端对 $\|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \leq 1$ 取上确界即得 (5.43) 式.

现若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 用 $\Delta_j^\#$ 诱导平方函数的 L^p 估计 5.4 的证明末尾提到的过程即得结论. $\square$

5.1.3 L^p 上的正交性损失

下面给出两例来说明为什么 (5.1) 式两端在指标 2 换成 $q \neq 2$ 时就不成立了. 准确来说, 下面说明如果函数 f_j 的 Fourier 变换支在不交集上, 则不等式

$$\left\| \sum_j f_j \right\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq C_p \sum_j \|f_j\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \tag{5.45}$$

在 $p > 2$ 时不能成立, 而不等式

$$\sum_j \|f_j\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \leq C_p \left\| \sum_j f_j \right\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \tag{5.46}$$

在 $p < 2$ 时不能成立. (5.45), (5.46) 两式中 C_p 均与 f_j 的选取无关.

例 5.1 取定 Schwartz 函数 ζ 满足其 Fourier 变换非负, 且 $\text{supp } \widehat{\zeta} \subset \{|\xi| \leq \frac{1}{4}\}$. 设 N 是足够大的整数, 取

$$f_j(x) = e^{i2\pi jx} \zeta(x),$$

则

$$\widehat{f_j}(\xi) = \widehat{\zeta}(\xi - j),$$

且 $\widehat{f_j}$ 有不交支集. 显见

$$\sum_{j=0}^N \|f_j\|_{L^p(\mathbb{R})}^p = (N+1) \|\zeta\|_{L^p(\mathbb{R})}^p.$$

另一方面, 有下述估计成立:

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{j=0}^N f_j \right\|_{L^p(\mathbb{R})}^p &= \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{e^{i2\pi(N+1)x} - 1}{2^{i2\pi x} - 1} \right|^p |\zeta(x)|^p dx \\
&\stackrel{(A)}{\leq} c \int_{|x| < \frac{1}{10}(N+1)^{-1}} \frac{(N+1)^p |x|^p}{|x|^p} = C_\zeta (N+1)^{p-1},
\end{aligned}$$

其中 (A) 是因为一方面 ζ 在 $x = 0$ 附近非零⁵, 根据被积函数连续性得到积分区域的缩小, 另一方面用微分中值定理得到被积函数的估计. 现若 $p > 2$, 则总会存在足够大的 N 使得 (5.45) 式不成立.

⁵这又是因为 $\int_{\mathbb{R}} \widehat{\zeta} d\xi > 0$, 于是 $\zeta(0) = (\widehat{\zeta})^\vee(0) > 0$.

例 5.2 下面说明为什么 $p < 2$ 时(5.46)式不成立. 取 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数 Ψ , 令 $\widehat{\Psi}$ 非负, $\text{supp } \widehat{\Psi} \subset [\frac{7}{8}, \frac{17}{8}]$, 且在 $[\frac{9}{8}, \frac{15}{8}]$ 上 $\widehat{\Psi} \equiv 1$. 容易验证

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)^2 = 1, \quad \forall \xi > 0.$$

现在把 $\widehat{\Psi}$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的偶函数, 并记 Δ_j 是 Ψ 所诱导的 Littlewood-Paley 算子. 另取 $\mathbb{R}$ 上的非零 Schwartz 函数 φ , 令 $\widehat{\varphi}$ 非负, $\text{supp } \widehat{\varphi} \subset [\frac{11}{8}, \frac{13}{8}]$. 取 N 是足够大的正整数, 设

$$f_j(x) = e^{i2\pi \frac{12}{8} 2^j x} \varphi(x), \quad j = 1, 2, \dots, N, \quad (5.47)$$

则函数 $\widehat{f_j}(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi - \frac{12}{8} 2^j)$ 支在集合 $[\frac{11}{8} + \frac{12}{8} 2^j, \frac{13}{8} + \frac{12}{8} 2^j]$, 在 $j \geq 3$ 时该集合被包含在 $[\frac{9}{8} 2^j, \frac{15}{8} 2^j]$ 内. 也就是说, $j \geq 3$ 时 $\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$ 在 $\text{supp } \widehat{f_j}$ 上恒为 1, 这表明 $j \geq 3$ 时

$$\Delta_j(f_j) = f_j.$$

结合(5.33)式⁶可知在 $N \geq 3$ 时

$$\left\| \sum_{j=3}^N f_j \right\|_{L^p(\mathbb{R})} = \left\| \sum_{j=3}^N \Delta_j(f_j) \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j=3}^N |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} = C_p \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R})} (N-2)^{\frac{1}{2}}, \quad 1 < p < \infty.$$

另一方面, 由(5.47)式显见

$$\left(\sum_{j=3}^N \|f_j\|_{L^p(\mathbb{R})}^p \right)^{\frac{1}{p}} = \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R})} (N-2)^{\frac{1}{p}},$$

令 $N \rightarrow \infty$, 因为 $\frac{1}{p} > \frac{1}{2}$, 故 $(\sum_{j=3}^N \|f_j\|_{L^p(\mathbb{R})}^p)^{\frac{1}{p}}$ 的增长总会快于 $\|\sum_{j=3}^N f_j\|_{L^p(\mathbb{R})}$ 的增长, 至此即知就算 f_j 具有不交频率支集, $p < 2$ 时(5.46)式依旧不会成立.

例 5.3 通过与例5.2类似的构造, 可以说明(5.13)左式出现的 l^2 范数也是必要的. 为此设 Ψ, Δ_j 与例5.2相同, 固定 $1 < p < \infty, q < 2$. 下面说明不等式

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^q \right)^{\frac{1}{q}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (5.48)$$

不成立. 取 $f = \sum_{j=3}^N f_j$, 其中 f_j 依照(5.47)式定义, $N \geq 3$, 则(5.48)左式被 $\|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R})} (N-2)^{\frac{1}{q}}$ 控制了下界, 而(5.48)右式被 $\|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R})} (N-2)^{\frac{1}{2}}$ 控制了上界. 令 $N \rightarrow \infty$ 即知(5.48)式在 $q < 2$ 时不可能成立.

例 5.4 对 $1 < p < \infty, 2 < q < \infty$, 就算 Ψ 满足(5.15)式, 不等式

$$\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,q} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(g)|^q \right)^{\frac{1}{q}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (5.49)$$

也不会成立. 这是因为取 Δ_j 是例5.2中定义的 Littlewood-Paley 算子, 设(5.49)式在 $q > 2$ 时对这些 Δ_j 确实成立, 则由 Δ_j 的自伴性与对偶性可知

$$\begin{aligned} \left\| \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\Delta_k(g)|^{q'} \right)^{\frac{1}{q'}} \right\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} &\stackrel{(A)}{=} \sup_{\|\{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}}\|_{l^q} \|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \Delta_k(g) \overline{h_k} dx \right| \\ &\leq \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \sup_{\|\{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}}\|_{l^q} \|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 1} \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}} \Delta_k(h_k) \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} C \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \sup_{\|\{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}}\|_{l^q} \|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 1} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \left| \Delta_j \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \Delta_k(h_k) \right) \right|^q \right)^{\frac{1}{q}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \\ &\stackrel{(C)}{\leq} C' \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \sup_{\|\{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}}\|_{l^q} \|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 1} \left\{ \sum_{l=-1}^1 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j \Delta_{j+l}(h_j)|^q \right)^{\frac{1}{q}} \right\| \right\} \\ &\stackrel{(D)}{\leq} C'' \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})} \sup_{\|\{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}}\|_{l^q} \|_{L^p(\mathbb{R})} \leq 1} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |h_j|^q \right)^{\frac{1}{q}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} = C'' \|g\|_{L^{p'}(\mathbb{R})}, \end{aligned}$$

⁶因为 $0 \notin \text{supp } \widehat{\Psi}$, 故 $\widehat{\Psi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \Psi dx = 0$. 又因为延拓后的 $\widehat{\Psi}$ 是 Schwartz 函数, 故 Ψ 也可以看成 Schwartz 函数, 这便满足了(5.33)式对 Ψ 的要求.

其中 (A) 是 $L^p(X, B)$ 的共轭空间性质 4.11; (B) 是 (5.49) 式; (C) 一方面是 Minkowski 不等式, 另一方面根据 Δ_j 的支集构造知 $|l| \geq 2$ 时 $\Delta_j \Delta_{j+l} = 0$; (D) 是把 (5.34) 式用了两次. 又因为 $q' < 2$, 上述过程实际上说明的是 (5.48) 式, 但这个式子在 $q' < 2$ 时本身不成立, 矛盾! 故只能有 (5.49) 式不成立.

综上所述, 如果在 Littlewood-Paley 定理中 Ψ 同时满足 (5.12), (5.16) 式, 则 L^p 范数内的 l^2 范数不能换成 l^q ($q \neq 2$) 范数.

5.1.4 两个乘子定理

现在回到曾经在 Fourier 乘子部分介绍过的空间 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$. 乘子定理的动机在于寻找定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^∞ 函数成为 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 中元素的充分条件. 本节我们介绍提供这种充分条件的两个基本定理, 即 Marcinkiewicz 乘子定理与 Hörmander-Mihlin 乘子定理. 这两个定理都是前面介绍过的 Littlewood-Paley 定理的结论.

通过对 $\mathbb{R}^n$ 作二进分解, 可以把任意 L^∞ 函数 m 写成和式

$$m = \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} m \chi_{R_j} \text{ a.e.,}$$

其中 $j = (j_1, \dots, j_n)$, $R_j = I_{j_1} \times \dots \times I_{j_n}$, $I_k = [2^k, 2^{k+1}) \cup (-2^{k+1}, -2^k]$. 对 $j \in \mathbb{Z}^n$, 记 $m_j = m \chi_{R_j}$. 做好这些准备工作后, 下面我们用量值不等式刻画 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$.

命题 5.2 ($\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 的向量值不等式刻画)

设 $m \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, $m_j = m \chi_{R_j}$, 则 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ (即存在常数 c_p 使得对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有 $\|(\widehat{f}m)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq c_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$) 当且仅当存在 $C_p > 0$ 使得

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |(\widehat{f_j} m_j)^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (5.50)$$

对任意 $\{f_j\}_{j \in \mathbb{Z}^n} \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ 均成立.

证明 设 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, 由引理 5.2 可得

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |(\chi_{R_j} m \widehat{f_j})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |(m \widehat{f_j})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

其中第二个不等式用到了线性算子的 l^2 延拓 4.14(a) (注意到 $p = q$ 时定理 4.14 中的 $C_{p,q} = 1$).

相反地, 若对任意函数列 $\{f_j\}_{j \in \mathbb{Z}^n} \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ 均有 (5.50) 式成立, 则取定函数 f , 在 (5.50) 式中令 $f_j = (\widehat{f} \chi_{R_j})^\vee$ (其中 R_j 是指标为 $j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{Z}^n$ 的二进方体). 知

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |(\widehat{f} m \chi_{R_j})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |(\widehat{f} \chi_{R_j})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

现由高维情况下 $\Delta_j^\#$ 诱导平方函数的 L^p 估计 5.4 可知上左式在忽略常数倍的意义下等价于 $\|(\widehat{f}m)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 而上右式在忽略常数倍的意义下等价于 $\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 因此上式实际上等价于不等式

$$\|(\widehat{f}m)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq c_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

该不等式说明了 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$. □

5.1.4.1 $\mathbb{R}$ 上的 Marcinkiewicz 乘子定理

$\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 的向量值不等式刻画 5.2 表明 m 在每个二进方体 R_j 上的行为在决定 m 是否为 L^p 乘子这件事上至关重要. Marcinkiewicz 乘子定理给出了针对 m 在任意二进方体 R_j 上的限制的充分条件. 在阐述定理前, 我们首先通过下面的例子来展示定理的主要想法. 设 m 是在 $-\infty$ 附近衰减的有界函数, 它在每一点均可导, 且它的导函数还是可积的. 则有

$$m(\xi) = \int_{-\infty}^{\xi} m'(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[t, \infty)}(\xi) m'(t) dt,$$

因对 Schwartz 函数 f 有

$$(\widehat{fm})^\vee = \int_{\mathbb{R}} (\widehat{f}\chi_{[t,\infty)})^\vee m'(t) dt.$$

因为算子 $f \mapsto (\widehat{f}\chi_{[t,\infty)})^\vee$ 是 $L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})$ 的, 故

$$\|(\widehat{fm})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C_p \|m'\|_{L^1(\mathbb{R})} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})},$$

这便说明 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Marcinkiewicz 乘子定理正是这一结果的拓展, 它的证明需要用到 Littlewood-Paley 定理. 下面我们先从一维情况开始.

定理 5.5 (Marcinkiewicz 乘子定理)

设 $m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界函数, 且它在每个二进区间 $(2^j, 2^{j+1}) \cup (-2^{j+1}, -2^j) (j \in \mathbb{Z})$ 上都是 C^1 函数. 另设 m 的导函数 m' 满足

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} \left[\int_{-2^{j+1}}^{-2^j} |m'(\xi)| d\xi + \int_{2^j}^{2^{j+1}} |m'(\xi)| d\xi \right] \leq A < \infty. \quad (5.51)$$

则对任意 $1 < p < \infty$ 均有 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, 且存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R})} \leq C \max(p, (p-1)^{-1})^6 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})} + A). \quad (5.52)$$

证明 因为函数 m 在 $(2^j, 2^{j+1})$ 上有可积的导函数, 故其在该区间上为有界变差函数, 进而它可以被表为两个递增函数之差. 因此 m 在点 2^j 与 2^{j+1} 处分别具有左极限和右极限, 故通过定义 m 在这两个端点的值可使 m 在 2^j 处右连续, 在 -2^j 处左连续.

记 $I_j = [2^j, 2^{j+1}) \cup (-2^{j+1}, -2^j]$, $I_j^+ = [2^j, 2^{j+1}) (j \in \mathbb{Z})$. 对于 $\mathbb{R}$ 上给定的区间 I , 记算子 Δ_I 为 $\Delta_I(f) = (\widehat{f}\chi_I)^\vee$, $\Delta_{I_j^+}(f) = (\widehat{f}\chi_{I_j^+})^\vee$. 现取 m 是满足题意的函数, 记 $m(\xi) = m_+(\xi) + m_-(\xi)$, 其中 $m_+(\xi) = m(\xi)\chi_{\xi \geq 0}$, $m_-(\xi) = m(\xi)\chi_{\xi < 0}$, 接下来说明 m_+, m_- 均为 L^p 乘子. 因为 m' 在每个形如 $[2^j, \xi] (2^j \leq \xi < 2^{j+1})$ 的区间上均可积, 故由微积分基本定理知

$$m(\xi) = m(2^j) + \int_{2^j}^{\xi} m'(t) dt, \quad 2^j \leq \xi < 2^{j+1},$$

因此对 $\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 函数 f 有

$$m(\xi) \widehat{f}(\xi) \chi_{I_j^+}(\xi) = m(2^j) \widehat{f}(\xi) \chi_{I_j^+}(\xi) + \int_{2^j}^{2^{j+1}} \widehat{f}(\xi) \chi_{[t,\infty)}(\xi) \chi_{I_j^+}(\xi) m'(t) dt.$$

进而

$$(\widehat{f}\chi_{I_j} m_+)^{\vee} = (\widehat{f}\chi_{I_j^+} m_+)^{\vee} = m(2^j) \Delta_{I_j^+}(f) + \int_{2^j}^{2^{j+1}} \Delta_{[t,\infty)} \Delta_{I_j^+}(f) m'(t) dt,$$

故由(5.51)式得

$$\begin{aligned} |(\widehat{f}\chi_{I_j} m_+)^{\vee}| &\leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})} |\Delta_{I_j^+}(f)| + \left| \int_{2^j}^{2^{j+1}} \Delta_{[t,\infty)} \Delta_{I_j^+}(f) (m'(t))^{\frac{1}{2}} (m'(t))^{\frac{1}{2}} dt \right| \\ &\leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})} |\Delta_{I_j^+}(f)| + \left(\int_{2^j}^{2^{j+1}} |\Delta_{[t,\infty)} \Delta_{I_j^+}(f)|^2 |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^j}^{2^{j+1}} |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})} |\Delta_{I_j^+}(f)| + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^j}^{2^{j+1}} |\Delta_{[t,\infty)} \Delta_{I_j^+}(f)|^2 |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

两边同取 l^2 范数得

$$\left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |(\widehat{f}\chi_{I_j} m_+)^{\vee}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_{I_j^+}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty |\Delta_{[t,\infty)} \Delta_{[\log_2 t]}^\#(f_+)|^2 |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

其中 $f_+ = (\widehat{f}\chi_{[0,\infty)})^\vee$. 为估计上右式第二项, 首先阐明断言下述引理成立:

引理 5.3

设 $(T, d\mu)$ 是 σ 有限测度空间. 对任意 $t \in T$, 设 $R(t)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中各边平行于坐标轴的矩体, 其满足映射 $t \mapsto R(t)$ 可测. 则存在常数 $C_n > 0$ 使得对任意 $1 < p < \infty$ 与 $\mathbb{R}^n$ 上的任意平方可积函数族 $\{f_t\}_{t \in T}$ 而言, 只要映射 $t \mapsto f_t(x)$ 可测, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 就有

$$\left\| \left(\int_T |\widehat{f_t \chi_{R(t)}}^\vee|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \max(p, (p-1)^{-1})^n \left\| \left(\int_T |f_t|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

根据引理可得

$$A^{\frac{1}{2}} \left\| \left(\int_0^\infty |\Delta_{[t, \infty)} \Delta_{[\log_2 t]}^\#(f_+)|^2 |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C \max(p, (p-1)^{-1}) A^{\frac{1}{2}} \left\| \left(\int_0^\infty |\Delta_{[\log_2 t]}^\#(f_+)|^2 |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})},$$

从取整函数的性质与 $\Delta_{I_j^+}$ 的定义可知上右式中 L^p 范数内的积分可以写成

$$\left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_{I_j^+}(f)|^2 \int_{I_j^+} |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

又由(5.51)式可得

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_{I_j^+}(f)|^2 \int_{I_j^+} |m'(t)| dt \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq A^{\frac{1}{2}} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_{I_j^+}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

根据一维情况下 $\Delta_j^\#$ 诱导平方函数的 L^p 估计5.3知

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_{I_j^+}(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C' \max(p, (p-1)^{-1})^2 \|(\widehat{f} \chi_{(0, \infty)})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

利用 Hausdorff-Young 不等式2.8可以说明 $1 < p \leq 2$ 时 $\|(\widehat{f} \chi_{(0, \infty)})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \max(p, (p-1)^{-1}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 再由对偶性可得 $p > 2$ 时该不等式也成立, 从而上右式被 $\max(p, (p-1)^{-1})^3 \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$ 的常数倍控制. 综合上述诸式可得

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |(\widehat{f} \chi_{I_j} m_+)^{\vee}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C'' \max(p, (p-1)^{-1})^4 (A + \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}, \quad (5.53)$$

于是由一维情况下 $\Delta_j^\#$ 诱导平方函数的 L^p 估计5.3的下界估计知

$$\|(\widehat{f} m_+)^{\vee}\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C \max(p, (p-1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |(\widehat{f} \chi_{I_j} m_+)^{\vee}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq C \max(p, (p-1)^{-1})^6 (A + \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R})}) \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

这便对 m_+ 证明了(5.52)式, 对 m_- 的证明是类似的, 将所得两式相加即得欲证.

下面还需证明引理5.3. 当 $n = 1$ 时, $R(t)$ 退化为区间 $I(t)$, 不妨设 $I(t) = (a_t, b_t)$, 其中映射 $t \mapsto a_t, t \mapsto b_t$ 均可测. 利用与引理5.1完全相同的证明可以说明算子 $T_t : f \mapsto (\chi_{I(t)} \widehat{f})^\vee$ 能表为

$$T_t = \frac{i}{2} (M^{a_t} H M^{-a_t} - M^{b_t} H M^{-b_t}),$$

其中 $M^{a_t}(f)(x) = f(x) e^{i2\pi a_t x}$. 另记 $T_t^1 : f \mapsto \frac{i}{2} M^{a_t} H M^{-a_t}(f), T_t^2 : f \mapsto \frac{i}{2} M^{b_t} H M^{-b_t}(f)$, 则要证明 $n = 1$ 时的结论, 就只需要证明

$$\|T_t^k(f_t)\|_{L^2(T, d\mu)} \|_{L^p(\mathbb{R}, dx)} \leq C_n \max(p, (p-1)) \|f_t\|_{L^2(T, d\mu)} \|_{L^p(\mathbb{R}, dx)}, \quad k = 1, 2.$$

下面着重说明 $k = 1$ 的情况. 因为

$$\begin{aligned} \|T_t^1(f_t)\|_{L^2(T, d\mu)} \|_{L^p(\mathbb{R}, dx)} &= \left\| \left(\frac{1}{4} \int_T |M^{a_t} H M^{-a_t}(f_t)|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \\ &= \frac{1}{4} \left\| \left(\int_T |H(e^{-i2\pi a_t(\cdot)} f_t)|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}, \end{aligned}$$

故只需说明对 $\mathbb{R}$ 上的平方可积函数族 $\{f_t\}_{t \in T}$ 而言, 只要 $t \mapsto f_t(x)$ 作为 t 的映射对全体 $x \in \mathbb{R}$ 均可测, 就有

$$\left\| \left(\int_T |H(e^{-i2\pi a_t(\cdot)} f_t)|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq c(p) \left\| \left(\int_T |f_t|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

现在首先说明上述不等式在 $p = 2$ 时是成立的. 事实上因为 T 是 σ 有限的, 故根据 Fubini 定理与 H 的 L^2 等距性知

$$\begin{aligned} \left\| \left(\int_T |H(e^{-i2\pi a_t(\cdot)} f_t)|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} &= \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_T |H(e^{-i2\pi a_t(\cdot)} f_t)(x)|^2 d\mu(t) \right) dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_T \left(\int_{\mathbb{R}} |H(e^{-i2\pi a_t(\cdot)} f_t)(x)|^2 dx \right) d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_T \left(\int_{\mathbb{R}} |e^{-i2\pi a_t x} f_t(x)|^2 dx \right) d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_T \left(\int_{\mathbb{R}} |f_t(x)|^2 dx \right) d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_T |f_t(x)|^2 d\mu(t) \right) dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left\| \left(\int_T |f_t|^2 d\mu(t) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

至此已经说明了算子 $\{f_t\}_{t \in T} \mapsto \{H(f_t)\}_{t \in T}$ ⁷

注 Marcinkiewicz 乘子定理 5.5 中 m 的条件可以放宽为在每个区间 $[2^j, 2^{j+1}], [-2^{j+1}, -2^j]$ 上都是有界变差函数, 此时上述证明中的测度 $|m'(t)|dt$ 应该改成 Lebesgue-Stieltjes 测度 $dm(t)$ 的绝对变差 $|dm(t)|$, 其余证明过程是一样的.

例 5.5 任何在二进区间上为常数的有界函数都是 L^p 乘子, 另外函数 $m(\xi) = |\xi|2^{-[\log_2 |\xi|]}$ 在 $1 < p < \infty$ 时也是 $\mathbb{R}$ 上的 L^p 乘子.

5.1.4.2 $\mathbb{R}^n$ 上的 Marcinkiewicz 乘子定理

下面把 Marcinkiewicz 乘子定理 5.5 拓展到 $\mathbb{R}^n$ 上. 记 $\mathbb{R}^n$ 中的点 ξ 为 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$, $I_j = (-2^{j+1}, -2^j] \cup [2^j, 2^{j+1})$, 且在 $j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{Z}^n$ 时 $R_j = I_{j_1} \times \dots \times I_{j_n}$.

定理 5.6 (Marcinkiewicz 乘子定理)

设 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界函数, 且对任意 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 只要 $|\alpha_1|, \dots, |\alpha_n| \leq 1$, 那么导函数 $\partial^\alpha m$ 对全体 $j \in \mathbb{Z}^n$ 就都是在 R_j 上到边连续的. 另设存在常数 $A < \infty$ 使得只要 $\{s_1, \dots, s_k\} \cup \{r_1, \dots, r_l\} = \{1, 2, \dots, n\}$ 满足 $n = k + l$, 对任意 $\xi \in R_j$ 与任意 $j = (j_1, \dots, j_n)$ 就有

$$\sup_{\xi_{r_1} \in I_{j_{r_1}}} \dots \sup_{\xi_{r_l} \in I_{j_{r_l}}} \int_{I_{j_{s_1}}} \dots \int_{I_{j_{s_k}}} |(\partial_{s_1} \dots \partial_{s_k} m)(\xi_1, \dots, \xi_n)| d\xi_{s_k} \dots d\xi_{s_1} \leq A. \quad (5.54)$$

则 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$), 且存在常数 $C_n < \infty$ 使得

$$\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n (A + \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}) \max(p, (p-1)^{-1})^{6n}. \quad (5.55)$$

证明 我们只考虑 $n = 2$ 的情形, 因为更高维的情况在证明步骤上没什么本质区别, 只是增添了一些记号的不便. 现将函数 m 分解为

$$m(\xi) = m_{++}(\xi) + m_{-+}(\xi) + m_{+-}(\xi) + m_{--}(\xi),$$

上右式中每一项都只支在四个象限中的某一个上面. 例如函数 $m_{+-}(\xi_1, \xi_2)$ 支在 $\xi_1 \geq 0, \xi_2 < 0$ 这一象限上. 类似于一维情形, 我们只需对上右式的四项分别进行估计即可. 出于对称性, 我们首先估计 m_{++} .

⁷这里对证明还是有很大的问题, 参考 mse 上的问题.

根据微积分基本定理, 在 $2^{j_1} \leq \xi_1 < 2^{j_1+1}, 2^{j_2} \leq \xi_2 < 2^{j_2+1}$ 时有

$$m(\xi_1, \xi_2) = m(2^{j_1}, 2^{j_2}) + \int_{2^{j_1}}^{\xi_1} (\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2}) dt_1 + \int_{2^{j_2}}^{\xi_2} (\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2) dt_2 + \int_{2^{j_1}}^{\xi_1} \int_{2^{j_2}}^{\xi_2} (\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2) dt_2 dt_1. \quad (5.56)$$

定义作用在第 r 个变量 ($r \in \{1, 2\}$, 其余变量保持不变) 的算子 $\Delta_I^{(r)} : f \mapsto (\widehat{f} \chi_I)^\vee$. 类似地, 定义 (同样是作用在第 r 个变量上 ($r \in \{1, 2\}$) 的) 算子 $\Delta_j^{\#(r)} : f \mapsto (\widehat{f} \chi_{(-2^{j+1}, -2^j] \cup [2^j, 2^{j+1})})^\vee$. 出于简化记号, 对给定的 Schwartz 函数 f 记

$$f_{++} = (\widehat{f} \chi_{(0, \infty)^2})^\vee,$$

并类似地定义 f_{+-}, f_{-+}, f_{--} .

现在在 (5.53) 式两端同乘函数 $\widehat{f} \chi_{R_j} \chi_{(0, \infty)^2}$ 得到

$$\begin{aligned} & (\widehat{f} \chi_{R_j} \chi_{(0, \infty)^2})(\xi_1, \xi_2) m(\xi_1, \xi_2) \\ &= m(2^{j_1}, 2^{j_2}) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) \\ & \quad + \int_{2^{j_1}}^{\xi_1} \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) (\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2}) dt_1 \\ & \quad + \int_{2^{j_2}}^{\xi_2} \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) (\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2) dt_2 \\ & \quad + \int_{2^{j_1}}^{\xi_1} \int_{2^{j_2}}^{\xi_2} \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) (\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2) dt_2 dt_1 \\ &= m(2^{j_1}, 2^{j_2}) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) \\ & \quad + \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \chi_{[t_1, \infty)}(\xi_1) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) (\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2}) dt_1 \\ & \quad + \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \chi_{[t_2, \infty)}(\xi_2) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) (\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2) dt_2 \\ & \quad + \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \chi_{[t_1, \infty)}(\xi_1) \chi_{[t_2, \infty)}(\xi_2) \widehat{f}(\xi_1, \xi_2) \chi_{R_j}(\xi_1, \xi_2) \chi_{(0, \infty)^2}(\xi_1, \xi_2) (\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2) dt_2 dt_1, \end{aligned}$$

根据 $\Delta_I^{(r)}$ 与 $\Delta_j^{\#(r)}$ 的构造, 对上式两端同取 Fourier 逆变换有

$$\begin{aligned} & (\widehat{f} \chi_{R_j} m_{++})^\vee = m(2^{j_1}, 2^{j_2}) \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++}) \\ & \quad + \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)}(f_{++}) (\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2}) dt_1 \\ & \quad + \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++}) (\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2) dt_2 \\ & \quad + \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++}) (\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2) dt_2 dt_1. \end{aligned} \quad (5.57)$$

对 (5.57) 右式的后三项分别用测度为 $|(\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2})| dt_1, |(\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2)| dt_2, |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1$ 的 Cauchy-Schwartz 不等式可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)}(f_{++}) (\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2}) dt_1 \right| \\ & \leq \left(\int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} |(\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2})| dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} |\Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)}(f_{++})|^2 |(\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2})| dt_1 \right)^{\frac{1}{2}}, \\ & \left| \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++}) (\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2) dt_2 \right| \\ & \leq \left(\int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |(\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2)| dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++})|^2 |(\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2)| dt_2 \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left| \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++}) (\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2) dt_2 dt_1 \right| \\
& \leq \left(\int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1 \right)^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

代入(5.54)式可得

$$\begin{aligned}
|(\widehat{f} \chi_{R_j} m_{++})^\vee| & \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++})| \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} |\Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2})| dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2)| dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1 \right)^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

上式两端均为指标为 $j \in \mathbb{Z}^2$ 的序列, 因此在两端取 $l^2(\mathbb{Z}^2)$ 范数并考虑 Minkowski 不等式⁸可得

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |(\widehat{f} \chi_{R_j} m_{++})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} & \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} |\Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2})| dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2)| dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{j_2}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& = \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \int_0^\infty |\Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 m)(t_1, 2^{j_2})| dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} \int_0^\infty |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_2 m)(2^{j_1}, t_2)| dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& = \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)} \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 m)(t_1, 2^{[\log_2 t_2]})| dt_1 d\nu(t_2) \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_2 m)(2^{[\log_2 t_1]}, t_2)| d\nu(t_1) dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
& + A^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[t_1, \infty)}^{(1)} \Delta_{[t_2, \infty)}^{(2)} \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)} (f_{++})|^2 |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_2 dt_1 \right)^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

其中 ν 是计数测度 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \delta_{2^j}$, 其定义为 $\nu(A) = \#\{j \in \mathbb{Z} : 2^j \in A\}$ (其中 $A \subset (0, \infty)$). 现在在上式两端取 $L^p(\mathbb{R}^2)$

⁸这里的 Minkowski 不等式指 l^2 范数的三角不等式.

范数, 并分别对右式每一项进行估计. 由引理5.3知

$$\begin{aligned} & \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |(\widehat{f} \chi_{R_j} m_{++})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_2 A^{\frac{1}{2}} \max(p, (p-1)^{-1})^2 \\ & \times \left\{ \left\| \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)} \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)}(f_{++})|^2 |\partial_1 m(t_1, 2^{\lfloor \log_2 t_2 \rfloor})| dt_1 dv(t_2) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \right. \\ & + \left\| \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)}(f_{++})|^2 |\partial_2 m(2^{\lfloor \log_2 t_1 \rfloor}, t_2)| dv(t_1) dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \left. + \left\| \left(\int_0^\infty \int_0^\infty |\Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)}(f_{++})|^2 |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_1 dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \right\}. \end{aligned}$$

又因为函数 $(t_1, t_2) \mapsto \Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)}(f_{++})$ 在形如 $[2^{j_1}, 2^{j_1+1}) \times [2^{j_2}, 2^{j_2+1})$ 的二进区间直积上是常数⁹, 因此将积分写回和式并将前述常数提出积分号, 由(5.54)式知

$$\begin{aligned} & \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |(\widehat{f} \chi_{R_j} m_{++})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_2 A^{\frac{1}{2}} \max(p, (p-1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} |\Delta_{j_2}^{\#(2)} \Delta_{j_1}^{\#(1)}(f_{++})|^2 \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} |\partial_1 m(t_1, 2^{j_2})| dt_1 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_2 A^{\frac{1}{2}} \max(p, (p-1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++})|^2 \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} |\partial_2 m(2^{j_1}, t_2)| dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_2 A^{\frac{1}{2}} \max(p, (p-1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j_2 \in \mathbb{Z}} \sum_{j_1 \in \mathbb{Z}} |\Delta_{j_1}^{\#(1)} \Delta_{j_2}^{\#(2)}(f_{++})|^2 \int_{2^{j_2}}^{2^{j_2+1}} \int_{2^{j_1}}^{2^{j_1+1}} |(\partial_1 \partial_2 m)(t_1, t_2)| dt_1 dt_2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \leq \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} + 3C_2 A \max(p, (p-1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \leq C_3 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^2 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |\Delta_j^\#(f_{++})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \stackrel{(A)}{\leq} C_4 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|(\widehat{f} \chi_{(0,\infty)^2})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & = C_4 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|\mathcal{F}_{\xi_2}^{-1} [\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \chi_{(0,\infty)}(\xi_2) \mathcal{F}_{x_1} [\mathcal{F}_{x_2}(f)]]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & = C_4 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|\mathcal{F}_{\xi_2}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_2) \mathcal{F}_{x_2} [\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]]]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \stackrel{(B)}{\leq} C_5 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|\mathcal{F}_{\xi_2}^{-1} [\text{sgn}(\xi_2) \mathcal{F}_{x_2} [\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]]]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_5 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & = C_5 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|H_{x_2} (\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]])\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_5 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^6 \|\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \stackrel{(C)}{\leq} C_6 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^7 \|\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\chi_{(0,\infty)}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & \leq C_7 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^7 \|\mathcal{F}_{\xi_1}^{-1} [\text{sgn}(\xi_1) \mathcal{F}_{x_1}[f]]\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & + C_7 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^7 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \\ & = C_7 (\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^7 (\|H_{x_1}(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} + \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}) \end{aligned}$$

⁹这里指 $\Delta_{[\log_2 t_1]}^{\#(1)} \Delta_{[\log_2 t_2]}^{\#(2)}(f_{++})$ 在 $[2^{j_1}, 2^{j_1+1}) \times [2^{j_2}, 2^{j_2+1})$ 上与 (t_1, t_2) 无关, 这当然是成立的, 因为此时 $[\log_2 t_1], [\log_2 t_2]$ 是定值.

$$\leq C_8(\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^8 \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)},$$

其中 (A) 使用了高维情况下 $\Delta_j^\#$ 诱导平方函数的 L^p 估计 5.4 并代入了 f_{++} 的定义; (C) 是 Hilbert 变换的 L^p 有界性 4.2, 其中 H_{x_2} 表示对 x_2 这一变量单独作用 Hilbert 变换; 下面着重说明 (B), 也就是要说明

$$\|(\widehat{f}\chi_{(0,\infty)})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim \|(\widehat{f}\operatorname{sgn}(\xi))^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} + \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

这是因为注意到 $\chi_{(0,\infty)}(\xi) = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{sgn} \xi)$, 故

$$\|(\widehat{f}\chi_{(0,\infty)})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} = \frac{1}{2}\|(\widehat{f})^\vee + (\widehat{f}\operatorname{sgn} \xi)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} \lesssim \|(\widehat{f}\operatorname{sgn}(\xi))^\vee\|_{L^p(\mathbb{R})} + \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}.$$

另一边, 利用 (5.41) 左式知

$$\frac{\|(\widehat{f}m_{++})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}}{C(p + (p-1)^{-1})^4} \leq \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^2} |(\widehat{f}\chi_{R_j}m_{++})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^2)},$$

因此

$$\|(\widehat{f}m_{++})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \leq C(\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^{12} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}.$$

对 m_{+-}, m_{-+}, m_{--} 作同样的估计并将所得结果相加即得 (5.55) 式.

对于 $\mathbb{R}^n$ 的情况, 经过与前文类似的处理后可得估计

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} |(\widehat{f}\chi_{R_j}m_{+\dots+})^\vee|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n(\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^{4n} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

同样由 (5.41) 左式可得

$$\|(\widehat{f}m_{+\dots+})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n(\|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + A) \max(p, (p-1)^{-1})^{6n} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

将其中的任意 $+$ 改为 $-$, 可通过完全相同的方法得到上述估计, 将所得估计相加即得 n 维情况的 (5.55) 式. $\square$

下面给出比 (5.54) 式更强的一个条件, 在这一条件下的结论具有广泛的应用.

推论 5.2

设 m 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 的各坐标轴之外的 C^n 函数, 且对任意 $k \in \{1, \dots, n\}$, 任意两两不同的 $j_1, \dots, j_k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 与任意 $\xi_r \in \mathbb{R} \setminus \{0\} (r \notin \{j_1, \dots, j_k\})$ 有

$$|(\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_k} m)(\xi_1, \dots, \xi_n)| \leq A |\xi_{j_1}|^{-1} \cdots |\xi_{j_k}|^{-1}. \quad (5.58)$$

那么 m 满足 (5.55) 式. 

证明 只需证明 (5.58) 式蕴含 (5.54) 式即可. 这是因为

$$\int_{I_{js_1}} \cdots \int_{I_{js_k}} |(\partial_{s_1} \cdots \partial_{s_k} m)(\xi_1, \dots, \xi_n)| d\xi_{s_k} \cdots d\xi_{s_1} \leq A (\log 2)^k.$$

(5.54) 式至此立得. $\square$

例 5.6 下面给出的一些函数例都满足推论 5.2 的条件:

$$\begin{aligned} m_1(\xi) &= \frac{\xi_1}{\xi_1 + i(\xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2)}, \\ m_2(\xi) &= \frac{|\xi_1|^{\alpha_1} \cdots |\xi_n|^{\alpha_n}}{(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2)^{\frac{\alpha}{2}}}, \\ m_3(\xi) &= \frac{\xi_2 \xi_3^2}{i\xi_1 + \xi_2^2 + \xi_3^4}, \end{aligned}$$

其中 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = \alpha, \alpha_j > 0$, 函数 m_1, m_2 定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上, m_3 定义在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上.

上例与诸多满足推论 5.2 条件 (5.58) 的例子都是在下述意义下伸缩不变的: 设存在 $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{R}^+, s \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的光滑函数 m 满足

$$m(\lambda^{k_1} \xi_1, \dots, \lambda^{k_n} \xi_n) = \lambda^{is} m(\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \mathbb{R}, \lambda > 0.$$

则 m 满足(5.58)式. 这是因为通过微分可知

$$\lambda^{\alpha_1 k_1 + \dots + \alpha_n k_n} \partial^\alpha m(\lambda^{k_1} \xi_1, \dots, \lambda^{k_n} \xi_n) = \lambda^{is} \partial^\alpha m(\xi_1, \dots, \xi_n)$$

对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 均成立. 现对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 取唯一的 $\lambda_\xi > 0$ 使得 $(\lambda_\xi^{k_1} \xi_1, \dots, \lambda_\xi^{k_n} \xi_n) \in \mathbb{S}^{n-1}$, 则 $\lambda_\xi^{k_j \alpha_j} \leq |\xi_j|^{-\alpha_j}$, 因此

$$|\partial^\alpha m(\xi_1, \dots, \xi_n)| \leq \left[\sup_{\xi \in \mathbb{S}^{n-1}} |\partial^\alpha m| \right] \lambda_\xi^{\alpha_1 k_1 + \dots + \alpha_n k_n} \leq C_\alpha |\xi_1|^{-\alpha_1} \dots |\xi_n|^{-\alpha_n}.$$

5.1.4.3 $\mathbb{R}^n$ 上的 Mihlin-Hörmander 乘子定理

下面再讨论一个同样要求导函数衰减的乘子定理. 我们考虑每个偏导函数都关于全体变量一致衰减的情况, 写成式子即

$$|\partial_\xi^\alpha m(\xi)| \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n. \quad (5.59)$$

这一衰减也能表示成平方积分估计的形式:

$$\left(\int_{R < |\xi| < 2R} |\partial_\xi^\alpha m(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \leq C'_\alpha R^{\frac{n}{2} - |\alpha|} < \infty, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \forall R > 0. \quad (5.60)$$

显见(5.59)式蕴含了(5.60)式, 这是因为(5.59)式成立时有

$$\left(\int_{R < |\xi| < 2R} |\partial_\xi^\alpha m(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \leq C_\alpha \left(\int_{R < |\xi| < 2R} |\xi|^{-2|\alpha|} d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim \left(\int_R^{2R} r^{-2|\alpha| + n-1} dr \right)^{\frac{1}{2}} \lesssim R^{\frac{n}{2} - |\alpha|}.$$

定理 5.7 (Mihlin-Hörmander 乘子定理)

设定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的复值有界函数 $m(\xi)$ 满足存在 $A < \infty$ 使得

$$\left(\int_{R < |\xi| < 2R} |\partial_\xi^\alpha m(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \leq AR^{\frac{n}{2} - |\alpha|} < \infty, \quad \forall |\alpha| \leq \left[\frac{n}{2} \right] + 1, \forall R > 0, \quad (5.61)$$

则对全体 $1 < p < \infty$ 均有 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, 且对 m 有下述估计:

$$\|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \max(p, (p-1)^{-1}) (A + \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}). \quad (5.62)$$

另外, 算子 $f \mapsto (\widehat{f}m)^\vee$ 以至多为 $A + \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 某常数倍的范数将 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

我们需要提醒的是, 在大多数实际应用中, 条件(5.61)都以

$$|\partial_\xi^\alpha m(\xi)| \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|} \quad (5.63)$$

这一形式出现, 它本身是更容易验证的.

证明 由 m 是有界函数与 Young 不等式知算子 $f \mapsto f * W$ (其中 $W = m^\vee$) 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界. 现在要说明该算子将 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 根据一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 与 (5.61) 式蕴含尺寸条件知只需说明分布 W 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上和一个满足 Hörmander 条件的函数 K 重合即可.

现设 $\widehat{\zeta}$ 是支在环 $\frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2$ 上的光滑函数, 且其满足

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \neq 0.$$

对 $j \in \mathbb{Z}$ 记 $m_j(\xi) = m(\xi) \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi)$, $K_j = m_j^\vee$, 首先说明 $\sum_{j=-N}^N K_j$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下收敛到 W . 这是因为任取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\left\langle \sum_{j=-N}^N K_j, \varphi \right\rangle = \left\langle \sum_{j=-N}^N m_j, \varphi^\vee \right\rangle \rightarrow \langle m, \varphi^\vee \rangle = \langle W, \varphi \rangle.$$

取 $n_0 = \left[\frac{n}{2} \right] + 1$, 现在断言存在常数 $\widetilde{C}_n$ 使得

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)| (1 + 2^j |x|)^{\frac{1}{4}} dx \leq \widetilde{C}_n A, \quad (5.64)$$

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{-j} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla K_j(x)| (1 + 2^j |x|)^{\frac{1}{4}} dx \leq \widetilde{C}_n A. \quad (5.65)$$

为证(5.64)式, 考虑将其左端变形为

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)| (1 + 2^j |x|)^{n_0} (1 + 2^j |x|)^{-n_0 + \frac{1}{4}} dx,$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)| (1 + 2^j |x|)^{n_0} (1 + 2^j |x|)^{-n_0 + \frac{1}{4}} dx \right| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)|^2 (1 + 2^j |x|)^{2n_0} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + 2^j |x|)^{-2n_0 + \frac{1}{2}} dx \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (5.66)$$

注意到 $-2n_0 + \frac{1}{2} < -n$, 故(5.66)右式第二个因子是 $2^{-\frac{jn}{2}}$ 的常数倍. 为估计(5.66)右式第一个因子, 根据二项式定理显见

$$(1 + 2^j |x|)^{n_0} \leq C(n) \sum_{|\gamma| \leq n_0} |(2^j x)^\gamma|.$$

因此对(5.66)右式有

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)|^2 (1 + 2^j |x|)^{2n_0} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + 2^j |x|)^{-2n_0 + \frac{1}{2}} dx \right)^{\frac{1}{2}} &\leq C'(n) 2^{-\frac{jn}{2}} \sum_{|\gamma| \leq n_0} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)|^2 2^{2j|\gamma|} |x^\gamma|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= C'(n) 2^{-\frac{jn}{2}} \sum_{|\gamma| \leq n_0} 2^{j|\gamma|} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)|^2 |x^\gamma|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned} \quad (5.67)$$

又根据 Plancherel 定理知

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |x^\gamma K_j(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |x^\gamma m_j^\vee(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = C_\gamma \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\partial^\gamma m_j)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

其中 C_γ 是常数, 因此

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)|^2 (1 + 2^j |x|)^{2n_0} dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + 2^j |x|)^{-2n_0 + \frac{1}{2}} dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq 2^{-\frac{jn}{2}} \sum_{|\gamma| \leq n_0} C_\gamma 2^{j|\gamma|} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\partial^\gamma m_j)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (5.68)$$

对于多重指标 $\delta = (\delta_1, \dots, \delta_n)$, $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$, 我们用 $\delta \leq \gamma$ 表示对任意 $j = 1, \dots, n$ 均有 $\delta_j \leq \gamma_j$. 现对任意 $|\gamma| \leq n_0$, 由 Leibniz 法则知存在常数 $C_{\delta, \gamma}$ 使得

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\partial^\gamma m_j)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} &\leq \sum_{\delta \leq \gamma} C_{\delta, \gamma} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |2^{-j|\gamma - \delta|} (\partial_\xi^{\gamma - \delta} \widehat{\zeta})(2^{-j}\xi) (\partial_\xi^\delta m)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sum_{\delta \leq \gamma} C_{\delta, \gamma} 2^{-j|\gamma|} 2^{j|\delta|} \left(\int_{2^{j-1} \leq |\xi| \leq 2^{j+1}} |(\partial_\xi^{\gamma - \delta} \widehat{\zeta})(2^{-j}\xi)|^2 |(\partial_\xi^\delta m)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \sum_{\delta \leq \gamma} C'_{\delta, \gamma} 2^{-j|\gamma|} 2^{j|\delta|} \left(\int_{2^{j-1} \leq |\xi| \leq 2^{j+1}} |(\partial_\xi^\delta m)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sum_{\delta \leq \gamma} C'_{\delta, \gamma} 2^{-j|\gamma|} 2^{j|\delta|} 2A 2^{\frac{jn}{2}} 2^{-j|\delta|} \\ &= \widetilde{C}_n A 2^{\frac{jn}{2}} 2^{-j|\gamma|}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $|(\partial_\xi^{\gamma - \delta} \widehat{\zeta})(2^{-j}\xi)|$ 在 $2^{j-1} \leq |\xi| \leq 2^{j+1}$ 上作为连续函数有上界. 将上述结果代入(5.68)右式知

$$2^{-\frac{jn}{2}} \sum_{|\gamma| \leq n_0} C_\gamma 2^{j|\gamma|} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\partial^\gamma m_j)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \leq 2^{-\frac{jn}{2}} \sum_{|\gamma| \leq n_0} C_\gamma 2^{j|\gamma|} \widetilde{C}_n A 2^{\frac{jn}{2}} 2^{-j|\gamma|} \lesssim \widetilde{C}_n A,$$

再将上述结果代入(5.66)式即得(5.64)式. 而要证明(5.65)式, 只需对每个 $\partial_r K_j$ 重复上述过程即可. 其中因为 $(\partial_r K_j)(x) x^\gamma$ 的 Fourier 变换是 $\partial^\gamma (\xi_r m(\xi) \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi))$ 的常数倍, 故(5.65)左式中多出的因子 2^{-j} 实际上可以和 ξ_r 凑在一起, 进而可将 $2^{-j} \partial^\gamma (\xi_r m(\xi) \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi))$ 写成 $\partial^\gamma (m(\xi) \widehat{\zeta}_r(2^{-j}\xi))$, 其中 $\widehat{\zeta}_r(\xi) = \xi_r \widehat{\zeta}(\xi)$. 在 Plancherel 定理之后的计算中将 $\widehat{\zeta}$ 对

应换成 $\widehat{\zeta}_r$ 即可证明(5.65)式.

下面我们说明对任意 $x \neq 0$, 级数 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} K_j(x)$ 都收敛到某个函数 $K(x)$. 事实上, 对任意 $\delta > 0$ 有

$$(1 + 2^j \delta)^{\frac{1}{4}} \int_{|x| \geq \delta} |K_j(x)| dx \leq \int_{|x| \geq \delta} |K_j(x)| (1 + 2^j |x|)^{\frac{1}{4}} dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |K_j(x)| (1 + 2^j |x|)^{\frac{1}{4}} dx \leq \widetilde{C}_n A,$$

故由单调收敛定理知

$$\int_{|x| \geq \delta} \sum_{j>0} |K_j(x)| dx = \sum_{j>0} \int_{|x| \geq \delta} |K_j(x)| dx \leq \widetilde{C}_n A \sum_{j>0} (1 + 2^j \delta)^{-\frac{1}{4}} < \infty,$$

这说明函数 $\sum_{j>0} |K_j(x)|$ 在原点外可积, 且 $\int_{\delta \leq |x| \leq 2\delta} \sum_{j>0} |K_j(x)| dx < \infty$. 又注意到

$$\int_{\delta \leq |x| \leq 2\delta} |K_j(x)| dx \stackrel{(B)}{\leq} \|K_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} c_n \delta^{\frac{n}{2}} = \|\widehat{\zeta}(2^{-j}(\cdot))m\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} c_n \delta^{\frac{n}{2}} \stackrel{(C)}{\leq} c_n \|m\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \delta^{\frac{n}{2}} \|\widehat{\zeta}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} 2^{\frac{jn}{2}},$$

其中 (B), (C) 均为 Hölder 不等式, 由上式可知 $\int_{\delta \leq |x| \leq 2\delta} \sum_{j \leq 0} |K_j(x)| dx < \infty$. 至此即知 $\{\sum_{|j| \leq N} K_j(x)\}_{N \in \mathbb{N}}$ 至少在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上是 L^1 有界的, 因此 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} K_j(x)$ 在 L^1 意义下收敛到 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的 L^1 函数 $K(x)$, 再通过 Riesz 定理 (并适当地抛弃某些项后) 可得 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} K_j(x)$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上 a.e. 收敛到某函数 $K(x)$. 根据 K_j 的构造知 K 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与分布 $W = m^\vee$ 重合, 且由前述过程知

$$\int_{\delta \leq |x| \leq 2\delta} |K(x)| dx < \infty.$$

下面我们说明定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数 $K = \sum_{j \in \mathbb{Z}} K_j$ 满足 Hörmander 条件, 这只需证明对任意 $y \neq 0$ 有

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{|x| \geq 2|y|} |K_j(x-y) - K_j(x)| dx \leq 2C'_n A. \quad (5.69)$$

取定 $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 取 $k \in \mathbb{Z}$ 满足 $2^{-k} \leq |y| \leq 2^{-k+1}$, 则(5.69)式中 $j > k$ 的部分有下述估计:

$$\begin{aligned} \sum_{j>k} \int_{|x| \geq 2|y|} (|K_j(x-y)| + |K_j(x)|) dx &\leq 2 \sum_{j>k} \int_{|x| \geq |y|} |K_j(x)| dx \leq 2 \sum_{j>k} \int_{|x| \geq |y|} |K_j(x)| \frac{(1+2^j|x|)^{\frac{1}{4}}}{(1+2^j|x|)^{\frac{1}{4}}} dx \\ &\leq 2 \sum_{j>k} \frac{1}{(1+2^j|y|)^{\frac{1}{4}}} \int_{|x| \geq |y|} |K_j(x)| (1+2^j|x|)^{\frac{1}{4}} dx \\ &\stackrel{(D)}{\leq} \sum_{j>k} \frac{2\widetilde{C}_n A}{(1+2^j|y|)^{\frac{1}{4}}} \leq \sum_{j>k} \frac{2\widetilde{C}_n A}{(1+2^j 2^{-k})^{\frac{1}{4}}} = C'_n A, \end{aligned}$$

其中 (D) 是(5.64)式. 而对(5.69)式中 $j \leq k$ 的部分有

$$\begin{aligned} \sum_{j \leq k} \int_{|x| \geq 2|y|} |K_j(x-y) - K_j(x)| dx &\leq \sum_{j \leq k} \int_{|x| \geq 2|y|} \int_0^1 | -y \cdot \nabla K_j(x - \theta y) | d\theta dx \\ &\stackrel{(E)}{\leq} \int_0^1 \sum_{j \leq k} \int_{|x| \geq 2|y|} 2^{-k+1} |\nabla K_j(x - \theta y)| (1+2^j|x - \theta y|)^{\frac{1}{4}} dx d\theta \\ &\stackrel{(F)}{\leq} \int_0^1 \sum_{j \leq k} 2^{-k+1} \widetilde{C}_n A 2^j d\theta \leq C'_n A, \end{aligned}$$

其中 (E) 考虑到了 $|y| \leq 2^{-k+1}$ 与 $1 \leq (1+2^j|x - \theta y|)^{\frac{1}{4}}$; (F) 是(5.65)式. 至此即知 K 满足 Hörmander 条件, 因此由一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 即得算子 $f \mapsto (\widehat{f}m)^\vee$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 时所希望得到的算子范数上界, m 的 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 范数估计顺势即得. $\square$

例 5.7 设 m 是定义在原点外的光滑函数, 且它是复数阶齐次函数, 亦即存在 $\tau \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $\lambda > 0$ 有

$$m(\lambda\xi) = \lambda^{i\tau} m(\xi). \quad (5.70)$$

则 m 在 $1 < p < \infty$ 时是 L^p 乘子. 这是因为在(5.70)式两端作用 ∂_ξ^α 可得

$$\lambda^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha m(\lambda\xi) = \lambda^{i\tau} \partial_\xi^\alpha m(\xi).$$

取 $\lambda = |\xi|^{-1}$ 并令 $C_\alpha = \sup_{|\theta|=1} |\partial^\alpha m(\theta)|$ 即得条件(5.63). 这种函数的一个确切例子为 $m(\xi) = |\xi|^{i\tau}$. 这种情况的

另一例为

$$m_0(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \frac{\xi_1^2 + \xi_2^2}{\xi_1^2 + i(\xi_2^2 + \xi_3^2)},$$

它是零阶齐次函数, 且在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑.

例 5.8 设 z 是满足 $\operatorname{Re} z \geq 0$ 的复数, 则定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数

$$m_1(\xi) = \left(\frac{|\xi|^2}{1 + |\xi|^2} \right)^z, \quad m_2(\xi) = \left(\frac{1}{1 + |\xi|^2} \right)^z$$

在 $1 < p < \infty$ 时都是 L^p 乘子. 为证明关于 m_1 的这一断言, 我们可以验证条件(5.63). 为此考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的函数

$$M_1(\xi_1, \dots, \xi_n, t) = \left(\frac{|\xi_1|^2 + \dots + |\xi_n|^2}{t^2 + |\xi_1|^2 + \dots + |\xi_n|^2} \right)^z = \left(\frac{|\xi|^2}{t^2 + |\xi|^2} \right)^z,$$

其中 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$. 显见 M 是零阶齐次函数, 且在 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上光滑. 通过计算可知其导函数 $\partial^\beta M_1$ 是 $-|\beta|$ 阶齐次函数, 且由前述例子可知 $|\partial^\beta M_1(\xi, t)| \leq C_\beta |(\xi, t)|^{-|\beta|}$, 其中 $C_\beta = \sup_{|\theta|=1} |\partial^\beta M_1(\theta)|$, $(\xi, t) \neq 0$, 且 β 是有 $n+1$ 个分量的多重指标. 特别取 $\beta = (\alpha, 0)$ 知

$$|\partial_{\xi_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{\xi_n}^{\alpha_n} M_1(\xi_1, \dots, \xi_n, t)| \leq \frac{C_\alpha}{(t^2 + |\xi|^2)^{\frac{|\alpha|}{2}}},$$

取 $t = 1$ 即得 $|\partial^\alpha m_1(\xi)| \leq C_\alpha (1 + |\xi|^2)^{-\frac{|\alpha|}{2}} \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}$.

对 m_2 而言, 考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的函数

$$M_2(\xi_1, \dots, \xi_n, t) = \left(\frac{1}{t^2 + |\xi_1|^2 + \dots + |\xi_n|^2} \right)^z,$$

显见其为 $-2z$ 阶函数, 因此其导函数 $\partial^\beta M_2$ 是 $-|\beta| - 2z$ 阶齐次函数, 从而对任意 $n+1$ 维多重指标 β 有 $|\partial^\beta M_2(\xi, t)| \leq C_\beta |(\xi, t)|^{-|\beta| - 2\operatorname{Re} z}$. 特别取 $\beta = (\alpha, 0)$ 知

$$|\partial_{\xi_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{\xi_n}^{\alpha_n} M_2(\xi_1, \dots, \xi_n, t)| \leq \frac{C_\alpha}{(t^2 + |\xi|^2)^{\frac{|\alpha|}{2} + \operatorname{Re} z}},$$

再取 $t = 1$ 即得 $|\partial^\alpha m_2(\xi)| \leq C_\alpha (1 + |\xi|^2)^{-\frac{|\alpha|}{2}} \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}$, 其中第一个不等式是因为 $\operatorname{Re} z \geq 0$.

在本节末, 我们来比较 Marcinkiewicz 乘子定理 5.5, 5.6 与 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7. 在 $n = 1$ 时, 因为

$$\int_{2^j < |\xi| < 2^{j+1}} |m'(\xi)| d\xi \leq 2^{\frac{j}{2}} \left(\int_{2^j < |\xi| < 2^{j+1}} |m'(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

故

$$2^{\frac{j}{2}} \left(\int_{2^j < |\xi| < 2^{j+1}} |m'(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} < \infty \Rightarrow \int_{2^j < |\xi| < 2^{j+1}} |m'(\xi)| d\xi < \infty.$$

这表明 Marcinkiewicz 乘子定理的条件(5.5)要弱于 Mihlin-Hörmander 乘子定理的条件(5.61), 也就是说 Marcinkiewicz 乘子定理本身强于 Mihlin-Hörmander 乘子定理. 同时注意一维情况下 Marcinkiewicz 乘子定理 5.5 并不要求乘子 m 在 $\pm 2^j$ 这些点处可微. 但在高维情况下, 这两个定理互不蕴含. 在高维版本的 Marcinkiewicz 乘子定理 5.6 中, 乘子 m 可以在某个零测集上奇异, 但必须关于每个变量可微, 也就是说它至少在该零测集的补集上是 C^n 函数; 而在高维版本的 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7 中, 乘子 m 最多只能在原点处奇异, 但它只需要成为 $C^{[\frac{n}{2}]+1}$ 函数即可, 这一正则性要求几乎是把 Marcinkiewicz 乘子定理的要求减半了. 需要注意的是, 这两个定理都有各自的缺陷. 准确来说, 他们都不是 L^p 敏感的, 亦即它们不能用来分辨 m 在哪些 L^p 空间中是有界乘子, 又在哪些 L^p 空间中不是有界乘子.

注 因为 Mihlin-Hörmander 乘子定理具有很好验证的衰减条件(5.63), 所以在乘子性质很好时一般我们都是用这一定理给出对应算子的 L^p 估计. 下面给出一例:

命题 5.3

设 $\widehat{\zeta}(\xi)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中支在原点外的紧支光滑函数, a_j 是有界的复数列, 则函数

$$m(\xi) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} a_j \widehat{\zeta}(2^j \xi)$$

在 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)(1 < p < \infty)$ 中.

证明 因为 $\widehat{\zeta}$ 紧支且支在 origin 外, 故可设 $0 < R_1 < R_2$ 使得 $\text{supp } \widehat{\zeta}$ 紧包含于环 $R_1 < |\xi| < R_2$ 中. 现在需要验证 Mihlin-Hörmander 乘子定理的条件(5.63), 为此取 $\xi_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 在考虑 $m(\xi)$ 在 ξ_0 处的微分时, 可取 ξ_0 的一个小邻域 U_{ξ_0} , 由 $\text{supp } \widehat{\zeta} \subset \{R_1 < |\xi| < R_2\}$ 可知和式 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} a_j \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi)$ 在 U_{ξ_0} 内只有有限项非零. 准确来说, 通过设置 U_{ξ_0} 的大小, 可使 $\widehat{\zeta}(2^{-j}\xi_0)$ 只有在指标 j 满足 $R_1 < |2^{-j}\xi_0| < R_2$ (亦即 $\frac{|\xi_0|}{R_2} < 2^j < \frac{|\xi_0|}{R_1}$) 时非零. 因此在 $\xi \in U_{\xi_0}$ 处求导并将求导与有限和交换可得

$$\partial^\alpha \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} a_j \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi) \right) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} a_j 2^{-j|\alpha|} \partial^\alpha (\widehat{\zeta})(2^{-j}\xi).$$

令 $\xi = \xi_0$ 可得

$$\left| \partial^\alpha \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} a_j \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi_0) \right) \right| = \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}} a_j 2^{-j|\alpha|} \partial^\alpha (\widehat{\zeta})(2^{-j}\xi_0) \right|.$$

因为和式是有限和, 且指标 j 满足 $\frac{|\xi_0|}{R_2} < 2^j < \frac{|\xi_0|}{R_1}$ (这说明指标一共有 $C(1 + \log \frac{R_2}{R_1})$ 个, 其中 C 是常数), 故

$$|(\partial^\alpha m)(\xi_0)| \lesssim \left(1 + \log \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\sup_{k \in \mathbb{Z}} |a_k|\right) \|\partial^\alpha (\widehat{\zeta})\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \left(\frac{R_2}{|\xi_0|}\right)^{-|\alpha|},$$

此即

$$|(\partial^\alpha m)(\xi)| \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n.$$

由 Mihlin-Hörmander 乘子定理即得欲证. □

利用上述命题, 可以进一步得到下述关于极大算子的结果:

命题 5.4

设 $\widehat{\zeta}(\xi)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上支在 origin 外的紧支光滑函数, 记 $\Delta_j^\zeta(f) = (\widehat{f}(\xi) \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi))^\vee$, 则算子

$$f \mapsto \sup_{N \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{j < N} \Delta_j^\zeta(f) \right|$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)(1 < p < \infty)$ 上有界.

证明 取 Schwartz 函数 φ 满足 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 时 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi}(2^{-j}\xi) = 1$, 且 $\text{supp } \widehat{\varphi} \subset \{\frac{6}{7} \leq |\xi| \leq 2\}$, 记 $\Delta_j^\varphi(f) = (\widehat{f}(\xi) \widehat{\varphi}(2^{-j}\xi))^\vee$, 则

$$(\Delta_k^\varphi \Delta_j^\zeta(f))^\wedge = \widehat{f}(\xi) \widehat{\varphi}(2^{-k}\xi) \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi).$$

为使 $(\Delta_k^\varphi \Delta_j^\zeta(f))^\wedge \neq 0$, 注意到 $\text{supp } \widehat{\zeta}$ 能被某不包含 origin 的环 $\{c_1 \leq |\xi| \leq c_2\}$ 所囊括, 故至少需要

$$\begin{cases} \frac{6}{7} \leq |2^{-k}\xi| \leq 2, \\ c_1 \leq |2^{-j}\xi| \leq c_2. \end{cases}$$

为使 $(\Delta_k^\varphi \Delta_j^\zeta(f))^\wedge$ 不至于恒为零, 我们便要求

$$\begin{cases} 2^j c_1 \leq 2^{k+1} \\ \frac{6}{7} \times 2^k \leq 2^j c_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{c_1}{2} \leq 2^{k-j} \leq \frac{7}{6} c_2.$$

这说明存在 $c_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $|j - k| > c_0$ 时必有 $(\Delta_k^\varphi \Delta_j^\zeta(f))^\wedge = 0 \Rightarrow \Delta_k^\varphi \Delta_j^\zeta = 0$.

至此有

$$\sum_{j < N} \Delta_j^\zeta = \sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \sum_{j < N} \Delta_j^\zeta = \sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\zeta - \sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \sum_{j \geq N} \Delta_j^\zeta,$$

对于上右式第一项中的算子 $\sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi$, 因为本身 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi}(2^{-j}\xi) = 1$, 故该算子对应的乘子 $\sum_{k < N+c_0} \widehat{\varphi}(2^{-j}\xi)$

至少是一个关于 ξ 的函数, 且根据 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 知 $\sum_{k < N+c_0} \widehat{\varphi}(2^{-j}\xi)$ 可被某正递减可积径向函数 Φ 控制¹⁰, 进而根据推论 3.2 知

$$\left| \sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\zeta(f) \right) \right| \leq C_\Phi M \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\zeta(f) \right),$$

两边同取 L^p 范数, 对于上右式首先应用 Hardy-Littlewood 极大函数的 L^p 有界性 3.5, 再在命题 5.3 中令 $a_j = 1$ 即得 $\sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\zeta(f) \right)$ 的 L^p 有界性.

至此只需证明算子

$$f \mapsto \sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \left(\sum_{j \geq N} \Delta_j^\zeta(f) \right)$$

的 L^p 有界性即可. 根据前面谈到的支集性质有

$$\sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \left(\sum_{j \geq N} \Delta_j^\zeta(f) \right) = \sum_{k < N+c_0} \Delta_k^\varphi \left(\sum_{\substack{j \geq N \\ |j-k| \leq c_0}} \Delta_j^\zeta(f) \right) = \sum_{N-c_0 \leq k \leq N+c_0} \Delta_k^\varphi \left(\sum_{N \leq j \leq k+c_0} \Delta_j^\zeta(f) \right),$$

可见上面最右端的和式中至多有 c_0^2 项. 通过与前文相同的讨论知和式中的每一项均形如 $\Delta_k^\varphi \Delta_j^\zeta(f)$, 且这些项均被 f 的 Hardy-Littlewood 极大函数的某常数倍控制. 因此可得和式的下述控制

$$\sup_{N \in \mathbb{Z}} \sum_{N-c_0 \leq k < N+c_0} \sum_{N \leq j \leq k+c_0} c M(f) \leq c_0^2 c M(f),$$

因此该算子同样是 L^p 有界的, 至此即得欲证. $\square$

上述证明的脉络值得重新梳理一遍: 为了证明极大算子的有界性, 首先想到套用命题 5.3, 但命题 5.3 谈论的是对全体 $j \in \mathbb{Z}$ 求和的情况, 所以需要把极大算子中的 $\sum_{j < N}$ 分解为 $\sum_{j \in \mathbb{Z}}$ 和 $\sum_{j \geq N}$, 此时主要问题都出现在 $\sum_{j \geq N}$ 这一部分, 它作为无限和没法简单地用一致控制来估计. 为了解决无限和的技术难题, 我们引入新的算子 Δ_j^φ , 用这一算子与后面将要提及的几乎正交原理的想法将 $\sum_{j > N}$ 这一无限和变为有限和, 进而完成证明.

最后我们预备一个后面将要用到的命题:

命题 5.5

设 Schwartz 函数 Ψ 满足 $\widehat{\Psi}$ 是实值紧支函数, $0 \notin \text{supp } \widehat{\Psi}$, 且

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \xi \neq 0.$$

设 Δ_j 是 Ψ 所诱导的 Littlewood-Paley 算子, 则对任意 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\left\| \sum_{|j| < N} \Delta_j(g) - g \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, N \rightarrow \infty.$$

这说明 Fourier 变换具有不包含原点的紧支集 (下面简称为紧支在原点外) 的 Schwartz 函数构成的集合在 $L^p(\mathbb{R}^n) (1 < p < \infty)$ 中稠密. 

证明 任取 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 与 $\varepsilon > 0$, 知存在 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|f - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$. 如果我们能在 L^p 意义下用 Fourier 变换紧支在原点外的 Schwartz 函数逼近给定的 g , 命题就得证了.

注意到对任意给定的 N 而言, 函数 $\sum_{|j| < N} \Delta_j(g)$ 本身是 Schwartz 函数的有限和, 因此它依旧是 Schwartz 函数. 由 $0 \notin \text{supp } \widehat{\Psi}$ 可知该函数的 Fourier 变换紧支在原点外, 同时由 Fourier 反演公式显见

$$g(x) - \sum_{|j| < N} \Delta_j(g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{|j| \geq N} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \right) \widehat{g}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi.$$

因为 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1 (\xi \neq 0)$, 故由 Lebesgue 控制收敛定理知 $g(x) - \sum_{|j| < N} \Delta_j(g)(x)$ 在 $N \rightarrow \infty$ 时 a.e. 趋于零. 又根据命题 5.4 知 $|g| + \sup_{N > 0} \left| \sum_{|j| < N} \Delta_j(g) \right| \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \sum_{|j| < N} \Delta_j(g)(x) - g(x) \right|^p dx = 0.$$

¹⁰在近处由 $\text{supp } \widehat{\varphi}$ 的构造知该乘子是衰减的, 在远处由 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 知该乘子同样衰减, 因此可以构造这样的控制函数.

命题即证. □

5.1.5 Littlewood-Paley 定理的应用

现在我们来研究 Littlewood-Paley 定理的一些重要应用, 其中我们特别关注奇异算子与极大算子上界的确定, 这些上界是通过用二次表达式控制对应算子达到的.

5.1.5.1 极大算子的估计

控制极大算子 $\sup_k |T_k(f)|$ 的一种方法是通过引入一个好的平均函数 φ , 考察下述优化

$$\begin{aligned} \sup_k |T_k(f)| &\leq \sup_k |T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}}| + \sup_k |f * \varphi_{2^{-k}}| \\ &\leq \left(\sum_k |T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + C_\varphi M(f), \end{aligned} \quad (5.71)$$

其中 C_φ 是依赖于 φ 的常数. 我们用这一想法证明下述定理:

定理 5.8

设 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界函数, 它在原点的某邻域内是 C^1 的, 满足 $m(0) = 1$, 且存在 $C, \varepsilon > 0$ 使得 $|m(\xi)| \leq C|\xi|^{-\varepsilon}$ 对全体 $\xi \neq 0$ 均成立. 对每个 $k \in \mathbb{Z}$ 定义 $T_k(f)(x) = (\widehat{f}(\xi)m(2^{-k}\xi))^\vee(x)$, 则存在常数 C_n 使得对 $\mathbb{R}^n$ 上的任意 L^2 函数有

$$\left\| \sup_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f)| \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C_n \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.72)$$

证明 取 Schwartz 函数 φ 满足 $\widehat{\varphi}(0) = 1$. 根据 Schwartz 函数的衰减性值存在正常数 C_1 使得在 ξ 远离 0 时有 $|m(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi)| \leq C_1|\xi|^{-\varepsilon}$, 又根据 m 与 $\widehat{\varphi}$ 在 0 处的连续性知存在正常数 C_2 使得在 ξ 靠近 0 时有 $|m(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi)| \leq C_2|\xi|$. 这两个不等式说明

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |m(2^{-j}\xi) - \widehat{\varphi}(2^{-j}\xi)|^2 \leq C_3 < \infty.$$

由此及 Young 不等式立得算子

$$f \mapsto \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

的 L^2 有界性. 又由(5.71)式与 Hardy-Littlewood 极大函数的 L^2 有界性可知

$$\left\| \sup_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f)| \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \left\| \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} + C_\varphi \|M(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \lesssim_n \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

此即(5.72)式. □

如果 $m(\xi)$ 是各边平行于坐标轴的矩体的示性函数, 则上述结果还能延拓到 L^p 中:

定理 5.9

设 $1 < p < \infty$, U 是包含原点的 n 个开区间的直积. 对每个 $k \in \mathbb{Z}$ 定义 $T_k(f)(x) = (\widehat{f}(\xi)\chi_U(2^{-k}\xi))^\vee(x)$, 则存在常数 $C_{p,n}$ 使得对 $\mathbb{R}^n$ 上的全体 L^p 函数 f 有

$$\left\| \sup_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f)| \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,n} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

证明 现取定内部包含 U 的边界的开环 A 并取紧支光滑函数 $\widehat{\psi}$, 使其在原点某邻域与无穷点某邻域中为零, 且在

环 A 上恒为 1. 显见函数 $\widehat{\varphi} = (1 - \widehat{\psi})\chi_U$ 是 Schwartz 函数. 因为 $\chi_U = \chi_U \widehat{\psi} + \widehat{\varphi}$, 故对全体 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} T_k(f) &= T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}} + f * \varphi_{2^{-k}} \\ &= (\widehat{f}(\xi)\chi_U(2^{-k}\xi))^\vee - (\widehat{f}\widehat{\varphi_{2^{-k}}})^\vee + f * \varphi_{2^{-k}} \\ &= (\widehat{f}(\xi)\chi_U(2^{-k}\xi)\widehat{\psi_{2^{-k}}})^\vee + f * \varphi_{2^{-k}} = T_k(f * \psi_{2^{-k}}) + f * \varphi_{2^{-k}}. \end{aligned}$$

在上式两端对 k 取上确界, 由推论 3.2 可得

$$\sup_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f)| \leq \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + C_\varphi M(f). \quad (5.73)$$

其中算子 $f \mapsto T_k(f * \psi_{2^{-k}})$ 依照前述过程已知可表为 $f \mapsto (\widehat{f}(\xi)\chi_U(2^{-k}\xi)\widehat{\psi}(2^{-k}\xi))^\vee = (\widehat{f}(\xi)\chi_{2^k U}(\xi)\widehat{\psi}(2^{-k}\xi))^\vee$. 现在因为 $\{2^k U\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是各边平行于坐标轴的可测矩体族, 故由引理 5.2 知

$$\left\| \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |T_k(f) - f * \varphi_{2^{-k}}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,n} \left\| \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |f * \psi_{2^{-k}}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.74)$$

又因为 $f * \psi_{2^{-k}} = \Delta_j^\psi(f)$, 故由 Littlewood-Paley 定理的结论 (5.13) 知 (5.74) 右式被 $\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$ 的某常数倍控制. 因此在 (5.73) 式两端同取 L^p 范数, 利用平方函数的 L^p 估计即得欲证. $\square$

Carleson-Hunt 定理的下述截断版本是 Littlewood-Paley 定理这一强力工具的另一体现:

推论 5.3

(a) 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含原点的开集, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{2^k \Omega} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi = f(x)$$

对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$ 成立.

(b) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$), 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\substack{|\xi_j| < 2^k \\ j=1, \dots, n}} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi = f(x)$$

对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$ 成立.



证明 欲证的两个极限式在 f 是 Schwartz 函数时都是 a.e. 存在的. 为说明它们对 L^p 中一般的 f 的 a.e. 收敛性, 我们考虑算子族的点态收敛定理 3.2, 这便需要给出极大算子的 L^p 估计. 对 (a) 来说, 需要的估计可在定理 5.72 中令 $m = \chi_\Omega$ 得到; 对 (b) 来说, 需要的估计可由定理 5.9 得到. $\square$

5.1.5.2 具粗糙核的奇异积分的估计

下面介绍 Littlewood-Paley 定理另一考虑奇异积分的应用.

定理 5.10 (粗糙核奇异积分的 L^p 有界性)

设 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支有限 Borel 测度, 且存在 $b < 0$ 使得对全体 $\xi \neq 0$ 都有 $|\widehat{\mu}(\xi)| \leq B \min(|\xi|^{-b}, |\xi|^b)$. 定义测度 μ_j 为 $\widehat{\mu_j}(\xi) = \widehat{\mu}(2^{-j}\xi)$, 则算子

$$T_\mu(f)(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (f * \mu_j)(x)$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < \infty$) 上有界.



证明 我们 (理所当然地) 从 T_μ 的 L^2 有界性开始. 通过 $\widehat{\mu}$ 已知的估计可得

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\mu}(2^{-j}\xi)| \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} B \min(|2^{-j}\xi|^b, |2^{-j}\xi|^{-b}) \leq C_b B < \infty. \quad (5.75)$$

由 Young 不等式与 (5.75) 式立得 T_μ 的 L^2 有界性.

下面证明 $1 < p < \infty$ 时 T_μ 的 L^p 有界性. 取定径向 Schwartz 函数 ψ , 令 $\text{supp } \widehat{\psi} \subset \{\frac{1}{2} < |\xi| < 2\}$, 且在 $\xi \neq 0$

时有

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\psi}(2^{-j}\xi) = 1. \quad (5.76)$$

记 $\psi_{2^{-k}}(x) = 2^{kn}\psi(2^k x)$, 则 $\widehat{\psi_{2^{-k}}}(\xi) = \widehat{\psi}(2^{-k}\xi)$, 另注意到根据(5.76)式有

$$\left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \mu_j * \psi_{2^{-j-k}} \right)^\wedge = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\mu_j} \widehat{\psi_{2^{-j-k}}} = \widehat{\mu_j},$$

故

$$\mu_j = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mu_j * \psi_{2^{-j-k}}.$$

现定义算子 S_k 为

$$S_k(f) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\mu_j * \psi_{2^{-j-k}}) * f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\mu * \psi_{2^{-k}})_{2^{-j}} * f.$$

则对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$T_\mu(f) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \mu_j * f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (\mu_j * \psi_{2^{-j-k}}) * f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} S_k(f).$$

因此只需说明 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} S_k$ 的 L^p 有界性即可. 我们从每个 S_k 的 L^2 有界性开始研究. 因为乘积 $\widehat{\psi_{2^{-j-k}}} \widehat{\psi_{2^{-j'-k}}}$ 仅在 $j' \in \{j-1, j, j+1\}$ 时非零, 故

$$\begin{aligned} \|S_k(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\mu * \psi_{2^{-k}})_{2^{-j}} * f \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &\leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|((\mu * \psi_{2^{-k}})_{2^{-j}})^\wedge \widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|(\mu * \psi_{2^{-k}})^\wedge (2^{-j}\xi) \widehat{f}(\xi)\|_{L_\xi^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|\widehat{\mu}(2^{-j}\xi) \widehat{\psi}(2^{-j-k}\xi) \widehat{f}(\xi)\|_{L_\xi^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{\mu_j}(\xi) \widehat{\psi}(2^{-j-k}(\xi))|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{j' \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{\mu_j}(\xi) \widehat{\mu_{j'}}(\xi) \widehat{\psi}(2^{-j-k}\xi) \widehat{\psi}(2^{-j'-k}\xi)| |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C_1 \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{j'=j-1}^{j+1} \int_{|\xi| \approx 2^{j+k}} |\widehat{\mu_j}(\xi) \widehat{\mu_{j'}}(\xi)| |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq C_2 \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{|\xi| \approx 2^{j+k}} B^2 \min(|2^{-j}\xi|^b, |2^{-j}\xi|^{-b})^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\stackrel{(B)}{\leq} C_3^2 B^2 2^{-2|k|b} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{|\xi| \approx 2^{j+k}} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &= C_3^2 B^2 2^{-2|k|b} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $\text{supp } \widehat{\psi_{2^{-j-k}}} \subset \{2^{j+k-1} < |\xi| < 2^{j+k+1}\}$, 这才有 $|\xi| \approx 2^{j+k}$; (B) 是因为 $|\xi| \approx 2^{j+k} \Rightarrow |2^{-j}\xi| \approx 2^k$, 而 $\min(2^{kb}, 2^{-kb})^2 = 2^{-2|k|b}$. 至此即知对全体 $k \in \mathbb{Z}$ 与全体 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|S_k(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C_3 B 2^{-b|k|} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \quad (5.77)$$

对于 S_k 的 L^p 有界性, 考虑使用一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理4.9, 这便需要验证尺寸条件(4.94)与 Hör-

mander 条件(4.103). 针对尺寸条件(4.94), 知对任意 $R > 0$ 有

$$\begin{aligned} \int_{R \leq |x| \leq 2R} \sum_{j \in \mathbb{Z}} |(\mu * \psi_{2^{-k}})_{2^{-j}}(x)| dx &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{2^j R \leq |x| \leq 2^{j+1} R} |(\mu * \psi_{2^{-k}})(x)| dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |(\mu * \psi_{2^{-k}})(x)| dx \leq \|\mu\| \|\psi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

尺寸条件(4.94)因而成立.

下面说明每个 S_k 的卷积核都满足常数至多为 $(1 + |k|)$ 某常数倍的 Hörmander 条件. 取定 $y \neq 0$, 知

$$\begin{aligned} &\int_{|x| \geq 2|y|} \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}} ((\mu * \psi_{2^{-k}})_{2^{-j}}(x - y) - (\mu * \psi_{2^{-k}})_{2^{-j}}(x)) \right| dx \\ &\leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{|x| \geq 2|y|} 2^{jn} |(\mu * \psi_{2^{-k}})(2^j x - 2^j y) - (\mu * \psi_{2^{-k}})(2^j x)| dx = \sum_{j \in \mathbb{Z}} I_{j,k}(y), \end{aligned}$$

其中

$$I_{j,k}(y) = \int_{|x| \geq 2^{j+1}|y|} |(\mu * \psi_{2^{-k}})(x - 2^j y) - (\mu * \psi_{2^{-k}})(x)| dx.$$

由 Young 不等式可知 $I_{j,k}(y) \leq C_4 \|\mu\|_{\mathcal{M}}$. 设 $|\mu|$ 是 μ 的全变差, 为得到 $I_{j,k}(y)$ 的更精细估计, 考虑:

$$\begin{aligned} I_{j,k}(y) &\leq \int_{|x| \geq 2^{j+1}|y|} \int_{\mathbb{R}^n} |\psi_{2^{-k}}(x - 2^j y - z) - \psi_{2^{-k}}(x - z)| d|\mu|(z) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} 2^{kn} \int_{|x| \geq 2^{j+1}|y|} |\psi(2^k x - 2^k z - 2^{j+k} y) - \psi(2^k x - 2^k z)| dx d|\mu|(z) \\ &\leq C_5 \int_{|x| \geq 2^{j+1}|y|} \int_{\mathbb{R}^n} 2^{kn} 2^{j+k} |y| |\nabla \psi(2^k x - 2^k z - \theta)| d|\mu|(z) dx \\ &\leq C_6 2^{j+k} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{|x| \geq 2^{j+1}|y|} 2^{kn} |y| (1 + |2^k x - 2^k z - \theta|)^{-n-2} dx d|\mu|(z) \\ &= C_6 2^{j+k} |y| \int_{\mathbb{R}^n} \int_{|x| \geq 2^{j+k+1}|y|} (1 + |x - 2^k z - \theta|)^{-n-2} dx d|\mu|(z), \end{aligned}$$

其中 $|\theta| \leq 2^{j+k}|y|$. 注意到 θ 依赖于 j, k, y , 由此与 $I_{j,k}(y) \leq C_4 \|\mu\|_{\mathcal{M}}$ 知

$$I_{j,k}(y) \leq C_7 \|\mu\|_{\mathcal{M}} \min(1, 2^{j+k}|y|), \quad \forall j, k, \forall y \neq 0. \quad (5.78)$$

为了进一步估计上式最后出现的二重积分, 我们考虑两种情况: $|x| \geq 2^{k+2}|z|$ 与 $|x| < 2^{k+2}|z|$. 在第一种情况中结合 $|x| \geq 2^{j+k+1}|y|$ 可得 $|x - 2^k z - \theta| \geq \frac{1}{4}|x|$; 在第二种情况中设 $\text{supp } \mu \subset B(0, R)$, 有 $|x| \leq 2^{k+2}R$. 将这两式代入前述二重积分可得在 $2^j|y| \geq 2R$ 时有:

$$\begin{aligned} I_{j,k}(y) &\leq C_8 2^{j+k} |y| \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\substack{|x| \geq 2^{j+k+1}|y| \\ |x| \geq 2^{k+2}|z|}} \frac{dx}{(1 + \frac{1}{4}|x|)^{n+2}} + \int_{\substack{|x| \geq 2^{j+k+1}|y| \\ |x| < 2^{k+2}R}} dx \right] d|\mu|(z) \\ &\leq C_9 2^{j+k} |y| \|\mu\|_{\mathcal{M}} \left[\frac{1}{(2^{j+k}|y|)^2} + 0 \right] = C_9 (2^{j+k}|y|)^{-1} \|\mu\|_{\mathcal{M}}. \end{aligned}$$

将上述估计与(5.78)式结合可得

$$I_{j,k}(y) \leq C_{10} \|\mu\|_{\mathcal{M}} \begin{cases} \min(1, 2^{j+k}|y|), & \forall j, k, y, \\ (2^{j+k}|y|)^{-1}, & 2^j|y| \geq 2R. \end{cases} \quad (5.79)$$

下面估计 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} I_{j,k}(y)$. 当 $2^k \geq (2R)^{-1}$ 时由(5.79)式知

$$\begin{aligned} \sum_{j \in \mathbb{Z}} I_{j,k}(y) &\leq C_{10} \|\mu\|_{\mathcal{M}} \left[\sum_{2^j \leq \frac{1}{2^k|y|}} 2^{j+k}|y| + \sum_{\frac{1}{2^k|y|} \leq 2^j \leq \frac{2R}{|y|}} 1 + \sum_{2^j \geq \frac{2R}{|y|}} (2^{j+k}|y|)^{-1} \right] \\ &\leq C_{11} \|\mu\|_{\mathcal{M}} (|\log R| + |k|). \end{aligned}$$

细节上, $\sum_{2^j \leq \frac{1}{2^k|y|}} 2^{j+k}|y|$ 和 $\sum_{2^j \geq \frac{2R}{|y|}} (2^{j+k}|y|)^{-1}$ 作为等比数列求和, 其结果均被某与 j, k, y 均无关的常数控制,

而 $\sum_{\frac{1}{2^k|y|} \leq 2^j \leq \frac{2R}{|y|}} 1$ 被 $[\log R] + |k|$ 的某常数倍控制. 在 $2^k < (2R)^{-1}$ 时, 同样由(5.79)式知

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} I_{j,k}(y) \leq C_{10} \|\mu\|_{\mathcal{M}} \left[\sum_{2^j \leq \frac{1}{2^k|y|}} 2^{j+k}|y| + \sum_{2^j \geq \frac{1}{2^k|y|}} (2^{j+k}|y|)^{-1} \right] \leq C_{12} \|\mu\|_{\mathcal{M}},$$

细节上, 根据 2^k 的设置知 $2^j|y| \geq 2^{-k} > 2R$, 因此针对 $\sum_{2^j \geq \frac{1}{2^k|y|}} (2^{j+k}|y|)^{-1}$ 是可以代入(5.79)式中 $2^j|y| \geq 2R$ 这一情况的. 至此可得

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} I_{j,k}(y) \leq C_{13} \|\mu\|_{\mathcal{M}} (1 + |k|), \quad (5.80)$$

其中 C_{13} 式依赖于维数 n 与 R 的常数. 至此我们便说明了 S_k 的卷积核都满足 Hörmander 条件, 于是由一般奇异积分算子 L^p 有界性延拓定理 4.9 知每个 S_k 都是 $L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 的, 且它在其上的算子范数至多为

$$C_n(2^{-b|k|} + 1 + |k|) \|\mu\|_{\mathcal{M}} \leq C_n(2 + |k|) \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$

于是由 Marcinkiewicz 插值定理 3.4 知 S_k 以至多为 $C_{p,n} 2^{-b|k|\theta_p} (1 + |k|)^{1-\theta_p}$ 的算子范数将 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^p(\mathbb{R}^n)$ (其中 $1 < p < 2$, $\frac{1}{p} = \frac{\theta_p}{2} + 1 - \theta_p$). 最后对 $k \in \mathbb{Z}$ 求和即知 T_μ 是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < 2$) 的. T_μ 在 $p > 2$ 时的有界性由对偶性即得. $\square$

5.1.5.3 L^p 上的几乎正交原理

设 T_j 是乘子算子列, 其定义为 $T_j(f) = (\widehat{f} m_j)^\vee$, 其中 m_j 是乘子. 如果函数 m_j 的支集两两不交, 且这些函数关于 j 一致有界, 根据支集的不交性带来的正交性可知算子

$$T = \sum_{j \in \mathbb{Z}} T_j$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界. 下面的定理给出了这一结果的 L^p 版本.

定理 5.11 (几乎正交原理)

设 $1 < p \leq 2 \leq q < \infty$. 设 m_j 是支在环 $2^{j-1} \leq |\xi| \leq 2^{j+1}$ 上的 Schwartz 函数, 记 $T_j(f) = (\widehat{f} m_j)^\vee$. 另设 T_j 是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 的一致有界算子列, 即

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} \|T_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} = A < \infty,$$

则对每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 级数

$$T(f) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} T_j(f)$$

都在 L^q 范数下收敛, 且存在常数 $C_{p,q,n} < \infty$ 使得

$$\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,q,n} A. \quad (5.81) \quad \heartsuit$$

证明 取定径向 Schwartz 函数 φ , 令 $\widehat{\varphi}$ 是实值函数, 在环 $\frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2$ 上 $\widehat{\varphi} \equiv 1$, 且在环 $\frac{1}{4} \leq |\xi| \leq 4$ 之外 $\widehat{\varphi}$ 恒为零. 设 $\varphi_{2^{-j}}(x) = 2^{jn} \varphi(2^j x)$, 则 $\widehat{\varphi_{2^{-j}}}$ 在每个对应的 m_j 的支集上均恒为 1. 记 $\Delta_j(f) = f * \varphi_{2^{-j}}$, 观察到对任意 $j \in \mathbb{Z}$ 均有

$$T_j = \Delta_j T_j \Delta_j,$$

这是因为

$$(\Delta_j T_j \Delta_j)(f) = \Delta_j((\widehat{f} \widehat{\varphi_{2^{-j}}} m_j)^\vee) = (\widehat{f} \widehat{\varphi_{2^{-j}}}^2 m_j)^\vee = (\widehat{f} m_j)^\vee = T_j.$$

现对正整数 N , 记

$$T^N = \sum_{|j| \leq N} \Delta_j T_j \Delta_j.$$

取定 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 由 $T_j : L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 与 T^N 是有限和知对每个 N 而言, $T^N(f)$ 都是 L^q 函数. 根据(5.33)式

可知

$$\begin{aligned}
\|T^N(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} &= \left\| \sum_{|j| \leq N} \Delta_j T_j \Delta_j(f) \right\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq C'_q \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j \Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \\
&= C'_q \left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_j \Delta_j(f)|^2 \right\|_{L^{\frac{q}{2}}(\mathbb{R}^n)}^{\frac{1}{2}} \\
&\stackrel{(A)}{\leq} C'_q \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \| |T_j \Delta_j(f)|^2 \|_{L^{\frac{q}{2}}(\mathbb{R}^n)} \right)^{\frac{1}{2}} \\
&= C'_q \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|T_j \Delta_j(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^2 \right)^{\frac{1}{2}},
\end{aligned}$$

其中 (A) 是 Minkowski 不等式, 且不等式的条件 $\frac{q}{2} \geq 1$ 是满足的. 现由算子列 T_j 在 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 时的一致有界性知

$$\begin{aligned}
C'_q \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|T_j \Delta_j(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^2 \right)^{\frac{1}{2}} &\leq C'_q A \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \|\Delta_j(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\
&= C'_q A \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \| |\Delta_j(f)|^2 \|_{L^{\frac{p}{2}}(\mathbb{R}^n)} \right)^{\frac{1}{2}} \\
&\stackrel{(B)}{\leq} C'_q A \left(\left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right\|_{L^{\frac{p}{2}}(\mathbb{R}^n)} \right)^{\frac{1}{2}} \\
&= C'_q A \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\
&\stackrel{(C)}{\leq} C'_q C_p A \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},
\end{aligned}$$

其中 (B) 是反向 Minkowski 不等式, 且不等式的条件 $\frac{p}{2} \leq 1$ 是满足的; (C) 是 Littlewood-Paley 定理. 至此即得算子 T^N 是 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 的一致有界算子.

若 $\hat{h}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的某子集内有紧支集, 则序列 $T^N(h)$ 在 N 足够大时就与 N 无关了 (因为在 N 足够大时 $\text{supp } m_j$ 已经完全囊括了 $\text{supp } \hat{h}$), 因此该序列是 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列. 又因为 h 本身是频率紧支在原点外的, 故根据命题 5.5 知所有这样的 h 构成的集合在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 将这两个结果结合, 利用 T^N 在 $L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 时的一致有界性可以证明对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 而言, 序列 $T^N(f)$ 都是 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列. 因此, 对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 而言, 序列 $\{T^N(f)\}_{N \in \mathbb{N}}$ 都在 L^q 意义下收敛到某个 $T(f)$. 由 Fatou 引理可知

$$\|T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C'_q C_p A \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

至此即得 (5.81) 式. □

5.1.6 Haar 系统, 条件期望与鞅

Littlewood-Paley 算子与概率论中的某些想法 (例如条件期望和鞅差算子) 有非常强的关联. 这里我们考虑的条件期望是关于 $\mathbb{R}^n$ 上全体二进方体的递增 σ 代数的.

5.1.6.1 条件期望与二进鞅差

我们首先回忆一下二进方体的定义.

定义 5.3 (二进区间与二进方体)

$\mathbb{R}$ 上的二进区间是形如

$$[m2^{-k}, (m+1)2^{-k})$$

的区间, 其中 m, k 都是整数. $\mathbb{R}^n$ 上的二进方体是相同长度的二进区间的直积, 也就是说它们形如

$$\prod_{j=1}^n [m_j 2^{-k}, (m_j + 1) 2^{-k}),$$

其中 $m_1, \dots, m_n, k$ 是整数.



之所以把二进区间定义成左闭右开区间, 是因为这样一来相同长度的不同二进区间就总是不交的了. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的方体 Q , 记 $|Q|$ 为其 Lebesgue 测度, $l(Q)$ 为其边长. 显见 $|Q| = l(Q)^n$, 下面介绍一些相关的记号.

定义 5.4 (等长二进方体族, 二进方体族)

对 $k \in \mathbb{Z}$, 记 $\mathcal{D}_k$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中全体边长为 2^{-k} 的二进方体. 同时记 $\mathcal{D}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的全体二进方体. 显见

$$\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k.$$

另外, $\mathbb{R}^n$ 中由 $\mathcal{D}_k$ 中诸元素的可数并与补生成的可测子集的 σ 代数 $\sigma(\mathcal{D}_k)$ 随着 k 递增而递增.



通过二进方体的定义, 很容易观察到它们具有下述性质: 对任意两个等长二进区间而言, 它们要么不交, 要么重合. 另外, 对任意两个二进区间而言, 它们要么不交, 要么其中一个包含另一个. 类似地, 对任意两个二进区间而言, 它们同样是要么不交, 要么其中一个包含另一个. 这种性质已经为它们的用处理下了伏笔.

定义 5.5 (函数在方体上的平均)

对 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数 f , 记

$$\text{Avg}_Q f = \frac{1}{|Q|} \int_Q f(t) dt$$

为 f 在方体 Q 上的平均.

**定义 5.6 (条件期望, 二进鞅差算子)**

$\mathbb{R}^n$ 上局部可积函数 f 关于由 $\mathcal{D}_k$ 生成的递增 σ 代数族 $\sigma(\mathcal{D}_k)$ 的条件期望定义为

$$E_k(f)(x) = \sum_{Q \in \mathcal{D}_k} (\text{Avg}_Q f) \chi_Q(x), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

另外定义二进鞅差算子 D_k 为:

$$D_k(f) = E_k(f) - E_{k-1}(f), \quad k \in \mathbb{Z}.$$



下面介绍 Haar 函数族.

定义 5.7 (Haar 函数族)

对二进区间 $I = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k})$ 而言, 定义 $I_L = [m2^{-k}, (m + \frac{1}{2})2^{-k})$, $I_R = [(m + \frac{1}{2})2^{-k}, (m+1)2^{-k})$ 分别是 I 的左部与右部. 函数

$$h_I(x) = |I|^{-\frac{1}{2}} \chi_{I_L} - |I|^{-\frac{1}{2}} \chi_{I_R}$$

称为区间 I 诱导的 Haar 函数.



初见 Haar 函数时可能会觉得它的定义很奇怪, 实际上 Haar 函数构造的动机是想让其 L^2 范数为 1 的同时具

有下述正交性:

$$\int_{\mathbb{R}} h_I(x) h_{I'}(x) dx = \begin{cases} 0, & I \neq I', \\ 1, & I = I'. \end{cases} \quad (5.82)$$

从 Haar 函数的构造出发容易验证 $\|h_I\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = 1$. 对于正交性, 当 $I \neq I'$, 则要么 $I \cap I' = \emptyset$ (这种情况下(5.82)式是显然的), 要么根据二进区间的性质知它们不等长, 不妨设 $|I'| < |I|$. 当 I, I' 不交时(5.82)式显然成立, 而当 I, I' 相交时, 知 I' 要么在 I 的左部, 要么在 I 的右部, 这两种情况下 h_I 都是常数, 因此由 $|I'_L| = |I'_R|$ 即知欲求积分为 0, 这便证明了(5.82)式.

回忆记号

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx$$

对平方可积函数是有意义的. 在这一记号下, (5.82)式能写成 $\langle h_I, h_{I'} \rangle = \delta_{I, I'}$, 其中 $\delta_{I, I'}$ 在 $I = I'$ 时为 1, 否则为 0.

5.1.6.2 二进鞅差与 Haar 函数的关系

在一维情况下, 二进鞅差与 Haar 函数有下述关系:

命题 5.6

对 $\mathbb{R}$ 上的任意局部可积函数 f 与任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有

$$D_k(f) = \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \langle f, h_I \rangle h_I, \quad (5.83)$$

且

$$\|D_k(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} |\langle f, h_I \rangle|^2. \quad (5.84)$$

证明 观察到 $\mathcal{D}_k$ 中的每个区间 J 都是 $\mathcal{D}_{k-1}$ 中某个唯一对应区间 I 的左部 I_L 或右部 I_R , 因此

$$\begin{aligned} E_k(f) &= \sum_{J \in \mathcal{D}_k} (\text{Avg}_J f) \chi_J \\ &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \left[\left(\frac{2}{|I|} \int_{I_L} f(t) dt \right) \chi_{I_L} + \left(\frac{2}{|I|} \int_{I_R} f(t) dt \right) \chi_{I_R} \right]. \end{aligned} \quad (5.85)$$

另一方面

$$\begin{aligned} E_{k-1}(f) &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} (\text{Avg}_I f) \chi_I \\ &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \left(\frac{1}{|I|} \int_{I_L} f(t) dt + \frac{1}{|I|} \int_{I_R} f(t) dt \right) (\chi_{I_L} + \chi_{I_R}). \end{aligned} \quad (5.86)$$

现在将(5.85), (5.86)两式作差得到

$$\begin{aligned} D_k(f) &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \left[\left(\frac{1}{|I|} \int_{I_L} f(t) dt \right) \chi_{I_L} - \left(\frac{1}{|I|} \int_{I_R} f(t) dt \right) \chi_{I_L} + \left(\frac{1}{|I|} \int_{I_R} f(t) dt \right) \chi_{I_R} - \left(\frac{1}{|I|} \int_{I_L} f(t) dt \right) \chi_{I_R} \right] \\ &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \left[\left(\frac{1}{|I|} \int_I f(t) (\chi_{I_L}(t) - \chi_{I_R}(t)) dt \right) \chi_{I_L} - \left(\frac{1}{|I|} \int_I f(t) (\chi_{I_L}(t) - \chi_{I_R}(t)) dt \right) \chi_{I_R} \right] \\ &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \left[\left(\frac{1}{|I|^{\frac{1}{2}}} \int_I f(t) h_I(t) dt \right) \chi_{I_L} - \left(\frac{1}{|I|^{\frac{1}{2}}} \int_I f(t) h_I(t) dt \right) \chi_{I_R} \right] \\ &= \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \left(\int_I f(t) h_I(t) dt \right) h_I = \sum_{I \in \mathcal{D}_{k-1}} \langle f, h_I \rangle h_I. \end{aligned}$$

此即(5.83)式. (5.84)式由(5.82)式立得. $\square$

n 维情况时, 我们有下列定理:

定理 5.12

任意 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 都可在 L^2 与 a.e. 意义下表为

$$f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} D_k(f), \quad (5.87)$$

同时

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \|D_k(f)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2. \quad (5.88)$$

另外, 在 $n = 1$ 时 f 可在 L^2 与 a.e. 意义下表为

$$f = \sum_{I \in \mathcal{D}} \langle f, h_I \rangle h_I, \quad (5.89)$$

且有

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \sum_{I \in \mathcal{D}} |\langle f, h_I \rangle|^2. \quad (5.90)$$



证明 从 Lebesgue 微分定理 3.5 的角度来看, 对给定的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 总存在 $\mathbb{R}^n$ 上的零测子集 N_f 满足对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus N_f$ 有

$$\lim_{Q_j \ni x} \text{Avg}_{Q_j} f = f(x),$$

其中 Q_j 是满足 $\bigcap_j \overline{Q_j} = \{x\}$ 的递减方体列. 同时从等长二进方体族 $\mathcal{D}_j$ 的构造可知对给定的 $x \in \mathbb{R}^n \setminus N_f$, 总存在唯一的二进方体列 $Q_j(x) \in \mathcal{D}_j$ 使得 $\bigcap_{j=0}^{\infty} \overline{Q_j(x)} = \{x\}$. 因此对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus N_f$ 均有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_j(f)(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{Q \in \mathcal{D}_j} (\text{Avg } f) \chi_Q(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} \text{Avg}_{Q_j(x)} f = f(x).$$

由此可知 $E_j(f) \rightarrow f (j \rightarrow \infty)$ 是 a.e. 的. 同时观察到因为 $|E_j(f)| \leq M_c(f)$, 其中 M_c 是关于方体的无心想大函数, 故 $|E_j(f) - f| \leq 2M_c(f)$, 因此由 Lebesgue 控制收敛定理可得 $E_j(f) \rightarrow f (j \rightarrow \infty)$ 也是 L^2 的.

下面我们研究 $j \rightarrow -\infty$ 时 $E_j(f)$ 的收敛性. 对给定的 $x \in \mathbb{R}^n$ 与 $Q_j(x)$ 有

$$|E_j(f)(x)| = |\text{Avg}_{Q_j(x)} f| \leq \left(\frac{1}{|Q_j(x)|} \int_{Q_j(x)} |f(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq 2^{\frac{jn}{2}} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad j \rightarrow -\infty.$$

又因为 $|E_j(f)| \leq M_c(f)$, 由 Lebesgue 控制收敛定理即知 $j \rightarrow -\infty$ 时 $E_j(f) \rightarrow 0$ 在 L^2 意义下成立. 为得到 (5.87) 式, 通过简单观察可知

$$\sum_{k=M}^N D_k(f) = E_N(f) - E_{M-1}(f) \rightarrow f, \quad N \rightarrow \infty, M \rightarrow -\infty$$

在 L^2 与 a.e. 意义下成立.


为证 (5.88) 式, 首先观察到可把 $D_k(f)$ 写成

$$\begin{aligned} D_k(f) &= \sum_{Q \in \mathcal{D}_k} (\text{Avg } f) \chi_Q - \sum_{R \in \mathcal{D}_{k-1}} (\text{Avg } f) \chi_R \\ &= \sum_{R \in \mathcal{D}_{k-1}} \left[\sum_{\substack{Q \in \mathcal{D}_k \\ Q \subset R}} (\text{Avg } f) \chi_Q - (\text{Avg } f) \chi_R \right] \\ &= \sum_{R \in \mathcal{D}_{k-1}} \left[\sum_{\substack{Q \in \mathcal{D}_k \\ Q \subset R}} (\text{Avg } f) \chi_Q - \frac{1}{2^n} \sum_{\substack{Q \in \mathcal{D}_k \\ Q \subset R}} (\text{Avg } f) \chi_R \right] \\ &= \sum_{R \in \mathcal{D}_{k-1}} \sum_{\substack{Q \in \mathcal{D}_k \\ Q \subset R}} (\text{Avg } f) (\chi_Q - 2^{-n} \chi_R). \end{aligned} \quad (5.91)$$

由这一等式可知对给定的 $k' > k$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} D_k(f)(x) D_{k'}(f)(x) dx = \sum_{R \in \mathcal{D}_{k-1}} \sum_{\substack{Q \in \mathcal{D}_k \\ Q \subset R}} (\text{Avg } f)_Q \sum_{R' \in \mathcal{D}_{k'-1}} \sum_{\substack{Q' \in \mathcal{D}_{k'} \\ Q' \subset R'}} (\text{Avg } f)_{Q'} \int_{\mathbb{R}^n} (\chi_Q - 2^{-n} \chi_R)(\chi_{Q'} - 2^{-n} \chi_{R'}) dx.$$

因为 $k' > k$, 故上右式中的积分只可能在 $R' \subsetneq R$ 时不为零 (否则只能有 $R' \cap R = \emptyset$), 此时存在 $Q_{R'} \in \mathcal{D}_k$ 使得 $R' \subset Q_{R'} \subsetneq R$ (见右图).



因为 $Q' \subset R'$, 故函数 $\chi_{Q'} - 2^{-n} \chi_{R'}$ 在方体 $Q_{R'}$ 上. 另外, 函数 $\chi_Q - 2^{-n} \chi_R$ 在 R 的任意子二进方体 Q (其中 $l(Q) = \frac{1}{2}l(R)$) 上均为常数, 特别有它在 $Q_{R'}$ 上也是常数, 因此要计算 $\int_{\mathbb{R}^n} (\chi_Q - 2^{-n} \chi_R)(\chi_{Q'} - 2^{-n} \chi_{R'}) dx$, 就是要在每个 $Q_{R'}$ 内计算 $\int_{Q_{R'}} (\chi_{Q'} - 2^{-n} \chi_{R'}) dx$. 因为 $|R'| = 2^n |Q'|$, 故

$$\sum_{\substack{Q' \in \mathcal{D}_{k'} \\ Q' \subset R'}} (\text{Avg } f)_{Q'} \int_{Q_{R'}} (\chi_{Q'} - 2^{-n} \chi_{R'}) dx = \sum_{\substack{Q' \in \mathcal{D}_{k'} \\ Q' \subset R'}} (\text{Avg } f)_{Q'} (|Q'| - 2^{-n} |R'|) = 0,$$

故 $\langle D_k(f), D_{k'}(f) \rangle = 0 (k \neq k')$, 由此即得(5.88)式.

最后, (5.89)式是(5.87)式的直接推论, (5.90)式是(5.88)式的直接推论. □

第二部分

现代 Fourier 分析与 Fourier 分析基础笔记

第六章 光滑性与函数空间

本章及之后的内容主要选自 [LG2]. 本章着重于通过验证函数的可微性来研究光滑性. 我们有很多办法来衡量可微性, 也有很多方法来量化光滑性. 本章我们通过 Laplace 算子来衡量光滑性, 这种方法和 Fourier 变换之间有简单的关系. 这一关系随后成为了光滑性与 Littlewood-Paley 理论之间联系的本质且深刻的基础.

为了衡量并微调光滑性, 我们需要引进一些函数空间. 本章主要研究的函数空间是 Sobolev 空间和 Lipschitz 空间.

6.1 光滑函数与缓增分布

6.1.1 模多项式的缓增分布空间

我们首先来介绍多项式空间. 记 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 为全体 n 元多项式构成的集合, 也就是形如

$$\sum_{|\beta| \leq m} c_\beta x^\beta = \sum_{\substack{\beta_j \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \\ \beta_1 + \dots + \beta_n \leq m}} c_{\beta_1, \dots, \beta_n} x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n}, \quad m \in \mathbb{N}, c_\beta \in \mathbb{C}$$

的函数构成的集合. 现在在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上定义等价关系 $\equiv$ 为

$$u \equiv v \Leftrightarrow u - v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n).$$

通过这一等价关系形成的全体等价类构成的空间记作 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)/\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 该空间称为模多项式的缓增分布空间. 为避免记号冗杂, $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 中的两个元素在同一等价类中时视作同一元素, 此时记 $u = v$ 在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 意义下成立.

定义 6.1 ($\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$)

定义 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 为 Schwartz 函数 φ 构成的空间, 其中 φ 满足对任意多重指标 γ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} x^\gamma \varphi(x) dx = 0. \quad (6.1)$$

注 条件(6.1)等价于对任意多重指标 γ 有 $\partial^\gamma(\hat{\varphi})(0) = 0$, 这是因为

$$\int_{\mathbb{R}^n} x^\gamma \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi \cdot x} x^\gamma \varphi(x) dx = (x^\gamma \varphi)^\wedge(0) = C_\gamma \partial^\gamma(\hat{\varphi})(0).$$

另外显见 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的子空间, 且它与 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有相同的拓扑.

例 6.1 设 $\eta(\xi)$ 是紧支光滑函数, 则函数 $e^{-\frac{1}{|\xi|^2}} \eta(\xi)$ 的 Fourier 逆变换在 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 内. 这是因为 $e^{-\frac{1}{|\xi|^2}} \eta(\xi)$ 在原点处的每个导数都是形如

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \partial_\xi^\beta (|\xi|^{-2}) e^{-\frac{1}{|\xi|^2}} = 0$$

的项的有限线性组合, 因此 $e^{-\frac{1}{|\xi|^2}} \eta(\xi)$ 在原点处的各阶导数均为 0, 由前述等价定义即得欲证.

命题 6.1 ($\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间)

$\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的拓扑下的共轭空间为

$$\mathcal{S}'_0(\mathbb{R}^n) = \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n).$$

证明 为了刻画 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间, 对每个 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们设 $J(u)$ 是 u 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的子空间 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 上的限制. 知 J 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'_0(\mathbb{R}^n)$ 的线性映射, 下面证明 J 的核¹正是 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$.

要确定 $\ker J$, 就是要确定使得 $J(u) = 0$ 的全体 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 而 $J(u) = 0$ 的定义为

$$\langle J(u), \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n).$$

¹也就是 $\ker J := \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : J(u) = 0\}$.

现在若 $\forall \varphi_0 \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n) (\langle u, \varphi \rangle = 0)$, 则 $\forall \varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n) (\langle \hat{u}, \varphi^\vee \rangle = 0)$, 又根据 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 的定义知 $\text{supp } \varphi^\vee \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 因此

$$\langle \hat{u}, \psi \rangle = 0, \forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \text{supp } \psi \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

这说明 $\hat{u}$ 是支在原点的分布, 进而由频率支在原点的缓增分布刻画 2.41 知 u 是多项式, 至此即知 $\ker J = \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$.

下面再说明 J 的值域 $\text{Im}(J) = \mathcal{S}'_0(\mathbb{R}^n)$. 取定 $v \in \mathcal{S}'_0(\mathbb{R}^n)$, 根据定义知 v 是 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函, $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的子空间, 且存在 Schwartz 半范的有限线性组合 p 使得对任意 $\phi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 均有 $|\langle v, \phi \rangle| \leq p(\phi)$. 因此由 Hahn-Banach 定理知 v 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上有延拓 V , 其满足对任意 $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有 $|\langle V, \Phi \rangle| \leq p(\Phi)$. 可见 $J(V) = v$, 因此 $\text{Im}(J) = \mathcal{S}'_0(\mathbb{R}^n)$, 故 J 是双射. 由此即知

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{S}'_0(\mathbb{R}^n).$$

□

由 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 共轭空间的刻画 6.1 知 $u_j \rightarrow u$ 在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的意义下成立当且仅当 $u_j, u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\langle u_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle u, \varphi \rangle, j \rightarrow \infty, \forall \varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n).$$

注意 $\mathcal{S}$ 意义下的收敛蕴含了 $\mathcal{S}_0$ 意义下的收敛, 因此 $\mathcal{S}'$ 意义下的收敛蕴含了 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 意义下的收敛.

$\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 函数的 Fourier 变换在与 $|\xi|^z (z \in \mathbb{C})$ 相乘后依旧是在零点处无穷阶衰减的光滑函数. 为说明该断言, 设 $\varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$, 首先说明 $\partial_j(|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi))(0)$ 存在. 因为 $\hat{\varphi}$ 在零点处的 Taylor 展开式中的每一项都是零, 根据 Taylor 定理可知只要 $|\xi| \leq 1$, 对任意 $M \in \mathbb{N}$ 就有 $|\hat{\varphi}(\xi)| \leq C_M |\xi|^M$. 因此, 只要 $M > 1 - \text{Re } z$, 那么 $\frac{|te_j|^z \hat{\varphi}(te_j)}{t}$ 就在 $t \rightarrow 0$ 时趋零, 其中 e_j 是第 j 个分量为 1, 其余分量均为 0 的单位向量. 这说明 $|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi)$ 在零点处的全体偏导数均存在, 且它们都等于零.

对更高阶的情况, 我们考虑归纳法, 假设 $\partial^\gamma(|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi)) = 0$, 往证 $\partial_j \partial^\gamma(|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi))(0)$ 存在且同样为零. 根据 Leibniz 法则, 我们把 $\partial^\gamma(|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi))$ 写成 $|\xi|^z$ 各阶导数与 $\hat{\varphi}(\xi)$ 各阶导数乘积的有限和. 若 $|\beta| \leq |\gamma|$, 根据前述过程知 $|\xi| \leq 1$ 时总有 $|\partial^\beta(\hat{\varphi})(\xi)| \leq C_{M,\beta} |\xi|^M (\forall M \in \mathbb{N})$. 取 $M > |\gamma| + 1 - \text{Re } z$ 并由 $|\partial^{\gamma-\beta}(|\xi|^z)| \leq C_\alpha |\xi|^{\text{Re } z - |\gamma| + |\beta|}$ 可知 $\partial_j \partial^\gamma(|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi))(0)$ 同样存在且为零.

至此我们已经证明了若 $\varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $z \in \mathbb{C}$ 也有 $(|\xi|^z \hat{\varphi}(\xi))^\vee \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$. 这便允许我们在模多项式的分布上引进算子 $\varphi \mapsto (|\cdot|^z \hat{\varphi})^\vee$, 此即下述定义.

定义 6.2

设 $s \in \mathbb{C}, u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 定义由 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 诱导的分布 $(|\xi|^s \hat{u})^\vee$ 为

$$\langle (|\cdot|^s \hat{u})^\vee, \varphi \rangle = \langle u, (|\cdot|^s \varphi^\vee)^\wedge \rangle, \forall \varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n).$$

♣

注 因为 $\varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n) \Rightarrow (|\cdot|^s \hat{\varphi})^\vee \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$, 故上述定义是合理的.

下面的命题说明 C^s 函数的无限和在某些情况下依旧是 C^s 函数.

命题 6.2 (无限和与求导换序)

设 $N \in \mathbb{N}$, $\{g_i\}_{i \in \mathbb{Z}}$ 是满足 $g_i \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$ (其中多重指标 α 满足 $|\alpha| \leq N$), 且 $\sum_{i \in \mathbb{Z}} \|\partial^\alpha g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty (\forall |\alpha| \leq N)$ 的函数列. 则函数 $g = \sum_{i \in \mathbb{Z}} g_i$ 在 $C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$ 内, 且对任意 $|\alpha| \leq N$ 均有

$$\partial^\alpha g = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \partial^\alpha g_i.$$

♠

证明 设 e_j 是第 j 个分量为 1, 其余分量为 0 的单位向量. 取 $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 知

$$\frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \frac{g_i(x + he_j) - g_i(x)}{h}.$$

因为 g_i 本身是 $C^{|\alpha|}$ 函数, 故 $\frac{g_i(x + he_j) - g_i(x)}{h}$ 在 $h \rightarrow 0$ 时点态收敛到 $\partial_j g_i(x)$. 又根据微分中值定理与 $\sum_{i \in \mathbb{Z}} \|\partial_j g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty$

∞ 可知 $\frac{g_i(x+he_j)-g_i(x)}{h}$ 被 $\|\partial_j g_j\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 关于 h 一致控制. 故由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} \frac{g_i(x+he_j)-g_i(x)}{h} \rightarrow \sum_{i \in \mathbb{Z}} \partial_j g_i(x), \quad h \rightarrow 0.$$

这表明命题中定义的函数 g 存在偏导数, 且根据级数的一致收敛性知这些偏导数也是连续的. 对全体多重指标 α (其中 $|\alpha| \leq N$) 用归纳法, 因为 $\sum_{i \in \mathbb{Z}} \|\partial^\alpha g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty$, 故上述过程可以重复, 至此即得欲证. $\square$

6.1.2 Calderón 再现公式

我们首先回忆一下记号: 对给定的 $t > 0$ 与 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 g , 记 $g_t(x) = t^{-n}g(t^{-1}x)$ 为 g 的 L^1 缩放. 对 $\mathbb{R}^n$ 上 Fourier 变换在原点处为零的可积函数 Ψ 与 $j \in \mathbb{Z}$, 记 Δ_j^Ψ 是由式子

$$\Delta_j^\Psi(f) = f * \Psi_{2^{-j}} = (\widehat{f}(\xi)\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))^\vee, \quad \forall f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

所定义的 Littlewood-Paley 算子. 另外对于 Fourier 变换在原点处非零的可积函数 Φ , 在 $j \in \mathbb{Z}$ 时定义平均算子

$$S_j^\Phi(f) = f * \Phi_{2^{-j}} = (\widehat{f}(\xi)\widehat{\Phi}(2^{-j}\xi))^\vee, \quad \forall f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

命题 6.3 (Littlewood-Paley 分解的逼近性质)

(a) 设 $\widehat{\Phi}$ 是在 $\overline{B(0,1)}$ 上恒为 1 的 C_0^∞ 函数, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 而言均有

$$S_N^\Phi(\varphi) \rightarrow \varphi (N \rightarrow \infty) \text{ 在 } \mathcal{S} \text{ 的意义下成立.} \quad (6.2)$$

同时对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$S_N^\Phi(f) \rightarrow f (N \rightarrow \infty) \text{ 在 } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \text{ 的拓扑下成立.} \quad (6.3)$$

(b) 设 Φ 是 Fourier 变换支在某包含以原点为球心的开球的紧集上的 Schwartz 函数, Ψ 是 Fourier 变换支在某不包含原点的环上的 Schwartz 函数, 且

$$\widehat{\Phi}(\xi) + \sum_{j=1}^{\infty} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$S_0^\Phi(\varphi) + \sum_{j=1}^N \Delta_j^\Psi(\varphi) \rightarrow \varphi (N \rightarrow \infty) \text{ 在 } \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \text{ 的意义下成立.} \quad (6.4)$$

另对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$S_0^\Phi(f) + \sum_{j=1}^N \Delta_j^\Psi(f) \rightarrow f (N \rightarrow \infty) \text{ 在 } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \text{ 的拓扑下成立.} \quad (6.5)$$

(c) 设 Ψ 是 Fourier 变换支在某不包含原点的环上的 Schwartz 函数, 且

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \neq 0.$$

则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\sum_{|j| < N} \Delta_j^\Psi(\varphi) \rightarrow \varphi (N \rightarrow \infty) \text{ 在 } \mathcal{S}_0(\mathbb{R}^n) \text{ 的意义下成立.} \quad (6.6)$$

另对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\sum_{|j| < N} \Delta_j^\Psi(f) \rightarrow f (N \rightarrow \infty) \text{ 在 } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \text{ 的意义下成立.} \quad (6.7)$$

证明 (a) 记 $\widetilde{\Phi}(x) = \Phi(-x)$, 观察到对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\langle S_N^\Phi(f), \varphi \rangle = \langle \widehat{f}\widehat{\Phi}, \varphi^\vee \rangle = \langle f, (\widehat{\Phi}\varphi^\vee)^\wedge \rangle = \langle f, (\widehat{\Phi}(\varphi^\vee)^\sim)^\vee \rangle = \langle f, (\widehat{\Phi}\widehat{\varphi})^\vee \rangle = \langle f, S_N^{\widetilde{\Phi}}(\varphi) \rangle.$$

这说明只要证明了 (6.2) 式, 因为 $\widetilde{\Phi}$ 和 Φ 在命题中具有完全相同的性质, 故可以通过对偶性得到 (6.3) 式. 现在为了

证明(6.2)式, 取定 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 只需证明 $(S_N^\Phi(\varphi))^\wedge \rightarrow \widehat{\varphi}$ 在 $\mathcal{S}$ 的意义下成立即可. 根据定义, 这便要求对取定的多重指标 α, β 有

$$\rho'_{\alpha, \beta}((S_N^\Phi(\varphi))^\wedge - \widehat{\varphi}) = \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} |\partial_\xi^\beta [(1 - \widehat{\Phi}(2^{-N}\xi))\widehat{\varphi}(\xi)\xi^\alpha]| \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty. \quad (6.8)$$

因为 $\widehat{\Phi}$ 在单位球中恒为 1, 故(6.8)式中的上确界实际上是在集合 $|\xi| \geq 2^N$ 中取的. 根据 Leibniz 法则, 上式中的偏导数 $\partial^\beta [(1 - \widehat{\Phi}(2^{-N}\xi))\widehat{\varphi}(\xi)\xi^\alpha]$ 实际上是 $\partial^\gamma (1 - \widehat{\Phi}(2^{-N}\xi))$ 与 $\partial^{\beta-\gamma}(\widehat{\varphi}(\xi)\xi^\alpha)$ 两者乘积关于 $\gamma \leq \beta$ 的有限和. 在和式中若 $\gamma \neq 0$, 则在 $\partial^\gamma (1 - \widehat{\Phi}(2^{-N}\xi))$ 中会出现因子 2^{-N} , 随着 $N \rightarrow \infty$, 该因子便能携与之相乘的项趋零. 若 $\gamma = 0$, 此时因为 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 而上确界是在 $|\xi| \geq 2^N$ 上取的, 故 $N \rightarrow \infty$ 时由 $\widehat{\varphi}$ 的速降性即得该项趋零. 至此即证(6.8)式, (a) 因而得证.

(b) 证明的主要思路在于将 (a) 中的 $\widehat{\Phi}(2^{-N}\xi)$ 换为 $\Phi(\xi) + \sum_{j=1}^N \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$. 任取 $\xi \in \overline{B(0, \xi)}$, 因为 $2^{-j}\xi \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$, 故 $\widehat{\Phi}(\xi) + \sum_{j=1}^\infty \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$ 对每个固定的 ξ 而言实际上是有限和, 取 N 足够大即知 $\widehat{\Phi}(\xi) + \sum_{j=1}^N \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$ 同样是 $\overline{B(0, 1)}$ 上恒为 1 的 C_0^∞ 函数, 通过相同的论述可知只需证明(6.4)式, 即可通过对偶性得到(6.5)式. 现在为了证明(6.4)式, 取 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 只需证明 $(S_0^\Phi(\varphi))^\wedge + \sum_{j=1}^N (\Delta_j^\Psi(\varphi))^\wedge \rightarrow \widehat{\varphi} (N \rightarrow \infty)$ 在 $\mathcal{S}$ 的意义下成立, 重复 (a) 对应部分的证明即可.

(c) 类似于 (a), 可以说明只要证明了(6.6)式成立, 就可以用对偶性证明(6.7)式. 现为证明(6.6)式, 考虑使用 Fourier 变换. 注意到若 $\varphi_N, \varphi \in \mathcal{S}_0$, 则 $\varphi_N \rightarrow \varphi(\mathcal{S}_0)$ 当且仅当 $\varphi_N \rightarrow \varphi(\mathcal{S})$, 这又等价于 $\widehat{\varphi_N} \rightarrow \widehat{\varphi}(\mathcal{S})$. 因此为了说明 $\sum_{|j| < N} \Delta_j^\Psi(\varphi) \rightarrow \varphi(\mathcal{S}_0)$, 只需说明 $\sum_{|j| \geq N} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \rightarrow 0(\mathcal{S})$. 为此我们分别讨论 $j \geq N$ 和 $j \leq -N$ 这两部分. 对于 $j \geq N$ 的部分, 注意到 $\partial_\xi^\beta (\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) \sum_{j \geq N} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))$ 支在 $|\xi| \geq c2^N$ 上, 其中 $c > 0$ 是常数, 且这一函数本身在无穷远处就是速降的, 故

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} |\partial_\xi^\beta (\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) \sum_{j \geq N} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))| \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

对于 $j \leq -N$ 的部分, 注意到 $\partial_\xi^\beta (\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) \sum_{j \leq -N} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))$ 支在 $|\xi| \leq c'2^{-N}$ 上, 且这一函数本身在零点附近就是无穷阶趋零的. 因此其满足

$$|\partial_\xi^\beta (\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) [\chi_{\{0\}}(\xi) + \sum_{j \leq -N} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)])| \leq c_{\alpha, \beta, \varphi, \Psi} \sup_{|\xi| \leq 2^{-N+1}} |\xi|,$$

在 $N \rightarrow \infty$ 时上右式趋零, 至此即得欲证. □

推论 6.1 (Calderón 再现公式)

设 Ψ, Ω 是 Fourier 变换支在某不包含原点的环上的 Schwartz 函数, 它们满足

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{\Omega}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \neq 0.$$

则对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Psi_{2^{-j}} * \Omega_{2^{-j}} * f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\Psi \Delta_j^\Omega(f) = f, \quad (6.9)$$

在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立. ♡

证明 将命题6.3(c) 中的 Ψ 换成 $\Psi * \Omega$ 即可. □

推论 6.2

设 Θ, Φ 是具有紧支频率的 Schwartz 函数, Ψ, Ω 是频率支在不包含原点的环上的 Schwartz 函数, 且有

$$\widehat{\Phi}(\xi) \widehat{\Theta}(\xi) + \sum_{j=1}^\infty \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{\Omega}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (6.10)$$

则对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\Phi * \Theta * f + \sum_{j=1}^\infty \Delta_j^\Psi \Delta_j^\Omega(f) = f$$

在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立.



证明 在(6.10)式中代入 $\xi = 0$ 可得 $0 \notin \text{supp}(\widehat{\Phi\Theta})$, 又因为 $\widehat{\Phi\Theta}$ 至少在原点附近连续, 由连续性知 $\text{supp}(\widehat{\Phi\Theta})$ 实际上包含某以原点为球心的开球, 进而套用命题6.3(b)的结论即可.

6.1.3 Laplace 算子, Riesz 势与 Bessel 势

Laplace 算子指的是算子

$$\Delta = \partial_1^2 + \cdots + \partial_n^2,$$

它可以作用在函数或缓增分布上. Laplace 算子满足对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$-\widehat{\Delta(f)}(\xi) = 4\pi^2 |\xi|^2 \widehat{f}(\xi).$$

根据上述恒等式, 我们可以把上右式中的指数 2 换成复数 z , 进而对 $z \in \mathbb{C}$ 与 Schwartz 函数 f 定义

$$(-\Delta)^{\frac{z}{2}} f(x) = ((2\pi|\xi|)^z \widehat{f}(\xi))^{\vee}(x). \quad (6.11)$$

不严格地说, 如果 z 是偶数, 那么算子 $(-\Delta)^{\frac{z}{2}}$ 的作用就是求 z 阶导数. 如果 z 是实部小于 $-n$ 的复数, 则函数 $|\xi|^z$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上并不局部可积, 因此(6.11)式此时可能不是良定义的. 因此, 在我们谈及(6.11)式时, 总是认为要么 $\text{Re } z > -n$, 要么 $\text{Re } z \leq -n$ 的同时 $\widehat{f}$ 在原点处有足够高阶的衰减, 使得表达式 $|\xi|^z \widehat{f}(\xi)$ 是可积的. 注意到算子族 $\{(-\Delta)^z\}_{z \in \mathbb{C}}$ 在作用到 Fourier 变换在原点某邻域内衰减的 Schwartz 函数上时具有半群性质

$$(-\Delta)^z (-\Delta)^w = (-\Delta)^{z+w}, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}.$$

利用乘法公式, 可以把算子 $(-\Delta)^{\frac{z}{2}}$ 写成 $f \mapsto f * ((2\pi)^z |\xi|^z)^{\vee}$, 由定理2.22可知只要 $-n < \text{Re } z < 0$ (此时 $|\xi|^z$ 和 $|x|^{-z-n}$ 都是局部可积函数), 就有

$$((2\pi)^z |\xi|^z)^{\vee}(x) = (2\pi)^z \frac{\pi^{-\frac{z}{2}}}{\pi^{\frac{z+n}{2}}} \frac{\Gamma(\frac{n+z}{2})}{\Gamma(\frac{-z}{2})} |x|^{-z-n}. \quad (6.12)$$

通过前文对定义2.20的延拓知, 可在(6.12)式两边同时除以 $\Gamma(\frac{n+z}{2})$, 进而将(6.12)式的结果作为分布的恒等式延拓到全体复数 z 上.

6.1.3.1 Riesz 势

当 s 是正实数时, 算子 $f \mapsto (-\Delta)^{-\frac{s}{2}} f$ 实际上表示的并不是 f 的微分, 而是 f 的积分. 因此, 我们用一些不同的记号来更好地反映这一算子的本质.

定义 6.3 (Riesz 势算子)

设 s 是满足 $0 < \text{Re } s < \infty$ 的复数, 则 s 阶 Riesz 势算子定义为

$$\mathcal{I}_s = (-\Delta)^{-\frac{s}{2}}.$$



显见 $\mathcal{I}_s$ 对于 Fourier 变换在原点某邻域内衰减的 Schwartz 函数是良定义的. 如果 $\text{Re } s < n$, 则函数 $\xi \mapsto |\xi|^{-s}$ 局部可积, 进而 $\mathcal{I}_s$ 对全体 Schwartz 函数均良定义. 进一步, 根据(6.12)式可得

$$\mathcal{I}_s(f)(x) = 2^{-s} \pi^{-\frac{n}{2}} \frac{\Gamma(\frac{n-s}{2})}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) |y|^{-n+s} dy,$$

可见 $\text{Re } s > 0$ 时上述积分对全体 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 均收敛, 故 $\mathcal{I}_s$ 在 $\text{Re } s > 0$ 时在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上良定义.

我们从算子 $\mathcal{I}_s$ 的齐次性开始研究其各个性质.

注 设存在 $s \in \mathbb{C}$ 满足 $\text{Re } s > 0$, 且有估计

$$\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C(p, q, n, s) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (6.13)$$

其中 p, q 是正指标, $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 则 p, q 必定满足关系

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{\operatorname{Re} s}{n}. \quad (6.14)$$

要说明这件事, 可以考虑在(6.13)式中代入缩放 $\delta^\lambda(f)(x) = f(\lambda x)$ ($\lambda > 0$). 根据 $\mathcal{I}_s$ 的定义知

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_s(\delta^\lambda(f)) &= 2^{-s} \pi^{-\frac{n}{2}} \frac{\Gamma(\frac{n-s}{2})}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_{\mathbb{R}^n} f(\lambda(x-y)) |y|^{-n+s} dy \\ &= \lambda^{-s} 2^{-s} \pi^{-\frac{n}{2}} \frac{\Gamma(\frac{n-s}{2})}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_{\mathbb{R}^n} f(\lambda x - y) |y|^{-n+s} dy = \lambda^{-s} \delta^\lambda(\mathcal{I}_s(f)), \end{aligned}$$

进而在(6.13)式成立的情况下, 我们有

$$\lambda^{-\frac{n}{q} - \operatorname{Re} s} \|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C(p, q, n, s) \lambda^{-\frac{n}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (6.15)$$

整理得

$$\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C(p, q, n, s) \lambda^{\frac{n}{q} - \frac{n}{p} + \operatorname{Re} s} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.16)$$

若 $\frac{1}{p} > \frac{1}{q} + \frac{\operatorname{Re} s}{n}$, 则可在(6.16)式中令 $\lambda \rightarrow \infty$; 若 $\frac{1}{p} < \frac{1}{q} + \frac{\operatorname{Re} s}{n}$, 则可在(6.16)式中令 $\lambda \rightarrow 0$. 这两种操作都可以得到 $\mathcal{I}_s(f) = 0$ ($\forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$), 但这显然已经与 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 的情况矛盾了. 因此(6.14)式必定成立.

这一例子完美地展现了算子的齐次性 (或缩放结构) 如何影响它作为 $L^p \rightarrow L^q$ 算子时指标 p, q 的关系. 上述过程实际上是一个范式, 也就是说每当我们确定指标 p, q 的关系时, 总是要想到这一套方法的 (曾经在谈论 Fourier 变换时也用过这个方法).

从上注中可以看到, 如果 Riesz 势把 L^p 映入 L^q , 就必定有 $q > p$, 这说明 Riesz 势可以提升函数的可积性. 这种提升函数可积性的算子成为光滑化算子, Riesz 势的重要性也正体现在它是光滑化算子这一点上. 分数阶积分的 Hardy-Littlewood-Sobolev 定理就是在谈 Riesz 势确为光滑化算子这件事, 下面我们介绍该定理.

因为

$$|\mathcal{I}_s(f)| \leq \mathcal{I}_{\operatorname{Re} s}(|f|),$$

故出于讨论简便, 下面我们设 $\mathcal{I}_s(f)$ 中 f 是非负函数, $s > 0$.

定理 6.1 (分数阶积分的 Hardy-Littlewood-Sobolev 定理)

设 $s \in \mathbb{R}$, $0 < s < n$, 且 $1 < p < q < \infty$ 满足

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{s}{n}.$$

则存在常数 $C(n, s, p), C(s, n) < \infty$ 使得对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C(n, s, p) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

且

$$\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^{\frac{n}{n-s}, \infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C(n, s) \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 $\mathcal{I}_s$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \frac{n}{s}$) 上有唯一使得前述估计依旧成立的延拓.



证明 对给定的非负 (且非零) 的 Schwartz 函数 f , 记

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) |y|^{s-n} dy = I_1(f)(x) + I_2(f)(x),$$

其中

$$\begin{aligned} I_1(f)(x) &= \int_{|y| < R(x)} f(x-y) |y|^{s-n} dy, \\ I_2(f)(x) &= \int_{|y| \geq R(x)} f(x-y) |y|^{s-n} dy, \end{aligned}$$

这里 $R(x) > 0$ 是待定的函数. 注意到 $K(y) = |y|^{-n+s} \chi_{|y| < 1}$ 是可积径向函数, 关于原点对称衰减, 且

$$I_1(f)(x) = R(x)^s (f * K_{R(x)})(x),$$

其中 $K_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} K(x/\varepsilon)$. 于是由正递减径向可积函数生成的恒等逼近族性质 3.4 知

$$I_1(f)(x) \leq R(x)^s M(f)(x) \int_{|y|<1} |y|^{-n+s} dy = \frac{\nu_{n-1}}{s} R(x)^s M(f)(x), \quad (6.17)$$

其中 M 是 Hardy-Littlewood 极大函数, 其定义为

$$M(g)(x) = \sup \frac{1}{|B|} \int_B |g(y)| dy.$$

其中上确界在 $\mathbb{R}^n$ 中全体包含 x 的开球 B 中取. 现在在 $1 < p < \infty$ 时记 $p' = \frac{p}{p-1}, 1' = \infty$. 观察到 $(n-s)p' = n + \frac{p'n}{q} > n$, 由 Hölder 不等式可得

$$|I_2(f)(x)| \leq \left(\int_{|y| \geq R(x)} |y|^{-(n-s)p'} dy \right)^{\frac{1}{p'}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \left(\frac{q\nu_{n-1}}{p'n} \right)^{\frac{1}{p'}} R(x)^{-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (6.18)$$

而在 $p = 1$ 时注意到 $q = \frac{n}{n-s}$, 故同样有

$$|I_2(f)(x)| \leq \| |\cdot|^{-(n-s)} \|_{L^\infty(|y| \geq R(x))} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = R(x)^{-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.19)$$

将 (6.17), (6.18) 两式结合可得

$$\mathcal{I}_s(f)(x) \leq C'_{n,s,p} (R(x)^s M(f)(x) + R(x)^{-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}). \quad (6.20)$$

现在为将 (6.20) 右式化简, 令

$$R(x) = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{q}} (M(f)(x))^{-\frac{p}{q}}.$$

注意到若 f 非零, 则对全体 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $M(f)(x) > 0$, 这说明上式中的 $R(x)$ 良定义. 将 $R(x)$ 的这一取值代入 (6.20) 式可得

$$\mathcal{I}_s(f)(x) \leq C_{n,s,p} M(f)(x)^{\frac{p}{q}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{1-\frac{p}{q}}. \quad (6.21)$$

进而

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\mathcal{I}_s(f)(x)|^q dx \leq C_{n,s,p,q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{q-p} \int_{\mathbb{R}^n} |M(f)(x)|^p dx.$$

利用极大算子的强 (p, p) 型不等式 3.5 可得

$$\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,s,p,q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{1-\frac{p}{q}} \|M(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p}{q}} \leq C_{n,s,p,q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

对于 $p = 1, q = \frac{n}{n-s}$ 的情况, 我们考虑极大算子的弱 $(1, 1)$ 型不等式 3.5. 将 (6.17), (6.19) 两式结合并应用与 $p > 1$ 情况下相同的操作得到

$$\mathcal{I}_s(f)(x) \leq C_{n,s} M(f)(x)^{\frac{n-s}{n}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{s}{n}}.$$

为了估计 $\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^{\frac{n}{n-s}, \infty}(\mathbb{R}^n)}$, 我们就要研究 $\|M(f)\|_{L^{\frac{n}{n-s}, \infty}(\mathbb{R}^n)}$, 为此任取 $\lambda > 0$, 知

$$\begin{aligned} |\{C_{n,s} M(f)^{\frac{n-s}{n}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{s}{n}} > \lambda\}| &= \left| \left\{ M(f) > \left(\frac{\lambda}{C_{n,s} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{s}{n}}} \right)^{\frac{n}{n-s}} \right\} \right| \\ &\leq 3^n \left(\frac{C_{n,s} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^{\frac{s}{n}}}{\lambda} \right)^{\frac{n}{n-s}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\ &= C(n, s) \left(\frac{\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}}{\lambda} \right)^{\frac{n}{n-s}}. \end{aligned}$$

因此

$$\|\mathcal{I}_s(f)\|_{L^{\frac{n}{n-s}, \infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C(n, s) \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

定理至此即证. □

6.1.3.2 Bessel 势

卷积核 $|x|^{-n+s}$ 在 $|x| \rightarrow 0$ 时的行为与其光滑性质是很好地吻合的, 但随着 s 的增长, 这些卷积核在 $|x| \rightarrow \infty$ 时的衰减变差了. 我们可以把 Riesz 势修改一下, 从而保持它们在零点附近的行为, 但在无穷远处达到指数阶衰减. 达成这一目的最简单的方法是把非负算子 $-\Delta$ 替换为严格正算子 $I - \Delta$, 这里非负与严格正的含义需要用到这些算子的 Fourier 乘子.

定义 6.4 (Bessel 势)

设 z 是满足 $0 < \operatorname{Re} z < \infty$ 的复数, 则 z 阶 Bessel 势算子定义为

$$\mathcal{J}_z = (I - \Delta)^{-\frac{z}{2}}.$$

该算子通过下述方式作用在函数 f 上:

$$\mathcal{J}_z(f) = (\widehat{fG_z})^\vee = f * G_z,$$

其中

$$G_z(x) = ((1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-\frac{z}{2}})^\vee(x).$$

Bessel 势对 Riesz 势做的改动正是把 $4\pi^2|\xi|^2$ 换成了 $1 + 4\pi^2|\xi|^2$. 这一替换产生了光滑性, 而光滑性表明 G_z 在无穷远处速降. 下面的结果就量化了 G_z 在零点附近和无穷远附近的行为.

命题 6.4 (Bessel 势在原点与无穷远处的行为)

设 z 是满足 $\operatorname{Re} z > 0$ 的复数, 则函数 G_z 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑. 另若 $s \in \mathbb{R}$, 则 G_s 是严格正的函数, $\|G_s\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$, 且存在有限正常数 $C(s, n), c(s, n)$ 使得

$$G_s(x) \leq C(s, n)e^{-\frac{|x|}{2}}, \quad |x| \geq 2, \quad (6.22)$$

且

$$\frac{1}{c(s, n)} \leq \frac{G_s(x)}{H_s(x)} \leq c(s, n), \quad |x| \leq 2, \quad (6.23)$$

其中

$$H_s(x) = \begin{cases} |x|^{s-n} + 1 + O(|x|^{s-n+2}), & 0 < s < n, \\ \log \frac{2}{|x|} + 1 + O(|x|^2), & s = n, \\ 1 + O(|x|^{s-n}), & s > n, \end{cases}$$

而 $O(t)$ 是满足 $|O(t)| \leq |t| (t \geq 0)$ 的函数.

对于 G_z (z 是满足 $\operatorname{Re} z > 0$ 的复数) 而言, 同样存在有限正常数 $C'(\operatorname{Re} z, n), c'(\operatorname{Re} z, n)$ 使得 $|x| \geq 2$ 时

$$|G_z(x)| \leq \frac{C'(\operatorname{Re} z, n)}{|\Gamma(\frac{z}{2})|} e^{-\frac{|x|}{2}}, \quad |x| \geq 2, \quad (6.24)$$

且 $|x| \leq 2$ 时

$$|G_z(x)| \leq \frac{c'(\operatorname{Re} z, n)}{|\Gamma(\frac{z}{2})|} \begin{cases} |x|^{\operatorname{Re} z - n}, & \operatorname{Re} z < n, \\ \log \frac{2}{|x|} + 1, & \operatorname{Re} z = n, \\ 1, & \operatorname{Re} z > n. \end{cases}$$

证明 对于 $A > 0$ 与实部大于 0 的 z 而言, 回忆 Γ 函数恒等式

$$A^{-\frac{z}{2}} = \frac{1}{\Gamma(\frac{z}{2})} \int_0^\infty e^{-tA} t^{\frac{z}{2}-1} dt,$$

因此

$$(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-\frac{z}{2}} = \frac{1}{\Gamma(\frac{z}{2})} \int_0^\infty e^{-t} e^{-\pi|2\sqrt{\pi t}\xi|^2} t^{\frac{z}{2}-1} dt.$$

可以验证上右式积分对任意 ξ 都是收敛的, 因此上式确有意义. 现在在上式两端关于 ξ 取 Fourier 逆变换, 注意到函数 $e^{-\pi|\xi|^2}$ 的 Fourier 逆变换就是它自身, 可得

$$G_z(x) = \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{z}{2})} \int_0^\infty e^{-t} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} t^{\frac{z-n}{2}} \frac{dt}{t}.$$

上述等式表明 G_z 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑. 若取 $z = s > 0$, 则显见对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $G_s(x) > 0$. 因此 $\|G_s\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = \int_{\mathbb{R}^n} G_s(x) dx = \widehat{G_s}(0) = 1$.

现设 $|x| \geq 2$, 则 $t + \frac{|x|^4}{4t} \geq t + \frac{1}{t}$, $t + \frac{|x|^2}{4t} \geq |x|$. 这表明

$$-t - \frac{|x|^2}{4t} \leq -\frac{t}{2} - \frac{1}{2t} - \frac{|x|}{2},$$

因此 $|x| \geq 2$ 时有

$$|G_z(x)| \leq \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{|\Gamma(\frac{z}{2})|} \left(\int_0^\infty e^{-\frac{t}{2}} e^{-\frac{1}{2t}} t^{\frac{\operatorname{Re} z - n}{2}} \frac{dt}{t} \right) e^{-\frac{|x|}{2}} = \frac{C'(\operatorname{Re} z, n)}{|\Gamma(\frac{z}{2})|} e^{-\frac{|x|}{2}}.$$

这便证明了 (6.24) 式, 如果令 $C(s, n) = \Gamma(\frac{s}{2})^{-1} C'(s, n)$, $s > 0$, 得到的就是 (6.22) 式.

对于 $|x| \leq 2, s > 0$ 的情形, 记 $G_s(x) = G_s^1(x) + G_s^2(x) + G_s^3(x)$, 其中

$$\begin{aligned} G_s^1(x) &= \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^{|x|^2} e^{-t'} e^{-\frac{|x|^2}{4t'}} (t')^{\frac{s-n}{2}} \frac{dt'}{t'} \\ &= |x|^{s-n} \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^1 e^{-t|x|^2} e^{-\frac{1}{4t}} t^{\frac{s-n}{2}} \frac{dt}{t}, \\ G_s^2(x) &= \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_{|x|^2}^4 e^{-t} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} t^{\frac{s-n}{2}} \frac{dt}{t}, \\ G_s^3(x) &= \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_4^\infty e^{-t} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} t^{\frac{s-n}{2}} \frac{dt}{t}. \end{aligned}$$

在 G_s^1 的表达式中, 因为 $t|x|^2 \leq 4$, 故根据中值定理可得 $e^{-t|x|^2} = 1 + O(t|x|^2)$, 其中 $O(t)$ 是满足 $|O(t)| \leq |t|$ 的函数. 从而有

$$G_s^1(x) = |x|^{s-n} \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^1 e^{-\frac{1}{4t}} t^{\frac{s-n}{2}} \frac{dt}{t} + O(|x|^{s-n+2}) \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^1 e^{-\frac{1}{4t}} t^{\frac{s-n}{2}} dt.$$

现在对于 G_s^2 , 知此时 $0 \leq \frac{|x|^2}{4t} \leq \frac{1}{4}$, $0 \leq t \leq 4$, 进而 $e^{-\frac{1}{4t}} \leq e^{-t - \frac{|x|^2}{4t}} \leq 1$, 因此

$$G_s^2(x) \approx \int_{|x|^2}^4 t^{\frac{s-n}{2}} \frac{dt}{t} = \begin{cases} \frac{2}{n-s} |x|^{s-n} - \frac{2^{s-n+1}}{n-s}, & s < n, \\ 2 \log \frac{4}{|x|^2}, & s = n, \\ \frac{1}{s-n} 2^{s-n+1} - \frac{2}{s-n} |x|^{s-n}, & s > n. \end{cases}$$

最后对于 G_s^3 , 知此时 $e^{-\frac{1}{4t}} \leq e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \leq 1$, 这表明 $G_s^3(x)$ 的上下界均被正常数控制. 结合 $G_s^1(x), G_s^2(x), G_s^3(x)$ 的结果即得 (6.23) 式.

若 z 是 $\operatorname{Re} z > 0$ 的复数, 按照与前述过程相同的分法, 记 $G_z = G_z^1 + G_z^2 + G_z^3$. 对于 $|G_z^1(x)|$, 在 $|x| \leq 2$ 时有

$$|G_z^1(x)| \leq c_1(\operatorname{Re} z, n) \left| \Gamma\left(\frac{z}{2}\right) \right|^{-1} |x|^{\operatorname{Re} z - n}.$$

对于 G_z^2 , 在 $|x| \leq 2$ 时有

$$\begin{aligned} |G_z^2(x)| &\leq \frac{(2\sqrt{\pi})^{-n}}{|\Gamma(\frac{z}{2})|} \begin{cases} \frac{2}{n - \operatorname{Re} z} |x|^{\operatorname{Re} z - n} - \frac{2^{\operatorname{Re} z - n + 1}}{n - \operatorname{Re} z}, & \operatorname{Re} z < n, \\ 2 \log(2/|x|), & \operatorname{Re} z = n, \\ \frac{1}{\operatorname{Re} z - n} 2^{\operatorname{Re} z - n + 1} - \frac{2}{\operatorname{Re} z - n} |x|^{\operatorname{Re} z - n}, & \operatorname{Re} z > n \end{cases} \\ &\leq \frac{c_2(\operatorname{Re} z, n)}{|\Gamma(\frac{z}{2})|} \begin{cases} |x|^{\operatorname{Re} z - n}, & \operatorname{Re} z < n, \\ \log(2/|x|), & \operatorname{Re} z = n, \\ 1, & \operatorname{Re} z > n. \end{cases} \end{aligned}$$

最后对于 G_z^3 , 在 $|x| \leq 2$ 时有

$$|G_z^3(x)| \leq c_3(\operatorname{Re} z, n) \left| \Gamma\left(\frac{z}{2}\right) \right|^{-1}.$$

将上述三个估计结合即得欲证. $\square$

我们用类似于分数阶积分的 Hardy-Littlewood-Sobolev 定理 6.1 的结果结束本节, 在介绍结论前我们先准备一个引理:

引理 6.1

在 $\mathbb{R}^n$ 上设 $T(f) = f * K$, 其中 K 是正的 L^1 函数, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p \leq \infty$), 则 $\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} = \|K\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$. ♡

证明 根据 Young 不等式显见 $\|T\|_{L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|K\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$. 对于反向不等式, 取定 $0 < \varepsilon < 1$ 与正整数 N , 记 $\chi_N = \chi_{B(0, N)}$, 对任意 $R > 0$ 记 $K_R = K \chi_{B(0, R)}$. 观察到若 $|x| \leq (1 - \varepsilon)N$, 则 $B(0, N\varepsilon) \subset B(x, N)$, 因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_N(x - y) K_{N\varepsilon}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} K_{N\varepsilon}(y) dy = \|K_{N\varepsilon}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{\|K * \chi_N\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p}{\|\chi_N\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p} &\geq \frac{\|K_{N\varepsilon} * \chi_N\|_{L^p(0, (1-\varepsilon)N)}^p}{\|\chi_N\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p} \\ &= \frac{1}{\|\chi_N\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p} \left\| \int_{B(0, (1-\varepsilon)N)} \chi_N(\cdot - y) K_{N\varepsilon}(y) dy \right\|_{L^p(0, (1-\varepsilon)N)}^p \\ &= \frac{1}{\|\chi_N\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p} \|K_{N\varepsilon}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p \|1\|_{L^p(0, (1-\varepsilon)N)}^p \\ &= \|K_{N\varepsilon}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p \frac{|B(0, (1-\varepsilon)N)|}{|B(0, N)|} = \|K_{N\varepsilon}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}^p (1 - \varepsilon)^n. \end{aligned}$$

先令 $N \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得引理. $\square$

推论 6.3 (Bessel 势的有界性)

- (a) 对任意 $0 < s < \infty$, 算子 $\mathcal{J}_s$ 都是以范数 1 将 $L^r(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^r(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq r \leq \infty$) 的.
 (b) 设 $0 < s < n$, $1 \leq p < q < \infty$ 满足 (6.14) 式, 则存在常数 $C_{p,q,n,s} < \infty$ 使得对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 均有

$$\|\mathcal{J}_s(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,q,n,s} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

且在 $p = 1$ 时有 $\|\mathcal{J}_s(f)\|_{L^{q,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{q,n,s} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$. ♡

证明 (a) 根据 G_s 的定义可知 $\widehat{G_s}(0) = 1$, $G_s > 0$, 因此 $\|G_s\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$. 又因为算子 $\mathcal{J}_s$ 可以表为 $f \mapsto f * G_s$, 而 G_s 是正 L^1 函数, 故由引理 6.1 可知 $\|\mathcal{J}_s\|_{L^r(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^r(\mathbb{R}^n)} = \|G_s\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$ ($1 \leq r \leq \infty$).

(b) 若 $0 < s < n$, 由 Bessel 势在原点与无穷远处的行为 6.4 知

$$G_s(x) \approx \begin{cases} |x|^{-n+s}, & |x| \leq 2, \\ e^{-\frac{|x|^2}{2}}, & |x| \geq 2. \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_s(f)(x) &\leq C_{n,s} \left[\int_{|y| \leq 2} |f(x-y)| |y|^{-n+s} dy + \int_{|y| \geq 2} |f(x-y)| e^{-\frac{|y|^2}{2}} dy \right] \\ &\leq C_{n,s} \left[\mathcal{I}_s(|f|)(x) + \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| e^{-\frac{|y|^2}{2}} dy \right]. \end{aligned}$$

因为函数 $y \mapsto e^{-\frac{|y|^2}{2}}$ 对任意 $r < \infty$ 都是 L^r 的, 故由 Young 不等式与分数阶积分的 Hardy-Littlewood-Sobolev 定理 6.1 即得欲证. $\square$

6.1.4 Sobolev 空间

本节我们研究用于量化函数光滑性的一种方法, Sobolev 空间正是为此而生的, 这套理论用导函数的积分来刻画光滑性. 我们从 Sobolev 空间的定义开始.

定义 6.5 (Sobolev 空间)

设 k 是非负整数, $1 < p < \infty$. Sobolev 空间 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 由 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 构成, 其中对全体多重指标 α , 只要 $|\alpha| \leq k$, f 的弱导数 $\partial^\alpha f$ 就也在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中. 该空间的范数定义为

$$\|f\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (6.25)$$

其中 $\partial^{(0,\dots,0)} f = f$.



Sobolev 范数量化了光滑性. 指标 k 表示 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 中给定函数的光滑阶数. 随着 k 的增长, 函数变得越来越光滑. 与这一事实等价的是 Sobolev 空间随 k 增加而递降:

$$L^p(\mathbb{R}^n) \supset W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \supset W^{2,p}(\mathbb{R}^n) \supset W^{3,p}(\mathbb{R}^n) \supset \dots,$$

这表明 $W^{k+1,p}(\mathbb{R}^n)$ 总是 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 的真子空间. 这一符合我们对光滑性的直觉的性质是 Sobolev 范数定义的推论.

下面观察到 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 是完备的. 事实上, 若 $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是关于依(6.25)式定义的范数的基本列, 则 $\{\partial^\alpha f_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 对全体 $|\alpha| \leq k$ 都是 L^p 意义下的基本列. 根据 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的完备性知存在 $f_\alpha \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\partial^\alpha f_j \rightarrow f_\alpha (\forall |\alpha| \leq k)$ 在 L^p 意义下成立, 特别有 $f_j \rightarrow f_0 (j \rightarrow \infty)$ 在 L^p 意义下成立. 根据弱导数的定义知对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$(-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} f_j (\partial^\alpha \varphi) dx = \int_{\mathbb{R}^n} (\partial^\alpha f_j) \varphi dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha \varphi dx.$$

因为上左式在 $j \rightarrow \infty$ 时收敛到

$$(-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} f_0 (\partial^\alpha \varphi) dx,$$

根据数值极限的唯一性即知弱导数 $\partial^\alpha f_0$ 正是 f_α , 这说明 $f_j \rightarrow f_0$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立, 完备性至此得证.

本节的目标在于研究这些空间与前面讨论过的 Riesz 势和 Bessel 势之间的关系, 并得到这些空间的 Littlewood-Paley 刻画. 在我们继续研究之前, 需要注意到可以把 Sobolev 空间定义中的指标 k 延拓成实数.

6.1.4.1 一般 Sobolev 空间的定义与基本性质

定义 6.6 (非齐次 Sobolev 空间)

设 $s \in \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$. 非齐次 Sobolev 空间 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 由缓增分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 构成, 其中

$$((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u})^\vee \in L^p(\mathbb{R}^n). \quad (6.26)$$

对 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的分布 u , 我们定义

$$\|u\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = \|((1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$



注意到函数 $(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且它在无穷远处至多有多项式速度增长, 而 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \widehat{u} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 故根据函数与缓增分布的乘积的良定义性 (例 2.7) 知(6.26)式中的乘积是良定义的函数.

一般称 s 为 Sobolev 空间的阶数或正则性指标. 对阶数而言我们可以做些观察. 首先注意到 $s = 0$ 时 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n) = L^p(\mathbb{R}^n)$. 现在要问 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素是不是一直都是 L^p 函数. 下面说明在 $s \geq 0$ 时这件事是成立的, 而在 $s < 0$ 时这件事不成立. 同时我们还要说明在 $s = k$ 是正整数时, 上述定义与定义 6.5 是等价的.

为说明 $s \geq 0$ 时 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素确为 L^p 函数, 记 $f_s = ((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{f})^\vee$, 知

$$f = (\widehat{f_s}(\xi) \widehat{G_s}(\xi/2\pi))^\vee = f_s * (2\pi)^n G_s(2\pi(\cdot)),$$

其中 G_s 由定义 6.4 给出. 因此由 Bessel 势的有界性 6.3 知存在常数 c 使得

$$c^{-1}\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

至此即得 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ ($s \geq 0$). 下面说明 $s = k$ 是非负整数, 且 $1 < p < \infty$ 时, 定义 6.6 中给出的 $W^{s,p}$ 范数与定义 6.5 中给出的 $W^{k,p}$ 范数等价. 为此设 $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 在定义 6.6 下成立. 对任意 $|\alpha| \leq k$ 而言, 对 f 的弱导数 $\partial^\alpha f$ 都有

$$\partial^\alpha f = c_\alpha (\widehat{f}(\xi) \xi^\alpha)^\vee = c_\alpha \left(\widehat{f}(\xi) (1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}} \frac{\xi^\alpha}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}}} \right)^\vee. \quad (6.27)$$

利用 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7, 可以验证函数

$$\frac{\xi^\alpha}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}}}$$

是 L^p 乘子. 根据定义 6.6 的表述, 本身对 f 有 $(\widehat{f}(\xi) (1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}})^\vee \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故由 (6.27) 式知弱导数 $\partial^\alpha f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,n,k} \|((1 + |\cdot|^2)^{\frac{k}{2}} \widehat{f})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty. \quad (6.28)$$

这便说明 f 同样在定义 (6.5) 下从属于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$.

相反地, 设 $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 在定义 (6.5) 下成立, 根据二项式定理知

$$(1 + \xi_1^2 + \cdots + \xi_n^2)^{\frac{k}{2}} = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{k!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n! (k - |\alpha|)!} \xi^\alpha \frac{\xi^\alpha}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}}}.$$

前面已经说明了函数 $m_\alpha(\xi) = \xi^\alpha (1 + |\xi|^2)^{-\frac{k}{2}}$ 在 $|\alpha| \leq k$ 时是 L^p 乘子, 又因为

$$((1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}} \widehat{f})^\vee = \sum_{|\alpha| \leq k} c_{\alpha,k} (m_\alpha(\xi) \xi^\alpha \widehat{f})^\vee = \sum_{|\alpha| \leq k} c'_{\alpha,k} (m_\alpha(\xi) \widehat{\partial^\alpha f})^\vee,$$

故

$$\|(\widehat{f}(\xi) (1 + |\xi|^2)^{\frac{k}{2}})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{p,n,k} \sum_{|\gamma| \leq k} \|(\widehat{f}(\xi) \xi^\gamma)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty. \quad (6.29)$$

这便说明 f 同样在定义 (6.6) 下从属于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$. 结合 (6.28), (6.29) 两式即得定义 6.5 与定义 6.6 中出现的 Sobolev 范数实际上是等价的.

例 6.2(对于负正则性指标的一些讨论) 在 $s \in \mathbb{R}$ 时, 每个 Schwartz 函数都在 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 内. 负正则性指标的 Sobolev 空间可以包含非局部可积的缓增分布. 例如考虑原点处的 Dirac 测度 δ_0 , 知 $s > 0$ 时

$$\|\delta_0\|_{W^{-s,p}(\mathbb{R}^n)} = \|(\widehat{G_s}(\xi/2\pi) \widehat{\delta_0})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = (2\pi)^{-n} \|G_s((\cdot)/2\pi)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = (2\pi)^{\frac{n}{p}-n} \|G_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

根据 Bessel 势在原点与无穷远处的行为 6.4, 当 $s \geq n$ 时 $\|G_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty$. 若 $0 < s < n$, 则只要 p 满足 $(s-n)p > -n$ (亦即 $1 < p < \frac{n}{n-s}$), 函数 $G_s(x) = ((1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}})^\vee(x)$ 就是 p 次可积的. 因此在 $0 < s < n$ 时对 $1 < p < \frac{n}{n-s}$ 有 $\delta_0 \in W^{-s,p}(\mathbb{R}^n)$, 而在 $s \geq n$ 时对全体 $1 < p < \infty$ 均有 $\delta_0 \in W^{-s,p}(\mathbb{R}^n)$.

例 6.3(在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 却不在 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数) 考虑函数

$$h(t) = \begin{cases} 1-t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1+t, & -1 \leq t \leq 0, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

容易验证 h 的弱导数为 $h'(t) = \chi_{(-1,0)} - \chi_{(0,1)}$, 而其二阶弱导数为 $h'' = \delta_1 + \delta_{-1} - 2\delta_0$. 显见 h'' 不在任何 L^p 空间中, 故 $h \notin W^{2,p}(\mathbb{R})$. 但对 $1 < p < \infty$ 而言均有 $h \in W^{1,p}(\mathbb{R})$, 这便找到了在 $W^{1,p}(\mathbb{R})$ 中但不在 $W^{2,p}(\mathbb{R})$ 中的一个函数.

定义 6.6 允许我们通过求解使得 $h \in W^{s,p}(\mathbb{R})$ 的全体 s 来对 h 的光滑性进行微调. 通过计算可知

$$\widehat{h}(\xi) = \frac{e^{i2\pi\xi} + e^{-i2\pi\xi} - 2}{4\pi^2|\xi|^2}.$$

现在取定光滑函数 φ , 令 φ 在无穷远点的某邻域内为 1, 在区间 $[-2, 2]$ 上为 0. 由该构造显见 $\widehat{h}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}}(1 - \varphi(\xi))$ 是紧支光滑函数, 因此 $(\widehat{h}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}}(1 - \varphi(\xi)))^\vee$ 作为紧支光滑函数的 Fourier 逆变换必为 Schwartz 函数, 进而它从属于全体 L^p 空间. 现在要说明对怎样的 s 与 p 而言 $((1 + |\xi|^2)\widehat{h}(\xi))^\vee \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 根据 Fourier 逆变换的线性性知只需说明对怎样的 s 与 p 而言 $((1 + |\xi|^2)\widehat{h}(\xi)\varphi(\xi))^\vee \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 将该函数写成

$$u = \left((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \frac{e^{i2\pi\xi} + e^{-i2\pi\xi} - 2}{4\pi^2(1 + |\xi|^2)} \varphi(\xi) \frac{1 + |\xi|^2}{|\xi|^2} \right)^\vee, \quad (6.30)$$

希望 $u \in L^p(\mathbb{R})$. 下面说明(6.30)式定义的 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 当且仅当函数

$$v = \left((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \frac{e^{i2\pi\xi} + e^{-i2\pi\xi} - 2}{4\pi^2(1 + |\xi|^2)} \right)^\vee \in L^p(\mathbb{R}). \quad (6.31)$$

一方面, 若 $v \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$), 注意到有界函数 $m(\xi) = \varphi(\xi) \frac{1 + |\xi|^2}{|\xi|^2}$ 满足 Mihlin 条件 $|m'(\xi)| \leq C|\xi|^{-1}$, 因此由 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7 知 $u \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$). 另一方面, 若 $u \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$), 注意到 $m_0(\xi) = \frac{|\xi|^2}{1 + |\xi|^2}$ 同样满足 Mihlin 条件 $|m'_0(\xi)| \leq C|\xi|^{-1}$, 而 $(\widehat{v}(1 - \varphi))^\vee$ 是 Schwartz 函数, 故根据 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7 知

$$v = (\widehat{v}(\xi)(1 - \varphi(\xi)))^\vee + \left(\widehat{u}(\xi) \frac{|\xi|^2}{1 + |\xi|^2} \right)^\vee \in L^p(\mathbb{R}).$$

特别把 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 等价到 $v \in L^p(\mathbb{R})$ 是因为 v 要更好算一些. 对于 v 而言, 在 $0 < s < 2$ 时有

$$\begin{aligned} v(x) &= ((1 + |\xi|^2)^{\frac{s-2}{2}} \cdot |\xi|^2 \cdot \widehat{h}(\xi))^\vee = \frac{1}{4\pi^2} ((1 + |\xi|^2)^{\frac{s-2}{2}} \widehat{h''}(\xi))^\vee \\ &= \frac{1}{2\pi} ((1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{\frac{s-2}{2}} \widehat{h''}(2\pi\xi))^\vee = (G_{2-s} * (\delta_1 + \delta_{-1} - 2\delta_0)(2\pi(\cdot)))(x) \\ &= 2\pi G_{2-s}(2\pi(\cdot)) * (\delta_1 + \delta_{-1} - 2\delta_0)(x) = 2\pi(G_{2-s}(2\pi(x-1)) + G_{2-s}(2\pi(x+1)) - 2G_{2-s}(2\pi x)), \end{aligned}$$

其中 G_{2-s} 是 $2-s$ 阶 Bessel 势. 若 $2-s < 1$ (即 $1 < s < 2$), 由 Bessel 势在原点与无穷远处的行为 6.4 知 $G_{2-s}(x)$ 在零点处有与 $|x|^{1-s}$ 同阶的尖点, 这一尖点仅在 $1 < s < 1 + \frac{1}{p}$ 时 p 次可积. 现在知道函数 $v(x)$ 在 $-1, 1, 0$ 这三点处都有类似的尖点, 因此 $v \in L^p(\mathbb{R})$ 仅当 $1 < s < 1 + \frac{1}{p}$, 故 $h \in W^{s,p}(\mathbb{R})$ 当且仅当 $s < 1 + \frac{1}{p}$.

下面我们介绍著名的 Sobolev 嵌入定理:

定理 6.2 (Sobolev 嵌入定理)

(a) 若 $0 < s < \frac{n}{p}$, $1 < p < \infty$, 且

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{s}{n},$$

则 Sobolev 空间 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 连续嵌入 $L^q(\mathbb{R}^n)$.

(b) 若 $0 < s = \frac{n}{p}$, $1 < p < \infty$, 则对任意 $\frac{n}{s} < q < \infty$ 而言, $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 均连续嵌入 $L^q(\mathbb{R}^n)$.

(c) 若 $\frac{n}{p} < s < \infty$, $1 < p < \infty$, 则 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的每个元素都在忽略零测集的意义下成为一致连续的有界函数.



证明 (a) 若 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_s(x) = ((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{f})^\vee(x) \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 因此

$$f(x) = ((1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{f_s})^\vee(x).$$

因此 $f = f_s * G_s$. 因为 $s < n$, 由 Bessel 势在原点与无穷远处的行为 6.4 知

$$|G_s(x)| \leq C_{s,n}|x|^{s-n}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

这表明 $|f| = |G_s * f_s| \leq C_{s,n} \mathcal{I}_s(|f_s|)$, 于是由分数阶积分的 Hardy-Littlewood-Sobolev 定理 6.1 知

$$\|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C'_{s,n} \|\mathcal{I}_s(|f_s|)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C''_{s,n} \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C''_{s,n} \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

(b) 任取 $\frac{n}{s} < q < \infty$, 已知 $f = G_s * f_s$, 为了得到 f 的 L^q 估计, 自然会考虑 Young 不等式. 又因为目标是 $W^{s,p}$ 范数, 故 Young 不等式左端的指标为 q , 而右端的指标中有一个是 p . 因为 $q > \frac{n}{s} = p$, 故总能找到 $t > 1$ 使得

$$1 + \frac{1}{q} = \frac{s}{n} + \frac{1}{t} = \frac{1}{p} + \frac{1}{t}.$$

于是 $1 < \frac{s}{n} + \frac{1}{t}$, 这表明 $(-n+s)t > -n$, 因此函数 $|x|^{-n+s}\chi_{|x|\leq 2}$ 是 t 次可积函数, 于是由 Bessel 势在原点与无穷远处的行为 6.4 知 $G_s \in L^t(\mathbb{R}^n)$, 进而由 Young 不等式知

$$\|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|G_s\|_{L^t(\mathbb{R}^n)} = C_{n,s} \|f\|_{W^{\frac{n}{p},p}(\mathbb{R}^n)}.$$

(c) 已知 $f = G_s * f_s$. 我们首先说明无论 $s > 0$ 怎么取值, 总会有 $G_s \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$. 在 $s \geq n$ 时, 由 Bessel 势在原点与无穷远处的行为 6.4 知 $G_s \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$. 在 $0 < s < n$ 时, 知 $G_s(x)$ 在零点附近被 $|x|^{-n+s}$ 的某常数倍控制, 而在无穷远处有指数阶衰减, 因此只要 $(-n+s)p' > -n$ (亦即 $s > \frac{n}{p}$), G_s 在原点附近就是 p' 次可积的, 进而 $G_s \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$. 又因为 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f_s \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故 f 实际上是 L^p 函数与 $L^{p'}$ 函数的卷积. 现在一方面由 Young 不等式知 f 一致有界, 另一方面由 Lebesgue 积分的平均连续性即得 f 的一致连续性. $\square$

6.1.4.2 非齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画

我们下面介绍本节的第一个主要结果, 即用 Littlewood-Paley 定理刻画非齐次 Sobolev 空间.

为便于阐明定理, 我们需要提前声明一些设置. 取定 $\mathbb{R}^n$ 上 Fourier 变换非负的 Schwartz 函数 Ψ , 令 $\text{supp } \widehat{\Psi} \subset \{1 - \frac{1}{7} \leq |\xi| \leq 2\}$, 在环 $1 \leq |\xi| \leq 2 - \frac{2}{7}$ 上 $\widehat{\Psi} \equiv 1$, 且在环 $1 \leq |\xi| \leq 4 - \frac{4}{7}$ 上 $\widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(\frac{\xi}{2}) = 1$. 这样设置的函数满足

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \neq 0. \quad (6.32)$$

现在定义由 Ψ 诱导的 Littlewood-Paley 算子 $\Delta_j^\Psi : f \mapsto (\widehat{f}(\xi) \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))^\vee$, 将其写成

$$\Delta_j^\Psi(f) = \Psi_{2^{-j}} * f. \quad (6.33)$$

根据 Ψ 的构造可得

$$\Delta_j^\Psi = (\Delta_{j-1}^\Psi + \Delta_j^\Psi + \Delta_{j+1}^\Psi) \Delta_j^\Psi, \quad \forall j \in \mathbb{Z}.$$

另定义 Schwartz 函数 Φ 为

$$\widehat{\Phi}(\xi) = \begin{cases} \sum_{j \leq 0} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi), & \xi \neq 0, \\ 1, & \xi = 0. \end{cases} \quad (6.34)$$

因为 $j \geq 1$ 时 $|\xi| \leq 2 - \frac{2}{7} \Rightarrow \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 0$, 故 $|\xi| \leq 2 - \frac{2}{7}$ 时 $\widehat{\Phi}(\xi) = 1$, 同理可以说明 $|\xi| \geq 2$ 时 $\widehat{\Phi} \equiv 0$, 且

$$\widehat{\Phi}(\xi) + \sum_{j=1}^{\infty} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (6.35)$$

现在记算子 S_0^Φ 为

$$S_0^\Phi(f) = \Phi * f, \quad f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n). \quad (6.36)$$

由 (6.35) 式与 Littlewood-Paley 分解的逼近性质 6.3(b) 知算子等式

$$S_0^\Phi + \sum_{j=1}^{\infty} \Delta_j^\Psi = I$$

在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立.

在做完这些准备工作后, 接下来我们就可以介绍下述结果了:

定理 6.3 (非齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画)

设 Ψ 满足 (6.32) 式, Φ 满足 (6.34) 式, Δ_j^Ψ, S_0^Φ 分别依 (6.33), (6.36) 式定义. 取定 $s \in \mathbb{R}, 1 < p < \infty$, 则存在仅依赖于 n, s, p, Φ, Ψ 的常数 C_1 使得对任意 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|S_0^\Phi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \left\| \left(\sum_{j=1}^{\infty} (2^{js} |\Delta_j^\Psi(f)|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_1 \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.37)$$

相反地, 存在依赖于 n, s, p, Φ, Ψ 的常数 C_2 使得对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 只要

$$\|S_0^\Phi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \left\| \left(\sum_{j=1}^{\infty} (2^{js} |\Delta_j^\Psi(f)|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty,$$

那么 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C_2 \left(\|S_0^\Phi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \left\| \left(\sum_{j=1}^{\infty} (2^{js} |\Delta_j^\Psi(f)|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \right). \quad (6.38)$$



证明 为符号简便, 统一用 C 表示依赖于 n, s, p, Φ, Ψ 的常数. 对给定的缓增分布 f , 我们定义缓增分布 f_s 为

$$f_s = ((1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} f)^\vee,$$

进而 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.

首先设(6.38)右式的量是有限的, 通过控制 f_s 的 L^p 范数来证明 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$. 记

$$f_s = (\widehat{\Phi} f_s)^\vee + ((1 - \widehat{\Phi}) f_s)^\vee,$$

接下来说明上右式的两项都是 L^p 函数. 对于第一项, 取紧支光滑函数 η_0 满足在 $\text{supp } \widehat{\Phi}$ 上 $\eta_0 \equiv 1$, 显见对任意 $s \in \mathbb{R}$ 而言, $(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \eta_0(\xi)$ 都满足 Mihlin 条件, 因此由 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7 知 $(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \eta_0(\xi) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n) (1 < p < \infty)$. 因为

$$\begin{aligned} (\widehat{\Phi} f_s)^\vee(x) &= ((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{\Phi}(\xi) \widehat{f}(\xi))^\vee(x) \\ &= (((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \eta_0(\xi)) \widehat{S_0^\Phi(f)}(\xi))^\vee(x), \end{aligned} \quad (6.39)$$

故

$$\|(\widehat{\Phi} f_s)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|S_0^\Phi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.40)$$

对于第二项, 记 η_∞ 是在原点某邻域为零, 在 $\text{supp}(1 - \widehat{\Phi})$ 上为 1 的光滑函数, 用 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7 可以验证

$$\frac{(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}}}{|\xi|^s} \eta_\infty(\xi) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n),$$

且上式中函数的 $\mathcal{M}_p$ 范数依赖于 n, p, η_∞, s . 现因

$$((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f})^\vee(x) = \left(\frac{(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \eta_\infty(\xi)}{|\xi|^s} |\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f} \right)^\vee(x),$$

故

$$\|((1 - \widehat{\Phi}) f_s)^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f_\infty\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (6.41)$$

其中 f_∞ 是通过下式定义的缓增分布

$$f_\infty = (|\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f})^\vee.$$

现在考虑用 Littlewood-Paley 定理 5.2 证明 $\|f_\infty\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty$. 为此引入支在环 $\frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 4$ 上的光滑鼓包函数 $\widehat{\zeta}$, 令它在 $\text{supp } \widehat{\Psi}$ 上恒为 1. 定义 $\widehat{\theta}(\xi) = |\xi|^s \widehat{\zeta}(\xi)$, 设 Littlewood-Paley 算子

$$\Delta_j^\theta(g) = g * \theta_{2^{-j}},$$

其中 $\theta_{2^{-j}}(t) = 2^{jn} \theta(2^j t)$. 回忆

$$1 - \widehat{\Phi}(\xi) = \sum_{k \geq 1} \widehat{\Psi}(2^{-k} \xi),$$

可得

$$\begin{aligned}\widehat{f_\infty} &= |\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f} = \sum_{j=1}^{\infty} |\xi|^s \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{f}(\xi) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} |\xi|^s \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{\zeta}(2^{-j}\xi) \widehat{f} \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} 2^{js} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{\theta}(2^{-j}\xi) \widehat{f}\end{aligned}$$

在 $\mathcal{S}'$ 的意义下成立, 因此

$$f_\infty = \sum_{j=1}^{\infty} \Delta_j^\theta(2^{js} \Delta_j^\Psi(f))$$

在 $\mathcal{S}'$ 的意义下成立. 现因 θ 具有实值 Fourier 变换, 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \theta(x) dx = \widehat{\theta}(0) = 0$, 故由 (5.33) 式知

$$\left\| \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\theta(f_j) \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C(n, p, \theta) \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |f_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

现取 $f_j = 2^{js} \Delta_j^\Psi(f)$, 知

$$\|f_\infty\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \left\| \left(\sum_{j=1}^{\infty} |2^{js} \Delta_j^\Psi(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty. \quad (6.42)$$

结合 (6.40)-(6.42) 式即得 (6.38) 式. 上面的论述同时说明 f_∞ 也是函数.

为得到反向不等式 (6.37), 我们必须从本质上把上述步骤反转. 现设 $f \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 往证 (6.37) 式.

第一步, 我们有下述估计成立

$$\begin{aligned}\|S_0^\Phi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &= \|(\widehat{f\Phi})^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|((1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{f}(\xi) (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{\Phi}(\xi))^\vee\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)},\end{aligned} \quad (6.43)$$

其中 (A) 是因为由 $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 可知 $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{\Phi}(\xi) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$.

第二步, 设 $\widehat{\sigma}(\xi) = |\xi|^{-s} \widehat{\Psi}(\xi)$, 令 Δ_j^σ 是鼓包函数 $\widehat{\sigma}(2^{-j}\xi)$ 诱导的 Littlewood-Paley 算子, 有

$$2^{js} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{f} = \widehat{\sigma}(2^{-j}\xi) |\xi|^s \widehat{f} \stackrel{(B)}{=} \widehat{\sigma}(2^{-j}\xi) |\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f} = \widehat{\sigma}(2^{-j}\xi) \widehat{f_\infty}, \quad j \geq 2,$$

其中 (B) 是因为根据 $\widehat{\Phi}, \widehat{\Psi}$ 的构造, $j \geq 2$ 时 $\widehat{\Phi}$ 在 $\text{supp } \widehat{\sigma}(2^{-j}\xi)$ 上为零. 由此可得算子等式

$$2^{js} \Delta_j^\Psi(f) = \Delta_j^\sigma(f_\infty). \quad (6.44)$$

由 (6.44) 式可得

$$\left\| \left(\sum_{j=2}^{\infty} |2^{js} \Delta_j^\Psi(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \left\| \left(\sum_{j=2}^{\infty} |\Delta_j^\sigma(f_\infty)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \stackrel{(C)}{\leq} C \|f_\infty\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (6.45)$$

其中 (C) 是 Littlewood-Paley 定理 5.2. 注意到

$$f_\infty = (|\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) \widehat{f})^\vee = \left(\frac{|\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi))}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}}} \widehat{f_s} \right)^\vee,$$

而由 Mihlin-Hörmander 乘子定理 5.7 知函数 $|\xi|^s (1 - \widehat{\Phi}(\xi)) (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, 故

$$\|f_\infty\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)},$$

将上式与 (6.45) 式联立得

$$\left\| \left(\sum_{j=2}^{\infty} |2^{js} \Delta_j^\Psi(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.46)$$

最后还需要讨论 $j = 1$ 的情况, 知

$$\begin{aligned} 2^s \Delta_1^\Psi(f) &= 2^s \widehat{\Psi}\left(\frac{1}{2}\xi\right)(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}\widehat{f}^\vee \\ &= 2^s \widehat{\Psi}\left(\frac{1}{2}\xi\right)(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}\widehat{f_s}^\vee, \end{aligned}$$

而 $\widehat{\Psi}(\frac{1}{2}\xi)(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}$ 作为紧支光滑函数当然在 $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 中, 故

$$\|2^s \Delta_1^\Psi(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C \|f\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.47)$$

结合(6.43),(6.46),(6.47)式即得(6.37)式. $\square$

6.1.4.3 齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画

下面介绍齐次 Sobolev 空间 $\dot{W}^{s,p}$, 它与非齐次空间 $W^{s,p}$ 最主要的区别在于 $\dot{W}^{s,p}$ 中的元素本身未必是 L^p 中的元素. 另一点不同之处在于齐次 Sobolev 空间中相差多项式的两个元素可以视作同一个元素.

为便于阐明定义, 在 $1 < p < \infty$ 时我们用 $\dot{L}^p(\mathbb{R}^n)$ 表示由 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素构成的空间, 其中每个 (由等价关系 $u \equiv v \Leftrightarrow u - v \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 生成的) 等价类都包含唯一从属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的表示. 定义这些等价类中每个元素的 $\dot{L}^p(\mathbb{R}^n)$ 范数为其 (唯一的) L^p 表示的 L^p 范数. 于是在这一定义下有

$$\|f + P\|_{\dot{L}^p(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{\dot{L}^p(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad f \in L^p(\mathbb{R}^n), P \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n).$$

定义 6.7 (齐次 Sobolev 空间)

设 $s \in \mathbb{R}, 1 < p < \infty$. 齐次 Sobolev 空间 $\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 定义为由 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素 u 构成的空间, 其中良定义分布 $(|\xi|^s \widehat{u})^\vee$ 与 $\dot{L}^p(\mathbb{R}^n)$ 中的函数重合. 对在 $\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的分布 u 定义

$$\|u\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = \|(|\cdot|^s \widehat{u})^\vee\|_{\dot{L}^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.48)$$

注

- (i) 齐次 Sobolev 范数 $\|\cdot\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)}$ 无法区分多项式, 因为若 u 是多项式, 则根据频率支在原点的缓增分布刻画知 $\widehat{u}$ 支在原点, 因此 $|\xi|^s \widehat{u}(\xi) \equiv 0$, 故 $\|u\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = 0$. 事实上, 后面定义的齐次空间都满足这个性质, 这也可以解释为什么在研究齐次空间时用于生成 Littlewood-Paley 算子的函数总是频率支在原点外的: 这样可以保证函数至少不是多项式.
- (ii) 分别讨论齐次空间与非齐次空间可能会让人疑惑动机所在. 实际上 [MathStackExchange](#) 上有人提过类似的问题, 回答者的观点是齐次空间上的范数“确为范数”, 这是因为齐次空间上的范数具有齐次性, 而非齐次空间上的“范数”实际上是准范数, 因此非齐次空间只能成为 Frechet 空间而非 Banach 空间.

为了避免研究函数的等价类这一较麻烦的对象, 出于和前文相同的理由, 我们把 $\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中相差多项式的两个分布视作同一元素. 在这一视角下, (6.48)式定义了一个范数.

齐次 Sobolev 空间有与非齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画6.3类似的定理.

定理 6.4 (齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画)

设 Ψ 满足(6.32)式, Δ_j^Ψ 是由 Ψ 诱导的 Littlewood-Paley 算子. 设 $s \in \mathbb{R}, 1 < p < \infty$, 则存在仅依赖于 n, s, p, Ψ 的常数 C_1 使得对任意 $f \in \dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} (2^{js} |\Delta_j^\Psi(f)|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_1 \|f\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.49)$$

相反地, 存在仅依赖于 n, s, p, Ψ 的常数 C_2 使得对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 只要

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} (2^{js} |\Delta_j^\Psi(f)|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty,$$

那么就有 $f \in \dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C_2 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} (2^{js} |\Delta_j^\Psi(f)|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.50)$$

证明 该定理的证明与非齐次 Sobolev 空间的 Littlewood-Paley 刻画 6.3 类似, 但是还要简单一些. 为得到 (6.49) 式, 设 $f \in \dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 注意到

$$2^{js} \Delta_j^\Psi(f) = 2^{js} (|\xi|^s |\xi|^{-s} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) \widehat{f})^\vee = (\widehat{\sigma}(2^{-j}\xi) \widehat{f}_s)^\vee = \Delta_j^\sigma(f_s),$$

其中 $\widehat{\sigma}(\xi) = \widehat{\Psi}(\xi) |\xi|^{-s}$, Δ_j^σ 是 Littlewood-Paley 算子 $f \mapsto (\widehat{f}(\xi) \widehat{\sigma}(2^{-j}\xi))^\vee$. 进而

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |2^{js} \Delta_j^\Psi(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\sigma(f_s)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \stackrel{(A)}{\leq} C \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C \|f\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)},$$

其中 (A) 是 Littlewood-Paley 定理 5.2, 至此即证 (6.49) 式.

下面说明若 (6.50) 右式有限, 则 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 必在齐次 Sobolev 空间 $\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中, 且其齐次 Sobolev 范数被 (6.50) 右式的某常数倍控制.

定义 Littlewood-Paley 算子 $\Delta_j^\eta : f \mapsto f * \eta_{2^{-j}}$, 其中 $\widehat{\eta}$ 作为光滑鼓包函数支在环 $\frac{4}{5} \leq |\xi| \leq 2$ 上, 且其满足

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\eta}(2^{-k}\xi) = 1, \quad \xi \neq 0, \quad (6.51)$$

或在算子形式下由 Littlewood-Paley 分解的逼近性质 6.3(c) 有

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \Delta_k^\eta = I \quad (6.52)$$

在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的意义下成立. 我们再引入另一族 Littlewood-Paley 算子 $\Delta_j^\theta : f \mapsto f * \theta_{2^{-j}}$, 其中 $\widehat{\theta}(\xi) = \widehat{\eta}(\xi) |\xi|^s$. 现取定 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 记 $f_s = (|\xi|^s \widehat{f})^\vee$, 显见 $f_s \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. 现由 Littlewood-Paley 定理 5.2(5.17) 知存在多项式 Q 使得

$$\|f\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = \|f_s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|f_s - Q\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\eta(f_s)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |2^{js} \Delta_j^\theta(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.53)$$

回忆 Δ_j 的定义, 注意到 $\text{supp } \widehat{\theta} = \text{supp } \widehat{\eta} = \{\frac{4}{5} \leq |\xi| \leq 2\}$, 又因为在环 $1 \leq |\xi| \leq 4 - \frac{4}{7}$ 上 $\widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(\frac{\xi}{2}) = 1$, 在 $\frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2 - \frac{2}{7}$ 上 $\widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(2\xi) = 1$, 且 $\text{supp } \widehat{\Psi}(\frac{\xi}{2}) \cap \text{supp } \widehat{\Psi}(2\xi) = \emptyset$, 故在 $\text{supp } \widehat{\theta}$ 上

$$\widehat{\Psi}\left(\frac{1}{2}\xi\right) + \widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(2\xi) = 1.$$

因此

$$\Delta_j^\theta = (\Delta_{j-1}^\Psi + \Delta_j^\Psi + \Delta_{j+1}^\Psi) \Delta_j^\theta.$$

因此有估计

$$\left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |2^{js} \Delta_j^\theta(f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \sum_{r=-1}^1 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\theta \Delta_{j+r}^\Psi(2^{js} f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由 Littlewood-Paley 定理的向量值版本 5.1 知

$$\sum_{r=-1}^1 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\theta \Delta_{j+r}^\Psi(2^{js} f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \lesssim \sum_{r=-1}^1 \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\Psi(2^{js} f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \lesssim \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\Psi(2^{js} f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

将上式代回 (6.53) 式即得

$$\|f\|_{\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \lesssim \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j^\Psi(2^{js} f)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

这便证明了 f 的齐次 Sobolev 范数被 (6.50) 右式的某常数倍控制, 特别在 (6.50) 右式有限时, 分布 f 在 $\dot{W}^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 内.

这便完成了反向不等式的证明, 命题证毕. $\square$

6.1.5 Lipschitz 空间

Lipschitz 空间衡量的是函数的分数阶光滑性. 根据经典定义, 称 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 是 γ ($\gamma \in (0, 1)$) 阶 Lipschitz (或 Hölder) 连续函数, 如果存在常数 $C < \infty$ 使得对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|f(x+y) - f(x)| \leq C|y|^\gamma. \quad (6.54)$$

人们引入 Lipschitz 范数来量化由 (6.54) 式中的 γ 所衡量的光滑性, Lipschitz 空间就是由这些范数定义的. 本节我们讨论 $\gamma > 1$ 时 (6.54) 式的不同版本, 并研究它与 Fourier 变换和正交性之间的关系. 本节的主要内容在于用 Littlewood-Paley 定理刻画 Lipschitz 空间.

6.1.5.1 Lipschitz 空间简介

定义 6.8 (非齐次 Lipschitz 空间)

设 $0 \leq \gamma < 1$. 称 $\mathbb{R}^n$ 上的函数为 γ 阶 Lipschitz 函数, 如果其作为有界连续函数满足 (6.54) 式. 此时记

$$\|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sup_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{|f(x+h) - f(x)|}{|h|^\gamma}.$$

定义空间

$$\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n) = \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续且 } \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} < \infty\}.$$

称 $\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 为 γ 阶非齐次 Lipschitz 空间.



注 可以说明 $\Lambda_0(\mathbb{R}^n) = L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, 此时范数 $\|\cdot\|_{\Lambda_0(\mathbb{R}^n)}$ 与 $\|\cdot\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 是等价的. 这是因为在 $\gamma = 0$ 时对任意有界连续函数 f 有

$$\|f\|_{\Lambda_0(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sup_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |f(x+h) - f(x)| \leq 3\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

又显见 $\|f\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{\Lambda_0(\mathbb{R}^n)}$, 故 $\|\cdot\|_{\Lambda_0(\mathbb{R}^n)}$ 与 $\|\cdot\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 等价, 因此 $\Lambda_0(\mathbb{R}^n) = L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$.

根据 Taylor 展开定理可知在 $\gamma > 1$ 时只有常值函数满足

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sup_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |h|^{-\gamma} |f(x+h) - f(x)| < \infty,$$

前述定义在此就不起作用了. 为将定义 6.8 延拓到指标 $\gamma \geq 1$ 的情况, 对 $h \in \mathbb{R}^n$ 我们定义作用在连续函数 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 上的差分算子 D_h 为

$$D_h(f)(x) = f(x+h) - f(x).$$

容易验证

$$D_h^2(f)(x) = D_h(D_h f)(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x),$$

$$D_h^3(f)(x) = D_h(D_h^2 f)(x) = f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x),$$

通过归纳法可以证明一般情况下 $D_h^{k+1}(f) = D_h^k(D_h f)$ 可表为

$$D_h^{k+1}(f)(x) = \sum_{s=0}^{k+1} (-1)^{k+1-s} C_{k+1}^s f(x+sh), \quad (6.55)$$

其中 k 是非负整数.

定义 6.9 ((延拓定义后的) 非齐次 Lipschitz 空间)

对 $\gamma > 0$ 定义

$$\|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sup_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{|D_h^{[\gamma]+1}(f)(x)|}{|h|^\gamma},$$

其中 $[\gamma]$ 表示 γ 的整数部分, 记

$$\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n) = \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续且 } \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} < \infty\}.$$

称 $\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 为 $\gamma (\gamma \in \mathbb{R}^+)$ 阶非齐次 Lipschitz 空间.



另外我们定义齐次 Lipschitz 空间如下:

定义 6.10 (齐次 Lipschitz 空间)

对 $\gamma > 0$ 定义

$$\|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sup_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{|D_h^{[\gamma]+1}(f)(x)|}{|h|^\gamma},$$

记

$$\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n) = \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续且 } \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} < \infty\}.$$

称 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 为 γ 阶齐次 Lipschitz 空间.



注 注意到在 $\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 与 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 的定义中都特别要求了 f 连续, 这是因为在 $\gamma \geq 1$ 时我们没法从 Lipschitz 范数有限推知 f 连续. 其根源在于选择公理断言了向量空间 $\mathbb{R}$ 存在一组基 $\{v_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 我们基于这一点构造 Lipschitz 范数有限的不连续函数. 不失一般性, 我们把 1 添进这组基, 定义 $f(1) = 1$, 在 $v_i \neq 1$ 时 $f(v_i) = -1$, 然后通过线性性将 f 延拓到 $\mathbb{R}$ 上. 现若 $v_i \neq 1$, 则 $v_i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 取 $q_k \in \mathbb{Q}$ 使得 $q_k \rightarrow v_i (k \rightarrow \infty)$, 则 $f(q_k) = q_k \rightarrow v_i (k \rightarrow \infty)$, 但另一方面 $f(v_i) = -1 \neq v_i$, 这说明 f 在每个 v_i 处均不连续, 进而由线性性知 f 处处不连续. 与此同时由线性性知对任意 $x, h \in \mathbb{R}$ 有 $D_h(f)(x) = f(h)$, 于是对任意 $k \geq 2$ 有 $D_h^k(f) = 0$, 因此 $\|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R})} = \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R})} = 0$.

接下来我们说明 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 中的元素在无穷远处至多以多项式速度增长. 事实上, 通过差分的表达式(6.55)知对任意 $h \in \mathbb{R}^n$ 有

$$D_h^{k+1}(f - f(0))(0) = \sum_{s=1}^{k+1} (-1)^{k+1-s} C_s^{k+1}(f(sh) - f(0)),$$

于是

$$f((k+1)h) - f(0) = D_h^{k+1}(f - f(0))(0) - \sum_{s=1}^k (-1)^{k+1-s} C_s^{k+1}(f(sh) - f(0)).$$

进而

$$\begin{aligned} |f((k+1)h) - f(0)| &\leq \sum_{k=1}^k C_{k+1}^s |f(sh) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |h|^{k+1} \\ &\leq 2^{k+1} \left[\sup_{s \in \{1, \dots, k\}} |f(sh) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma} |h|^{k+1} \right], \end{aligned} \quad (6.56)$$

将 h 换成 $(k+1)h$ 可得对任意 $h \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned}
 |f((k+1)^2 h) - f(0)| &\leq 2^{k+1} \left[\sup_{s \in \{1, \dots, k\}} |f(s(k+1)h) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |(k+1)h|^{k+1} \right] \\
 &\stackrel{(A)}{\leq} 2^{k+1} [2^{k+1} \left(\sup_{s, s' \in \{1, \dots, k\}} |f(ss'h) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |kh|^{k+1} \right) + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |(k+1)h|^{k+1}] \\
 &\stackrel{(B)}{\leq} 2^{k+1} [2^{k+1} \sup_{s, s' \in \{1, \dots, k\}} |f(ss'h) - f(0)| + 2^{k+1} \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |(k+1)h|^{k+1}] \\
 &\leq (2^{k+1})^2 \left[\sup_{s \in \{1, \dots, k^2\}} |f(sh) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |(k+1)h|^{k+1} \right],
 \end{aligned} \tag{6.57}$$

其中 (A) 是将 sh 看成新的 h , 在 $\sup_{s \in \{1, \dots, k\}}$ 内再次使用 (6.56) 式得到的; (B) 是因为在 k 足够大时有

$$2^{k+1} k^{k+1} + (k+1)^{k+1} \leq 2^{k+1} (k+1)^{k+1}.$$

继续将 (6.57) 式中的 h 换成 $(k+1)h$, 重复操作可得对任意 $M \in \mathbb{N}$ 与 $h \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|f((k+1)^M h) - f(0)| \leq (2^{k+1})^M \left[\sup_{s \in \{1, \dots, k^M\}} |f(sh) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |(k+1)^{M-1} h|^{k+1} \right],$$

将上式中的 h 换成 $(k+1)^{-M} h$ 可得

$$|f(h) - f(0)| \leq (2^{k+1})^M \left[\sup_{s \in \{1, \dots, k^M\}} |f(s(k+1)^{-M} h) - f(0)| + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} \frac{|h|^{k+1}}{(k+1)^{k+1}} \right].$$

现取定 $|h| > 1$ 与足够大的 $k \in \mathbb{N}$, 知存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得 $(\frac{k+1}{k})^{M-1} < |h| \leq (\frac{k+1}{k})^M$. 若设 $c(k) = (k+1)/\log_2(\frac{k+1}{k})$, 则

$$(2^{k+1})^M = \left(\frac{k+1}{k} \right)^{Mc(k)} \leq \left(\frac{k+1}{k} \right)^{c(k)} |h|^{c(k)}.$$

又因为 f 连续, 故 $\|f\|_{L^\infty(\overline{B(0,1)})} < \infty$, 因此对任意 $|h| > 1$ 有

$$|f(h) - f(0)| \leq \left(\frac{k+1}{k} \right)^{c(k)} [2\|f\|_{L^\infty(\overline{B(0,1)})} + \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}] |h|^{c(k)}.$$

这说明 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 中的函数在无穷远处至多有多项式速度增长, 因此它们能成为缓增分布.

因为 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 中的元素可以看成缓增分布, 故我们把 $D_h^k(u)$ 的定义延拓到缓增分布上. 对 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 定义缓增分布 $D_h^k(u)$ 为

$$\langle D_h^k(u), \varphi \rangle = \langle u, D_{-h}^k(\varphi) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

因为常值函数 f 满足对任意 $h, x \in \mathbb{R}^n$ 都有 $D_h(f)(x) = 0$, 故 $\|\cdot\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$ 对常数不敏感. 类似地, 表达式 $D_h^{[\gamma]+1}(f)$ 与 $\|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$ 没法区分至多 $[\gamma]$ 阶的多项式, 另外还可以说明多项式是唯一具有该性质的连续函数. 这表明 $\|\cdot\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$ 不是范数, 而仅仅是半范数 (因为 $\|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} = 0$ 仅仅意味着 f 是不超过 $[\gamma]$ 阶的多项式). 然而, 如果我们考虑模多项式的函数等价类, $\|\cdot\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$ 就确为范数. 因此, 我们通常把 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 看成 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}_{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$ 的子空间, 其中 $\mathcal{P}_d(d \geq 0)$ 表示至多 d 阶的多项式构成的空间.

例 6.4 设 $a \in \mathbb{R}^n, 0 < \gamma < 1$, 则对于函数 $h(x) = \cos(x \cdot a)$, 因为从 $|h(x) - h(y)| \leq \min(2, |a||x - y|)$ 可知 $|h(x) - h(y)| \leq 2^{1-\gamma} |a|^\gamma |x - y|^\gamma$, 故 $h \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$. 同理, 因为 $||x + h|^\gamma - |x|^\gamma| \leq |h|^\gamma (0 < \gamma < 1)$, 故函数 $x \mapsto |x|^\gamma$ 也在 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 中.

更高阶 Lipschitz 空间中函数的例子可以通过绝对值函数的幂次给出. 例如考察 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $|x|^2$, 知 $D_h(|x|^2) = 2|h|^2$, 于是 $|x|^2 \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \gamma \geq 2$.

再考察 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $|x|^{\frac{3}{2}}$, 它在任意点都有连续偏导: $x \neq 0, n \geq 2$ 时 $\partial_j |x|^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} x_j |x|^{-\frac{1}{2}} (j = 1, \dots, n)$, 而 $x = 0$ 时其偏导为 0. 我们断言 $|x|^{\frac{3}{2}} \in \dot{\Lambda}_{\frac{3}{2}}(\mathbb{R}^n), x_j |x|^{-\frac{1}{2}} \in \dot{\Lambda}_{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$. 为此我们首先证明下述不等式

$$\left| \frac{x_j + h_j}{|x + h|^{\frac{1}{2}}} - \frac{x_j}{|x|^{\frac{1}{2}}} \right| \leq C|h|^{\frac{1}{2}}. \tag{6.58}$$

考虑下述三种情况: (a) $x = 0, h \neq 0$, 此时结论显然成立; (b) $x \neq 0, 2|h| < |x|$, 此时 (6.58) 左式根据微分中值定

理被形如 $c|h||x + \xi|^{-\frac{1}{2}}$ 的式子控制 (其中 $|\xi| \leq h$), 于是由 $|x + \xi| \geq |x| - |\xi| \geq |x| - |h| \geq |h|$ 即证(6.58)式; (c) $2|h| \geq |x|, h \neq -x \neq 0$, 此时

$$\left| \frac{x_j + h_j}{|x + h|^{\frac{1}{2}}} - \frac{x_j}{|x|^{\frac{1}{2}}} \right| \leq \frac{|x_j + h_j|^{\frac{1}{2}}}{|x + h|^{\frac{1}{2}}} + \frac{|x_j|^{\frac{1}{2}}}{|x|^{\frac{1}{2}}} \leq |x + h|^{\frac{1}{2}} + |x|^{\frac{1}{2}} \leq C|h|^{\frac{1}{2}}.$$

至此(6.58)式得证, 于是 $x_j|x|^{-\frac{1}{2}} \in \dot{\Lambda}_{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$. 现由微积分基本定理与积分中值定理²知存在 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|\xi| \leq |h|$, 且

$$D_h^2(|x|^{\frac{3}{2}}) = \nabla(|x|^{\frac{3}{2}})(x + h + \xi) - \nabla(|x|^{\frac{3}{2}})(x + \xi) \cdot h,$$

代入(6.58)式可得

$$|D_h^2(|x|^{\frac{3}{2}})| \leq C|h|^{\frac{3}{2}}.$$

这便说明了 $|x|^{\frac{3}{2}} \in \dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)$.

下面介绍差分算子 D_h^k 的一些有用性质:

命题 6.5 (差分算子的积分表示)

设 $f \in C^m(\mathbb{R}^n), m \in \mathbb{N}$, 则对任意 $h = (h_1, \dots, h_n)$ 与 $x \in \mathbb{R}^n$ 均成立等式:

$$D_h(f)(x) = \int_0^1 \sum_{j=1}^n h_j (\partial_j f)(x + sh) ds. \quad (6.59)$$

另有

$$D_h^m(f)(x) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_m=1}^n h_{j_1} \cdots h_{j_m} (\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f)(x + (s_1 + \cdots + s_m)h) ds_1 \cdots ds_m. \quad (6.60)$$

因此如果存在 $\gamma \in (0, 1)$ 使得对全体多重指标 $|\alpha| = m$ 均有 $\partial^\alpha f \in \dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)$, 就有 $f \in \dot{\Lambda}_{m+\gamma}(\mathbb{R}^n)$. 

证明 对定义在 $[0, 1]$ 上的函数 $t \mapsto f((1-t)x + t(x+h))$ 应用微积分基本定理立得(6.59)式, 进而利用归纳法可以证明(6.60)式. 现在设 $\partial^\alpha f \in \dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)$ 对全体多重指标 $|\alpha| = m$ 均成立, 在(6.60)式两端同时作用 D_h , 根据 $\|\cdot\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)}$ 的定义有

$$|D_h(\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f)(x + (s_1 + \cdots + s_m)h)| \leq \|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)} |h|^\gamma,$$

于是

$$\begin{aligned} |D_h^{m+1}(f)(x)| &\leq \int_0^1 \cdots \int_0^1 \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_m=1}^n |h_{j_1} \cdots h_{j_m}| \|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)} |h|^\gamma ds_1 \cdots ds_m \\ &\leq |h|^{m+\gamma} \int_0^1 \cdots \int_0^1 \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_m=1}^n \|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)} ds_1 \cdots ds_m \\ &\leq |h|^{m+\gamma} \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_m=1}^n \|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

显见平移变换不会改变 $\|\cdot\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)}$, 因此 $\|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} D_h^{[\gamma]}(f)\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)}$ 能被 $\|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)}$ 的有限线性组合控制, 因此

$$|D_h^{m+[\gamma]+1}(f)(x)| = |D_h^{m+1}(D_h^{[\gamma]}f)(x)| \lesssim |h|^{m+\gamma} \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_m=1}^n \|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma}(\mathbb{R}^n)} \Rightarrow f \in \dot{\Lambda}_{m+\gamma}(\mathbb{R}^n).$$

□

²这里我们用的是 $g(b) - g(a) = \int_0^1 \nabla g((1-t)a + tb) \cdot (b-a) dt = \nabla g((1-t^*)a + t^*b) \cdot (b-a)$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}^n$ 式任取的, $g \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $t^* \in (0, 1)$ 依赖于 g, a, b .

6.1.5.2 齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画

我们现在用 Littlewood-Paley 算子 Δ_j 来刻画齐次 Lipschitz 空间. 类似于在刻画 Sobolev 空间时的设置, 取定 Schwartz 函数 Ψ 满足 $\widehat{\Psi} \geq 0$, $\text{supp } \widehat{\Psi} \subset \{1 - \frac{1}{7} \leq |\xi| \leq 2\}$, 在环 $1 \leq |\xi| \leq 2 - \frac{2}{7}$ 上 $\widehat{\Psi} \equiv 1$, 且

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \quad \forall \xi \neq 0. \quad (6.61)$$

由 Ψ 诱导的 Littlewood-Paley 算子 Δ_j^Ψ 定义为 $f \mapsto (\widehat{f}(\xi)\widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))^\vee$. 这一算子是良定义的, 因为前面提过 $\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 中的元素都是缓增分布, 这说明卷积 $\Psi_{2^{-j}} * f = \Delta_j^\Psi(f)$ 本质上是 Schwartz 函数与缓增分布的卷积, 它因而是在无穷远处至多有多项式增长速度的光滑函数. 另外记 $[\gamma]$ 在 $\gamma \notin \mathbb{N}$ 时为 $\lceil \gamma \rceil$, $\gamma \in \mathbb{N}$ 时为 $\gamma - 1$, 且记 $C^0(\mathbb{R}^n) = C(\mathbb{R}^n)$.

定理 6.5 (齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画)

设 Ψ, Δ_j^Ψ 同上, $\gamma > 0$, 则存在常数 $C = C(n, \gamma, \Psi)$ 使得对任意 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 均有估计

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.62)$$

相反地, 对给定的 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 只要

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = C_0 < \infty, \quad (6.63)$$

则存在多项式 Q 与常数 $C_{n,\gamma}$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $|f(x) - Q(x)| \leq C_{n,\gamma} C_0 (1 + |x|)^{[\gamma]+1}$. 另有 $f - Q \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n) \cap \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 且存在常数 $C'(n, \gamma, \Psi)$ 使得

$$\|f - Q\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} \leq C'(n, \gamma, \Psi) C_0. \quad (6.64)$$

特别地, 对函数 f 而言, $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n) \Rightarrow f \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$.

证明 我们从(6.62)式开始证明, 首先考虑 $0 < \gamma < 1$ 这一简单情况. 因为 Δ_j^Ψ 的卷积核 $\Psi_{2^{-j}}$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi_{2^{-j}}(x) dx = \widehat{\Psi}(0) = 0$, 故对 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} \Delta_j^\Psi(f)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \Psi_{2^{-j}}(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x)) \Psi_{2^{-j}}(y) dy \\ &= 2^{-j\gamma} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_{-\gamma}(f)(x)}{|y|^\gamma} |2^j y|^\gamma 2^{jn} \Psi(2^j y) dy, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} 2^{j\gamma} |\Delta_j^\Psi(f)(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |2^j y|^\gamma 2^{jn} \Psi(2^j y) dy \\ &\leq \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |y|^\gamma \Psi(y) dy \leq C \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

因此 $\sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$, $0 < \gamma < 1$ 时的(6.62)式即证.

下面讨论 $\gamma \geq 1$ 的情况. 记 $(\tau^y f)(x) = f(x-y)$, 注意到对任意 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$\begin{aligned} D_h(u) &= \tau^{-h}(u) - u = (e^{i2\pi\xi \cdot h} \widehat{u} - \widehat{u})^\vee = ((e^{i2\pi\xi \cdot h} - 1) \widehat{h})^\vee, \\ D_h^2(u) &= \tau^{-h}(D_h u) - D_h u = ((e^{i2\pi\xi \cdot h} - 1) \widehat{D_h u})^\vee = ((e^{i2\pi\xi \cdot h} - 1)^2 \widehat{u})^\vee, \\ &\vdots \end{aligned}$$

归纳立得

$$D_h^{[\gamma]+1}(u) = ((e^{i2\pi\xi \cdot h} - 1)^{[\gamma]+1} \widehat{u}(\xi))^\vee,$$

其中 Fourier 逆变换能够进行是因为它作用在有界光滑函数与缓增分布的乘积上, 这一乘积是有定义的.

现在取定 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ ($\gamma \geq 1$), 根据上述讨论, 想要用 $D_h^{[\gamma]+1}(f)$ 表示 Δ_j^Ψ , 自然会考虑函数

$$\xi \mapsto \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) (e^{i2\pi\xi \cdot h} - 1)^{-[\gamma]-1}.$$

但是因为 $\text{supp } \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi)$ 可能包含使得 $\xi \cdot h$ 为整数的 ξ (从而 $e^{i2\pi\xi \cdot h} - 1$ 可能为 0), 因此上述函数不是良定义的. 为了解决这个问题, 我们取有限个单位向量 $\{u_r\}_r$ 使得环 $\frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2$ 能被集合

$$U_r = \left\{ \xi \in \mathbb{R}^n : \frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2, \frac{1}{4} \leq |\xi \cdot u_r| \leq 2 \right\}$$

关于角标 r 的并包含. 现在把 $\widehat{\Psi}$ 写成光滑函数 $\widehat{\Psi}^{(r)}$ 的有限和, 其中每个 $\widehat{\Psi}^{(r)}$ 都支在 U_r 上³. 记

$$h_{r,j} = \frac{1}{8} 2^{-j} u_r,$$

注意到 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n) \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \widehat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 于是

$$\begin{aligned} (\Psi^{(r)})_{2^{-j}} * f &= (\widehat{\Psi}^{(r)}(2^{-j}\xi)(e^{i2\pi\xi \cdot h_{r,j}} - 1)^{-[\gamma]-1}(e^{i2\pi\xi \cdot h_{r,j}} - 1)^{[\gamma]+1}\widehat{f}(\xi))^\vee \\ &= (\widehat{\psi}^{(r)}(2^{-j}\xi)(e^{i2\pi 2^{-j}\xi \cdot \frac{1}{8}u_r} - 1)^{-[\gamma]-1}(D_{h_{r,j}}^{[\gamma]+1}(f))^\wedge(\xi))^\vee, \end{aligned} \quad (6.65)$$

其中指数函数 $e^{i2\pi 2^{-j}\xi \cdot \frac{1}{8}u_r}$ 不可能为 1, 因为

$$2^{-j}\xi \in U_r \Rightarrow \frac{1}{32} \leq \left| 2^{-j}\xi \cdot \frac{1}{8}u_r \right| \leq \frac{1}{4}.$$

从而函数 $\widehat{\zeta}^{(r)} = \widehat{\Psi}^{(r)}(\xi)(e^{i2\pi\xi \cdot \frac{1}{8}u_r} - 1)^{-[\gamma]-1}$ 是良定义的紧支光滑函数, 进而

$$(\Psi^{(r)})_{2^{-j}} * f = (\zeta^{(r)})_{2^{-j}} * D_{h_{r,j}}^{[\gamma]+1}(f),$$

于是

$$\|(\Psi^{(r)})_{2^{-j}} * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|(\zeta^{(r)})_{2^{-j}}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|D_{2^{-j}\frac{1}{8}u_r}^{[\gamma]+1}(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\zeta^{(r)}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} 2^{-j\gamma}.$$

将上式两端关于 r 求和可得

$$\|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} 2^{-j\gamma}, \quad (6.66)$$

其中 C 依赖于 n, γ, Ψ , 而与 j 无关. 这便证明了 (6.62) 式.

下面在 (6.63) 式成立的情况下证明 (6.64) 式⁴. 首先需要做一些准备工作, 取 $\mathbb{R}^n$ 上的 Schwartz 函数 η 满足 $\widehat{\eta} \geq 0, \text{supp } \widehat{\eta} \subset \{\frac{4}{5} \leq |\xi| \leq 2\}$, 且

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\eta}(2^{-j}\xi)^2 = 1, \quad \forall \xi \neq 0. \quad (6.67)$$

设 $\Delta_j^\eta : f \mapsto (\widehat{f}(\xi)\widehat{\eta}(2^{-j}\xi))^\vee$ 是 η 诱导的 Littlewood-Paley 算子. 另在 (6.61) 式的基础上记

$$\widehat{\Theta}(\xi) = \widehat{\Psi}\left(\frac{1}{2}\xi\right) + \widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(2\xi),$$

同时记 $\Delta_j^\Theta : f \mapsto (\widehat{f}(\xi)\widehat{\Theta}(2^{-j}\xi))^\vee$ 是 Θ 诱导的 Littlewood-Paley 算子, 显见 $\Delta_j^\Theta = \Delta_{j-1}^\Psi + \Delta_j^\Psi + \Delta_{j+1}^\Psi$. 由 (6.63) 式, 对任意 $j \in \mathbb{Z}$ 均有

$$\|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C_0(2^\gamma + 1 + 2^{-\gamma})2^{-j\gamma}. \quad (6.68)$$

通过 Ψ 取值的构造可知 $\widehat{\Theta}$ 在 $\text{supp } \widehat{\eta}$ 上恒为 1, 结合 (6.67) 式可得算子恒等式

$$I = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (\Delta_j^\eta)^2 = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j^\Theta \Delta_j^\eta \Delta_j^\eta,$$

其中级数在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 的意义下收敛, 这里的收敛性基于 Calderón 再现公式 6.1⁵. 另外, 在下面的证明中, 我们将取定 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足 (6.63) 式. 对 $L = 1, 2, 3, \dots$ 定义

$$f_L = \sum_{|j| \leq L} \Delta_j^\Theta \Delta_j^\eta \Delta_j^\eta(f) = \sum_{|j| \leq L} (\Delta_j^\Theta(f) * \eta_{2^{-j}}) * \eta_{2^{-j}}.$$

³这件事能够达成是因为可以通过添加合适的 u_r 来保证环 $\frac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2$ 上的每一点都恰好落在某个锥形区域 $\{\frac{1}{4} \leq |\xi \cdot u_r| \leq 2\}$ 的内部, 随后利用示性函数与磨光即可得到 $\Psi^{(r)}$.

⁴证明的主要思路在于把 f 往可微函数上靠, 后面的一系列过程都在说明 f 作为缓增分布能与可微函数加上某个多项式等同.

⁵引入 η 是为了把差分算子 $D_h^{[\gamma]+1}$ 转移到性质足够好的函数 η 上, 而引入 Θ 是为了使用 (6.63) 式. 使用 Θ 而不直接使用 Ψ 又是因为 Θ 满足 $\widehat{\Theta}$ 在 $\text{supp } \widehat{\eta}$ 上恒为 1, 这样就方便导出算子恒等式了.

显见对任意 L 都有 $f_L \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且 $f_L \rightarrow f (L \rightarrow \infty)$ 在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的意义下成立. 我们还需准备一个引理:

引理 6.2

设 $h_k, k = 1, 2, \dots$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^N 函数, 其满足 $k \rightarrow \infty$ 时在 $\mathbb{R}^n$ 的每个紧子集上均有 $h_k \rightarrow h$ 一致成立. 设存在有限常数 C_α, M_α 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有 $\sup_{k \in \mathbb{N}} |\partial^\alpha h_k(x)| \leq C_\alpha (1 + |x|)^{M_\alpha}$. 另设对任意多重指标 $|\alpha| \leq N$ 而言, 在 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集上均有 $\partial^\alpha h_k \rightarrow u_\alpha$ 一致成立 (其中 u_α 是连续函数). 则 $h \in C^N(\mathbb{R}^n)$, 且对任意 $|\alpha| \leq N$ 有 $\partial^\alpha h = u_\alpha$.

因为 $h_k (k \in \mathbb{N})$ 在无穷远处被某多项式一致控制, 而 $h_k \rightarrow h$ 在任意紧集上一致成立, 故 h 在无穷远处至多以多项式速度增长, 因此可将 h 视作缓增分布. 同理对任意多重指标 α 而言, 可将 $\partial^\alpha h$ 视作缓增分布. 下面说明对每个 $|\alpha| \leq N$, 条件中的函数 u_α 都满足 $\partial^\alpha h = u_\alpha$. 取定 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 对给定的 $|\alpha| \leq N$ 与 $\varepsilon > 0$, 根据 φ 的速降性知存在 $R_\alpha > 0$ 使得

$$\begin{aligned} \int_{|x| \geq R_\alpha} |\varphi(x)| 2C_\alpha (1 + |x|)^{M_\alpha} dx &< \frac{\varepsilon}{4}, \\ \int_{|x| \geq R_\alpha} |\partial^\alpha \varphi(x)| 2C_\alpha (1 + |x|)^{M_\alpha} dx &< \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

已知在紧集 $\overline{B(0, R_\alpha)}$ 上 $h_k \rightarrow h, \partial^\alpha h_k \rightarrow u_\alpha$ 一致成立, 故存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $k \geq k_0$ 有

$$\begin{aligned} \int_{|x| \leq R_\alpha} |\varphi(x)| dx \|\partial^\alpha h_k - u_\alpha\|_{L^\infty(\overline{B(0, R_\alpha)})} &< \frac{\varepsilon}{4}, \\ \int_{|x| \leq R_\alpha} |\partial^\alpha \varphi(x)| dx \|h_k - h\|_{L^\infty(\overline{B(0, R_\alpha)})} &< \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

将上四式结合可得 $k \geq k_0$ 时有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |h_k(x) - h(x)| |\partial^\alpha \varphi(x)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha h_k(x) - u_\alpha(x)| |\varphi(x)| dx < \varepsilon.$$

因此

$$\begin{aligned} |\langle \partial^\alpha h - u_\alpha, \varphi \rangle| &\leq |\langle \partial^\alpha h - \partial^\alpha h_k, \varphi \rangle| + |\langle \partial^\alpha h_k - u_\alpha, \varphi \rangle| \\ &= |\langle h - h_k, \partial^\alpha \varphi \rangle| + |\langle \partial^\alpha h_k - u_\alpha, \varphi \rangle| < \varepsilon, \end{aligned}$$

根据 ε 的任意性即得 $\partial^\alpha h = u_\alpha$, 特别可得 $h \in C^N(\mathbb{R}^n)$, 至此引理即证, 准备工作完毕.

因为卷积是线性算子, 故 $D_h^{[\gamma]+1}(F * G) = F * D_h^{[\gamma]+1}(G)$, 于是

$$\begin{aligned} D_h^{[\gamma]+1}(f_L) &= \sum_{|j| \leq L} \Delta_j^\Theta(f) * D_h^{[\gamma]+1}(\eta_{2^{-j}}) * \eta_{2^{-j}} \\ &= \sum_{|j| \leq L} D_h^{[\gamma]+1}(\Delta_j^\Theta(f)) * (\eta * \eta)_{2^{-j}}, \end{aligned} \quad (6.69)$$

通过差分算子的通式(6.55)可知对(6.69)第二式有

$$\begin{aligned} \|D_h^{[\gamma]+1}(\Delta_j^\Theta(f)) * (\eta * \eta)_{2^{-j}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq \sum_{k=0}^{[\gamma]+1} C_{[\gamma]+1}^s \|\eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{[\gamma]+1} \|\eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned} \quad (6.70)$$

对于(6.69)第一式, 为估计 $D_h^{[\gamma]+1}(\eta_{2^{-j}})$, 考虑应用差分算子的积分表示6.5, 为此注意到

$$\begin{aligned} &\sum_{r_1=1}^n \cdots \sum_{r_{k+1}=1}^n h_{r_1} \cdots h_{r_{k+1}} (\partial_{r_1} \cdots \partial_{r_{k+1}} \eta_{2^{-j}})(x + (s_1 + \cdots + s_{k+1})h) \\ &= 2^{j(k+1)} \sum_{r_1=1}^n \cdots \sum_{r_{k+1}=1}^n h_{r_1} \cdots h_{r_{k+1}} (\partial_{r_1} \cdots \partial_{r_{k+1}} \eta)_{2^{-j}}(x + (s_1 + \cdots + s_{k+1})h). \end{aligned}$$

于是

$$\|D_h^m(\eta_{2^{-j}})\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\| \int_0^1 \cdots \int_0^1 \sum_{r_1=1}^n \cdots \sum_{r_{k+1}=1}^n h_{r_1} \cdots h_{r_{k+1}} (\partial_{r_1} \cdots \partial_{r_{k+1}} \eta_{2^{-j}}) (\cdot + (s_1 + \cdots + s_{k+1})h) ds_1 \cdots ds_{k+1} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\
&= 2^{j(k+1)} \left\| \int_0^1 \cdots \int_0^1 \sum_{r_1=1}^n \cdots \sum_{r_{k+1}=1}^n h_{r_1} \cdots h_{r_{k+1}} (\partial_{r_1} \cdots \partial_{r_{k+1}} \eta)_{2^{-j}} (\cdot + (s_1 + \cdots + s_{k+1})h) ds_1 \cdots ds_{k+1} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq 2^{j(k+1)} |h|^{k+1} \sum_{r_1=1}^n \cdots \sum_{r_{k+1}=1}^n \|\partial_{r_1} \cdots \partial_{r_{k+1}} \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\|\Delta_j^\Theta(f) * D_h^{[\gamma]+1}(\eta_{2^{-j}}) * \eta_{2^{-j}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|D_h^{[\gamma]+1}(\eta_{2^{-j}}) * \eta_{2^{-j}}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |2^j h|^{[\gamma]+1} c_\gamma \sum_{|\alpha| \leq [\gamma]+1} \|\partial^\alpha \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|\eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.71)
\end{aligned}$$

结合(6.70),(6.71)式可得

$$\|\Delta_j^\Theta(f) * D_h^{[\gamma]+1}(\eta_{2^{-j}}) * \eta_{2^{-j}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C_{\eta,n,\gamma} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \min(1, |2^j h|^{[\gamma]+1}). \quad (6.72)$$

将(6.72)式代回(6.69)式可得

$$\frac{\|D_h^{[\gamma]+1}(f_L)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}}{|h|^\gamma} \leq \frac{C_{\eta,\gamma}}{|h|^\gamma} \sum_{|j| \leq L} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \min(2^{-j\gamma}, 2^{j([\gamma]+1-\gamma)} |h|^{[\gamma]+1}),$$

于是

$$\begin{aligned}
\|f_L\|_{\dot{A}_\gamma(\mathbb{R}^n)} &\leq \sup_{h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{C_{\eta,\gamma}}{|h|^\gamma} \sum_{|j| \leq L} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \min(2^{-j\gamma}, 2^{j([\gamma]+1-\gamma)} |h|^{[\gamma]+1}) \\
&\leq C'_{n,\gamma} \sup_{j \in \mathbb{Z}} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \sup_{h \neq 0} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \min(|h|^{-\gamma} 2^{-j\gamma}, 2^{j([\gamma]+1-\gamma)} |h|^{[\gamma]+1-\gamma}) \\
&\leq C''_{n,\gamma} \sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\
&\stackrel{(A)}{\leq} C''_{n,\gamma} (2^\gamma + 1 + 2^{-\gamma}) C_0, \quad (6.73)
\end{aligned}$$

其中 (A) 是(6.68)式.

现记 $f_L = f_L^1 + f_L^2$, 其中

$$f_L^1 = \sum_{j=-L}^{-1} \Delta_j^\Theta(f) * \eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}}, \quad f_L^2 = \sum_{j=0}^L \Delta_j^\Theta(f) * \eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}}.$$

由(6.68)式, 若记 $C'_0 = (2^\gamma + 1 + 2^{-\gamma})C_0$, 则

$$\|\Delta_j^\Theta(f) * \eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq C'_0 \|\eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} 2^{-j\gamma},$$

这说明 f_L^2 在 $L \rightarrow \infty$ 时将一致收敛到某有界连续函数 g_2 , 同理可证只要 $|\beta| < \gamma$, 则 $\partial^\beta f_L^2$ 在 $L \rightarrow \infty$ 时就一致收敛. 由引理6.2即知 $g_2 \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$, 且对全体 $|\beta| < \gamma$ 都有 $\partial^\beta f_L^2 \rightarrow \partial^\beta g_2 (L \rightarrow \infty)$ 一致成立.

下面讨论 f_L^1 . 显见 $f_L^1 \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\partial^\alpha f_L^1 = \sum_{j=-L}^{-1} \Delta_j^\Theta(f) * 2^{j|\alpha|} (\partial^\alpha \eta)_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}}.$$

故由(6.68)式知⁶

$$\begin{aligned}
\|\partial^\alpha f_L^1\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq \sum_{j=-L}^{-1} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} 2^{j|\alpha|} \|\partial^\alpha \eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq C'_0 \sum_{j=-L}^{-1} 2^{-j\gamma} 2^{j|\alpha|} \|\partial^\alpha \eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)},
\end{aligned}$$

⁶这一式子就说明了为什么我们没法像 f_L^2 那样断言 f_L^1 也收敛到某有界连续函数: 在 $|\alpha| = 0$ 时随着 $L \rightarrow \infty$, 用于控制 $\|f_L^1\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 的级数中的项趋无穷.

进而当 $|\alpha| \geq [\gamma] + 1$ 时有

$$\sup_{L \in \mathbb{N}} \|\partial^\alpha f_L^1\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C'_0 \sum_{j=-\infty}^{-1} 2^{-j\gamma} 2^{j([\gamma]+1)} \|\partial^\alpha \eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = c_{\alpha, \gamma} C_0 < \infty. \quad (6.74)$$

记 P_L^d 是 f_L^1 的 d 阶 Taylor 多项式, 根据 Taylor 展开定理可得

$$f_L^1(x) - P_L^{[\gamma]}(x) = ([\gamma] + 1) \sum_{|\alpha|=[\gamma]+1} \frac{x^\alpha}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^{[\gamma]} (\partial^\alpha f_L^1)(tx) dt. \quad (6.75)$$

固定 $K \in \mathbb{N}$, 在(6.75)式两端先作用 ∂^β (这里 $|\beta| < \gamma$), 再作用 ∇ , 并将(6.75)右式用 Leibniz 法则写成有限项 (这里每一项都是 n 维向量) 的线性组合. 该线性组合中每项的元素都形如 x^ν 乘以某个积分, 且积分中 f_L^1 偏导数的阶数不小于 $[\gamma] + 1$. 将(6.74)式代入这些积分, 可知 $\{\nabla(\partial^\beta(f_L^1 - P_L^{[\gamma]}))\}_{L=1}^\infty$ 在 $\overline{B(0, K)}$ 上关于 L 一致有界, 因此根据微分中值定理知 $\{\partial^\beta(f_L^1 - P_L^{[\gamma]})\}_{L=1}^\infty$ 在 $\overline{B(0, K)}$ 上等度连续. 同理, 如果只在(6.75)式两端同时作用 ∂^β 并重复前面的讨论, 可得 $\{\partial^\beta(f_L^1 - P_L^{[\gamma]})\}_{L=1}^\infty$ 关于 L 一致有界. 于是由 Arzela-Ascoli 定理知对每个 $|\beta| < \gamma$ 而言, $\{\partial^\beta(f_L^1 - P_L^{[\gamma]})\}_{L=1}^\infty$ 在 $\overline{B(0, K)}$ 上都存在一致收敛子列 $\{\{\partial^\beta(f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]})\}_{m=1}^\infty\}$. 现在让 K 跑遍 $\mathbb{N}$, 我们有:

$$\begin{aligned} & \partial^\beta(f_{L_1}^1 - P_{L_1}^{[\gamma]}), \partial^\beta(f_{L_2}^1 - P_{L_2}^{[\gamma]}), \partial^\beta(f_{L_3}^1 - P_{L_3}^{[\gamma]}), \dots \text{ 在 } \overline{B(0, 1)} \text{ 上一致收敛,} \\ & \partial^\beta(f_{L_1}^1 - P_{L_1}^{[\gamma]}), \partial^\beta(f_{L_2}^1 - P_{L_2}^{[\gamma]}), \partial^\beta(f_{L_3}^1 - P_{L_3}^{[\gamma]}), \dots \text{ 在 } \overline{B(0, 2)} \text{ 上一致收敛,} \\ & \partial^\beta(f_{L_1}^1 - P_{L_1}^{[\gamma]}), \partial^\beta(f_{L_2}^1 - P_{L_2}^{[\gamma]}), \partial^\beta(f_{L_3}^1 - P_{L_3}^{[\gamma]}), \dots \text{ 在 } \overline{B(0, 3)} \text{ 上一致收敛,} \\ & \vdots \end{aligned}$$

取对角线序列 $\{\partial^\beta(f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]})\}_{m=1}^\infty$, 可知该子列在 $\mathbb{R}^n$ 的任意紧子集上一致收敛, 将该子列另记为 $\{\partial^\beta(f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]})\}_{m=1}^\infty$. 数学分析中提过如果连续函数列在紧集上一致收敛, 那么它必一致收敛到连续函数, 由此可知存在 $g_1 \in C(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\{f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]}\}_{m=1}^\infty$ 在任意紧集上一致收敛到 g_1 . 对于 $\{\partial^\beta(f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]})\}_{m=1}^\infty$ 重复前述步骤, 由引理 6.2 可知 $g_1 \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$, 且对任意 $|\beta| \leq [\gamma]$ 有 $\partial^\beta(f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]}) \rightarrow \partial^\beta g_1 (m \rightarrow \infty)$.

记 $g = g_1 + g_2$, (6.75)式表明 g_1 能被 $(1 + |x|)^{[\gamma]+1}$ 的某常数倍控制, 而 $\sup_{L \in \mathbb{N}} \|f_L^2\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty$ 表明 g_2 能被某常数控制, 这说明 g 能被 $(1 + |x|)^{[\gamma]+1}$ 的某常数倍控制, 亦即

$$|g(x)| \leq C_{n, \gamma} C_0 (1 + |x|)^{[\gamma]+1}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (6.76)$$

从而 g 在无穷远处至多以多项式速度增长, 因此 $g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 于是

$$f_{L_m} - P_{L_m}^{[\gamma]} = f_{L_m}^1 - P_{L_m}^{[\gamma]} + f_{L_m}^2 \rightarrow g_1 + g_2 = g \text{ 在 } \mathcal{S}' \text{ 的意义下成立.} \quad (6.77)$$

又因为 $g_1, g_2 \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$, 故 $g \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$.

与此同时, 根据 Calderón 再现公式 6.1 知 $f_L \rightarrow f (L \rightarrow \infty)$ 在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的意义下成立, 因此对给定的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 只要⁷ $0 \notin \text{supp } \hat{\varphi}$, 就有

$$\langle f_{L_m} - P_{L_m}^{[\gamma]}, \varphi \rangle \stackrel{(B)}{\rightarrow} \langle f_{L_m}, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle.$$

其中 (B) 是因为 $\langle P_{L_m}^{[\gamma]}, \varphi \rangle = \langle (P_{L_m}^{[\gamma]})^\wedge, \varphi^\vee \rangle$, 而 $\text{supp}(P_{L_m}^{[\gamma]})^\wedge \subset \{0\}$, $0 \notin \text{supp } \varphi^\vee$, 故 $\langle (P_{L_m}^{[\gamma]})^\wedge, \varphi^\vee \rangle = 0$. 因为 $\mathcal{S}'$ 意义下的收敛蕴含了 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 意义下的收敛, 故(6.77)式在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的意义下也成立, 这说明对任意满足前述条件的 φ 都有 $\langle f - g, \varphi \rangle = 0$ 在 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的意义下成立. 又因为限制算子 $J: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \setminus \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 的核恰为 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, 故 $f - g$ 是多项式, 设 $f - g = Q \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$.

现在要验证 $f - Q$ 的性质, 实际上就是验证 g 的性质. 对于 $f - Q$ 的缓增性⁸, 由(6.76)式即得结论. 对于 $f - Q$ 的连续性, 由 $g \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$ 即得 $f - Q \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$. 我们还需要得到 $\|f - Q\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$, 为此只需研究 $\|g\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$. 因为 g 本身是通过 f_{L_m} 逼近的, 故我们先考虑 $\|f_{L_m}\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}$. 由(6.73)式知:

$$|D_h^{[\gamma]+1}(f_{L_m})(x)| = \frac{|D_h^{[\gamma]+1}(f_{L_m})(x)|}{|h|^\gamma} |h|^\gamma \leq \|f_{L_m}\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} |h|^\gamma \leq C_{n, \gamma}''' C_0 |h|^\gamma,$$

⁷ 设置这个条件是因为现在谈论的是 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 意义下的收敛, 而用于研究 $\mathcal{S}' \setminus \mathcal{P}$ 的测试函数本就该是频率支在原点外的.

⁸ 也就是在无穷远处以至多多项式速度增长.

又因为 $D_h^{[\gamma]+1}(P_{L_m}^{[\gamma]}) = 0$, 故

$$|D_h^{[\gamma]+1}(f_{L_m} - P_{L_m}^{[\gamma]})(x)| \leq C_{n,\gamma}''' C_0 |h|^\gamma.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 可得

$$|D_h^{[\gamma]+1}(g)(x)| = |D_h^{[\gamma]+1}(f - Q)(x)| \leq C_{n,\gamma}''' C_0 |h|^\gamma, \forall h \neq 0.$$

于是 $\|f - Q\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} < C_{n,\gamma}''' C_0$, 此即(6.64)式, 同时 $f - Q \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$. 当 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 时, 取 $Q = 0$ 可知 $f = g$, 而前面已经说明 $g \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$, 故 $f \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$. 至此定理即证. $\square$

推论 6.4

若函数 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $|\beta| < \gamma$ 均有 $f \in C^{|\beta|}(\mathbb{R}^n)$, $\partial^\beta f \in \dot{\Lambda}_{\gamma-|\beta|}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|\partial^\beta f\|_{\dot{\Lambda}_{\gamma-|\beta|}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,\gamma,\beta} \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.78)$$

证明 因为函数 $f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 由齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画 6.5 知 $f \in C^{[\gamma]}(\mathbb{R}^n)$. 现设 Ψ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Schwartz 函数, 其满足 $\text{supp } \widehat{\Psi} \subset \{1 - \frac{1}{\gamma} \leq |\xi| \leq 2\}$, 且在 $1 \leq |\xi| \leq 2 - \frac{2}{\gamma}$ 上 $\widehat{\Psi} \equiv 1$. 对于多重指标 $|\beta| < \gamma$, 记 $\Delta_j^{\partial^\beta \Psi}$ 为 $(\partial^\beta \Psi)_{2^{-j}}$ 诱导的 Littlewood-Paley 算子, 知

$$\begin{aligned} \Delta_j^\Psi(\partial^\beta f) &= ((\partial^\beta f)^\wedge(\xi) \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))^\vee = ((i2\pi\xi)^\beta \widehat{f}(\xi) \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))^\vee \\ &= (2^{j|\beta|} \widehat{f}(\xi) (i2\pi 2^{-j}\xi)^\beta \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi))^\vee = 2^{j|\beta|} (\widehat{f}(\partial^\beta \widehat{\Psi})^\wedge(2^{-j}\xi))^\vee \\ &= 2^{j|\beta|} \Delta_j^{\partial^\beta \Psi}(f), \forall f \in \dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

因为在 $\text{supp}(\partial^\beta \Psi)^\wedge = \text{supp } \widehat{\Psi}$ 上 $\widehat{\Psi}(\frac{\xi}{2}) + \widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(2\xi) \equiv 1$, 故

$$2^{j(\gamma-|\beta|)} \Delta_j^\Psi(\partial^\beta f) = 2^{j\gamma} \Delta_j^{\partial^\beta \Psi}(\Delta_{j-1}^\Psi + \Delta_j^\Psi + \Delta_{j+1}^\Psi)(f),$$

因此

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j(\gamma-|\beta|)} \|\Delta_j^\Psi(\partial^\beta f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq (2^\gamma + 1 + 2^{-\gamma}) \|\partial^\beta \Psi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \sup_{j \in \mathbb{Z}} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

故 $|\beta| < \gamma$ 时 $\partial^\beta f \in \dot{\Lambda}_{\gamma-|\beta|}(\mathbb{R}^n)$. $\square$

6.1.5.3 非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画

我们已经说明了如何用 Littlewood-Paley 算子 Δ_j 刻画齐次 Lipschitz 空间, 下面对非齐次 Lipschitz 空间做同样的事.

介绍定理前还是先给出一些初始设置. 取定径向 Schwartz 函数 Ψ , 令 $\widehat{\Psi} \geq 0$, $\text{supp } \widehat{\Psi} \subset \{1 - \frac{1}{\gamma} \leq |\xi| \leq 2\}$, 在环 $1 \leq |\xi| \leq 2 - \frac{2}{\gamma}$ 上 $\widehat{\Psi} \equiv 1$, 且

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi) = 1, \forall \xi \neq 0.$$

另定义 Schwartz 函数 Φ 为

$$\widehat{\Phi}(\xi) = \begin{cases} \sum_{j \leq 0} \widehat{\Psi}(2^{-j}\xi), & \xi \neq 0, \\ 1, & \xi = 0. \end{cases} \quad (6.79)$$

可以验证 $|\xi| \leq 2 - \frac{2}{\gamma}$ 时 $\widehat{\Phi} \equiv 1$, $|\xi| \geq 2$ 时 $\widehat{\Phi} \equiv 0$. 最后对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 记 $\Delta_j^\Psi(f) = \Psi_{2^{-j}} * f$, $S_0^\Phi(f) = \Phi * f$.

定理 6.6 (非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画)

设 $\Psi, \Phi, \Delta_j^\Psi, S_0^\Phi$ 同上, $\gamma > 0$, 则存在常数 $C = C(n, \gamma)$ 使得对任意 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 都有估计:

$$\|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.80)$$

反之, 若缓增分布 f 满足

$$\|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty, \quad (6.81)$$

则 $f \in C^{[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)$, 且对任意 $|\alpha| \leq [[\gamma]]$ 而言 $\partial^\alpha f$ 均有界. 另有 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 且存在常数 $C' = C'(n, \gamma)$ 使得

$$\|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} \leq C'(\|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}). \quad (6.82)$$

特别地, $\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 中的函数都在 $C^{[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)$ 中, 且这些函数有至多 $[[\gamma]]$ 阶的有界导函数. ♥

证明 若 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 知 $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}$, 因此

$$\|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \|f * \Phi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.83)$$

又因为 $\|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} \leq \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}$, 故由齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画 6.5(6.62) 知

$$\sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\dot{\Lambda}_\gamma(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.84)$$

结合 (6.83), (6.84) 两式即得 (6.80) 式.

对于 (6.82) 式, 取定满足 (6.81) 式的 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 取 Schwartz 函数 ζ, η 满足

$$\widehat{\zeta}(\xi)^2 + \sum_{j=1}^{\infty} \widehat{\eta}(2^{-j}\xi)^2 = 1,$$

同时 $\text{supp } \widehat{\eta} \subset \{\frac{2}{5} \leq |\xi| \leq 1\}$, $\text{supp } \widehat{\zeta} \subset \{|\xi| \leq 1\}$. 记 $\Delta_j^\eta: f \mapsto f * \eta_{2^{-j}}$, 令 $\Delta_j^\Theta = \Delta_{j-1}^\Psi + \Delta_j^\Psi + \Delta_{j+1}^\Psi$, 由 (6.81) 式可知存在 $C_0 < \infty$ 使得

$$\|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C_0 2^{-j\gamma}. \quad (6.85)$$

注意到 $\widehat{\Phi}$ 在 $\text{supp } \widehat{\zeta}$ 上恒为 1, $\widehat{\Theta}$ 在 $\text{supp } \widehat{\eta}$ 上恒为 1, 故 $\Delta_j^\Theta \Delta_j^\eta = \Delta_j^\eta$, 因此由推论 6.2 知

$$f = \zeta * \zeta * \Phi * f + \sum_{j=1}^{\infty} \eta_{2^{-j}} * \eta_{2[-j]} * \Delta_j^\Theta(f) \quad (6.86)$$

在 $\mathcal{S}'$ 的意义下成立.

另一方面, 由 (6.85) 式知

$$\|\eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}} * \Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|\eta * \eta\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C_0 2^{-j\gamma},$$

故 (6.86) 式也在 L^∞ 的意义下成立, 这说明 f 本身是有界连续函数. 另对任意 $|\alpha| < \gamma$ 有

$$\|\partial^\alpha(\eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}} * \Delta_j^\Theta(f))\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{j|\alpha|} \|\partial^\alpha(\eta * \eta)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C_0 2^{-j(\gamma-|\alpha|)},$$

因此 $\sum_{j=1}^{\infty} \|\partial^\alpha(\eta_{2^{-j}} * \eta_{2^{-j}} * \Delta_j^\Theta(f))\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty$, 于是由无限和与导数换序的命题 6.2 知对任意 $|\alpha| < \gamma$ (或等价地 $|\alpha| \leq [[\gamma]]$), 缓增分布 f 都是 $C^{|\alpha|}$ 阶函数, 且其各阶偏导数均有界.

最后还需证明 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$. 取 $k = [\gamma]$, 知

$$\frac{D_h^{k+1}(f)}{|h|^\gamma} = \zeta * \frac{D_h^{k+1}(\zeta)}{|h|^\gamma} * \Phi * f + \sum_{j=1}^{\infty} \eta_{2^{-j}} * \frac{D_h^{k+1}(\eta_{2^{-j}})}{|h|^\gamma} * \Delta_j^\Theta(f). \quad (6.87)$$

根据差分算子的积分表示 6.5 知 $\|D_h^{k+1}(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 能被 $\min(1, |h|^{k+1})$ 的某常数倍控制, 其中 1 的出现是因为当 $|h|$ 很大时, 在 (6.60) 式中应用 ζ 作为 Schwartz 函数的速降性控制 $h_{j_1} \cdots h_{j_m}$; $|h|^{k+1}$ 的出现是在 $|h|$ 很小时直接将 (6.60) 式中的 $\|\partial_{j_1} \cdots \partial_{j_m} \zeta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ 放成常数. 现在对 (6.87) 右式第一项有

$$\begin{aligned} \left\| \zeta * \frac{D_h^{k+1}(\zeta)}{|h|^\gamma} * \Phi * f \right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq \left\| \frac{D_h^{k+1}(\zeta)}{|h|^\gamma} \right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\zeta * \Phi * f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C' \min \left(\frac{1}{|h|^\gamma}, \frac{|h|^{k+1}}{|h|^\gamma} \right) \|\Phi * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C' \|\Phi * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned} \quad (6.88)$$

对于(6.87)右式第二项, 仿照得到(6.72)式的过程可得

$$\|D_h^{k+1}(\eta_{2^{-j}}) * \eta_{2^{-j}} * \Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C_{\eta,n,k} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \min(1, |2^j h|^{k+1}),$$

因此

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=1}^{\infty} \eta_{2^{-j}} * \frac{D_h^{k+1}(\eta_{2^{-j}})}{|h|^\gamma} * \Delta_j^\Theta(f) \right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq C' (\sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Theta(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}) \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j\gamma} |h|^\gamma \min(1, |2^j h|^{k+1}) \\ &\leq C'' (\sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}) \sum_{j=1}^{\infty} \min(|2^j h|^{-\gamma}, |2^j h|^{k+1-\gamma}) \quad (6.89) \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C''' \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned}$$

其中 (A) 左式中级数 $\sum_{j=1}^{\infty} \min(|2^j h|^{-\gamma}, |2^j h|^{k+1-\gamma})$ 因为 $k+1 = [\gamma] + 1 > \gamma$ 而关于 $h \in \mathbb{R}^n$ 一致收敛, 因此得到的 (A) 右式. 现在结合(6.87)-(6.89)式即得(6.82)式, 进而 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$. $\square$

基于 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画有下述结论成立:

推论 6.5 (非齐次 Lipschitz 空间之间的嵌入)

对 $0 < \gamma < \delta < \infty$, 存在常数 $C_{n,\gamma,\delta} < \infty$ 使得对任意 $f \in \Lambda_\delta(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,\gamma,\delta} \|f\|_{\Lambda_\delta(\mathbb{R}^n)}.$$

也就是说, 能把空间 $\Lambda_\delta(\mathbb{R}^n)$ 视作 $\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$ 的一个子空间. 

证明 若 $0 < \gamma < \delta, j \geq 1$, 则 $2^{j\gamma} < 2^{j\delta}$, 因此

$$\sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \sup_{j \geq 1} 2^{j\delta} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

于是

$$\|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} 2^{j\delta} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)},$$

由非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画6.6即得结论. $\square$

推论 6.6 (非齐次 Lipschitz 空间中函数的正则性)

设 $\gamma > 0$, 多重指标 α 满足 $|\alpha| < \gamma$, 则只要函数 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 就有 $f \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$, $\partial^\alpha f \in \Lambda_{\gamma-|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$, 且存在常数 $C_{n,\gamma,\alpha}$ 使得

$$\|\partial^\alpha f\|_{\Lambda_{\gamma-|\alpha|}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,\gamma,\alpha} \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.90)$$

证明 设多重指标 α 满足 $|\alpha| < \gamma$, Ψ, Φ 同本小节最开始的设置. 记鼓包函数 $(\partial^\alpha \Psi)_{2^{-j}}$ 诱导的 Littlewood-Paley 算子为 $\Delta_j^{\partial^\alpha \Psi}$. 若 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 则非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画6.6表明对全体 $|\alpha| < \gamma$ 均有 $f \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\partial^\alpha f$ 是有界函数. 另外容易验证 $\Delta_j^\Psi(\partial^\alpha f) = 2^{j|\alpha|} \Delta_j^{\partial^\alpha \Psi}(f)$. 注意到

$$2^{j(\gamma-|\alpha|)} \Delta_j^\Psi(\partial^\alpha f) = 2^{j\gamma} \Delta_j^{\partial^\alpha \Psi}(\Delta_{j-1}^\Psi + \Delta_j^\Psi + \Delta_{j+1}^\Psi)(f), \quad (6.91)$$

于是

$$\sup_{j \geq 1} 2^{j(\gamma-|\alpha|)} \|\Delta_j^\Psi(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq (2^\gamma + 2) \|\partial^\alpha \Psi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} < \infty. \quad (6.92)$$

另因在 $\text{supp}(\partial^\alpha \Phi)^\wedge$ 上 $\widehat{\Phi} + \widehat{\Psi_{2^{-1}}} \equiv 1$, 故

$$S_0^\Phi(\partial^\alpha f) = \Phi * (\partial^\alpha f) = \partial^\alpha \Phi * f = \partial^\alpha \Phi * (\Phi + \Psi_{2^{-1}}) * f,$$

因此

$$\begin{aligned} \|S_0^\Phi(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq \|\partial^\alpha \Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} (\|\Phi * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \|\Psi_{2^{-1}} * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}) \\ &\leq \|\partial^\alpha \Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} (\|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}), \end{aligned}$$

将上式与(6.92)式结合并利用非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画6.6即得(6.90)式. $\square$

推论 6.7 (非齐次 Lipschitz 范数的等价表示)

设 $\gamma > 0, f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} \approx \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sum_{|\alpha|=[[\gamma]]} \|\partial^\alpha f\|_{\Lambda_{\gamma-[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)}. \quad (6.93)$$

证明 一方面, 因为 $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}$, 且由(6.90)式知 $\|\partial^\alpha f\|_{\Lambda_{\gamma-[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}$, 故

$$\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sum_{|\alpha|=[[\gamma]]} \|\partial^\alpha f\|_{\Lambda_{\gamma-[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)}.$$

另一方面, 在(6.82)式中将 $\widehat{\Psi}$ 分解为 $\widehat{\Psi} = \sum_{k=1}^n \widehat{\Psi}^{(k)}$, 其中 $\xi \in \text{supp } \widehat{\Psi}^{(k)} \Rightarrow \xi_k \neq 0$ (这个分解从直观上看是把 $\text{supp } \widehat{\Psi}$ 所在的环拆成了 n 小份, 每一份中都有一个分量足够远离原点). 记 $\widehat{\zeta}_k(\xi) = \widehat{\Psi}^{(k)}(\xi) \xi_k^{-[[\gamma]]}$, 有

$$\begin{aligned} \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\leq C \sum_{k=1}^n \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} 2^{-j[[\gamma]]} \|\Delta_j^{\zeta_k}(\partial_k^{[[\gamma]]} f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C \sum_{k=1}^n \sum_{|\alpha|=[[\gamma]]} \sup_{j \geq 1} 2^{j(\gamma-[[\gamma]])} \|\Delta_j^{\Psi*} \Delta_j^{\zeta_k}(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned} \quad (6.94)$$

其中 $\widehat{\Psi}_*(\xi) = \widehat{\Psi}(2\xi) + \widehat{\Psi}(\xi) + \widehat{\Psi}(\frac{\xi}{2})$, 且容易验证在 $\text{supp } \widehat{\zeta}_k$ 上 $\widehat{\Psi}_* \equiv 1$. 因为 $f \mapsto f * \zeta_k$ 是 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子, 故

$$\begin{aligned} \sup_{j \geq 1} 2^{j(\gamma-[[\gamma]])} \|\Delta_j^{\Psi*} \Delta_j^{\zeta_k}(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\lesssim \sup_{j \geq 1} 2^{j(\gamma-[[\gamma]])} \|\Delta_j^{\Psi*}(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\lesssim \sup_{j \geq 1} 2^{j(\gamma-[[\gamma]])} \|\Delta_j^\Psi(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

因为 $f \in \Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)$, 由非齐次 Lipschitz 空间中函数的正则性6.6知 $\partial^\alpha f \in \Lambda_{\gamma-[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)$, 再根据非齐次 Lipschitz 空间的 Littlewood-Paley 刻画6.6(6.80)有

$$\sup_{j \geq 1} 2^{j(\gamma-[[\gamma]])} \|\Delta_j^\Psi(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|\partial^\alpha f\|_{\Lambda_{\gamma-[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)},$$

因此

$$\begin{aligned} \|f\|_{\Lambda_\gamma(\mathbb{R}^n)} &\lesssim \|S_0^\Phi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{j \geq 1} 2^{j\gamma} \|\Delta_j^\Psi(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\lesssim \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sum_{|\alpha|=[[\gamma]]} \|\Delta_j^\Psi(\partial^\alpha f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \\ &\lesssim \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sum_{|\alpha|=[[\gamma]]} \|\partial^\alpha f\|_{\Lambda_{\gamma-[[\gamma]]}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

至此即得(6.93)式. $\square$

在本节末我们需要强调: 空间 Λ_γ 的 Littlewood-Paley 刻画前关于函数 Ψ, Φ 的具体初始设置实际上并不重要. 事实上, 只要有频率支在环上的 Schwartz 函数 $\widetilde{\Psi}$ 与频率支在原点某邻域的 Schwartz 函数 $\widetilde{\Phi}$ 使得(6.63),(6.82)式成立, 那么这两个式子对我们原先设置的 Ψ, Φ 也就成立.

第七章 有界平均振荡

本章选自 [LG3].

7.1 有界平均振荡函数的基本性质

L^1_{loc} 函数 f 在正测集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 上的平均为

$$f_K = \frac{1}{|K|} \int_K f(y) dy.$$

称 $|f - f_K|$ 为 f 在 K 上的振荡. 因此 f 在 K 上的平均振荡为

$$\frac{1}{|K|} \int_K |f(y) - f_K| dy.$$

本章我们研究在所有方体上平均振荡均连续的函数.

定义 7.1 (BMO)

对于 $\mathbb{R}^n$ 上的复值局部可积函数 f , 定义

$$\|f\|_{BMO} = \sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx,$$

其中上确界在 $\mathbb{R}^n$ 中所有各边平行于坐标轴的方体 Q 中取^a. 如果 $\|f\|_{BMO} < \infty$, 就称函数 f 是有界平均振荡的, $\mathbb{R}^n$ 上全体局部可积的有界平均振荡函数构成的空间记作 $BMO(\mathbb{R}^n)$.

^a之后除非特别提到, 否则我们默认出现的方体都是各边平行于坐标轴的.



如果 $(BMO, \|\cdot\|_{BMO})$ 是赋范线性空间, 就应该有

$$\|f + g\|_{BMO} \leq \|f\|_{BMO} + \|g\|_{BMO}, \quad (7.1)$$

$$\|\lambda f\|_{BMO} = |\lambda| \|f\|_{BMO}, \quad (7.2)$$

$$\|f\|_{BMO} = 0 \Rightarrow f = 0, \text{ a.e.}, \quad (7.3)$$

(7.1), (7.2) 两式是容易验证的, 但 (7.3) 式实际上不成立. 如果 $\|f\|_{BMO} = 0$, 根据定义可知 f 在每个方体 Q 上都只能是某个常数 C_Q . 用有重合部分的方体覆盖 $\mathbb{R}^n$, 可知对全体方体 Q, Q' 而言都应有 $C_Q = C_{Q'}$, 因此 $\|f\|_{BMO} = 0$ 只能导出 f a.e. 等于某 (可能非零的) 常数. 这说明 $\|\cdot\|_{BMO}$ 只能成为 BMO 上的半范数. 为了把 $\|\cdot\|_{BMO}$ 改成范数, 我们在 BMO 空间上就不再考虑 a.e. 相等生成的函数等价类, 而是考虑由等价关系 $f \equiv g \Leftrightarrow f - g$ a.e. 是常数生成的函数等价类. 经过这一修改后, $(BMO, \|\cdot\|_{BMO})$ 就确实是赋范线性空间了.

另外, 可以观察到 BMO 就像每个 L^p 空间那样是平移不变的¹, 但 BMO 空间比其它任何 L^p 空间都更靠近 L^∞ . 这是因为 BMO 空间还是伸缩不变的², 而伸缩不变是 L^∞ 才有的性质. 为验证这一断言, 记 $f^\lambda(x) = f(\lambda x)$, $\lambda > 0$, 则 $(f^\lambda)_Q = f_{\lambda Q}$, 其中 $\lambda Q = \{\lambda x : x \in Q\}$. 由此可知

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f^\lambda(x) - (f^\lambda)_Q| dx = \frac{1}{|\lambda Q|} \int_{\lambda Q} |f(x) - f_{\lambda Q}| dx,$$

两边对 Q 取上确界即知 $\|f^\lambda\|_{BMO} = \|f\|_{BMO}$.

最后, 我们观察到 BMO 实际上包含了 L^∞ . 这是因为

$$\|f\|_{BMO} = \sup_Q |f - f_Q|_Q \leq \sup_Q [|f|_Q + |f_Q|_Q] \leq 2\|f\|_{L^\infty}.$$

当然, 我们也可以把前面提到的方体改成球体, 得到另一种 BMO 的定义:

¹也就是说 $\|f + c\|_{BMO} = \|f\|_{BMO}$ 对任意常数 c 成立.

²也就是说 $\|f(\lambda \cdot)\|_{BMO} = \|f\|_{BMO}$ 对任意常数 $\lambda > 0$ 成立.

定义 7.2

对 $\mathbb{R}^n$ 上的复值局部可积函数 f , 定义

$$\|f\|_{BMO_{balls}} = \sup_B \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f_B| dx,$$

其中上确界在 $\mathbb{R}^n$ 中的所有球 B 中取.



下面的命题给出了 $f \in BMO$ 的一个常用判别法:

命题 7.1 (BMO 判别法)

设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 若存在 $A > 0$ 使得对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意方体 K (或球 K) 均存在常数 c_K 使得

$$\frac{1}{|K|} \int_K |f(x) - c_K| dx \leq A, \quad (7.4)$$

则 $f \in BMO$ (或 $f \in BMO_{balls}$), 且 $\|f\|_{BMO} \leq 2A$ (或 $\|f\|_{BMO_{balls}} \leq 2A$).



证明 注意到

$$|f - f_K| \leq |f - c_K| + |f_K - c_K| \leq |f - c_K| + \frac{1}{|K|} \int_K |f(x) - c_K| dx.$$

将上式两端在方体 K (或球 K) 上取平均, 再代入(7.4)式即得 $\|f\|_{BMO} \leq 2A$ (或 $\|f\|_{BMO_{balls}} \leq 2A$). $\square$

下面说明半范数 $\|f\|_{BMO_{balls}}$ 与 $\|f\|_{BMO}$ 实际上是可比较的, 因此 $BMO(\mathbb{R}^n)$ 和 $BMO_{balls}(\mathbb{R}^n)$ 实际上包含相同元素.

任意取定 $\mathbb{R}^n$ 中的方体 Q , 记 B 是 Q 的外接球, 设 ν_n 是单位球体积, 则

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_B| dx \leq \frac{|B|}{|Q|} \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f_B| dx \leq \frac{\nu_n \sqrt{n^n}}{2^n} \|f\|_{BMO_{balls}}.$$

由 BMO 判别法 7.1 即知 $\|f\|_{BMO} \leq 2^{1-n} \nu_n \sqrt{n^n} \|f\|_{BMO_{balls}}$. 反之, 任意取定球 B , 记其外切方体为 Q , 知

$$\frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f_Q| dx \leq \frac{|Q|}{|B|} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \frac{2^n}{\nu_n} \|f\|_{BMO},$$

因此 $\|f\|_{BMO_{balls}} \leq 2^{n+1} \nu_n^{-1} \|f\|_{BMO}$. 由此可知 BMO 与 BMO_{balls} 实际上有可比较的半范数, 进而它们同构.

命题 7.2 (BMO 函数的基本运算性质)

若 $f \in BMO$, 则 $|f| \in BMO$. 若 f, g 是实值 BMO 函数, 则 $\max(f, g), \min(f, g)$ 也是 BMO 函数, 且

$$\| |f| \|_{BMO} \leq 2 \|f\|_{BMO}, \quad (7.5)$$

$$\| \max(f, g) \|_{BMO} \leq \frac{3}{2} \|f\|_{BMO} + \frac{3}{2} \|g\|_{BMO}, \quad (7.6)$$

$$\| \min(f, g) \|_{BMO} \leq \frac{3}{2} \|f\|_{BMO} + \frac{3}{2} \|g\|_{BMO}. \quad (7.7)$$



证明 为证(7.5)式, 注意到 $||f| - |f_Q|| \leq |f - f_Q|$, 于是

$$||f| - |f_Q||_Q \leq |f - f_Q|_Q \leq \|f\|_{BMO}. \quad (7.8)$$

对每个方体 Q 而言, 总能找到常数 $C_Q = |f_Q|$ 使得(7.8)式成立, 由 BMO 判别法 7.1 即得(7.5)式.

下一步, 注意到

$$\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \quad \min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \| \max(f, g) \|_{BMO} &\leq \frac{1}{2} (\|f\|_{BMO} + \|g\|_{BMO} + \|f - g\|_{BMO}) \\ &\leq \frac{1}{2} (\|f\|_{BMO} + \|g\|_{BMO} + 2\|f - g\|_{BMO}) \\ &\leq \frac{1}{2} (\|f\|_{BMO} + \|g\|_{BMO} + 2\|f\|_{BMO} + 2\|g\|_{BMO}), \end{aligned}$$

(7.6)式即证, (7.7)式类似可证. $\square$

例 7.1 本例说明无界函数 $\log|x|$ 在 $BMO(\mathbb{R}^n)$ 中, 因此 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $BMO(\mathbb{R}^n)$ 的真子空间.

方便起见, 下面证明 $\log|x| \in BMO_{balls}(\mathbb{R}^n)$. 取定球 $B(x_0, R)$. 若 $|x_0| > 2R$, 则对 $|x - x_0| \leq R$ 有 $\frac{1}{2}|x_0| \leq |x| \leq \frac{3}{2}|x_0|$, 因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{\nu_n R^n} \int_{|x-x_0| \leq R} |\log|x| - \log|x_0|| dx &= \frac{1}{\nu_n R^n} \int_{|x-x_0| \leq R} \left| \log \frac{|x|}{|x_0|} \right| dx \\ &\leq \max \left(\log \frac{3}{2}, \left| \log \frac{1}{2} \right| \right) = \log 2. \end{aligned}$$

而若 $|x_0| \leq 2R$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\nu_n R^n} \int_{|x-x_0| \leq R} |\log|x| - \log R| dx &= \frac{1}{\nu_n R^n} \int_{|x-x_0| \leq R} \left| \log \frac{|x|}{R} \right| dx \\ &\leq \frac{1}{\nu_n R^n} \int_{|x| \leq 3R} \left| \log \frac{|x|}{R} \right| dx \\ &= \frac{1}{\nu_n} \int_{|x| \leq 3} |\log|x|| dx = \frac{3^n(n \log 3 - 1) + 2}{n}. \end{aligned}$$

在 BMO 判别法 7.1 中令 $C_{B(x_0, R)}$ 为 $\log R$ 或 $\log|x_0|$ 即知 $\log|x| \in BMO_{balls}(\mathbb{R}^n)$, 因此 $\log|x| \in BMO(\mathbb{R}^n)$.

函数 $\log|x|$ 实际上是 BMO 中的一个典型元素, 我们之后会进一步研究这个函数. 特别需要注意的是, BMO 不对截断操作封闭, 参见下例.

例 7.2 函数 $h(x) = \chi_{x>0} \log \frac{1}{x}$ 不在 $BMO(\mathbb{R})$ 中, 这个函数的问题出在原点处. 考虑区间 $(-\varepsilon, \varepsilon)$, 其中 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$, 知

$$h_{(-\varepsilon, \varepsilon)} = \frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} h(x) dx = \frac{1}{2\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} \log \frac{1}{x} dx = \frac{1 + \log \frac{1}{\varepsilon}}{2}.$$

但这表明

$$\frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |h(x) - h_{(-\varepsilon, \varepsilon)}| dx \geq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\varepsilon}^0 |h_{(-\varepsilon, \varepsilon)}| dx = \frac{1 + \log \frac{1}{\varepsilon}}{4}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 知上右式最终将无界, 这说明 $h \notin BMO(\mathbb{R})$. 这个例子同样说明了两个 BMO 函数的乘积未必是 BMO 函数.

命题 7.3 (BMO 的完备性)

如果把差值 a.e. 为常数的两个函数视作同一元素, 那么 BMO 就是 Banach 空间. 

证明 前面已经说明了在这种等价类下 $\|\cdot\|_{BMO}$ 确为范数, 下面说明完备性. 设 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是 BMO 中的基本列, 记 $Q_N = [-N, N]^n, N = 1, 2, \dots$, 则

$$\frac{1}{|Q_N|} \int_{Q_N} |f_k - f_m| dx \leq \|f_k - f_m\|_{BMO},$$

其中忽略 $(f_k - f_m)_{Q_N}$ 的影响是因为 $f_k - f_m$ 和 $f_k - f_m - (f_k - f_m)_{Q_N}$ 在同一等价类中. 现由上式可知对任意 N 而言, $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^1(Q_N)$ 中的基本列, 由 $L^1(Q_N)$ 的完备性知存在 $F^N \in L^1(Q_N)$ 使得 $f_k \rightarrow F^N (k \rightarrow \infty)$ 在 $L^1(Q_N)$ 的意义下成立.

因为 $f_k \rightarrow F^{N+1}$ 在 $L^1(Q_{N+1})$ 的意义下成立, 而 $Q_N \subset Q_{N+1}$, 根据极限的唯一性知在 Q_N 上 $F^N = F^{N+1}$ a.e. 现定义函数 F 为在 Q_N 上 $F = F^N (N \in \mathbb{N})$, 显见 F 良定义, 且 $F \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$. 进一步可知在任意紧集 K 上均有 $f_k \rightarrow F$ 在 $L^1(K)$ 意义下成立, 下面我们说明 $F \in BMO$, 且 $f_k \rightarrow F$ 在 BMO 下成立.

因为 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是 BMO 中的基本列, 故对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得对 $k, m \geq k_0$ 有

$$\sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |f_k - f_m| dx < \varepsilon.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 知

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f_k - F| dx \leq \varepsilon, \quad \forall \text{ 方体 } Q. \quad (7.9)$$

因此对任意方体 Q 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |F - F_Q| dx &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |F - f_{k_0}| dx + \frac{1}{|Q|} \int_Q |f_{k_0} - (f_{k_0})_Q| dx + |(f_{k_0})_Q - F_Q| \\ &\leq \varepsilon + \|f_{k_0}\|_{BMO} + \varepsilon. \end{aligned}$$

这便说明 $F \in BMO$. 现在在(7.9)式两端对全体方体 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 取上确界, 由 BMO 判别法7.1即知 $\|f_k - F\|_{BMO} \leq 2\varepsilon (\forall k \geq k_0)$, 亦即 $f_k \rightarrow F$ 在 BMO 意义下成立. $\square$

下面我们验证 BMO 函数的一些基本性质. 对球 B 与 $a > 0$ 而言, 记 aB 为与 B 同心, 半径为 B 半径 a 倍的球.

命题 7.4 (BMO 函数的性质)

设 $f \in BMO_{balls}(\mathbb{R}^n)$, B, B' 是 $\mathbb{R}^n$ 中的球.

(i) 若 $B \subset B'$, 则

$$|f_B - f_{B'}| \leq \frac{|B'|}{|B|} \|f\|_{BMO_{balls}}. \quad (7.10)$$

(ii) 设 $B = B_0 \subset B_1 \subset \cdots \subset B_m = B'$, 其中 B_i 的半径至多为 B_{i-1} 的两倍 ($i = 1, \dots, m$), 则

$$|f_B - f_{B'}| \leq 2^n m \|f\|_{BMO_{balls}}. \quad (7.11)$$

(iii) 对任意 $\delta > 0$, 存在常数 $C_{n,\delta}$ 使得只要 B 是以 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为心, R 为半径的球, 就有

$$R^\delta \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f_B|}{(R + |x - x_0|)^{n+\delta}} dx \leq C_{n,\delta} \|f\|_{BMO_{balls}}. \quad (7.12)$$

对以 x_0 为心, R 为边长的方体而言有类似估计成立.



证明 (i) 知

$$|f_B - f_{B'}| \leq \frac{1}{|B|} \int_B |f - f_{B'}| dx \leq \frac{1}{|B|} \int_{B'} |f - f_{B'}| dx \leq \frac{|B'|}{|B|} \|f\|_{BMO_{balls}}.$$

(ii) 由(7.11)式知对每个 $i = 1, \dots, m$ 均有

$$|f_{B_i} - f_{B_{i-1}}| \leq \frac{|B_i|}{|B_{i-1}|} \|f\|_{BMO_{balls}} \leq 2^n \|f\|_{BMO_{balls}}.$$

进而由

$$|f_B - f_{B'}| \leq |f_{B_0} - f_{B_1}| + |f_{B_1} - f_{B_2}| + \cdots + |f_{B_{m-1}} - f_{B_m}| \leq 2^n m \|f\|_{BMO_{balls}}$$

即得(7.11)式.

(iii) 不妨设 $x_0 = 0, R = 1$, 这种情况得证后, 对球 $B(x_0, R)$ 而言把 $f(x)$ 换成 $x \mapsto f(Rx + x_0)$ 即得一般情况. 现设 $B = B(0, 1)$, 知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f_B|}{(1 + |x|)^{n+\delta}} dx &= \int_B \frac{|f(x) - f_B|}{(1 + |x|)^{n+\delta}} dx + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^{k+1}B \setminus 2^k B} \frac{|f(x) - f_{2^{k+1}B} + f_{2^{k+1}B} - f_B|}{(1 + |x|)^{n+\delta}} dx \\ &\leq \int_B |f(x) - f_B| dx + \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k(n+\delta)} \int_{2^{k+1}B} (|f(x) - f_{2^{k+1}B}| + |f_{2^{k+1}B} - f_B|) dx \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \nu_n \|f\|_{BMO_{balls}} + \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k(n+\delta)} (2^n(k+1) + 1) (2^{k+1})^n \nu_n \|f\|_{BMO_{balls}} \\ &= C'_{n,\delta} \|f\|_{BMO_{balls}}. \end{aligned}$$

其中 (A) 是(7.11)式. 此即欲证. $\square$

结合前面提到的 BMO_{balls} 与 BMO 之间的同构性可知, 如果把命题7.4中的球都换成方体, 是可以得到类似结论的.

下面的结果给出了生成 BMO 函数的一个常用方法:

定理 7.1

设 Φ 为 $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 的严格递增凹函数, 亦即 $\Phi(0) = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \Phi(t) = \infty, \Phi(t+s) \leq \Phi(t) + \Phi(s) (\forall t, s \geq 0)$. 若 $f \in BMO$, 则 $\Phi(|f|) \in BMO$, 且

$$\|\Phi(|f|)\|_{BMO} \leq 2\Phi(\|f\|_{BMO}).$$



证明 由 Φ 严格递增知 Φ^{-1} 严格递增, 由 Φ 是凹函数知 Φ^{-1} 是凸函数, 回忆凸函数的 Jensen 不等式:

$$\Phi^{-1}\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X g d\mu\right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \Phi^{-1}(g) d\mu.$$

任取方体 Q , 知

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |\Phi(|f|) - \Phi(f_Q)| dx &= \Phi\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |\Phi(|f|) - \Phi(f_Q)| dx\right)\right) \\ &\leq \Phi\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \Phi^{-1}(|\Phi(|f|) - \Phi(f_Q)|) dx\right) \\ &\leq \Phi\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |\Phi^{-1}(\Phi(|f|)) - \Phi^{-1}(\Phi(f_Q))| dx\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_Q| dx\right) \leq \Phi(\|f\|_{BMO}), \end{aligned}$$

由 BMO 判别法 7.1 即得欲证. □

7.2 John-Nirenberg 定理

可测函数 g 称为紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 上的指数可积函数, 如果存在正常数 c 使得

$$\int_K e^{c|g(x)|} dx < \infty. \quad (7.13)$$

在例 7.1 中, 我们说明了 $g(x) = \log|x|$ 在 $BMO(\mathbb{R}^n)$ 中. 这一函数实际上也是指数可积的, 也就是说只要 $c < n$, 它就总能满足 (7.13) 式. 指数可积性实际上是 BMO 函数的一个普遍性质, 这便是下面定理所描述的:

定理 7.2 (John-Nirenberg 定理)

对任意 $f \in BMO(\mathbb{R}^n)$, 任意方体 Q 与任意常数 $\alpha > 0$, 有

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \alpha\|f\|_{BMO}\}| \leq e|Q|e^{-\frac{\alpha}{2\|f\|_{BMO}}}. \quad (7.14)$$



证明 若 $\|f\|_{BMO} = 0$, 则 (7.14) 左式中的集合是零测集, 结论进而成立. 下设 $\|f\|_{BMO} \neq 0$. 注意到把 (7.14) 左式中的 f 换成 $f/\|f\|_{BMO}$ 不会影响式子结果, 故可设 $\|f\|_{BMO} = 1$. 现取定方体 Q , 依照下式选出 Q 的子方体 R :

$$\frac{1}{|R|} \int_R |f(x) - f_Q| dx > e. \quad (7.15)$$

因为

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \|f\|_{BMO} = 1 < e,$$

故 Q 本身不满足 (7.15) 式. 记 $Q^0 = Q$, 通过各边长减半把 Q^0 分成 2^n 个相同的闭子方体, 如果其中有哪个子方体 R 满足 (7.15) 式的话, 就把它选出来. 完成选取之后, 再把没被选取的那些方体进一步分成 2^n 个子方体, 接着在这些子方体中选取满足 (7.15) 式的子方体. 通过无限重复这一过程, 我们可以选出一个可数方体族 $\{Q_j^1\}_j$, 称 Q_j^1 为第一代方体.

下面选定某个第一代方体 Q_j^1 , 依照下式选出 Q_j^1 的子方体 R :

$$\frac{1}{|R|} \int_R |f(x) - f_{Q_j^1}| dx > e. \quad (7.16)$$

显见 Q_j^1 本身不满足(7.16)式. 我们在方体 Q_j^1 内对函数 $f - f_{Q_j^1}$ 用与前文类似的停时选取方法³. 将 Q_j^1 分成 2^n 个边长减半的相同闭子方体, 在这些子方体中选取满足(7.16)式的子方体 R . 无限次重复这一过程, 在对所有第一代方体 Q_j^1 都完成选取过程后, 把选出的这些满足(7.16)式的子方体构成的方体族记为 $\{Q_l^2\}_l$, 称之为**第二代方体**. 显见对每个第二代方体而言, 只会存在唯一的第一代方体包含它.

对于选定的一个第二代方体 Q_l^2 , 进一步依照下式选取 Q_l^2 的子方体 R :

$$\frac{1}{|R|} \int_R |f(x) - f_{Q_l^2}| dx > e.$$

重复前述选取过程, 可以得到 Q_l^2 中的第三代方体. 对全体第二代方体 Q_l^2 进行这样的选取, 最终可以得到**第三代方体族** $\{Q_s^3\}_s$.

迭代上述过程无限次, 对第 k 代而言, 总是可以得到可数方体族 $\{Q_j^k\}_j$. 现在我们声明这些方体满足下述性质:

(A- k) 对每个 Q_j^k 而言, 存在唯一的 $Q_{j'}^{k-1}$ 满足 $(Q_j^k)^\circ \subset Q_{j'}^{k-1}$.

(B- k) $e < |Q_j^k|^{-1} \int_{Q_j^k} |f(x) - f_{Q_{j'}^{k-1}}| dx \leq 2^n e$.

(C- k) $|f_{Q_j^k} - f_{Q_{j'}^{k-1}}| \leq 2^n e$.

(D- k) $\sum_j |Q_j^k| \leq \frac{1}{e} \sum_{j'} |Q_{j'}^{k-1}|$.

(E- k) 在集合 $Q_{j'}^{k-1} \setminus \bigcup_j Q_j^k$ 上 a.e. 有 $|f - f_{Q_{j'}^{k-1}}| \leq e$.




图 7.1: 选取过程示意.

(A- k) 是通过选取方法直接可得. (B- k) 左式通过选取方法直接可得, 对于 (B- k) 右式, 注意到边长为 Q_j^k 边长的两倍, 包含 Q_j^k 且被 $Q_{j'}^{k-1}$ 包含的方体 R_{j_0} 不会在第 k 代方体的选取中被选中, 因此

$$e \geq \frac{1}{|R_{j_0}|} \int_{R_{j_0}} |f(x) - f_{Q_{j'}^{k-1}}| dx \geq \frac{1}{2^n |Q_j^k|} \int_{Q_j^k} |f(x) - f_{Q_{j'}^{k-1}}| dx.$$

(C- k) 是 (B- k) 右式的直接推论. 为证 (E- k), 注意到对 $Q_{j'}^{k-1} \setminus \bigcup_j Q_j^k$ 中的每一点而言, 总会有一列方体收敛到它, 且 $|f - f_{Q_{j'}^{k-1}}|$ 在这些方体上的平均至多为 e . 根据 Lebesgue 微分定理可知 $|f - f_{Q_{j'}^{k-1}}| \leq e$ 在 $Q_{j'}^{k-1} \setminus \bigcup_j Q_j^k$ 上 a.e. 成立.

下面证明 (D- k). 由 (A- k) 知对给定的第 k 代方体 Q_j^k 而言, 存在唯一的第 $k-1$ 代方体 $Q_{j'}^{k-1}$ 包含它. 现在记 $I_{j'}$ 是第 k 代方体 Q_i^k 的下标 i 构成的指标集, 其中每个 i 都满足 $i' = j'$ (也就是说这些 Q_i^k 源自同一个 $Q_{j'}^{k-1}$). 显

³停时选取方法指的是一个选取过程在某特定尺度下进行不下去时, 来到下一尺度继续进行选取. 参见 [LG1]pg.97 对 stopping time argument 的表述.

见全体 $Q_i^k (i \in I_{j'})$ 均有不交内部, 且它们都包含在 $Q_{j'}^{k-1}$ 内, 由此与 (B-k) 可知

$$\begin{aligned} \sum_j |Q_j^k| &< \frac{1}{e} \sum_j \int_{Q_j^k} |f(x) - f_{Q_{j'}^{k-1}}| dx \\ &= \frac{1}{e} \sum_{j'} \sum_{i \in I_{j'}} \int_{Q_i^k} |f(x) - f_{Q_{j'}^{k-1}}| dx \\ &\leq \frac{1}{e} \sum_{j'} \int_{Q_{j'}^{k-1}} |f(x) - f_{Q_{j'}^{k-1}}| dx \\ &\leq \frac{1}{e} \sum_{j'} |Q_{j'}^{k-1}| \|f\|_{BMO} = \frac{1}{e} \sum_{j'} |Q_{j'}^{k-1}|. \end{aligned}$$

在完成 (A-k)-(E-k) 的证明后, 我们接下来给出一些结论. 应用 $k-1$ 次 (D-k) 可得

$$\sum_j |Q_j^k| \leq e^{-k} |Q^0|. \quad (7.17)$$

对第一代方体 Q_j^1 而言, 由 (C-1) 知 $|f_{Q_j^1} - f_{Q^0}| \leq 2^n e$, 由 (E-2) 知在 $Q_j^1 \setminus \bigcup_l Q_l^2$ 上 a.e. 有 $|f - f_{Q_j^1}| \leq e$. 这两件事实表明

$$|f - f_{Q^0}| \leq 2^n e + e \text{ 在 } Q_j^1 \setminus \bigcup_l Q_l^2 \text{ 上 a.e. 成立,}$$

结合 (E-1) 可得

$$|f - f_{Q^0}| \leq 2^n 2e \text{ 在 } Q^0 \setminus \bigcup_l Q_l^2 \text{ 上 a.e. 成立.} \quad (7.18)$$

对第二代方体 Q_l^2 而言, 由 (E-3) 知 $|f - f_{Q_l^2}| \leq e$ 在 $Q_l^2 \setminus \bigcup_s Q_s^3$ 上 a.e. 成立, 将此与分别由 (C-2), (C-1) 得到的 $|f_{Q_l^2} - f_{Q_{l'}^1}| \leq 2^n e, |f_{Q_{l'}^1} - f_{Q^0}| \leq 2^n e$ 结合知

$$|f - f_{Q^0}| \leq 2^n 3e \text{ 在 } Q_l^2 \setminus \bigcup_s Q_s^3 \text{ 上 a.e. 成立.}$$

结合 (7.17) 式可知相同的估计对 $Q^0 \setminus \bigcup_s Q_s^3$ 依旧成立. 重复这一过程, 归纳可得对任意 $k \geq 1$ 均有

$$|f - f_{Q^0}| \leq 2^n k e \text{ 在 } Q^0 \setminus \bigcup_s Q_s^k \text{ 上 a.e. 成立.} \quad (7.19)$$

这说明在 a.e. 意义下有

$$\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > 2^n k e\} \subset \bigcup_j Q_j^k,$$

其中 $k = 1, 2, 3, \dots$ (这在 $k = 0$ 时同样成立, 此时右式只有一个方体, 即 $Q^0 = Q$). 现在我们用 (7.17), (7.19) 两式证明 (7.14) 式. 取定 $\alpha > 0$, 若存在 $k \geq 0$ 使得 $2^n k e < \alpha \leq 2^n (k+1) e$, 则

$$\begin{aligned} |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \alpha\}| &\leq |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > 2^n k e\}| \\ &\leq \sum_j |Q_j^k| \\ &\leq \frac{1}{e^k} |Q^0| \\ &\leq |Q| e^{1 - \frac{\alpha}{2^n e}}, \end{aligned}$$

其中最后一步是因为 $-k \leq 1 - \frac{\alpha}{2^n e}$. (7.14) 式至此得证. □

在证明分布不等式 (7.14) 后, 我们下面介绍它的一系列重要推论.

推论 7.1 (BMO 函数 (在方体上) 的指数可积性)

每个 BMO 函数都在任意方体上指数可积. 精确来说, 对任意 $0 < \gamma < (2^n e)^{-1}$, 任意 $f \in BMO(\mathbb{R}^n)$ 与任意方体 Q 而言有

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q e^{\gamma \frac{|f(x) - f_Q|}{\|f\|_{BMO}}} dx \leq 1 + \frac{2^n e^2 \gamma}{1 - 2^n e \gamma}.$$



证明 回忆 L^p 范数的等价计算式:

$$\int_X \varphi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \varphi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda,$$

代入 $\varphi(t) = e^t - 1$, 显见 (Q, dx) 是 σ 有限测度空间, φ 是 $[0, \infty)$ 上的递增连续可微函数且 $\varphi(0) = 0$, 知

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q e^{|h|} dx = 1 + \frac{1}{|Q|} (e^{|h|} - 1) dx = 1 + \frac{1}{|Q|} \int_0^\infty e^\lambda |\{x \in Q : |h(x)| > \lambda\}| d\lambda,$$

其中 h 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 取 $\gamma < (2^n e)^{-1}$, 令 $h = \gamma \|f\|_{BMO}^{-1} |f - f_Q|$, 知

$$|\{x \in Q : |h(x)| > \lambda\}| = \left| \left\{ x \in Q : |f(x) - f_Q| > \frac{\lambda}{\gamma} \|f\|_{BMO} \right\} \right|.$$

在(7.14)式中代入 $\alpha = \frac{\lambda}{\gamma}$ 知

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q e^{\gamma \frac{|f(x) - f_Q|}{\|f\|_{BMO}}} dx \leq 1 + \frac{1}{|Q|} \int_0^\infty e^\lambda |Q| e^{-\frac{\lambda}{2^n e} \frac{1}{\gamma}} d\lambda = 1 + \frac{2^n e^2 \gamma}{1 - 2^n e \gamma},$$

因为 $1 - (2^n e \gamma)^{-1} < 0$, 故上式中的积分确实收敛, 推论至此即证. $\square$

下面的推论把推论7.1的结果从方体推广到了全体紧集.

推论 7.2 (BMO 函数 (在紧集上) 的指数可积性)

设 $f \in BMO(\mathbb{R}^n)$, 则对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 总有

$$\int_K e^{c|f(x)|} dx < \infty, \quad (7.20)$$

其中 $c < (2^n e \|f\|_{BMO})^{-1}$.



证明 取定紧集 K , 取包含该紧集的方体 Q . 对于 $c < (2^n e \|f\|_{BMO})^{-1}$, 取 $\gamma = c \|f\|_{BMO} < (2^n e)^{-1}$, 由

$$c|f(x)| \leq c|f_Q| + c|f(x) - f_Q| \leq c|f_Q| + \gamma \frac{|f(x) - f_Q|}{\|f\|_{BMO}}$$

与推论7.1可知 $e^{c|f|}$ 在 Q 上指数可积, 进而在 K 上指数可积. $\square$

John-Nirenberg 定理的另一重要推论在于阐明 BMO 与 L^p_{loc} 之间的关系.

推论 7.3 (BMO 函数的 L^p 局部可积性)

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq e 2^n (ep \Gamma(p))^{\frac{1}{p}} \|f\|_{BMO(\mathbb{R}^n)}. \quad (7.21)$$

因此对全体 $0 < p < \infty$ 而言, 总有 $BMO \subset L^p_{loc}(\mathbb{R}^n) = \{f : |f|^p \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)\}$.



证明 若 $f \in L^1_{loc} \setminus BMO$, 则 $\|f\|_{BMO} = \infty$, (7.21)式自然成立. 下设 $f \in BMO$. 由 L^p 范数的等价计算式知

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx &= \frac{1}{|Q|} \int_0^\infty p \lambda^{p-1} |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| d\lambda \\ &\leq \frac{p}{|Q|} e |Q| \int_0^\infty \lambda^p e^{-\frac{\lambda}{2^n e \|f\|_{BMO}}} \frac{d\lambda}{\lambda} \\ &= p \Gamma(p) e (2^n e \|f\|_{BMO})^p, \end{aligned}$$

此即(7.21)式. 由此知 $|f - f_Q|^p$ 在任意方体 Q 上均可积, 进而 $|f|^p$ 在任意方体 Q 上均可积, 于是对任意 $0 < p < \infty$ 均有 $|f|^p \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$. $\square$

利用 Hölder 不等式, 可以得到推论7.3中 $p > 1$ 时的反向不等式, 由此可得 BMO 范数的 L^p 刻画.

推论 7.4 (BMO 范数的 L^p 刻画)

对任意 $1 \leq p < \infty$ 与任意 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|f\|_{BMO} \leq \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq e^2 \cdot 2^n p \|f\|_{BMO}. \quad (7.22)$$

证明 对(7.22)左式, 知

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \frac{1}{|Q|} \left(\int_Q dx \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

此即(7.22)左式. 对(7.22)右式, 由推论(7.3)已经得到常数 $(p\Gamma(p))^{\frac{1}{p}} e^{\frac{1}{p}+1} 2^n$ 了, 进一步注意到 $p \geq 1$ 时有

$$\frac{\Gamma(p)}{p^p} = \int_0^\infty e^{-t} \left(\frac{t}{p} \right)^p \frac{dt}{t} = \int_0^\infty e^{-pt} t^p \frac{dt}{t} = \int_0^\infty e^{-p(t-\log t)} \frac{dt}{t} \leq \int_0^\infty e^{-(t-\log t)} \frac{dt}{t} = 1.$$

这说明 $p \geq 1$ 时 $\Gamma(p)^{\frac{1}{p}} (pe)^{\frac{1}{p}} e 2^n \leq p \cdot e \cdot e 2^n$, (7.22)右式至此即证. $\square$

7.3 二进极大函数与二进 BMO

本节我们研究前面提过的二进方体的相关思想. 回忆二进方体的定义:

定义 7.3 (二进方体)

二进方体是形如 $\prod_{j=1}^n [m_j 2^{-k}, (m_j + 1) 2^{-k}) (m_1, \dots, m_n, k \in \mathbb{Z})$ 的集合. 二进方体 Q 的二进子方体指的是通过将 Q 的边长减半得到的 2^n 个各面平行于 Q 对应面的二进方体. 记 $\mathbb{R}^n$ 上的全体二进方体为 $\mathcal{Q}$. 二进方体 Q 的前代指的是包含它的任意二进方体, 它的子代指的是任意在它之中的二进方体.

显见每个二进方体都有 2^n 个子代, 有 2^{2n} 个子子代, 在一般情况下有边长为 $2^{-k}L$ 的 2^{nk} 个子二进方体, 其中 L 是原方体的边长. 事实上, 所有包含在二进方体 Q_0 中的二进方体都是 Q_0 的子代.

通过二进方体的构造可知, 边长相同的两个二进方体总是不交的. 对不同边长的两个二进方体, 边长较小的二进方体总会有唯一的与边长较大的二进方体边长相同的前代. 这个前代方体要么就是边长较大的那个方体, 要么和边长较大的那个方体不交. 因此两个二进方体要么不交, 要么具有包含关系.

把二进方体按代分开是很有用的. 称边长为 1 的全体二进方体为第零代方体, 记这些方体构成的集合为 $\mathcal{Q}_0$. 记 $\mathcal{Q}_0$ 中方体的子代为第 1 代方体, 它们的全体为 $\mathcal{Q}_1$. 重复该操作, 记 $\mathcal{Q}_k$ 为全体边长为 2^{-k} 的二进方体, 称之为第 k 代方体. 随着方体的缩小, k 是逐渐趋向无穷的, 但我们还可以考虑 $k < 0$ 的情况. 在特定的问题下, 我们一般都把第零代方体取成某个特定边长的方体 (不一定是 1), 再通过这种方式定义其前代与子代, 比如二进 Calderón-Zygmund 分解.

定义 7.4 (二进极大函数)

取定 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数 f , 定义 f 的二进极大函数 $M_d(f)$ 为

$$M_d(f)(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t)| dt,$$

其中上确界在 $\mathbb{R}^n$ 中全体包含 x 的二进方体 Q 中取.

二进极大函数与经典的 Hardy-Littlewood 极大函数的许多性质都类似. 但有一处不同需要特别注意: $M_d(h)$ 可以在空间上的某处为零. 例如如果 $\text{supp } h \subset [0, \infty)$, 则 $M_d(h)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上就为零, 因为没有哪个包含负数的二进方体能与 $\text{supp } h$ 有重合部分.

定理 7.3 (二进极大函数的有界性)(i) 对任意 $\lambda > 0$ 与 $\mathbb{R}^n$ 上的任意可测函数 f 有

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| \leq \frac{1}{\lambda} \int_{\{M_d(f) > \lambda\}} |f(t)| dt. \quad (7.23)$$

(ii) 算子 M_d 以至多为 1 的范数将 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.(iii) 对 $1 < p < \infty$, M_d 以至多为 $\frac{p}{p-1}$ 的范数将 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^p(\mathbb{R}^n)$.(iv) 对 $1 < p < \infty$, M_d 以至多为 $\frac{p}{p-1}$ 的范数将 $L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

证明 (i),(ii) 参见定理 3.6. 对于 (iii), 可以通过 M_d 的强 (∞, ∞) 估计与弱 $(1, 1)$ 估计插值得到结论. 下面证明 (iv). 对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 记

$$E_f = \{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}.$$

对每个 $x \in E_f$ 而言, 根据 M_d 的定义知总会存在包含 x 的二进方体 Q_x , 使得 $|f|$ 在 Q_x 上的平均严格大于 λ . 对于 Q_x 而言, 显见只要 $y \in Q_x$, 就都有 $M_d(f)(y) > \lambda$, 因此 $y \in E_f$, 故 $Q_x \subset E_f$, 于是 $E_f = \bigcup_{x \in E_f} Q_x$. 由 $|f|_{Q_x} > \lambda$ 知 $|Q| \leq \frac{\|f\|_{L^1}}{\lambda}$, 因此对每个 $x \in E_f$ 而言, 总是会存在唯一形如 $Q_y (y \in E_f)$ 的最大二进方体 $Q_x^{\max}$ 包含 Q_x . 设所有这些不同的最大二进方体 $Q_x^{\max}$ 对应的 x 构成的集合为 $E'_f \subset E_f$, 可见 $E_f = \bigcup_{x \in E_f} Q_x = \bigcup_{x \in E'_f} Q_x^{\max}$. 另由二进方体的性质与极大性知只要两个 $Q_x^{\max}$ 不同, 它们就不交. 现将集合 $\{Q_x^{\max} : x \in E'_f\}$ 重记为 $\{Q_j : j \in \mathbb{Z}\}$, 则

$$\sum_j |Q_j| = |E_f|,$$

且

$$\int_{Q_j} |f(y)| dy > \lambda |Q_j|.$$

于是

$$|E_f| = \sum_j |Q_j| \leq \frac{1}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} |f(y)| dy = \frac{1}{\lambda} \int_{E_f} |f(y)| dy. \quad (7.24)$$

现取 $1 < p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 将 (7.24) 式写成

$$\lambda |\{M_d(f) > \lambda\}|^{\frac{1}{p}} \leq |\{M_d(f) > \lambda\}|^{\frac{1}{p}-1} \int_{\{M_d(f) > \lambda\}} |f(y)| dy.$$

因为 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故 $|\{M_d(f) > \lambda\}| < \infty$, 由引理 3.3 可知上右式能被 $\frac{p}{p-1} \|f\|_{L^{p,\infty}}$ 控制, 进而

$$\|M_d(f)\|_{L^{p,\infty}} \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_{L^{p,\infty}}, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n). \quad (7.25)$$

现对 $f \in L^{p,\infty}$, 考虑非负递增函数列 $|f_N|$:

$$f_N = f \chi_{|f| \leq N} \chi_{[-2^N, 2^N]^n},$$

知 $|f_N| \uparrow |f|$, $f_N \in L^p$, 因此 $\|f_N\|_{L^{p,\infty}} \uparrow \|f\|_{L^{p,\infty}}$. 可以证明 $M(f_N) \uparrow M(f)$, $\|M(f_N)\|_{L^{p,\infty}} \uparrow \|M(f)\|_{L^{p,\infty}}$, 同理可证

$$\|M_d(f_N)\|_{L^{p,\infty}} \uparrow \|M_d(f)\|_{L^{p,\infty}}, \quad N \rightarrow \infty.$$

对 f_N 代入估计 (7.25) 并令 $N \rightarrow \infty$ 即得欲证. □

下面我们定义二进 BMO, 这其实就是把 BMO 定义中的方体换成二进方体.

定义 7.5 (二进 BMO)对 $\mathbb{R}^n$ 上的复值局部可积函数 f , 定义

$$\|f\|_{BMO_d} = \sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx,$$

其中上确界在 $\mathbb{R}^n$ 中的全体二进方体 Q 中取. 若 $\|f\|_{BMO_d} < \infty$, 就称 f 是二进有界平均振荡的. $\mathbb{R}^n$ 上全

体满足 $\|f\|_{BMO_d} < \infty$ 的局部可积函数 f 构成的空间记作 $BMO_d(\mathbb{R}^d)$.



在 BMO_d 中, a.e. 相差一个常数的两个函数视为同一元素, 在这一等价类下 BMO_d 成为赋范线性空间, 进一步可以证明其为 Banach 空间. BMO 的性质基本都在其二进版本 BMO_d 中同样成立, 例如我们有下述命题:

命题 7.5 (BMO_d 判别法)

设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 若存在 $A > 0$ 使得对任意二进方体 Q 而言, 存在常数 c_Q 使得

$$\sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - c_Q| dx \leq A. \quad (7.26)$$

则 $f \in BMO_d$, 且 $\|f\|_{BMO_d} \leq 2A$.



证明 注意到

$$|f - f_Q| \leq |f - c_Q| + |f_Q - c_Q| \leq |f - c_Q| + \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - c_Q| dx.$$

将上式两端在二进方体 Q 上取平均, 由(7.26)式即得 $\|f\|_{BMO_d} \leq 2A$. □

例 7.3 函数 $h(t) = \log t \chi_{t>0}$ 在 $BMO_d(\mathbb{R})$ 中, 而不在 $BMO(\mathbb{R})$ 中. $h \notin BMO(\mathbb{R})$ 的原因在例 7.2 中已经说明了, 下面说明 $h \in BMO_d(\mathbb{R})$. 设 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 是二进区间, 根据 BMO_d 判别法 7.5, 要想说明 $h \in BMO_d$, 可以考虑选取常数 $C_{[a,b]} = \log c$ 使得对任意 a, b 均有

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b |\log t - \log c| dt = \frac{1}{\frac{b}{c} - \frac{a}{c}} \int_{\frac{a}{c}}^{\frac{b}{c}} |\log t| dt$$

始终有界. 现若 $b-a \geq \frac{b}{2}$, 则可取 $c = b$, 此时 $1 - \frac{a}{b} \geq \frac{1}{2}$, 因此

$$\frac{1}{1 - \frac{a}{b}} \int_{\frac{a}{b}}^1 |\log t| dt \leq 2 \int_0^1 |\log t| dt = 2.$$

若 $b-a < \frac{b}{2}$, 则可取 $c = a$, 此时 $\frac{b}{a} < 2$, 因此

$$\frac{1}{\frac{b}{a} - 1} \int_1^{\frac{b}{a}} |\log t| dt \leq \frac{1}{\frac{b}{a} - 1} \int_1^2 |\log t| dt = |\log 2| \leq 2.$$

因此由 BMO_d 判别法 7.5 知 $\|h\|_{BMO_d} \leq 4$.

命题 7.6 (BMO_d 函数的性质)

设 $f \in BMO_d$, 则对任意二进方体 Q, Q' , 只要 $Q \subset Q'$, 就有

$$|f_Q - f_{Q'}| \leq \frac{|Q'|}{|Q|} \|f\|_{BMO_d}.$$

特别设 $N \in \mathbb{N}$, 若 Q' 的边长是 Q 的 2^N 倍, 则

$$|f_Q - f_{Q'}| \leq N 2^n \|f\|_{BMO_d}.$$



证明 知

$$|f_Q - f_{Q'}| \leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_{Q'}| dx \leq \frac{1}{|Q|} \int_{Q'} |f - f_{Q'}| dx \leq \frac{|Q'|}{|Q|} \|f\|_{BMO_d}.$$

现若 Q' 的边长是 Q 的 2^N 倍, 设 $Q = Q_0 \subset Q_1 \subset \cdots \subset Q_N = Q'$, 其中 Q_j 的边长是 Q 的 2^j 倍, 则 $|Q_{j+1}|/|Q_j| = 2^{(j+1)n}/2^{jn}|Q| = 2^n$, 进而

$$|f_{Q_0} - f_{Q_N}| \leq |f_{Q_0} - f_{Q_1}| + |f_{Q_1} - f_{Q_2}| + \cdots + |f_{Q_{N-1}} - f_{Q_N}| \leq N 2^n \|f\|_{BMO_d}.$$

此即欲证. □

对 BMO 成立的 John-Nirenberg 定理同样对 BMO_d 成立:

定理 7.4 (BMO_d 上的 John-Nirenberg 定理)

对任意 $f \in BMO_d(\mathbb{R}^n)$, 任意 $Q \in \mathcal{D}$ 与任意 $\alpha > 0$ 而言有

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \alpha \|f\|_{BMO_d}\}| \leq e|Q|e^{-\frac{\alpha}{2^n e}}. \quad (7.27)$$

证明 在 John-Nirenberg 定理 7.2 的证明中把第零代方体选成二进方体, 显见选取过程中出现的所有方体都将是二进方体, 重复 John-Nirenberg 定理的证明即可. $\square$

BMO_d 上的 John-Nirenberg 定理成立后, 其在 BMO 中的推论自然也能在 BMO_d 中成立:

推论 7.5 (BMO_d 函数 (在二进方体上) 的指数可积性)

每个 BMO_d 函数都在下述意义下指数可积: 对任意 $0 < \gamma < (2^n e)^{-1}$, 任意 $f \in BMO_d(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $Q \in \mathcal{D}$ 而言有

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q e^{\gamma \frac{|f(x) - f_Q|}{\|f\|_{BMO_d}}} dx \leq 1 + \frac{2^n e^2 \gamma}{1 - 2^n e \gamma}. \quad (7.28)$$

推论 7.6 (BMO_d 函数 (在紧集上) 的指数可积性)

设 $f \in BMO_d(\mathbb{R}^n)$, 则对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ 均有

$$\int_K e^{c|f(x)|} dx < \infty, \quad (7.29)$$

其中 $c < (2^n e \|f\|_{BMO_d})^{-1}$.

推论 7.7 (BMO_d 函数的局部可积性)

对任意 $0 < p < \infty$ 与任意 $f \in BMO_d$ 有

$$\sup_{Q \in \mathcal{D}} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq e 2^n (e p \Gamma(p))^{\frac{1}{p}} \|f\|_{BMO_d(\mathbb{R}^n)}. \quad (7.30)$$

推论 7.8 (BMO_d 范数的 L^p 刻画)

对任意 $1 \leq p < \infty$ 与 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|f\|_{BMO_d} \leq \sup_{Q \in \mathcal{D}} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq e^2 \cdot 2^n p \|f\|_{BMO_d}. \quad (7.31)$$

7.4 sharp 极大函数

回忆对 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ 关于方体定义的 Hardy-Littlewood 极大函数:

$$M_c(f)(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy.$$

本节我们介绍用于控制函数在某点附近平均振荡的相关极大算子.

定义 7.6 (sharp 极大函数)

对 $\mathbb{R}^n$ 上给定的局部可积函数 f , 定义其 sharp 极大函数 $M_c^\#(f)$ 为

$$M_c^\#(f)(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t) - f_Q| dt, \quad (7.32)$$

其中上确界在 $\mathbb{R}^n$ 中包含点 x 的全体方体中取.

sharp 极大函数与 BMO 空间有关, 事实上有

$$BMO(\mathbb{R}^n) = \{f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n) : M_c^\#(f) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)\},$$

且

$$\|f\|_{BMO} = \|M_c^\#(f)\|_{L^\infty}.$$

sharp 极大函数还有二进版本:

定义 7.7 (二进 sharp 极大函数)

f 的二进 sharp 极大函数定义为

$$M_d^\#(f)(x) = \sup_{Q \in \mathcal{D}, Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t) - f_Q| dt, \quad (7.33)$$

其中 $\mathcal{D}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的全体二进方体.

显见 $M_d^\#$ 要点态小于 $M_c^\#$. 与 BMO 的相关结论类似, 在二进版本下同样有

$$BMO_d(\mathbb{R}^n) = \{f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n) : M_d^\#(f) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)\},$$

且

$$\|f\|_{BMO_d} = \|M_d^\#(f)\|_{L^\infty}.$$

命题 7.7 (sharp 极大函数的点态控制)

设 $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, 若存在 $A > 0$ 使得对包含 $\mathbb{R}^n$ 中某取定点 x 的任意方体 (或二进方体) Q 而言, 总存在常数 c_Q 使得

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y) - c_Q| dy \leq A.$$

则 $M_c^\#(f)(x) \leq 2A$ (或 $M_d^\#(f)(x) \leq 2A$).

证明 取定 $x \in \mathbb{R}^n$, 对包含 x 的方体 (或二进方体) Q 而言有

$$|f - f_Q|_Q \leq |f - c_Q|_Q + |f_Q - c_Q|_Q \leq |f - c_Q|_Q + \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - c_Q| dx \leq 2A.$$

上式两端同时在包含 x 的全体方体 (或二进方体) Q 中取上确界即得 $M_c^\#(f)(x) \leq 2A$ (或 $M_d^\#(f)(x) \leq 2A$). $\square$

下面讨论 $M_c^\#, M_d^\#$ 的性质及它们与 M_c, M_d 之间的关系.

命题 7.8

设 f, g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数, 则

- (i) $M_c^\#(f + g) \leq M_c^\#(f) + M_c^\#(g), M_d^\#(f + g) \leq M_d^\#(f) + M_d^\#(g).$
- (ii) $M_c^\#(f) \leq 2M_c(f), M_d^\#(f) \leq 2M_d(f).$
- (iii) $M_c^\#(|f|) \leq 2M_c^\#(f), M_d^\#(|f|) \leq 2M_d^\#(f).$

证明 (i) 的结论是显然对. (ii) 通过定义与 $|f - f_Q| \leq |f| + |f_Q|$ 即可得证. 为证 (iii), 对 $\mathbb{R}^n$ 中包含 x 的每个方体 (或二进方体) Q 而言, 记 $c_Q = |f_Q|$, 则由 $||f| - |f_Q|| \leq |f - f_Q|$ 可知

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q ||f(y)| - |f_Q|| dy \leq M_c^\#(f)(x).$$

(在 Q 为二进方体时上右式对应改为 $M_d^\#(f)(x)$). 由命题 7.7 即得结论. $\square$

下面给出的结果是 $M_d, M_d^\#$ 之间范数可比较性的基础.

定理 7.5 (M_d 的 good λ 分布不等式)

对任意 $\gamma > 0$, 任意 $\lambda > 0$ 与 $\mathbb{R}^n$ 上的任意局部可积函数 f 均有估计

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda, M_d^\#(f)(x) \leq \gamma\lambda\}| \leq 2^n \gamma |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}|.$$

证明 不妨设 $\Omega_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}$ 的测度是有限的, 否则命题无所可证. 任取 $x \in \Omega_\lambda$, 总会存在一个最

大二进方体 $Q^x \ni x$ 使得

$$\frac{1}{|Q^x|} \int_{Q^x} |f(y)| dy > \lambda. \quad (7.34)$$

其中最大是在包含关系下谈的. 这是因为如果这个最大二进方体不存在, Ω_λ 的测度就是 ∞ 了. 注意到整个 Q^x 都会包含在 Ω_λ 中, 因为对每个给定的 $z \in Q_x$ 而言, 由(7.34)式即知 $z \in \Omega_\lambda$. 现用 Q_j 表示 Ω_λ 中所有 x 对应的最大二进方体 Q^x , 即 $\{Q_j\}_j = \{Q^x : x \in \Omega_\lambda\}$. 根据最大性知这些最大二进方体两两不交, 因此不同的 Q_j 也是不交的. 另注意到若 $x, y \in Q_j$, 则 $Q_j = Q^x = Q^y$. 可知 $\Omega_\lambda = \bigcup_j Q_j$, 且容易验证

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda, M_d^\#(f)(x) \leq \gamma\lambda\} \subset \Omega_\lambda = \bigcup_j Q_j.$$

因此要证明欲求估计, 只需证明对每个 Q_j 均有

$$|\{x \in Q_j : M_d(f)(x) > 2\lambda, M_d^\#(f)(x) \leq \gamma\lambda\}| \leq 2^n \gamma |Q_j| \quad (7.35)$$

即可. 这是因为只要(7.35)式成立, 对式子两边关于 j 求和即得欲证.

对每个方体 Q_j , 记 Q'_j 为其唯一的二进父代, 即边长为其两倍的唯一前代. 下面说明对每个 j 均有

$$\{x \in Q_j : M_d(f)(x) > 2\lambda\} \subset \{x \in Q_j : M_d((f - f_{Q'_j})\chi_{Q_j})(x) > \lambda\}. \quad (7.36)$$

取定 $x \in Q_j$ 满足 $M_d(f)(x) > 2\lambda$, 则有

$$\sup_{R \ni x} \frac{1}{|R|} \int_R |f(y)| dy = M_d(f)(x), \quad (7.37)$$

其中上确界在全体要么包含 Q_j , 要么被 Q_j 包含的二进方体 R 中取 (因为 $Q_j \cap R \supset \{x\} \neq \emptyset$). 现若 $R \supsetneq Q_j$, 由 Q_j 的最大性知(7.34)式对 R 不成立, 因此 $|f|$ 在 R 上的平均至多为 λ . 故只要 $M_d(f)(x) > 2\lambda$, 就总会存在 Q_j 内的某个二进方体 R 使得(7.37)式中的平均大于 2λ . 这说明如果 $x \in Q_j$ 且 $M_d(f)(x) > 2\lambda$, 就可以把(7.37)式中的 f 换成 $f\chi_{Q_j}$, 进而得到 $M_d(f\chi_{Q_j})(x) > 2\lambda$. 从而对 $x \in Q_j$, 由 Q_j 的最大性知 $|f_{Q'_j}| \leq |f|_{Q'_j} \leq \lambda$, 可得

$$M_d((f - f_{Q'_j})\chi_{Q_j})(x) \geq M_d(f\chi_{Q_j})(x) - |f_{Q'_j}| > 2\lambda - \lambda = \lambda.$$

这便证明了(7.36)式, 进而可得

$$|\{x \in Q_j : M_d(f)(x) > 2\lambda\}| \leq |\{x \in Q_j : M_d((f - f_{Q'_j})\chi_{Q_j})(x) > \lambda\}|, \quad (7.38)$$

由 M_d 的弱 (1,1) 型估计可得对任意 $\xi_j \in Q_j$ 均有:

$$\begin{aligned} |\{x \in Q_j : M_d((f - f_{Q'_j})\chi_{Q_j})(x) > \lambda\}| &\leq \frac{1}{\lambda} \int_{Q_j} |f(y) - f_{Q'_j}| dy \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y) - f_{Q'_j}| \chi_{Q_j} dy \\ &\leq \frac{2^n |Q_j|}{\lambda} \frac{1}{|Q'_j|} \int_{Q'_j} |f(y) - f_{Q'_j}| dy \\ &\leq \frac{2^n |Q_j|}{\lambda} M_d^\#(f)(\xi_j). \end{aligned} \quad (7.39)$$

为证(7.35)式, 设存在 $\xi_j \in Q_j$ 满足 $M_d^\#(f)(\xi_j) \leq \gamma\lambda$, 否则(7.35)左式成为零测集. 对该 ξ_j 应用(7.38),(7.39)两式即得(7.35)式. $\square$

下面从 good λ 不等式7.5导出 $M_d(f)$ 的几种范数关于 $M_d^\#(f)$ 对应范数的控制.

定理 7.6 (M_d 与 $M_d^\#$ 之间的范数控制)

取定 $0 < p_0 < \infty$, 设 p 满足 $p_0 < p < \infty$, 则对任意 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 只要

$$\forall B > 0 (C_B(f) = \sup_{0 < \lambda \leq B} \lambda^{p_0} |\{M_d(f) > \lambda\}| < \infty), \quad (7.40)$$

就有

$$\|M_d(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_d^\#(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (7.41)$$

且

$$\|M_d(f)\|_{L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_d^\#(f)\|_{L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)}. \quad (7.42)$$

证明 取定 $p_0 < p < \infty$, 对正实数 N 记

$$I_N = \int_0^N p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f) > \lambda\}| d\lambda.$$

由(7.40)式知 $I_N < \infty$, 且

$$I_N \leq \int_0^N p\lambda^{p-p_0-1} C_N(f) d\lambda = \frac{pN^{p-p_0}}{p-p_0} C_N(f) < \infty.$$

为套用 good λ 不等式 7.5, 换元得

$$I_N = 2^p \int_0^{\frac{N}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda\}| d\lambda,$$

进而由 good λ 不等式得

$$\begin{aligned} I_N &\leq 2^p \int_0^{\frac{N}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda, M_d^\#(f)(x) \leq \gamma\lambda\}| d\lambda + 2^p \int_0^{\frac{N}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d^\#(f)(x) > \gamma\lambda\}| d\lambda \\ &\leq 2^p 2^n \gamma \int_0^{\frac{N}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| d\lambda + 2^p \int_0^{\frac{N}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d^\#(f)(x) > \gamma\lambda\}| d\lambda \\ &\leq 2^p 2^n \gamma I_N + \frac{2^p}{\gamma^p} \int_0^{\frac{N\gamma}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d^\#(f)(x) > \lambda\}| d\lambda. \end{aligned}$$

现取 γ 满足 $2^p 2^n \gamma = \frac{1}{2}$, 因为 $I_N < \infty$, 故可以消去右式的 $\frac{1}{2} I_N$ 得到

$$I_N \leq 2^{p+1} 2^{p(n+p+1)} \int_0^{\frac{N\gamma}{2}} p\lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d^\#(f)(x) > \lambda\}| d\lambda,$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得(7.41)式.

再次应用 good λ 不等式, 可得

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda, M_d^\#(f)(x) \leq \gamma\lambda\}| + |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d^\#(f)(x) > \gamma\lambda\}| \\ &\leq 2^n \gamma |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| + |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d^\#(f)(x) > \gamma\lambda\}|. \end{aligned}$$

在上式两端同乘 λ^p , 对 $\lambda \leq N$ 取上确界得

$$\sup_{0 < \lambda \leq N} \lambda^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > 2\lambda\}| \leq 2^n \gamma \sup_{0 < \lambda \leq N} \lambda^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| + \frac{1}{\gamma^p} \|M_d^\#(f)\|_{L^{p,\infty}}^p,$$

等价地有

$$\begin{aligned} 2^{-p} \sup_{0 < t \leq 2N} t^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > t\}| &\leq 2^n \gamma \sup_{0 < \lambda \leq N} \lambda^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| + \frac{1}{\gamma^p} \|M_d^\#(f)\|_{L^{p,\infty}}^p \\ &\leq 2^n \gamma \sup_{0 < \lambda \leq 2N} \lambda^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| + \frac{1}{\gamma^p} \|M_d^\#(f)\|_{L^{p,\infty}}^p. \end{aligned}$$

由(7.40)式知

$$\sup_{0 < \lambda \leq 2N} \lambda^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > \lambda\}| \leq (2N)^{p-p_0} C_{2N}(f) < \infty.$$

取 γ 满足 $2^n \gamma = \frac{1}{2} 2^{-p}$ 可得

$$\frac{1}{2} 2^{-p} \sup_{0 < t \leq 2N} t^p |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d(f)(x) > t\}| \leq 2^{p(n+p+1)} \|M_d^\#(f)\|_{L^{p,\infty}}^p,$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得(7.42)式. □

注 若 $1 < p_0 < \infty$, 则 $L^{p_0,\infty}$ 中的函数同样满足(7.40)式, 因此定理 7.6 对 $f \in L^{p_0,\infty}$ 也成立.

7.5 关于 BMO 的插值

本节我们讨论把 L^∞ 换成 BMO 的一个插值定理, sharp 函数在这一结果中具有重要的地位. 在此之前, 我们先准备一个范数控制 7.6 在该插值中有用的推论.

命题 7.9

设 $0 < p_0 < \infty$, 则对任意 $p_0 < p < \infty$ 与任意满足 (7.40) 式的 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ (特别是令 $M_d(f) \in L^{p_0, \infty}$ 的 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$) 有

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leq \|M_d(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_d^\#(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_c^\#(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{n+p+3+\frac{1}{p}} \|M_c(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned} \quad (7.43)$$

类似有

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)} &\leq \|M_d(f)\|_{L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_d^\#(f)\|_{L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_c^\#(f)\|_{L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq 2^{n+p+3+\frac{1}{p}} \|M_c(f)\|_{L^{p, \infty}(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned} \quad (7.44)$$

若 $p > 1$, 则上述所有不等式变为同阶关系 $\approx$.

证明 因为对 $\mathbb{R}^n$ 中的每一点而言, 总会有某列二进方体收缩到该点, 故由 Lebesgue 微分定理知对 a.e. $x \in \mathbb{R}^n$ 而言, 局部可积函数 f 在包含 x 的二进方体上的平均总会随着二进方体的收缩而收敛到 $f(x)$, 因此 $|f| \leq M_d(f)$ a.e., 故 (7.43), (7.44) 的第一式得证. 由范数控制 7.6 即得 (7.43), (7.44) 第二式. 从 $M_d^\#, M_c^\#$ 的定义出发立得 (7.43), (7.44) 第三式, 而 (7.43), (7.44) 第四式由命题 7.8(ii) 即得.

当 $p > 1$ 时, 由 M_c 的强 (p, p) 型估计立得 (7.43) 式的反向估计, 而强型估计能导出弱型估计, 由 M_c 的弱 (p, p) 型估计即得 (7.43) 式的反向估计. $\square$

下面记 L_{fin}^∞ 为全体支在有限测度集上的 L^∞ 函数构成的空间.

定理 7.7 (BMO 的 L^p 插值)

设 $1 \leq p_0 < \infty$, T 以至多为 A_0 的范数将 $L^{p_0}(\mathbb{R}^n)$ 映入 $L^{p_0, \infty}(\mathbb{R}^n)$, 以至多为 A_1 的范数将 $L_{fin}^\infty(\mathbb{R}^n)$ 映入 $BMO(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $p_0 < p < \infty$ 而言, 算子 T 存在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 到自身的延拓, 且存在常数 C_{n, p, p_0} 使得对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|T(f)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n, p, p_0} A_0^{\frac{p_0}{p}} A_1^{1-\frac{p_0}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (7.45)$$

证明 我们按照 p_0 取值的两种情况来讨论.

情况一: $p_0 > 1$. 对 $f \in L^{p_0} + L_{fin}^\infty$ 定义算子 $S(f) = M_c^\#(T(f))$, 显见 S 是次可加算子, 下面证明 S 将 L_{fin}^∞ 映入 L^∞ . 对 $f \in L_{fin}^\infty$ 知

$$\|S(f)\|_{L^\infty} = \|M_c^\#(T(f))\|_{L^\infty} = \|T(f)\|_{BMO} \leq A_1 \|f\|_{L^\infty}.$$

下一步我们说明 S 将 L^{p_0} 映入 $L^{p_0, \infty}$. 对 $f \in L^{p_0}$ 有

$$\begin{aligned} \|S(f)\|_{L^{p_0, \infty}} &= \|M_c^\#(T(f))\|_{L^{p_0, \infty}} \\ &\leq 2 \|M_c(T(f))\|_{L^{p_0, \infty}} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} 2 \frac{3^n p_0}{p_0 - 1} \|T(f)\|_{L^{p_0, \infty}} \\ &\leq 2 \frac{3^n p_0}{p_0 - 1} A_0 \|T(f)\|_{L^{p_0, \infty}}. \end{aligned}$$

其中 (A) 是 (3.21) 式. 现已知 S 的弱 (∞, ∞) 型估计与弱 (p_0, p_0) 型估计, 记 $\mathcal{F}$ 是有限简单函数空间, 则由 Marcinkiewicz 插值定理知对任意 $f \in \mathcal{F}$ 与 $p_0 < p < \infty$ 均有

$$\|M_c^\#(T(f))\|_{L^p} = \|S(f)\|_{L^p} \leq 2 \left(\frac{p}{p-p_0} \right)^{\frac{1}{p}} \left(2 \frac{3^n p_0}{p_0-1} A_0 \right)^{\frac{p_0}{p}} A_1^{1-\frac{p_0}{p}} \|f\|_{L^p}.$$

现取 $h \in \mathcal{F}$, 显见 $h \in L^{p_0}(\mathbb{R}^n)$, 由 $T: L^{p_0} \rightarrow L^{p_0, \infty}$ 的有界性知 $T(h) \in L^{p_0, \infty}(\mathbb{R}^n)$, 于是由 M_d 的弱 (p, p) 型估计 7.3 知 $M_d(T(h)) \in L^{p_0, \infty}(\mathbb{R}^n)$, 进而应用命题 7.9 知

$$\|T(h)\|_{L^p} \leq 2^{n+p+2+\frac{1}{p}} \|M_c^\#(T(h))\|_{L^p} \leq C_{n,p,p_0} A_0^{\frac{p_0}{p}} A_1^{1-\frac{p_0}{p}} \|h\|_{L^p}.$$

由上式与 $\mathcal{F}$ 在 L^p 中的稠密性即知 (7.45) 式对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 均成立.

情况二: $p_0 = 1$. 取定 $\delta \in (0, 1)$, 对 $f \in L^1 + L^\infty$ 定义

$$S_\delta(f) = M_c^\#(|T(f)|^\delta)^{\frac{1}{\delta}}.$$

下面说明 S_δ 把 L_{fin}^∞ 映入 L^∞ . 对 $f \in L_{fin}^\infty$ 有

$$\begin{aligned} \|S_\delta(f)\|_{L^\infty} &= \|M_c^\#(|T(f)|^\delta)^{\frac{1}{\delta}}\|_{L^\infty} \\ &= \|M_c^\#(|T(f)|^\delta)\|_{L^\infty}^{\frac{1}{\delta}} \\ &= \| |T(f)|^\delta \|_{BMO}^{\frac{1}{\delta}} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} 2^{\frac{1}{\delta}} \|T(f)\|_{BMO} \\ &\leq 2^{\frac{1}{\delta}} A_1 \|f\|_{L^\infty}, \end{aligned}$$

其中 (B) 是定理 7.1. 另对于 $f \in L^1$ 知

$$\begin{aligned} \|S_\delta(f)\|_{L^{1,\infty}} &= \|M_c^\#(|T(f)|^\delta)^{\frac{1}{\delta}}\|_{L^{1,\infty}} \\ &= \|M_c^\#(|T(f)|^\delta)\|_{L^{\frac{1}{\delta},\infty}}^{\frac{1}{\delta}} \\ &\leq \left(\frac{3^{n\delta} 2}{\frac{1}{\delta} - 1} \right)^{\frac{1}{\delta}} \| |T(f)|^\delta \|_{L^{\frac{1}{\delta},\infty}}^{\frac{1}{\delta}} \\ &= \left(\frac{3^{n\delta} 2}{1-\delta} \right)^{\frac{1}{\delta}} \|T(f)\|_{L^{1,\infty}} \\ &= \left(\frac{3^{n\delta} 2}{1-\delta} \right)^{\frac{1}{\delta}} A_0 \|f\|_{L^1}. \end{aligned}$$

现在在 $S_\delta: L_{fin}^\infty \rightarrow L^\infty$ 与 $S_\delta: L^1 \rightarrow L^{1,\infty}$ 之间插值, 在 $\mathcal{F}$ 上应用 Marcinkiewicz 差值定理知对任意 $1 < p < \infty$ 与任意 $f \in \mathcal{F}$ 有

$$\|M_c^\#(|T(f)|^\delta)\|_{L^{\frac{1}{\delta},\infty}}^{\frac{1}{\delta}} = \|S_\delta(f)\|_{L^p} \leq 2 \left(\frac{p}{p-1} \right)^{\frac{1}{p}} \left[\left(\frac{3^{n\delta} 2}{1-\delta} \right)^{\frac{1}{\delta}} A_0 \right]^{\frac{1}{p}} (2^{\frac{1}{\delta}} A_1)^{1-\frac{1}{p}} \|f\|_{L^p}. \quad (7.46)$$

为证 (7.45) 式, 取定 $1 < p < \infty$, 考虑 $h \in \mathcal{F}$, 显见 $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 由 $T: L^1 \rightarrow L^{1,\infty}$ 的有界性知 $T(h) \in L^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 进而 $|T(h)|^\delta \in L^{\frac{1}{\delta},\infty}(\mathbb{R}^n)$, 于是由 M_d 的弱 $(\frac{1}{\delta}, \frac{1}{\delta})$ 型有界性可知 $M_d(|T(h)|^\delta) \in L^{\frac{1}{\delta},\infty}(\mathbb{R}^n)$. 最后在命题 7.9 中代入 $p_0 = \frac{1}{\delta}$ 可得

$$\|T(h)\|_{L^p} = (\| |T(h)|^\delta \|_{L^{\frac{1}{\delta},\infty}})^{\frac{1}{\delta}} \leq (2^{n+\frac{p}{\delta}+2+\frac{\delta}{p}} \|M_c^\#(|T(h)|^\delta)\|_{L^{\frac{1}{\delta},\infty}})^{\frac{1}{\delta}}. \quad (7.47)$$

将 (7.46) 式中的估计代入 (7.47) 式可得将 f 换成 h 的 (7.45) 式, 其中 $C_{n,p,1}$ 会依赖于 δ (但可以就把 δ 取成 $\frac{1}{2}$). 最后通过 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性即得 (7.45) 式对全体 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 均成立. $\square$

注

- (i) 特别对 $p_0 = 1$ 单独讨论而不直接使用 M_c 的弱 $(1, 1)$ 型估计的原因在于命题 7.9 中同阶关系只能对 $p_0 > 1$ 成立.
- (ii) 如果把插值定理 7.7 中的 BMO 换成更大的 BMO_d , 结论也是成立的. 此时需要把证明中的 $M_c^\#$ 都换成 $M_d^\#$, 再在 BMO_d 下用定理 7.1 即可.

下面给出插值定理 7.7 的一个应用.

定理 7.8 (Calderó-Zygmund 奇异积分的 BMO 有界性)

设 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的局部可积函数 K 满足尺寸条件

$$|K(x)| \leq \frac{A_1}{|x|^n} < \infty, \quad A_1 > 0, \quad (7.48)$$

与 Hörmander 条件

$$\sup_{y \neq 0} \int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx = A_2 < \infty, \quad (7.49)$$

仿照(4.97)式定义缓增分布 $W \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与递降列 $\delta_k \downarrow 0$. 设 $T: f \mapsto f * W$ 具有 $L^2 \rightarrow L^2$ 的延拓, 则对任意 $f \in L_{fin}^\infty$ 有

$$\|T(f)\|_{BMO} \leq 2(A_2 + (2\sqrt{n})^{\frac{n}{2}} \|T\|_{L^2 \rightarrow L^2}) \|f\|_{L^\infty}. \quad (7.50) \quad \heartsuit$$

证明 取定中心在 c_Q 的方体 Q , 设 Q^* 是与 Q 同心, 各边平行于 Q , 边长满足 $l(Q^*) = 2\sqrt{n}l(Q)$ 的方体. 取支在有限测度集上的函数 f , 记 $f = f_0 + f_\infty$, 其中 $f_0 = f\chi_{Q^*}$, $f_\infty = f\chi_{(Q^*)^c}$. 对取定的 $x \in Q$, 我们断言 $T(f_\infty)(x)$ 是良定义的, 且

$$T(f_\infty)(x) = \lim_{\delta_k \downarrow 0} \int_{|x-y| \geq \delta_k} K(x-y)f(y)\chi_{(Q^*)^c}(y)dy = \int_{(Q^*)^c} K(x-y)f(y)dy, \quad (7.51)$$

这是因为对 $y \in (Q^*)^c$ 与 $x \in Q$ 知 $|x-y| \geq \sqrt{n}l(Q)$, 故

$$|K(x-y)| \leq \frac{A_1}{|x-y|^n} \leq \frac{A_1}{(\sqrt{n}l(Q))^n}.$$

而 f 本身是支在有限测度集上的有界函数, 因此(7.51)右式绝对收敛, 此即良定义性.

记

$$C_Q = T(f_\infty)(c_Q),$$

知

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |T(f)(x) - C_Q| dx &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |T(f_0)(x)| dx + \frac{1}{|Q|} \int_Q |T(f_\infty)(x) - T(f_\infty)(c_Q)| dx \\ &= \frac{1}{|Q|} \int_Q |T(f_0)(x)| dx + \frac{1}{|Q|} \int_Q \left| \int_{(Q^*)^c} [K(x-y) - K(c_Q-y)] f(y) dy \right| dx \\ &\leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |T(f_0)(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\|f\|_{L^\infty}}{|Q|} \int_Q \int_{(Q^*)^c} |K(x-y) - K(c_Q-y)| dy dx \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \|T\|_{L^2 \rightarrow L^2} \left(\frac{1}{|Q|} \int_{Q^*} |f_0(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\|f\|_{L^\infty}}{|Q|} \int_Q A_2 dx \\ &\leq ((2\sqrt{n})^{\frac{n}{2}} \|T\|_{L^2 \rightarrow L^2} + A_2) \|f\|_{L^\infty}, \end{aligned}$$

其中 (A) 用到的式子是

$$\int_{(Q^*)^c} |K(x - c_Q + (c_Q - y)) - K(c_Q - y)| dy \leq A_2,$$

这一式子成立是因为由 $y \notin Q^*$ 知

$$|c_Q - y| \geq \sqrt{n}l(Q),$$

又由 $x \in Q$ 知

$$|x - c_Q| \leq \frac{\sqrt{n}}{2}l(Q),$$

由此得

$$|c_Q - y| \geq 2|x - c_Q|,$$

套用 Hörmander 条件即可, 几何关系参看图7.2. 最后由 BMO 判别法7.1即得欲证. $\square$




图 7.2: 方体 Q 与扩大后的方体 Q^* , 其中 $l(Q^*) = 2\sqrt{n}l(Q)$, $x \in Q, y \in Q^*$.

定理 7.8 可以用于在绕过 Calderón-Zygmund 分解的情况下给出奇异积分的 L^p 控制. 这是因为如果 T 是定理 7.8 中提到的奇异积分, 那么它就同时是 $L^2 \rightarrow L^2$ 与 $L_{fin}^\infty \rightarrow BMO$ 的, 因此由插值定理 7.45 可得 T 具有 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($2 < p < \infty$) 上的延拓, 通过对偶即得 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < 2$) 上的延拓.

第八章 Hardy 空间

8.1 光滑性与消失性

Hardy 空间是具有消失积分或消失矩 (总之具有消失性) 的函数或分布构成的空间. 为了充分利用消失性, 我们需要明白消失性是怎样和光滑性产生联系的. 要研究这一联系, 可以考虑研究具有光滑性的函数在具有消失性的函数上的作用, 并让这两个函数处在不同量级.

设 $\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积, 我们将会多次用到下述不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1+|x|)^M} \leq \frac{\nu_n M}{M-n}, \quad M > n. \quad (8.1)$$

要证明(8.1)式, 用极坐标换元可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1+|x|)^M} = n\nu_n \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{(1+r)^M} dr \leq n\nu_n \int_0^1 r^{n-1} dr + n\nu_n \int_1^\infty r^{n-1-M} dr,$$

积分即得(8.1)式.

定理 8.1 (无消失矩函数与无光滑性函数之间的作用)

设 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 Φ, Ψ 满足

$$|\Phi(x)| \leq \frac{A}{(1+|x|)^M}, \quad |\Psi(x)| \leq \frac{B}{(1+|x|)^K},$$

其中 $M, K > n$, 则对 $t, s > 0$ 有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_t(x-a) \Psi_s(x-b) dx \right| \leq \frac{C_0 AB \max(t, s)^{-n}}{(1 + \max(t, s)^{-1} |a-b|)^{\min(M, K)}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad (8.2)$$

其中

$$C_0 = \nu_n \left(\frac{M4^K}{M-n} + \frac{K4^M}{K-n} \right).$$

特别地, 对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|(\Phi_t * \Psi_s)(y)| \leq \frac{C_0 AB \max(t, s)^{-n}}{(1 + \max(t, s)^{-1} |y|)^{\min(M, K)}}. \quad (8.3)$$

证明 因为 t, s 地位对等, 不妨设 $t \leq s$. 在 $s^{-1}|a-b| \leq 1$ 时, 注意到

$$\frac{s^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^K} \leq s^{-n} \leq \frac{s^{-n} 2^{\min(M, K)}}{(1+s^{-1}|a-b|)^{\min(M, K)}}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{At^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} \frac{Bs^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^K} dx &\leq \frac{ABs^{-n} 2^{\min(M, K)}}{(1+s^{-1}|a-b|)^{\min(M, K)}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{t^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} dx \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \frac{ABs^{-n}}{(1+s^{-1}|a-b|)^{\min(M, K)}} \frac{\nu_n M 2^K}{M-n}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是代入了(8.1)式与 $\min(M, K) \leq K$. 结合 Φ, Ψ 自身的点态估计即得欲证.

对于 $s^{-1}|a-b| \geq 1$ 的情况, 取线段 $[a, b]$ 的重点, 取过该点且垂直于线段 $[a, b]$ 的超平面, 用该超平面将空间分为两个半空间, 记包含 a 的半空间为 H_a , 包含 b 的半空间为 H_b . 知

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{At^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} \frac{Bs^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^K} dx = \int_{H_a} \cdots dx + \int_{H_b} \cdots dx.$$

对 $x \in H_a$, 知 $|x - b| \geq \frac{1}{2}|a - b|$, 进而

$$\begin{aligned} \int_{H_a} \frac{At^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} \frac{Bs^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^K} dx &\leq \frac{Bs^{-n}}{(1+s^{-1}\frac{1}{2}|a-b|)^K} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{At^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} dx \\ &\leq \frac{ABs^{-n}}{(1+s^{-1}|a-b|)^K} \frac{\nu_n M 2^K}{M-n}. \end{aligned}$$

对 $x \in H_b$, 知 $|x - a| \geq \frac{1}{2}|a - b|$, 进而

$$\begin{aligned} \int_{H_b} \frac{At^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} \frac{Bs^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^K} dx &\leq \frac{At^{-n}}{(1+t^{-1}|x-a|)^M} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{Bs^{-n}}{(1+s^{-1}\frac{1}{2}|a-b|)^K} dx \\ &\leq \frac{At^{-n} 2^M}{(t^{-1}|a-b|)^M} \frac{B\nu_n K}{K-n} \\ &= \frac{At^{-n} 2^M (t/s)^M}{(s^{-1}|a-b|)^M} \frac{B\nu_n K}{K-n} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \frac{AB(t/s)^{M-n} s^{-n}}{(1+s^{-1}|a-b|)^M} \frac{4^M \nu_n K}{K-n} \\ &\leq \frac{ABs^{-n}}{(1+s^{-1}|a-b|)^M} \frac{\nu_n K 4^M}{K-n}. \end{aligned}$$

其中 (B) 是因为 $s^{-1}|a-b| \geq 1$. 现在将 H_a, H_b 上的估计结合即得(8.2)式. 另 $a=0, y=b$ 并将 Ψ 换成 $\tilde{\Psi}$ 即得(8.3)式. $\square$

定理 8.2 (高阶消失矩函数与高阶光滑函数之间的作用)

取定 $a, b \in \mathbb{R}^n, N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, 设 $\Phi \in C^{N+1}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\sum_{|\beta|=N+1} |\partial^\beta \Phi(x)| \leq \frac{A}{(1+|x|)^M}, \quad M \geq 0.$$

另设 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 Ψ 满足

$$|\Psi(x)| \leq \frac{B}{(1+|x|)^K},$$

其中 $K > N + M + n + 1$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) x^\beta dx = 0, \quad \forall |\beta| \leq N. \quad (8.4)$$

则只要 $0 < s \leq t < \infty$, 就有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_t(x-a) \Psi_s(x-b) dx \right| \leq \frac{C_N C(K-N-M, n) A B t^{-n} (s/t)^{N+1}}{(1+t^{-1}|a-b|)^M}, \quad (8.5)$$

其中 $C(K-N-M, n) = \frac{\nu_n(K-N-M-1)}{K-N-M-n-1}$, $C_N = \sum_{|\beta|=N+1} \frac{1}{\beta!}$. 特别地, 对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|(\Phi_t * \Psi_s)(y)| \leq \frac{C_N C(K-N-M, n) A B t^{-n} (s/t)^{N+1}}{(1+t^{-1}|y|)^M}. \quad (8.6)$$

证明 为证命题, 考虑使用 Taylor 展开公式:

$$F(x_0 + h) = \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{\partial^\alpha F(x_0)}{\alpha!} h^\alpha + R(h, x_0, N), \quad (8.7)$$

其中 $x_0, h \in \mathbb{R}^n, N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, 且

$$R(h, x_0, N) = (N+1) \sum_{|\beta|=N+1} \frac{h^\beta}{\beta!} \int_0^1 (1-\theta)^N \partial^\beta F(x_0 + \theta h) d\theta. \quad (8.8)$$

是积分形式余项, $F \in C^{N+1}(\mathbb{R}^n)$.

取 $x_0 = b - a, h = x - b$, 可得 $x_0 + h = x - a$, 现由(8.7), (8.8)式与消失矩条件(8.4)(这一条件对 Ψ_s 同样成立)

可得

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_t(x-a) \Psi_s(x-b) dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left[\Phi_t(x-a) - \sum_{|\gamma| \leq N} \frac{\partial^\gamma \Phi_t(b-a)}{\gamma!} (x-b)^\gamma \right] \Psi_s(x-b) dx \right| \\
&= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left[(N+1) \sum_{|\beta|=N+1} \frac{(x-b)^\beta}{\beta!} \int_0^1 (1-\theta)^N \frac{\partial^\beta \Phi(\frac{b-a+\theta(x-b)}{t})}{t^{n+N+1}} d\theta \right] \Psi_s(x-b) dx \right| \\
&\leq \sum_{|\beta|=N+1} \frac{N+1}{\beta!} \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 \frac{t^{-n} t^{-N-1} (1-\theta)^N}{(1+t^{-1}|(1-\theta)b+\theta x-a|)^M} \frac{ABs^{-n}|x-b|^{N+1}}{(1+s^{-1}|x-b|)^K} d\theta dx \\
&\leq \sum_{|\beta|=N+1} \frac{N+1}{\beta!} \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 \frac{t^{-n} (s/t)^{N+1} (1-\theta)^N}{(1+t^{-1}|\xi_{b,x}^\theta - a|)^M} \frac{ABs^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^{K-N-1}} d\theta dx, \quad (8.9)
\end{aligned}$$

其中 $\xi_{b,x}^\theta = (1-\theta)b + \theta x$. 由 $s \leq t$ 与 $|\xi_{b,x}^\theta - b| \leq |x-b|$ 可知

$$\begin{aligned}
1+t^{-1}|a-b| &\leq 1+t^{-1}|a-\xi_{b,x}^\theta| + t^{-1}|\xi_{b,x}^\theta - b| \\
&\leq 1+t^{-1}|a-\xi_{b,x}^\theta| + s^{-1}|x-b| \\
&\leq (1+t^{-1}|\xi_{b,x}^\theta - a|)(1+s^{-1}|x-b|);
\end{aligned}$$

于是由 $M \geq 0$ 知

$$\frac{1}{(1+t^{-1}|\xi_{b,x}^\theta - a|)^M} \leq \left(\frac{1+s^{-1}|x-b|}{1+t^{-1}|a-b|} \right)^M.$$

将上述估计代入(8.9)式, 由 $K > N+M+n+1$, (8.1)式与关于 θ 的积分会产生一个 $(N+1)^{-1}$ 这一事实可得

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_t(x-a) \Psi_s(x-b) dx \right| &\leq C_N \int_{\mathbb{R}^n} \frac{(1+s^{-1}|x-b|)^M}{(1+t^{-1}|a-b|)^M} \frac{ABt^{-n}(s/t)^{N+1}s^{-n}}{(1+s^{-1}|x-b|)^{K-N-1}} dx \\
&\leq C_N \frac{ABt^{-n}(s/t)^{N+1}}{(1+t^{-1}|a-b|)^M} \frac{\nu_n(K-N-M-1)}{K-N-M-n-1}.
\end{aligned}$$

此即(8.5)式. 取 $a=0, y=b$, 将 Ψ 换成 $\tilde{\Psi}$ 即得(8.6)式. □

例 8.1 设 $\Phi, \Psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) x^\alpha dx = 0 (\forall |\alpha| \leq N, N \in \mathbb{N})$, 则对任意 $M > n$ 而言, 存在常数 C_M 使得对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|(\Phi_t * \Psi)(y)| \leq \begin{cases} \frac{C_M}{(2+|y|)^M}, & t < 1, \\ \frac{C_M t^{-n-N-1}}{(2+t^{-1}|y|)^M}, & t \geq 1. \end{cases} \quad (8.10)$$

其中第一个估计是定理8.1的结论, 第二个估计是定理8.2的结论.

8.2 Hardy 空间的定义和预备估计

分析中的很多有界性在 $L^p(p > 1)$ 上成立, 但在 L^1 时就不再成立了. Hardy 空间 H^1 给出了各种意义下 L^1 的良好替代. 本章主要研究 H^1 , 并在一定程度上拓展到 Hardy 空间 $H^p(p < 1)$ 上.

定义 8.1 (非切向极大函数)

设 $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 定义 f 关于 Φ 的非切向极大函数为

$$M^*(f; \Phi)(x) = \sup_{t>0} \sup_{\substack{y \in \mathbb{R}^n \\ |y-x|<t}} |(\Phi_t * f)(y)|. \quad (8.11)$$

其中非切向性体现在(8.11)式中的两个上确界是在锥 $\Gamma_x = \{(y, t) : |x-y| < t\} \subset \mathbb{R}_+^{n+1}$ 中的点 (y, t) 中取的, 这个锥仅在点 x 处与 $\mathbb{R}^n$ 相交, 也就是说它与 $\mathbb{R}^n$ 不相切. ♣

注 设 M 是 Hardy-Littlewood 极大函数. 我们断言对任意 Schwartz 函数 Φ 而言, 存在常数 C_Φ 使得

$$M^*(f; \Phi) \leq C_\Phi M(f), \quad (8.12)$$

其中 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数, 且在无穷远处缓增, 即存在 $K, R, C > 0$ 使得在 $|x| \geq R$ 时有 $|f(x)| \leq C(1 + |x|)^K$. 为证该断言, 取 $N > K + n$, 设 $C'_\Phi > 0$ 满足 $|\Phi(x)| \leq C'_\Phi(2 + |x|)^{-N} (\forall x \in \mathbb{R}^n)$. 由 N 的选取与 f, Φ 的点态估计可知卷积 $|t| * |\Phi_t|$ 绝对收敛, 因此 $M^*(f; \Phi)(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 都是良定义的. 现在对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|\Phi_t(x)| = \frac{1}{t^n} \left| \Phi\left(\frac{x}{t}\right) \right| \leq \frac{1}{t^n} \frac{C'_\Phi}{(2 + \frac{|x|}{t})^N}.$$

对满足 $|y - x| < t$ 的任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 知

$$2 + \frac{|y - z|}{t} \geq 2 + \frac{|z - x|}{t} - \frac{|y - x|}{t} \geq 2 + \frac{|z - x|}{t} - 1 = 1 + \frac{|z - x|}{t}.$$

因此

$$M^*(f; \Phi)(x) \leq \sup_{t>0} \sup_{\substack{y \in \mathbb{R}^n \\ |y-x|<t}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{C'_\Phi |f(z)|}{(2 + \frac{|y-z|}{t})^N} \frac{dz}{t^n} \leq \sup_{t>0} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{C'_\Phi |f(z)|}{(1 + \frac{|x-z|}{t})^N} \frac{dz}{t^n},$$

由推论 3.2 即得 (8.12) 式.

下面用关于 Gauss 核 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 的非切向极大函数定义 Hardy 空间 H^p , 记 $\Phi_t(x) = t^{-n}\Phi(t^{-1}x)$, $t > 0$.

定义 8.2

设 $0 < p < \infty$, $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ ($x \in \mathbb{R}^n$). Hardy 空间 $H^p(\mathbb{R}^n)$ 定义为缓增分布 f 构成的空间, 其中 $M^*(f; \Phi) \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对 $f \in H^p$ 记

$$\|f\|_{H^p} = \|M^*(f; \Phi)\|_{L^p}.$$



$p \geq 1$ 时 $\|\cdot\|_{H^p}$ 显然是范数, 而 $p < 1$ 时 $\|\cdot\|_{H^p}$ 是拟范数. 单从定义 8.2 中没法看出 p 在取特定值时 H^p 与其它已知空间之间的重合关系, 下面的定理便说明了这件事.

定理 8.3 (Hardy 空间与 Lebesgue 空间的关系)

(i) 设 $1 < p < \infty$, 则存在常数 $C_{n,p}$ 使得对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|f\|_{H^p} \leq C_{n,p} \|f\|_{L^p}.$$

另对任意 $f \in H^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{H^p}.$$

因此 $H^p(\mathbb{R}^n)$ 与 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 重合.

(ii) $p = 1$ 时, H^1 中的每个元素都是可积函数. 也就是说, $H^1(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$, 且对任意 $f \in H^1$ 有

$$\|f\|_{L^1} \leq \|f\|_{H^1}. \quad (8.13)$$



证明 (a) 设存在 $1 < p < \infty$ 使得 $f \in H^p(\mathbb{R}^n)$, 由 H^p 的定义知集合 $\{\Phi_t * f : t > 0\}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的有界集, 因而它被 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中单位球的某常数倍所囊括. 因为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 是可分 Banach 空间 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间, 故由 Banach-Alaoglu 定理知 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的单位球是弱 * 列紧集. 因此存在序列 $t_j \rightarrow 0$ 使得 $\Phi_{t_j} * f$ 在 L^p 的弱 * 拓扑下收敛到某 L^p 函数 f_0 , 亦即

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\Phi_{t_j} * f) h dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f_0 h dx, \quad h \in L^{p'}(\mathbb{R}^n). \quad (8.14)$$

另一方面, 通过将 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 拆成 $\phi * f + (1 - \phi) * f$ (其中 ϕ 是 Schwartz 函数, 且 $\hat{\phi}$ 在原点附近恒为 1), 可以说明确明 $\Phi_{t_j} * f \rightarrow f(t_j \rightarrow 0)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下成立, 因此 f 与 L^p 函数 f_0 在 a.e. 意义下重合. 因为 $\{\Phi_t\}_{t>0}$ 本身是恒等逼近族, 由恒等逼近定理知

$$\|\Phi_t * f - f\|_{L^p} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 0,$$

通过极限定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists t_\varepsilon > 0 \forall t \in (0, t_\varepsilon) (\|f\|_{L^p} \leq \|\Phi_t * f\|_{L^p} + \varepsilon).$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 故

$$\|f\|_{L^p} \leq \left\| \sup_{t>0} |\Phi_t * f| \right\|_{L^p} \leq \|M^*(f; \Phi)\|_{L^p} = \|f\|_{H^p}. \quad (8.15)$$

对于反向不等式, 利用(8.12)式与 Hardy-Littlewood 极大算子在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($p > 1$) 上的有界性即可.

(b) 对于 $p = 1$ 的情况, 记 $C_{00}(\mathbb{R}^n)$ 为衰减连续函数空间. 注意到 L^1 函数总能成为复有限 Borel 测度, 故可将 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 嵌入复有限 Borel 测度空间 $\mathcal{M}$, 后者中的元素满足全变差有限. 因为 $\mathcal{M}$ 的共轭空间正是可分空间 $C_{00}(\mathbb{R}^n)$, 由 Banach-Alaoglu 定理即知 $\mathcal{M}$ 的单位球是弱*列紧集, 故存在序列 $t_j \rightarrow 0$ 使得 $\Phi_{t_j} * f$ 在测度拓扑下收敛到某测度 $\mu \in \mathcal{M}$, 即

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\Phi_{t_j} * f) h dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f d\mu, \quad h \in C_{00}(\mathbb{R}^n). \quad (8.16)$$

另知 $\Phi_{t_j} * f \rightarrow f$ 在 $\mathcal{S}'$ 的意义下成立, 故分布 f 与测度 μ 等同. 如果还能说明 $d\mu = f_0 dx$, 其中 $f_0 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 就能有 $f = f_0$ a.e., 进而 $f \in \mathcal{S}'$ 就能成为 L^1 函数了.

下面证明 μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 亦即对任意 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有 $|E| = 0 \Rightarrow \mu(E) = 0$, 这样一来就能通过 Radon-Nikodym 定理得到 f_0 . 由 Hardy 空间的定义知 $\sup_{t>0} |\Phi_t * f| \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 进而由 Lebesgue 积分的绝对连续性知对给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对 $\mathbb{R}^n$ 的任意可测子集 F 有

$$|F| < \delta \Rightarrow \int_F \sup_{t>0} |\Phi_t * f| dx < \varepsilon.$$

现取 E 满足 $|E| = 0$, 知存在开集 U 使得 $E \subset U$ 且 $|U| < \delta$. 设 $C_{00}(U)$ 是支在 U 上的衰减连续函数构成的空间, 则任意 $g \in C_{00}(U)$ 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} g d\mu \right| &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \int_{\mathbb{R}^n} g(x) (\Phi_{t_j} * f)(x) dx \right| \\ &\leq \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_U \sup_{t>0} |(\Phi_t * f)(x)| dx \\ &< \varepsilon \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

记 $|\mu|$ 是 μ 的绝对变差, 则

$$|\mu|(U) = \int_U 1 d|\mu| = \sup \left\{ \left| \int_{\mathbb{R}^n} g d\mu \right| : g \in C_{00}(U), \|g\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq 1 \right\},$$

这说明 $|\mu|(U) < \varepsilon$, 由 ε 的任意性即得 $|\mu|(E) = 0$, 因此 $\mu(E) = 0$, 这说明 μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 故存在 $f_0 \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 使得 $d\mu = f_0 dx$, 进而 $f = f_0$ a.e. 仿照推导(8.15)式的过程即得(8.13)式. $\square$

注 在说明 $H^1(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 后, 自然要问是否有 $H^1(\mathbb{R}^n) = L^1(\mathbb{R}^n)$. 下面我们说明对任意 $p \leq 1$ 而言, $L^p(\mathbb{R}^n)$ 都不会被 $H^p(\mathbb{R}^n)$ 包含. 取 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 知对 $|x| \geq 1$ 有

$$M^*(\chi_{B(0,1)}; \Phi) \geq (\chi_{B(0,1)} * \Phi_{|x|})(x) = \frac{1}{|x|^n} \int_{|y| \leq 1} e^{-\pi(\frac{|x-y|}{|x|})^2} dy \geq \nu_n \frac{e^{-4\pi}}{|x|^n},$$

其中最后一步是因为

$$\frac{|x-y|}{|x|} \leq \frac{|x|+|y|}{|x|} \leq \frac{|x|+1}{|x|} \leq 2.$$

因为函数 $|x|^{-n}$ 在 $B(0,1)^c$ 上对任意 $p \leq 1$ 都不是 p 阶可积的, 故 $\chi_{B(0,1)} \in L^p \setminus H^p$, 因此 H^1 是 L^1 的真子空间, 且对任意 $p < 1$ 而言 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 都不会被 $H^p(\mathbb{R}^n)$ 包含. 另一方面, 因为在 $p < 1$ 时 $H^p(\mathbb{R}^n)$ 中存在不为函数的分布, 故此时 $H^p(\mathbb{R}^n)$ 也不会被 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 包含.

下面说明 H^1 函数积分必定为零.

定理 8.4 (H^1 函数的积分消失性)

若 $g \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx = 0$.



证明 由定理 8.3(b) 知 $g \in H^1 \Rightarrow g \in L^1$, 因此 $\int_{\mathbb{R}^n} g dx$ 至少是良定义的. 记 $c = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx$, $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则函数族 $\{g_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ 实际上可以视作恒等逼近族, 由恒等逼近定理知对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 与任意 $t > 0$ 有

$$(\Phi_t * g_\varepsilon)(y) \rightarrow c \Phi_t(y), \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

因此

$$|c|\Phi_t(y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} |(\Phi_t * g_\varepsilon)(y)| = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon^n} \left| (\Phi_{t/\varepsilon} * g) \left(\frac{y}{\varepsilon} \right) \right|,$$

于是对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 与任意 $t > 0$ 有

$$|c| \sup_{t>0} \sup_{y:|y-x|<t} |\Phi_t(y)| \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon^n} \sup_{t>0} \sup_{y:|y-x|<t} \left| (\Phi_{t/\varepsilon} * g) \left(\frac{y}{\varepsilon} \right) \right|. \quad (8.17)$$

现在一方面对(8.17)右式有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup_{t>0} \sup_{y':|y'-\frac{x}{\varepsilon}|<t'} \frac{1}{\varepsilon^n} |(\Phi_{t'} * g)(y')| \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon^n} M^*(g; \Phi) \left(\frac{x}{\varepsilon} \right).$$

另一方面对(8.17)左式有

$$|c| \sup_{t>0} \sup_{y:|y-x|<t} |\Phi_t(y)| \geq |c| |\Phi_{|x|}(x)| = \frac{|c|e^{-\pi}}{|x|^n}.$$

如果 $c \neq 0$, 在(8.17)式两端取 L^1 范数并应用 Fatou 引理可知

$$|c| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-\pi} dx}{|x|^n} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} M^*(g; \Phi) \left(\frac{x}{\varepsilon} \right) \frac{dx}{\varepsilon^n} \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} M^*(g; \Phi) \left(\frac{x}{\varepsilon} \right) \frac{dx}{\varepsilon^n} = \|g\|_{H^1}.$$

上左式为 ∞ , 而 $\|g\|_{H^1} < \infty$, 矛盾! 故 $c = 0$. □

在本节末, 我们说明具有特定消失矩的 Schwartz 函数将会在 H^p 中.

定理 8.5

设 $0 < p \leq 1, N = [\frac{n}{p} - n]$, 则只要 $\mathbb{R}^n$ 的 Schwartz 函数 Ψ 满足对任意多重指标 $|\alpha| \leq N$ 均有 $\int_{\mathbb{R}^n} \Psi(x) x^\alpha dx = 0$, 就有 $\Psi \in H^p(\mathbb{R}^n)$. ♡

证明 我们将主要用到(8.10)式, 其中 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$.

若 $t < 1$ 且 $y \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|y - x| < t$, 则

$$2 + |y| \geq 2 + |x| - |x - y| \geq 2 + |x| - t \geq 1 + |x|,$$

因此(8.10)右式中的 $2 + |y|$ 在 $|y - x| < t$ 时能被替换为 $1 + |x|$, 于是由(8.10)式知

$$\sup_{0 < t < 1} \sup_{y:|y-x|<t} |(\Phi_t * \Psi)(y)| \leq \frac{C_M}{(1 + |x|)^M},$$

其中 M 充分大.

若 $t \geq 1$ 且 $y \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|y - x| < t$, 则

$$2 + t^{-1}|y| \geq 2 + t^{-1}|x| - t^{-1}|x - y| \geq 2 + t^{-1}|x| - 1 \geq 1 + t^{-1}|x|,$$

因此(8.10)右式中的 $2 + t^{-1}|y|$ 能被替换为 $1 + t^{-1}|x|$, 于是

$$\sup_{t \geq 1} \sup_{y:|y-x|<t} |(\Phi_t * \Psi)(y)| \leq \sup_{t \geq 1} \frac{C_M t^{-n-N-1}}{(1 + t^{-1}|x|)^M} \leq \begin{cases} C_M, & |x| \leq 1, \\ \frac{C_M}{|x|^{n+N+1}} \sup_{t>0} t^{\frac{s^{n+N+1}}{(1+s)^M}}, & |x| > 1. \end{cases}$$

其中最后一步中考虑了换元 $s = |x|/t$. 结合前述估计, 取 $M > n + N + 1$ 可得

$$M^*(\Psi; \Phi)(x) \leq \frac{C'_M}{(1 + |x|)^{n+N+1}}. \quad (8.18)$$

由 $N = [\frac{n}{p} - n]$ 可得 $p(n + N + 1) > n$, 因此(8.18)式表明 $M^*(\Psi; \Phi) \in L^p(\mathbb{R}^n)$. □

8.3 H^p 原子

前面说明了具有消失矩的 Schwartz 函数在 H^p 中. 回顾定理8.5的证明, 我们其实只用到了 Ψ 在无穷远处的衰减. 在 Ψ 紧支时, 这一条件自动成立, 这便诱导出了下述定义.

定义 8.3 (H^p 原子)

设 $0 < p \leq 1$, 函数 A 称为一个 H^p 原子^a, 如果其满足:

- (i) A 支在某各边平行于坐标轴的方体 Q 上.
- (ii) 对任意 $x \in Q$ 均有 $|A(x)| \leq |Q|^{-\frac{1}{p}}$.
- (iii) 对任意满足 $|\alpha| \leq [\frac{n}{p} - n]$ 的多重指标 α 有 $\int_Q A(x)x^\alpha dx = 0$.

^a又可称为 H^p 的 L^∞ 原子.



注 通过展开多项式可以说明上述条件 (iii) 等价于对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 与任意 $|\alpha| \leq [\frac{n}{p} - n]$ 均有 $\int_Q A(x)(x-x_0)^\alpha dx = 0$, 因此 H^p 原子在平移变换后依旧是 H^p 原子.

上述定义中, (iii) 称为消失矩性质, 在 $p = 1$ 时这一条件正是积分消失性. 条件 (ii) 仅为正规化而设置.

定理 8.6 (H^p 原子的 H^p 控制)

H^p 原子在 H^p 中. 准确来说, 存在仅依赖于 n, p 的常数 $C(n, p)$ 使得对任意 H^p 原子 A 均有 $\|A\|_{H^p} \leq C(n, p)$.



证明 因为 H^p 原子平移后依旧是 H^p 原子, 故只需对支在以原点为心的方体上的 H^p 原子证明命题即可. 现取定支在以原点为心的方体 Q 上的原子 A , 设 Q 的边长为 $l = l(Q)$, 定义 $\Psi(y) = l^{\frac{n}{p}} A(l y)$, 则 Ψ 是支在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^n$ 上的原子, 且

$$A(x) = l^{n-\frac{n}{p}} \frac{1}{l^n} \Psi\left(\frac{x}{l}\right) = l^{n-\frac{n}{p}} \Psi_l(x).$$

设 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则

$$\Phi_t * A = l^{n-\frac{n}{p}} (\Phi_t * \Psi_l).$$

由定义 8.3(ii) 知

$$|\Psi(y)| = l^{\frac{n}{p}} |A(l y)| \leq l^{\frac{n}{p}} |Q|^{-\frac{1}{p}} \chi_{\frac{1}{l}Q}(y) = \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^n}(y) \leq \frac{C_K}{(1+|y|)^K},$$

其中 $K > 0$ 任取, $C_K = (1 + \sqrt{n}/2)^K$. 现若 $t \leq l$, 则由定理 8.1 知对任意 $M > n$ 有

$$l^{n-\frac{n}{p}} |(\Phi_t * \Psi_l)(y)| \leq \frac{C_M l^{n-\frac{n}{p}} l^{-n}}{(2+l^{-1}|y|)^M} \leq \frac{C_M l^{-\frac{n}{p}}}{(1+l^{-1}|x|)^M}, \quad (8.19)$$

其中最后一步是取 x 满足 $|y-x| < t \leq l$.

现由定义 8.3(iii) 知函数 $\Psi(y) = l^{\frac{n}{p}} A(l y)$ 具有直到 $N = [\frac{n}{p} - n]$ 阶的消失矩. 当 $t > l$ 时, 由定理 8.2 知对 $|y-x| < t$ 与任意 $L > 0$ 有

$$|(\Phi_t * A)(y)| = l^{n-\frac{n}{p}} |(\Phi_t * \Psi_l)(y)| \leq \frac{C_L t^{-N} l^{n-\frac{n}{p}} (l/t)^{N+1}}{(2+t^{-1}|y|)^L} \leq \frac{C_L t^{-N-1-n} l^{n-\frac{n}{p}+N+1}}{(1+t^{-1}|x|)^L}, \quad (8.20)$$

其中最后一步是因为 $|y-x| < t$. 由此可得

$$\sup_{t>l} \sup_{y:|y-x|<t} |(\Phi_t * A)(y)| \leq C_L l^{-N-1-n} l^{n-\frac{n}{p}+N+1} = C_L l^{-\frac{n}{p}}. \quad (8.21)$$

另在 (8.20) 右式中换元 $s = |x|/t$ ($|x| \neq 0$) 可得

$$\sup_{t>l} \sup_{y:|y-x|<t} |(\Phi_t * A)(y)| \leq C_L l^{-\frac{n}{p}} \left(\frac{l}{|x|}\right)^{n+N+1} \sup_{s>0} \frac{s^{N+1+n}}{(1+s)^L}. \quad (8.22)$$

为使 (8.22) 右式中关于 s 的上确界有界, 取 $L > N+1+n$, 现结合 (8.21), (8.22) 两式可得

$$\sup_{t>l} \sup_{y:|y-x|<t} |(\Phi_t * A)(y)| \leq \frac{C'_L l^{-\frac{n}{p}}}{(1+l^{-1}|x|)^{n+N+1}}. \quad (8.23)$$

最后, 由 (8.19), (8.23) 两式可得

$$M^*(A; \Phi)(x) \leq \frac{C_M l^{-\frac{n}{p}}}{(1+l^{-1}|x|)^M} + \frac{C'_L l^{-\frac{n}{p}}}{(1+l^{-1}|x|)^{n+N+1}},$$

可以验证上右式函数的 L^p 拟范能被独立于 l 的常数控制, 而 M, L 的选取都可以只依赖于 n, N (因此会依赖于 n, p), 故 $M^*(A; \Phi)$ 的 L^p 拟范会被依赖于 n, p 的常数 $C(n, p)$ 控制. $\square$

例 8.2 每个积分为零的紧支有界函数 g 都在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中. 这是因为这种函数都支在某个大方体 Q 中, 且被 $c|Q|^{-1}$ 点态控制, 其中 $c = \|g\|_{L^\infty}|Q|$. 因此总存在 H^1 原子 A 使得 $g = cA$, 故 $g \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

在本节最后, 我们证明定理 8.6 的一个加强版本, 它适用于具有消失矩的无界函数.

我们从对 Gauss 核 $e^{-\pi|x|^2}$ 的一些观察入手. 通过直接计算可知函数 $t \mapsto e^{-\pi t^2}$ 的第 N 阶导数形如 $p_N(t)e^{-\pi t^2}$, 其中 p_N 是 N 阶多项式, 因此存在常数 B_N 使得

$$\left| \frac{d^N}{dt^N} e^{-\pi t^2} \right| \leq B_N (1 + |t|)^N e^{-\pi t^2}.$$

(通过分离变量) 把这一结果拓展到 n 维, 可知对满足 $|\beta| = N$ 的多重指标 $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ 而言有

$$\partial^\beta e^{-\pi|x|^2} = P_\beta(x) e^{-\pi|x|^2}, \quad (8.24)$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $P_\beta(x) = \prod_{j=1}^n p_{\beta_j}(x_j)$. 因此对任意满足 $|\beta| = N$ 的 β 而言, 总有

$$|\partial^\beta e^{-\pi|x|^2}| \leq B_N^N (1 + |x|)^N e^{-\pi|x|^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (8.25)$$

上述事实将在 H^p 拟范的计算中发挥作用.

定理 8.7 (L^q 函数的 H^p 控制)

设 $0 < p \leq 1, 1 < p \leq \infty$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ 支在方体 Q 中, 且对 $|\alpha| \leq [\frac{n}{p} - n]$ 有 $\int_Q g(x) x^\alpha dx = 0$. 则 $g \in H^p(\mathbb{R}^n)$, 且存在常数 $C_{n,p,q}$ 使得^a

$$\|g\|_{H^p} \leq C_{n,p,q} |Q|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|g\|_{L^q}.$$

^a规范化后的函数 $|Q|^{-\frac{1}{p} + \frac{1}{q}} g / \|g\|_{L^q}$ 称为 H^p 的 L^q 原子.

证明 因为 H^p 是平移不变的, 故可设 Q 以原点为心. 记 Q^* 是扩大 $2\sqrt{n}$ 倍的 Q , 另记 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 对这一 Φ 与 $x \in Q^*$ 应用 (8.12) 式可得

$$\|M^*(g; \Phi) \chi_{Q^*}\|_{L^p} \leq C \|M(g) \chi_{Q^*}\|_{L^p} \leq C |Q^*|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|M(g)\|_{L^q}, \quad (8.26)$$

其中最后一步是 Hölder 不等式. 由 M 的 L^q 有界性 (3.21) 可知

$$C |Q^*|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|M(g)\|_{L^q} \leq C |Q^*|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \frac{2q}{q-1} 3^{\frac{n}{q}} \|g\|_{L^q} \leq C' |Q|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|g\|_{L^q}. \quad (8.27)$$

下面着重讨论 $x \notin Q^*$ 的情况. 取定 y 满足 $|y - x| < t$, 注意到 g 具有直到 $N = [\frac{n}{p} - n]$ 阶的消失矩, 由 Taylor 展开可得

$$\begin{aligned} |(\Phi_t * g)(y)| &= \left| \frac{1}{t^n} \int_Q \left[\Phi\left(\frac{y-z}{t}\right) - \sum_{|\alpha| \leq N} \partial^\alpha \Phi\left(\frac{y}{t}\right) \frac{1}{\alpha!} \left(-\frac{z}{t}\right)^\alpha \right] g(z) dz \right| \\ &= \frac{N+1}{t^n} \left| \int_Q \left[\sum_{|\beta|=N+1} \int_0^1 (1-\theta)^N \partial^\beta \Phi\left(\frac{y}{t} - \theta \frac{z}{t}\right) \frac{1}{\beta!} \left(-\frac{z}{t}\right)^\beta d\theta \right] g(z) dz \right| \\ &\leq \frac{C_N B_{N+1}^n}{t^{n+N+1}} \int_Q \left[\int_0^1 (1-\theta)^N \left(1 + \left|\frac{y-\theta z}{t}\right|\right)^{N+1} e^{-\pi \left|\frac{y-\theta z}{t}\right|^2} d\theta \right] |z|^{N+1} |g(z)| dz. \end{aligned} \quad (8.28)$$

注意到 $x \notin Q^*$ 表明 $|x| \geq \sqrt{n}l$, 其中 $l = l(Q)$ 是 Q 的边长, 而 $z \in Q$ 表明 $|z| \leq \frac{1}{2}\sqrt{n}l$.

情况一: $|x| \geq 4t$. 此时有

$$|y - \theta z| \geq |y| - |z| \geq |x| - |x - y| - |z| \geq |x| - t - \frac{1}{2}\sqrt{n}l \geq \frac{|x|}{2} - t \geq \frac{|x|}{4},$$

且

$$|y - \theta z| \leq |y| + |z| \leq |x| + |y - x| + |z| \leq |x| + t + \frac{1}{2}\sqrt{n}l \leq |x| + \frac{|x|}{4} + \frac{|x|}{2} \leq 2|x|.$$

结合上述两个估计可得

$$\left(1 + \left|\frac{y - \theta z}{t}\right|\right)^{N+1} e^{-\pi \left|\frac{y - \theta z}{t}\right|^2} \leq \left(1 + \frac{2|x|}{t}\right)^{N+1} e^{-\pi \left(\frac{|x|}{4t}\right)^2}.$$

将上式代入(8.28)式可得

$$\begin{aligned} |(\Phi_t * g)(y)| &\leq \frac{C_N B_{N+1}^n}{t^{n+N+1}} \left(1 + \frac{2|x|}{t}\right)^{N+1} e^{-\pi \left(\frac{|x|}{4t}\right)^2} \int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \frac{C_N B_{N+1}^n}{(2|x|)^{n+N+1}} \left(1 + \frac{2|x|}{t}\right)^{2N+2+n} e^{-\pi \left(\frac{|x|}{4t}\right)^2} \int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \frac{C'_N B_{N+1}^n}{|x|^{n+N+1}} \int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz, \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $\left(\frac{2|x|}{t}\right)^{n+N+1} \leq \left(1 + \frac{2|x|}{t}\right)^{n+N+1}$; (B) 是因为函数 $s \mapsto (1 + 8s)^{2N+2+n} e^{-\pi s^2}$ 有界.

情况二: $|x| < 4t$. 此时(8.28)右式方括号中的函数关于 z 是有界的, 因此

$$|(\Phi_t * g)(y)| \leq \frac{C''_N}{t^{n+N+1}} \int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz \leq \frac{C''_N 4^{n+N+1}}{|x|^{n+N+1}} \int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz,$$

这便回到了情形一得到的结果.

因此结合情形一和情形二, 在 $x \notin Q^*$ 时有

$$M^*(g; \Phi)(x) = \sup_{t>0} \sup_{y: |y-x|<t} |(\Phi_t * g)(y)| \leq \frac{C'_{n,N}}{|x|^{n+N+1}} \int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz. \quad (8.29)$$

又因为

$$\int_Q |z|^{N+1} |g(z)| dz \leq c|Q|^{\frac{N+1}{n}} \int_Q |g(z)| dz \leq c|Q|^{\frac{N+1}{n}} |Q|^{\frac{1}{q'}} \|g\|_{L^q},$$

故对 $x \notin Q^*$ 有

$$M^*(g; \Phi)(x) \leq \frac{C'_{n,N}}{|x|^{n+N+1}} |Q|^{\frac{N+1}{n}} |Q|^{\frac{1}{q'}} \|g\|_{L^q}.$$

因为 $N = [\frac{n}{p} - n]$, 故 $p(n + N + 1) > n$, 于是 $|x|^{-(n+N+1)p}$ 在 $|x| \geq \sqrt{n}l(Q)$ 上可积, 该积分会产生因子 $|Q|^{-(1+\frac{N+1}{n})p+1}$, 从而

$$\left[\int_{(Q^*)^c} M^*(g; \Phi)^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \leq C_{n,p} |Q|^{-(1+\frac{N+1}{n})+\frac{1}{p}} |Q|^{\frac{N+1}{n}} |Q|^{\frac{1}{q'}} \|g\|_{L^q} = C_{n,p} |Q|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|g\|_{L^q}.$$

将上述估计与(8.26),(8.27)式结合即得欲证. $\square$

8.4 grand 极大函数

本节旨在说明 Hardy 空间的定义并不依赖于极大函数核 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 的选取. 在进入主题前, 我们先准备一个有用的引理.

引理 8.1

设 $m \in \mathbb{N}$, $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x) dx = 1$ (例如 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$), 则存在常数 $C_0(\Phi, m)$ 使得对任意函数 $\Psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 均存在 Schwartz 函数 $\Theta^{(s)} (0 \leq s \leq 1)$ 满足

$$\Psi(x) = \int_0^1 (\Theta^{(s)} * \Phi_s)(x) ds, \quad (8.30)$$

且

$$\frac{1}{s^m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^m) |\Theta^{(s)}(x)| dx \leq C_0(\Phi, m) \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|)^m \sum_{|\alpha| \leq m+1} |\partial^\alpha \Psi(x)| dx. \quad (8.31)$$

[LG3] 中上述引理的证明是构造性的, 且缺乏动机, 这里就省略证明了. 从引理8.1出发, 可以进一步推知存在

常数 $C'_0(\Phi, n)$ 使得

$$\frac{1}{s^m} \int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^m \left| s \frac{d}{ds} \Theta^{(s)}(x) \right| dx \leq C'_0(\Phi, m) \int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^m \sum_{|\alpha| \leq m+1} |\partial^\alpha \Psi(x)| dx. \quad (8.32)$$

在引理8.1中出现的形如范数的量

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^m \sum_{|\alpha| \leq m+1} |\partial^\alpha \Psi(x)| dx, \quad \Psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

在 Hardy 空间理论中十分重要. 在本节中, 我们就将用这个量说明 H^p 定义中的函数 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 能被换成其它积分非零的 Schwartz 函数.

定义 8.4 (grand 极大函数)

对取定的正整数 N 与 Schwartz 函数 φ , 定义

$$\mathfrak{N}_N(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^N \sum_{|\alpha| \leq N+1} |\partial^\alpha \varphi(x)| dx. \quad (8.33)$$

记

$$\mathcal{F}_N = \{\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) : \mathfrak{N}_N(\varphi) \leq 1\}. \quad (8.34)$$

在这些记号下, 定义 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ (关于 N) 的 grand 极大函数为

$$\mathcal{M}_N(f)(x) = \sup_{\varphi \in \mathcal{F}_N} M^*(f; \varphi)(x).$$



定理 8.8 (grand 极大函数的非切向极大函数控制)

取定 $0 < p < \infty$, $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x) dx \neq 0$, $N \in \mathbb{N}$, $N \geq [\frac{n}{p}] + 1$. 则存在常数 $C(n, p, \Phi)$ 使得对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\frac{1}{\mathfrak{N}_N(\Phi)} \|M^*(f; \Phi)\|_{L^p} \leq \|\mathcal{M}_N(f)\|_{L^p} \leq C(n, p, \Phi) \|M^*(f; \Phi)\|_{L^p}. \quad (8.35)$$



证明 (8.35)左式是显然的, 因为 Schwartz 函数 $\Phi/\mathfrak{N}_N(\Phi) \in \mathcal{F}_N$, 因此对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$M^*\left(f; \frac{\Phi}{\mathfrak{N}_N(\Phi)}\right) \leq \mathcal{M}_N(f).$$

设 $b > 0$, 在证明(8.35)右式的过程中, 需要引入下面的辅助极大函数:

$$M_b^{**}(f; \Phi)(x) = \sup_{t>0} \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \frac{|(\Phi_t * f)(x-y)|}{(1+t^{-1}|y|)^b}. \quad (8.36)$$

因为对任意 $t > 0$ 都有

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^n, |y| < t} |(\Phi_t * f)(x-y)| \leq \sup_{u \in \mathbb{R}^n} \frac{2^b}{(1+t^{-1}|y|)^b} |(\Phi_t * f)(x-y)|,$$

故

$$M^*(f; \Phi) \leq 2^b M_b^{**}(f; \Phi). \quad (8.37)$$

M_b^{**} 将要扮演的角色体现在下述两条断言中:

(i) 对任意 $b > \frac{n}{p}$ 与任意 $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 而言, 存在 $C_1(n, p, b) < \infty$ 使得对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|M_b^{**}(f; \Phi)\|_{L^p} \leq C_1(n, p, b) \|M^*(f; \Phi)\|_{L^p}. \quad (8.38)$$

(ii) 对任意 $b > 0$ 与任意 $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 而言, 只要 $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x) dx = 1$, 就存在常数 $C_2(b, \Phi) < \infty$ 使得在 $N \geq [b] + 1$ 时对任意 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|\mathcal{M}_N(f)\|_{L^p} \leq C_2(b, \Phi) \|M_b^{**}(f; \Phi)\|_{L^p}. \quad (8.39)$$

下面我们来证明上述两条断言. 由定义式

$$M^*(f; \Phi)(z) = \sup_{t>0} \sup_{|w-z|<t} |(\Phi_t * f)(w)|$$

知

$$|(\Phi_t * f)(x-y)| \leq M^*(f; \Phi)(z), \quad \forall z \in B(x-y, t).$$

又因为 $B(x-y, t) \subset B(x, |y|+t)$, 故

$$\begin{aligned} |(\Phi_t * f)(x-y)|^{\frac{n}{b}} &\leq \frac{1}{|B(x-y, t)|} \int_{B(x-y, t)} M^*(f; \Phi)(z)^{\frac{n}{b}} dz \\ &\leq \frac{1}{|B(x-y, t)|} \int_{B(x, |y|+t)} M^*(f; \Phi)(z)^{\frac{n}{b}} dz \\ &\leq \left(\frac{|y|+t}{t} \right)^n M(M^*(f; \Phi)^{\frac{n}{b}})(x), \end{aligned}$$

因此对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$M_b^{**}(f; \Phi)(x) \leq [M(M^*(f; \Phi)^{\frac{n}{b}})(x)]^{\frac{b}{n}}.$$

对上式两端取 p 次幂, 考虑 $p > \frac{n}{b}$ 与 Hardy-Littlewood 极大算子 M 在 $L^{\frac{pb}{n}}$ 上的有界性即得(8.38)式.

为证 (ii), 我们把 b 换成整数 $b_0 = [b] + 1$. 设 Φ 是积分为 1 的 Schwartz 函数. 在引理 8.1 中取 $m = b_0$, 知任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 都能写成

$$\varphi(y) = \int_0^1 (\Theta^{(s)} * \Phi_s)(y) ds,$$

其中 $\Theta^{(s)}$ 是某个 Schwartz 函数. 则对任意 $t > 0$ 有

$$\varphi_t(y) = \int_0^1 ((\Theta^{(s)})_t * \Phi_{ts})(y) ds.$$

现对 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们断言

$$\varphi_t * f = \int_0^1 (\Theta^{(s)})_t * \Phi_{ts} * f ds, \quad (8.40)$$

因为 Schwartz 函数和缓增分布的卷积是 C^∞ 函数, 故上右式必绝对收敛. 我们将在断言证明的末尾证明上式.

在(8.40)式成立后, 对取定的 $x \in \mathbb{R}^n$ 与 $y \in B(x, t)$ 知

$$\begin{aligned} |(\varphi_t * f)(y)| &\leq \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} |(\Theta^{(s)})_t(z)| |(\Phi_{ts} * f)(y-z)| dz ds \\ &\leq \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} |(\Theta^{(s)})_t(z)| M_{b_0}^{**}(f; \Phi)(x) \left(\frac{|x-(y-z)|}{st} + 1 \right)^{b_0} dz ds \\ &\leq \int_0^1 s^{-b_0} \int_{\mathbb{R}^n} |(\Theta^{(s)})_t(z)| M_{b_0}^{**}(f; \Phi)(x) \left(\frac{|x-y|}{t} + \frac{|z|}{t} + 1 \right)^{b_0} dz ds \\ &\leq 2^{b_0} M_{b_0}^{**}(f; \Phi)(x) \int_0^1 s^{-b_0} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(w)| (|w|+1)^{b_0} dw ds \\ &\leq 2^{b_0} M_{b_0}^{**}(f; \Phi)(x) \int_0^1 s^{-b_0} C_0(\Phi, b_0) s^{b_0} \mathfrak{N}_{b_0}(\varphi) ds, \end{aligned}$$

其中最后一步是引理 8.1. 取 $N = b_0 = [b] + 1$, 由上式可知对 $y \in B(x, t)$ 与 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$|(\varphi_t * f)(y)| \leq 2^{b_0} C_0(\Phi, b_0) \mathfrak{N}_{b_0}(\varphi) M_{b_0}^{**}(f; \Phi)(x).$$

在上式两端对 $y \in B(x, t)$ 取上确界, 再对 $t > 0$ 取上确界, 最后对 $\varphi \in \mathcal{F}_N$ 取上确界可得点态估计

$$\mathcal{M}_N(f)(x) \leq 2^{b_0} C_0(\Phi, b_0) M_{b_0}^{**}(f; \Phi)(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $N = b_0$. 取 $C_2 = 2^{b_0} C_0(\Phi, b_0)$ 即得(8.39)式.

现在来证明(8.40)式. 设

$$H(s, x) = (\Theta^{(s)} * \Phi_s)(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

注意到 $((\Theta^{(s)})_t * \Phi_{ts})(x) = t^{-n} H(s, x/t)$. 为证明(8.40)式, 只需证明 $\int_0^1 H(s, x/t) ds$ 对应的部分和在 Schwartz 函数的拓扑下收敛到该积分即可. 也就是说, 若 $s_i = \frac{i}{N} (i = 1, 2, \dots, N)$, 则需要证明对取定的 $t > 0$ 有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| \sum_{i=1}^N \int_{s_{i-1}}^{s_i} \left[x^\alpha \partial_x^\beta H \left(s_{i-1}, \frac{x}{t} \right) - x^\alpha \partial_x^\beta H \left(u, \frac{x}{t} \right) \right] du \right| \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty, \forall \alpha, \beta. \quad (8.41)$$

根据微积分基本定理, 可将(8.41)式中的上确界写成

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| \sum_{i=1}^N \int_{s_{i-1}}^{s_i} \left[\int_{s_{i-1}}^u x^\alpha \partial_x^\beta \frac{d}{ds} H \left(s, \frac{x}{t} \right) ds \right] du \right|,$$

显见点态估计:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| \sum_{i=1}^N \int_{s_{i-1}}^{s_i} \left[\int_{s_{i-1}}^u x^\alpha \partial_x^\beta \frac{d}{ds} H \left(s, \frac{x}{t} \right) ds \right] du \right| \leq \frac{1}{N} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_0^1 \left| x^\alpha \partial_x^\beta \frac{d}{ds} H \left(s, \frac{x}{t} \right) \right| ds.$$

代入 H 的表达式知上右式能写成

$$\frac{t^{|\alpha|}}{t^{|\beta|} N} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_0^1 \left[\left(\frac{x}{t} \right)^\alpha \left(\frac{d}{ds} \Theta^{(s)} * \frac{(\partial_x^\beta \Phi)_s}{s^{|\beta|}} + \Theta^{(s)} * \frac{d}{ds} \frac{(\partial_x^\beta \Phi)_s}{s^{|\beta|}} \right) \left(\frac{x}{t} \right) \right] ds. \quad (8.42)$$

(8.42)式中中括号内的量具有下述控制:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x}{t} \right)^\alpha \left(\frac{d}{ds} \Theta^{(s)} * \frac{(\partial_x^\beta \Phi)_s}{s^{|\beta|}} + \Theta^{(s)} * \frac{d}{ds} \frac{(\partial_x^\beta \Phi)_s}{s^{|\beta|}} \right) \left(\frac{x}{t} \right) \\ & \leq \frac{2^{|\alpha|-1}}{s^{|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{d}{ds} \Theta^{(s)}(y) \right| |y|^{|\alpha|} \left| (\partial_x^\beta \Phi)_s \left(\frac{x}{t} - y \right) \right| dy \\ & \quad + \frac{2^{|\alpha|-1}}{s^{|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{d}{ds} \Theta^{(s)}(y) \right| \left| \frac{x}{t} - y \right|^{|\alpha|} \left| (\partial_x^\beta \Phi)_s \left(\frac{x}{t} - y \right) \right| dy \\ & \quad + \frac{2^{|\alpha|-1}}{s^{|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| |y|^{|\alpha|} \left| \frac{d}{ds} (\partial_x^\beta \Phi)_s \left(\frac{x}{t} - y \right) \right| dy \\ & \quad + \frac{|\beta| 2^{|\alpha|-1}}{s^{|\beta|+1}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| |y|^\alpha \left| (\partial_x^\beta \Phi)_s \left(\frac{x}{t} - y \right) \right| dy \\ & \quad + \frac{2^{|\alpha|-1}}{s^{|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| \left| \frac{x}{t} - y \right|^{|\alpha|} \left| \frac{d}{ds} (\partial_x^\beta \Phi)_s \left(\frac{x}{t} - y \right) \right| dy \\ & \quad + \frac{|\beta| 2^{|\alpha|-1}}{s^{|\beta|+1}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| \left| \frac{x}{t} - y \right|^{|\alpha|} \left| (\partial_x^\beta \Phi)_s \left(\frac{x}{t} - y \right) \right| dy \\ & \leq \frac{C}{s^{n+|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{d}{ds} \Theta^{(s)}(y) \right| (1 + |y|)^m dy \\ & \quad + \frac{Cs^{|\alpha|}}{s^{n+|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{d}{ds} \Theta^{(s)}(y) \right| dy \\ & \quad + \frac{C}{s^{n+1+|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| (1 + |y|)^m dy \\ & \quad + \frac{C}{s^{n+1+|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| (1 + |y|)^m dy \\ & \quad + \frac{Cs^{|\alpha|}}{s^{n+1+|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| dy \\ & \quad + \frac{Cs^{|\alpha|}}{s^{n+1+|\beta|}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Theta^{(s)}(y)| dy, \end{aligned}$$

其中 $m \geq |\alpha|$, C 是依赖于 $\Phi, \alpha, \beta, m, n$ 的常数. 回忆(8.31), (8.32)两式, 分别在这两式中取 $m \geq |\beta| + n + 2$ 与 $m \geq |\alpha|$ 可知上右式有界, 因此(8.42)式中的积分收敛, 于是 $N \rightarrow \infty$ 时(8.42)式趋零, 此即(8.40)式.

由断言 (i), (ii) 立得结论. $\square$

8.5 开集的 Whitney 分解

记 $l(Q)$ 为方体 Q 的边长. 本节我们将 $\mathbb{R}^n$ 的真开子集 Ω 分解为二进方体之并, 其中每个方体的边长与该方体到 $\partial\Omega$ 的距离是可比较的.

和前文一致, 记 $\mathcal{D}_k$ 是形如

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : m_j 2^{-k} \leq x_j < (m_j + 1) 2^{-k}\}$$

的全体二进方体构成的集族, 其中 $m_j \in \mathbb{Z}$. 通过边长减半, 可以将 $\mathcal{D}_k$ 中的每个方体写成 $\mathcal{D}_{k+1}$ 中 2^n 个方体之并. 记 $\mathcal{D} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{D}_k$ 为全体二进方体构成的集族.

定义 8.5

称 $\mathbb{R}^n$ 中的两个二进方体是相邻的, 如果它们本身不交, 但它们的边界交集非空 (这一交集可以是某点, 某条边, 或至多 $n-1$ 维的面).



定理 8.9 (Whitney 分解)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空开真子集, 则存在不交二进方体族 $\mathcal{F} = \{Q_j\}_j$ 使得

(i) $\bigcup_j Q_j = \Omega$.

(ii) 对任意 $Q_j \in \mathcal{F}$ 均有

$$\sqrt{n}l(Q_j) \leq \text{dist}(\overline{Q_j}, \Omega^c) \leq 4\sqrt{n}l(Q_j).$$

因此存在 $\xi_j \in \Omega^c$ 使得 ξ_j 到 Q_j 中心的距离不超过 $\frac{9}{2}\sqrt{n}l(Q_j)$.

(iii) 若方体 Q_j, Q_k 相邻, 则

$$\frac{1}{4} \leq \frac{l(Q_j)}{l(Q_k)} \leq 4.$$

(iv) 对给定的 $Q_j \in \mathcal{F}$ 而言, 至多存在 $6^n - 4^n$ 个方体 $Q_k \in \mathcal{F}$ 与之相邻.

(v) 设 $0 < \varepsilon < \frac{2}{5}$, 若 Q_j^* 是与 Q_j 同心, 边长满足 $l(Q_j^*) = (1 + \varepsilon)l(Q_j)$ 的方体, 则只要 $Q_j, Q_i \in \mathcal{F}$ 是不交且不相邻的方体, Q_j^*, Q_i^* 也就不交. 另外, 全体 Q_j^* 都在 Ω 内, 且

$$\chi_\Omega \leq \sum_j \chi_{Q_j^*} \leq 2^n \chi_\Omega.$$



证明 记 Ω 为 $\Omega_k (k \in \mathbb{Z})$ 之并, 其中

$$\Omega_k = \{x \in \Omega : 2\sqrt{n}2^{-k} < \text{dist}(x, \Omega^c) \leq 4\sqrt{n}2^{-k}\}.$$

记

$$\mathcal{G} = \{Q \in \mathcal{D} : \exists k \in \mathbb{Z} (Q \in \mathcal{D}_k, Q \cap \Omega_k \neq \emptyset)\}.$$

下面说明 $\mathcal{G}$ 满足性质 (ii). 设存在 k 使得 $Q \in \mathcal{G} \cap \mathcal{D}_k$, 取 $x \in \Omega_k \cap Q$. 根据 Ω_k 的构造知

$$\sqrt{n}2^{-k} \leq \text{dist}(x, \Omega^c) - \sqrt{n}l(Q) \leq \text{dist}(Q, \Omega^c) \leq \text{dist}(x, \Omega^c) \leq 4\sqrt{n}2^{-k},$$

因此集族 $\mathcal{G}$ 满足 (ii) 的第一条结论. 现对给定的 $Q \in \mathcal{G}$ 知总存在点 $\xi \in \Omega^c$ 使得 $\text{dist}(\xi, Q) \leq 4\sqrt{n}l(Q)$, 于是 ξ 离 Q 中心的距离至多为

$$4\sqrt{n}l(Q) + \frac{\sqrt{n}}{2}l(Q),$$

这说明 $\mathcal{G}$ 也满足 (ii) 的第二条结论.

由已经成立的 (ii) 知每个在 $\mathcal{G}$ 中的 Q 都与 Ω^c 之间距离为正, 故这样的 Q 都在 Ω 内, 因此 $\bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q \subset \Omega$. 现对任意 $x \in \Omega$ 知存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $x \in \Omega_k$, 又因为总存在方体 $Q_x \in \mathcal{D}_k$ 使得 $x \in Q_x$, 故 $Q_x \cap \Omega_k \neq \emptyset$, 于是 $Q_x \in \mathcal{G}$,

进而 $x \in \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$. 这说明 $\Omega \subset \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$, 结合前述结论可得

$$\Omega = \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q.$$

但我们并不能从 $\mathcal{G}$ 的上述性质推出 $\mathcal{G}$ 满足 (i), 这是因为前面定义的 $\mathcal{G}$ 是不同尺度的二进方体所构成的, 因此 $\mathcal{G}$ 中的元素未必两两不交. 为了解决这个问题, 我们要把 $\mathcal{G}$ 中被某个二进方体包含的那些小二进方体都去掉¹. 因为两个二进方体之间要么有不交内部, 要么一个完全包含在另一个里面, 故对 $\mathcal{G}$ 中的每个方体 Q , 总可以找到 $\mathcal{G}$ 中包含它的唯一最大二进方体 Q^{max} . 根据最大性, 不同的最大二进方体之间必定不交.

现取 $\mathcal{F} = \{Q^{max} : Q \in \mathcal{G}\}$, 方体族 $\{Q_j\}_j = \mathcal{F}$ 就能满足 (i), (ii). 下面我们证明 $\mathcal{F}$ 满足 (iii). 观察到如果 $\mathcal{F}$ 中的两个方体 Q_j, Q_k 相邻, 则

$$\sqrt{n}l(Q_j) \leq \text{dist}(Q_j, \Omega^c) \leq \text{dist}(Q_j, Q_k) + \text{dist}(Q_k, \Omega^c) \leq 0 + 4\sqrt{n}l(Q_k).$$

此即 $\frac{l(Q_j)}{l(Q_k)} \leq 4$, 交换上述过程中的 Q_j, Q_k 即得 $\frac{l(Q_k)}{l(Q_j)} \leq 4$, (iii) 至此即证.

为证明 (iv), 注意到与取定方体 $Q_k \in \mathcal{D}_k \cap \mathcal{F}$ 相邻的方体数最大时, 这些相邻方体的边长会尽可能小, 由 (iii) 可知这些相邻方体都将在 $\mathcal{D}_{k+2}$ 中. 因为 $\frac{6}{4}Q_j$ 包含 6^n 个边长为 2^{-k-2} 的子方体, Q_j 自身包含 4^n 个这样的子方体, 故 $\frac{6}{4}Q_j$ 中在 Q_j 之外的 $6^n - 4^n$ 个子方体必与 Q_j 相邻, 此即 (iv).

对于性质 (v), 我们首先说明只要 $Q_j, Q_i \in \mathcal{F}$ 不相邻, 那么 Q_j^*, Q_i^* 也不会相邻. 不失一般性设 $l(Q_j) \geq l(Q_i)$. 若 $l(Q_j) = l(Q_i)$, 则 Q_j, Q_i 之间的距离至少为 $l(Q_j)$, 因此 Q_j^*, Q_i^* 当然不相邻. 另若 $l(Q_j) = 2l(Q_i)$, 则 $\frac{7}{5}Q_j, \frac{7}{5}Q_i$ 不相邻, 进而 Q_j^*, Q_i^* 同样不相邻. 最后, 若 $l(Q_j) = 4l(Q_i)$, 因为

$$\frac{1}{5}l(Q_j) + \frac{1}{5}l(Q_i) = l(Q_i) \leq \text{dist}(Q_i, Q_j),$$

故在最极端的情况下不交方体 $\frac{7}{5}Q_j, \frac{7}{5}Q_i$ 将有重合边界, 因此只要 $\varepsilon < \frac{2}{5}$, Q_j^*, Q_i^* 就依旧不相邻. 由 (iv) 知要想 Q_j, Q_i 不相邻, 必定有 $l(Q_j) < 4l(Q_i)$, 故前述论证已经将可能的情况讨论完了.

下一步我们断言只要 $\varepsilon < \frac{2}{5}$, 那么每个 $Q_j^* = (1 + \varepsilon)Q_j$ 都将在 Ω 内. 为此注意到 Q_j^* 能被 Q_j 及其全体相邻方体之并包含, 这是因为 Q_j^* 超出 Q_j 的 $\frac{1}{5}l(Q_j)$ 比 Q_j 的任意相邻方体的边长都小, 后者依照 (iv) 至少是 $\frac{1}{4}l(Q_j)$. 又因为 $\frac{1}{4}l(Q_j) \leq \sqrt{n}l(Q_j) \leq \text{dist}(\overline{Q_j}, \Omega^c)$, 故总能在 $\mathcal{F}$ 中找到 Q_j 的一组 (将 Q_j 与外界可能相邻的所有部分隔绝的) 相邻方体, 使得 Q_j 与这些相邻方体之并依旧在 Ω 内. 因此 $Q^* \subset \Omega$.

对于 (v) 中不等式的左式, 由 $Q_j \subset Q_j^*$ 与 $\bigcup_j Q_j = \Omega^*$ 即证. 对于该不等式右式, 回忆若 Q_j^*, Q_i^* 在 $i \neq j$ 时相交, 则 Q_j, Q_i 必相邻, 而 $\sum_j \chi_{Q_j^*}$ 可能取到的最大值不会超过同时相邻的 Q_i^* 的最大个数, 因此我们需要找到最多能有多少个二进方体 Q_j 同时相邻. 显见这个最大数是 2^n (此时所有相邻二进方体共享一个顶点), 这便证明了不等式右式. $\square$

定义 8.6

Whitney 分解定理 8.9 中得到的方体 Q_j 称为 Ω 的 Whitney 方体.



例 8.3 设在 Whitney 分解中要分解的开集 $\Omega = (0, 1)$, 则二进区间 $[\frac{1}{4}, \frac{2}{4}), [\frac{2}{4}, \frac{3}{4})$ 与 Ω^c 的距离正好是它们自身的长度, 这两个区间同时也是 Ω 与 Ω^c 的距离至少为自身长度的最大二进区间. 下一代具有同样性质的二进区间为 $[\frac{1}{8}, \frac{2}{8}), [\frac{6}{8}, \frac{7}{8})$, 再下一代是 $[\frac{1}{16}, \frac{2}{16}), [\frac{14}{16}, \frac{15}{16})$, 依此类推. 这些二进区间就构成了 $(0, 1)$ 的一个 Whitney 分解.

注 设 Ω, Ω' 是满足 $\Omega \subset \Omega' \subsetneq \mathbb{R}^n$ 的飞控开机, 则 Ω 的每个 Whitney 方体都会被 Ω' 的某个 Whitney 方体包含.

为证明这一段眼, 定义 $\mathcal{G}', \mathcal{F}'$ 是 Ω' 中分别类似于 Ω 中 $\mathcal{G}, \mathcal{F}$ 的集族. 对 $k \in \mathbb{Z}$, 类似定义 Ω'_k , 下面说明

$$\Omega_k \subset \bigcup_{l \leq k} \Omega'_l. \quad (8.43)$$

事实上, 取 $x \in \Omega_k (k \in \mathbb{Z})$, 则 $-k$ 是满足 $2^{-k} \leq \frac{2}{\sqrt{n}} \text{dist}(x, \Omega^c)$ 的最大整数. 因为 $\text{dist}(x, \Omega^c) \leq \text{dist}(x, (\Omega')^c)$, 故使得 $2^{-l} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \text{dist}(x, (\Omega')^c)$ 的最大整数 $-l$ 必满足 $-l \geq -k$, 因此存在 $l \leq k$ 使得 $x \in \Omega'_l$. (8.43) 式至此得证.

现设 $Q \in \mathcal{F}$, 则 $Q \in \mathcal{G}$, 进而存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $Q \in \mathcal{D}_k$ 且 $Q \cap \Omega_k \neq \emptyset$. 由 (8.43) 式知存在 $l \leq k$ 使得

¹ 这里的策略采用去小留大而非去大留小是因为 $\mathcal{G}$ 中二进方体肯定不能太大 (不然与 Ω_k 的定义冲突), 但 $\mathcal{G}$ 中的二进方体可以很小, 因此如果考虑的是去掉大的二进方体而保留小的二进方体, 可能出现找不到最小二进方体的情况. 这也是后面 Q^{max} 总能取到的原因.

$Q \cap \Omega'_l \neq \emptyset$. 取 Q 的一个边长为 2^{-l} 的前代 Q' , 知 $Q' \in \mathcal{D}_l$, $Q \cap \Omega'_l \neq \emptyset$. 因此 $Q' \in \mathcal{G}'$, 于是它被 $\mathcal{F}'$ 中的某个方体 Q'' 囊括. 至此即知 Ω 的每个 Whitney 方体都会被 Ω' 的某个 Whitney 方体 Q'' 包含.

下面我们给出基于 Whitney 分解的一个光滑单位分解.

引理 8.2 (Whitney 单位分解)

设 $\{Q_j\}_j$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空真开子集 Ω 的 Whitney 分解, 则存在 C^∞ 函数族 $\{\varphi_j\}_j$ 使得

- (i) 对任意 j 均有 $0 \leq \varphi_j \leq 1$.
- (ii) $\text{supp } \varphi_j \subset \frac{9}{8}Q_j$, 其中 $\frac{9}{8}Q_j$ 表示与 Q_j 同心, 边长为 $\frac{9}{8}l(Q_j)$ 的方体.
- (iii) 对任意多重指标 α , 存在 $C_\alpha > 0$ 使得对任意 j 均有

$$|\partial^\alpha \varphi_j| \leq \frac{C_\alpha}{l(Q_j)^{|\alpha|}}.$$

- (iv) 对任意 j 有

$$\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_j(y) dy \leq \left(\frac{9}{8}\right)^n.$$

- (v) 函数族 $\{\varphi_j\}_j$ 构成 Ω 的一个单位分解, 即

$$\sum_j \varphi_j = \chi_\Omega.$$

- (vi) 对任意多重指标 α , 存在常数 B_α 使得对任意 i, j 有

$$|\partial^\alpha (\varphi_i \varphi_j)| \leq \frac{B_\alpha}{l(Q_j)^{|\alpha|+n}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i(y) \varphi_j(y) dy.$$



证明 我们从 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数 ω 入手:

$$\omega(t) = \begin{cases} 0, & |t| \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{16}, \\ 1, & |t| \leq \frac{1}{2}, \\ \text{严格递减}, & t \in (\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{16}). \end{cases} \quad (8.44)$$

取实轴上的二进区间 I , 用函数

$$\phi_I(t) = \omega\left(\frac{t - c_I}{|I|}\right) \quad (8.45)$$

将 ω 取 1 的范围拉到 I 上, 其中 c_I 是 I 的中心. 根据这一构造知对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均存在常数 C_k 使得

$$|\phi_I^{(k)}| \leq C_k |I|^{-k}. \quad (8.46)$$

其中 $f^{(k)}$ 对应 k 阶导数, 取 $C_k = \|\omega^{(k)}\|_{L^\infty}$ 即可. 现在将 ϕ_I 的定义拓展到高维: 对二进方体 $Q = I_1 \times \cdots \times I_n$ 定义

$$\Phi_Q(x_1, \dots, x_n) = \phi_{I_1}(x_1) \cdots \phi_{I_n}(x_n). \quad (8.47)$$

由(8.46)式知, 对任意多重指标 γ 而言, 存在常数 c_γ 使得

$$|\partial^\gamma \Phi_Q| \leq c_\gamma l(Q)^{-|\gamma|}. \quad (8.48)$$

设 $\{Q_j\}_j$ 是开集 Ω 的 Whitney 分解, 考虑依照(8.47)式在 Q_j 上取 1 的函数 Φ_{Q_j} . 注意到 $Q_j^* = \frac{9}{8}Q_j$ 满足 $\Phi_{Q_j} \leq \chi_{Q_j^*}$, 且由 Whitney 分解 8.9(v) 知

$$\chi_\Omega \leq \sum_j \Phi_{Q_j} \leq 2^n \chi_\Omega. \quad (8.49)$$

到这里我们还不能说 $\{\Phi_{Q_j}\}_j$ 是 Ω 的单位分解, 不过它已经相当靠近了. 为从该函数族中得到一个单位分解, 定义

$$\varphi_j = \begin{cases} \Phi_{Q_j} (\sum_s \Phi_{Q_s})^{-1}, & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \Omega^c. \end{cases} \quad (8.50)$$

直接观察即知 φ 满足 (i), (ii), (v).

为证 (iii), 我们需要用到 Faà di Bruno 公式, 即对多重指标 γ 而言有

$$\frac{1}{\gamma!} \partial^\gamma \frac{1}{\sum_s \Phi_{Q_s}} = \sum_{\substack{(m_1, \dots, m_k) \\ (\beta_1, \dots, \beta_k)}} \frac{(-1)^{m_1 + \dots + m_k} (m_1 + \dots + m_k)!}{(\sum_s \Phi_{Q_s})^{m_1 + \dots + m_k + 1}} \frac{(\frac{1}{\beta_1!} \partial^{\beta_1} \sum_s \Phi_{Q_s})^{m_1}}{m_1!} \dots \frac{(\frac{1}{\beta_k!} \partial^{\beta_k} \sum_s \Phi_{Q_s})^{m_k}}{m_k!},$$

其中和式对全体满足 $\gamma = m_1 \beta_1 + \dots + m_k \beta_k$ 的 $(m_1, \dots, m_k)$ 与 $(\beta_1, \dots, \beta_k)$ ($m_1, \dots, m_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{N}$) 做的. 对取定的在某 Whitney 方体 Q_r 中的 x , 若 Q_s 不等于 Q_r 也不与 Q_r 相邻, 则 Φ_{Q_s} 总会在 x 附近趋零. 因此只要 $\Phi_{Q_s}(x) \neq 0$, Q_s 与 Q_r 就必定是可比较的 (即 8.9(iv)). 在这种观察下, 由前述等式知

$$\left| \partial^\gamma \frac{1}{\sum_s \Phi_{Q_s}}(x) \right| \leq C'_\gamma \sum_{\substack{(m_1, \dots, m_k) \\ (\beta_1, \dots, \beta_k)}} \frac{1}{l(Q_r)^{m_1 |\beta_1|}} \dots \frac{1}{l(Q_r)^{m_k |\beta_k|}} \leq \frac{C''_\gamma}{l(Q_r)^{|\gamma|}}. \quad (8.51)$$

对 (8.50) 式中的函数应用 Leibniz 公式, 代入 (8.51), (8.48) 式知 $x \in Q_r$ 时有

$$|\partial^\alpha \varphi_j(x)| \leq \sum_{\gamma \leq \alpha} C'_\alpha \left| \partial^\gamma \frac{1}{\sum_s \Phi_{Q_s}}(x) \right| |\partial^{\alpha-\gamma} \Phi_{Q_j}| \leq \sum_{\gamma \leq \alpha} C'_\alpha \frac{C'_\gamma}{l(Q_r)^{|\gamma|}} \frac{c_{\alpha-\gamma}}{l(Q_j)^{|\alpha|-|\gamma|}}.$$

另注意到如果 φ_j 在 x 附近非零, 则 Q_j 要么就是 Q_j , 要么与 Q_j 相邻, 于是 $l(Q_r) \approx l(Q_j)$, 这便证明了 (iii).

下面证明 (iv). 根据 Φ 的构造可知

$$1 \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_{Q_j}(y) dy = \prod_{m=1}^n \frac{1}{l(Q_j)} \int_{\mathbb{R}^n} \omega\left(\frac{y_m - (c_{Q_j})_m}{l(Q_j)}\right) dy_m \leq \left(\frac{9}{8}\right)^n,$$

其中 c_{Q_j} 是 Q_j 的中心. 结合上式与 (8.49) 式即得 (iv).

为证 (vi), 注意到 $\varphi_i \varphi_j \equiv 0$ 时结论是平凡的, 故我们只考虑 $\varphi_i \varphi_j$ 不恒为零的情况. 此时它们对应的方体 Q_i, Q_j 要么重合, 要么相邻, 因此这两个方体必定有可比较的边长. 不妨设 $|Q_i| \geq |Q_j|$, 对给定的多重指标 α , 应用 Leibniz 法则与 (iii) 中给出的估计可知

$$|\partial^\alpha (\varphi_i \varphi_j)| \leq \sum_{\beta \leq \alpha} C'_\alpha \frac{C_{[\beta]}}{l(Q_i)^{|\beta|}} \frac{C_{\alpha-\beta}}{l(Q_j)^{|\alpha|-|\beta|}} \leq \frac{B'_\alpha}{l(Q_j)^{|\alpha|}}. \quad (8.52)$$

现在只要证明了存在常数 $B'' > 0$ 使得

$$\frac{1}{l(Q_j)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i(y) \varphi_j(y) dy \geq B'', \quad (8.53)$$

结合 (8.52), (8.53) 两式并令 $B_\alpha = \frac{B'_\alpha}{B''}$ 即得 (vi). (8.53) 式的证明包含在下一条引理的 (c) 中. $\square$

在下面的引理中, φ_j 的设置与单位分解 8.2 相同, ϕ_I, Φ_Q 分别依照 (8.45), (8.47) 两式定义.

引理 8.3

(a) 存在常数 B 使得对任意两个二进区间 I, J 而言, 只要 $l(J) \leq 4l(I)$, 且 $\phi_I \phi_J$ 不恒为零, 就有

$$\frac{1}{|J|} \int_{\mathbb{R}} \phi_I(t) \phi_J(t) dt \geq B. \quad (8.54)$$

(b) 存在依赖于维数的常数 B' 使得对任意两个二进方体 Q, R 而言, 只要 $l(R) \leq 4l(Q)$, 且 $\Phi_Q \Phi_R$ 不恒为零, 就有

$$\frac{1}{|R|} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_Q(y) \Phi_R(y) dy \geq B'. \quad (8.55)$$

(c) 设 Q_i 是某开集的 Whitney 方体, Q_j 是另一开集的 Whitney 方体, 且 $l(Q_j) \leq 4l(Q_i)$, 则只要 $\varphi_i \varphi_j$ 不恒为零, 就有

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_i(y) \varphi_j(y) dy \geq B'' = 2^{-2n} B'. \quad (8.56)$$

证明 (a) 通过平移变换, 不妨设 $J = [0, 2^m]$, $m \in \mathbb{Z}$, 再通过伸缩变换不妨设 $J = [0, 1]$, I 是长度至少为 $\frac{1}{4}$ 的二进区间. 因为 $\phi_I \phi_J$ 不恒为零, 故 $\frac{9}{8}I \cap \frac{9}{8}J \neq \emptyset$, 故要么 $I \subset J$, 要么 I 与 J 相邻, 要么 $I \supset J$. 这说明 I 只可能取:

$$\begin{aligned} &[-1/4, 0], [0, 1/4], [1/4, 2/4], [2/4, 3/4], [3/4, 1], [1, 5/4], \\ &[-1/2, 0], [0, 1/2], [1/2, 1], [1, 3/2], \end{aligned}$$

$$[-1, 0), [0, 1), [1, 2), \\ [-2^k, 0), [0, 2^k),$$

其中 $k \geq 1$. 因此只需说明上面列举的 I 都满足

$$\int_{\mathbb{R}} \phi_I(t) \phi_{[0,1)}(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \omega\left(\frac{t-c_I}{|I|}\right) \omega\left(t - \frac{1}{2}\right) dt \geq B \quad (8.57)$$

即可. 因为 $\omega(\cdot - \frac{1}{2})$ 在 $[1, \frac{17}{16})$ 上严格递减且非零, 故 (8.57) 式自然成立, 且前面列举的 I 中第一行产生的就是 (8.57) 左式可能的最小值. 因此 (8.54) 式成立.

(b) 记 $Q = I_1 \times \cdots \times I_n, R = J_1 \times \cdots \times J_n$, 其中 $|I_1| = \cdots = |I_n| = l(Q), |J_1| = \cdots = |J_n| = l(R)$. 因为 $\Phi_Q \Phi_R$ 不恒为零, 故 $\frac{9}{8}Q \cap \frac{9}{8}R \neq \emptyset$, 因此对每个 $m \in \{1, \cdots, n\}$ 均有 $\frac{9}{8}I_m \cap \frac{9}{8}J_m \neq \emptyset$. 另由 $l(R) \leq 4l(Q)$ 知对每个 m 均有 $|J_m| \leq 4|I_m|$. 现由 Φ_Q 的定义 (8.47) 知 (8.55) 式中的积分恰是 (8.54) 式中积分的乘积, 于是由 (a) 即得结论.

(c) 由 (8.49), (8.50) 式知 $\varphi_i \geq 2^{-n} \Phi_{Q_i}, \varphi_j \geq 2^{-n} \Phi_{Q_j}$. 由 (8.55) 式即得 (8.56) 式. $\square$

8.6 H^1 的原子分解

本节我们证明 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的原子刻画, 该定理表明 H^1 的每个元素都能表为 H^1 原子的无穷和.

定理 8.10 (H^1 的原子刻画)

给定 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$, 则存在 H^1 原子列 $a_s (s = 1, 2, \cdots)$ 与正数列 λ_s 使得

$$f = \sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s a_s, \text{ a.e..} \quad (8.58)$$

另存在仅依赖于维数的常数 $c_n, C_n > 0$ 使得

$$c_n \|f\|_{H^1} \leq \sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s \leq C_n \|f\|_{H^1}. \quad (8.59)$$

最后, 级数 $\sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s a_s$ 在 H^1 意义下收敛到 f .



证明 取 $f \in H^1$ 非零. 由 Hardy 空间与 Lebesgue 空间的关系 8.3 知 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 另取定 $N \geq n+1$ 并考虑 grand 极大函数 $\mathcal{M}_N$. 若存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $\Omega^k = \{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_N(f)(x) > 2^k\}$ 为空, 则令 k_{00} 为满足这一性质的最小整数, 否则取 $k_{00} = \infty$. 观察到对每个 $k < k_{00}$ 而言, Ω^k 总是 $\mathbb{R}^n$ 的非空开真子集. 在后面的证明中, 我们就默认 k 总严格小于 k_{00} 了.

对 $k \in \mathbb{Z}$, 由 Whitney 分解 8.9 知

$$\Omega^k = \{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_N(f)(x) > 2^k\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^k,$$

其中 $\{Q_i^k\}_{i=1}^{\infty}$ 是 Ω^k 的二进 Whitney 方体. 设 Q_i^k 的边长为 l_i^k , $\{\varphi_i^k\}_i$ 是 Whitney 方体 Q_i^k 的单位分解. 进一步记

$$m_i^k = \frac{1}{\|\varphi_i^k\|_{L^1}} \int_{\mathbb{R}^n} f \varphi_i^k dy, \\ g_k = f \chi_{(\Omega^k)^c} + \sum_{i=1}^{\infty} m_i^k \varphi_i^k. \quad (8.60)$$

我们断言存在仅依赖于维数的常数 $C_1(n)$ 使得

$$|m_i^k| \leq C_1(n) 2^k \quad (8.61)$$

对全体 i, k 均成立. 下面证明该断言. 由 Whitney 单位分解 8.2(ii) 知可取 $\xi_i^k \notin \Omega^k$ 满足 $|\xi_i^k - c_i^k| \leq \frac{9}{2} \sqrt{n} l_i^k$, 其中 c_i^k 是 Q_i^k 的中心. 定义函数

$$\Phi_i^k(x) = \varphi_i^k(\xi_i^k - l_i^k x).$$

注意到

$$\text{supp } \Phi_i^k \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^n : |\xi_i^k - l_i^k x - c_i^k| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{8} \sqrt{n} l_i^k \right\} \subset B \left(0, \frac{82}{16} \sqrt{n} \right).$$

另由 Whitney 单位分解 8.2(iii) 知 Φ_i^k 的各阶导数能被独立于 i, k 的常数控制². 由这些观察知存在常数 $C'_1(n) > 0$ 使得对全体 i, k 均有 $\frac{1}{C'_1(n)} \Phi_i^k \in \mathcal{F}_N$, 因此

$$\begin{aligned} |m_i^k| &= \frac{1}{\|\varphi_i^k\|_{L^1}} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \overbrace{\Phi_i^k \left(\frac{\xi_i^k - y}{l_i^k} \right)}^{\varphi_i^k(y)} dy \right| \\ &= C'_1(n) \frac{(l_i^k)^n}{\|\varphi_i^k\|_{L^1}} \left| \left(\left(\frac{\Phi_i^k}{C'_1} \right) * f \right) (\xi_i^k) \right| \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C'_1(n) 2^n \mathcal{M}_N(f)(\xi_i^k) \\ &\stackrel{(B)}{\leq} C_1(n) 2^k, \end{aligned} \quad (8.62)$$

其中 (A) 是 Whitney 单位分解 8.2(iv); (B) 是因为 $\xi_i^k \notin \Omega^k$. 至此即证断言.

下一步我们断言存在常数 $C_2(n)$ 使得 $|g_k| \leq C_2(n) 2^k$, 下面证明该断言. 由 (8.60), (8.61) 两式知该断言首先在 Ω^k 上成立. 另取 $\phi \in \mathcal{F}_N$ 满足 $c_\phi = \int \phi dy \neq 0$, 由恒等逼近定理与 $\phi \in \mathcal{S} \subset L^\infty \cap C^\infty$ 知 $\phi_t * f \rightarrow c_\phi f (t \rightarrow 0)$. 又 $|\phi_t * f| \leq \mathcal{M}_N(f)$, 故由 $\mathcal{M}_N(f)$ 在 $(\Omega^k)^c$ 上不超过 2^k 知 $|f|$ 在 $(\Omega^k)^c$ 上不超过 $2^k/c_\phi$, 因此 $|g_k| \leq C_2(n) 2^k$ 在 $(\Omega^k)^c$ 上同样成立, 此即欲证断言. 由此还可知 $k \rightarrow -\infty$ 时 $g_k \rightarrow 0$.

知

$$f - g_k = \sum_{i=1}^{\infty} (f - m_i^k) \varphi_i^k$$

支在 Ω^k 上, 而 $k \rightarrow \infty$ 时 Ω^k 趋向 $\emptyset$, 故 $\text{supp}(f - g_k)$ 将趋向 $\emptyset$, 亦即 $k \rightarrow \infty$ 时 $g_k \rightarrow f$ 是 a.e. 的. 由此可得

$$f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (g_{k+1} - g_k), \text{ a.e..} \quad (8.63)$$

现知

$$g_{k+1} - g_k = (f - g_k) - (f - g_{k+1}) = \sum_{i=1}^{\infty} (f - m_i^k) \varphi_i^k - \sum_{j=1}^{\infty} (f - m_j^{k+1}) \varphi_j^{k+1}.$$

这里我们倾向于把函数族 $\{(f - m_i^k) \varphi_i^k\}_{i,k}$ 考虑成 f 的原子分解中所出现的原子. 这些函数本身积分为零, 且它们都是支在方体中的, 但它们可能无界, 故我们需要引入一个更深的刻画来解决无界性. 回忆每个 Q_j^{k+1} 都被某个 Q_i^k 包含, 故可把支集与 $\text{supp } \varphi_i^k$ 相交的所有 φ_j^{k+1} 打包. 准确来说, 如果 $\varphi_i^k \varphi_j^{k+1}$ 恒为零, 就令 $m_{i,j}^{k,k+1} = 0$, 否则令

$$m_{i,j}^{k,k+1} = \frac{1}{\int \varphi_i^k \varphi_j^{k+1} dy} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \varphi_i^k(y) \varphi_j^{k+1}(y) dy.$$

引入函数

$$\alpha_i^k = (f - m_i^k) \varphi_i^k - \left(\sum_{j=1}^{\infty} (f - m_{i,j}^{k,k+1}) \varphi_j^{k+1} \right) \varphi_i^k \quad (8.64)$$

$$= \left[f \chi_{(\Omega^{k+1})^c} - \left(m_i^k - \sum_{j=1}^{\infty} m_{i,j}^{k,k+1} \varphi_j^{k+1} \right) \right] \varphi_i^k, \quad (8.65)$$

$$\beta_j^{k+1} = -(f - m_j^{k+1}) \varphi_j^{k+1} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} (f - m_{i,j}^{k,k+1}) \varphi_i^k \right) \varphi_j^{k+1} \quad (8.66)$$

$$= \left[-f \chi_{(\Omega^k)^c} + \left(m_j^{k+1} - \sum_{i=1}^{\infty} m_{i,j}^{k,k+1} \varphi_i^k \right) \right] \varphi_j^{k+1}. \quad (8.67)$$

由 $m_i^k, m_j^{k+1}, m_{i,j}^{k,k+1}$ 的定义与 (8.64), (8.66) 两式可知 $\alpha_i^k, \beta_j^{k+1}$ 的积分均为零. 进一步对 (8.64) 式关于 i 求和, 对 (8.66) 式

² 单位分解 8.2(iii) 中的每个 $l(Q_j)$ 都会被链式法则出现的 l 约掉.

关于 j 求和可得

$$g_{k+1} - g_k = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i^k + \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j^{k+1}. \quad (8.68)$$

我们断言 $|m_{i,j}^{k,k+1}| \leq C_3(n)2^k$, 其中 $C_3(n)$ 是仅依赖于维数的常数, 下面证明该断言. 若 $\varphi_i^k \varphi_j^{k+1} \neq 0$, 则 $\frac{9}{8}Q_i^k \cap \frac{9}{8}Q_j^{k+1} \neq \emptyset$, 这说明 Q_j^{k+1} 要么在 Q_i^k 内, 要么在与 Q_i^k 相邻的某 Whitney 方体 $Q_{i'}^k$ 中. 在这两种情况下, 我们都有 $l_j^{k+1} \leq 4l_i^k$. 现取 $\xi_j^{k+1} \in (\Omega^{k+1})^c$ 满足 $|\xi_j^{k+1} - c_j^{k+1}| \leq \frac{9}{2}\sqrt{n}l_j^{k+1}$, 其中 c_j^{k+1} 是 Q_j^{k+1} 的中心, 定义

$$\Psi_{i,j}^{k,k+1}(x) = \varphi_i^k(\xi_j^{k+1} - l_j^{k+1}x)\varphi_j^{k+1}(\xi_j^{k+1} - l_j^{k+1}x).$$

因为 $l_j^{k+1} \leq 4l_j^k$, 由 Leibniz 法则与单位分解 8.2(iii), $\Psi_{i,j}^{k,k+1}$ 的各阶导数均被与 i, j, k 无关的常数所控制. 另知 $\text{supp } \Psi_{i,j}^{k,k+1} \subset B(0, \frac{82}{16}\sqrt{n})$, 故存在常数 $C_3(n)$ 使得 $\frac{1}{C_3(n)}\Psi_{i,j}^{k,k+1} \in \mathcal{F}_N$ 关于 i, j, k 一致成立. 通过类似于 (8.62) 式的过程与由引理 8.3(8.56) 得到的

$$\frac{(l_j^{k+1})^n}{\int \varphi_i^k \varphi_j^{k+1} dy} \leq \frac{1}{B^n}$$

可知 $|m_{i,j}^{k,k+1}| \leq C_3(n)2^k$.

前面已经证明了对满足 $c_\phi = \int \phi dy \neq 0$ 的 Schwartz 函数 $\phi \in \mathcal{F}_N$, 在 $(\Omega^k)^c$ 上有 $|f| \leq 2^k/c_\phi$ (同理可证 $|f| \leq 2^{k+1}/c_\phi$). 将 $|f|$ 的估计与对 $m_i^k, m_j^{k+1}, m_{i,j}^{k,k+1}$ 的估计代入 (8.65), (8.67) 两式可得

$$|\alpha_i^k| \leq C_4(n)2^k, \quad |\beta_j^{k+1}| \leq C_4(n)2^{k+1},$$

其中 $C_4(n) > 0$ 是只依赖于维数的常数. 前面已知 $\alpha_i^k, \beta_j^{k+1}$ 的积分为零, 又由构成它们的因子 $\varphi_i^k, \varphi_j^{k+1}$ 知它们分别支在 $\frac{9}{8}Q_i^k, \frac{9}{8}Q_j^{k+1}$ 上. 因此, 在将它们规范化后, 得到的函数正是 H^1 原子.

下面从 $\alpha_i^k, \beta_j^{k+1}$ 出发构造原子. 定义常数

$$\mu_i^k = C_4(n)2^k \left| \frac{9}{8}Q_i^k \right|, \quad \mu_j^{k+1} = C_4(n)2^{k+1} \left| \frac{9}{8}Q_j^{k+1} \right|,$$

考虑 $\alpha_i^k, \beta_j^{k+1}$ 的下述规范化:

$$A_i^k = \frac{\alpha_i^k}{\mu_i^k}, \quad B_j^{k+1} = \frac{\beta_j^{k+1}}{\mu_j^{k+1}}.$$

则 A_i^k, B_j^{k+1} 是 H^1 原子. 由 (8.63), (8.68) 两式可知

$$f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} (\mu_i^k A_i^k + \mu_i^{k+1} B_i^{k+1}), \quad \text{a.e..} \quad (8.69)$$

下面估计系数序列的 l^1 范数:

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) &= \left(\frac{9}{8}\right)^n C_4(n) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} (2^k |Q_i^k| + 2^{k+1} |Q_i^{k+1}|) \\ &= \left(\frac{9}{8}\right)^n C_4(n) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (2^k |\Omega^k| + 2^{k+1} |\Omega^{k+1}|) \\ &= 2 \left(\frac{9}{8}\right)^n C_4(n) \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k |\Omega^k| \\ &= 4 \left(\frac{9}{8}\right)^n C_4(n) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{2^{k-1}}^{2^k} |\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_N(f)(x) > 2^k\}| d\lambda \\ &\leq 4 \left(\frac{9}{8}\right)^n C_4(n) \int_0^\infty |\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_N(f)(x) > \lambda\}| d\lambda \\ &= 4 \left(\frac{9}{8}\right)^n C_4(n) \|\mathcal{M}_N(f)\|_{L^1} \\ &\leq C_n \|f\|_{H^1}. \end{aligned} \quad (8.70)$$

记 a_s 是由 A_i^k, B_j^{k+1} 组合成的序列, λ_s 是对应的系数 μ_i^k, μ_j^{k+1} 组合成的序列, 这便得到了 (8.59) 右式.

对于(8.59)左式, 注意到若 $f = \sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s a_s$, 其中 $\lambda_s > 0$, a_s 是 H^1 原子, 则

$$M^*(f; \Phi) \leq \sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s M^*(a_s; \Phi),$$

其中 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 由 H^p 原子的 H^p 控制8.6与 a_s 是 H^1 原子知

$$\|f\|_{H^1} = \|M^*(f; \Phi)\|_{L^1} \leq \sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s \|M^*(a_s; \Phi)\|_{L^1} \leq C(n, 1) \sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s.$$

取 $c_n = \frac{1}{C(n, 1)}$ 即得(8.59)左式.

最后, 我们证明级数 $\sum_{s=1}^{\infty} \lambda_s a_s$ 在 H^1 意义下收敛到 f . 由 $f \in H^1$ 与(8.59)右式知

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{i=1}^{\infty} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) < \infty.$$

因此

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{|k| > M} \sum_{i=1}^{\infty} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) = 0, \quad \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{i=M+1}^{\infty} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) = 0.$$

记

$$S_M = \sum_{|k| \leq M} \sum_{i=1}^M (\mu_i^k A_i^k + \mu_i^{k+1} B_i^{k+1}),$$

知

$$S_M - f = \sum_{|k| > M} \left(\sum_{i=1}^{\infty} \mu_i^k A_i^k + \mu_i^{k+1} B_i^{k+1} \right) + \sum_{|k| \leq M} \left(\sum_{i > M} \mu_i^k A_i^k + \mu_i^{k+1} B_i^{k+1} \right).$$

在上式两端取 H^1 范数, 由(8.59)左式知

$$\|S_M - f\|_{H^1} \leq \frac{1}{c_n} \left[\sum_{|k| > M} \sum_{i=1}^{\infty} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) + \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{i > M} (\mu_i^k + \mu_i^{k+1}) \right],$$

上右式在 $M \rightarrow \infty$ 时趋零, 因此 S_M 在 H^1 意义下收敛到 f . 至此, 只要取 $\{\lambda_s\}_{s=1}^{\infty}$ 是 $\{\mu_i^k, \mu_i^{k+1}\}_{i,k}$ 的一种排列, 对应取 $\{a_s\}_{s=1}^{\infty}$ 是 $\{A_i^k, B_i^{k+1}\}_{i,k}$ 的排列即可. $\square$

推论 8.1 (H^1 范数的原子刻画)

对任意 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|f\|_{H^1} \approx \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j : f = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j \text{ a.e., } a_j \text{ 是 } H^1 \text{ 原子, } \lambda_j > 0, \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j < \infty \right\}.$$

证明 取定 $f \in H^1$, 由 H^1 的原子刻画8.10知存在 H^1 原子 a_j 与 $\lambda_j > 0$ 使得 $f = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j$ a.e. 的同时有

$$\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \leq C_n \|f\|_{H^1}.$$

而所有形如 $\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j$ 的值的下确界只会更小, 故

$$\inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j : f = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j \text{ a.e., } a_j \text{ 是 } H^1 \text{ 原子, } \lambda_j > 0, \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j < \infty \right\} \leq C_n \|f\|_{H^1}.$$

另一边, 由 H^p 原子的 H^p 控制8.6知只要 f 能表示成 $\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j$, 就有

$$\|f\|_{H^1} = \left\| \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j \right\|_{H^1} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \|a_j\|_{H^1} \leq c_n \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j.$$

对上左式取下确界即得欲求的同阶关系. $\square$

8.7 Hardy 空间 H^1 上的奇异积分

在前面谈论奇异积分的时候, 提到的奇异积分都是 $L^p \rightarrow L^p (1 < p < \infty)$ 的, 但这种性质在 $p = 1$ 时通常不成立. 本节我们说明奇异积分实际上把 Hardy 空间 H^1 映入 L^1 .

我们首先回忆一下奇异积分的定义. 设 K 是定义在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的函数, 其满足尺寸条件

$$|K(x)| \leq \frac{A_1}{|x|^n} < \infty, \quad (8.71)$$

光滑性条件 (Hörmander 条件)

$$\sup_{y \neq 0} \int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx = A_2 < \infty \quad (8.72)$$

与消失性条件

$$\sup_{\delta > 0} \sup_{N > \delta} \left| \int_{\delta < |x| < N} K(x) dx \right| = A_3 < \infty, \quad (8.73)$$

其中 $A_1, A_2, A_3 > 0$ 都是常数. 其中消失性条件(8.73)表明存在序列 $\delta_j \downarrow 0$ 使得下述极限存在:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\delta_j \leq |x| \leq 1} K(x) dx = L_0.$$

这说明对 $\mathbb{R}^n$ 上的紧支光滑函数 φ 而言, 极限

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{|x-y| > \delta_j} K(x-y) \varphi(y) dy = T(\varphi)(x) \quad (8.74)$$

存在, 且该极限定义了 C_0^∞ 上的线性算子 T .

因为 C_0^∞ 在 $L^p (1 < p < \infty)$ 中稠密, 故这样的算子 T 在 $L^p (1 < p < \infty)$ 上都有延拓, 另因 Lebesgue 测度 dx 是 doubling 测度, 通过 Vitali 覆盖可以说明 T 同样是弱 $(1, 1)$ 型算子. T 在这些空间上的范数均被 $A_1 + A_2 + A_3$ 的某常数倍控制. 特别由 Calderón-Zygmund 定理4.12知 T 的 L^2 范数被 $C_n(A_1 + A_2 + A_3)$ 控制. 因此, 这样的算子 T 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上 (进而在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 上) 至少是良定义的.

定理 8.11 (Calderón-Zygmund 奇异积分的 $H^1 \rightarrow L^1$ 有界性)

设 K 满足(8.71)-(8.73)式, T 依照(8.74)式定义, 则存在常数 C_n 使得对任意 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\|T(f)\|_{L^1} \leq C_n(A_1 + A_2 + A_3) \|f\|_{H^1}. \quad (8.75)$$

证明 我们首先说明(8.75)式对 H^1 原子成立. 因为 T 是卷积算子 (因此它平移可换), 故只需考虑支在以原点为心的方体上的原子即可. 记 $f = a$ 是这样的原子, 它支在以原点为心的方体 Q 上, 且

$$Q^* = 2\sqrt{n}Q$$

表示边长为 Q 的 $2\sqrt{n}$ 倍, 与 Q 同心的方体. 知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |T(a)(x)| dx = \int_{Q^*} |T(a)(x)| dx + \int_{(Q^*)^c} |T(a)(x)| dx. \quad (8.76)$$

我们接下来分别估计这两部分. 知

$$\begin{aligned} \int_{Q^*} |T(a)(x)| dx &\leq |Q^*|^{\frac{1}{2}} \left(\int_{Q^*} |T(a)(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} c_n(A_1 + A_2 + A_3) |Q^*|^{\frac{1}{2}} \left(\int_Q |a(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} c_n(A_1 + A_2 + A_3) |Q^*|^{\frac{1}{2}} |Q|^{\frac{1}{2}} |Q|^{-1} \\ &= c_n(2\sqrt{n})^{\frac{n}{2}} (A_1 + A_2 + A_3), \end{aligned} \quad (8.77)$$

其中 (A) 是 T 的 L^2 有界性 (即 Calderón-Zygmund 定理4.12); (B) 是原子的性质8.3(ii)

对于以原点为心的方体 Q , 我们下面断言如果 $x \notin Q^*$, $y \in Q$, 就有 $|x| \geq 2|y|$, 且 $x - y$ 不可能为零, 这样一来

$K(x-y)$ 就是良定义的了. 为此由

$$|x| \geq l(Q)\sqrt{n}$$

与

$$|y| \leq \frac{1}{2}l(Q)\sqrt{n}$$

可得

$$|x| \geq l(Q)\sqrt{n} \geq 2|y|.$$

参见图8.1.




图 8.1: $x \notin Q^*, y \in Q$ 的示意.

在 $x \notin Q^*, y \in Q$ 的情况下, 因为 $K(x-y)$ 此时良定义了, 故 $T(a)(x)$ 此时可表为良定义的卷积. 另注意到原子积分为零, 可得

$$\begin{aligned} \int_{(Q^*)^c} |T(a)(x)| dx &= \int_{(Q^*)^c} \left| \int_Q K(x-y) a(y) dy \right| dx \\ &= \int_{(Q^*)^c} \left| \int_Q (K(x-y) - K(x)) a(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_Q \int_{(Q^*)^c} |K(x-y) - K(x)| dx |a(y)| dy \\ &\leq \int_Q \int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx |a(y)| dy \\ &\leq A_2 \int_Q |a(y)| dy \\ &\leq A_2. \end{aligned} \tag{8.78}$$

结合(8.77),(8.78)两式可知 H^1 原子 a 满足

$$\|T(a)\|_{L^1} \leq C'_n(A_1 + A_2 + A_3). \tag{8.79}$$

下面利用原子刻画8.10把结果延拓到 H^1 上. 根据原子刻画8.10与推论8.1可知将 $f \in H^1$ 写成 $f = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j$, 其中 $\lambda_j > 0$, 该级数的收敛是在 H^1 意义下 (进而在 L^1 意义下) 的, a_j 均为 H^1 原子, 且

$$\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \leq C''_n \|f\|_{H^1}. \tag{8.80}$$

由 Calderón-Zygmund 定理 4.12 知 T 本身将 L^1 映入 $L^{1,\infty}$, 故 $T(f)$ 首先是良定义的 $L^{1,\infty}$ 函数. 下面我们断言

$$T(f) = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j T(a_j), \text{ a.e..} \quad (8.81)$$

注意(8.81)式中的级数在 L^1 意义下收敛, 因此它对应一个良定义的可积函数.

为证(8.81)式, 我们需要用到 T 的弱 $(1, 1)$ 型估计. 对给定的 $\delta > 0$ 知

$$\begin{aligned} \left| \left\{ T(f) - \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j T(a_j) > \delta \right\} \right| &\leq \left| \left\{ T(f) - \sum_{j=1}^N \lambda_j T(a_j) > \frac{\delta}{2} \right\} \right| + \left| \left\{ \sum_{j=N+1}^{\infty} \lambda_j T(a_j) > \frac{\delta}{2} \right\} \right| \\ &\leq \frac{2}{\delta} \|T\|_{L^1 \rightarrow L^{1,\infty}} \left\| f - \sum_{j=1}^N \lambda_j a_j \right\|_{L^1} + \frac{2}{\delta} \left\| \sum_{j=N+1}^{\infty} \lambda_j T(a_j) \right\|_{L^1} \\ &\leq \frac{2}{\delta} \|T\|_{L^1 \rightarrow L^{1,\infty}} \left\| \sum_{j=N+1}^{\infty} \lambda_j a_j \right\| + \frac{2}{\delta} C'_n (A_1 + A_2 + A_3) \sum_{j=N+1}^{\infty} \lambda_j. \end{aligned}$$

显见 $\left\| \sum_{j=N+1}^{\infty} \lambda_j a_j \right\|_{L^1} \leq \sum_{j=N+1}^{\infty} \lambda_j$, 故这两项在 $N \rightarrow \infty$ 时都将趋零. 因此对任意 $\delta > 0$ 均有

$$\left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| T(f) - \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j T(a_j) \right| > \delta \right\} \right| = 0,$$

此即(8.81)式.

在(8.81)式得证后, 知

$$\|T(f)\|_{L^1} = \left\| \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j T(a_j) \right\|_{L^1} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \|T(a_j)\|_{L^1} \leq C''_n \|f\|_{H^1} \cdot C'_n (A_1 + A_2 + A_3).$$

此即(8.75)式. □

8.8 H^1 与 BMO 之间的对偶性

本节我们说明 BMO 是 H^1 的对偶空间. 证明这一断言的关键点在于 H^1 的紧性, 这一事实表明了 $(H^1)^*$ 单位球的弱*紧性.

命题 8.1 (H^1 的完备性)

H^1 中的每个基本列都收敛, 因此 H^1 是 Banach 空间. ♠

证明 设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 H^1 中的基本列, 由 $H^1 \hookrightarrow L^1$ 知该序列同样是 L^1 中的基本列, 因此它在 L^1 意义下收敛到可积函数 f . 记 $\Phi(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则因为 $\Phi \in L^\infty$, 知对任意 $t > 0, y \in \mathbb{R}^n$ 与 $m \in \mathbb{N}$ 有

$$|((f_k - f_m) * \Phi_t)(y)| \rightarrow |((f - f_m) * \Phi_t)(y)|.$$

因此对 $|y - x| < t$ 有

$$|((f - f_m) * \Phi_t)(y)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |((f_k - f_m) * \Phi_t)(y)| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} M^*(f_k - f_m; \Phi)(x).$$

在上式两端对满足 $|y - x| < t$ 的全体 y 与全体 $t > 0$ 取上确界可得

$$M^*(f - f_m; \Phi)(x) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} M^*(f_k - f_m; \Phi)(x)$$

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立. 由 Fatou 引理知

$$\|M^*(f - f_m; \Phi)\|_{L^1} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|M^*(f_k - f_m; \Phi)\|_{L^1}. \quad (8.82)$$

因为 $\{f_k\}_k$ 是 H^1 中的基本列, 故(8.82)右式有限, 因此由(8.82)式知 $f - f_m \in H^1$, 从而 $f \in H^1$. 最后由(8.82)式知

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \|M^*(f - f_m; \Phi)\|_{L^1} \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \|M^*(f_k - f_m; \Phi)\|_{L^1} = 0,$$

其中上右式正是因为 $\{f_k\}_k$ 是 H^1 中的基本列. 因此 $f_m \rightarrow f (m \rightarrow \infty)$ 在 H^1 的意义下成立. □

定义 8.7 ($H_0^1(\mathbb{R}^n)$)

记 $H_0^1(\mathbb{R}^n)$ 为 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 原子的全体有限线性组合构成的空间. 由原子刻画 8.10 知 $H_0^1(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 取定 $b \in BMO(\mathbb{R}^n)$, 对 $g \in H_0^1$ 可以定义线性泛函

$$L_b(g) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)b(x)dx. \quad (8.83)$$

因为 g 紧支, 故 (8.83) 右式绝对收敛, 从而 L_b 良定义. 另注意到因为原子积分为零, 故如果 b 被换成 $b+c$ (其中 c 是常数), 则有 $L_b(g) = L_{b+c}(g)$.



如果在 L_b 的定义中, b 还在 L^∞ 内, 则 L_b 实际上在整个 H^1 上 (而不仅仅是 H_0^1 上) 都良定义.

命题 8.2 (L_b 的 H^1 范数控制)

存在常数 C_n 使得对任意函数 $b \in L^\infty$ 均有

$$\|L_b\|_{H^1 \rightarrow \mathbb{C}} \leq C_n \|b\|_{BMO}. \quad (8.84)$$



证明 设 b 是有界 BMO 函数, 由 H^1 范数的原子刻画 8.1 知存在常数 C_n 使得对任意 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j : f = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j a_j \text{ a.e., } a_j \text{ 是 } H^1 \text{ 原子, } \lambda_j > 0, \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j < \infty \right\} \leq C_n \|f\|_{H^1}.$$

现对 H^1 中的 f , 取支在 Q_k 上的 H^1 原子 $\{a_k\}_k$ 与 $\lambda_k (k=1, 2, \dots)$ 使得

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k, \text{ a.e.,} \quad (8.85)$$

且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \leq C'_n \|f\|_{H^1},$$

其中 C'_n 是严格大于 C_n 的任意常数. 因为 (8.85) 式在 H^1 意义下收敛, 故它必在 L^1 意义下收敛, 因此

$$\begin{aligned} |L_b(f)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x)b(x)dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \int_{Q_k} a_k(x)(b(x) - b_{Q_k})dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} |b(x) - b_{Q_k}| dx \\ &\leq C'_n \|f\|_{H^1} \|b\|_{BMO}. \end{aligned}$$

因为 $C'_n > C_n$ 是任意的, 故 (8.84) 式在 $b \in L^\infty$ 时得证. $\square$

在证明命题 8.2 后, 我们希望在不限定 $b \in BMO$ 有界性的前提下, 把 L_b 的定义延拓到整个 H^1 上. 为此, 取定 $b \in BMO$, 记 $b_M(x) = b\chi_{|b| \leq M} (M=1, 2, 3, \dots)$. 可以说明 $\|b_M\|_{BMO} \leq \frac{9}{4}\|b\|_{BMO}$, 因此线性泛函列 $\{L_{b_M}\}_M$ 将落在 $(H^1)^*$ 单位球的某常数倍中, 根据 Banach-Alaoglu 定理知存在子列 $M_j \rightarrow \infty$ 使得 $L_{b_{M_j}}$ 弱*收敛到 H^1 上的某有界线性泛函 $\widetilde{L}_b$. 也就是说, 对任意 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$L_{b_{M_j}}(f) \rightarrow \widetilde{L}_b(f), \quad j \rightarrow \infty.$$

若 a^Q 是支在方体 Q 上的某个取定的 H^1 原子, 则

$$L_{b_{M_j}}(a^Q) = \int_Q b_{M_j} a^Q dy = \int_Q (b_{M_j} - (b_{M_j})_Q) a^Q dy,$$

同理可证 $L_b(a^Q)$ 满足类似结论, 因此

$$\begin{aligned} |L_{b_{M_j}}(a^Q) - L_b(a^Q)| &\leq \|a^Q\|_{L^\infty} [|(b_{M_j} - (b_{M_j})_Q) - (b - b_Q)|_{L^1(Q)}] \\ &\leq \frac{1}{|Q|} \|b_{M_j} - b\|_{L^1(Q)} + |(b_{M_j} - b)_Q|. \end{aligned}$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理, 上右式两项在 $j \rightarrow \infty$ 时均趋零. 同样的讨论对 a^Q 的全体有限线性组合均成立, 因此对任意 $g \in H_0^1$ 均有 $L_{b_{M_j}}(g) \rightarrow L_b(g)$, 从而由极限的唯一性知对任意 $g \in H_0^1$ 均有 $L_b(g) = \widetilde{L}_b(g)$. 因为 H_0^1 在 H^1 中稠密, 而 L_b 与 $\widetilde{L}_b$ 在 H_0^1 上重合, 故 $\widetilde{L}_b$ 实际上是 L_b 在 H^1 上的唯一有界延拓. 这一过程便完成了 L_b 在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 上的延拓, 延拓得到的算子本质上是具有线性泛函的弱极限.

上面的过程表明每个 BMO 函数 b 都能对应 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函 L_b , 且该线性泛函满足

$$\|L_b\|_{H^1 \rightarrow \mathbb{C}} \leq C_n \|b\|_{BMO}. \quad (8.86)$$

下面的定理的主要贡献在于给出了上述命题的反命题.

定理 8.12 ($(H^1)^*$ 与 BMO 的对应)

存在有限常数 C_n, C'_n 使得下述断言成立:

- (i) 取定 $b \in BMO(\mathbb{R}^n)$, 则线性泛函 $L_b \in (H^1(\mathbb{R}^n))^*$, 且其具有至多为 $C_n \|b\|_{BMO}$ 的范数. 另外, $BMO \rightarrow (H^1)^*$ 的映射 $b \mapsto L_b$ 是单射.
- (ii) 对 H^1 上的每个有界线性泛函 L , 都存在 BMO 函数 b 使得

$$\|b\|_{BMO} \leq C'_n \|L\|_{H^1 \rightarrow \mathbb{C}},$$

另对任意 $f \in H_0^1(\mathbb{R}^n)$ 均有 $L(f) = L_b(f)$.



证明 (i) 前面已经在(8.86)式中说明了对任意 $b \in BMO(\mathbb{R}^n)$ 而言, L_b 都在 $(H^1(\mathbb{R}^n))^*$ 中, 且其具有至多为 $C_n \|b\|_{BMO}$ 的范数. 要证嵌入关系 $b \mapsto L_b$ 是单射, 就是要证如果 $L_b = 0$, 那么 b 就是常值函数. 我们用反证法来证明这件事, 知 $L_b = 0$ 可表为

$$\int_Q b(x)g(x)dx = 0$$

对支在 Q 上积分为零的任意有界函数 g 均成立. 若 b 在 Q 上并不是 a.e. 常值函数, 则集合 $E = \{w \leq c\} \cap Q, F = \{w \geq d \cap Q\}$ 都将为正测集, 其中 w 要么是 $\operatorname{Re} b$, 要么是 $\operatorname{Im} b$, c, d 是常数, 且 $c \neq d$. 现在取

$$g(x) = \begin{cases} -|F|, & x \in E, \\ |E|, & x \in F, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

由 $c \neq d$ 知 $\int_Q b(x)g(x)dx \neq 0$, 矛盾! 故 b 只能是 a.e. 常值函数, 亦即 $b \mapsto L_b$ 是单射.

(ii) 取定 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函 L , 取定方体 Q , 考察全体支在 Q 上的平方可积函数构成的空间 $L^2(Q)$, 赋范

$$\|g\|_{L^2(Q)} = \left(\int_Q |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

记 $L_0^2(Q)$ 为 $L^2(Q)$ 中全体积分为零的函数构成的闭子空间. 由 L^q 函数的 H^p 控制 8.7 知 $L_0^2(Q)$ 中的每个函数 g 都在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中, 且其满足范数估计

$$\|g\|_{H^1} \leq c_n |Q|^{\frac{1}{2}} \|g\|_{L^2}. \quad (8.87)$$

因为 $L_0^2(Q)$ 是 H^1 的闭子空间, 故 H^1 上的线性泛函 L 同样是 $L_0^2(Q)$ 上的线性泛函, 且由(8.87)式知它在 $L_0^2(Q)$ 上的范数满足³

$$\|L\|_{L_0^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}} \leq c_n |Q|^{\frac{1}{2}} \|L\|_{H^1 \rightarrow \mathbb{C}}. \quad (8.88)$$

我们按下式将 L 延拓为 $L^2(Q)$ 上的线性泛函 $\widetilde{L}$:

$$\widetilde{L}(h) = L(h - h_Q), \quad h \in L^2(Q).$$

³ $\|g\|_{L^2} \leq 1 \Rightarrow (c_n |Q|^{\frac{1}{2}})^{-1} \|g\|_{H^1} \leq 1$, 于是 $\sup_{\|g\|_{L^2} \leq 1} \langle L, g \rangle \leq c_n |Q|^{\frac{1}{2}} \sup_{\|g\|_{H^1} \leq 1} \langle L, g \rangle$.

注意到对 $h \in L^2(Q)$ 有

$$\begin{aligned} |\tilde{L}(h)| &\leq \|L\|_{L_0^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}} \|h - h_Q\|_{L^2(Q)} \\ &\leq \|L\|_{L_0^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}} [\|h\|_{L^2(Q)} + |h_Q| |Q|^{\frac{1}{2}}] \\ &\leq 2\|L\|_{L_0^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}} \|h\|_{L^2(Q)}, \end{aligned}$$

因此

$$\|\tilde{L}\|_{L^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}} \leq 2\|L\|_{L_0^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}}. \quad (8.89)$$

故 $\tilde{L} \in (L^2(Q))^*$, 对 Hilbert 空间 $L^2(Q)$ 应用 Riesz 表示定理知存在函数 $F^Q \in L^2(Q)$ 使得

$$\tilde{L}(h) = \int_Q h F^Q dx, \quad \forall h \in L^2(Q),$$

且

$$\|F^Q\|_{L^2} = \|\tilde{L}\|_{L^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}}. \quad (8.90)$$

将 $\tilde{L}$ 重新限制在 $L_0^2(Q)$ 上可得

$$L(g) = \int_Q g F^Q dx, \quad \forall g \in L_0^2(Q). \quad (8.91)$$

结合(8.89),(8.90)两式可得

$$\|F^Q\|_{L^2(Q)} \leq 2\|L\|_{L_0^2(Q) \rightarrow \mathbb{C}}. \quad (8.92)$$

因此对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意方体 Q , 总存在在 Q 上的平方可积函数 F^Q 使得(8.91)式成立.

下面说明如果方体 Q 被另一个方体 Q' 包含, 那么 F^Q 与 $F^{Q'}$ 只会在 Q 上 a.e. 相差一个常数. 这是因为对任意 $g \in L_0^2(Q)$ 均有

$$\int_Q F^{Q'}(x)g(x)dx = L(g) = \int_Q F^Q(x)g(x)dx,$$

因此

$$\int_Q (F^{Q'}(x) - F^Q(x))g(x)dx = 0.$$

重复 $b \mapsto L_b$ 为单射的对应证明即知 $F^{Q'} - F^Q$ 在 Q 上 a.e. 为常数.

记

$$Q_m = \left[-\frac{m}{2}, \frac{m}{2}\right]^n, \quad m = 1, 2, \dots,$$

知 $|Q_1| = 1$. 定义 $b \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ 为

$$b(x) = F^{Q_m}(x) - \frac{1}{|Q_1|} \int_{Q_1} F^{Q_m}(y)dy, \quad x \in Q_m. \quad (8.93)$$

下面验证这个定义不会造成歧义 (即 m 的取值不会影响 b 最后的取值.). 设 $1 \leq l < m$, 对 $x \in Q_l$ 而言, (8.93)式中的 $b(x)$ 同样可以把 m 换成 l 来定义. 依照这两种方式定义的 $b(x)$ 之差为 $F^{Q_m} - F^{Q_l} - (F^{Q_m} - F^{Q_l})_{Q_1}$, 又因为前面已经说明了 $F^{Q_m} - F^{Q_l}$ 在 Q_l 上 a.e. 为常数, 由 $|Q_1| = 1$ 可得 $F^{Q_m} - F^{Q_l} = (F^{Q_m} - F^{Q_l})_{Q_1}$, 因此 $F^{Q_m} - F^{Q_l} - (F^{Q_m} - F^{Q_l})_{Q_1}$ a.e. 为零.

现在我们断言对任意方体 Q 而言, 存在常数 C_Q 使得

$$F^Q = b - C_Q, \quad x \in Q. \quad (8.94)$$

这是因为对取定的方体 Q , 可以取到最小的 $m = m(Q)$ 使得 $Q \subset Q_m$, 因而

$$F^Q = \underbrace{F^Q - F^{Q_m}}_{(A)} + \underbrace{F^{Q_m} - (F^{Q_m})_{Q_1}}_{(B)} + \underbrace{(F^{Q_m})_{Q_1}}_{(C)},$$

其中 (A),(C) 在 Q 上都是常数, (B) 等于 $b(x)$. 令 $-C_Q$ 为 (A),(C) 对应的常数即可.

至此, 我们已经构造了一个局部可积函数 b , 使得对任意方体 Q 与任意 $g \in L_0^2(Q)$ 均有

$$\int_Q b(x)g(x)dx = \int_Q (F^Q(x) + C_Q)g(x)dx = \int_Q F^Q(x)g(x)dx = L(g), \quad (8.95)$$

下面说明 $b \in BMO(\mathbb{R}^n)$. 由(8.94),(8.92),(8.88)三式知

$$\begin{aligned} \sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |b(x) - C_Q|dx &= \sup_Q \frac{1}{|Q|} \int_Q |F^Q(x)|dx \\ &\leq \sup_Q |Q|^{-1} |Q|^{\frac{1}{2}} \|F^Q\|_{L^2(Q)} \\ &\leq 2 \sup_Q |Q|^{-\frac{1}{2}} \|L\|_{L_0^1(Q) \rightarrow \mathbb{C}} \\ &\leq c_n \|L\|_{H^1 \rightarrow \mathbb{C}} < \infty \end{aligned}$$

由 BMO 判别法7.1即得 $b \in BMO$, 且

$$\|b\|_{BMO} \leq 2c_n \|L\|_{H^1 \rightarrow \mathbb{C}}.$$

最后, (8.95)式表明对任意 $g \in H_0^1(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$L(g) = \int_{\mathbb{R}^n} b(x)g(x)dx = L_b(g).$$

这说明线性泛函 L 在 H^1 的稠密子空间上与 L_b 重合, 因此 $L = L_b$, (ii) 至此即证. □

第三部分

现代调和分析及其应用讲义笔记

第九章 Hardy-Littlewood 极大函数：一些回顾与串讲

9.1 Hardy-Littlewood 定理与算子族点态收敛定理

经过前面的许多讨论, 可以发现 Hardy-Littlewood 极大函数为收敛性的证明提供了诸多便利. 实变函数中给出了下述定理:

定理 9.1 (Lebesgue)

设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x), \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^d. \quad (9.1)$$

而回忆 Hardy-Littlewood 极大函数的定义:

$$M(f)(x) := \sup_r \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy.$$

可见 Hardy-Littlewood 极大函数与 Lebesgue 定理有强烈联系. 对于极大函数而言, 前面已经说明了其强 (p, p) 型估计与弱 $(1, 1)$ 型估计, 这又称为 Hardy-Littlewood 定理:

定理 9.2 (Hardy-Littlewood)

$$\|M(f)\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}, \quad 1 < p \leq \infty, \quad (9.2)$$

$$|\{x \in \mathbb{R}^d : M(f) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}. \quad (9.3)$$

之前证明 Hardy-Littlewood 定理时是对不同维数进行讨论的, 事实上通过 Vitali 覆盖引理同样能够证明该定理.

引理 9.1 (Vitali 覆盖引理)

设 E 是 $\mathbb{R}^d$ 中的可测集, $E \subset \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}$, B_{α} 是一族具有一致有界直径的球, 则存在 $\{B_{\alpha}\}$ 的一个互不相交的子列 $\{B_j\}_j$ 满足

$$|E| \leq 5^d \sum_{j=1}^{\infty} |B_j|. \quad (9.4)$$

证明 证明的思路在于选取子列时, 总试着选取最大的球. 但是 $\{B_{\alpha}\}_{\alpha}$ 本身可能是一个不可数的集族, 所以“最大”未必能达到, 故我们只能通过上确界的定义来考虑尽可能大的球, 例如选取 B_1 满足

$$\text{diam}(B_1) \geq \frac{1}{2} \sup_{\alpha} \{\text{diam}(B_{\alpha})\},$$

其中 $\text{diam}(B)$ 表示 B 的直径. 递归地在选取 $B_1, \dots, B_k$ 后可选 B_{k+1} 为:

$$\text{diam}(B_{k+1}) > \frac{1}{2} \sup_{\alpha} \{\text{diam}(B_{\alpha}) : B_{\alpha} \cap B_j = \emptyset, 1 \leq j \leq k\}.$$

情形 1: 选取过程在有限步终止. 这种情况意味着选出的 $\{B_j\}$ 是有限集, 且 $\{B_{\alpha}\}$ 中的每个球都能与某个 B_j 相交. 记 $B_j^* := 5B_j$ 是与 B_j 同心, 半径增长 5 倍的球, 下面断言

$$E \subset \bigcup_{j=1}^k B_j^*. \quad (9.5)$$

事实上, 对任意 α , 根据前述讨论知必存在 $1 \leq j \leq k$ 使得 $B_{\alpha} \cap B_j \neq \emptyset$, 不妨设 j 是满足这种情况的最小值, 根据

$\{B_j\}$ 的选取方法知

$$\text{diam}(B_j) > \frac{1}{2} \text{diam}(B_\alpha),$$

于是必定有 $B_\alpha \subset 5B_j = B_j^*$, 因此(9.5)式成立.

情形 2: 选取过程可以一直持续. 这种情况意味着选出的 $\{B_j\}$ 是无限集. 不妨设 $\sum_j |B_j| < \infty$, 否则结论自动成立. 注意到

$$\sum_j |B_j| < \infty \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} |B_j| = 0,$$

因此对任意 α 而言, 总存在 B_{k+1} 使得

$$\text{diam}(B_{k+1}) \leq \frac{1}{2} \text{diam}(B_\alpha). \quad (9.6)$$

下面断言必存在 $j \in \{1, 2, \dots, k\}$ 使得

$$B_\alpha \cap B_j \neq \emptyset, \quad (9.7)$$

否则由 $\{B_j\}$ 的选取方法知一定有

$$\text{diam}(B_{k+1}) > \frac{1}{2} \text{diam}(B_\alpha),$$

这与(9.6)式相矛盾.

现令 j_0 是满足(9.7)式的最小值, 知

$$B_\alpha \cap \bigcup_{k=1}^{j_0-1} B_k = \emptyset, \quad B_\alpha \cap B_{j_0} \neq \emptyset,$$

而根据选取过程知

$$\text{diam}(B_{j_0}) > \frac{1}{2} \text{diam}(B_\alpha),$$

因此

$$B_\alpha \subset 5B_{j_0} = B_{j_0}^* \Rightarrow E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j^*.$$

故

$$|E| \leq 5^d \sum_{j=1}^{\infty} |B_j|.$$

注 Vitali 覆盖引理可以推广到满足拟度量

$$\rho(x, y) \leq l(\rho(x, z) + \rho(z, y)), \quad l \geq 1$$

与 Doubling 条件

$$\mu(B(x, 2r)) \leq A\mu(B(x, r))$$

的齐次空间中.

下面用 Vitali 覆盖引理证明 Hardy-Littlewood 定理:

证明 首先证明弱 $(1, 1)$ 型估计(9.3), 记

$$E = \{x \in \mathbb{R}^d : M(f) > \lambda\}.$$

任取 $x \in E$, 根据 $M(f)$ 的定义知必存在球 $B(x, r)$ 使得

$$\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy > \lambda.$$

这便得到了 E 的开覆盖 $\bigcup_x B(x, r)$, 其中 $r = r_x$. 由 Vitali 覆盖引理知存在一系列互不相交的 B_j 使得

$$|E| \leq 5^d \sum_j |B_j| \leq 5^d \sum_j \frac{1}{\lambda} \int_{B_j} |f(y)| dy \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1}.$$

因为 $f \mapsto M(f)$ 本身是次线性算子, 其弱 $(1, 1)$ 型估计已证, 而强 (∞, ∞) 型估计是显见的, 故由 Marcinkiewicz 插

值定理可得其强 (p, p) 型估计.

注 从 Marcinkiewicz 插值定理的系数也可以看出为什么 Hardy-Littlewood 极大函数不能是强 $(1, 1)$ 型的: $p = 1$ 时这个系数会爆掉.

从 Hardy-Littlewood 定理出发, Lebesgue 定理其实就是该定理与算子族点态收敛定理的直接推论. 前面已经提过算子族点态收敛定理的应用了, 总结来看, 这套方法称为证明算子点态收敛的**极大函数方法**. 极大函数方法的主旨是将 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 函数满足的点态收敛结果推广到 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 函数上. 通过算子族点态收敛定理可知, 达成这一目的需要的是算子族对应极大算子的弱 (p, p) 有界性. 这里回忆一下算子族点态收敛定理的内容:

定理 9.3

设 $1 \leq p < \infty$, $\{T_r\}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)$ 的算子列, 满足对任意 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 均有

$$\lim_{r \rightarrow 0} T_r g = Tg, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^d.$$

若极大算子 $T^*f := \sup_r |T_r f|$ 是弱 (p, p) 型算子, 则对任意 $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\lim_{r \rightarrow 0} T_r g = Tg, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^d.$$



9.2 应用: 非切向极限与椭圆边值问题

考虑上半空间 $\mathbb{R}_+^{d+1}$ 上的 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta_{d+1} u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+ = \mathbb{R}_+^{d+1}, \\ u|_{\mathbb{R}^d} = f(x), \end{cases} \quad (9.8)$$

其中 $\Delta_{d+1} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$. 通过 Fourier 变换容易验证

$$u(x, t) = (P_t * f)(x), \quad P_t(x) = \frac{\Gamma(\frac{d+1}{2})}{\pi^{\frac{d+1}{2}}} \frac{t}{(|x|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} \quad (9.9)$$

是 Dirichlet 问题(9.8)的解. 通过恒等逼近定理 (或算子半群理论, 或 Young 不等式) 可知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|P_t * f - f\|_{L^p} = 0, \quad 1 \leq p < \infty.$$

现在要问的是, 在点态意义下是否有

$$\lim_{t \rightarrow 0} P_t * f = f, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^d, f \in L^p(\mathbb{R}^d) \quad (9.10)$$

或更一般的非切向极限成立?

注 这里的非切向是极限趋向的方向相对于 $\mathbb{R}^d$ 来谈的, 参见图9.1.



图 9.1: 法向极限与一般非切向极限示意

要回答(9.10)式的问题, 根据前面介绍的极大函数方法, 可定义法向极大函数

$$u^+(x) = \sup_{t>0} |(P_t * f)(x)|$$

与非切向极大函数

$$u^*(x) = \sup_{(y,t) \in \Gamma_\alpha(x)} |(P_t * f)(y)|, \quad \Gamma_\alpha(x) = \{(y, t) : |x - y| \leq \alpha t, x \in \mathbb{R}^d\},$$

如果能证明法向极大函数与非切向极大函数能被 Hardy-Littlewood 极大函数控制, 亦即证明

$$u^+(x) \lesssim M(f)(x), \quad (9.11)$$

$$u^*(x) \lesssim M(f)(x). \quad (9.12)$$

根据 Hardy-Littlewood 定理就可以说明这两个极大函数是强 (p, p) 型, 进而是弱 (p, p) 型的 ($p = 1$ 时直接成为弱 $(1, 1)$ 型). 恒等逼近定理已经说明了(9.10)式 (或更一般的非切向极限) 对全体 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 是 a.e. 成立的, 根据算子族点态收敛定理即得(9.10)式 (或更一般的非切向极限) 对全体 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 也成立.

现在对于(9.11)式, 知

$$\begin{aligned} u(x, t) &= C_d \int_{\mathbb{R}^d} \frac{t}{(|x-z|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} f(z) dz \\ &\leq C_d \int_{|x-z| \leq t} \frac{t}{(|x-z|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} |f(z)| dz + C_d \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^k t < |x-z| < 2^{k+1} t} \frac{t}{(|x-z|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} |f(z)| dz \\ &\leq C_d \left(\frac{1}{t^d} \int_{|x-z| < t} |f(z)| dz + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t}{(2^k t)^{d+1}} \int_{|x-z| < 2^{k+1} t} |f(z)| dz \right) \\ &\leq C_d \left(M(f)(x) + 2^d \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} M(f)(x) \right) \\ &\leq CM(f)(x). \end{aligned}$$

由此即得(9.11)式. 对于(9.12)式, 注意到对 $(y, t) \in \Gamma_\alpha(x)$ 有 $|y-x| \leq \alpha t$, 可见

$$\begin{aligned} u(y, t) &= C_d \int_{\mathbb{R}^d} \frac{t}{(|y-z|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} f(z) dz \\ &\leq C_d \int_{|x-z| \leq 2\alpha t} \frac{t}{(|y-z|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} |f(z)| dz + C_d \sum_{k=1}^{\infty} \int_{2^k \alpha t < |x-z| < 2^{k+1} \alpha t} \frac{t}{(|y-z|^2 + t^2)^{\frac{d+1}{2}}} |f(z)| dz \\ &\leq C_d \left(\frac{(2\alpha)^d}{(2\alpha t)^d} \int_{|x-z| < 2\alpha t} |f(z)| dz + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t}{(2^{k-1} \alpha t)^{d+1}} \int_{|x-z| < 2^{k+1} \alpha t} |f(z)| dz \right) \\ &\leq C_d \left((2\alpha)^d M(f)(x) + 2^{2d} \alpha^{-d-1} \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k+1} M(f)(x) \right) \\ &\leq CM(f)(x), \end{aligned}$$

由此即得(9.12)式.

注 上面的过程在某种意义上也与 Hardy 空间的极大函数刻画有关系.

9.3 应用: Carleson 极大函数

Fourier 级数的收敛问题是调和分析的主流问题之一. 对于 L^2 函数的 Fourier 展开

$$f(x) \sim \sum_k c_k e^{i2\pi kx}, \quad c_k = \widehat{f}(k), \quad f \in L^2(\mathbb{T}),$$

由 Plancherel 定理显见上述级数在 L^2 意义下收敛到 f 自身, 现在的问题是上述级数是否点态收敛? 也就是说, 是否有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f := \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{|k| \leq N} c_k e^{i2\pi kx} = f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{T}.$$

其中 S_N 是第一章提过的截断部分和:

$$S_N f = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{i2\pi kx} = \frac{\sin(\pi(2N+1)\cdot)}{\sin(\pi\cdot)} * f := \int_0^1 D_N(x-y) f(y) dy.$$

1966 年, Carleson 在研究上述问题时引入了 Carleson 极大函数:

$$C(f) = \sup_N \left| \int_0^1 D_N(x-y)f(y)dy \right| := \sup_N |D_N * f|,$$

根据前面的极大函数方法, Fourier 级数的点态收敛问题就转化成了 $C(f)$ 的弱有界性问题. 因为 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 所以需要考虑的就是 $C(f)$ 的弱 $(2, 2)$ 型估计问题:

$$|\{x \in \mathbb{T} : C(f) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda^2} \|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2.$$

这其实就是 Carleson-Hunt 定理证明的事.

类似地, 若设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 考虑 $\hat{f}$ 的截断逼近序列 $\{\hat{f}_R(\xi)\}_R$:

$$\hat{f}_R(\xi) = \int_{|x| \leq R} e^{-i2\pi x \cdot \xi} f(x) dx,$$

要研究该截断逼近序列是否点态收敛, 即是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \hat{f}_R(\xi) = \hat{f}(\xi), \text{ a.e. } \xi \in \mathbb{R}^d,$$

其实还是可以通过研究 Carleson 型极大函数

$$C(f) = \sup_{R>0} \left| \int_{|x| \leq R} e^{-i2\pi x \cdot \xi} f(x) dx \right|$$

的弱 $(2, 2)$ 有界性来实现.

注

(i) 在 Hardy-Littlewood 极大函数理论中, 代数结构在其中起着很重要的作用. 在 $\mathbb{R}^d$ 中考虑伸缩变换

$$D_\delta f(x) := f(\delta x) = f(\delta x_1, \dots, \delta x_d),$$

可以验证

$$D_\delta(Mf)(x) = M(D_\delta f)(x).$$

这一事实对应所谓的单参数调和分析.

(ii) 定义强极大函数

$$M_s(f) = \sup_{\substack{x \in R \\ R \subset \mathbb{R}^d}} \frac{1}{|R|} \int_R |f(y)| dy,$$

其中 R 取遍所有包含 x 的矩体, 考虑多参数伸缩变换

$$D_\delta f = f(\delta \circ x) = f(\delta_1 x_1, \delta_2 x_2, \dots, \delta_d x_d),$$

可以验证

$$D_\delta M_s(f)(x) = M_s(D_\delta f)(x).$$

这对应着多元调和分析. 关于强极大函数有下述经典结果:

$$\|M_s(f)\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}, \quad 1 < p \leq \infty,$$

$$|\{x \in \mathbb{R}^d : M_s(f)(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L \log^{d-1} L(\mathbb{R}^d)},$$

其中

$$\|f\|_{L \log^{d-1} L(\mathbb{R}^d)} = \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(1 + \log^+ \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{d-1} dx.$$

现在对于强极大函数的有界性, 从

$$M_s(f)(x_1, \dots, x_d) \leq M^1 M^2 \cdots M^d(f)(x_1, \dots, x_d)$$

可得强极大函数的强 (p, p) 型估计, 但 Vitali 覆盖引理对于 M_s 失效了, 没法证明 M_s 时经典意义下的弱 $(1, 1)$ 型算子, 这才出现了弱 $L \log^{d-1} L$ 型算子.

第十章 A_p 权理论及其应用

10.1 A_p 权的定义

前面我们讨论 Hardy-Littlewood 极大函数时都是在测度空间 $(\mathbb{R}^d, dx)$ 上做的 (其中 dx 是 Lebesgue 测度). 现在对于一般的 L^p 型可测函数空间 $L^p(d\mu)$, 我们希望 Hardy-Littlewood 极大算子依旧满足 Hardy-Littlewood 定理:

(i) $\|M(f)\|_{L^p(d\mu)} \leq C_p \|f\|_{L^p(d\mu)} (1 < p \leq \infty)$,

(ii) $\mu(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(d\mu)}$.

这便对测度 $d\mu$ 的形式提出了一些要求. 下面首先说明上述估计成立的必要条件:

命题 10.1

若测度 $d\mu$ 能使得 Hardy-Littlewood 极大函数的弱 $(1, 1)$ 型估计和强 (p, p) 型估计依旧成立 (其中 $1 < p \leq \infty$), 那么它必关于 Lebesgue 测度绝对连续, 亦即若 $|E| = 0$, 则 $\mu(E) = 0$.

证明 设 $1 \leq p < \infty$, 由条件可知 Hardy-Littlewood 极大函数至少是弱 (p, p) 型的. 由 $|E| = 0$ 知存在开集 $G \supset E$ 使得对任意 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\mu(G \setminus E) < \varepsilon.$$

现在选取 $f(x) = \chi_{G \setminus E}(x)$, 可知

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d, d\mu)}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \chi_{G \setminus E}(x) d\mu = \int_{G \setminus E} d\mu = \mu(G \setminus E) < \varepsilon,$$

因此 $f \in L^p(\mathbb{R}^d, d\mu)$, $\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d, d\mu)}^p < \varepsilon$. 对任意 $x \in E$, 由开集的定义知存在球 $B(x, r) \subset G$, 进而

$$\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy = \frac{|(G \setminus E) \cap B(x, r)|}{|B(x, r)|} = \frac{|B(x, r)|}{|B(x, r)|} = 1.$$

这意味着至少有

$$M(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy > \frac{1}{2}.$$

因此 $E \subset \{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \frac{1}{2}\}$. 由 Hardy-Littlewood 极大算子的弱 (p, p) 型估计知

$$\mu(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda^p} \|f\|_{L^p(d\mu)}^p,$$

因此

$$\mu(E) \leq \mu(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \frac{1}{2}\}) \leq C 2^p \int_{\mathbb{R}^d} |f|^p d\mu \leq C 2^p \varepsilon.$$

利用 ε 的任意性即得 $\mu(E) = 0$. □

利用 Radon-Nikodym 定理, 已经知道了存在某个非负的局部可积函数 $\omega(x)$, 使得 $d\mu = \omega(x)dx$. 现在的问题就归结为对怎样的 $\omega(x) \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\|M(f)\|_{L^p(\omega dx)} \leq C_p \|f\|_{L^p(\omega dx)}, \quad 1 < p \leq \infty, \quad (10.1)$$

$$\omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\omega dx)}, \quad (10.2)$$

其中

$$\omega(E) = \int_E \omega(x) dx.$$

至此最开始的问题就转化为求 $\omega(x)$ 满足 (10.1), (10.2) 的充要条件. 我们前面讨论的必要条件 (命题 10.1) 在这里显然成立 (因为 ω 在 Lebesgue 零测集上积分为零), 下面寻找更强的必要条件.

令 $x \in Q_1 \subset Q_2$, $f(x) = \chi_{Q_1}(x)$. 对任意 $z \in Q_2$, 考察

$$M(f)(z) = \sup_{z \in Q} \frac{1}{|Q|} \int_Q f(y) dy \geq \frac{1}{|Q_2|} \int_{Q_2} f(y) dy = \frac{|Q_1|}{|Q_2|}.$$

因此在(10.2)式成立的情况下有

$$\begin{aligned} \int_{Q_2} \omega(x) dx &\leq \int_{\{x: M(f)(x) \geq \frac{|Q_1|}{|Q_2|}\}} \omega(x) dx \\ &= \omega\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) \geq \frac{|Q_1|}{|Q_2|}\right\}\right) \\ &\leq C \cdot \frac{|Q_2|}{|Q_1|} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \omega(x) dx = C \cdot \frac{|Q_2|}{|Q_1|} \int_{Q_1} \omega(x) dx. \end{aligned}$$

上式意味着

$$\frac{1}{|Q_2|} \int_{Q_2} \omega(x) dx \leq C \frac{1}{|Q_1|} \int_{Q_1} \omega(x) dx \Leftrightarrow \frac{\omega(Q_2)}{|Q_2|} \leq C \frac{\omega(Q_1)}{|Q_1|}.$$

将 Q_1, Q_2 都取成以 x 为心的球体, 令 $|Q_1| \rightarrow 0$, 利用 Lebesgue 定理即得

$$M(\omega)(x) \leq C\omega(x), \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^d.$$

这便是 A_1 权函数的定义:

定义 10.1 (A_1 权函数)

称 $\omega \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 是 A_1 权函数, 如果 $\omega(x) \geq 0$, 且

$$M(\omega)(x) \leq C\omega(x), \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^d. \quad (10.3)$$

A_1 权有下述等价刻画:

定理 10.1 (A_1 权的等价刻画)

ω 是 A_1 权等价于下述诸命题:

- (i) $\frac{\omega(Q)}{|Q|} = \frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(x) dx \leq C\omega(x), \text{ a.e. } x \in Q.$
- (ii) $\frac{\omega(Q)}{|Q|} = \frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(x) dx \leq C \operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} \omega(x).$

证明 考虑证明(10.3) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (10.3). 首先说明(10.3) $\Rightarrow$ (ii), 为此考虑反证法, 设对任意常数 C , 均存在 Q_0 使得

$$\frac{1}{|Q_0|} \int_{Q_0} \omega(x) dx > C \operatorname{ess\,inf}_{x \in Q_0} \omega(x).$$

根据本性下确界的定义知必存在 $E \subset Q_0$ 使得 $|E| > 0$, 且

$$\frac{1}{|Q_0|} \int_{Q_0} \omega(x) dx > C\omega(x), \forall x \in E.$$

于是

$$M(\omega)(x) \geq \frac{1}{|Q_0|} \int_{Q_0} \omega(x) dx \geq \frac{1}{|Q_0|} \int_{Q_0} \omega(x) dx > C\omega(x), \forall x \in E,$$

这与(10.3)矛盾! 因此(10.3) $\Rightarrow$ (ii). 根据本性下确界的定义显见(ii) $\Rightarrow$ (i), 下面说明(i) $\Rightarrow$ (10.3).

事实上, 若存在 $x \in \mathbb{R}^d$ 使得 $M(\omega)(x) > C\omega(x)$, 根据 M 的上确界定义知必存在具有有理端点的方体 $Q \subset \mathbb{R}^d$ 使得

$$\frac{\omega(Q)}{|Q|} > C\omega(x). \quad (10.4)$$

由(i)知 x 只能从属于 Q 的某个零测子集. 取所有这种方体之并即知满足(10.4)式的 x 构成的点集是零测集. $\square$

下面进一步分析 A_1 权函数的定义. 由不等式

$$\frac{\omega(Q)}{|Q|} \leq C \frac{\omega(S)}{|S|}, \quad S \subset Q \quad (10.5)$$

可得:

(i) 要么 $\omega \equiv 0$, 要么 $\omega > 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$. 这是因为如果存在正测度集 S 使得

$$\omega(x) = 0, \quad x \in S,$$

则(10.5)式表明, 对任意包含 S 的可测集, 均应有 $\omega(Q) = 0$.

(ii) 要么 $\omega \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 要么 $\omega = \infty$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$. 这是因为如果存在某方体 Q 使得

$$\omega(Q) = \infty,$$

则对任意 $\tilde{Q} \supset Q$ 均有 $\omega(\tilde{Q}) = \infty$, 因此由(10.5)式知对任意正测集 S 均有 $\omega(S) = \infty$.

基于上述理由, 以后当我们谈及权函数 ω 时, 总设它是局部可积且 a.e. 大于零的.

回到我们最开始的问题, 要想证明 Hardy-Littlewood 极大算子在加权空间 $L^p(\omega dx)$ 上是强 (p, p) ($1 < p < \infty$) 型算子, 只需证明它是弱 $(1, 1)$ 型算子. 也就是说, 在前面的讨论下我们已经可以保证 M 是 $L^p(\omega dx)$ 上的强 (∞, ∞) 算子了, 这是因为(10.5)式表明 $\omega(E) = 0 \Leftrightarrow |E| = 0$, 因此 $L^\infty(\omega) = L^\infty$.

现在为了证明 Hardy-Littlewood 极大算子 M 是弱 $(1, 1)$ 型算子, 就需要在 ω 测度的意义下建立 Vitali 型覆盖引理, 这样一来就可以仿照 Lebesgue 测度下的讨论进行证明了. 而 Vitali 型覆盖引理成立的条件是 μ 满足 Doubling 条件, 因此问题归结为证明测度 ω 满足 Doubling 条件.

引理 10.1

若 ω 是 A_1 权函数, 则 ω 满足 Doubling 条件.

证明 由 A_1 权的等价刻画 10.1(ii) 知:

$$\omega(2Q) \leq C|2Q| \inf_{x \in 2Q} \omega(x) \leq C|Q| \inf_{x \in Q} \omega(x) \leq C \int_Q \omega(x) dx = C\omega(Q).$$

□

引理 10.2

若 ω 是 A_1 权函数, 则 $M(f)(x) \leq CM_\omega(f)(x)$, 其中

$$M_\omega(f)(x) = \sup_{x \in Q} \frac{1}{\omega(Q)} \int_Q |f(y)| \omega(y) dy.$$

证明 由 A_1 权的等价刻画 10.1(ii) 知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy &\leq \sup_{x \in Q} \frac{1}{\text{ess inf}_{y \in Q} \omega(y) |Q|} \int_Q |f(y)| \omega(y) dy \\ &\leq C \sup_{x \in Q} \frac{1}{\omega(Q)} \int_Q |f(y)| \omega(y) dy \\ &= CM_\omega(f)(x). \end{aligned}$$

□

定理 10.2

非负函数 $\omega(x)$ 满足

$$\omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \omega(x) dx \quad (10.6)$$

当且仅当 ω 是 A_1 权.

证明 结合前面的讨论, 只需要证明 $\omega \in A_1 \Rightarrow (10.6)$. 因为 ω 满足 Doubling 条件, 根据 Vitali 覆盖引理, 仿照前面在 Lebesgue 测度下的证明可得

$$\omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M_\omega(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\omega dx)}.$$

由引理 10.2 即得

$$\omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M_\omega(f)(x) > c\lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\omega dx)}.$$

□

类似于 A_1 权解决的是 Hardy-Littlewood 极大算子 M 在测度 ωdx 下的弱 $(1, 1)$ 型估计, A_p 权解决的是 M 在测度 ωdx 下的弱 (p, p) 型估计. 也就是说, 当我们谈及 A_p 权时, 是在问怎样的局部可积 a.e. 正值函数 ω 能满足

$$\omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \omega(x) dx. \quad (10.7)$$

和 A_1 权的情形相同, 这种弱型估计的建立需要 Vitali 覆盖引理在测度 ωdx 下成立, 亦即 ω 需要满足 Doubling 性质. 但是, 对于 A_p 权而言, 事实上有更好的性质, 即 A_p 权 ω 实际上能使 Hardy-Littlewood 极大函数 M 在测度 ωdx 下成为强 (p, p) 型算子. 我们下面就来研究怎样的 ω 能使得强 (p, p) 型估计

$$\|M(f)\|_{L^p(\omega dx)} \leq C \|f\|_{L^p(\omega dx)}. \quad (10.8)$$

首先考虑必要条件. 取方体 $Q \subset \mathbb{R}^d, 1 < p < \infty$. 利用极大函数的定义, 考察

$$M(f\chi_Q)(x) \geq \chi_Q(x) \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy =: \chi_Q(x) m_Q(|f|),$$

可得

$$\begin{aligned} \int_Q m_Q(|f|)^p \omega(y) dy &= \omega(Q) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy \right)^p \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^d} M^p(\chi_Q f)(y) \omega(y) dy \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^d} |\chi_Q f(y)|^p \omega(y) dy \\ &= C \int_Q |f(y)|^p \omega(y) dy \\ &\leq C \int_Q |f(y)|^p (\omega(y) + \varepsilon) dy, \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon > 0$ 是任意的. 现取 $f(x) = (\omega(x) + \varepsilon)^{-\frac{1}{p-1}}$, 上式意味着

$$\omega(Q) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q (\omega(y) + \varepsilon)^{-\frac{1}{p-1}} dy \right)^p \leq C \int_Q (\omega(y) + \varepsilon)^{-\frac{1}{p-1}} dy,$$

整理得

$$\frac{\omega(Q)}{|Q|} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q (\omega(y) + \varepsilon)^{-\frac{1}{p-1}} dy \right)^{p-1} \leq C.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由 Fatou 引理可得

$$\left(\frac{1}{|Q|} \omega(Q) \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-\frac{1}{p-1}} dy \right)^{p-1} \leq C.$$

这便是 A_p 权的定义:

定义 10.2 (A_p 权函数)

称 $\omega \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 是 A_p 权函数 ($1 < p < \infty$), 如果 $\omega(x) \geq 0$, 且存在常数 C 使得对 $\mathbb{R}^d$ 中的任意方体 Q 均有

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(y) dy \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-\frac{1}{p-1}} dy \right)^{p-1} \leq C. \quad (10.9)$$



注 当 $p \rightarrow 0$ 时, 对一个已经在某 $L^q(0 < q < \infty)$ 空间中的 f 而言, 可以说明 $\|f\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$. 因此在(10.9)式中令 $p-1 \rightarrow 0$, 可知上述定义实际上回到了 A_1 权的定义.

命题 10.2 (A_p 权的性质)

- (i) 若 $1 \leq p < q < \infty$, 则 $A_p \subset A_q$.
- (ii) $\omega \in A_p \Leftrightarrow \omega^{1-p'} \in A_{p'}$.

(iii) 若 $\omega_0, \omega_1 \in A_1$, 则 $\omega_0 \omega_1^{1-p} \in A_p$.

证明 (i) 若 $p = 1$, 需要估计 $\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-\frac{1}{q-1}} dy\right)^{q-1}$. 注意到 $(1-q')(1-q) = 1$, 可得

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-q'} dy\right)^{q-1} \leq \operatorname{ess\,sup}_{x \in Q} \omega(x)^{-1} \leq \left(\operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} \omega(x)\right)^{-1}.$$

由 A_1 权的定义知当 $x \in Q$ 时有

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(x) dx \leq M(\omega)(x) \leq C\omega(x) \Rightarrow \frac{\omega(Q)}{|Q|} \leq \operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} \omega(x),$$

因此

$$\left(\operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} \omega(x)\right)^{-1} \leq \frac{1}{C} \left(\frac{\omega(Q)}{|Q|}\right)^{-1},$$

故存在常数 C 使得

$$\left(\frac{\omega(Q)}{|Q|}\right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-q'} dy\right)^{q-1} \leq C.$$

这便是 $\omega \in A_q$, 因此 $A_1 \subset A_q$.

若 $p > 1$, 由 $p < q$ 知 $p' > q'$, 且

$$1 - q' \geq 1 - p', \quad (p-1)(p'-1) = (q-1)(q'-1) = 1.$$

由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-q'} dy\right)^{q-1} &\leq \left(\frac{1}{|Q|} \left(\int_Q \omega^{1-p'} dy\right)^{\frac{q'-1}{p'-1}} |Q|^{1-\frac{q'-1}{p'-1}}\right)^{q-1} \\ &\leq \left(\int_Q \omega^{1-p'} dy\right)^{\frac{1}{p'-1}} |Q|^{-\frac{1}{p'-1}} \\ &= \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-p'} dy\right)^{p-1} \\ &\leq C \left(\frac{|Q|}{\omega(Q)}\right), \end{aligned}$$

这说明

$$\left(\frac{\omega(Q)}{|Q|}\right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-q'} dy\right)^{q-1} \leq C.$$

此即 $\omega \in A_q$, 故 $A_p \subset A_q$.

(ii) 知

$$\begin{aligned} \omega^{1-p'} &\in A_{p'} \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-p'} dy\right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{(1-p')(1-p)} dy\right)^{p'-1} &\leq C \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-p'} dy\right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega dy\right)^{p'-1} &\leq C \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{1-p'} dy\right)^{\frac{1}{p'-1}} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega dy\right) &\leq C^{\frac{1}{p'-1}} \\ \Leftrightarrow \omega &\in A_p. \end{aligned}$$

(iii) 往证

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega_0 \omega_1^{1-p} dy\right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega_0^{1-p'} \omega_1 dy\right)^{p-1} \leq C. \quad (10.10)$$

因为 $\omega_0, \omega_1 \in A_1$, 故对任意 $x \in Q$ 均有

$$\omega_i(x)^{-1} \leq \operatorname{ess\,sup}_{x \in Q} \omega_i(x)^{-1} \leq (\operatorname{ess\,inf}_{x \in Q} \omega_i(x))^{-1} \leq C \left(\frac{\omega_i(Q)}{|Q|} \right)^{-1}, \quad i = 0, 1.$$

将上式代入(10.10)左式即可.

接下来我们说明 A_p 权的定义足以满足 Hardy-Littlewood 极大函数 M 的强 (p, p) 型估计.

第一步: A_p 权与 Hardy-Littlewood 极大函数的弱型估计

我们首先说明一个引理:

引理 10.3

设 $1 < p < \infty$, 若 $\omega \in A_p$, 则存在常数 $C > 0$ 使得

$$M(f)(x) \leq C(M_\omega(|f|^p)(x))^{\frac{1}{p}}.$$

证明 知

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x)| dx \right)^p &= \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x)| \omega^{\frac{1}{p}} \omega^{-\frac{1}{p}} dx \right)^p \\ &\leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x)|^p \omega dx \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-\frac{1}{p-1}} dx \right)^{p-1} \\ &= \left(\frac{1}{\omega(Q)} \int_Q |f(x)|^p \omega dx \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega dx \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-\frac{1}{p-1}} dx \right)^{p-1} \\ &\leq C \frac{1}{\omega(Q)} \int_Q |f(x)|^p \omega dx. \end{aligned}$$

由此即得引理 10.3. □

在引理 10.3 的证明过程中代入 $f = \chi_{\frac{1}{2}Q}$ 可得

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \chi_{\frac{1}{2}Q}(x) dx \right)^p \leq C \frac{\omega(\frac{1}{2}Q)}{\omega(Q)},$$

由此可得

$$\omega(Q) \leq C 2^{pd} \omega\left(\frac{1}{2}Q\right),$$

这说明 ωdx 是满足 Doubling 条件的测度, 进而 Vitali 覆盖引理在 ωdx 下成立, 仿照前述方法即知测度 ωdx 下的极大函数 M_ω 是弱 $(1, 1)$ 型算子. 结合引理 10.3 可得下述结论:

定理 10.3

设 $1 < p < \infty$, $\omega \in A_p$, 则 Hardy-Littlewood 极大算子 M 在测度 ωdx 下是弱 (p, p) 型算子. ♥

证明 知

$$\begin{aligned} \omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M(f)(x) > \lambda\}) &\leq \omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M_\omega(|f|^p)(x)^{\frac{1}{p}} > C\lambda\}) \\ &= \omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M_\omega(|f|^p)(x) > C\lambda^p\}) \\ &\leq \frac{C}{\lambda^p} \| |f|^p \|_{L^1(\omega dx)} = \frac{C}{\lambda^p} \| f \|_{L^p(\omega dx)}^p. \end{aligned}$$

□

第二步: A_p 权的反向 Hölder 不等式

接下来我们给出 A_p 权的反向 Hölder 不等式:

引理 10.4 (A_p 权的反向 Hölder 不等式)

设 $1 \leq p < \infty, \omega \in A_p$, 则存在 $r > 0$ 及常数 $C > 0$ 使得对任意 $Q \subset \mathbb{R}^d$ 均有

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^r(y) dy \right)^{\frac{1}{r}} \leq C \frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(y) dy. \quad (10.11)$$

上式记为 $\omega \in (RH)_r$.



为证明 $\omega \in (RH)_r$, 我们需要用到 Calderón-Zygmund 分解和下述引理:

引理 10.5 (A_p 权测度与 Lebesgue 测度的可比性)

设 $1 \leq p < \infty, \omega \in A_p$. 对任意 $0 < \alpha < 1$, 存在 $0 < \beta < 1$ 使得对给定的方体 Q 和 $E \subset Q$ 而言, 只要 $|E| \leq \alpha|Q|$, 就有 $\omega(E) \leq \beta\omega(Q)$.



下面证明引理 10.5.

证明 考虑 $\chi_{Q \setminus E}(x)$ 的极大函数, 根据 $|E| \leq \alpha|Q|$ 可知对任意 $x \in Q$ 有

$$M(\chi_{Q \setminus E})(x) = \sup_{\tilde{Q} \ni x} \frac{1}{|\tilde{Q}|} \int_{\tilde{Q}} \chi_{Q \setminus E}(y) dy \geq \frac{|Q \setminus E|}{|Q|} = \frac{|Q| - |E|}{|Q|} \geq 1 - \alpha.$$

因为 $\omega \in A_p$, 由引理 10.3 知在 $1 < p < \infty$ 时有

$$1 - \alpha \leq M(\chi_{Q \setminus E})(x) \leq C(M_\omega(|\chi_{Q \setminus E}|^p)(x))^{\frac{1}{p}} = C(M_\omega(\chi_{Q \setminus E})(x))^{\frac{1}{p}}$$

而在 $p = 1$ 时有

$$1 - \alpha \leq M(\chi_{Q \setminus E})(x) \leq CM_\omega(\chi_{Q \setminus E})(x).$$

这说明

$$M_\omega(\chi_{Q \setminus E})(x) \geq C^{-1}(1 - \alpha)^p, \quad x \in Q.$$

进而 $Q \subset \{x \in \mathbb{R}^d : M_\omega(\chi_{Q \setminus E})(x) \geq C^{-1}(1 - \alpha)^p\}$. 接下来我们先承认 A_p 权 ω 同样满足 Doubling 条件, 由此可知它对应的极大函数是弱 $(1, 1)$ 型的, 进而

$$\begin{aligned} \omega(Q) &\leq \omega(\{x \in \mathbb{R}^d : M_\omega(\chi_{Q \setminus E})(x) \geq C^{-1}(1 - \alpha)^p\}) \\ &\leq \frac{C}{(1 - \alpha)^p} \|\chi_{Q \setminus E}\|_{L^1(\omega dx)} \\ &= \frac{C}{(1 - \alpha)^p} \omega(Q \setminus E) \\ &= \frac{C}{(1 - \alpha)^p} (\omega(Q) - \omega(E)) \end{aligned}$$

整理得

$$\omega(E) \leq \frac{C - (1 - \alpha)^p}{C} \omega(Q).$$

取 $\beta = \frac{C - (1 - \alpha)^p}{C}$ 即证引理 10.5. □

现在来证明反向 Hölder 不等式 10.4.

证明 对取定的方体 Q , 选取一组待定参数

$$\frac{\omega(Q)}{|Q|} = \frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(x) dx = \lambda_0 < \lambda_1 < \cdots < \lambda_k < \cdots.$$

对每个 λ_k , 在 Q 上对 $\omega(x)$ 进行 Calderón-Zygmund 分解, 可得

$$\begin{cases} \omega(x) \leq \lambda_k, x \in F_k = Q \setminus \Omega_k, \Omega_k = \bigcup_j Q_{k,j}, \end{cases} \quad (10.12)$$

$$\begin{cases} \lambda_k < \frac{1}{|Q_{k,j}|} \int_{Q_{k,j}} \omega(x) dx \leq 2^d \lambda_k. \end{cases} \quad (10.13)$$

由 λ_k 的递增性可见 $\Omega_{k+1} \subset \Omega_k$. 现在对与 $(\lambda_k, \omega(x))$ 对应的 Calderón-Zygmund 分解中某个固定的 Q_{k,j_0} 有

$$Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1} = \bigcup_i Q_{k+1,i} \cap Q_{k,j_0} \stackrel{(A)}{=} \bigcup_{i \in \mathcal{I}_{k,j_0}} Q_{k+1,i},$$

其中 $\mathcal{I}_{k,j_0}$ 指代满足 $Q_{k+1,i} \cap Q_{k,j_0} \neq \emptyset$ 的那些 i 构成的指标集, (A) 的成立依赖于二进方体的性质. 现由 (10.13) 式可得

$$\begin{aligned} |Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}| &= \sum_{\mathcal{I}_{k,j_0}} |Q_{k+1,i}| \leq \frac{1}{\lambda_{k+1}} \sum_{\mathcal{I}_{k,j_0}} \int_{Q_{k+1,i}} \omega(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\lambda_{k+1}} \int_{Q_{k,j_0}} \omega(x) dx \leq \frac{2^d \lambda_k}{\lambda_{k+1}} |Q_{k,j_0}|. \end{aligned}$$

取定 $\alpha < 1$, 选取 λ_k 使得

$$\frac{2^d \lambda_k}{\lambda_{k+1}} = \alpha,$$

解得 $\lambda_k = \frac{(2^d \alpha^{-1})^k \omega(Q)}{|Q|}$, 从而

$$|Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}| \leq \frac{2^d \lambda_k}{\lambda_{k+1}} |Q_{k,j_0}| = \alpha |Q_{k,j_0}|.$$

由引理 10.5 知存在 $\beta < 1$ 使得

$$\omega(Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}) \leq \beta \omega(Q_{k,j_0}).$$

现在对 λ_k 层级上分解出来的这些二进方体 Q_{k,j_0} 关于 j_0 求和, 可得

$$\omega(\Omega_{k+1}) \leq \beta \omega(\Omega_k),$$

因此 $\omega(\Omega_k) \leq \beta^k \omega(\Omega_0)$, 类似可得

$$|\Omega_{k+1}| \leq \alpha |\Omega_k|,$$

因此 $|\Omega_k| \leq \alpha^k |\Omega_0|$. 故

$$\left| \bigcap_k \Omega_k \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\Omega_k| = 0.$$

由此可知

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |\omega(x)|^r dx &= \frac{1}{|Q|} \int_{Q \setminus \Omega_0} |\omega(x)|^r dx + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\Omega_k \setminus \Omega_{k+1}} |\omega(x)|^r dx \\ &\leq \lambda_0^{r-1} \frac{\omega(Q \setminus \Omega_0)}{|Q|} + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_{k+1}^{r-1} \omega(\Omega_k \setminus \Omega_{k+1}) \\ &\leq \lambda_0^{r-1} \frac{\omega(Q)}{|Q|} + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_{k+1}^{r-1} \omega(\Omega_k) \\ &= \lambda_0^{r-1} \frac{\omega(Q)}{|Q|} + \frac{1}{|Q|} \sum_{k=0}^{\infty} (2^d \alpha^{-1})^{(k+1)(r-1)} \lambda_0^{r-1} \beta^k \omega(\Omega_0). \end{aligned} \tag{10.14}$$

选取 $r > 1$ 使得

$$(2^d \alpha^{-1})^{r-1} \beta < 1,$$

就能让 (10.14) 右式中的级数收敛, 且可被 $C \lambda_0^{r-1} \frac{\omega(Q)}{|Q|}$ 控制. 因为 $\lambda_0 = \frac{\omega(Q)}{|Q|}$, 代入 (10.14) 式即得欲证. $\square$

从反向 Hölder 不等式出发, 可以得到下述用来证明 Hardy-Littlewood 极大算子 M 强 (p, p) 估计的重要推论:

推论 10.1

$$A_p = \bigcup_{1 \leq q < p} A_q, \quad 1 < p < \infty.$$



证明 由 A_p 权的性质 10.2(i) 知

$$\bigcup_{1 \leq q < p} A_q \subset A_p.$$

因此只需说明 $A_p \subset \bigcup_{1 \leq q < p} A_q$ 即可. 设 $\omega \in A_p$, 由 A_p 权的性质 10.2(ii) 知 $\omega^{1-p'} \in A_{p'}$, 由反向 Hölder 不等式 10.4 知存在 $r > 1$ 使得

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{(1-p')r} dx \right)^{\frac{1}{r}} \leq \frac{C}{|Q|} \int_Q \omega^{1-p'} dx. \quad (10.15)$$

定义 q 满足

$$q' - 1 = (p' - 1)r,$$

易知 $q < p$, 于是由 (10.15) 式可得

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-\frac{1}{q-1}} dy \right)^{q-1} \leq \left(\frac{C}{|Q|} \int_Q \omega^{1-p'} dx \right)^{p-1} \stackrel{(A)}{\leq} C^{p-1} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(y) dy \right)^{-1},$$

其中 (A) 是 $\omega \in A_p$ 的定义, 因此 $\omega \in A_q$. 故 $A_p \subset \bigcup_{1 \leq q < p} A_q$, (i) 至此得证. 另外上式等价于

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{(1-p')r} dx \right)^{\frac{p-1}{r}} \leq C^{p-1} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega(y) dy \right)^{-1}. \quad (10.16)$$

第三步: A_p 权与 Hardy-Littlewood 极大函数的强型估计

有了前面这些铺垫, 下面来说明 A_p 权的定义足以满足 Hardy-Littlewood 极大函数 M 的强 (p, p) 型估计:

定理 10.4

设 $1 < p < \infty$, 则 M 是 $L^p(\omega dx)$ 上的有界算子, 即

$$\int_{\mathbb{R}^d} |M(f)(x)|^p \omega(x) dx \leq C_p \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \omega(x) dx$$

当且仅当 $\omega \in A_p$.



证明 前面我们已经说明了必要性, 下面证明充分性. 若 $1 < p < \infty$, 由推论 10.1 知只要 $\omega \in A_p$, 就必存在 $1 < q < p$ 使得 $\omega \in A_q$. 由定理 10.3 知 Hardy-Littlewood 极大算子 M 在测度 ωdx 下是弱 (q, q) 型算子. 又因为前面已经说明了 $L^\infty(\omega dx) = L^\infty(dx)$, 故 M 是测度 ωdx 下的弱 (∞, ∞) 型算子, 由 Marcinkiewicz 插值定理与 $q < p < \infty$ 即知 M 是测度 ωdx 下的强 (p, p) 型算子. $\square$

反向 Hölder 不等式在 A_p 权的研究中至关重要, 它不仅仅体现在上述 A_p 权条件与 Hardy-Littlewood 极大函数强型估计的等价性上, 还体现在下述 A_∞ 权的定义中:

推论 10.2

若 $\omega \in A_p, 1 \leq p < \infty$, 那么存在 $\delta > 0$ 满足对给定的方体 Q 与 $S \subset Q$ 有

$$\frac{\omega(S)}{\omega(Q)} \leq C \left(\frac{|S|}{|Q|} \right)^\delta. \quad (10.17)$$

如果权函数 ω 满足 (10.17) 式, 就称 $\omega \in A_\infty$. 在这种记法下, 推论 10.1 对 $p = \infty$ 也成立, 即:

$$A_\infty = \bigcup_{1 \leq p < \infty} A_p.$$



证明 取 $S \subset Q$, 由 $\omega \in A_p$ 与反向 Hölder 不等式 10.4 知存在 $r > 1$ 使得

$$\omega(S) = \int_Q \chi_S \omega dx \leq \left(\int_Q \omega^r dx \right)^{\frac{1}{r}} |S|^{\frac{r-1}{r}} \leq C \omega(Q) \left(\frac{|S|}{|Q|} \right)^{\frac{r-1}{r}}.$$

取 $\delta = \frac{r-1}{r}$ 即得 (10.17) 式.

下面说明 $A_\infty = \bigcup_{1 \leq p < \infty} A_p$. 事实上, 从 A_∞ 的定义出发可知对任意 $1 \leq p < \infty$ 总有 $A_p \subset A_\infty$, 因此只需证明对任意 $\omega \in A_\infty$, 均存在 $1 \leq p < \infty$ 使得 $\omega \in A_p$ 即可. 为此我们需要对 A_∞ 权给出类似引理 10.4, 10.5 的结

果. 具体来说, 引理10.5表明 $1 \leq p < \infty$ 时测度 ωdx 关于 dx 可比较, 而下面我们说明 $p = \infty$ 时 dx 同样关于 ωdx 可比较, 即:

引理 10.6

设 $\omega \in A_\infty$, 对任意的 $0 < \alpha < 1$, 存在 $0 < \beta < 1$ 使得对给定的方体 Q 和 $S \subset Q$ 而言, 只要 $\omega(S) \leq \alpha\omega(Q)$, 就有 $|S| \leq \beta|Q|$.



现在证明引理10.6. 知 $\omega \in A_\infty$ 等价于存在 $\delta > 0$ 使得 $\frac{\omega(E)}{\omega(Q)} \leq C\left(\frac{|E|}{|Q|}\right)^\delta$, 令 $E = Q \setminus S$ 可得

$$\frac{\omega(Q) - \omega(S)}{\omega(Q)} \leq \left(\frac{|Q| - |S|}{|Q|}\right)^\delta.$$

又因为 $\frac{\omega(S)}{\omega(Q)} \leq \alpha$, 故

$$1 - \alpha \leq 1 - \frac{\omega(S)}{\omega(Q)} \leq C\left(1 - \frac{|S|}{|Q|}\right)^\delta,$$

解得

$$|S| \leq [1 - C(1 - \alpha)^{\frac{1}{\delta}}]|Q|,$$

取 $\beta = 1 - C(1 - \alpha)^{\frac{1}{\delta}}$ 即可, 引理10.6至此得证.

利用引理10.6与 Calderón-Zygmund 分解, 可以说明 A_∞ 权的反向 Hölder 不等式:

引理 10.7

若 $\omega \in A_\infty$, 则 ω^{-1} 关于测度 ωdx 满足反向 Hölder 不等式, 即存在 $r > 1$ 满足

$$\left(\frac{1}{\omega(Q)} \int_Q \omega^{-r} \omega dx\right)^{\frac{1}{r}} \leq \frac{C}{\omega(Q)} \int_Q \omega^{-1} \omega dx.$$



在证明反向 Hölder 不等式10.7后, 可得存在 $r > 1$ 使得

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q \omega^{-(r-1)} dx \leq C \left(\frac{|Q|}{\omega(Q)}\right)^{r-1}.$$

取 $r - 1 = p' - 1$ 即知 $\omega \in A_p$, 故 $A_\infty \subset \bigcup_{1 \leq p < \infty} A_p$, 此即欲证.

最后, 我们来证明反向 Hölder 不等式10.7. 对取定的方体 Q , 取待定参数 $\lambda_k (k = 1, 2, \dots)$ 满足

$$\frac{|Q|}{\omega(Q)} = \frac{1}{\omega(Q)} \int_Q \omega^{-1} \omega dx = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_k < \dots.$$

对每个 λ_k , 在 Q 上对 $\omega^{-1}(x)$ 进行 Calderón-Zygmund 分解, 可得

$$\begin{cases} \omega^{-1}(x) \leq \lambda_k, x \in F_k = Q \setminus \Omega_k, \Omega_k = \bigcup_j Q_{k,j}, \end{cases} \quad (10.18)$$

$$\begin{cases} \lambda_k < \frac{1}{\omega(Q_{k,j})} \int_{Q_{k,j}} \omega^{-1} \omega(x) dx \leq 2^d \lambda_k. \end{cases} \quad (10.19)$$

可得

$$\begin{aligned} \omega(Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}) &= \sum_{i \in \mathcal{I}_{k,j_0}} \omega(Q_{k+1,i}) \leq \frac{1}{\lambda_{k+1}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{k,j_0}} \int_{Q_{k+1,i}} \omega^{-1}(x) \omega(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\lambda_{k+1}} \int_{Q_{k,j_0}} \omega^{-1}(x) \omega(x) dx \leq \frac{2^d \lambda_k}{\lambda_{k+1}} \omega(Q_{k,j_0}). \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{I}_{k,j_0}$ 是 Ω_{k+1} 中那些满足 $Q_{k+1,i} \cap Q_{k,j_0} \neq \emptyset$ 的 i 构成的指标集. 固定 $\alpha < 1$, 选取 λ_k 使得 $\frac{2^d \lambda_k}{\lambda_{k+1}} = \alpha$, 根据引理10.6可知存在 $0 < \beta < 1$ 使得

$$|Q_{k,j_0} \cap \Omega_{k+1}| \leq \beta |Q_{k,j_0}|.$$

对 λ_k 层次上分解出来的这些二进方体 Q_{k,j_0} 关于 j_0 求和可得

$$\omega(\Omega_k) \leq \alpha^k \omega(\Omega_0), \quad |\Omega_k| \leq \beta^k |\Omega_0|.$$

因此

$$\omega\left(\bigcap_k \Omega_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \omega(\Omega_k) = 0.$$

故

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega(Q)} \int_Q \omega^{-r} \omega dx &= \frac{1}{\omega(Q)} \int_{Q \setminus \Omega_0} \omega^{-r} \omega dx + \frac{1}{\omega(Q)} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\Omega_k \setminus \Omega_{k+1}} \omega^{-r} \omega dx \\ &\leq \lambda_0^{r-1} \frac{|Q|}{\omega(Q)} + \frac{1}{\omega(Q)} \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_{k+1}^{r-1} |\Omega_k| \\ &\leq \lambda_0^{r-1} \frac{|Q|}{\omega(Q)} + \frac{1}{\omega(Q)} \sum_{k=0}^{\infty} (2^d \alpha^{-1})^{(k+1)(r-1)} \lambda_0^{r-1} \beta^k |\Omega_0| \\ &\leq C \lambda_0^{r-1} \frac{|Q|}{\omega(Q)} = C \left(\frac{1}{\omega(Q)} \int_Q \omega^{-1} \omega dx \right)^r. \end{aligned}$$

整理即得欲证. □

第四部分

拟微分算子和 Nash-Moser 定理笔记

第十一章 拟微分算子与 Nash-Moser 定理

本章选自 [SAPR], 旨在介绍 PDE 中的拟微分算子理论, 并展示调和分析在 PDE 中的这一应用.

11.1 拟微分算子

11.1.1 导论

11.1.1.1 Fourier 变换的运用

为了介绍拟微分算子, 我们首先重新认识一下微分算子. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

定义 11.1 (微分算子)

如果作用在 Ω 上函数的算子 P 能写成

$$P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha \quad (11.1)$$

其中 α 是多重指标, $a_\alpha \in C^\infty(\Omega)$, 则称它是 Ω 上的 m 阶微分算子.

显见对任意 k 而言, P 都是 $C^{k+m}(\Omega) \rightarrow C^k(\Omega)$ 的线性映射. 通过 Fourier 变换的性质 2.14(viii) 可得下述定义

定义 11.2 (象征)

依照 (2.14) 式定义微分算子 P 的象征是由

$$p(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) (i2\pi\xi)^\alpha$$

定义的在 $\Omega \times \mathbb{R}^n$ 上关于 ξ 的多项式函数. P 的 m 阶主象征 (或者在不会造成歧义的情况下简称为主象征) 是下述关于 ξ 的齐次函数:

$$p_m(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) (i2\pi\xi)^\alpha.$$

为了研究拟微分算子理论, 需要把微分算子的多项式形式进行推广, 缓增函数就是这样一种推广:

定义 11.3 (缓增函数)

称函数 $a \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是缓增函数, 如果

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^n \exists M_\alpha \in \mathbb{N} \exists C_\alpha > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n (|D^\alpha a(x)| \leq C_\alpha (1 + |x|)^{M_\alpha}).$$

另外对分布而言, 为了刻画其奇异性, 还需介绍奇异支集的概念:

定义 11.4 (奇异支集)

对定义在 Ω 上的 u 而言, 设 $B = \{x : \text{存在邻域 } U(x) \text{ 使得 } u \text{ 在 } U(x) \text{ 内是 } C^\infty \text{ 函数}\}$, 则 u 的奇异支集定义为

$$\text{sing supp } u = \overline{B^c}.$$

根据定义可见奇异支集 $\text{sing supp } u$ 囊括了那些没能让 u 在邻域内成为 C^∞ 函数的点, 正是这些点让 u 具有可能的奇异性. 显见奇异支集必为闭集, $\text{sing supp } u \subset \text{supp } u$, 且 $u \in C^\infty(\Omega) \Leftrightarrow \text{sing supp } u = \emptyset$.

现在对于一个 C^∞ 换增函数 $a(\xi)$, 用 $a(D)$ 记 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上定义的算子

$$\widehat{(a(D)u)}(\xi) = a(\xi)\widehat{u}(\xi).$$

称函数 $a(\xi)$ 为算子 $a(D)$ 的**象征**. 对于 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Fourier 反演公式可知

$$\begin{aligned} (a(D)u)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(\xi) \widehat{u}(\xi) d\xi, \\ u(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} \widehat{u}(\xi) d\xi. \end{aligned} \quad (11.2)$$

通过比较可知, 对于 u 在“频率为 ξ ”时的分量 $e^{i2\pi x \cdot \xi} \widehat{u}(\xi)$ 而言, $a(D)$ 的作用只是对“振幅” $\widehat{u}(\xi)$ 乘上了 $a(\xi)$. 此外, 容易验证等式

$$a(D)b(D) = (ab)(D)$$

也就是说两个算子的复合的象征就是两个算子的象征之积, 称这样的性质为“象征演算”. 后面我们就称 $a(D)$ (在增长速度受一定限制的情况下) 为一个“常系数 (即象征与 x 无关) **拟微分算子**”.

本节将发展一套把算子 $a(x, D)$ 和一般的象征 $a(x, \xi)$ 相关联的理论, 使得上面提到的“ $a(x, D)$ 改变振幅”这一性质得到保留, 且推导出相应的象征演算

$$a(x, D)b(x, D) = (a \# b)(x, D),$$

其中 $a \# b$ 是一个能够计算的象征, 且在 b 为常系数拟微分算子时它就是 ab . 不过, 就算是最简单的常系数算子理论也有一些有趣的结论, 比如考虑 Laplace 算子:

$$P = \Delta = \partial_1^2 + \cdots + \partial_n^2.$$

显见该算子的象征为

$$a(\xi) = -4\pi^2 |\xi|^2.$$

事实上, 如果取分布 E 为:

$$\widehat{E}(\xi) = -\frac{1 - \chi(\xi)}{4\pi^2 |\xi|^2}$$

其中 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\xi = 0$ 的某邻域内恒为 1, 则有

$$\widehat{(PE)}(\xi) = -4\pi^2 |\xi|^2 \cdot \left(-\frac{1 - \chi(\xi)}{4\pi^2 |\xi|^2} \right) = 1 - \chi(\xi)$$

两边取 Fourier 逆变换可知 $PE = \delta + \omega$ (其中 δ 是 0 点处的 Dirac 测度, $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$). 另外, 前面取的分布 E 在 0 点之外显然是 C^∞ 的, 同时只要 $|\xi|$ 充分大 (以至于 $\chi(\xi) = 0$), 那么 $(-i2\pi x_j E)^\wedge = \partial_{\xi_j} \widehat{E}$ 就是 -3 次齐次分布, $((-i2\pi x_j)^k E)^\wedge = \partial_{\xi_j}^k \widehat{E}$ 是 $-2-k$ 次齐次分布, 对 E 的其余各阶倒数也有类似结论. 另一方面, 若 $f \in \mathcal{E}'$ 是紧支分布, 因为 E 同时是 $C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 中的元素, 故 $E * f$ 是有意义的, 且

$$P(E * f) = \left(-4\pi^2 |\xi|^2 \cdot \frac{\chi(\xi) - 1}{4\pi^2 |\xi|^2} \cdot \widehat{f} \right)^\vee = (\widehat{f} - \chi(\xi) \widehat{f})^\vee = f + \omega * f.$$

因此, 分布 $u = E * f$ 就是方程

$$Pv = f$$

的一个近似解, 且误差项 $\omega * f$ 是 C^∞ 的. 最后, 我们说明 $\text{sing supp } u = \text{sing supp } f$, 这是因为 Pu 是 f 加上某个 C^∞ 函数, 故在 u 是 C^∞ 函数的地方, f 也应该是 C^∞ 函数, 此即 $\text{sing supp } u \subset \text{sing supp } f$. 为说明 $\text{sing supp } f \subset \text{sing supp } u$, 设 f 在 x_0 附近是 C^∞ 函数, 则可取在 x_0 附近恒为 1 的函数 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\chi f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 进而可得等式

$$u = E * f = E * (\chi f) + E * ((1 - \chi)f)$$

上右式中显见¹ $E * (\chi f) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 而

$$(E * ((1 - \chi)f))(x) = \int_{\mathbb{R}^n} E(x - y)(1 - \chi(y))f(y)dy$$

根据 χ 的构造可知 $1 - \chi(y)$ 这一因子使得在 y 距离 x_0 足够近时上右式被积函数为 0, 这便消除了 E 在 $x = y$ 时具有的奇异性带来的麻烦, 进而可知 x 在 x_0 附近时依旧有 $E * ((1 - \chi)f) \in C^\infty$, 故 $u(x) \in C^\infty$, 这便说明了 $\text{sing supp } f \subset \text{sing supp } u$.

利用 E 还可以得到, 对于方程 $Pv = f$ 的每一个解 v , 都有

$$\text{sing supp } v = \text{sing supp } f.$$

实际上, 如果 f 在 x_0 附近是 C^∞ 的, 取在 x_0 附近恒为 1 的函数 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则因为在 x_0 附近 $P(\chi v) = Pv = f$, 故 $P(\chi v)$ 在 x_0 附近也是 C^∞ 的. 现因 χv 和 $P(\chi v)$ 都是 $\mathcal{E}'$ 中的元素, 有

$$E * (P(\chi v)) = \chi v + \omega * (\chi v) \equiv \chi v \pmod{C^\infty}$$

于是由前述结果可知在 x_0 附近有 $\chi v \in C^\infty$.

根据这一套方法, 利用和 E 做卷积得到的算子 $\widehat{E}(D) : f \mapsto (\widehat{E}f)^\vee$, 我们先把它看作模 C^∞ 意义下 P 的右逆 (也就是 $(P \circ \widehat{E}(D))(f) = P(\widehat{E}(D)(f)) = P(E * f) \equiv f \pmod{C^\infty}$), 依此得到方程 $Pu = f$ 的一个“近似解”; 再把它看成模 C^∞ 意义下 P 的左逆 (也就是 $(\widehat{E}(D) \circ P)(\chi v) = \widehat{E}(D)(P(\chi v)) \equiv \chi v \pmod{C^\infty}$), 依此来研究方程 $Pv = f$ 解的光滑性. 在这种意义下进行研究的解称为 P 的一个**拟基本解**².

尽管如此, 这种完全“从 Fourier 出发”的工作方式还是有种种不便: 我们没法精确控制 $\text{supp } u$ 和 $\text{sing supp } u$, 且这种手段难以用来处理“变系数”算子.

11.1.1.2 变系数算子

根据上一小节的办法, 对于算子 $P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D_x^\alpha$ ($a_\alpha \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$) 我们有

$$\widehat{Pu}(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} \widehat{a}_\alpha * ((i2\pi\xi)^\alpha \widehat{u}(\xi)),$$

但这个式子并不是很好用. 实际上, 更加好用的关系式是对上式两端再取 Fourier 逆变换得到的

$$\begin{aligned} Pu(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} p(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi, \\ p(x, \xi) &= \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) (i2\pi\xi)^\alpha. \end{aligned} \quad (11.3)$$

更加好用是因为在这一形式下我们并不一定要取 $p(x, \xi)$ 为 ξ 的一个多项式函数, 也就是说它不一定要取成微分算子的象征: 所有“适当的” $a = a(x, \xi)$ 都可以. 记

$$a(x, D)u = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi,$$

称 $a(x, D)$ 为“象征为 $a(x, \xi)$ 的拟微分算子”, 在不会混淆的情况下简记 $a(x, D)$ 为 A .

前面提到的“适当的”是指:

- (i) $a(x, \xi)$ 在 $|\xi| \rightarrow +\infty$ 时关于 ξ 至多有多项式增长速度, 且通过将它对 ξ 求导能让增长速度进一步减缓. 也就是说, 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^n (|\partial_\xi^\alpha a(x, \xi)| \leq C_\alpha (1 + |\xi|)^{m - |\alpha|}).$$

- (ii) $a(x, \xi)$ 关于 x 的变化要足够小, 以至于(11.3)式中振幅 $a(x, \xi)$ 和“相位” $e^{i2\pi x \cdot \xi}$ 之间的差异能明显地得到保持. 准确来说, 我们要求

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^n (|\partial_x^\alpha a(x, \xi)| \leq C_\alpha (1 + |\xi|)^m).$$

¹ 因为此时 χf 升级为 Schwartz 函数, 而 E 还是缓增分布, 缓增分布与 Schwartz 函数的卷积就是 C^∞ 的.

² 译本与法文原本似乎都没有明确“拟基本解”这句话的主语是谁, 这里是我擅自补充的主语, 记得询问.

称满足 (i),(ii) 的 C^∞ 函数为一个 m 阶象征³.

历史上, 这种处理方式最早用在寻找变系数椭圆算子 $P(x, D)$ 的拟基本解中 (椭圆指的是对 $\xi \in \mathbb{R}^n, \xi \neq 0$ 有 $p_m(x, \xi) \neq 0$). 事实上, 当我们试图求方程 $Pu = f$ 的形如 $u = a(x, D)f$ 的解时, 有

$$Pu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} p(x, \xi + D) a(x, \xi) \widehat{f}(\xi) d\xi$$

其中

$$p(x, \xi + D)a(x, \xi) = p(x, \xi)a(x, \xi) + \sum_{\alpha \neq 0} \frac{1}{\alpha!} \partial_\xi^\alpha p(x, \xi) D^\alpha a$$

在上述和式中, 随着指标 α 的增大, 相应的项在 $|\xi| \rightarrow +\infty$ 时的行为是越来越容易控制的. 如果取 $a(x, \xi) = \frac{1-\chi(\xi)}{p(x, \xi)}$ (注意对足够大的 $|\xi|$ 而言 $p(x, \xi) \neq 0$), 则可验证 a 是一个 $-m$ 阶象征, 且 $p(x, \xi + D)a = 1 + O(\frac{1}{|\xi|}) = 1 + r$, 其中 r 是一个 -1 阶象征. 因此有等式 $Pu = f + Rf$, 这里 Rf 是一个比 f 具有更好光滑性的函数 (例如当 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 时, Rf 及其梯度都在 L^2 内). 之后还可以看到这个过程可以继续改进, 最终得到 $Rf \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

最关键的事情, 是要建立一个 (包含象征及相应算子的) 理论框架, 使得我们可以 (近似地) 求一个 (微分或拟微分) 算子 $P(x, D)$ 的一个同类型的逆算子 $a(x, D)$, 这样一来我们就得到了一个算子代数, 且逆算子的象征基本就是“自然的候选者” $a(x, \xi) = \frac{1}{p(x, \xi)}$.

我们注意到, 前面提到的所谓近似在这里并不是对数值而言的, 而是从函数的光滑性角度考虑: 一个“小误差”指的是一个 C^∞ 函数, 不管这个函数实际上有多大的数值. 人们由此担心, 这样一来这一理论的应用将被局限在对于函数奇性的研究上 (毕竟如果不考虑数值, 各类估计也就很难达到了), 也就是说我们仅仅能用这一理论得到形如

$$\Delta v = f \Rightarrow \text{sing supp } v = \text{sing supp } f$$

这样的结果. 但是实际上, 数值上的波动根本不是问题, 我们将在后文说明如何用拟微分算子理论建立一些微分问题的解和已知条件之间的不等式. 前面提到的数值上近似的困难在这些不等式重体现为难以确定常数的具体数值. 即便如此, 这些不等式依旧可以用来证明一大类问题精确解的存在性.

11.1.1.3 调和分析的两个角度 (坐标空间 x 和频率空间 ξ)

上面简单介绍过的理论的特点在于引进了象征这一强有力的概念. 例如, 算子乘积 $a(x, D)b(x, D)$ 通过(11.3)式与象征 $a(x, \xi), b(x, \xi)$ 相关联, 而在形式上存在函数 $c(x, \xi)$ 使得这一算子乘积同样通过(11.3)式与之关联. 这一结果的不平凡性体现在证明 $c(x, \xi)$ 本身也是一个象征上, 这也正是本节的核心内容: 象征演算定理. 类似于前文提到的“象征演算”, 对 c 可以做渐进展开

$$c \sim \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \partial_\xi^\alpha a D_x^\alpha b$$

其中最主要的项是 ab , 这与常系数微分算子的结果就吻合了.

这样一套象征演算的好处在于可以把关于算子的命题转化为关于函数的命题, 在后文中我们会举很多这方面的例子. 此外, 象征演算定理的一个推论是下述“拟局部性质”: 对所有拟微分算子 A 有

$$\text{sing supp } Au \subset \text{sing supp } u$$

这表明一个算子 A 尽管可能“延展”了函数 u 的支集, 但它不会影响 u 的奇点在坐标空间中的局部化 (这一事实是很难直接从(11.3)式看出来的). 对这一性质做更为精细的讨论就可以得到 u 的波前集的概念 (记作 $WF(u)$), 这个集合里的点 (x, ξ) 满足 $x \in \text{sing supp } u$, 且 ξ 是 u 在 x 附近的主导频率. 我们将会证明

$$WF(Au) \subset WF(u).$$

因此拟微分演算与相应的波前集的概念使得我们可以对需要研究的函数“从 x 的角度”和“从 Fourier 的角度”得到两方面信息. 系统性地“对 x ”和“对 ξ ”做局部化的过程称为微局部分析.

³当然, 条件 (i),(ii) 本身可以做相当大的改动, 这在后面将会得到说明, 精确的定义也会在后文给出.

11.1.2 象征

11.1.2.1 定义和例子

定义 11.5 (象征)

设 $m \in \mathbb{R}$, 若函数 $a \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ 满足

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta} (1 + |\xi|)^{m - |\beta|}), \quad (11.4)$$

则称 a 是一个 m 阶象征. m 阶象征的全体构成的集合为 $S^m = S^m(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, 同时记 $S^{-\infty} = \bigcap_{m \in \mathbb{R}} S^m$. 

例 11.1 (微分象征) 设 $a(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) (i2\pi\xi)^\alpha$, 其中 $a_\alpha \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且每一个 a_α 及其任意阶导数有界的, 那么 $a \in S^m$. 称 a 是一个微分象征.

例 11.2 设 $a(\xi)$ 是一个 m 阶 (正) 齐次函数 (即 $\forall \lambda > 0 (a(\lambda\xi) = \lambda^m a(\xi))$), 且当 $\xi \neq 0$ 时 $a(\xi)$ 是 C^∞ 函数. 若 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足在 0 点附近 $\chi \equiv 1$, 那么 $\tilde{a}(\xi) = (1 - \chi(\xi))a(\xi)$ 是一个 m 阶象征.

例 11.3 设 $p(x, \xi)$ 是对 $x \in \Omega$ (Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集) 定义的一个 m 阶微分象征. 设 p 在 Ω 中是椭圆的, 亦即

$$\forall x \in \Omega \forall \xi \in \mathbb{R}^n (\xi \neq 0 \Rightarrow p_m(x, \xi) \neq 0).$$

对于 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ 和满足在 0 点附近恒为 1 的 C_0^∞ 函数 χ 而言, 函数 $a(x, \xi) = \varphi(x) \frac{1 - \chi(\xi/C)}{p(x, \xi)}$ 在 C 充分大时是一个 $-m$ 阶象征.

例 11.4 若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则函数 $\varphi(\xi)$ 是一个 $-\infty$ 阶象征.

例 11.5 函数 $a(x, \xi) = e^{ix\xi}$ 不是象征.

从定义出发容易验证象征的下述基本性质:

命题 11.1 (象征的基本性质)

- (i) 若 $a \in S^m$, 则 $\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a \in S^{m - |\beta|}$;
 - (ii) 若 $a \in S^m, b \in S^{m'}$, 则 $ab \in S^{m+m'}$;
 - (iii) 若 $a \in S^m$, 则 $a \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^{2n})$.
- 

最后我们还会用到下述重要引理:

引理 11.1

若 $a_1, \dots, a_k \in S^0, F \in C^\infty(\mathbb{C}^k)$, 则 $F(a_1, \dots, a_k) \in S^0$. 

证明 既然 $\operatorname{Re} a_k$ 与 $\operatorname{Im} a_k$ 都是 S^0 的元素, 不妨设 a_i 是实值函数, 且 $F \in C^\infty(\mathbb{R}^k)$. 因此

$$\frac{\partial}{\partial x_j} F(a) = \sum_{r=1}^k \frac{\partial F}{\partial a_r} \cdot \partial_{x_j} a_r, \quad (11.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi_j} F(a) = \sum_{r=1}^k \frac{\partial F}{\partial \xi_r} \cdot \partial_{\xi_j} a_r. \quad (11.6)$$

现在用归纳法证明 $F(a)$ 依旧是 0 阶象征. 若 $|\alpha| + |\beta| = 0$, 往证 $|F(a_1, \dots, a_n)(x, \xi)| \leq C$. 事实上, 因为 $a_r (r = 1, \dots, k)$ 都在 S^0 中, 知存在常数 C 使得 $|a_r(x, \xi)| \leq C (r = 1, \dots, k)$. 现对固定的 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 知 $\mathbb{C}^k$ 中的元素 $(a_1(x, \xi), \dots, a_k(x, \xi))$ 在球 $B(0, C)$ 内, 因此

$$|F(a_1, \dots, a_k)(x, \xi)| = |F(a_1(x, \xi), \dots, a_k(x, \xi))| \leq |F(0, \dots, 0)| + \|\nabla F\|_{L^\infty(B(0, C))} |(a_1, \dots, a_k)| \leq C'$$

此即欲证. 现设 $|\alpha| + |\beta| \leq p$ 时 $|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta F(a_1, \dots, a_k)| \leq C$. 当 $|\alpha| + |\beta| \leq p + 1$ 时, 对 (11.5), (11.6) 两式用 Leibniz 公式, 并考虑对各个偏导数 $\frac{\partial F}{\partial a_k}(a)$ 的归纳假设即得结论. $\square$

我们还需要提醒读者注意, 对象征 $a(x, \xi) (x \in \mathbb{R}^n, \xi \in \mathbb{R}^n)$ 而言, 如果固定其变量的某个分量, 将它视为关于

变量 $y = (x, x'), \eta = (\xi, \xi')(x' \in \mathbb{R}^m, \xi' \in \mathbb{R}^m, m \geq 1)$ 的函数, 此时它未必依旧是象征, 除非它本身是微分象征.

11.1.2.2 象征的逼近

现在在 S^m 上定义一族半范数

$$|a|_{\alpha, \beta}^m = \sup_{(x, \xi) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \{(1 + |\xi|)^{-(m-|\beta|)} |\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x, \xi)|\}$$

可以说明 S^m 在装备上述半范族后成为一个完备空间 (更准确来说是一个 Frechet 空间), 其中 $a_n \rightarrow a$ 定义为

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n (|a_n - a|_{\alpha, \beta}^m \rightarrow 0)$$

显见在该拓扑下, 求导运算 $a \mapsto \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a$ 与乘积运算 $(a, b) \mapsto ab$ 均为连续映射. 本小节我们主要介绍下述逼近引理:

引理 11.2 (象征的逼近引理)

设 $a \in S^0(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, 记 $a_\varepsilon(x, \xi) = a(x, \varepsilon\xi)$, 则 a_ε 在 S^0 中有界, 且在 $m > 0$ 时若 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 a_ε 在 S^m 的意义下趋向 a_0 .

证明 我们首先证明对 $0 \leq m \leq 1, 0 \leq \varepsilon \leq 1$ 与任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 而言有

$$|a_\varepsilon - a_0|_{\alpha, \beta}^m \leq C_{\alpha, \beta, m} \varepsilon^m.$$

事实上, 当 $\beta = 0$ 时, 根据关于 ξ 的微积分基本定理知

$$\partial_x^\alpha (a_\varepsilon - a_0) = \varepsilon \xi \cdot \int_0^1 \partial_\xi^\alpha \partial_x^\alpha a(x, t\varepsilon\xi) dt,$$

因为 $a \in S^0$, 故根据 0 阶象征的定义知存在常数 C 使得

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x, t\varepsilon\xi)| \leq C_\alpha (1 + |t\varepsilon\xi|)^{-1}$$

因此

$$|\partial_x^\alpha (a_\varepsilon - a_0)| \leq |\varepsilon\xi| \int_0^1 C_\alpha \frac{dt}{1 + |t\varepsilon\xi|} = C_\alpha \int_0^{|\varepsilon\xi|} \frac{ds}{1 + s} = C \log(1 + \varepsilon|\xi|).$$

又因为对任意 $m > 0$, 总存在 $C_m > 0$ 使得 $\log(1 + x) \leq C_m x^m$, 将该估计代入上右式即得欲证.

当 $\beta \neq 0$ 时, 因为 $a_0(x, \xi) = a(x, 0)$ 与 ξ 无关, 故 $\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a_0 = 0$. 另一方面根据 0 阶象征的定义知

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a_\varepsilon| \leq C_{\alpha, \beta} \varepsilon^{|\beta|} (1 + \varepsilon|\xi|)^{-|\beta|}$$

又因为 $0 \leq \varepsilon \leq 1 \Rightarrow 1 + |\xi| \geq 1 + \varepsilon|\xi|$, 故

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a_\varepsilon| \leq C_{\alpha, \beta} \varepsilon^{|\beta|} (1 + |\xi|)^{-|\beta|}$$

至此即得有界性与收敛性. 对于 $m > 1$ 的情况关于 $[m]$ 归纳即证. □

注 需要注意上述引理中的 $m > 0$ 不能加强为 $m \geq 0$. 在 S^0 中我们是得不到 $a_\varepsilon \rightarrow a_0$ 的. 另外若取 $\chi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\xi = 0$ 附近恒为 1, 且设 $a \in S^m$, 则象征 $a_\varepsilon(x, \xi) = \chi(\varepsilon\xi)a(x, \xi)$ 对全体 $\varepsilon > 0$ 而言都是 $-\infty$ 阶的, 且对所有 $m' > m$, 在 $S^{m'}$ 中有收敛关系 $a_\varepsilon \rightarrow a$.

11.1.2.3 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$ 中的渐近和式与古典拟微分象征

对于递减数列 $m_j \rightarrow -\infty (j \in \mathbb{N})$ 而言, 考虑象征 $a_j \in S^{m_j}$ (实际应用中通常取 $m_j = m - j$ 或 $m_j = m - \frac{j}{2}$). 现在希望赋予和式 $\sum_{j \in \mathbb{N}} a_j$ 某种意义, 因为它在一般情况下不是一个收敛级数. 现若

$$\forall k \in \mathbb{N} (a - \sum_{j=0}^k a_j \in S^{m_{k+1}})$$

就记

$$a \sim \sum_{j \in \mathbb{N}} a_j, \quad |\xi| \rightarrow +\infty.$$

为了更好地理解渐近展开这一概念, 首先给出下面的经典引理.

引理 11.3 (Borel)

设 $\{b_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是一个复数序列, 则存在光滑函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使得对任意 $j \in \mathbb{N}$ 均有 $f^{(j)}(0) = b_j$, 亦即下式成立

$$f(x) \sim \sum_{j \in \mathbb{N}} b_j \frac{x^j}{j!}, \quad x \rightarrow 0$$



证明 取 C^∞ 函数 χ , 令它在 $|x| \leq 1$ 时恒为 1, 在 $|x| \geq 2$ 时恒为 0. 现在希望选取某个适当的趋向 $+\infty$ 的正数列 $\{\lambda_j\}_{j \in \mathbb{N}}$, 使得依照式子

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j \frac{x^j}{j!} \chi(\lambda_j x) =: \sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$$

定义的函数 f 具有我们需要的性质. 首先, 因为 $\lambda_j \rightarrow +\infty$, 故对每个取定的 $x \in \mathbb{R}^n$, 总存在足够大的 j 使得 $|\lambda_j x| \geq 2$, 因此上式对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都是有限项之和, 亦即上述级数点态收敛. 现对整数 k 与 $j \geq k$, 知上述级数中第 j 项的 k 阶导数满足

$$f_j^{(k)}(x) = \sum_{0 \leq l \leq k} C_k^l b_j \frac{x^{j-l}}{(j-l)!} \chi^{(k-l)}(\lambda_j x) \lambda_j^{k-l}.$$

因为 χ 及其各阶导数的支集要求 $|\lambda_j x| \leq 2 \Rightarrow |x| \leq 2|\lambda_j|^{-1}$, 故存在常数 C_k 使得

$$\begin{aligned} |f_j^{(k)}(x)| &\leq \sum_{0 \leq l \leq k} C_k^l b_j \frac{|x|^{j-l}}{(j-l)!} |\chi^{(k-l)}(\lambda_j x)| \lambda_j^{k-l} \\ &\leq \sum_{0 \leq l \leq k} C_k^l b_j \frac{2^{j-l} |\lambda_j|^{l-j}}{(j-l)!} |\chi^{(k-l)}(\lambda_j x)| \lambda_j^{k-l} \\ &\leq C_k |b_j| \lambda_j^{k-j} \frac{1}{(j-k)!}, \end{aligned}$$

现取 $\lambda_j \geq 1 + |b_j|$, 则对 $x \in \mathbb{R}$ 而言, 级数 $\sum_{j=0}^{\infty} |f_j^{(k)}(x)|$ 一致收敛, 因此 f 是 C^∞ 函数, 且其各阶导数可通过逐项求导得到. 特别对每个 k 都有

$$f^{(k)}(0) = b_k.$$

□

对于象征的渐近和式而言, 我们有下列性质:

命题 11.2

存在 $a \in S^{m_0}$ 满足 $a \sim \sum_{j=1}^{\infty} a_j (|\xi| \rightarrow \infty)$, 且可以进一步要求 $\text{supp } a \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \text{supp } a_j$.



证明 只需对 Borel 引理 11.3 作适当的修改, 把 $x \rightarrow 0$ 时的渐近性质换成 $\frac{1}{|\xi|} \rightarrow 0$ 时的渐近性质. 现取 C_0^∞ 函数 χ , 令它在 $\xi = 0$ 附近恒为 1, 考虑

$$a(x, \xi) := \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j(x, \xi) := \sum_{j=1}^{\infty} (1 - \chi(\varepsilon_j \xi)) a_j(x, \xi)$$

其中 $\varepsilon_j \downarrow 0$ 是下降足够快的数列. 进一步, 可以要求在 $|\alpha| + |\beta| \leq j$ 时有

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \tilde{a}_j| \leq 2^{-j} (1 + |\xi|)^{1+m_j-|\beta|}.$$

这是因为本身 $a_j \in S^{m_j}$, 且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $1 - \chi(\varepsilon \xi)$ 在 S_1 的意义下趋向 0, 故仿照象征的逼近引理 11.2 的证明即得上式. 同时因为对每个取定的 ξ 而言, 在 $\varepsilon_j \rightarrow 0$ 时总有 $\varepsilon_j \xi \rightarrow 0$, 故 $1 - \chi(\varepsilon_j \xi)$ 只会对有限个 ε_j 非零, 这说明

$\sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j(x, \xi)$ 实际上对每个 ξ 都是有限和. 又因为根据象征的定义知 $a_j \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, 故 $a \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$.

现在对给定的 α, β, k , 若 $|\alpha| + |\beta| \leq N, m_N + 1 \leq m_{k+1}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \left(a - \sum_{j \leq N-1} \tilde{a}_j \right) \right| &\leq \sum_{j \geq N} |\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \tilde{a}_j| \leq \sum_{j \geq N} 2^{-j} (1 + |\xi|)^{1+m_j-|\beta|} \\ &\leq (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} \sum_{j \geq N} 2^{-j} \leq (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} \end{aligned}$$

故对于

$$a - \sum_{j \leq k} a_j = a - \sum_{j \leq N-1} \tilde{a}_j + \sum_{k+1 \leq j \leq N-1} \tilde{a}_j - \sum_{j \leq k} (a_j - \tilde{a}_j)$$

因为从 $\tilde{a}_j$ 的构造可知 $a_j - \tilde{a}_j \in S^{-\infty}, \tilde{a}_j \in S^{m_j}$, 进而

$$\begin{aligned} \left| \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \left(a - \sum_{j \leq k} a_j \right) \right| &\leq \left| \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \left(a - \sum_{j \leq N-1} \tilde{a}_j \right) \right| + \left| \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \left(\sum_{k+1 \leq j \leq N-1} \tilde{a}_j \right) \right| + \left| \partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta \left(\sum_{j \leq k} (a_j - \tilde{a}_j) \right) \right| \\ &\leq (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} + \sum_{k+1 \leq j \leq N-1} C_{\alpha, \beta, j} (1 + |\xi|)^{m_j-|\beta|} + \sum_{j \leq k} (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} \\ &\leq C_k (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} + \sum_{k+1 \leq j \leq N-1} C_{\alpha, \beta, j} (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} \leq C_{\alpha, \beta, k} (1 + |\xi|)^{m_{k+1}-|\beta|} \end{aligned}$$

这便依照定义证明了 $a \sim \sum_{j=1}^{\infty} a_j (|\xi| \rightarrow \infty)$. 从 a 的构造出发显见 $\text{supp } a \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \text{supp } a_j$. □

通过这种渐近的想法, 我们引进下述定义:

定义 11.6 (古典象征)

称象征 $a \in S^m$ 是古典的, 如果 $a \sim \sum_{j=1}^{\infty} a_j (|\xi| \rightarrow \infty)$, 其中函数 a_j 对于 $|\xi| \geq 1$ 是 $m-j$ 阶齐次函数 (也就是说对 $|\xi| \geq 1, \lambda \geq 1$ 有 $a_j(x, \lambda\xi) = \lambda^{m-j} a_j(x, \xi)$).



可以验证例 11.1-11.3 中给出的象征都是古典象征. 有时候, 我们还会 (对“象征”这个概念稍加滥用地) 把所有在 $|\xi| \neq 0$ 时为 C^∞ 函数的函数 a 都称作象征, 这种情况下我们约定要通过适当的方式在 $\xi = 0$ 附近做一个截断, 这样一来两个象征之差总是 $S^{-\infty}$ 的. 对齐次函数定义的象征正是如此.

11.1.3 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{S}'$ 中的拟微分算子

下面来正式给出导论中提到过的各种定义.

11.1.3.1 $\mathcal{S}$ 上的作用

命题 11.3 (拟微分算子的性质)

若 $a \in S^m, u \in \mathcal{S}$, 则等式

$$\text{Op}(a)u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi$$

定义了 $\mathcal{S}$ 中的一个函数, 且

$$(a, u) \mapsto \text{Op}(a)u$$

是连续的, 这便定义了一个由 S^m 映到 $\mathcal{S}$ 上线性算子空间的线性映射 Op , 它是单射, 且满足关系式

$$\begin{cases} [\text{Op}(a), D_j] = i \text{Op}(\partial_{x_j} a), \\ [\text{Op}(a), x_j] = -i \text{Op}(\partial_{\xi_j} a), \end{cases} \quad (11.7)$$

其中 $D_j = -i \frac{\partial}{\partial x_j}$, x_j 表示函数 $x \mapsto x_j$ 定义的乘积算子, $[a, b] = ab - ba$ 是交换子.



证明 首先, 因为 $\widehat{u} \in \mathcal{S}, a \in S^m$, 故

$$|\mathrm{Op}(a)u(x)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |a(x, \xi)(1 + |\xi|)^{-m}| \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|)^m |\widehat{u}(\xi)| d\xi < \infty \quad (11.8)$$

这表明 $\mathrm{Op}(a)u$ 是有界的. 利用相同的方法可得

$$|\mathrm{Op}(a)u(x+h) - \mathrm{Op}(a)u(x)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(a(x+h, \xi) - a(x, \xi))(1 + |\xi|)^{-m}| \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|)^m |\widehat{u}(\xi)| d\xi$$

进而由 $a \in S^m \subset C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ 知 $\mathrm{Op}(a)u$ 是连续函数. 重复上述步骤即知 $\mathrm{Op}(a)u$ 是 Schwartz 函数.

(11.7)式可由分部积分得到, 这是因为

$$\mathrm{Op}(a)D_j u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{D_j u}(\xi) d\xi = 2\pi \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \xi_j \widehat{u}(\xi) d\xi,$$

而

$$\begin{aligned} D_j(\mathrm{Op}(a)u)(x) &= -i \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{x_j} (e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi)) \widehat{u}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} 2\pi \xi_j e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi - i \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} (\partial_{x_j} a)(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi \end{aligned}$$

将两式相减即得(11.7)第一式, 类似可证(11.7)第二式. 由(11.7)式知 $x^\alpha D^\beta(\mathrm{Op}(a)u)$ 是形如

$$\mathrm{Op}(\partial_\xi^{\alpha'} \partial_x^{\beta'} a)(x^{\alpha''} D^{\beta''} u) \quad (\text{其中 } \alpha' + \alpha'' = \alpha, \beta' + \beta'' = \beta)$$

的项的线性组合, 通过类似(11.8)式的估计可知 $x^\alpha D^\beta(\mathrm{Op}(a)u)$ 是由 u 在 $\mathcal{S}$ 中的一个半范与 a 在 S^m 中的一个半范的乘积所控制的. 这便得到了映射 $(a, u) \mapsto \mathrm{Op}(a)u$ 的连续性.

最后, 为了证明 Op 是单射, 设对全体 $u \in \mathcal{S}, x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi = 0$$

需要证明 $a = 0$. 现固定 x , 注意到函数

$$b(\xi) = \frac{a(x, \xi)}{(1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2} + \frac{n}{4} + \frac{1}{2}}} \in L^2(\mathbb{R}^n)$$

和所有形如

$$v(\xi) = e^{-i2\pi x \cdot \xi} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2} + \frac{n}{4} + \frac{1}{2}} \overline{\widehat{u}(\xi)}$$

的函数正交. 因为 u 跑遍 $\mathcal{S}$ 时 v 也跑遍 $\mathcal{S}$, 而 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 还在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 这说明 $b \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 与 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的某稠密子集中的所有函数正交, 因此只能有 $b = 0$, 亦即 $a = 0$. $\square$

定义 11.7 (拟微分算子)

对于 $a \in S^m$, 称算子 $\mathrm{Op}(a)$ 是以 a 为象征的拟微分算子. 若拟微分算子的象征在 S^m 中, 则称该拟微分算子是 m 阶的. 

和微分算子的情形类似, 我们经常记 $\mathrm{Op}(a) = a(x, D)$. 如果不会产生混淆, 我们用表示象征的字母的大写形式来记该象征对应的拟微分算子: $A = \mathrm{Op}(a)$.

11.1.3.2 算子的核函数与共轭

设 $a \in S^{-\infty}$. 对于 $u \in \mathcal{S}$, 有

$$\begin{aligned} \mathrm{Op}(a)u(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{u}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi x \cdot \xi} a(x, \xi) \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi y \cdot \xi} u(y) dy \right) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i2\pi(x-y) \cdot \xi} a(x, \xi) d\xi \right) dy \end{aligned}$$

因此算子 $\text{Op}(a)$ 的核函数 K 由下式给出:

$$K(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i2\pi(x-y)\cdot\xi} a(x, \xi) d\xi. \quad (11.9)$$

若 $a \in S^m$, 则上式有下述延拓

$$K(x, y) = \mathcal{F}_\xi[a](x, y - x) \quad (11.10)$$

其中 $\mathcal{F}_\xi[a]$ 表示 a 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^{2n})$ 中关于 ξ 的 Fourier 变换. 由 Fourier 反演公式可知

$$a(x, \xi) = \mathcal{F}_{y \rightarrow \xi}[K(x, x - y)]. \quad (11.11)$$

第五部分

Banach 空间上的分析笔记

第十二章 Bochner 空间

本章我们系统研究先前在 Littlewood-Paley 理论中提过的 Banach 值函数积分理论. 我们从这类函数的不同可测性入手. 从测度的直觉定义上看, 对于可分 Banach 空间 X 与可测空间 $(S, \mathcal{A})$ 而言, 函数 $f: S \rightarrow X$ 可测指的是对 X 中的每个 Borel 集 B 而言, f 的预像

$$f^{-1}(B) := \{f \in B\} := \{s \in S : f(s) \in B\}$$

均可测. 而 Pettis 可测定理表明这一可测性等价于对每个 $x^* \in X^*$ 而言, 标量函数 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均可测. 这件事我们将在第一节说明.

第二节我们会给出 Bochner 积分的构造, 这个构造类似于对 X 值函数谈 Lebesgue 积分的构造, 它也保留了 Lebesgue 积分的所有重要性质, 例如对逼近结果的保持, 收敛定理与 Fubini 定理. Bochner 可积函数构成的 Banach 可积 $L^p(S, X)$ 将是后文一系列工作的基石. 我们同时还需要 Pettis 积分, 这类积分是用函数 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的 Lebesgue 积分定义的.

第三节我们会讨论 Bochner 可积 $L^p(S, X)$ 的对偶理论. 这一理论相当复杂, 因此我们只会讨论一类 Radon-Nikodým 型定理的在其上成立的空间类. 这一空间类和 X 值 Lipschitz 与绝对连续函数的 a.e. 可微性有紧密联系, 我们将在下一章讨论这种联系.

统一约定 X 是背景为标量场 $\mathbb{K}$ (可能是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 的 Banach 空间. 在强调标量场的选取时我们会称之为实 Banach 空间或复 Banach 空间. 注意通过把复标量乘法限制为实标量乘法我们总可以把复 Banach 空间看成实 Banach 空间. $x \in X$ 的范数记为 $\|x\|_X$, X 的对偶记作 X^* , 另用 $\langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} := x^*(x)$ 表示 $x \in X$ 与 $x^* \in X^*$ 之间的对偶序偶.

12.1 可测性

Banach 空间的分析保留了测度论的一些自然的概念, 比如可测性, 强可测性与弱可测性. 有限维情形下这三种可测性彼此等价, 但无限维情形下并非如此, 因此我们的首要任务是理解它们之间相关联的方式. Pettis 可测定理做的就是这个工作, 它表明 X 值函数强可测当且仅当它可分取值且弱可测. 我们会给出该结果的两种阐述: 一种是对定义在可测空间 $(S, \mathcal{A})$ 上的函数的点态版本, 另一种是对定义在测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 上的函数的 μ -a.e. 版本. 我们会努力把结果做到任意测度空间上, 从而尽可能避免 σ -有限性这类假设.

12.1.1 可测空间 $(S, \mathcal{A})$ 上的函数

可测性

Banach 值函数的第一种可测性定义利用了逆像: 称 X 值函数 f 可测, 如果对 X 中的每个 Borel 集 B 而言, 其预像 $f^{-1}(B)$ 均可测. 但这种定义其实在很多时候并没有我们期望的那么有用, 其原因在于 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(X)$ 一般来说都“太大了”, 因此这种可测性其实相当强. 具体来说, 就像强拓扑和弱拓扑一样, Banach 空间 X 上也有两种定义 σ 代数的方式, 其中 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(X)$ 正是 X 上的强拓扑生成的 σ 代数. 另一方面, 对于对偶空间 X^* 中的元素 $x^*: X \rightarrow (\mathbb{K}, \mathcal{B}(\mathbb{K}))$ 而言, 要想断言 x^* 可测, 就需要在 X 上赋包含 $\{(x^*)^{-1}(A)\}_{A \subset \mathbb{K}}$ 的 σ 代数, 其中 A 是 $\mathbb{K}$ 中的 Borel 集, 因此每个 x^* 的可测性都对 X 上将要赋的 σ 代数提了要求 (这点很像每个 x^* 的连续性对 X 上的拓扑提要求). 如果在 X^* 中圈定一个子集 Y , 该子集中的全体元素的可测性就都会对 X 上的 σ 代数提要求, 因此我们可以仿照定义弱拓扑的方式定义该 σ 代数:

定义 12.1

设 X 是 Banach 空间, $Y \subset X^*$, 定义 $\sigma(Y) \subset 2^X$ 为 X 中使得每个 $x^* \in Y$ 均可测的最小 σ 代数, 称之为 Y 在 X 中生成的 σ 代数.



根据前面的说明显见

$$\sigma(Y) = \sigma\left(\bigcup_{\substack{x^* \in Y \\ A \in \mathcal{B}(\mathbb{K})}} \{(x^*)^{-1}(A)\}\right).$$

利用坐标函数可以说明下述更大的集类¹生成的 σ 代数同样是 $\sigma(Y)$:

$$\mathcal{C}(Y) := \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{(x_k^*)_{1 \leq k \leq n} \in Y^n} \bigcup_{B \in \mathcal{B}(\mathbb{K}^n)} \{x \in X : (\langle x, x_1^* \rangle_{X \times X^*}, \dots, \langle x, x_n^* \rangle_{X \times X^*}) \in B\}. \quad (12.1)$$

明晰起见, 我们用 $\mathcal{B}(X, \|\cdot\|_X)$ 表示 X 上的强拓扑诱导的 Borel σ 代数, 用 $\mathcal{B}(X, \sigma(X, X^*))$ 表示 X 上的弱拓扑诱导的 Borel σ 代数. 因为弱拓扑弱于强拓扑, 故显见 $\mathcal{B}(X, \sigma(X, X^*)) \subset \mathcal{B}(X, \|\cdot\|_X)$. 不过, 只要范数满足特定条件, 我们就可以得到 $\mathcal{B}(X, \sigma(X, X^*)) = \mathcal{B}(X, \|\cdot\|_X)$.

定义 12.2 (Kadec 范数)

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 是 Banach 空间, 记 $B_\varepsilon(y) := \{x \in X : \|x - y\|_X < \varepsilon\}$, $\overline{B}_\varepsilon(y) := \{x \in X : \|x - y\|_X \leq \varepsilon\}$. 如果在 $\{x \in X : \|x\|_X = 1\}$ 上强拓扑和弱拓扑等价, 就称 $\|\cdot\|_X$ 是 Kadec 范数.



注 Kadec 范数的条件可以等价地提成²:

$$\forall \varepsilon > 0 \forall y \in X \left(\|y\|_X = 1 \Rightarrow y \notin \overline{B_1(0) \setminus B_\varepsilon(y)}^{\sigma(X, X^*)} \right),$$

或

$$x_n \rightharpoonup x \wedge \|x_n\|_X \rightarrow \|x\|_X \Rightarrow x_n \rightarrow x.$$

回忆局部一致凸的定义:

定义 12.3 (局部一致凸, 严格凸)

称 Banach 空间 X 局部一致凸, 如果对任意 $\varepsilon \in (0, 2]$ 与任意 $x \in \partial B_1(0)$ 均存在 $\delta = \delta(x, \varepsilon) > 0$ 使得

$$\|y\|_X = 1 \wedge \|y - x\|_X \geq \varepsilon \Rightarrow \|y + x\|_X \leq 2(1 - \delta).$$

称 X 严格凸, 如果 $\partial B_1(0)$ 不包含任何线段集, 即

$$\|x\|_X = \|y\|_X = 1 \wedge x \neq y \Rightarrow \forall \lambda \in (0, 1) (\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|_X < 1).$$



可以证明³只要 X 局部一致凸, 就有 $x_n \rightharpoonup x \wedge \|x_n\|_X \rightarrow \|x\|_X \Rightarrow x_n \rightarrow x$, 因此局部一致凸 Banach 空间上的范数自动成为 Kadec 范数. 我们接下来给出赋 Kadec 范数的 Banach 空间的下述重要结果:

定理 12.1

若 X 是赋 Kadec 范数 $\|\cdot\|_X$ 的 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, \sigma(X, X^*)) = \mathcal{B}(X, \|\cdot\|_X)$.



证明 设 $U \subset X$ 是强拓扑下的开集, 记

$$U' = \bigcup_{\exists r > 0} (\overline{B}_r(0) \cap (U \cup \overline{B}_r(0)^c)^{\circ, \sigma(X, X^*)}),$$

其中 $A^{\circ, \sigma(X, X^*)}$ 表示 A 在弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 下的内部. 因为 $\overline{B}_r(0)$ 是强拓扑下的闭凸集, 故它同样是弱拓扑下的闭凸集⁴, 从而 $U' \in \mathcal{B}(X, \sigma(X, X^*))$. 下面说明 $U = U'$. 一方面显见 $U' \subset U$, 另一方面任取 $y \in U$, 由 U 是开集

¹我在第一次阅读这里的时候把一些概念混淆了: 我联想到了弱拓扑的邻域基中每个基都可表为有限集, 但我错误地联想成了弱拓扑有可数邻域基, 进而错以为这里的断言指的是在 Y 中可以找到一列 $\{x_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得每次谈论 $\sigma(Y)$ 时只需利用这列元素中的有限个即可. 事实上弱拓扑未必有可数邻域基, 这里的断言也不是前面这种把 $\sigma(Y)$ 简化的意思. 参看 [MSE 上的相关讨论](#).

²参看 [GAE].

³参看 [KD]pg.112 Prop 12.1(b).

⁴参看 [HB]pg.60 Thm 3.7.

知存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B_\varepsilon(y) \subset U$. 现在根据 Kadec 性质知

$$y \notin \overline{B_{\|y\|_X}(0) \cap B_{\varepsilon/2}(y)^c}^{\sigma(X, X^*)} \Rightarrow y \in ((\overline{B_{\|y\|_X}(0)} \cap B_{\varepsilon/2}(y)^c)^{\circ, \sigma(X, X^*)}) = (B_{\varepsilon/2}(y) \cup \overline{B_{\|y\|_X}(0)}^c)^{\circ, \sigma(X, X^*)} = A.$$

因为 A 是 $\sigma(X, X^*)$ 中的一个开集 (进而也是强拓扑下的一个开集), 故存在 $\mathbb{Q} \ni r > \|y\|_X$ 使得 $y \in (r/\|y\|_X)A$, 且 $(r/\|y\|_X)B_{\varepsilon/2}(y) \subset B_\varepsilon(y)$, 因此

$$y \in (r/\|y\|_X)A \subset (B_\varepsilon(y) \cup \overline{B_r(0)}^c)^{\circ, \sigma(X, X^*)} \subset (U \cup \overline{B_r(0)}^c)^{\circ, \sigma(X, X^*)}.$$

故 $y \in \overline{B_r(0)} \cap (U \cup \overline{B_r(0)}^c)^{\circ, \sigma(X, X^*)} \subset U'$, 因此 $U = U'$, 故 $\mathcal{B}(X, \|\cdot\|_X) = \mathcal{B}(X, \sigma(X, X^*))$. $\square$

当 X 是可分 Banach 空间时, X 上自动赋有局部一致凸范数⁵, 因此 X 总可以视为赋 Kadec 范数的 Banach 空间, 故定理 12.1 对可分的 X 总成立. 接下来我们说明只要 $Y \subset X^*$ 是稠子空间, 就有 $\sigma(Y) = \mathcal{B}(X)$, 从而 X 可分时前面提到的 Borel σ 代数可能太大的问题并不存在.

命题 12.1

设 X 可分, Y 是 X^* 在弱 * 意义下的稠密线性子空间, 则

$$\sigma(Y) = \sigma(X^*) = \mathcal{B}(X).$$

证明 设

$$G = \{x^* \in X^* : \text{函数 } x \mapsto \langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} \text{ 是 } \sigma(Y) \text{ 可测的}\},$$

则由可测性对加法与数乘封闭可知 $G \supset Y$ 是 X^* 的线性子空间. 进一步若 $G \ni x_n^* \xrightarrow{*} x^* \in X^*$, 由 Y 的弱 * 稠密性知存在 $\{y_n^*\} \subset Y$ 使得 $y_n^* \xrightarrow{*} x^*$. 根据 $\sigma(Y)$ 的定义知每个 $x \mapsto \langle x, y_n^* \rangle_{X \times X^*}$ 均 $\sigma(Y)$ 可测, 亦即

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{K}) ((y_n^*)^{-1}(B) \in \sigma(Y)).$$

因为 $\mathbb{K}$ 上的 Borel σ 代数总能由开集诱导出来, 故不妨设 B 是 $\mathbb{K}$ 上的开集, 进一步不妨设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{K} = \mathbb{C}$ 的情形证明是类似的, 从而由 $\sigma(\{(-\infty, a)\}_{a \in \mathbb{R}}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 知不妨设 $B = (-\infty, a)$. 因为 $B = \emptyset, \mathbb{R}$ 时必有 $(x^*)^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \sigma(Y), (x^*)^{-1}(\mathbb{R}) = X \in \sigma(Y)$, 故不妨设 $a \in \mathbb{R}$.

接下来说明 $x^* \in G$. 根据弱 * 收敛的定义知

$$\forall x \in X (\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, y_n^* \rangle_{X \times X^*} = \langle x, x^* \rangle_{X \times X^*}),$$

故

$$\langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} \leq a \Rightarrow \exists N_a > 0 \forall n > N_a (\langle x, y_n^* \rangle_{X \times X^*} \leq a),$$

因此

$$(x^*)^{-1}((-\infty, a]) \subset \bigcap_{n=N_a+1}^{\infty} (y_n^*)^{-1}((-\infty, a]).$$

反之, 根据极限的保非严格不等号性知

$$\forall n > N_a (\langle x, y_n^* \rangle_{X \times X^*} \leq a) \Rightarrow \langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} \leq a,$$

这说明

$$\bigcap_{n=N_a+1}^{\infty} (y_n^*)^{-1}((-\infty, a]) \subset (x^*)^{-1}((-\infty, a]),$$

因此

$$(x^*)^{-1}((-\infty, a]) = \bigcap_{n=N_a+1}^{\infty} (y_n^*)^{-1}((-\infty, a]) \in \sigma(Y).$$

故 $x^* \in G$.

现在我们说明了 G 是弱 * 列闭的, 故由 Krein-Smulian 定理的一个推论⁶知 $G = X^*$, 这说明对全体 $x^* \in X^*$

⁵ 参看 [MMD]pg.160 Thm 1(a).

⁶ 若 X 可分, Y 是 X^* 的弱 * 稠密线性子空间, 且 Y 弱 * 列闭, 则 $Y = X^*$. 证明参看 [TJML].

而言, 函数 $x \mapsto \langle x, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 都是 $\sigma(Y)$ 可测的.

现设 $n \geq 1$, 取定 $x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*$, $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{K})$, 则 $B := B_1 \times \dots \times B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{K}^n)$, 且

$$\{x \in X : (\langle x, x_1^* \rangle_{X \times X^*}, \dots, \langle x, x_n^* \rangle_{X \times X^*}) \in B\} = \bigcap_{k=1}^n \{x \in X : \langle x, x_k^* \rangle_{X \times X^*} \in B_k\} = \bigcap_{k=1}^n (x_k^*)^{-1}(B_k) \in \sigma(Y).$$

记

$$\Sigma := \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{K}^n) : \{x \in X : (\langle x, x_1^* \rangle_{X \times X^*}, \dots, \langle x, x_n^* \rangle_{X \times X^*}) \in B\} \in \sigma(Y)\}. \quad (12.2)$$

则容易证明 Σ 是 σ 代数, 且显见全体 Borel 矩体 $B_1 \times \dots \times B_n$ 均在 Σ 内, 因此 $\mathcal{B}(\mathbb{K}^n) \subset \Sigma$. 因为上述过程对任意 $n \geq 1$ 与任意取的有限列 $\{x_k^*\}_{1 \leq k \leq n} \in X^*$ 均成立, 故

$$\bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{(x_k^*)_{1 \leq k \leq n} \in (X^*)^n} \bigcup_{B \in \mathcal{B}(\mathbb{K}^n)} \{x \in X : (\langle x, x_1^* \rangle_{X \times X^*}, \dots, \langle x, x_n^* \rangle_{X \times X^*}) \in B\} \subset \sigma(Y),$$

由(12.1)知上式生成的 σ 代数为 $\sigma(X^*)$, 因此 $\sigma(X^*) \subset \sigma(Y)$, 而另一方面由 $Y \subset X^*$ 立得 $\sigma(Y) \subset \sigma(X^*)$, 因此 $\sigma(X^*) = \sigma(Y)$.

接下来说明 $\sigma(X^*) = \mathcal{B}(X)$. 因为每个开集都能表为开球的可数并, 而每个开球都能表为闭球的可数并, 故只需说明每个闭球 $B(x_0, r) := \{x \in X : \|x - x_0\|_X \leq r\}$ 均在 $\sigma(X^*)$ 内. 因为 X 可分, 设 X_{ct} 是 X 的可数稠密子集, 则

$$\{x \in X : \|x - x_0\|_X \leq r\} = \bigcup_{\{x'_k\} \subset X_{\text{ct}}} \bigcap_{k \geq 1} \{x'_k \in X_{\text{ct}} : \|x'_k - x_0\|_X \leq r\}.$$

对 X_{ct} 中的每个元素 x'_k , 根据 Hahn-Banach 定理均能找到 x_k^* 使得

$$\|x'_k - x_0\|_X = \langle x'_k - x_0, x_k^* \rangle_{X \times X^*}, \quad \|x_k^*\|_{X^*} = 1.$$

因此

$$\{x'_k \in X_{\text{ct}} : \|x'_k - x_0\|_X \leq r\} = \{x'_k \in X_{\text{ct}} : \langle x'_k - x_0, x_k^* \rangle_{X \times X^*} \leq r\} \in \sigma(X^*),$$

故 $B(x_0, r) \in \sigma(X^*)$, 从而 $\mathcal{B}(X) \subset \sigma(X^*)$. □

注 当 X 不可分时, 严格包含关系 $\sigma(X^*) \subsetneq \mathcal{B}(X)$ 是可能存在的.

推论 12.1

若 X 可分, 则对函数 $f: S \rightarrow X$ 而言, 下述断言等价:

- (i) f 可测,
- (ii) 对全体 $x^* \in X^*$ 而言, $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均可测.



证明 因为 X 可分, 故 x^* 把 $\mathcal{B}(\mathbb{K})$ 中的元素映回为 $\sigma(X^*) = \mathcal{B}(X)$ 的元素, 而只要 f 可测, 它就把 $\mathcal{B}(X)$ 中的元素映回 S 上可测性对应的 σ 代数中的元素, 故 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 此时作为可测函数的复合必可测.

若对全体 $x^* \in X^*$ 而言 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均可测, 设 S 上可测性对应的 σ 代数为 $\mathcal{A}$, 则由 Hahn-Banach 定理知对每个 $s \in S$ 均存在 $x_s^* \in X^*$ 使得

$$\|f(s) - x_0\|_X = \langle f(s) - x_0, x_s^* \rangle_{X \times X^*}, \quad \|x_s^*\|_{X^*} = 1,$$

于是

$$f^{-1}(B(x_0, r)) = \{s \in S : \|f(s) - x_0\|_X \leq r\} = \{s \in S : \langle f(s) - x_0, x_s^* \rangle_{X \times X^*} \leq r\} \in \mathcal{A}.$$

因为 $B(x_0, r)$ 构成的球族能生成 $\mathcal{B}(X)$, 故 f 可测. □

强可测性

标量函数 Lebesgue 积分构造的基础是每个可测函数都能被一系列简单函数点态逼近. 因为可测函数的点态极限依旧可测, 故前述逼近过程暗示了可测性的概念和简单函数逼近之间有紧密联系, 这其实就是强可测性定义的思路. 现设 $(S, \mathcal{A})$ 是可测空间.

定义 12.4

称函数 $f: S \rightarrow X$ 是简单函数, 如果 f 形如 $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 其中 $A_n \in \mathcal{A}, x_n \in X, 1 \leq n \leq N$.



这里 $\mathbf{1}_A$ 是集合 A 的示性函数, $\otimes$ 指的是

$$(f \otimes x)(s) := f(s)x,$$

其中 $f: S \rightarrow \mathbb{K}, x \in X$. 另记

$$F \otimes X := \left\{ \sum_{n=1}^N f_n \otimes x_n : f_n \in F, x_n \in X, n = 1, \dots, N, N = 1, 2, \dots \right\},$$

其中 F 是标量函数构成的线性空间.

定义 12.5

称函数 $f: S \rightarrow X$ 强可测, 如果存在简单函数列 $f_n: S \rightarrow X$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 在 S 上点态成立.



如果另外还想强调强可测性的背景 σ 代数, 就称函数是强 $\mathcal{A}$ 可测的.

下面我们会说明如果 X 可分, 那么 X 值函数 f 强可测当且仅当它可测. 下例表明这一断言中可分一词不能省掉.

例 12.1

对任意不可分 Banach 空间 X , 恒同映射 $I: X \rightarrow X$ 均连续, 进而 I 可测, 但 I 并不强可测. 这是因为若 I 强可测, 则存在简单 Borel 函数列 $I_n: X \rightarrow X$ 点态收敛到 I . 设 V 是这些简单函数的值域构成的可数集, 则每个 $x \in X$ 都能表为 V 中某列点的极限, 这说明 X 可分, 矛盾! 通过相同的过程可以说明 I 甚至都不是强 2^X 可测的.

称函数 $f: S \rightarrow X$ 可分取值, 如果存在可分闭子空间 $X_0 \subset X$ 使得 $f(s) \in X_0 (\forall s \in S)$. 若对全体 $x^* \in X^*$ 而言, 函数

$$s \mapsto \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}(s) := \langle f(s), x^* \rangle_{X \times X^*}$$

均可测, 就称 f 弱可测.

定理 12.2 (Pettis 可测定理 (第一形式))

设 $(S, \mathcal{A})$ 是可测空间, Y 是 X^* 的弱 * 稠子空间, 则对函数 $f: S \rightarrow X$ 而言下述断言等价:

- (i) f 强可测;
- (ii) f 可分取值且弱可测;
- (iii) f 可分取值且 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 对全体 $x^* \in Y$ 均可测.

在 f 具有上述性质的前提下, 若 f 在 X 的某闭线性子空间 X_0 中取值, 则 f 可表为 X_0 值简单函数列的点态极限.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是点态收敛到 f 的简单函数列, X_1 是这列函数的值域构成的可数集张成的闭子空间, 则 X_1 可分且 f 在 X_1 中取值. 又因为每个 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 都是可测函数 $\langle f_n, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的点态极限, 故每个 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均可测.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 由弱可测蕴含 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 对全体 $x^* \in Y$ 均可测立得结论.

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 设 X_1 是 X 的可分闭子空间, 且 $f(s) \in X_1 (\forall s \in S)$, 记 $j_1: X_1 \subset X$ 是包含映射, 则 $j_1^*: X^* \rightarrow X_1^*, x^* \mapsto x^*$, 进而对每个 $x^* \in X^*$ 均有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} = \langle f, j_1^* x^* \rangle_{X_1 \times X_1^*}$, 其中左式把 f 看成了 X 值函数, 而右式把 f 看成了 X_1 值函数, 因此只需证明对每个 $x_1^* \in X_1^*$ 而言 $\langle f, x_1^* \rangle_{X_1 \times X_1^*}$ 均可测即可.

现设 Y_1 是 X_1^* 中使得 $\langle f, x_1^* \rangle_{X_1 \times X_1^*}$ 可测的全体 x_1^* 构成的子空间, 则 $j_1^*(Y) \subset Y_1$. 利用 j_1^* 是自伴算子立知 j_1^* 弱 * 连续, 故由 Y 的弱 * 稠密性知 $j_1^*(Y)$ 在 X_1^* 中弱 * 稠密, 进而 Y_1 也在 X_1^* 中弱 * 稠密. 又因为通过类似于

命题12.1证明的过程可以说明 Y_1 在 X_1^* 中弱*列闭, 故由 Krein-Smulian 定理的一个推论可知 $Y_1 = X_1^*$.

(ii)⇒(i): 设 f 在 X 的可分闭子空间 X_1 上取值, 根据可分性知 f 的每个取值都能诱导出 X 中的一列点 (这列点以该取值为极限), 而根据 Hahn-Banach 定理可知这列点能进一步诱导出 X^* 的一列用于刻画范数的单位向量 $\{x_n^*\}_{n \geq 1}$. 现在根据 f 的弱可测性知对每个 $x \in X_1$ 而言, 实值函数

$$s \mapsto \|f(s) - x\|_X = \sup_{n \geq 1} |\langle f(s) - x, x_n^* \rangle_{X \times X^*}|$$

均可测. 取 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 X_1 中的稠序列, 设 $x_1 = 0$.

接下来构造逼近函数 $\phi_n : X_1 \rightarrow \{x_1, \dots, x_n\}$. 对每个 $y \in X_1$, 设 $k(n, y)$ 满足 $1 \leq k \leq n$, 且 k 是满足下式的最小整数:

$$\|x_k\|_X \leq \|y\|_X \wedge \|y - x_k\|_X = \min_{1 \leq j \leq n} \|y - x_j\|_X.$$

取 $\phi_n(y) := x_{k(n, y)}$. 因为 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X_1 中稠密, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n(y) - y\|_X = 0, \quad \|\phi_n(y)\|_X \leq \|y\|_X, \quad \forall y \in X_1.$$

记 $f_n : S \rightarrow X$ 为

$$f_n(s) := \phi_n(f(s)), \quad \forall s \in S.$$

则对全体 $x \in X_1$ 均有 $\|f_n(x)\|_X \leq \|f(x)\|_X$, 且对全体 $1 \leq k \leq n$ 均有

$$\{f_n = x_k\} = \{\|f - x_k\|_X = \min_{1 \leq j \leq n} \|f - x_j\|_X < \min_{1 \leq j < k} \|f - x_j\|_X\}$$

上右式是 $\mathcal{A}$ 中的集合, 因此每个 f_n 都是在 X_1 中取值的简单函数, 且对全体 $s \in S$ 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(s) - f(s)\|_X = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n(f(s)) - f(s)\|_X = 0.$$

因此 f 强可测.

最后, 若已知可分取值的强可测函数 f 在闭线性子空间 X_0 中取值, 则 f 的可分值域 X_1 在 X_0 中, 利用 (ii)⇒(i) 中构造的简单函数列即得最后的结论. $\square$

接下来我们给出一些简单推论, 其中第一条推论是 (ii)⇒(i) 的直接产物.

推论 12.2

若 $f : S \rightarrow X$ 强可测, 则存在简单函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 使得

$$\|f_n(x)\|_X \leq \|f(x)\|_X, \quad f_n(x) \rightarrow f(x) (\forall x \in X).$$



推论 12.3

若 $f : S \rightarrow X$ 在 X 的某闭子空间 X_0 中取值, 则 f 作为 X 值函数强可测当且仅当 f 作为 X_0 值函数强可测.



推论 12.4

强可测函数列 $\{f_n : S \rightarrow X\}$ 的点态极限函数 $f : S \rightarrow X$ 强可测.



证明 因为每个 f_n 都在 X 的某个可分子空间中取值, 故 f 在这些子空间线性张成的闭空间中取值, 后者依旧可分. 函数 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的可测性源于每个 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 都是可测函数 $\langle f_n, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的点态极限. $\square$

下述推论点明了可测性与强可测性之间的具体关系.

推论 12.5

对函数 $f : S \rightarrow X$ 而言, 下述断言等价:

- (i) f 强可测;
- (ii) f 可分取值且可测.



证明 (i)⇒(ii): 若 f 强可测, 则 f 弱可测且可分取值, 设 f 在 X 的可分闭子空间 X_0 中取值. 既然 X_0 是 X 的闭子空间, 由 Hahn-Banach 定理可知 X_0^* 中的每个元素 $x_0^* : X_0 \rightarrow \mathbb{K}$ 均能延拓为 X 中的元素 $x^* : X \rightarrow \mathbb{K}$, 因此对任意 $x_0^* \in X_0^*$ 而言, 总存在 $x^* \in X^*$ 使得 $\langle f, x_0^* \rangle_{X_0 \times X_0^*} = \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$, 故 f 作为 X_0 值函数同样弱可测, 进而由推论 12.1 知 f 作为 X_0 值函数可测. 现设 $B \in \mathcal{B}(X)$, 则 $B_0 := B \cap X_0 \in \mathcal{B}(X_0)$, 进而

$$\{f \in B\} = \{f \in B_0\} \in \mathcal{A},$$

故 f 作为 X 值函数同样可测.

(ii)⇒(i): 若 f 可分取值且 f 可测, 则直接根据可测的定义知对全体 $x^* \in X^*$ 而言 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均可测, 进而由 Pettis 可测定理即知 f 强可测. $\square$




图 12.1: 定理 12.2 与推论 12.5 表明的不同可测性之间的联系。

若 $f : S \rightarrow X$ 强可测且在开集 $O \subset X$ 上取值, $\phi : O \rightarrow Y$ 连续, 其中 Y 是另一个 Banach 空间, 则 $\phi \circ f$ 强可测. 这是因为由 f 强可测知它是简单函数列 $\{f_n\}$ 的点态极限, 进而也是 $\tilde{f}_n := \mathbf{1}_{\{f_n \in O\}} f_n + \mathbf{1}_{\{f_n \in O^c\}} x_0$ 的点态极限, 其中 x_0 是 O 中某个取定的点. 容易说明 $\phi \circ \tilde{f}_n$ 良定义, 简单, 且点态收敛到 $\phi \circ f$, 此即待证.

上述结论可以推广至下述更一般的情形:

推论 12.6

设 $f : S \rightarrow X$ 强可测, $\phi : X \rightarrow Y$ 可测, 其中 Y 是 Banach 空间, 则 $\phi \circ f$ 强可测.



推论 12.6 的证明需要用到下述拓扑上的事实:

引理 12.1

设 E 是可分度量空间, F 是度量空间. 若 $f : E \rightarrow F$ 可测, 则 $f(E)$ 是 F 的一个可分子集.



证明 设 $f(E)$ 不可分, 则 F 中存在不可数个不交开集族 $\{O_i\}_{i \in I}$ 与 $f(E)$ 相交. 根据开集的任意并性质可知对每个 $I' \subset I$ 而言, $O_{I'} := \bigcup_{i \in I'} O_i$ 均为开集, 进而 $f^{-1}(O_{I'})$ 是 E 中的 Borel 集. 若 $I' \neq I''$, 则由不交性知 $O_{I'} \neq O_{I''}$, 进而 E 中至少有 $2^{|I|}$ 个 Borel 集, 但可分度量空间本身最多只有 $2^{|N|}$ 个 Borel 集⁷, 矛盾! $\square$

接下来证明推论 12.6.

证明 $\phi \circ f$ 作为可测函数的复合首先显然是可测的, 进而由推论 12.5 知只需说明 $\phi \circ f$ 在 Y 的某可分闭子空间中取值即可. 现在由 f 强可测知 f 在 X 的可分闭子空间 X_0 中取值, 进而 $\phi \circ f$ 在 Y 的子空间 $\phi(X_0)$ 中取值, 而由 ϕ 可测与引理 12.1 知 $\phi(X_0)$ 可分. $\square$

12.1.2 测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 上的函数

前面我们讨论的都是可测空间 $(S, \mathcal{A})$ 上 X 值函数的可测性质, 接下来我们研究定义在 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 上的函数.

⁷这件事我们后面有时间再证, 这里就先承认了.

定义 12.6

若 X 值函数 f 形如 $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 其中 $x_n \in X$, 集合 $A_n \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(A_n) < \infty$, 就称 f 是 μ -简单函数.



若对某个性质而言, 存在 μ -零测集 $N \in \mathcal{A}$ 使得该性质在 N^c 上成立, 就称该性质 μ -a.e. 成立. 注意 μ -a.e. 的定义没说该性质在 N 上成不成立, 这一性质可能在 N 的某子集上同样成立, 且该子集未必在 $\mathcal{A}$ 内.

定义 12.7

称函数 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测, 如果存在 μ -简单函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ μ -a.e. 收敛到 f .



当 $X = \mathbb{K}$ 时, 我们通常省略强这个前缀. 因此称函数 $f: S \rightarrow \mathbb{K}$ μ -可测, 如果存在 μ -简单函数列 $\{f_n: S \rightarrow \mathbb{K}\}$ μ -a.e. 收敛到 f .

如果测度 μ 存在穷竭列 (即 $\mathcal{A}$ 中的有限 μ -测度递增列 $S^{(1)} \subset S^{(2)} \subset \dots$, 且 $\bigcup_{n \geq 1} S^{(n)} = S$), 就称 μ 是 σ 有限的. 接下来的结果表明强 μ -可测函数在 μ -本质⁸的意义下支在 σ 有限测度空间上:

命题 12.2

若 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测, 则存在不交分解 $S = S_0 \cup S_1$, $S_0, S_1 \in \mathcal{A}$ 使得

- (i) $f \equiv 0$ 在 S_0 上 μ -a.e.;
- (ii) μ 在 S_1 上 σ 有限.



证明 设 $f_n \rightarrow f$ μ -a.e., 其中每个 f_n 都是 μ -简单函数, 不妨设 $f_n = \sum_{m=1}^{N_n} \mathbf{1}_{A_{mn}} \otimes x_{mn}$, 其中 $\mu(A_{mn}) < \infty$. 取 $S_1 = \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{m=1}^{N_n} A_{mn}$, $S_0 = S_1^c$ 即可. $\square$

下述结果指出了强可测性与强 μ -可测性之间的联系.

命题 12.3

考虑函数 $f: S \rightarrow X$.

- (i) 若 f 强 μ -可测, 则 f μ -a.e. 等于某强可测函数.
- (ii) 若 $\mu \sigma$ 有限, 且 f μ -a.e. 等于某强可测函数, 则 f 强 μ -可测.



证明 (i) 设 μ -简单函数列 $\{f_n\}$ 在 μ -零测集 $N \in \mathcal{A}$ 外点态收敛到 f , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{N^c} f_n = \mathbf{1}_{N^c} f$ 在 S 上点态成立. 因为 $\mathbf{1}_{N^c} f_n$ 是简单函数, 故 $\mathbf{1}_{N^c} f$ 强可测. 显见 $f = \mathbf{1}_{N^c} f$ μ -a.e..

(ii) 设 $\tilde{f}$ 强可测, μ -零测集 $N \in \mathcal{A}$ 满足在 N^c 上 $f = \tilde{f}$. 若 $\{\tilde{f}_n\}_{n \geq 1}$ 是点态收敛到 $\tilde{f}$ 的简单函数列, 则在 N^c 上有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n = \tilde{f}$, 进而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n = f$ μ -a.e.. 现在只要 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 μ 的一个穷竭列, 则函数 $f_n := \mathbf{1}_{S^{(n)}} \tilde{f}_n$ 就是 μ -简单函数, 进而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ μ -a.e.. $\square$

注

- 命题12.3(ii) 中 σ 有限的条件是不能拿掉的. 例如常值函数 $\mathbf{1}$ 永远是强可测函数, 但只有 $\mu \sigma$ 有限时它才是强 μ -可测函数.
- 从命题12.3(i) 出发可知可分取值的强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 必强 $\mathcal{A}_\mu$ 可测, 其中 $\mathcal{A}_\mu$ 是 $\mathcal{A}$ 关于 μ 的完备化, 即由 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}$ 中的全体 μ -零测集构成的集族生成的 σ 代数. 当 $\mu \sigma$ 有限时该结论的逆命题也成立.
- 本条注释讨论强 μ -可测函数的预像. 设 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测, 取强可测函数 $\tilde{f}: S \rightarrow X$ 满足 $f = \tilde{f}$ μ -a.e., 则由推论12.5知对全体 Borel 集 $B \in \mathcal{B}(X)$ 而言均有

$$\{\tilde{f} \in B\} := \{s \in S : \tilde{f}(s) \in B\} \in \mathcal{A}.$$

且 $\{\tilde{f} \in B\}$ 的 μ -测度并不随 $\tilde{f}$ 取法的改变而改变. 因此在没有额外声明时我们默认

$$\mu\{f \in B\} := \mu\{\tilde{f} \in B\}.$$

⁸即忽略 μ -零测集.

称 X 值函数 f μ -本质可分取值, 如果存在 X 的可分闭子空间 X_0 使得 $f(s) \in X_0$ 对 μ -a.e. 全体 $s \in S$ 均成立. 若 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 对全体 $x^* \in X$ 均成立, 就称 f 弱 μ -可测.

定理 12.3 (Pettis 可测定理 (第二形式))

对函数 $f: S \rightarrow X$ 而言, 下述断言等价:

- (i) f 强 μ -可测;
 - (ii) f μ -本质可分取值且弱 μ -可测;
 - (iii) f μ -本质可分取值, 且存在 X^* 的弱*稠子空间 Y 使得对全体 $x^* \in Y$ 均有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ μ -可测.
- 另若 f 能 μ -a.e. 地在 X 的某闭线性子空间 X_0 中取值, 那么 f 就能写成 X_0 值简单函数列的 μ -a.e. 点态极限.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) 的证明与定理 12.2 一样. (ii) $\Rightarrow$ (i) 时我们就要更加小心一点了, 这是因为定理 12.2 的对应过程只构造了简单函数列, 但它未必是 μ -简单函数列.

现设 X_1 是 f μ -a.e. 取值的可分闭子空间, $\{x_k^*\}_{k \geq 1}$ 是 X_1 的可分稠子集 $\{x_j\}_{j \geq 1}$ 通过 $\langle x_j, x_k^* \rangle_{X_1 \times X_1^*} = \|x_j\|_X$ 诱导的单位向量列. 现在由 f 弱 μ -可测知 $g_k = \langle f, x_k^* \rangle_{X \times X^*}$ μ -可测 (进而 g_k 强 μ -可测, 回忆对映入 $\mathbb{K}$ 的函数我们省略了“强”这个前缀), 故由命题 12.2 知存在分解 $S = S_{k,0} \cup S_{k,1}$ 使得在 $S_{k,0}$ 上 $g_k \equiv 0$ μ -a.e., 在 $S_{k,1}$ 上 μ - σ -有限. 取 $S_0 = \bigcap_{k \geq 1} S_{k,0}$, $S_1 := S_0^c$, 则在 S_0 上 $f \equiv 0$ μ -a.e., 在 S_1 上 μ - σ 有限.

上述过程表明可设 μ - σ 有限. 进而对全体 $x \in X$ 而言, 函数 $\mathbf{1}_S \otimes x$ 均强 μ -可测. 任取 $j, k \geq 1$, 显见每个 $g_{jk} = \langle f - x_j, x_k^* \rangle_{X \times X^*}$ 均 μ -可测, 进而由命题 12.3 知存在 μ -零测集 $N \in \mathcal{A}$ 使得函数 $\mathbf{1}_{N^c} g_{jk}$ 可测. 不妨设 $N^c = S$, 进而每个函数 g_{jk} 均可测, 从而取 $k = j$ 知 $\|f - x_j\|_X$ 也可测.

设 f_n 是定理 12.2(ii) $\Rightarrow$ (i) 部分中构造的简单函数, 则定理 12.2 的证明已经说明了 f_n 点态收敛到 f . 设 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 μ 的一个穷竭列, 则 $\mathbf{1}_{S^{(n)}} f_n \rightarrow f$ 同样是点态的, 且 $\mathbf{1}_{S^{(n)}} f_n$ 是 μ -简单函数, 至此便完成了 μ -简单函数逼近列的构造. $\square$

类似于 Pettis 可测定理第一形式的推论, 我们同样可以给出下述结果:

推论 12.7

若 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测, 则存在 μ -简单函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 使得

$$\|f_n(x)\|_X \leq \|f(x)\|_X, \quad f_n(x) \rightarrow f(x), \quad \forall \mu - \text{a.e. } x \in X.$$



推论 12.8

若 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测, 且 μ -a.e. 地在 X 的闭子空间 X_0 中取值, 则 f 作为 X_0 值函数同样强 μ -可测.



推论 12.9

强 μ -可测函数列 $\{f_n: S \rightarrow X\}$ 的 μ -a.e. 点态极限 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测.



推论 12.10

若 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测, $\phi: X \rightarrow Y$ 可测, 其中 Y 是 Banach 空间, 则只要下述条件之一成立, $\phi \circ f$ 就强 μ -可测:

- (i) μ - σ 有限;
- (ii) $\phi(0) = 0$.



证明 若 μ - σ 有限, 则由推论 12.6 与命题 12.3 立得结论.

若 $\phi(0) = 0$, 设 f 能被 μ -简单函数列 f_n μ -a.e. 点态逼近, 则 f 在全体 f_n 的支集之并外 μ -a.e. 为零. 现在根据命题 12.2 知 $\mu|_A$ 是 σ -有限测度, 而在 A 外 $\phi \circ f = 0$ μ -a.e.. 把 $f|_A$ 看成 A 上的强 $\mu|_A$ -可测函数, 应用已经证明的 (i) 即得结论. $\square$

注 就算 $X = Y = \mathbb{K}$, 上述推论中的条件也不能拿掉. 这是因为若 μ 不是 σ 有限测度, 则取 $f \equiv 0$, $\phi(t) \equiv 1 (\forall t \in \mathbb{K})$

即知 $1 = \phi \circ f$ 不是强 μ -可测函数.

称 $Y \subset X^*, F \subset X$. 如果对每对 $(x, y) \in F^2 (x \neq y)$ 均存在 $x^* \in Y$ 使得 $\langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} \neq \langle y, x^* \rangle_{X \times X^*}$, 就称 Y 分离 F 中的点. 为继续接下来的介绍, 我们首先需要引入下述命题:

命题 12.4

若 $F \subset X$ 可分, $Y \subset X^*$ 是弱*稠子集, 则 Y 包含一个分离 F 中点的序列.

证明 记

$$G := \{x - y : x \in F, y \in F, x \neq y\},$$

根据 Hahn-Banach 定理与 Y 的弱*稠密性知对每个 $g \in G$ 均存在 $x_g^* \in Y \cap \{x^* \in X^* : \langle g, x^* \rangle_{X \times X^*} \neq 0\}$. 定义

$$V_g := \{x \in G : \langle x, x_g^* \rangle_{X \times X^*} \neq 0\},$$

这便得到了可分度量空间 G 的一个开覆盖 $\{V_g\}_{g \in G}$. 根据 Lindelöf 定理, 可分度量空间的开覆盖总有可数子覆盖, 故 $\{V_g\}_{g \in G}$ 中可取出一个可数子覆盖, 进而存在 $\{g_n\}_{n=1}^\infty \subset G$ 使得 $\{V_{g_n}\}_{n=1}^\infty$ 覆盖 G . 现在每个满足 $(x, y) \in F^2, x \neq y$ 的 $x - y \in G$ 均在某个 V_{g_n} 内, 故 $\langle x - y, x_{g_n}^* \rangle_{X \times X^*} \neq 0$. $\square$

下述结果提供了一种把向量等式的证明化归为标量等式的方法. 该结果在强可测函数中的版本是显然成立的.

推论 12.11

若 f, g 是 X 值强 μ -可测函数, Y 是 X^* 的弱*稠子空间, 且对每个 $x^* \in Y$ 而言 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} = \langle g, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均 μ -a.e., 则 $f = g$ μ -a.e..

证明 由 Pettis 定理 12.3 知 f, g 均 μ -本质可分取值, 设 f, g 均在可分闭子空间 X_0 中 μ -a.e. 取值, 另设 μ -a.e. 所舍去的 μ -零测集为 N . 现由命题 12.4 知 Y 中存在序列 $\{x_n^*\}_{n \geq 1}$ 分离 X_0 中的点. 因为对每个 n 而言 $\langle f, x_n^* \rangle_{X \times X^*} = \langle g, x_n^* \rangle_{X \times X^*}$ 均在某个 μ -零测集 N_n 外成立, 故 f, g 在 μ -零测集 $N \cup (\bigcup_{n \geq 1} N_n)$ 外重合. $\square$

下例展示了怎样用上述结果验证强可测性.

例 12.2

设 X, Y 是 Banach 空间, X 可分, $T : X \rightarrow Y$ 是单射有界线性算子. 若 $f : S \rightarrow X$ 是满足 $T \circ f$ 强 μ -可测的函数, 则 f 强 μ -可测. 这是因为根据 X 的设置已知 f 可分取值, 且对全体 $y^* \in Y^*$ 而言函数 $\langle f, T^* y^* \rangle_{X \times X^*}$ 均 μ -可测. 现由 T 是单射知 T^* 有弱*稠密值域, 进而由 Pettis 可测定理立得前述结论.

注 上例中 X 可分这一假设不可省略, 否则取 $S = (0, 1), X = L^\infty(0, 1), Y = L^2(0, 1), T : X \ni f \mapsto f \in Y, f(t) = 1_{(0,t)}$ 即得反例.

12.1.3 算子值函数

我们接下来主要研究的都是算子值函数, 因此这里先预备一些这类函数的性质. 因为在通常的算子拓扑下, Banach 空间 $L(X, Y)$ 一般不可分, 故只有少数几个函数 $f : S \rightarrow L(X, Y)$ 强可测. 例如考虑映射

$$T : \mathbb{R} \rightarrow L(L^2(\mathbb{R})), t \mapsto T_t, T_t f(u) = f(u+t)(u \in \mathbb{R}).$$

下面说明上述函数在 $L(L^2(\mathbb{R}))$ 的一致算子拓扑下并不强可测. 任取 $(s, t) \in \mathbb{R}^2$ 满足 $s \neq t$, 知

$$\|T_s - T_t\|_{L^2 \rightarrow L^2} = 2,$$

故无论怎样取零测集 $N \subset \mathbb{R}$, 集合 $\{T_t : t \in \mathbb{R} \setminus N\}$ 都不可能为 $L(L^2(\mathbb{R}))$ 的可分闭子空间包含, 因此 $t \mapsto T_t$ 不可能可分取值, 由 Pettis 定理即知 $t \mapsto T_t$ 作为 $L(L^2(\mathbb{R}))$ 值函数并不强可测.

另一方面, 该函数的轨道 $t \mapsto T_t x$ 性质很好, 例如它在范数 $\|\cdot\|_{L^2(\mathbb{R})}$ 下连续. 因此我们对算子值函数考虑下述可测性:

定义 12.8

称函数 $f: S \rightarrow L(X, Y)$ 强可测 (或强 μ -可测), 如果对全体 $x \in X$ 而言 Y 值函数 $fx: s \mapsto f(s)x$ 均强可测 (或强 μ -可测).



更准确地说, 我们称这样的函数是关于强算子拓扑⁹强 (μ -) 可测的, 这样可以把它与关于一致算子拓扑的强可测性区分开. 上述定义实际上有一点术语混用了, 不过这是为了简便做出的牺牲.

命题 12.5

设 $(S, \mathcal{A})$ 是可测空间 (或 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间), X, Y 是 Banach 空间. 若 $f: S \rightarrow X, g: S \rightarrow L(X, Y)$ 均强 (μ -) 可测, 则 $gf: S \rightarrow Y$ 强 (μ -) 可测.



证明 根据 f 的强 (μ -) 可测性知存在 (μ -) 简单函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}(\mu\text{-a.e.})$ 点态收敛到 f , 进而 $gf_n \rightarrow gf(\mu\text{-a.e.})$ 点态成立. 又由 g 的强 (μ -) 可测性知 gf_n 强 (μ -) 可测, 故由推论 12.4 (推论 12.9) 即得 gf 的强 (μ -) 可测性. $\square$

推论 12.12

设 X, Y, Z 是 Banach 空间. 若 $f: S \rightarrow L(X, Y), g: S \rightarrow L(Y, Z)$ 强 (μ -) 可测, 则 $g \circ f: S \rightarrow L(X, Z)$ 强 (μ -) 可测.



证明 取定 $x \in X$. 因为 $s \mapsto f(s)x$ 作为 $S \rightarrow Y$ 的映射强 (μ -) 可测, 故命题 12.5 表明对全体 $x \in X$ 而言 $s \mapsto gf(s)x$ 均强 (μ -) 可测, 故 $g \circ f$ 强 (μ -) 可测. $\square$

12.2 积分

本节我们讨论 Lebesgue 积分的向量值延拓, 即 Bochner 积分. 在某些情形下我们也会用到 Bochner 积分的弱形式, 即 Pettis 积分.

12.2.1 Bochner 积分

取定向量空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$. 对 μ -简单函数 $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$ 而言, 定义

$$\int_S f d\mu := \sum_{n=1}^N \mu(A_n) x_n.$$

可以验证上述定义不依赖于 f 的表示方法, 且

$$\left\| \int_S f d\mu \right\|_X \leq \int_S \|f\|_X d\mu.$$

若 f, g 均为 μ -简单函数, 则

$$\int_S f d\mu + \int_S g d\mu = \int_S (f + g) d\mu.$$

定义 12.9

称强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 关于 μ Bochner 可积, 如果存在 μ -简单函数列 $\{f_n: S \rightarrow X\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_S \|f - f_n\|_X d\mu = 0.$$



⁹这里 $L(X, Y)$ 上的强算子拓扑是由映射 $T \mapsto Tx$ 生成的, 其中 x 取遍 X . $O \subset L(X, Y)$ 是该拓扑下的开集当且仅当对任意 $S \in O$ 而言均存在 $x_1, \dots, x_k \in X$ 与 $\varepsilon > 0$ 使得 $\bigcap_{j=1}^k \{T \in L(X, Y) : \|Sx_j - Tx_j\|_Y \leq \varepsilon\} \subset O$. 可以验证强算子拓扑下 $T_n \rightarrow T$ 当且仅当对任意 $x \in X$ 均有 $T_n x \rightarrow Tx$.

显见 $s \mapsto \|f(s) - f_n(s)\|_X$ 是 μ -可测的, 故上述定义没有超出前述 μ -简单函数 Bochner 积分的定义. 现由

$$\left\| \int_S f_n d\mu - \int_S f_m d\mu \right\|_X \leq \int_S \|f_n - f_m\|_X d\mu \leq \int_S \|f_n - f\|_X d\mu + \int_S \|f - f_m\|_X d\mu$$

可知积分列 $\{\int_S f_n d\mu\}$ 实际上是一个 Cauchy 列. 由 X 的完备性知该积分列收敛到 X 中的某元素, 称该积分列的极限为 f 关于 μ 的 Bochner 积分, 记之为

$$\int_S f d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S f_n d\mu.$$

可以验证该定义不依赖于逼近列的选取. 当测度 μ 已经约定好时, 我们就省掉关于 μ 这一前缀.

若 f Bochner 可积且 $f = g$ a.e., 则 g 也 Bochner 可积, 且 f 和 g 的 Bochner 积分重合. 因此在 Bochner 积分的定义中 f 只需要 a.e. 有定义即可.

命题 12.6

强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 关于 μ Bochner 可积当且仅当

$$\int_S \|f\|_X d\mu < \infty,$$

此时有

$$\left\| \int_S f d\mu \right\|_X \leq \int_S \|f\|_X d\mu.$$

证明 设 f 强 μ -可测, 且 $\int_S \|f\|_X d\mu < \infty$. 由推论 12.7 知可取 μ -简单函数列 f_n 使得在 a.e. 意义下有 $f_n \rightarrow f$ 且 $\|f_n\|_X \leq \|f\|_X$, 进而标量的控制收敛定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_S \|f_n - f\|_X d\mu = 0.$$

反之, 设 f Bochner 可积, μ -简单函数列 $\{f_n\}$ 由定义 12.9 给出, 则对任意足够大的 n 有

$$\int_S \|f\|_X d\mu \leq \int_S \|f - f_n\|_X d\mu + \int_S \|f_n\|_X d\mu < \infty.$$

最后, 不等式 $\left\| \int_S f d\mu \right\|_X \leq \int_S \|f\|_X d\mu$ 对 μ -简单函数来说是显见的, 对于一般情形利用推论 12.7 取 μ -简单函数列进行逼近即得结论. $\square$.

作为命题 12.6 的一个简单应用, 注意到若 $f: S \rightarrow X$ Bochner 可积, 则对全体 $A \in \mathcal{A}$ 而言截断函数 $\mathbf{1}_A f: S \rightarrow X$ 均 Bochner 可积, 且限制函数 $f|_A: A \rightarrow X$ 关于限制测度 $\mu|_A$ Bochner 可积. 另有

$$\int_S \mathbf{1}_A f d\mu = \int_A f|_A d\mu|_A.$$

因此这两个积分都可以记为 $\int_A f d\mu$.

利用推论 12.8 与命题 12.6 可以直接导出下述结果:

命题 12.7

设 $f: S \rightarrow X$ Bochner 可积. 若 X 的闭子空间 X_0 满足 $f(s) \in X_0 (\forall \text{ a.e. } s \in S)$, 则 f 作为 X_0 值函数同样 Bochner 可积, 且 $\int_S f d\mu \in X_0$.

由 Bochner 积分的定义知若 $f: S \rightarrow X$ Bochner 可积, 且 T 是 $X \rightarrow Y$ 的有界线性算子 (其中 Y 是 Banach 空间), 则 $Tf: S \rightarrow Y$ Bochner 可积, 且

$$T \int_S f d\mu = \int_S Tf d\mu. \quad (12.3)$$

特别对全体 $x^* \in X^*$ 有

$$\left\langle \int_S f d\mu, x^* \right\rangle_{X \times X^*} = \int_S \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu,$$

恒等式 (12.3) 可以进一步延拓到闭线性算子类上. 回忆对线性算子 $T: X \supset D(T) \rightarrow Y$ (其中 $D(T)$ 是 X 的线性子

空间, 称为 T 的定义域, Y 是 Banach 空间) 而言, 只要 T 的图

$$G(T) := \{(x, Tx) : x \in D(T)\}$$

是 $X \times Y$ 的闭子空间, 就称 T 是闭算子. 若 T 闭, 则 $D(T)$ 在图范数 $\|x\|_{D(T)} := \|x\|_X + \|Tx\|_Y$ 下是 Banach 空间, 且 T 是 $D(T) \rightarrow Y$ 的有界算子. 闭图像定理表明只要 $T : X \rightarrow Y$ 是闭线性算子且 $D(T) = X$, 则 T 有界.

定理 12.4 (Hille)

设 $f : S \rightarrow X$ Bochner 可积, T 是 $X \supset D(T) \rightarrow Y$ 的闭线性算子 (其中 Y 是 Banach 空间). 设 f a.e. 在 $D(T)$ 中取值, 且 a.e. 有定义的 $Tf : S \rightarrow Y$ Bochner 可积, 则 f 作为 $D(T)$ 值函数同样 Bochner 可积, $\int_S f d\mu \in D(T)$, 且

$$T \int_S f d\mu = \int_S Tf d\mu.$$

证明 注意到坐标映射和 Bochner 积分号可换, 进而根据命题 12.6 知若 X_1, X_2 是 Banach 空间, $f_1 : S \rightarrow X_1, f_2 : X \rightarrow S_2$ Bochner 可积, 则 $f = (f_1, f_2) : S \rightarrow X_1 \times X_2$ Bochner 可积, 且

$$\int_S f d\mu = \left(\int_S f_1 d\mu, \int_S f_2 d\mu \right).$$

回到命题的证明, 根据前述观察知函数 $g : S \rightarrow X \times Y, s \mapsto g(s) := (f(s), Tf(s))$ Bochner 可积. 又因为 g 在 $G(T)$ 内取值, 而根据 T 的闭性知 $G(T)$ 是 $X \times Y$ 的闭子空间, 故命题 12.7 表明 (f, Tf) 作为 $G(T)$ 值函数 Bochner 可积, 且特别有 $\int_S g d\mu \in G(T)$. 另一方面根据前述讨论知

$$\int_S g d\mu = \left(\int_S f d\mu, \int_S Tf d\mu \right),$$

由 $\int_S g d\mu \in G(T)$ 可知存在 $x_f \in X$ 使得

$$\left(\int_S f d\mu, \int_S Tf d\mu \right) = \int_S g d\mu = (x_f, Tx_f),$$

比对立得 $x_f = \int_S f d\mu$, 故只能有

$$T \int_S f d\mu = \int_S Tf d\mu.$$

最后, 映射 $x \mapsto (x, Tx)$ 可以作为 Banach 空间 $D(T), G(T)$ 之间的同构 $D(T) \simeq G(T)$, 故由 g 作为 $G(T)$ 值函数的 Bochner 可积性可得 f 作为 $D(T)$ 值函数的 Bochner 可积性. $\square$

定理 12.4 中的等式暗示了函数 $f : S \rightarrow D(T)$ 强 μ -可测, 这也可以从例 12.2 中看出来.

控制收敛定理, 换元法与 Fubini 定理

根据经验来看, 只要不含非负性假设, Lebesgue 积分理论的结果就可以照搬到 Bochner 积分中. 接下来我们说明 Bochner 积分理论中同样有控制收敛定理, 换元法则与 Fubini 定理.

命题 12.8 (控制收敛定理)

设函数 $f_n : S \rightarrow X$ Bochner 可积. 若存在函数 $f : S \rightarrow X$ 与非负可积函数 $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f_n \rightarrow f$ a.e., 且 $\|f_n\|_X \leq g$ a.e., 则 f Bochner 可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_S \|f_n - f\|_X d\mu = 0.$$

特别有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_S f_n d\mu = \int_S f d\mu.$$

证明 根据极限保不等号知 $\|f_n - f\|_X \leq 2g$ a.e., 进而由标量控制收敛定理即得结论. $\square$

命题 12.9 (换元法)

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $(T, \mathcal{B})$ 是可测空间, $\phi: S \rightarrow T$ 可测, $f: T \rightarrow X$ 强可测. 设 $\nu = \mu \circ \phi^{-1}$ 是 μ 在 ϕ 下的像测度, 则 $f \circ \phi$ 关于 μ Bochner 可积当且仅当 f 关于 ν Bochner 可积, 且当 $f \circ \phi$ Bochner 可积时有

$$\int_S f \circ \phi d\mu = \int_T f d\nu.$$

证明 根据 f, ϕ 的设置知 $f \circ \phi$ 可测, 且由 f 强可测知 f 可分取值, 进而 $f \circ \phi$ 可分取值, 从而由 Pettis 可测定理知 $f \circ \phi$ 强可测. 现设 $g = \mathbf{1}_A (A \in \mathcal{B})$, 则根据像测度的定义知

$$\int_T g d\nu = \nu(A) = \mu \circ \phi^{-1}(A) = \int_S \phi^{-1}(A) d\mu = \int_S \mathbf{1}_A \circ \phi d\mu,$$

因此待证等式至少对 $(T, \mathcal{B})$ 中的示性函数成立, 根据线性性知这一结果可以延拓到简单函数 g 上 (这里简单函数可以是向量值也可以是标量值). 根据单调收敛定理进一步可以把该结果延拓到非负可测函数 g 上, 由此可得

$$\int_S \|f \circ \phi\|_X d\mu = \int_T \|f\|_X d\nu,$$

这表明 $f \circ \phi$ Bochner 可积当且仅当 f Bochner 可积.

现设 $f: T \rightarrow X$ Bochner 可积, 由推论 12.2 知存在简单函数列 $\{f_n: T \rightarrow X\}$ 使得 $\|f_n\|_X \leq \|f\|_X$ 且 $f_n \rightarrow f$ 点态成立, 进而由控制收敛定理知

$$\int_S f \circ \phi d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S f_n \circ \phi d\mu \stackrel{(A)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_T f_n d\nu = \int_T f d\nu,$$

其中 (A) 用到了证明开头提到的简单函数的性质. □

若 $(S, \mathcal{A}), (T, \mathcal{B})$ 均为测度空间, 则记 $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ 为乘积 σ 代数 (即 $S \times T$ 中包含全体形如 $A \times B (A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B})$ 的集合的最小 σ 代数). 若 μ, ν 分别是 $(S, \mathcal{A}), (T, \mathcal{B})$ 上的 σ 有限测度, 则记 $\mu \times \nu$ 为乘积测度, 即 $(S \times T, \mathcal{A} \times \mathcal{B})$ 上满足 $\mu \times \nu(A \times B) = \mu(A)\nu(B) (\forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B})$ 的唯一 σ 有限测度.

利用标量值函数的 Pettis 可测定理与 Fubini 定理可以作出下述观察: 若 $f: S \times T \rightarrow X$ 强可测, 则对全体 $s \in S$ 而言函数 $t \mapsto f(s, t)$ 均强可测, 且对全体 $t \in T$ 而言函数 $s \mapsto f(s, t)$ 均强可测. 类似地, 若 $f: S \times T \rightarrow X$ 强 $\mu \times \nu$ -可测, 则对 μ -a.e. 全体 $s \in S$ 而言函数 $t \mapsto f(s, t)$ 均强 ν -可测, 且对 ν -a.e. 全体 $t \in T$ 而言函数 $s \mapsto f(s, t)$ 均强 μ -可测. 对于这些函数的 Bochner 可积性我们有下列结果:

命题 12.10 (Fubini 定理)

设 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是 σ 有限测度空间. 若 $f: S \times T \rightarrow X$ Bochner 可积, 则:

- (i) 对 a.e. $s \in S$ 而言, 函数 $t \mapsto f(s, t)$ Bochner 可积.
- (ii) 对 a.e. $t \in T$ 而言, 函数 $s \mapsto f(s, t)$ Bochner 可积.
- (iii) 函数 $s \mapsto \int_T f(s, t) d\nu(t), t \mapsto \int_S f(s, t) d\mu(s)$ Bochner 可积, 且

$$\int_{S \times T} f(s, t) d\mu \times \nu(s, t) = \int_T \int_S f(s, t) d\mu(s) d\nu(t) = \int_S \int_T f(s, t) d\nu(t) d\mu(s).$$

证明 根据 f 的设置知非负函数 $(s, t) \mapsto \|f(s, t)\|_X$ 可积, 进而由标量 Fubini 定理知对 a.e. $s \in S$ 而言函数 $t \mapsto \|f(s, t)\|_X$ 可积, 且对 a.e. $t \in T$ 而言函数 $s \mapsto \|f(s, t)\|_X$ 可积, 由命题 12.6 即得 (i), (ii). 现任意取定 $x^* \in X^*$, 由标量 Fubini 定理知

$$\int_{S \times T} \langle f(s, t), x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu \times \nu(s, t) = \int_T \int_S \langle f(s, t), x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu(s) d\nu(t) = \int_S \int_T \langle f(s, t), x^* \rangle_{X \times X^*} d\nu(t) d\mu(s).$$

(反复地) 利用 (12.3) 可把泛函 x^* 提出每个积分号, 进而令 x^* 为各个积分差值由 Hahn-Banach 定理诱导的保范单位向量即得结论. □

注 若 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是 (未必 σ 有限的) 任意测度空间, $f: S \times T \rightarrow X$ 是满足下式的强 $(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ -可测函数:

$$\int_T \int_S \|f(s, t)\|_X d\mu(s) d\nu(t) < \infty \text{ 或 } \int_S \int_T \|f(s, t)\|_X d\nu(t) d\mu(s) < \infty,$$

读者可能会好奇是否还有

$$\int_T \int_S f(s, t) d\mu(s) d\nu(t) = \int_S \int_T f(s, t) d\nu(t) d\mu(s).$$

答案实际上是否定的, 就算是对 $(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ -可测的示性函数我们也可以举出反例. 现取 $S = (0, 1)$ 是单位区间, 其上赋 Borel σ -代数诱导的 Lebesgue 测度. $T = (0, 1)$ 上赋 σ 代数 $2^{(0,1)}$ 与计数测度, 取 $f = \mathbf{1}_{\{s=t\}}$. 现在显见 f 是 $(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$ -可测的 (注意对角线可表为一列矩阵可数族之交), 但 f 没法用具有前述性质的任何简单函数逼近 (因为这样的逼近至多只能覆盖到 T 中的可数多个点).

凸性与积分

接下来我们研究 Bochner 积分与凸性相关的一些性质, 特别我们会导出 Jensen 不等式的一个向量值版本.

引理 12.2

设 C 是可分赋范空间 X 中的闭凸集, 则存在形如 $\phi_i = \operatorname{Re}\langle \cdot, x_i^* \rangle_{X \times X^*} - t_i$ 的仿射函数列 (其中 $x_i^* \in X^*, t_i \in \mathbb{R}$), 使得对全体 $x \in X$ 均有

$$x \in C \Leftrightarrow \forall i (\phi_i(x) \geq 0).$$

证明 因为 X 可分, 故存在序列 $\{x_i\}_{i=1}^\infty \subset C^c$ 在 C^c 中稠密. 记 $\delta_i := \operatorname{dist}(x_i, C) := \inf_{x \in C} \|x_i - x\|_X$, 由 C^c 是开集知 $\delta_i > 0$. 显见开球 $B(x_i, \delta_i)$ 是凸集, 且 $B(x_i, \delta_i)$ 与 C 不交, 进而由 Hahn-Banach 定理的几何形式知存在泛函 $x_i^* \in X^*$ 与实数 t_i 使得

$$\operatorname{Re}\langle x, x_i^* \rangle_{X \times X^*} \geq t_i > \operatorname{Re}\langle y, x_i^* \rangle_{X \times X^*}, \forall x \in C, y \in B(x_i, \delta_i).$$

故对任意 $x \in C$ 与 $i = 1, 2, \dots$ 均有 $\phi_i(x) := \operatorname{Re}\langle x, x_i^* \rangle_{X \times X^*} - t_i \geq 0$.

下面验证对任意 $y \in C^c$ 而言总存在 i 使得 $\phi_i(y) < 0$. 为此记 $\delta := \operatorname{dist}(y, C)$, 在上述过程确定的 $\{x_i\}$ 中取一个 x_i 使得 $\|x_i - y\|_X < \delta/2$, 则由三角不等式知 $\delta_i = \operatorname{dist}(x_i, C) > \delta/2$, 进而 $y \in B(x_i, \delta_i)$, 故 $\phi_i(x_i) < 0$. $\square$

若函数 $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\phi(x_0) \leq \liminf_{x \rightarrow x_0} \phi(x), \forall x_0 \in X,$$

则称 ϕ 下半连续.

引理 12.3

设 $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是可分赋范空间 X 上的凸下半连续函数, 则存在形如 $\phi_i = \operatorname{Re}\langle \cdot, y_i^* \rangle_{X \times X^*} + a_i$ ($y_i^* \in X^*, a_i \in \mathbb{R}$) 的仿射函数列 $\{\phi_i: X \rightarrow \mathbb{R}\}$ 使得

$$\phi(x) = \sup_i \phi_i(x), \forall x \in X.$$

证明 由 ϕ 凸知 $X \times \mathbb{K}$ 的子集 $C := \{(x, s) : \phi(x) \leq \operatorname{Re} s\}$ 是凸集, 又由 ϕ 下半连续知 C 是闭集. 进而引理 12.2 表明存在 $x_i^* \in X^*, s_i^* \in \mathbb{K}, t_i \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in X$ 而言均有

$$(x, s) \in C \Leftrightarrow \operatorname{Re}\langle x, x_i^* \rangle_{X \times X^*} + \operatorname{Re}(s \cdot s_i^*)_{\mathbb{K}^2} \geq t_i (\forall i = 1, 2, \dots). \quad (12.4)$$

注意到对取定的 $x \in X$ 而言, 只要 $\operatorname{Re} s$ 足够大, 就必有 $\phi(x) \leq \operatorname{Re} s$ (即 $(x, s) \in C$). 为使 (12.4) 与该观察一致, 我们需要 $\operatorname{Re} s_i^* > 0, \operatorname{Im} s_i^* = 0$, 进而在 (12.4) 两端同除 $s_i^* > 0$ 可得

$$\operatorname{Re} s \geq -\operatorname{Re} \left\langle x, \frac{x_i^*}{s_i^*} \right\rangle_{X \times X^*} + \frac{t_i}{s_i^*} =: \operatorname{Re}\langle x, y_i^* \rangle_{X \times X^*} + a_i =: \phi_i(x), \forall i = 1, 2, \dots.$$

上式进一步可等价地写为

$$\operatorname{Re} s \geq \sup_i \phi_i(x).$$

现在上式成立当且仅当 $(x, s) \in C$ (这是引理 12.2 给出的 ϕ_i 的性质), 根据 C 的定义知后者成立当且仅当 $\operatorname{Re} s \geq \phi(x)$, 故 $\phi(x) = \sup_i \phi_i(x)$. $\square$

接下来可以证明凸函数的主要不等式了:

命题 12.11 (Jensen 不等式)

设 $\mu(S) = 1$, $f: S \rightarrow X$ 是 Bochner 可积函数, $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸下半连续函数. 若 $\phi \circ f$ 可积, 则

$$\phi\left(\int_S f d\mu\right) \leq \int_S \phi \circ f d\mu.$$

证明 由 f Bochner 可积知 f 至少强可测, 进而不妨设 X 可分. 设 ϕ_i 是引理 12.3 断言存在的仿射函数列, 则由积分的线性性可知

$$\phi\left(\int_S f d\mu\right) = \sup_i \phi_i\left(\int_S f d\mu\right) = \sup_i \int_S \phi_i \circ f d\mu,$$

进而由点态控制 $\phi_i \circ f \leq \phi \circ f$ 与放大不等式可知

$$\int_S \phi_i \circ f d\mu \leq \int_S \phi \circ f d\mu, \forall i.$$

□

记 $\text{conv } V$ 为 $V \subset X$ 的凸包, 即

$$\text{conv } V := \left\{ \sum_{j=1}^k \lambda_j x_j : \lambda_j \geq 0, \sum_{j=1}^k \lambda_j = 1, x_j \in V, j = 1, \dots, k, k \in \mathbb{N} \right\}.$$

$\text{conv } V$ 的闭包记为 $\overline{\text{conv}} V$.

命题 12.12

设 $\mu(S) = 1$. 若 $f: S \rightarrow X$ 是 Bochner 可积函数, 则

$$\int_S f d\mu \in \overline{\text{conv}}\{f(s) : s \in S\}.$$

证明 由 f Bochner 可积蕴含的强可测性知可设 X 可分, 记 $C := \overline{\text{conv}}\{f(s) : s \in S\}$, ϕ_i 是 C 经引理 12.2 诱导得到的仿射函数列, 则

$$\phi_i\left(\int_S f d\mu\right) = \int_S \phi_i(f) d\mu \geq \int_S 0 d\mu = 0, \forall i.$$

因此 $\int_S f d\mu \in C$.

□

反之还有下述结论成立:

命题 12.13

设 $f: S \rightarrow X$ Bochner 可积, $C \subset X$ 是闭凸集. 若

$$\frac{1}{\mu(A)} \int_A f d\mu \in C, \forall A \in \mathcal{A}, 0 < \mu(A) < \infty,$$

则 $f(s) \in C$ 对 a.e. $s \in S$ 成立.

证明 由 f Bochner 可积蕴含的强可测性知可设 X 可分, 记 ϕ_i 是 C 经由引理 12.2 诱导得到的仿射函数列. 由命题假设知

$$\frac{1}{\mu(A)} \int_A \phi_i \circ f d\mu = \phi_i\left(\frac{1}{\mu(A)} \int_A f d\mu\right) \geq 0, \forall i, \forall A \in \mathcal{A}, 0 < \mu(A) < \infty.$$

由 A 的任意性知上式表明 $\phi_i \circ f \geq 0$ 对 a.e. $\forall i$ 均成立, 故 $f \in C$ a.e..

□

下述结果给出了判定两个可积函数何时 a.e. 相等的一个有用的判别法.

命题 12.14

设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是集族, $\mathcal{C}$ 对有限交封闭, $S \in \mathcal{C}$, 且 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A}$. 若 $f: S \rightarrow X$ Bochner 可积, 且

$$\int_C f d\mu = 0, \forall C \in \mathcal{C},$$

则 $f = 0$ a.e..

证明 由推论 12.11 知只需验证对全体 $x^* \in X^*$ 有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} = 0$ a.e.. 现对每个 $x^* \in X^*$ 而言, 有限 $\mathbb{K}$ 值测度 $\nu(A) := \int_A \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu$ 满足 $\forall C \in \mathcal{C} (\nu(C) = 0)$, 因此由 Dynkin π - λ 定理知 $\nu = 0$, 故 $\int_A f d\mu = 0$ 对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均成立. 在命题 12.13 中取 $C = \{0\}$ 即知 $f = 0$ a.e.. $\square$

12.2.2 Bochner 空间 $L^p(S; X)$

若强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X, g: S \rightarrow X$ 满足 $f(s) = g(s)$ 对 μ -a.e. $\forall s \in S$ 成立, 就称 f, g 等价. 显见该关系是 $S \rightarrow X$ 的全体强 μ -可测函数构成的集合上的一个等价关系. 在实践中我们一般就不把单个函数与该函数在该等价关系下的等价类区分开了.

定义 12.10

设 $1 \leq p < \infty$, 定义 $L^p(S; X)$ 为满足 $\int_S \|f\|_X^p d\mu < \infty$ 的全体强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ (的等价类) 构成的线性空间. 定义 $L^\infty(S; X)$ 为满足存在 $r \geq 0$ 使得 $\mu\{\|f\|_X > r\} = 0$ 的全体强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ (的等价类) 构成的线性空间.

若在 $L^p(S; X), L^\infty(S; X)$ 上分别赋

$$\|f\|_{L^p(S; X)} := \left[\int_S \|f\|_X^p d\mu \right]^{\frac{1}{p}}, \quad (12.5)$$

$$\|f\|_{L^\infty(S; X)} := \inf\{r \geq 0 : \mu\{\|f\|_X > r\} = 0\}, \quad (12.6)$$

则 $L^\infty(S; X) (1 \leq p \leq \infty)$ 成为 Banach 空间. 其证明其实就是逐字逐句重复标量情形的证明. 该证明特别表明若 $f_n \rightarrow f (L^p(S; X))$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得 $f_{n_k} \rightarrow f$ 在 X 中 a.e.. 显见 $L^1(S; X)$ 中的元素恰为 Bochner 可积函数 (的等价类).

对 $1 \leq p \leq \infty$, 简记 $L^p(S) := L^p(S; \mathbb{K})$. 根据定义可知强 μ -可测函数 $s \mapsto f(s)$ 在 $L^p(S; X)$ 内当且仅当 $s \mapsto \|f(s)\|_X$ 在 $L^p(S)$ 内. 标量情形下我们会把强 (μ -) 可测简称为 (μ -) 可测.

注 前面把 $L^\infty(S; X)$ 定义成了本质有界的强 μ -可测函数构成的空间, 并将 μ -a.e. 相等的函数视作等同. 对于 μ 并不 σ 有限的情形, 该空间其实要严格小于本质有界强可测函数 (的 a.e. 等价类) 构成的空间. 例如常值函数 $\mathbf{1} \otimes x$ 永远有界且强可测, 但该函数强 μ -可测 (进而在 $L^\infty(S; X)$ 内) 当且仅当 $\mu \sigma$ 有限.

$L^\infty(S; X)$ 定义中要求 f 强 μ -可测 (而非强可测) 的动机在于若简单函数 f 支在无限测度集上, 则 f 的 Bochner 积分实际上没有合理的定义. 在标量情形下, 该问题通常是通过先定义非负简单函数积分, 并允许积分取 ∞ 来规避的. 但在前面介绍的向量值情形下我们只能处理 μ -简单函数, 故 $L^\infty(S; X)$ 的定义在这一背景下是最自然的.

若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子 σ 代数, 则我们通常把关于测度空间 $(S, \mathcal{F}, \mu|_{\mathcal{F}})$ 的 L^p 空间记为 $L^p(S, \mathcal{F}; X)$. 该空间和由全体关于 $\mathcal{F}$ 强 μ -可测的函数的等价类构成的 $L^p(S; X)$ 的闭线性子空间重合. 记 $L^p(S; \mathcal{F}) := L^p(S, \mathcal{F}; \mathbb{K})$.

命题 12.15

对强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 而言, 下述断言等价:

- (i) $f \in L^\infty(S; X)$;
- (ii) $\forall x^* \in X^* (\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} \in L^\infty(S))$.

另有

$$\|f\|_{L^\infty(S; X)} = \sup_{\|x^*\|_{X^*} \leq 1} \|\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}\|_{L^\infty(S)}.$$

我们首先把上述命题证明的其中一个部分先用一个更一般的形式提出来, 该过程在后面也会用到:

引理 12.4

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, Y 是 Banach 空间 X 对偶空间 X^* 的一个闭子空间. 设函数 $f: S \rightarrow X$ 满足 $\forall x^* \in Y (\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} \in L^1(S))$, 则

$$T_f x^* := \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}, \quad x^* \in Y$$

定义了有界线性算子 $T_f: Y \rightarrow L^1(S)$.



证明 显见 T_f 良定义且线性, 接下来只要说明 T_f 是闭算子, 就能用闭图像定理推知 T_f 的有界性了. 设在 Y 中 $x_n^* \rightarrow x^*$, 且 $T_f x_n^* \rightarrow g$ ($L^1(S)$), 则在子列意义下¹⁰可设 $T_f x_n^* \rightarrow g$ 在 S 上 a.e.. 另一方面由 x_n^* 的收敛性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_f x_n^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, x_n^* \rangle_{X \times X^*} = \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 在 S 上点态成立, 故 $g = \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$, 进而 T_f 是闭算子. $\square$

下面证明命题 12.15.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) 由 Cauchy-Schwarz 不等式立得, 下面证明 (ii) $\Rightarrow$ (i). 不失一般性设 X 可分, 由 (ii) 与引理 12.4 知 $X^* \rightarrow L^\infty(S)$ 的映射 $x^* \mapsto \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 有界. 设 C 为该映射的范数. 由 X 可分知可取单位向量列 $\{x_n^*\}_{n \geq 1}$ 使得对 a.e. $s \in S$ 均有

$$\|f(s)\|_X = \sup_{n \geq 1} |\langle f(s), x_n^* \rangle_{X \times X^*}|.$$

现若 $\mu\{\|f\|_X > C\} = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} \{|\langle f(s), x_n^* \rangle_{X \times X^*}| > C\}\right)$ 严格正, 则至少存在某个 $n \geq 1$ 使得 $\mu\{|\langle f(s), x_n^* \rangle_{X \times X^*}| > C\} > 0$, 这与 C 的设置矛盾! $\square$

引理 12.5 (简单函数逼近)

设 $1 \leq p \leq \infty$.

- (i) μ -简单函数构成的空间在 $L^p(S; X)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. 特别地, $1 \leq p < \infty$ 时代数张量积 $L^p(S) \otimes X$ 在 $L^p(S; X)$ 中稠密.
- (ii) μ -简单函数构成的空间在依测度收敛的意义下在 $L^\infty(S; X)$ 中稠密. 准确来说, 若 $f \in L^\infty(S; X)$, $A \in \mathcal{A}$ 测度有限, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 而言均存在 μ -简单函数 $g: S \rightarrow X$ 与集合 $A' \in \mathcal{A}$ ($A' \subset A, \mu(A \setminus A') < \varepsilon$) 使得 $\|g\|_{L^\infty(S; X)} \leq \|f\|_{L^\infty(S; X)}$, 且

$$\sup_{s \in A'} \|f(s) - g(s)\|_X < \varepsilon.$$



证明 (i) 仿照命题 12.6 的证明即得, 下面证明 (ii). 不妨设 $\mu(S) < \infty$, 取定 $0 < \varepsilon < 1$, 进一步不妨设 X 可分且 $\|f\|_{L^\infty(S; X)} = 1$. 设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 X 中的 ε 网, 记

$$A_n = \left\{ s \in S : \|f(s) - x_n\|_X \leq \frac{\varepsilon}{4} \right\}, \quad (12.7)$$

$$B_1 = A_1, \quad B_{n+1} := A_{n+1} \setminus \bigcup_{j=1}^n B_j. \quad (12.8)$$

则函数 $g_n := \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{B_j} \otimes x_j$ 满足 $\|g_n\|_{L^\infty(S; X)} \leq 1 + \varepsilon/4$, 且

$$\sup_{s \in \bigcup_{j=1}^n B_j} \|f(s) - g_n(s)\|_X \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

故函数 $f_n := (1 + \varepsilon/4)^{-1} g_n$ 满足 $\|f_n\|_{L^\infty} \leq 1$, 且

$$\begin{aligned} \sup_{s \in \bigcup_{j=1}^n B_j} \|f(s) - f_n(s)\|_X &\leq \|f_n - g_n\|_{L^\infty(S; X)} + \frac{\varepsilon}{4} \\ &\leq \left(1 - \frac{1}{1 + \varepsilon/4}\right) \left(1 - \frac{\varepsilon}{4}\right) + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

因为 $\bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n = S$, 故 $\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) \uparrow \mu(S)$, 从而当 n 足够大时 $g = f_n$ 就是欲求的逼近函数. $\square$

¹⁰这里子列是针对 $p \in [1, \infty)$ 的情形提的. 当 $p = \infty$ 时不需要提子列.

注

- 由 (i) 特别可知每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ ($p \in [1, \infty)$) 都能被形如 $\sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{Q_j} \otimes x_j$ 的函数在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 的意义下逼近, 其中 $Q_j \subset \mathbb{R}^d$ 是各边平行于坐标轴的方体.
- 若 μ 是有限测度, $\mathcal{A}'$ 是能生成 $\mathcal{A}$ 的集代数, 则支在 $\mathcal{A}'$ 中集合上的 μ -简单函数构成的空间依旧在 $L^p(S; X)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.
- 有时我们会用可数值 μ -简单函数逼近 $L^\infty(S; X)$ 中的函数.

接下来我们用命题 12.15(i) 与命题 12.6 证明连续版本的 Minkowski 不等式. 虽说该不等式可以通过对函数 $s \mapsto \|f(s)\|_X$ 用标量版 Minkowski 不等式直接推出, 但接下来介绍的证明比标量版 Minkowski 不等式的证明更简洁.

命题 12.16 (连续版本的 Minkowski 不等式)

设 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间, X 是 Banach 空间, 则对任意 $1 \leq p \leq q < \infty$ 而言, 映射

$$\mathbf{1}_A \otimes (\mathbf{1}_B \otimes x) \mapsto \mathbf{1}_B \otimes (\mathbf{1}_A \otimes x)$$

都能唯一延拓为压缩嵌入

$$L^p(S; L^q(T; X)) \hookrightarrow L^q(T; L^p(S; X)).$$

证明 对函数 $f = \sum_{m=1}^N \mathbf{1}_{A_m} \otimes (\sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{B_n} \otimes x_{mn})$ ($\mu(A_m) < \infty, \nu(B_n) < \infty$) 而言, 命题 12.6 中的不等式表明

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^q(T; \nu; L^p(S; X))} &= \left[\int_T \left[\int_S \|f(x, y)\|_X^p d\mu(x) \right]^{\frac{q}{p}} d\nu(y) \right]^{\frac{1}{q}} \\ &= \left\| \int_S \|f(x, \cdot)\|_X^p d\mu(x) \right\|_{L^{q/p}(T)}^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\int_S \| \|f(x, \cdot)\|_X^p \|_{L^{q/p}(T)} d\mu(x) \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_S \left[\int_T \| \|f(x, y)\|_X^q d\nu(y) \right]^{\frac{p}{q}} d\mu(x) \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \|f\|_{L^p(S; \mu; L^q(T; X))}. \end{aligned}$$

由这类函数在 $L^p(S; L^q(T; X))$ 中稠密即得结论. □

$p = q$ 的情形会更特殊一些:

推论 12.13

设 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间, X 是 Banach 空间, 则对全体 $1 \leq p < \infty$ 而言映射 $\mathbf{1}_A \otimes (\mathbf{1}_B \otimes x) \mapsto \mathbf{1}_B \otimes (\mathbf{1}_A \otimes x)$ 均能诱导等距同构:

$$L^p(S; L^p(T; X)) \simeq L^p(T; L^p(S; X)).$$

上述推论可以看作 Fubini 定理, 不过这里不需要 σ 有限性, 这是因为此时我们给出的函数未必是 $S \times T \rightarrow X$ Bochner 可积的. 如果把 σ 有限性加上, 结果可以进一步强化:

命题 12.17

设 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是 σ 有限测度空间, $1 \leq p < \infty$, 则映射 $\mathbf{1}_A \otimes (\mathbf{1}_B \otimes x) \mapsto (\mathbf{1}_A \otimes \mathbf{1}_B) \otimes x$ 能唯一延拓为等距同构

$$\iota: L^p(S; L^p(T; X)) \simeq L^p(S \times T; X).$$

若 $\tilde{f}: S \times T \rightarrow X$ 是 $f \in L^p(S \times T; X)$ 对应等价类中的一个强 $(\mu \times \nu)$ -可测函数, 则对 a.e. $\forall s \in S$ 而言函数 $\tilde{f}(s, \cdot)$ 均在 $L^p(T; X)$ 中, 函数 $F: s \mapsto \tilde{f}(s, \cdot)$ 能定义 $L^p(S; L^p(T; X))$ 中的一个元素, 且 $\iota F = f$.

证明 由引理 12.5 与 $L^p(S \times T)$ 中形如 $\mathbf{1}_A \otimes \mathbf{1}_B$ 某种线性组合的 μ -简单函数构成空间的稠密性可知形如 $\mathbf{1}_A \otimes$

$(\mathbf{1}_B \otimes x)$ 与 $(\mathbf{1}_A \otimes \mathbf{1}_B) \otimes x$ 某种线性组合的 μ -简单函数构成的空间分别在 $L^p(S; L^p(T; X))$, $L^p(S \times T; X)$ 中稠密, 在这两种情形下我们均设 $\mu(A) < \infty, \nu(B) < \infty$. 现在对于这两个函数而言, 命题阐述中定义的映射显然是等距同构.

为证最后的断言, 设 $f \in L^p(S \times T; X)$ 取定, $\tilde{f}$ 是强 $(\mu \times \nu)$ -可测函数. 由 Fubini 定理 12.10 前的观察可知 $s \mapsto \tilde{f}(s, \cdot)$ 对 a.e. $\forall s \in S$ 强 ν -可测, 又由 Fubini 定理 12.10 知对 a.e. $s \in S$ 均有 $\|\tilde{f}(s, \cdot)\|_X \in L^p(T)$, 故对 a.e. $s \in S$ 均有 $\tilde{f}(s, \cdot) \in L^p(T; X)$.

下面验证 $L^p(T; X)$ 值函数 $F: s \mapsto \tilde{f}(s, \cdot)$ 强 μ -可测, 为此设 $f_n \rightarrow f$ ($L^p(S \times T; X)$), 其中每个 f_n 都是形如 $(\mathbf{1}_A \otimes \mathbf{1}_B) \otimes x$ 某种线性组合的 $(\mu \times \nu)$ -简单函数. 记 $F_n: s \mapsto f_n(s, \cdot)$, 由 Fubini 定理知 $\|F_n(\cdot) - F(\cdot)\|_{L^p(T; X)} \rightarrow 0$ ($L^p(S)$), 故在子列意义下可设 $\|F_n(s) - F(s)\|_{L^p(T; X)} \rightarrow 0$ 对 ν -a.e. $\forall s \in S$ 成立. 因为每个 $F_n: S \rightarrow L^p(T; X)$ 都是 μ -简单函数, 故 F 强 μ -可测.

对于形如前文描述的线性组合的 $(\mu \times \nu)$ -简单函数而言显然有 $\iota F = f$, 进而一般情形由稠密性立得. $\square$

上述命题在 $p = \infty$ 时会失效: 函数 $f(s, t) = \mathbf{1}_{\{0 < s < t < 1\}}$ 在 $L^\infty((0, 1) \times (0, 1))$ 内, 但它并不在 $L^\infty((0, 1); L^\infty(0, 1))$ 内 (这是因为它并不本质可分取值).

下面的结果表明在 $L^p(T; X)$ 中取值的 Bochner 积分是可以在点态 a.e. 的语境下谈的:

命题 12.18 (L^p 值积分的点态计算)

设 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间, X 是 Banach 空间, $1 \leq p < \infty$. 若 $F: S \rightarrow L^p(T; X)$ Bochner 可积, 则存在强可测函数 $f: S \times T \rightarrow X$ 使得:

- (i) 对 μ -a.e. $\forall s \in S$ 均有 $f(s, \cdot) = F(s)(L^p(T; X))$;
- (ii) 对 ν -a.e. $\forall t \in T$ 而言, 函数 $s \mapsto f(s, t)$ Bochner 可积, 且

$$\left(\int_S F d\mu \right)(t) = \int_S f(s, t) d\mu(s).$$

若 μ, ν 均 σ 有限, 则函数 f 可取成强 $(\mu \times \nu)$ -可测函数, 且它在下述意义下本质唯一: 若 $g: S \times T \rightarrow X$ 是另一个满足 (i) 的强 $(\mu \times \nu)$ -可测函数, 则 $g = f$ ($\mu \times \nu$)-a.e..

证明 我们把证明分成四步.

第一步: 用强 μ -可测性把两个测度化归为 σ 有限测度. 因为 F Bochner 可积蕴含了 F 强 μ -可测, 故由命题 12.2 知可设 μ σ 有限. 根据构造 (i) 知 f 在 μ -a.e. 地作为 $L^p(T; X)$ 值函数时强 μ -可测, 进而 f μ -a.e. 地在 $L^p(T; X)$ 的某可分闭子空间中取值. 下面的命题 12.19 表明这样的子空间总在形如 $L^p(T, \mathcal{B}', \nu|_{\mathcal{B}'}; Y)$ 的子空间内, 其中 $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ 是子 σ 代数, $\nu|_{\mathcal{B}'}$ σ 有限, Y 是 X 的可分闭子空间. 因此在承认命题 12.19 的基础上不失一般性可设 ν σ 有限.

第二步: 设 ν 是有限测度. 此时根据经典的 Lebesgue 嵌入知可以把 F 看成在 $L^1(T; X)$ 中取值的 Bochner 可积函数.

现取 f 是 ιF 的强可测表示¹¹, 其中 ι 是命题 12.17 中的映射. 由命题 12.17 知 f 满足 (i). 若 F 形如 $\mathbf{1}_A \otimes (\mathbf{1}_B \otimes x)$ 的某种线性组合 (其中 $\mu(A) < \infty, \nu(B) < \infty$, 方便起见这里就设 $F = \mathbf{1}_A \otimes (\mathbf{1}_B \otimes x)$), 则 $f = (\mathbf{1}_A \otimes \mathbf{1}_B) \otimes x$, 进而

$$\left(\int_S F d\mu \right)(t) = \mu(A) \mathbf{1}_B(t) x = \int_S (\mathbf{1}_A \otimes \mathbf{1}_B) \otimes x d\mu.$$

此即 (ii). 对于一般情形考虑逼近: 由 F Bochner 可积知存在形如前文的 μ -简单函数列 $\{F_n\}$ 使得 $F_n \rightarrow F$ ($L^1(S; L^1(T; X))$), 把 $L^1(S)$ 这一层写开并利用 Fubini 定理可得 $\int_S F_n d\mu \rightarrow \int_S F d\mu$ ($L^1(T; X)$), 进而在子列意义下可设

$$\left(\int_S F d\mu \right)(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_S F_n d\mu \right)(t), \quad \forall \text{ a.e. } t \in T.$$

因为 $\iota: L^1(S; L^1(T; X)) \rightarrow L^1(S \times T; X)$ 是等距同构, 故 $F_n \rightarrow F$ ($L^1(S; L^1(T; X))$) 表明 $f_n \rightarrow f$ ($L^1(S \times T; X)$) (其中 $f_n = \iota F_n$), 进而由 Fubini 定理知在子列意义下 $f_n(\cdot, t) \rightarrow f(\cdot, t)$ ($L^1(S; X)$) 对 a.e. $\forall t \in T$ 均成立, 故

¹¹ 即 ιF 的等价类中强可测的元素.

对 a.e. $\forall t \in T$ 有:

$$\begin{aligned} \left(\int_S F d\mu \right)(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_S F_n d\mu \right)(t) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S f_n(s, t) d\mu(s) = \int_S f(s, t) d\mu(s). \end{aligned}$$

第三步: 把 ν 优化为 σ 有限测度. 设 $\{T^{(j)}\}_{j \geq 1}$ 是 T 的有限测度不交分解, 对每个 $F^{(j)} = \mathbf{1}_{T^{(j)}} F$ 应用上述结论, 取 $f_j = \iota F^{(j)}$ 即可.

第四步: 证明唯一性. 设 g 是命题给出的函数. 因为对 a.e. $\forall s \in S$ 均有 $g(s, \cdot) = F(s)(L^p(T; X))$, 故对 a.e. 取定的 $s \in S$ 而言有 $g(s, t) = f(s, t) (\forall \text{ a.e. } t \in T)$, 进而由 Fubini 定理知对 $(\mu \times \nu)$ -a.e. $\forall (s, t) \in S \times T$ 均有 $g(s, t) = f(s, t)$. $\square$

注 若 ν σ 有限, 则上述结果对 $p = \infty$ 同样成立. 这里唯一用到 p 有限的地方是命题 12.19.

接下来介绍 Bochner 空间可分性的一个判别法, 我们首先需要引入下述概念.

定义 12.11

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间.

- (i) 若 $\mathcal{A}$ 中存在能生成 $\mathcal{A}$ 的序列 $\{S_n\}_{n \geq 1}$, 就称 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 可数可生成.
- (ii) 若 $\mathcal{A}$ 中存在能 μ -本质生成 $\mathcal{A}$ 的序列 $\{S_n\}_{n \geq 1}$ (即对 $\forall A \in \mathcal{A}$ 均存在 $A' \in \sigma(\{S_n\}_{n \geq 1})$ 使得 $\mu(A \Delta A') = 0$), 就称 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ μ -可数可生成.
- (iii) 若对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\mu(A) \in \{0, \infty\}$, 就称 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 纯无限.

这里 $A \Delta A' = (A \setminus A') \cup (A' \setminus A) = (A \cup A') \setminus (A \cap A')$ 表示 A 与 A' 的对称差.

例 12.3

$\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ 代数是可数可生成的 (例如用有理点处具有有理半径的球族即可), 但 $\mathbb{R}^d$ 的 Lebesgue σ 代数 (即 Borel σ 代数的完备化) 只能做到 λ -可数可生成, 这里 λ 是 Lebesgue 测度.

对 $A \in \mathcal{A}$, 记

$$\mathcal{A}|_A = \{A \cap B : B \in \mathcal{A}\} = \{B \in \mathcal{A} : B \subset A\}.$$

显见 $\mathcal{A}|_A$ 是 A 中的 σ 代数, μ 在 $\mathcal{A}|_A$ 上的限制记为 $\mu|_A$.

命题 12.19 (Bochner 空间的可分性)

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $1 \leq p < \infty$, X 是 Banach 空间. 若 $\dim L^p(S; X) \geq 1$, 则下述断言等价:

- (i) $L^p(S; X)$ 可分;
- (ii) X 可分, 且 S 存在 $\mathcal{A}$ 中的不交分解 $S = S_0 \cup S_1$, 使得 $(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}, \mu|_{S_0})$ 纯无限, $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{S_1})$ μ 可数可生成.

若上述条件成立, 则 $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{S_1})$ σ 有限, 且 $L^p(S; X) = L^p(S_1; X)$ 是等距同构.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 取定 $0 \neq x_0 \in X$, 显见 $\{f \otimes x_0 : f \in L^p(S)\}$ 作为 $L^p(S; X)$ 的闭子空间同样可分, 设 $\{f_n \otimes x_0\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是该子空间的稠子集, 容易验证 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 同样是 $L^p(S)$ 的稠子集, 故 $L^p(S)$ 可分. 同理取 $\{f_0 \otimes x : x \in X\}$ ($f_0 \neq 0$) 可知 X 可分. 现取 $L^p(S)$ 中的稠子集, 对该稠子集中的每个元素都用 μ -简单函数逼近. 记 S_1 是这一过程中用到的 $\mathcal{A}$ 中可数多个有限 μ -测度集之并, 显见 $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{S_1})$ σ 有限且 μ -可数可生成.

记 $S_0 = S_1^c$, 下面说明 $(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}, \mu|_{S_0})$ 纯无限. 若 $A_0 \in \mathcal{A}|_{S_0}$ 满足 $\mu(A_0) < \infty$, 则函数 $\mathbf{1}_{A_0} \in L^p(S)$ 能用前面提到的在 $L^p(S)$ 中稠密的 μ -简单函数列 μ -a.e. 逼近. 因为这些 μ -简单函数均 μ -a.e. 支在 S_1 上, 故 $\mathbf{1}_{A_0}$ 也应该 μ -a.e. 支在 S_1 上, 即 $\mu(A_0 \setminus S_1) = 0$. 但根据假设知 $A_0 \subset S_0$, 故只能有 $\mu(A_0) = 0$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): 记 $S = S_0 \cup S_1$, 则由 $L^p(S; X)$ 蕴含的可积性知全体 $f \in L^p(S; X)$ 均满足 $f|_{S_0} = 0$ a.e., 因此映射 $f \mapsto f|_{S_1}$ 是 $L^p(S; X) \rightarrow L^p(S_1; X)$ 的到上同构.

接下来说明当 $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{S_1})$ 能被可数集族 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A} (\mu(C_n) < \infty (\forall C_n \in \mathcal{C}))$ μ -可数生成时必有 $L^p(S_1; X)$ 可分. 设 $\mathcal{B}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 生成的集代数¹², 显见 $\mathcal{B}_1$ 可数. 由 $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{S_1})$ μ -可数可生成知对任取的 $A_1 \in \mathcal{A}|_{S_1}$, 总能找到 $A \in \sigma(\mathcal{B}_1) = \sigma(\mathcal{C})$ 使得 $\mu(A_1 \Delta A) = 0$, 进而存在¹³ $B \in \mathcal{B}_1$ 使得 $\mu(A_1 \Delta B) < \varepsilon$, 从而 $\mu(A \Delta B) < \varepsilon$. 现由引理 12.5 后的注¹⁴知 $L^p(S_1)$ 中的全体 μ -简单函数都能在 $L^p(S_1)$ 的意义下被 (可数多个) 示性函数 $\mathbf{1}_B (B \in \mathcal{B}_1)$ 的线性组合逼近, 因此这些示性函数的 $\mathbb{K}$ -有理线性组合可构成 $L^p(S_1)$ 的一个可数稠子集 U . 另设 V 是 X 的可数稠子集, 则 $U \otimes V$ 就是 $L^p(S_1; X)$ 的一个可数稠子集. $\square$

卷积与 $\mathbb{R}^d$ 上的磨光

本小节讨论测度空间 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \lambda)$ 上的 Bochner 空间 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 的一些结果, 其中 λ 是 Lebesgue 测度. 后面除非专门提到, 否则我们默认 $\mathbb{R}^d$ 上赋的是这一测度空间结构. 这里维数 $d \geq 1$ 是任取且固定的.

引理 12.6 (Young 不等式)

对 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$, $\phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 而言, 卷积

$$\phi * f(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \phi(y) f(x-y) dy$$

作为 Bochner 积分对 a.e. $\forall x \in \mathbb{R}^d$ 良定义, 且

$$\|\phi * f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq \|\phi\|_{L^1} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}.$$

证明 由 Hölder 不等式, Minkowski 不等式与 Fubini 定理知:

$$\begin{aligned} \|\phi * f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}^p &\leq \|\phi\|_{L^1}^p \int_{\mathbb{R}^d} \left[\int_{\mathbb{R}^d} \|f(x-y)\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \frac{|\phi(y)| dy}{\|\phi\|_{L^1}} \right]^p dx \\ &\leq \|\phi\|_{L^1}^p \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \|f(x-y)\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}^p \frac{|\phi(y)| dy}{\|\phi\|_{L^1}} dx \\ &= \|\phi\|_{L^1}^p \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \|f(x-y)\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}^p dx \frac{|\phi(y)| dy}{\|\phi\|_{L^1}} = \|\phi\|_{L^1}^p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}^p. \end{aligned}$$

上述估计同样确定了 Bochner 积分的存在性. $\square$

熟悉 Lusin 定理的读者会发现下述引理在把 $\mathbb{R}^d$ 换成赋正则 Borel 测度 μ 的任意局部紧 Hausdorff 空间后依旧成立, 但因为这里我们不需要这么一般的结果, 故我们只谈 $\mathbb{R}^d$ 的情形, 其证明相对也更简单.

引理 12.7

对任意 $p \in [1, \infty)$ 而言, 紧支函数空间 $C_c(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密. $\heartsuit$

证明 根据 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 蕴含的强 λ -可测性知 f 能被 λ -简单函数逼近, 其中 λ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度, 因此只需用紧支函数逼近示性函数 $\mathbf{1}_B$ 即可, 其中 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 是有限测度 Borel 集. 现在取定 B 与任意小的 $\varepsilon > 0$, 回忆命题 12.19 中提到的用集代数逼近 σ 代数的思路, 可知存在 $B' \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 形如矩体 $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$ 的有限并, 且对称差 $B \Delta B' = (B \setminus B') \cup (B' \setminus B)$ 的测度小于 ε , 进而 $B \Delta B'$ 对应示性函数的 L^p 范数小于 $\varepsilon^{\frac{1}{p}}$, 这说明只需用 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 逼近形如 $\mathbf{1}_Q$ 的示性函数即可, 其中 Q 是 $\mathbb{R}^d$ 中具有限变长的矩体, 但这一逼近直接用线性连接就能完成. $\square$

引理 12.7 可以用来导出下述非常有用的磨光逼近:

¹²注意集代数只对有限并补运算封闭.

¹³这里可以理解集代数中的元素可以在测度足够小的意义下逼近 σ 代数中的元素, B 是用来逼近 A 的.

¹⁴为什么可以用这一条注? 注要求 $\mu|_{S_1}$ 是有限测度, 但这里 $\mu|_{S_1}$ 未必有限吧.

命题 12.20 (磨光)

设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ ($p \in [1, \infty)$), $\phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 对 $\varepsilon > 0$, 记 $\phi_\varepsilon(y) := \varepsilon^{-d}\phi(\varepsilon^{-1}y)$, 则

$$\phi_\varepsilon * f \rightarrow c_\phi f \quad (L^p(\mathbb{R}^d; X)), \quad \varepsilon \downarrow 0,$$

其中 $c_\phi := \int_{\mathbb{R}^d} \phi(y) dy$.

证明 因为 $\int_{\mathbb{R}^d} \phi_\varepsilon(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} \phi(y) dy = c_\phi$, 故

$$\begin{aligned} \phi_\varepsilon * f(x) - c_\phi f(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} \phi_\varepsilon(y) [f(x-y) - f(x)] dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \phi(y) [f(x-\varepsilon y) - f(x)] dy, \end{aligned} \quad (12.9)$$

两端取 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 范数知

$$\|\phi_\varepsilon * f - c_\phi f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq \int_{\mathbb{R}^d} |\phi(y)| \|f(\cdot - \varepsilon y) - f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} dy.$$

因为 $\|f(\cdot - \varepsilon y) - f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq 2\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}$ 关于 ε, y 一致, 且 $\phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 故根据控制收敛定理知只需说明对每个取定的 $y \in \mathbb{R}^d$ 均有 $f(\cdot - \varepsilon y) \rightarrow f$ ($L^p(\mathbb{R}^d; X)$), 但后者在 $f \in C_c(\mathbb{R}^d; X)$ 时显见, 利用 $C_c(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中的稠密性即得结论. $\square$

12.2.3 Pettis 积分

尽管 Bochner 积分理论的结果很漂亮, 但 Bochner 可积的条件有时候还是太苛刻了. 本小节我们简单介绍一个更一般的积分, 即 Pettis 积分, 它可以理解为 Bochner 积分 (在泛函分析意义下) 的弱版本.

我们从最初设置开始. 设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, Y 是 Banach 空间 X 的对偶空间 X^* 的闭子空间. 设函数 $f: S \rightarrow X$ 满足对全体 $x^* \in Y$ 均有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} \in L^1(S)$. 由引理 12.4 知该函数能诱导有界线性映射:

$$T_f: Y \rightarrow L^1(S), \quad x^* \mapsto T_f x^* := \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}.$$

现对每个集合 $A \in \mathcal{A}$ 定义

$$\tau(X, Y)\text{-}\int_A f d\mu := T_f^* \mathbf{1}_A.$$

这里我们把函数 $\mathbf{1}_A \in L^\infty(S)$ 看成了对偶空间 $(L^1(S))^*$ 中的元素. 称 $\tau(X, Y)\text{-}\int_A f d\mu$ 为 f 在 A 上的 $\tau(X, Y)$ -积分. 知

$$\begin{aligned} \left\langle x^*, \tau(X, Y)\text{-}\int_A f d\mu \right\rangle_{Y \times Y^*} &= \langle x^*, T_f^* \mathbf{1}_A \rangle_{Y \times Y^*} \\ &= \int_A T_f x^* d\mu = \int_A \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu, \quad \forall x^* \in Y. \end{aligned}$$

且由 x^* 的任意性知 $\tau(X, Y)\text{-}\int_A f d\mu$ 是 Y^* 中唯一满足上式的元素.

例 12.4

设 $f: S \rightarrow X$ 是关于 μ 弱可积的函数 (即对 $\forall x^* \in X^*$ 均有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} \in L^1(S)$). 称 f 的 $\tau(X, X^*)$ -积分为 f 的弱积分. 注意对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\tau(X, X^*)\text{-}\int_A f d\mu \in X^{**}$.

例 12.5

设函数 $f: S \rightarrow X^*$ 弱 μ -可积 (即对 $\forall x \in X$ 均有 $\langle x, f \rangle_{X \times X^*} \in L^1(S)$). 称 $f: S \rightarrow X^*$ 的 $\tau(X^*, X)$ -积分为 f 的弱 $*$ 积分. 注意对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\tau(X^*, X)\text{-}\int_A f d\mu \in X^*$.

在例 12.4 中自然会问在怎样的条件下对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\tau(X, X^*)\text{-}\int_A f d\mu \in X$ (而不是仅仅在 X^{**} 内). 当 X 自反时这件事显然成立, 但一般来说 X 没法做到自反这么好, 因此我们需要下述定义.

定义 12.12

称弱 μ -可积函数 $f: S \rightarrow X$ Pettis 可积, 如果算子 $T_f: x^* \mapsto \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的伴随 T_f^* 把 $L^\infty(S)$ 映入 X .

这里 $L^\infty(S)$ 和对偶空间 $(L^1(S))^*$ 的某个可用于逼近范数¹⁵的闭子空间等距同构. 若 $\mu \sigma$ 有限, 则 $(L^1(S))^* = L^\infty(S)$. 我们暂时先承认这几条事实, 它们的向量值延拓版本会在下一节得到证明.

命题 12.21

对弱可积函数 $f: S \rightarrow X$ 而言, 下述断言等价:

- (i) f 关于 μ Pettis 可积;
- (ii) 对全体 $A \in \mathcal{A}$ 而言, 存在 $x_A \in X$ 使得对全体 $x^* \in X^*$ 均有

$$\langle x_A, x^* \rangle_{X \times X^*} = \int_A \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu. \quad (12.10)$$

在上述等价条件成立的情况下有

$$x_A = T_f^* \mathbf{1}_A =: (P)\text{-} \int_A f d\mu,$$

称之为 f 在 A 上的 Pettis 积分.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 取 $x_A = T_f^* \mathbf{1}_A \in X$ 即可.

(ii) $\Rightarrow$ (i): 我们分三步进行证明.

第一步: 设 μ 有限. 此时我们说明全体 μ -简单函数 g 都满足 $T_f^* g \in X$, 根据 T_f^* 的线性性知只需证明对任意 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $T_f^* \mathbf{1}_A \in X$ 即可, 为此首先回忆下述结果¹⁶:

推论 12.14

$x^{**} \in X^{**}$ 在 X 中当且仅当 x^{**} 在 B_{X^*} 上弱*连续.

现任取 $\{x_n^*\} \subset B_{X^*}$ 满足 $x_n^* \xrightarrow{*} x^*$, 则

$$\begin{aligned} \langle x_n^*, T_f^* \mathbf{1}_A \rangle_{X^* \times X^{**}} &= \int_A \langle f, x_n^* \rangle_{X \times X^*} d\mu \\ &\rightarrow \int_A \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu \\ &= \langle x^*, T_f^* \mathbf{1}_A \rangle_{X^* \times X^{**}}, \end{aligned}$$

故 $T_f^* \mathbf{1}_A \in X$. 另由 μ 有限知 μ -简单函数构成的集合在 $L^\infty(S)$ 上稠密, 因此 $T_f^* g \in X$ 对任意 $g \in L^\infty(S)$ 均成立, 此即 f 关于 μ Pettis 可积.

第二步: 用有限测度情形推导 σ 有限测度情形. 现设 $\mu \sigma$ 有限, 取可积函数 $w: S \rightarrow (0, 1)$. 因为 $\mu \sigma$ 有限, 故这样的 w 肯定可以取到, 进而测度 $\nu := w\mu$ 是有限测度. 现若 (12.10) 成立, 则由

$$\langle x_A, x^* \rangle_{X \times X^*} = \int_A \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu = \int_A \langle f/w, x^* \rangle_{X \times X^*} d\nu$$

知把 f, μ 分别换成 $f/w, \nu$ 后 (12.10) 依旧成立. 进一步对 $g \in L^\infty(S, \mu) = L^\infty(S, \nu)$ 知

$$\langle x^*, (T_f^{(\mu)})^* g \rangle_{X^* \times X^{**}} = \int_S \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} g d\mu = \int_S \langle f/w, x^* \rangle_{X \times X^*} g d\nu = \langle x^*, (T_{f/w}^{(\nu)})^* g \rangle_{X^* \times X^{**}},$$

其中 T 的上标表示 T 到达域对应背景空间的测度. 因为上述过程对任意 $x^* \in X^*$ 均成立, 故在 X^{**} 中 $(T_f^{(\mu)})^* g = (T_{f/w}^{(\nu)})^* g$. 因为前面已经说明了 (ii) $\Rightarrow$ (i) 对有限测度成立, 故 $(T_{f/w}^{(\nu)})^* g \in X$, 从而 $(T_f^{(\mu)})^* g \in X$, 因此 f 关于 μ Pettis 可积.

第三步: 证明一般测度情形. 现设 μ 是一般测度 (未必 σ 有限), 任取 $g \in L^\infty(S)$, 往证 $T_f^* g \in X$. 对 g 应用命题 12.2 知可对 S 作不交分解 $S = S_0 \cup S_1$, 使得在 S_0 上 $g \equiv 0$ a.e., 在 S_1 上 $\mu \sigma$ 有限. 将前面已经证明的 σ 有限情

¹⁵即对任意 $x \in L^1(S)$ 而言总有 $\sup_{0 \neq x^* \in L^\infty(S)} |\langle x, x^* \rangle_{L^1 \times (L^1)^*}| / \|x^*\|_{(L^1)^*} = \|x\|_{L^1}$, 原文用的是 norming.

¹⁶参看 [TJML] pg.523 Cor B.1.13 或 [LPD] pg.75 Thm 2.2, 后者包含的结论更广一些.

形应用到测度空间 $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{S_1})$ 上可得 $T_{f|_{S_1}}^* g|_{S_1} \in X$, 且对全体 $x^* \in X^*$ 有

$$\langle x^*, T_{f|_{S_1}}^* g|_{S_1} \rangle_{X^* \times X^{**}} = \int_{S_1} \langle f|_{S_1}, x^* \rangle_{X \times X^*} g|_{S_1} d\mu|_{S_1} = \int_S \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} g d\mu = \langle x^*, T_f^* g \rangle_{X^* \times X^{**}}.$$

故 $T_f^* g = T_{f|_{S_1}}^* g|_{S_1} \in X$. □

对 Bochner 可积函数 f 取 $x_A = \int_A f d\mu$ 即知 Bochner 可积必 Pettis 可积, 且这两种积分在每个 $A \in \mathcal{A}$ 上均相等, 此时 $T_f^* \mathbf{1}_A = \int_A f d\mu$. 之后我们会给出一个 Pettis 可积但不 Bochner 可积的例子.

下述结果给出了判定强 μ -可测函数 Pettis 可积的一个充分条件.

定理 12.5 (Pettis)

设 $1 < p \leq \infty, 1 \leq q < \infty$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 设强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 满足对全体 $x^* \in X^*$ 均有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} \in L^p(S)$, 则对全体 $\phi \in L^q(S)$ 而言, 函数 $s \mapsto \phi(s)f(s)$ 均 Pettis 可积. ♥

证明 我们主要对 $1 < q < \infty$ 证明结论, $q = 1$ 的情形是命题 12.15 的直接推论 (此时 $\phi f \in L^1(S; X)$ 作为 Bochner 可积函数必 Pettis 可积). 由命题 12.2 可知设 $\mu \sigma$ 有限, 设 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 μ 对应的穷竭列.

由引理 12.4 知线性映射 $T_f: X^* \rightarrow L^p(S)$, $x^* \mapsto \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 有界, 且

$$\int_S |\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}|^p d\mu \leq \|T_f\|_{X^* \rightarrow L^p}^p \|x^*\|_{X^*}^p, \quad \forall x^* \in X^*.$$

由 f 的强 μ -可测性知函数 $s \mapsto \|f(s)\|_X \mu$ 可测. 取定 $A \in \mathcal{A}$, 记 $A_n := A \cap \{\|f\|_X \leq n\} \cap S^{(n)}$, 由命题 12.6 知积分 $x_n := \int_{A_n} \phi f d\mu \in X$ 作为 Bochner 积分存在, 下面说明 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 Cauchy 列.

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N \geq 1$ 足够大使得

$$\int_{S \setminus S^{(N)}} |\phi|^q d\mu < \varepsilon^q.$$

对任意 $n \geq m \geq N$ 与任意 $x^* \in X^*$ 而言, 注意到 $A_n \setminus A_m \subset S \setminus S^{(N)}$, 由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} |\langle x_n - x_m, x^* \rangle_{X \times X^*}| &\leq \int_{A_n \setminus A_m} |\phi| |\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}| d\mu \\ &\leq \int_{S \setminus S^{(N)}} |\phi| |\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}| d\mu \\ &\leq \left[\int_{S \setminus S^{(N)}} |\phi|^q d\mu \right]^{\frac{1}{q}} \left[\int_S |\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}|^p d\mu \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \varepsilon \|T_f\|_{X^* \rightarrow L^p} \|x^*\|_{X^*}. \end{aligned}$$

上式两端对满足 $\|x^*\|_{X^*} \leq 1$ 的全体 $x^* \in X^*$ 取上确界, 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即知 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 Cauchy 列, 因此极限

$$x_A := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \phi f d\mu$$

在 X 中存在. 显见对全体 $x^* \in X^*$ 均有

$$\langle x_A, x^* \rangle_{X \times X^*} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \phi \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu = \int_A \phi \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu.$$

由此即得 ϕf Pettis 可积. □

推论 12.15

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间, $p > 1$. 若 $f: S \rightarrow X$ 强可测, 且对全体 $x^* \in X^*$ 均有 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} \in L^p(S)$, 则 f Pettis 可积. ♥

然而当 $p = 1, q = \infty$ 时, 定理 12.5 与推论 12.15 将失效:

例 12.6

设 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 是区间 $(0, 1)$ 中的一列正测度不交区间列, 定义 $f: (0, 1) \rightarrow c_0$ 为 $f = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{A_n} \otimes e_n / |A_n|$, 这里 c_0 是趋零序列构成的空间, $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 是 c_0 的一组标准单位基, 显见 f 强可测且弱可积. 记 $x^{**} \in l^\infty = c_0^{**}$ 为 f 的弱积分, 则对全体 $n \geq 1$ 均有

$$\langle e_n^*, x^{**} \rangle_{X^* \times X^{**}} = \int_0^1 \langle f(t), e_n^* \rangle_{X \times X^*} dt = 1,$$

这表明 $x^{**} = \mathbf{1}$ (即 l^∞ 中的常值 1 向量). 该向量显然不在 c_0 中, 进而 f 并不 Pettis 可积.

上例同样解释了为什么命题 12.21(ii) 要对全体 $A \in \mathcal{A}$ 成立, 而非仅仅 (像 Lebesgue 积分那样) 对 S 谈. 利用上例还可以构造更极端的例子. 例如令 $A := (0, 2)$, 取 $f: (0, 1) \rightarrow c_0$ 是例 12.6 给出的函数, 定义 $g: S \rightarrow c_0$ 为

$$g(t) := \begin{cases} f(t), & t \in (0, 1), \\ -f(t-1), & t \in (1, 2), \end{cases}$$

则弱积分 $\tau(c_0, l^1) \cdot \int_S g(t) dt = 0$, 进而 $\tau(c_0, l^1) \cdot \int_S g(t) dt \in c_0$, 但 $\tau(c_0, l^1) \cdot \int_0^1 g(t) dt$ 和 $\tau(c_0, l^1) \cdot \int_1^2 g(t) dt$ 均在 $l^\infty \setminus c_0$ 内.

接下来说明其实本质上例 12.6 是唯一一个强可测函数弱可积但不 Pettis 可积的例子, 为此需要准备 Banach 空间理论中的下述经典结果:

定理 12.6 (Bessaga-Pelczyński)

设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 Banach 空间 X 中的序列, 且 $\inf_{n \geq 1} \|x_n\|_X > 0$. 若存在有限常数 $C \geq 0$ 使得对全体 $k \geq 1$ 与全体符号 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_k \in \{-1, 1\}$ 均有

$$\left\| \sum_{j=1}^k \epsilon_j x_j \right\|_X \leq C,$$

则 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 张成的闭线性空间包含一个与 c_0 同构的子空间.

证明 命题条件表明对全体 n 均有 $\|x_n\|_X \leq 2C$, 因此不失一般性可设对全体 $n \geq 1$ 均有 $\|x_n\|_X = 1$.

设 $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ 满足 $\max_{1 \leq j \leq n} |b_j| \leq 1$. 若 b_j 均为实数, 则 $(b_1, \dots, b_n)$ 可表为 2^n 个形如 $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) (\epsilon_j \in \{-1, 1\})$ 的元素的凸组合, 进而

$$\left\| \sum_{j=1}^n b_j x_j \right\|_X \leq C.$$

若 b_j 是复数, 我们就把它的实部和虚部分开看, 通过相同的过程同样可以得到上述估计, 只是右端常数变为 $2C$.

现在对 $k = 1, 2, 3, \dots$ 记

$$a_k := \sup \left\{ \left\| \sum_{j=k}^l b_j x_j \right\|_X : l \geq k, |b_j| \leq 1 (\forall k \leq j \leq l) \right\}.$$

显见对全体 $k \geq 1$ 均有 (实值标量情况下) $1 \leq a_k \leq C$ 或 (复值标量情况下) $1 \leq a_k \leq 2C$, 且 $a_1 \geq a_2 \geq \dots$. 记 $a := \lim_{k \rightarrow \infty} a_k$, 取 $k_1 \geq 1$ 满足

$$a_{k_1} \leq \frac{4}{3}a. \quad (12.11)$$

根据 a_k 的上确界性质可知可取 $k_2 > k_1$ 与模长不超过 1 的标量 $b_{k_1}, \dots, b_{k_2-1}$ 使得

$$\left\| \sum_{j=k_1}^{k_2-1} b_j x_j \right\|_X > \frac{3}{4}a.$$

重复这种选取可得序列 $k_1 < k_2 < \dots$ 与向量 $y_i := \sum_{j=k_i}^{k_{i+1}-1} b_j x_j$ 使得 $\|y_i\|_X > 3a/4$, 且 $|b_j| \leq 1 (\forall j)$. 显见 $\text{span}\{y_i\}_{i \geq 1}$ 是 $\text{span}\{x_n\}_{n \geq 1}$ 的子空间, 下面说明 $\text{span}\{y_i\}_{i \geq 1}$ 与 c_0 同构. 对任意 $n \geq 1$ 与任意标量 $c_1, \dots, c_n$,

由(12.11)知

$$\left\| \sum_{i=1}^n c_i y_i \right\|_X = \left\| \sum_{i=1}^n \sum_{j=k_i}^{k_{i+1}-1} c_i b_j x_j \right\|_X \leq \frac{4}{3} a \max_{\substack{1 \leq i \leq n \\ k_1 \leq j \leq k_{n+1}-1}} |c_i b_j| \leq \frac{4}{3} a \max_{1 \leq i \leq n} |c_i|.$$

另一方面, 若 $\max_{1 \leq i \leq n} |c_i| = |c_{i_0}|$, 则设

$$\tilde{c}_i = \begin{cases} c_i, & i \neq i_0, \\ -c_i, & i = i_0, \end{cases}$$

可得

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^n c_i y_i \right\|_X &\geq 2 \|c_{i_0} y_{i_0}\|_X - \left\| \sum_{i=1}^n \tilde{c}_i y_i \right\|_X \\ &\geq \frac{3}{2} a |c_{i_0}| - \left\| \sum_{i=1}^n \tilde{c}_i y_i \right\|_X \\ &\geq \frac{3}{2} a |c_{i_0}| - \frac{4}{3} a \max_{1 \leq i \leq n} |c_i| = \frac{1}{6} a \max_{1 \leq i \leq n} |c_i|. \end{aligned}$$

因此映射 $c_0 \ni (c_1, c_2, \dots) \mapsto (c_1 y_1, c_2 y_2, \dots) \in \overline{\text{span}}\{y_i\}_{i \geq 1}$ 是同构. $\square$

命题 12.22

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, X 不包含任何与 c_0 同构的闭子空间. 若 $f: S \rightarrow X$ 强 μ -可测且弱可积, 则 f Pettis 可积.

证明 用反证法, 设 f 强 μ -可测且弱可积, 但并不 Pettis 可积. 由强 μ -可测性与命题 12.2 知不妨设 $\mu \sigma$ 有限, 设 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 μ 对应的穷竭列, 记 $A_n := \{\|f\|_X \leq n\} \cap S^{(n)}$. 取 $g \in L^\infty(S)$, 若通过 Bochner 积分 $x_n^g := \int_{A_n} g f d\mu$ 定义的序列 $\{x_n^g\}_{n \geq 1}$ 在 X 中能收敛到某个极限 x^g , 对全体 $x^* \in X^*$ 就有

$$\langle x^g, x^* \rangle_{X \times X^*} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} g \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu = \int_S g \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu = \langle x^*, T_f^* g \rangle_{X \times X^*},$$

其中 $T_f^*: L^\infty \rightarrow X^{**}$ 是算子 $T_f: X^* \rightarrow L^1(S), x^* \mapsto \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的对偶. 由上式可知 $T_f^* g = x^g \in X$.

现在根据反证假设 f 并不 Pettis 可积, 故必存在 $g \in L^\infty(S)$ 使得它对应的序列 $\{x_n^g\}_{n \geq 1}$ 没法在 X 中收敛. 不失一般性设 $\|g\|_{L^\infty} = 1$, 取 $\varepsilon > 0$ 与角标 $m_1 < n_1 < m_2 < n_2 < \dots$ 使得

$$\|x_{n_j}^g - x_{m_j}^g\|_X \geq \varepsilon, \quad j = 1, 2, \dots$$

记 $y_j := x_{n_j}^g - x_{m_j}^g = \int_{A_{n_j} \setminus A_{m_j}} g f d\mu$, 则 $\|y_j\|_X \geq \varepsilon$, 且对全体有限标量列 $a = (a_1, \dots, a_k)$ 与 $x^* \in X^*$ 有:

$$\begin{aligned} \left| \left\langle \sum_{j=1}^k a_j y_j, x^* \right\rangle_{X \times X^*} \right| &= \left| \sum_{j=1}^k \int_{A_{n_j} \setminus A_{m_j}} a_j g \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu \right| \\ &\leq \|a\|_{l^\infty} \sum_{j=1}^k \int_{A_{n_j} \setminus A_{m_j}} |g| |\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}| d\mu \\ &\leq \|a\|_{l^\infty} \|T_f\|_{X^* \rightarrow L^1} \|x^*\|_{X^*}, \end{aligned}$$

其中 $\|a\|_{l^\infty} := \max_{1 \leq j \leq k} |a_j|$. 进而

$$\left\| \sum_{j=1}^k a_j y_j \right\|_X \leq \|a\|_{l^\infty} \|T_f\|_{X^* \rightarrow L^1}.$$

由 Bessaga-Pelczyński 定理 12.6 即知 X 有一个同构于 c_0 的闭子空间, 矛盾! $\square$

通过逐字逐句重复命题 12.11-12.14 的证明可知 Pettis 积分同样有这些性质, 即:

命题 12.23

设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是包含 S , 对有限交封闭, 且满足 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A}$ 的集族. 若 $f: S \rightarrow X$ Pettis 可积, 且满足

$$(P)\text{-}\int_C f d\mu = 0, \forall C \in \mathcal{C},$$

则 $f = 0$ μ -a.e..

命题 12.24 (Jensen 不等式)

设 $\mu(S) = 1$, $f: S \rightarrow X$ 是 Pettis 可积函数, $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是下半连续凸函数, 且 $\phi \circ f$ 可积, 则

$$\phi\left((P)\text{-}\int_S f d\mu\right) \leq \int_S \phi \circ f d\mu.$$

命题 12.25

设 $\mu(S) = 1$, 若 $f: S \rightarrow X$ 是 Pettis 可积函数, 则

$$(P)\text{-}\int_S f d\mu \in \overline{\text{conv}}\{f(s) : s \in S\}.$$

命题 12.26

设 $f: S \rightarrow X$ Pettis 可积, $C \subset X$ 是闭凸集. 若

$$\frac{1}{\mu(A)}(P)\text{-}\int_A f d\mu \in C, \forall A \in \mathcal{A}, 0 < \mu(A) < \infty,$$

则 $f(s) \in C$ 对 a.e. $s \in S$ 成立.

12.3 Bochner 空间的对偶

经典 Lebesgue 空间理论的一大基石在于 $L^{p'}(S)$ 可以用来表示 $L^p(S)$ 上的全体有界线性泛函 (其中 $p \in [1, \infty)$, $1/p + 1/p' = 1$, $(S, \mathcal{A}, \mu)$ σ 有限). 对于 Bochner 空间 $L^p(S; X)$ 而言, 前述对偶关系在这里的延拓会依赖于 Banach 空间 X , 这也给出了另一个分析与 Banach 空间理论相互作用的例子 (如命题 12.22).

我们从一些初等的对偶结果开始, 这些结果不需要依赖 Banach 空间 X .

12.3.1 初等对偶结果

若 $1 \leq p, q \leq \infty$ 满足 $1/p + 1/q = 1$, 则由 Hölder 不等式知每个函数 $g \in L^q(S; X^*)$ 都能通过下式定义线性泛函 $\phi_g \in (L^p(S; X))^*$:

$$\langle f, \phi_g \rangle_{(L^p(S; X)) \times (L^p(S; X))^*} := \int_S \langle f(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s),$$

且

$$\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} \leq \|g\|_{L^q(S; X^*)}.$$

命题 12.27

设 $1 \leq p \leq \infty$, $1/p + 1/q = 1$, Y 是 X^* 中可用于逼近范数的闭子空间, 则映射 $g \mapsto \phi_g$ 定义了从 $L^q(S; Y)$ 到 $(L^p(S; X))^*$ 某个闭子空间的到上等距同构, 且该闭子空间在 $(L^p(S; X))^*$ 中可用于逼近范数.

证明 取定 $g \in L^q(S; Y)$, 前面已经说明了

$$\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} \leq \|g\|_{L^q(S; X^*)} = \|g\|_{L^q(S; Y)}.$$

为说明 $\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} \geq \|g\|_{L^q(S; Y)}$, 不妨设 $\|g\|_{L^q(S; Y)} = 1$, 往证 $\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} \geq 1$.

先设 $1 < p < \infty$. 若 $g_n \rightarrow g (L^q(S; Y))$, 则对取定的 $\varepsilon > 0$ 与足够大的 n 有

$$\begin{aligned}\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} &\geq \|\phi_{g_n}\|_{(L^p(S; X))^*} - \|\phi_{g-g_n}\|_{(L^p(S; X))^*} \\ &\geq \|\phi_{g_n}\|_{(L^p(S; X))^*} - \|g - g_n\|_{L^q(S; Y)} \\ &\geq \|\phi_{g_n}\|_{(L^p(S; X))^*} - \varepsilon.\end{aligned}$$

因此只需对满足 $\|g\|_{L^q(S; Y)} = 1$ 的全体 μ -简单函数 g 证明 $\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} \geq 1$ 即可. 设 $g = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n^*$, 其中 $A_n \in \mathcal{A}$ 两两不交, 且 $0 < \mu(A_n) < \infty$, 全体 $x_n^* \in Y$ 均非零. 任意取定 $\varepsilon > 0$, 对每个 x_n^* (依照 $\|x_n^*\|_{X^*}$ 的定义与 Y 的可逼近范数性) 可对应取 X 中范数为 1 的元素 x_n 满足 $\langle x_n, x_n^* \rangle_{X \times X^*} \geq (1 - \varepsilon) \|x_n^*\|_{X^*}$. 记 $f := \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes \|x_n^*\|_{X^*}^{q-1} x_n$, 则

$$\|f\|_{L^p(S; X)}^p = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|x_n^*\|_{X^*}^{p(q-1)} = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|x_n^*\|_{X^*}^q = \|g\|_{L^q(S; Y)}^q = 1,$$

且

$$\langle f, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|x_n^*\|_{X^*}^{q-1} \langle x_n, x_n^* \rangle_{X \times X^*} \geq (1 - \varepsilon) \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|x_n^*\|_{X^*}^q = 1 - \varepsilon.$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 故 $\|\phi_g\|_{X^*} \geq 1$.

当 $p = \infty$ 时, 因为 μ -简单函数构成的空间在 $L^q(S; Y) = L^1(S; Y)$ 中依旧稠密, 故依旧只需对 μ -简单函数 g 证明 $\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} \geq 1$. 重复前述过程中 g, x_n^*, x_n 的取法, 记 $f := \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 则 $\|f\|_{L^\infty(S; X)} = 1$, 且

$$\langle f, \phi_g \rangle_{L^\infty(S; X) \times (L^\infty(S; X))^*} = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \langle x_n, x_n^* \rangle_{X \times X^*} \geq (1 - \varepsilon) \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|x_n^*\|_{X^*} = 1 - \varepsilon.$$

由此同样可得 $\|\phi_g\|_{X^*} \geq 1$.

现设¹⁷ $p = 1$, 取定 $\varepsilon > 0$, 记

$$A_\varepsilon := \{s \in S : \|g(s)\|_{X^*} > 1 - \varepsilon\}.$$

既然 $\|g\|_{L^\infty(S; Y)} = 1$, 可知 A_ε 是严格正测集 (且 A 有可能测度无限). 因为 g 强 μ -可测, 故通过简单函数逼近可知 A_ε 至少包含一个有限测度子集 B_ε . 现由 g 强 μ -可测知 g 可分取值, 进而 $g|_{B_\varepsilon}$ 同样可分取值, 从而 Lindelöf 定理表明 $g|_{B_\varepsilon}$ 作为可分空间能被可数个半径为 ε 的球覆盖. 取 $x^* \in X^*$ 满足

$$B_{\varepsilon, x^*} := B_\varepsilon \cap \{s \in S : \|g(s) - x^*\|_{X^*} < \varepsilon\} \text{ 是正测集.}$$

则

$$\|x^*\|_{X^*} \geq \|g(s)\|_{X^*} - \|g(s) - x^*\|_{X^*} \geq 1 - 2\varepsilon.$$

设 $x \in X$ 满足 $\langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} \geq \|x^*\|_{X^*} - \varepsilon$ 且 $\|x\|_X = 1$, 取 $f := \mathbf{1}_{B_{\varepsilon, x^*}} \otimes x / \mu(B_{\varepsilon, x^*})$ 可知 $\|f\|_{L^1(S; X)} = 1$, 且

$$\begin{aligned}|\langle f, \phi_g \rangle_{X \times X^*}| &= \frac{1}{\mu(B_{\varepsilon, x^*})} \left| \int_{B_{\varepsilon, x^*}} \langle x, g \rangle_{X \times X^*} d\mu \right| \\ &\geq \frac{1}{\mu(B_{\varepsilon, x^*})} \int_{B_{\varepsilon, x^*}} \langle x, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu - \varepsilon \\ &\geq \|x^*\|_{X^*} - 2\varepsilon \geq 1 - 4\varepsilon.\end{aligned}$$

此即 $\|\phi_g\|_{X^*} \geq 1$.

为说明 $L^q(S; Y)$ 可用于逼近 $L^p(S; X)$ 上的范数, 我们回到前面的证明过程, 注意前面已经说明了当 Y 可用于逼近 X 上的范数时, $L^p(S; X)$ 可用于逼近 $L^q(S; Y)$ 上的范数 (这里 $1/p + 1/q = 1$). 现在对换 p, q 与 X, Y 的位置即可, 这里特别把 X 依 Hahn-Banach 定理等距同构成了 Y^* 的一个可用于逼近 Y 上范数的闭子空间. $\square$

一般来说 $L^\infty(S; X)$ 中的 μ -简单函数构成的空间未必在 $L^\infty(S; X)$ 中稠密 (参看引理 12.5), 不过上述证明说明了下述事实:

¹⁷前面的构造可以照搬 Lebesgue 空间对应情形的构造, 但这段构造我没看懂.

推论 12.16

若 X^* 的子空间 Y 能用于逼近 X 上的范数, 则 $L^\infty(S; Y)$ 中的 μ -简单函数构成的空间能用于逼近 $L^1(S; X)$ 上的范数.



读者可能会好奇上述结果能不能做到 $L^q(S; X^*) = (L^p(S; X))^*$, 可惜的是就算 $1 \leq p < \infty, 1/p + 1/q = 1$, 这个关系也未必成立. 接下来会说明该关系对全体 σ 有限空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 均成立的一个充分条件是 X^* 具有所谓的 Radon-Nikodým 性质. 不过对于原子测度空间而言, 该关系不需要对 X 或其对偶提任何条件就能成立. 回忆 $A \in \mathcal{A}$ 称为原子指的是 $\mu(A) > 0$, 且只要 $A = A_0 \cup A_1 (A_0, A_1 \in \mathcal{A})$ 是不交分解, 就必有 $\mu(A_0) = 0$ 或 $\mu(A_1) = 0$. 当 $\mathcal{A}$ 可由原子生成时, 测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 称为原子空间. [LG1] 中有提过原子空间这一概念 (参看定义 3.18), 不过那时侧重的都是非原子测度空间. 对于原子空间而言我们接下来特别需要用到下述结果¹⁸:

命题 12.28

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限原子测度空间, 则存在 μ -零测集 $N \in \mathcal{A}$ 使得 N^c 能表为至多可数个不交有限 μ -测度原子之并.



上述结果是下述结果的直接推论¹⁹:

命题 12.29

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是原子测度空间, 正测集 $A \in \mathcal{A}$ 是 σ 有限集, $\{A_i : i \in I\}$ 是 A 的最大不交原子分解 (其中最大指的是不存在原子 $B \in \mathcal{A}$ 使得 $B \subset A$ 的同时 $B \cap A_i = \emptyset (\forall i \in I)$), 则 I 至多可数, $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$, 且 $\mu(A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i) = 0$. 进一步对任意 $B \in \mathcal{A}$ 而言, 只要 $B \subset A$, 就存在 $I_0 \subset I$ 使得 B 与 $\bigcup_{i \in I_0} A_i$ 是 μ -等价 (即 $\mu(B \Delta \bigcup_{i \in I_0} A_i) = 0$) 的.



证明 首先说明 I 至多可数且 $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$. 因为 A 本身 σ 有限且 $\mu(A) > 0$, 故至少存在集族 $\{D_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{A}$ 使得 $A = \bigcup_{j \in J} D_j$, 其中 J 至多可数且 $0 < \mu(D_j) < \infty (\forall j \in J)$. 特别由 $\mu(D_j) < \infty (\forall j \in J)$ 知对每个 $j \in J$ 与任意 $k \in \mathbb{N}$ 而言下述集合均有限:

$$\left\{ i \in I : \mu(A_i \cap D_j) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

进而

$$\begin{aligned} I &= \{i \in I : \mu(A_i) > 0\} \\ &= \bigcup_{j \in J} \{i \in I : \mu(A_i \cap D_j) > 0\} \\ &= \bigcup_{j \in J} \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ i \in I : \mu(A_i \cap D_j) \geq \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

故 I 至多可数, 且上式特别表明 $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$.

下面说明 $N := A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$ 满足 $\mu(N) = 0$, 为此记

$$\mathcal{D} := \left\{ \bigcup_{i \in I_0} A_i : I_0 \subset I \right\} \cup \left\{ N \cup \bigcup_{i \in I_0} A_i : I_0 \subset I \right\}.$$

因为集列 $\{N\} \cup \{A_i : i \in I\}$ 中的元素两两不交且并集为 A , 故可以验证 $\mathcal{D}$ 是 A 上的一个 σ 代数, 进一步因为 I 至多可数知 $\mathcal{D} \subset \mathcal{A}$. 现在定义

$$\mathcal{A}' := \{E \in \mathcal{A} : \exists B \in \mathcal{D} (E \cap A \text{ 与 } B \mu\text{-等价})\}.$$

$\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 是 S 上的 σ 代数这件事通过下述两条 (易证的) 断言立得:

¹⁸证明也可参看 [TJML] pg.505 Prop A.1.7.

¹⁹该结果会直接用在命题 12.30 的证明中. [TJML] 对该命题的证明有误 (一方面构造错了表示映射, 另一方面用可数的原子生成了不可数的原子空间), 该结果与该命题的证明参看 MSE 上的问题与回答.

- 任取可数集 J , 设 $\{E_j\}_j, \{F_j\}_j \subset \mathcal{A}$ 满足 $\mu(E_j \Delta F_j) = 0 (\forall j \in J)$, 则 $\mu\left(\left(\bigcup_{j \in J} E_j \cap A\right) \Delta \bigcup_{j \in J} F_j\right) = 0$.
- 任取 $E, F \in \mathcal{A}$ 满足 $E \subset A, F \subset A$ 且 $\mu(E \Delta F) = 0$, 则 $\mu((A \setminus E) \Delta (A \setminus F)) = 0$.

另外不难发现 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 的每个原子都是 $\mathcal{A}'$ 的元素, 故实际上 $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$.

下面开始反证, 设 $\mu(N) > 0$. 若 N 能包含 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 中的某个原子, 这便与原子分解 $\{A_i : i \in I\}$ 最大矛盾了, 故必存在 $N' \in \mathcal{A}$ 使得 $N' \subset N$ 的同时有 $0 < \mu(N') < \mu(N)$. 因为 N' 一方面零测, 另一方面也与全体 A_i 不交, 故 N' 没法写成 $\bigcup_{i \in I_0} A_i$ 这种形式. 又因为 $\mu(N \setminus N') > 0$, 故 N' 没法与任何一个形如 $N \cup \bigcup_{i \in I_0} A_i$ 的集合 μ -等价, 根据 $\mathcal{A}'$ 的定义即知 $N' \notin \mathcal{A}'$, 但这与 $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$ 矛盾! 故只能有 $\mu(N) = 0$.

命题最后的断言由 $\mathcal{A}' = \mathcal{A}$ 立得. □

命题 12.30

设 $1 < p < \infty, 1/p + 1/q = 1$, $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是原子测度空间, 则对任意 Banach 空间 X 均有下述等距同构成立:

$$(L^p(S; X))^* = L^q(S; X^*).$$

特别地, 对任意集合 I 均有等距同构 $(l^p(I; X))^* = l^q(I; X^*)$ 成立. 当 $\mu \sigma$ 有限时该结论对 $p = 1$ 也成立. ♠

这里 $l^r(X) (1 \leq r < \infty)$ 的范数定义为

$$\|x\|_{l^r(X)}^r = \sup_{J \subset I \text{ 有限}} \sum_{j \in J} \|x_j\|_X^r.$$

证明 取定泛函 $\phi \in (L^p(S; X))^*$, 只要能证明非零元 ϕ 能被表为 $L^q(S; X^*)$ 中范数不超过 $\|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}$ 的非零元素, 设表示映射为 $J : (L^p(S; X))^* \rightarrow L^q(S; X^*)$, 命题 12.27 中的等距同构为 ι , 确定的闭子空间为 E , 则 $\iota \circ J$ 就是 $(L^p(S; X))^* \rightarrow E$ 的连续到上线性映射, 进而可以构造 $(L^p(S; X))^*$ 与 E 之间的等距同构²⁰. 因此只需给出 ϕ 的表示法即可.

接下来首先考虑 $p = 1$ 且 $(S, \mathcal{A}, \mu) \sigma$ 有限的情形, 任取 $\phi \in (L^1(S; X))^*$, 由命题 12.27 与前述论述知只需找到 $g \in L^\infty(S; X^*)$ 使得

$$\langle f, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} = \int_S \langle f(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s), \quad \forall f \in L^1(S; X)$$

即可. 记 $\{A_i : i \in I\}$ 为 S 的最大不交原子分解²¹, 且该分解中的每个原子均有有限测度, 则由命题 12.29 知 I 可数, 且 $\mu(S \setminus \bigcup_{i \in I} A_i) = 0$. 现对 $i \in I$ 考虑下述线性映射:

$$X \ni x \mapsto \mu(A_i)^{-1} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} \in \mathbb{K}. \quad (12.12)$$

因为 $\|\mathbf{1}_{A_i} \otimes x\|_{L^1(S; X)} = \mu(A_i) \|x\|_X$, 故

$$|\mu(A_i)^{-1} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{X \times X^*}| \leq \mu(A_i)^{-1} \|\mathbf{1}_{A_i} \otimes x\|_{L^1(S; X)} \|\phi\|_{(L^1(S; X))^*} = \|\phi\|_{(L^1(S; X))^*} < \infty, \quad \forall x \in X.$$

故映射 (12.12) 是 X 上的有界线性映射, 且其算子范数不超过 $\|\phi\|_{(L^1(S; X))^*}$. 于是由 X^* 的定义知存在范数不超过 $\|\phi\|_{(L^1(S; X))^*}$ 的 $x_{A_i}^* \in X^*$ 满足

$$\langle x, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*} = \mu(A_i)^{-1} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*}.$$

现定义映射

$$g : S \ni s \mapsto \sum_{i \in I} (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}^*)(s) \in X^*.$$

下面说明 $g \in L^\infty(S; X^*)$. 首先针对良定义性, 由 I 至多可数与 $\{A_i : i \in I\}$ 两两不交知 g 作为级数的定义式对于单点输入只会输出某一个级数项, 故 g 良定义. 另显见 g 强 μ -可测, 且

$$\begin{aligned} \|g(s)\|_{X^*} &\leq \sup\{\|(\mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}^*)(s)\|_{L^\infty(S; X^*)}\} \\ &= \sup\{\|x_{A_i}^*\|_X : i \in I\} \leq \|\phi\|_{(L^1(S; X))^*}, \quad \forall s \in S. \end{aligned}$$

²⁰ 具体构造方法参看 MSE 上的回答.

²¹ 最大分解的存在性可由 Zorn 引理推知.

故 $g \in L^\infty(S; X^*)$, 且 $\|g\|_{L^\infty(S; X^*)} \leq \|\phi\|_{(L^1(S; X))^*}$. 借由 g 可定义下述映射:

$$\phi_g : L^1(S; X) \rightarrow \mathbb{K}, f \mapsto \int_S \langle f(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s),$$

由命题 12.27 知 $\phi_g \in (L^1(S; X))^*$, 下面说明 $\phi_g = \phi$. 取定 $x \in X$, 定义

$$\mathcal{C} := \{C \in \mathcal{A} : \mu(C) < \infty \wedge \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} = \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi_g \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*}\}.$$

只要能说明 $\mathcal{C}$ 包含了 $\mathcal{A}$ 中每个测度有限的元素, 利用简单函数逼近与 ϕ, ϕ_g 作为泛函的连续性就能立马得到 $\phi = \phi_g$. 为此首先说明对任意 $i \in I$ 均有 $A_i \in \mathcal{C}$. 取 $i \in I$, 知

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} &= \mu(A_i) \langle x, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*} \\ &= \int_S \langle (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x)(s), (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}^*)(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s) \\ &= \int_S \langle (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x)(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s) \\ &= \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi_g \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*}, \end{aligned}$$

故 $A_i \in \mathcal{C}$. 现任取 $C \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(C) < \infty$, 由 $\mu(S \setminus \bigcup_{i \in I} A_i) = 0$ 与命题 12.29 知存在 $I_0 \subset I$ 使得 C 与 $\bigcup_{i \in I_0} A_i$ μ -等价, 由 I_0 至多可数与 μ 的可数可加性知进一步可取到由 $\{A_i : i \in I_0\}$ 中的某些元素的有限并构成的子列 $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C \Delta C_n) = 0.$$

显见 $\mathcal{C}$ 对有限并封闭, 故 $C_n \in \mathcal{C} (\forall n \in \mathbb{N})$, 由 ϕ, ϕ_g 作为泛函的连续性与控制收敛定理进一步可知

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathbf{1}_{C_n} \otimes x, \phi \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathbf{1}_{C_n} \otimes x, \phi_g \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*} \\ &= \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi_g \rangle_{L^1(S; X) \times (L^1(S; X))^*}, \end{aligned}$$

故 $C \in \mathcal{C}$, 从而只要 $C \in \mathcal{A}$ 测度有限, ϕ 和 ϕ_g 作用在形如 $\mathbf{1}_C \otimes x (x \in X)$ 的元素上时就都相等. 由引理 12.5 立知 $\phi = \phi_g, p = 1$ 的情形至此即证.

下面考虑 $p \in (1, \infty)$ 的情形, 此时不再设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ σ 有限. 任取 $\phi \in (L^p(S; X))^*$, 同样由命题 12.27 与证明开头的论证知只需找到 $g \in L^q(S; X^*)$ 使得

$$\langle f, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \int_S \langle f(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s), \quad \forall f \in L^p(S; X)$$

即可. 现设 $\{A_i : i \in I\}$ 是各元素均为测度有限的原子, 两两不交且满足下式的最大集列:

$$\{i \in I : \forall x \in X (\langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = 0)\} = \emptyset, \quad (12.13)$$

该集列的存在性由 Zorn 引理即得. 对取定的 $i \in I$, 定义下述线性映射:

$$X \ni x \mapsto \mu(A_i)^{-\frac{1}{p}} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} \in \mathbb{K}. \quad (12.14)$$

显见 $\|\mathbf{1}_{A_i} \otimes x\|_{L^p(S; X)} = \mu(A_i)^{\frac{1}{p}} \|x\|_X$, 故

$$\begin{aligned} |\mu(A_i)^{-\frac{1}{p}} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}| &\leq \mu(A_i)^{-\frac{1}{p}} \|\mathbf{1}_{A_i} \otimes x\|_{L^p(S; X)} \|\phi\|_{(L^p(S; X))^*} \\ &= \|\phi\|_{(L^p(S; X))^*} \|x\|_X, \quad \forall x \in X. \end{aligned}$$

故映射 (12.14) 是 X 上算子范数不超过 $\|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}$ 的有界线性泛函, 进而存在范数不超过 $\|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}$ 的 $x_{A_i}^* \in X^*$ 满足

$$\langle x, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*} = \mu(A_i)^{-\frac{1}{p}} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}, \quad \forall x \in X.$$

进一步由 (12.13) 知对每个 $i \in I$ 均有 $\|x_{A_i}^*\|_{X^*} \neq 0$, 故

$$I = \{i \in I : \|x_{A_i}^*\|_{X^*} \neq 0\}. \quad (12.15)$$

为仿照 $p = 1$ 的情形构造良定义的 g , 我们需要说明 I 至多可数, 为此考虑下述引理:

引理 12.8

若 $\{a_i\}_{i \in I} \subset [0, \infty)$ 满足存在 $M \in [0, \infty)$ 使得对 I 的每个有限子集 F 均有

$$\sum_{i \in F} a_i \leq M,$$

则 $\{i \in I : a_i \neq 0\}$ 至多可数.



现在证明该引理. 取 $\varepsilon > 0$, 下面说明 $\{i \in I : a_i \geq \varepsilon\}$ 至多可数. 设 $F \subset I$ 有限, 且对全体 $i \in F$ 均有 $a_i \geq \varepsilon$, 记 $|F|$ 为 F 的基数, 则

$$|F|\varepsilon = \sum_{i \in F} \varepsilon \leq \sum_{i \in F} a_i \leq M,$$

故 $|F| \leq M/\varepsilon$. 因此集合 $\{i \in I : a_i \geq \varepsilon\}$ 的基数不会超过 $[M/\varepsilon] + 1$, 故 $\{i \in I : a_i \geq \varepsilon\}$ 有限. 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即知

$$\{i \in I : a_i \neq 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ i \in I : a_i \geq \frac{1}{n} \right\}$$

作为可数个有限集之并至多可数, 引理证毕.

为证 I 至多可数, 根据引理 12.8 与 (12.15) 知只需证明

$$\sup \left\{ \sum_{i \in F} \|x_{A_i}^*\|_{X^*}^q : F \subset I \text{ 有限} \right\} \leq \|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}^q. \quad (12.16)$$

任取 $F \subset I$ 有限, 记 $l^p(F)$ 为全体序列 $c : F \rightarrow \mathbb{K}^n$ 构成的空间, 其中 $\|c\|_{l^p(F)} := (\sum_{i \in F} |c_i|^p)^{\frac{1}{p}} < \infty$. 由 Hölder 不等式立知

$$\left(\sum_{i \in F} \|x_{A_i}^*\|_{X^*}^q \right)^{\frac{1}{q}} = \sup \left\{ \sum_{i \in F} |c_i| \|x_{A_i}^*\|_{X^*} : c \in l^q(F), \|c\|_{l^p(F)} \leq 1 \right\}. \quad (12.17)$$

对任取的 $\varepsilon > 0$, 由 Hahn-Banach 定理知对任意 $i \in F$ 总存在 $x_{A_i} \in X$ 满足 $\|x_{A_i}\|_X \leq 1$ 且 $\langle x_{A_i}, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*} \geq \|x_{A_i}^*\|_{X^*} - \varepsilon$. 另任取 $c \in l^p(F)$ 满足 $\|c\|_{l^p(F)} \leq 1$, 记 $\psi := \sum_{i \in F} \mu(A_i)^{-\frac{1}{p}} |c_i| \mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}$, 由 Hölder 不等式易证 $\psi \in L^p(S; X)$, $\|\psi\|_{L^p(S; X)} \leq 1$, 且

$$\langle \psi, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \sum_{i \in F} \mu(A_i)^{-\frac{1}{p}} |c_i| \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \sum_{i \in F} |c_i| \langle x_{A_i}, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*}.$$

现有

$$\begin{aligned} \sum_{i \in F} |c_i| \|x_{A_i}^*\|_{X^*} &\leq \varepsilon \sum_{i \in F} |c_i| + \sum_{i \in F} |c_i| \langle x_{A_i}, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*} \\ &= \varepsilon \sum_{i \in F} |c_i| + \langle \psi, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} \\ &\leq \varepsilon \sum_{i \in F} |c_i| + \|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}. \end{aligned} \quad (12.18)$$

由 ε 的任意性与 (12.17), (12.18) 即知

$$\sum_{i \in F} \|x_{A_i}^*\|_{X^*}^q \leq \|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}^q.$$

由此即得 (12.16), 进一步即得 I 至多可数. 现在定义

$$g : S \rightarrow X^*, \quad s \mapsto g(s) := \sum_{i \in I} (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}^*)(s).$$

由 I 至多可数与 $\{A_i : i \in I\}$ 两两不交知 g 良定义且强 μ -可测. 进一步由 (12.16) 知 $g \in L^q(S; X^*)$, 且 $\|g\|_{L^q(S; X^*)} \leq \|\phi\|_{(L^p(S; X))^*}$. 借由 g 可定义下述映射:

$$\phi_g : L^p(S; X) \rightarrow \mathbb{K}, \quad f \mapsto \int_S \langle f(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s).$$

由 $g \in L^p(S; X^*)$ 与命题 12.27 立知 $\phi_g \in (L^p(S; X))^*$, 下面说明 $\phi_g = \phi$. 为此取定 $x \in X$, 记

$$\mathcal{C} := \{C \in \mathcal{A} : \mu(C) < \infty \wedge \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}\}.$$

和 $p = 1$ 的情形类似, 根据简单函数逼近只需说明 $\mathcal{C}$ 包含 $\mathcal{A}$ 中的每个测度有限的元素即可, 为此首先说明 $A_i \in \mathcal{C} (\forall i \in I)$. 任取 $i \in I$, 知

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} &= \mu(A_i) \langle x, x_{A_i}^* \rangle_{X \times X^*} \\ &= \int_S \langle (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x)(s), (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x_{A_i}^*)(s) \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} d\mu(s) \\ &= \int_S \langle (\mathbf{1}_{A_i} \otimes x)(s), g(s) \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} d\mu(s) \\ &= \langle \mathbf{1}_{A_i} \otimes x, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}, \end{aligned}$$

故 $A_i \in \mathcal{C}$. 再设 $B \in \mathcal{A}$ 是满足 $\mu(B) < \infty$ 与 $B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \emptyset$ 的原子, 由 (12.13) 与 $\{A_i : i \in I\}$ 最大知只能有 $\langle \mathbf{1}_B \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = 0$, 又由 $B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \emptyset$ 知 $\langle \mathbf{1}_B \otimes x, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = 0$, 故 $B \in \mathcal{C}$.

最后设 $C \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(C) < \infty$. 由命题 12.29 知存在 $I_0 \subset I$ 使得 $C \cap \bigcup_{i \in I} A_i$ 与 $\bigcup_{i \in I_0} A_i$ μ -等价. 设 $\{B_j : j \in J\}$ 是 $C \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$ 的最大不交原子分解, 则由 $\mu(C) < \infty$ 导出的 σ 有限性与命题 12.29 知 J 至多可数, 且 $C \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$ 与 $\bigcup_{j \in J} B_j$ μ 等价. 至此我们便找到了由 $\{A_i : i \in I_0\} \cup \{B_j : j \in J\}$ 中某些元素的有限并构成的集列 $\{C_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C \Delta C_n) = 0$. 因为 $\mathcal{C}$ 显然对有限并封闭, 故对每个 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $C_n \in \mathcal{C}$, 进一步由 ϕ, ϕ_g 作为泛函的连续性与控制收敛定理可得

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathbf{1}_{C_n} \otimes x, \phi \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathbf{1}_{C_n} \otimes x, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} \\ &= \langle \mathbf{1}_C \otimes x, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}, \end{aligned}$$

故 $C \in \mathcal{C}$. 至此已知 ϕ, ϕ_g 在作用在形如 $\mathbf{1}_C \otimes x (C \in \mathcal{A}, \mu(C) < \infty, x \in X)$ 的元素上时均相等, 利用简单函数逼近与 ϕ, ϕ_g 作为泛函的连续性即知只能有 $\phi = \phi_g$. $\square$

12.3.2 对偶性与 Radon-Nikodým 性质

命题 12.27 已经说明了只要 $1 \leq p \leq \infty, 1/p + 1/q = 1$, 则每个函数 $g \in L^q(S; Y)$ 都能通过下式确定泛函 $\phi_g \in (L^p(S; X))^*$:

$$\langle f, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \int_S \langle f(s), g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu(s),$$

且 $\|\phi_g\|_{(L^p(S; X))^*} = \|g\|_{L^q(S; X^*)}$. 现在自然会问在怎样的条件下映射 $g \mapsto \phi_g$ 能成为 Banach 空间 $L^q(S; X^*)$ 与 $(L^p(S; X))^*$ 之间的等距同构. 在标量情形下, 只要 $1 \leq p < \infty$ 且 μ σ 有限, 这件事就是成立的. 回忆标量情形下的证明依赖于 Radon-Nikodým 定理, 该定理表明具有有界变差的绝对连续测度能用 L^1 的形式表出. 为将该定理拓展到 X 值测度上, 我们就需要讨论具有有界变差的 X 值测度能否用 L^1 的形式表出.

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间. 若映射 $F : \mathcal{A} \rightarrow X$ 满足对 $\mathcal{A}$ 中的全体不交并 $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ 均有 $F(A) = \sum_{n \geq 1} F(A_n)$ 在 $\|\cdot\|_X$ 的意义下收敛, 就称 F 是 $(S, \mathcal{A})$ 上的 X 值测度. 因为我们可以交换 A_n 的次序, 故前述定义中的收敛是绝对收敛.

X 值测度 F 的变差指的是映射

$$\|F\| : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty], A \mapsto \|F\|(A) := \sup_{\pi} \sum_{B \in \pi} \|F(B)\|_X,$$

其中上确界在 A 的全体有限不交划分 π 中取.

定义 12.13

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $F: \mathcal{A} \rightarrow X$ 是 X 值测度, 则:

1. 若 $\|F\|(S) < \infty$, 就称 F 有界变差.
2. 若对 $A_0 \subset S$ 而言存在 $C < \infty$ 使得对任意 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $A \subset A_0 \Rightarrow \|F\|(A) \leq C\mu(A)$, 就称 F 在 A_0 上被 μ 控制上界.
3. 若对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\mu(A) = 0 \Rightarrow F(A) = 0$, 就称 F 关于 μ 绝对连续.



读者可能会想起经典测度论中每个复值测度都是有界变差的 (不过我们在这里不会用到这条结论), 但对向量值测度而言这个断言并不对, 参见下例:

例 12.7

设 $p \in (1, \infty]$, 定义

$$F: 2^{\mathbb{Z}_+} \rightarrow l^p, A \mapsto F(A) := \sum_{j \in A} j^{-1} e_j,$$

其中 e_j 是第 j 个单位向量. 显见 F 是 l^p 值测度, 且其变差为 $\|F\|(A) = \sum_{j \in A} j^{-1}$, 进而特别有 $\|F\|(\mathbb{Z}_+) = \infty$, 故 F 并不有界变差.

引理 12.9

若 F 有界变差, 则 $\|F\|$ 是有限测度.



证明 设 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ 彼此不交, $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, 往证 $\|F\|(A) = \sum_{n \geq 1} \|F\|(A_n)$.

对 A 考虑不交分解 $A = A_1 \cup \dots \cup A_N \cup \left(\bigcup_{n \geq N+1} A_n\right)$. 因为变差的计算要考虑全体不交有限划分, 故需要进一步设 $A_n = A_{n,1} \cup \dots \cup A_{n,M_n}$ 为不交分解. 现有

$$\begin{aligned} \|F\|(A) &= \sup_{\pi} \sum_{B \in \pi} \|F(B)\|_X \\ &\geq \sum_{n=1}^N \|F(A_n)\|_X + \left\| F\left(\bigcup_{n \geq N+1} A_n\right) \right\|_X \\ &\geq \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^{M_n} \|F(A_{n,m})\|_X. \end{aligned}$$

因为划分 $\{A_{n,m}\}_{1 \leq m \leq M_n}$ 是任取的, 故上式表明 $\|F\|(A) \geq \sum_{n \geq 1} \|F\|(A_n)$. 另一方面, 设 $A = B_1 \cup \dots \cup B_M$ 是不交分解, 取定 $\varepsilon > 0$. 因为 $F(A) = \sum_{n \geq 1} F(A_n)$ 在 $\|\cdot\|_X$ 的意义下收敛 (且由 F 有界变差知 $\|F(A)\|_X < \infty$), 故总存在足够大的 N 使得对全体 $m = 1, \dots, M$ 均有

$$\left\| F\left(\bigcup_{n \geq N+1} (A_n \cap B_m)\right) \right\|_X < \frac{\varepsilon}{M}.$$

进而

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^M \|F(B_m)\|_X &= \sum_{m=1}^M \left\| F\left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap B_m)\right) \right\|_X \\ &\leq \varepsilon + \sum_{m=1}^M \left\| F\left(\bigcup_{n=1}^N (A_n \cap B_m)\right) \right\|_X \\ &\leq \varepsilon + \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M \|F(A_n \cap B_m)\|_X \\ &\leq \varepsilon + \sum_{n=1}^N \|F\|(A_n). \end{aligned}$$

因为 $\varepsilon > 0$ 和分解 $\{B_k\}_{1 \leq k \leq M}$ 都是任取的, 故 $\|F\|(A) \leq \sum_{n \geq 1} \|F\|(A_n)$. □

引理 12.10

对有界变差 X 值测度 $F: \mathcal{A} \rightarrow X$ 而言, 下述断言等价:

- (i) F 关于 μ 绝对连续;
- (ii) $\|F\|$ 关于 μ 绝对连续;
- (iii) 对全体 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta > 0$ 使得对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\mu(A) < \delta \Rightarrow \|F(A)\|_X < \varepsilon$;
- (iv) 对全体 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta > 0$ 使得对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\mu(A) < \delta \Rightarrow \|F\|(A) < \varepsilon$.



证明 (ii) $\Rightarrow$ (i) 和 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 是显见的.

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 设 $A \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(A) = 0$. 若 $A = A_1 \cup \cdots \cup A_n$, 则对 $j = 1, \dots, n$ 均有 $\mu(A_j) = 0$, 进而 $\sum_{j=1}^n \|F(A_j)\|_X = 0$, 故 $\|F\|(A) = 0$.

(i) $\Rightarrow$ (iv): 若 (iv) 不成立, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\{A_n\} \subset \mathcal{A}$ 使得 $\mu(A_n) < 2^{-n}$, 且 $\|F\|(A_n) \geq \varepsilon$. 记 $B_j := \bigcup_{n \geq j} A_n$, $B := \bigcap_{j \geq 1} B_j$, 则 $B_1 \supset B_2 \supset \cdots$, 且 $\mu(B_j) < 2^{-j+1}$, 故 $\mu(B) = 0$. 另一方面, 由 $\|F\|$ 的可数可加性与有限性知

$$\|F\|(B) = \lim_{j \rightarrow \infty} \|F\|(B_j) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|F\|(A_n) \geq \varepsilon.$$

这说明至少存在某个 $B' \in \mathcal{A}$ 满足 $B' \subset B$ 且 $\|F(B')\|_X > 0$, 而对 B' 同样有 $\mu(B') = 0$. □

下述引理给出了有界变差绝对连续 X 值测度的一个重要例子.

引理 12.11

取定 $\phi \in L^1(S; X)$, 定义 $F: \mathcal{A} \rightarrow X$ 为

$$F(A) = \int_A \phi d\mu, \quad A \in \mathcal{A},$$

则 F 是有界变差 X 值测度, 且 F 关于 μ 绝对连续. 另对全体 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$\|F\|(A) = \int_A \|\phi\|_X d\mu.$$

若 $\phi \in L^\infty(S; X)$, 则 F 被 μ 控制上界.



证明 由命题 12.2 知 μ 在 $\{\|\phi\|_X > 0\}$ 上的限制是 σ 有限的, 进而不失一般性可设 μ 本身 σ 有限.

根据 Bochner 积分的放大不等式立得 $\|F(A)\|_X \leq \int_A \|\phi\|_X d\mu$, 进而由控制收敛定理知 F 可数可加. 另若 $A = A_1 \cup \cdots \cup A_N$ 是 A 的有限不交划分, 则

$$\sum_{n=1}^N \|F(A_n)\|_X \leq \sum_{n=1}^N \int_{A_n} \|\phi\|_X d\mu = \int_A \|\phi\|_X d\mu.$$

上式两端对全体不交有限划分取上确界可得

$$\|F\|(A) \leq \int_A \|\phi\|_X d\mu.$$

为证明反向不等式, 不妨设 X 是实 Banach 空间. 利用命题 12.3 调整 ϕ 在某个零测集上的取值可设 ϕ 强可测, 进而 ϕ 可分取值, 从而不妨设 X 可分. 取定 $\varepsilon > 0$, 根据 Hahn-Banach 定理的推论知在 X^* 的单位球面上可取到可用于逼近 X 中范数的可数对称子集 $C = \{x_n^*: n \geq 1\}$. 现对 $n \geq 1$ 记

$$A_n := \{s \in S : \|\phi(s)\|_X \leq \langle \phi(s), x_n^* \rangle_{X \times X^*} + \varepsilon\}.$$

由 ϕ 强可测知上述集合可测, 且由 C 的对称性知 $\bigcup_{n \geq 1} A_n = S$. 记 $B_1 := A_1, B_{n+1} := A_{n+1} \setminus \bigcup_{m=1}^n B_m (n \geq 1)$, 则 B_n 可测, 两两不交, 且 $\bigcup_{n \geq 1} B_n = S$.

现设 $A \in \mathcal{A}$ 是任意有限测度集, 则

$$\int_A \|\phi\|_X d\mu = \sum_{n \geq 1} \int_{A \cap B_n} \|\phi\|_X d\mu$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{n \geq 1} \int_{A \cap B_n} \langle \phi, x_n^* \rangle_{X \times X^*} d\mu + \varepsilon \mu(A) \\
&= \sum_{n \geq 1} \langle F(A \cap B_n), x_n^* \rangle_{X \times X^*} + \varepsilon \mu(A) \\
&\leq \sum_{n \geq 1} \|F(A \cap B_n)\|_X + \varepsilon \mu(A).
\end{aligned}$$

显见上右式的和式被 $\|F\|(A) + \varepsilon \mu(A)$ 控制. 由 F 有界变差知 $\sum_{n \geq 1} \|F(A \cap B_n)\|_X$ 收敛, 故只要 $N \geq 1$ 足够大, 就有

$$\int_A \|\phi\|_X d\mu \leq \sum_{n=1}^N \|F(A \cap B_n)\|_X + \varepsilon(1 + \mu(A)) \leq \|F\|(A) + \varepsilon(1 + \mu(A)).$$

由 ε 的任意性即知对任意有限测度集 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\int_A \|\phi\|_X d\mu \leq \|F\|(A)$. 为将该结论推广到任意 $A \in \mathcal{A}$, 考虑 μ 对应的穷竭列 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$, 知

$$\int_{A \cap S^{(n)}} \|\phi\|_X d\mu \leq \|F\|(A \cap S^{(n)}) \leq \|F\|(A),$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即可.

最后, F 关于 μ 的绝对连续性由非负测度 $\|\phi\|_X d\mu$ 关于 μ 的绝对连续性立得. □

如果我们对空间要求引理 12.11 的逆命题, 就可以得到下述 Radon-Nikodým 性质, 该性质是对偶关系 $(L^p(S; X))^* = L^q(S; X^*)$ 成立的一个充要条件:

定义 12.14

称 Banach 空间 X 关于测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 Radon-Nikodým 性质 (RNP), 如果对 $(S, \mathcal{A})$ 上的每个关于 μ 绝对连续的有界变差 X 值测度 F 而言, 均存在函数 $\phi \in L^1(S; X)$ 使得

$$F(A) = \int_A \phi d\mu, \quad A \in \mathcal{A}.$$

利用上述概念, 我们可以依照下述结果刻画对偶性:

定理 12.7

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间, X 是 Banach 空间, $1 \leq p < \infty, 1/p + 1/q = 1$, 则下述断言等价:

- (i) X^* 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP;
- (ii) 映射 $\phi \mapsto g_\phi$ 确定了下述 Banach 空间之间的等距同构:

$$L^q(S; X^*) \simeq (L^p(S; X))^*.$$

为在上述结果的证明中绕开标量情形的 Radon-Nikodým 定理, 我们需要下述自然成立的技术性引理:

引理 12.12

设 μ, ν 均为 $(S, \mathcal{A})$ 上的 σ 有限正测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 则存在穷竭列 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 使得 μ, ν 均在每个 $S^{(n)}$ 上有限, 且在每个 $S^{(n)}$ 上 ν 均被 μ 控制上界.

如果承认标量情形的 Radon-Nikodým 定理, 则可直接取 $S^{(n)} := S_n \cap \{\phi \leq n\}$ 得到上述引理, 其中 $\{S_n\}_{n \geq 1}$ 是 μ -测度有限的穷竭列, ϕ 是 ν 关于 μ 的 Radon-Nikodým 密度. 如果要绕开标量情形的 Radon-Nikodým 定理证明上述引理, 我们就可以用下述引理:

引理 12.13

设 (P) 作为有限测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 中可测集的某种性质满足:

- (i) 每个零测集都满足 (P) ;
- (ii) 每个正测集都有满足 (P) 的子正测集;

(iii) 每个满足 (P) 的不交集之可数并都满足 (P),
则每个可测集都满足 (P).



证明 设 A 是正测集, 由 (ii) 知可取 A 中满足 (P) 的子正测集. 我们特别考虑这些不交子正测集的下述归纳取法: 设 $A_1, \dots, A_{n-1}$ 已经取出了 ($n=1$ 时取空集). 若 $C_n := A \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$ 零测, 则 C_n 已经满足 (P) 了, 进而由 (iii) 知 $A = C_n \cup \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$ 同样满足 (P). 若 C_n 正测, 则考虑 C_n 中满足 (P) 的子正测集 A_n , 特别在可能取到的这些子正测集中我们选一个拟最大的²², 使得对 C_n 中其它满足 (P) 的子集 A' 都有 $\mu(A') \leq 2\mu(A_n)$. 在选到某个 $\mu(C_n) = 0$ 之前重复该取法, 可以得到 A 中满足 (P) 的不交列 $\{A_n\}$. 由不交性与 $\mu(S) < \infty$ 可知 $\mu(A_n) \rightarrow 0$.

接下来考虑上述取法不停止的情形. 设上述取法能取出无限集列 $\{A_n\}$ 使得 $C := A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 正测, 则由 (ii) 知存在 C 的子正测集 A' 满足 (P), 但由 $\mu(A_n) \rightarrow 0$ 知总会存在足够大的 n 使得 $\mu(A') > 2\mu(A_n)$, 这便与 A_n 的拟最大取法矛盾了, 故只能有 $\mu(C) = 0$, 因此 C 满足 (P), 故 $A = C \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 满足 (P). $\square$

下面利用引理 12.13 证明引理 12.12.

证明 由 σ 有限性知可以构造穷竭列使得 μ, ν 在该列中的每个集合上均有限, 我们主要需要证明的是在该穷竭列中的每个集合上 ν 都能被 μ 控制上界. 因为这条性质是分开针对每个集合谈的, 故不妨设 μ, ν 是 S 上的有限测度.

下面声明每个正测集都有 ν 被 μ 控制上界的子正测集. 考虑反证, 设存在集合 A 与 $r > \nu(A)/\mu(A)$ 使得 A 的每个子集 A' 都包含使得 $\nu(A'') \geq r\mu(A'')$ 的子正测集 A'' . 记 A'' 具有的这条性质为 (P). 可以验证在有限测度空间 A 上 (P) 满足引理 12.13 的条件, 因此根据该引理知每个 $A' \subset A$ 均满足 $\nu(A') \geq r\mu(A')$, 但根据 r 的构造知 $A' = A$ 时该式不成立, 由此即得前述断言.

现设 (P') 对应的集合 A 性质是 A 中存在穷竭列 $\{A^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 使得在每个 $A^{(n)}$ 上 ν 均被 μ 控制上界. 现在只要 ν 在 A 上被 μ 控制上界, 则 (P') 对穷竭列 $A^{(n)} \equiv A$ 就成立, 且根据前述断言知每个正测集都有满足 (P') 的子正测集. 引理 12.13 对 (P') 提的其余条件都容易验证, 因此 S 中的每个可测子集均能满足 (P'). 现在 S 本身就满足 (P'), 由此即证引理. $\square$

最后我们回到定理 12.7 的证明.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 命题 12.27 已经表明 $L^q(S; X^*)$ 中的每个元素都能对应到 $(L^p(S; X))^*$ 中, 因此只需说明对每个 $\Lambda \in (L^p(S; X))^*$ 都存在 $g \in L^q(S; X^*)$ 使得 Λ 能表为 ϕ_g . 注意只要能把 $\Lambda = \phi_g \mapsto g$ 的值域限定在 $L^q(S; X^*)$ 内, 命题 12.27 就自动表明 $\|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*} = \|g\|_{L^q(S; X^*)}$.

现设 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 μ 对应的穷竭列, 定义 $F_n: \mathcal{A} \rightarrow X^*$ 为

$$\langle x, F_n(A) \rangle_{X \times X^*} := \langle \mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}} \otimes x, \Lambda \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}, \quad A \in \mathcal{A}, x \in X.$$

下面验证每个 F_n 均为关于 μ 绝对连续的有界变差 X^* 值测度. 现对不交并 $A = \bigcup_{j=1}^k A_j$ 与范数为 1 的向量 $x_j \in X$ 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^k \langle x_j, F_n(A_j) \rangle_{X \times X^*} \right| &= \left| \left\langle \sum_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_j \cap S^{(n)}} \otimes x_j, \Lambda \right\rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} \right| \\ &\leq \left[\sum_{j=1}^k \|x_j\|_X^p \mu(A_j \cap S^{(n)}) \right]^{\frac{1}{p}} \|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*} \\ &= \mu(A \cap S^{(n)})^{\frac{1}{p}} \|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*}. \end{aligned}$$

上式两端对全体不交并 $A = \bigcup_{j=1}^k A_j$ 与全体范数为 1 的 $x_j \in X$ 取上确界可得

$$\|F_n\|(A) \leq \mu(A \cap S^{(n)})^{\frac{1}{p}} \|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*}.$$

上述结果特别表明每个 F_n 均有界变差且关于 μ 绝对连续. 现在因为 X^* 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, 故 X^* 值测度 F_n 具有 Radon-Nikodým 导数 $g_n \in L^1(S; X^*)$, 使得对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $F_n(A) = \int_A g_n d\mu$. 因为 $F_n(A) = F_n(A \cap S^{(n)})$, 故对与 $S^{(n)}$ 不交的全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\int_A g_n d\mu = 0$, 因此 g_n 在 $S^{(n)}$ 外恒为零.

²²原文是 quasi-maximal, 我的理解是在这些子正测集构成的集族中选一个足够靠近 $\sup |A_n|$ 的.

因为 $\{S^{(n)}\}$ 是穷竭列, 故 $m \leq n$ 时 g_n 在 $g_n|_{S^{(m)}} = g_m|_{S^{(m)}}$ 的意义下为常值, 因此该函数列唯一确定了强可测函数 $g: S \rightarrow X^*$, 且

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}} \otimes x, \Lambda \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} &= \langle x, F_n(A) \rangle_{X \times X^*} \\ &= \int_A \langle x, g_n(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu \\ &= \int_A \langle \mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}} \otimes x, g(s) \rangle_{X \times X^*} d\mu.\end{aligned}$$

下面说明 $g \in L^q(S; X^*)$, 且 g 能用来表示 Λ , 为此观察到若令 $A_n := S^{(n)} \cap \{\|g\|_{X^*} \leq n\}$, 则映射 $f \mapsto \int_{A_n} \langle f, g \rangle_{X \times X^*} d\mu$ 是 $L^p(S; X)$ 上的有界线性泛函. 由前述推导知当 f 是支在 A_n 上的 μ -简单函数时该泛函与 Λ 重合, 因此有界函数 $g|_{A_n} \in L^q(A_n; X^*)$ 能用来表示线性泛函 $\Lambda|_{L^p(A_n; X)}$, 进而由命题 12.27 知

$$\|g\|_{L^q(A_n; X^*)} = \sup_{\|f\|_{L^p(A_n; X)} \leq 1} |\langle f, g \rangle_{L^p(A_n; X) \times L^q(S; X^*)}| = \|\Lambda\|_{(L^p(A_n; X))^*} \leq \|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*}.$$

因为 $n \rightarrow \infty$ 时 $A_n \uparrow S$, 故由单调收敛定理知 $\|g\|_{L^q(S; X^*)} \leq \|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*}$, 进而对等式 $\langle \mathbf{1}_{A_n} \otimes f, \Lambda \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \langle \mathbf{1}_{A_n} \otimes f, g \rangle_{L^p(S; X) \times L^q(S; X^*)}$ 两端 (经 Hölder 不等式验证后) 应用控制收敛定理可知对全体 $f \in L^p(S; X)$ 均有

$$\langle f, \Lambda \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} = \langle f, g \rangle_{L^p(S; X) \times L^q(S; X^*)}.$$

因此函数 $g \in L^q(S; X^*)$ 能表出 Λ .

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 F 是关于 μ 绝对连续的有界变差 X^* 值测度, 则由引理 12.12 知存在 S 的穷竭列 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 使得 $\mu, \|F\|$ 在每个 $S^{(n)}$ 上有限, 且 F 在 $S^{(n)}$ 上以常数 C_n 被 μ 控制上界. 现对 μ -简单函数 $f = \sum_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_j} \otimes x_j$ 定义泛函

$$\Lambda_n(f) := \sum_{j=1}^k \langle x_j, F(A_j \cap S^{(n)}) \rangle_{X \times X^*}.$$

显见上述泛函良定义, 线性, 且

$$\begin{aligned}|\Lambda_n(f)| &\leq \sum_{j=1}^k \|x_j\|_X \|F(A_j \cap S^{(n)})\|_{X^*} \\ &\leq C_n \sum_{j=1}^k \|x_j\|_X \mu(A_j \cap S^{(n)}) \\ &= C_n \|f\|_{L^1(S^{(n)} \cap X)} \leq C_n \mu(S^{(n)})^{\frac{1}{q}} \|f\|_{L^p(S; X)},\end{aligned}$$

故 Λ_n 能延拓为 $L^p(S; X)$ 上的一个有界线性泛函, 由 $L^q(S; X^*) \simeq (L^p(S; X))^*$ 知 Λ_n 能被某个 $g_n \in L^q(S; X^*)$ 表出, 进而特别有

$$\langle x, F(A \cap S^{(n)}) \rangle_{X \times X^*} = \Lambda_n(\mathbf{1}_A \otimes x) = \int_A \langle \mathbf{1}_A \otimes x, g_n \rangle_{L^p(S; X) \times L^q(S; X^*)} = \left\langle x, \int_{A \cap S^{(n)}} g d\mu \right\rangle_{X \times X^*}, \quad (12.19)$$

其中 $s \in S^{(n)}$ 时 $g(s) := g_n(s)$. 注意由 (12.19) 的前两个等号知 g_n 支在 $S^{(n)}$ 上, 且 g_n, g_m 在 $S^{(n)} \cap S^{(m)}$ 上 a.e. 相等, 故 g 良定义且 μ -可测.

下面验证 $g \in L^1(S; X^*)$, 且在每个 $A \in \mathcal{A}$ 上 g 都能表出 F . 由 (12.19) 与引理 12.11 知

$$\|F\|(S^{(n)}) = \int_{S^{(n)}} \|g\|_X d\mu.$$

因为 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是穷竭列, 故把上式中的 $S^{(n)}$ 换成 S 后的得式依旧成立, 因此在 (12.19) 中令 $n \rightarrow \infty$, 由控制收敛定理即得结论. $\square$

特别若 $1 < p < \infty$, 则定理 12.7 中 σ 有限性这一条件可以丢掉:

推论 12.17

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $1 < p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$. 若 X^* 有 RNP, 则映射

$$g \mapsto \phi_g: L^q(S; X^*) \rightarrow (L^p(S; X))^*, \langle f, \phi_g \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} := \int_S \langle f, g \rangle_{X \times X^*} d\mu$$

确定了下述 Banach 空间之间的等距同构:

$$L^q(S; X^*) \simeq (L^p(S; X))^*.$$



证明 命题 12.27 已经说明了对任意测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 而言, 映射 $g \mapsto \phi_g$ 均等距. 现在只需说明 $(L^p(S; X))^*$ 能经该映射回到 $L^q(S; X^*)$ 即可. 任取 $\Lambda \in (L^p(S; X))^*$ 范数为 1, 取 $L^p(S; X)$ 中范数为 1 的函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 使得 $\langle f_n, \Lambda \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*} \geq 0$, 且 $\|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*} = \sup_{n \geq 1} \langle f_n, \Lambda \rangle_{L^p(S; X) \times (L^p(S; X))^*}$. 由命题 12.2 知存在不交分解 $S = S_0 \cup S_1$ ($S_0, S_1 \in \mathcal{A}$) 使得对每个 $n \geq 0$ 均有 $f_n = 0$ 在 S_0 上 a.e., 且 μ 在 S_1 上 σ 有限.

记 Λ_1 为 Λ 在 $L^p(S_1; X)$ 的闭子空间 $L^p(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}; X)$ 上的限制. 因为 X^* 有 RNP, 且 $(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}, \mu|_{\mathcal{A}|_{S_1}})$ σ 有限, 故由定理 12.7 知存在函数 $g_1 \in L^q(S_1, \mathcal{A}|_{S_1}; X^*)$ 使得 $\Lambda_1 = \phi_{g_1}$. 记 $g \in L^q(S; X^*)$ 为 g_1 的零延拓, 下面说明 $\Lambda = \phi_g$.

显见只需说明 Λ 在 $L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X)$ 上是零泛函即可. 考虑反证, 若存在范数为 1 的函数 $f_0 \in L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X)$ 使得 $\delta_0 := \langle f_0, \Lambda \rangle_{L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X) \times (L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X))^*} > 0$, 则取 $\lambda_0, \lambda_1 > 0$ 满足 $\lambda_0^p + \lambda_1^p = 1$, 另对取定的 $\varepsilon_n \geq 0$ 取 f_n 满足

$$\langle f_n, \Lambda \rangle_{L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X) \times (L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X))^*} = 1 - \varepsilon_n,$$

且

$$\|\lambda_0 f_0 + \lambda_1 f_n\|_{L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X)}^p = \lambda_0^p + \lambda_1^p = 1.$$

显见

$$\langle \lambda_0 f_0 + \lambda_1 f_n, \Lambda \rangle_{L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X) \times (L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X))^*} = \lambda_0 \delta_0 + \lambda_1 (1 - \varepsilon_n),$$

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, 知

$$\langle \lambda_0 f_0 + \lambda_1 f_n, \Lambda \rangle_{L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X) \times (L^p(S_0, \mathcal{A}|_{S_0}; X))^*} \geq \sup_{0 < \lambda < 1} [(1 - \lambda^p)^{\frac{1}{p}} \delta_0 + \lambda],$$

可以验证只要 $\delta_0 > 0$, 则上右式严格大于 1, 这与 $\|\Lambda\|_{(L^p(S; X))^*} = 1$ 矛盾! □

当 $p = 1$ 时, σ 有限这一条件不能省略, 参看下列:

例 12.8

设 $S = (0, 1)$ 上赋有定义在 2^S 上的计数测度 ν , 考虑对非负函数 $f \in L^1((0, 1), \nu)$ 定义的映射:

$$\Lambda : L^1((0, 1), \nu) \ni f \mapsto \Lambda(f) := \sum_{t \in (0, 1)} f(t) \in \mathbb{R},$$

其中和式定义为 $(0, 1)$ 上全体有限和的上确界. 若将上述映射延拓为 $L^1((0, 1), \nu)$ 上的有界线性泛函, 则该泛函不能被某个 $g \in L^\infty((0, 1), \nu)$ 表出. 唯一可能表出该泛函的函数是常值函数 **1**, 但因为 (S, ν) 并不 σ 有限, 故 **1** 并不 ν -可测. 注意该反例并不是因为我们把 $L^\infty(S)$ 定义成 μ -可测函数 (而非可测函数这一更大的函数类) 而出现的. 事实上只要考虑单点测度空间 $S = \{s\}$ 并令 $\mu(\{s\}) = \infty$, 则一方面 $L^1(S) = \{0\} = L^\infty(S)$, 进而 $L^\infty(S)$ 本身就没法包含常值函数 $\mathbf{1}_{\{s\}}$; 另一方面 $\mathbf{1}_{\{s\}}$ 有界可测, 但在这种情况下同样不 μ -可测.

12.3.3 关于 Radon-Nikodým 性质的更多介绍

前面我们为刻画 Bochner 空间介绍了 RNP, 下面我们对 RNP 本身进行进一步的研究. 特别地, 这些研究会为我们提供具有 (或不具有) RNP 的 Banach 空间实例, 并给出相关 Bochner 空间所具有 (或不具有) 的自然对偶.

本小节用到的主要工具是 RNP 与下述算子理论概念的相互联系:

定义 12.15

称有界算子 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 可表示, 如果存在函数 $\phi \in L^\infty(S; X)$ 使得

$$Tf = \int_S f\phi d\mu, \quad f \in L^1(S).$$



注意只要 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 能被函数 $\phi \in L^\infty(S; X)$ 表示, 则

$$\begin{aligned} \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} &= \sup_{\substack{\|f\|_{L^1(S)} \leq 1 \\ \|x^*\|_{X^*} \leq 1}} \left| \int_S f \langle \phi, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu \right| \\ &= \sup_{\|x^*\|_{X^*} \leq 1} \|\langle \phi, x^* \rangle_{X \times X^*}\|_{L^\infty(S)} = \|\phi\|_{L^\infty(S; X)}. \end{aligned}$$

其中上右式最后一个等号应用了命题 12.15.

定义 12.15 与 RNP 之间的联系体现为下述结果:

定理 12.8

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间, 则对 Banach 空间 X 而言下述断言等价:

- (i) X 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP;
- (ii) 每个有界线性算子 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 均可表示.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 X 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, $T: L^1(S) \rightarrow X$ 是有界线性算子. 设 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 的穷竭列. 定义 $F_n: \mathcal{A} \rightarrow X$ 为 $F_n(A) := T(\mathbf{1}_{S^{(n)} \cap A})$, 则估计

$$\|F_n(A)\|_X \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} \mu(S^{(n)} \cap A)$$

表明 F_n 是关于 μ 绝对连续的有界变差 X 值测度. 因为 X 有 RNP, 故 F_n 能对应密度 $\phi_n \in L^1(S; X)$, 进而对全体 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$T(\mathbf{1}_{S^{(n)} \cap A}) = F_n(A) = \int_A \phi_n d\mu. \quad (12.20)$$

特别若 $A \in \mathcal{A}$ 与 $S^{(n)}$ 不交, 则 $\int_A \phi_n d\mu = 0$, 进而 ϕ_n 在 $S^{(n)}$ 外为零.

因为 $\{S^{(n)}\}$ 是穷竭列, 故函数 ϕ_n 在 $\phi_n|_{S^{(m)}} = \phi_m|_{S^{(m)}} (\forall m \leq n)$ 的意义下为常值, 进而该函数列可以诱导一个良定义函数 $\phi: S \rightarrow X$. 接下来说明 $\phi \in L^\infty(S; X)$, $\|\phi\|_{L^\infty(S; X)} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X}$, 且 ϕ 可表出 T . 任取 $\varepsilon > 0$, 记 $S_\varepsilon^{(n)} := \{s \in S^{(n)} : \|\phi_n(s)\|_X \geq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} + \varepsilon\}$, 则在相差一个零测集的意义下有 $S_\varepsilon^{(n)} \subset S^{(n)}$, 且由引理 12.11 知

$$\|F_n(S_\varepsilon^{(n)})\|_X = \int_{S_\varepsilon^{(n)}} \|\phi_n\|_X d\mu \geq (\|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} + \varepsilon) \mu(S_\varepsilon^{(n)}).$$

另一方面, 对 $S_\varepsilon^{(n)}$ 的任意划分 $S_\varepsilon^{(n)} = B_1^{(n)} \cup \dots \cup B_k^{(n)}$ 知

$$\sum_{j=1}^k \|F_n(B_j^{(n)})\|_X = \sum_{j=1}^k \|T \mathbf{1}_{B_j^{(n)}}\|_X \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} \sum_{j=1}^k \mu(B_j^{(n)}) = \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} \mu(S_\varepsilon^{(n)}),$$

因此 $\|F_n(S_\varepsilon^{(n)})\|_X \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} \mu(S_\varepsilon^{(n)})$, 故只能有 $\mu(S_\varepsilon^{(n)}) = 0$. 因为 $\bigcup_{n \geq 1} S_\varepsilon^{(n)} = \{s : \|\phi(s)\|_X \geq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} + \varepsilon\}$, 故 $\mu(\{s : \|\phi(s)\|_X \geq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X} + \varepsilon\}) = 0$. 因为 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 故 $\mu(\{s : \|\phi(s)\|_X > \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X}\}) = 0$, 从而 $\phi \in L^\infty(S; X)$ 且 $\|\phi\|_{L^\infty(S; X)} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X}$.

接下来说明 ϕ 可表出 T . 由 (12.20), ϕ_n, ϕ 的定义与简单函数逼近知对全体 $f \in L^1(S)$ 均有

$$T(\mathbf{1}_{S^{(n)}} f) = \int_S f \phi_n d\mu = \int_S \mathbf{1}_{S^{(n)}} f \phi d\mu.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 用控制收敛定理即得结论.

(ii) $\Rightarrow$ (i): 设每个算子 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 均可表示, 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow X$ 是关于 μ 绝对连续的有界变差 X 值测度, 可知非负测度 $\|F\|$ 是关于 μ 绝对连续的有限测度. 现设不交可数集族 $\{A_i\}_{i \geq 1}$ 是引理 12.12 诱导的 $\|F\|$ -有限集 (同

时也是 μ -有限集), 且在忽略 μ -零测集的意义下 $\bigcup_{i \geq 1} A_i = S$. 对 $n = 1, 2, \dots$ 设

$$I_n := \{i \geq 1 : \|F\|(B) \leq n\mu(B), \forall B \in \mathcal{A}, B \subset A_i\},$$

记 $J_1 := I_1, J_{n+1} := I_{n+1} \setminus I_n (n \geq 1)$. 若记 $B_n := \bigcup_{i \in J_n} A_i$, 则由 $\|F\|$ 与 μ 的可数可加性知对满足 $B \subset B_n$ 的全体 $B \in \mathcal{A}$ 均有 $\|F\|(B) \leq n\mu(B)$.

现对不交集 $A_j \in \mathcal{A}$ 对应的 μ -简单函数 $f = \sum_{j=1}^k c_j \mathbf{1}_{A_j}$, 定义

$$T_n f := \sum_{j=1}^k c_j F(B_n \cap A_j).$$

显见 T_n 的定义并不依赖于 f 的具体表示, 且 T_n 是线性算子. 现由

$$\begin{aligned} \|T_n f\|_X &\leq \sum_{j=1}^k |c_j| \|F\|(B_n \cap A_j) \\ &\leq n \sum_{j=1}^k |c_j| \mu(B_n \cap A_j) = n \|f\|_{L^1(S)} \end{aligned}$$

知 T_n 可唯一延拓为 $L^1(S) \rightarrow X$ 的有界算子, 进而由条件知存在表示 T_n 的函数 $\phi_n \in L^\infty(S; X)$, 从而对 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$F(B_n \cap A) = T_n \mathbf{1}_A = \int_A \phi_n d\mu.$$

进一步若取 A 与 B_n 不交, 则知 ϕ_n 在 B_n 外 a.e. 为零. 现记 $\phi := \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{B_n} \phi_n$, 由 B_n 的不交性可知该和式 a.e. 收敛. 现由

$$\|F\|(B_n) = \int_{B_n} \|\phi\|_X d\mu$$

知 $\phi \in L^1(S; X)$, 且 $\|\phi\|_{L^1(S; X)} = \|F\|(S)$, 进而由 F 的可数可加性与控制收敛定理知对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有

$$F(A) = \sum_{n \geq 1} F(B_n \cap A) = \sum_{n \geq 1} \int_{B_n \cap A} \phi d\mu = \int_A \phi d\mu.$$

□

研究 RNP 需要用到的另一组工具是条件期望的一些初等性质, 我们也会在之后的章节细致研究条件期望. 为使目前的阐述尽量完备, 我们先临时把条件期望算子 $E_{\mathcal{B}} : L^2(S) \rightarrow L^2(S)$ 定义为 $L^2(S)$ 到其子空间 $L^2(S; \mathcal{B})$ 上的正交投影. 因为对 $\mathcal{B}$ 中的全体有限测度集 B 与全体 $f \in L^2(S)$ 均有 $\mathbf{1}_B \in L^2(S, \mathcal{B})$, 且 $f - E_{\mathcal{B}} f \perp L^2(S, \mathcal{B})$, 故由该定义立知

$$\int_B f d\mu = \int_B E_{\mathcal{B}} f d\mu.$$

若 $L^2(S) \ni f \geq 0$, 则对全体 $B \in \mathcal{B}$ 均有 $\int_B E_{\mathcal{B}} f d\mu = \int_B f d\mu \geq 0$, 进而 $L^2(S; \mathcal{B}) \ni E_{\mathcal{B}} f \geq 0$. 进一步若 $f \in L^1(S) \cap L^2(S)$, 则 $L^2(S) \ni f^\pm \geq 0$, 从而

$$|E_{\mathcal{B}} f| \leq |E_{\mathcal{B}} f^+| + |E_{\mathcal{B}} f^-| = E_{\mathcal{B}} f^+ + E_{\mathcal{B}} f^- = E_{\mathcal{B}} |f|.$$

上式两端在 S 上积分可知 $E_{\mathcal{B}} f \in L^1(S, \mathcal{B})$, 且 $\|E_{\mathcal{B}} f\|_{L^1(S)} \leq \|f\|_{L^1(S)}$. 最后若 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ σ 有限, 则有等距同构 $(L^1(S))^* = L^\infty(S), (L^1(S, \mathcal{B}))^* = L^\infty(S, \mathcal{B})$, 从而对 $f \in L^\infty(S) \cap L^2(S)$ 有 $E_{\mathcal{B}} f = E_{\mathcal{B}}^* f \in L^\infty(S, \mathcal{B})$, 因此对 $f \in L^\infty(S)$ 可以定义 $E_{\mathcal{B}} f := E_{\mathcal{B}}^* f$.

接下来证明 RNP 关于子 σ 代数的稳定性:

引理 12.14

设 X 关于 σ 有限测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子 σ 代数, 则 X 关于 $(S, \mathcal{B}, \mu|_{\mathcal{B}})$ 有 RNP. 

证明 设 $T : L^1(S, \mathcal{B}) \rightarrow X$ 是有界算子, $E_{\mathcal{B}} : L^1(S) \rightarrow L^1(S, \mathcal{B})$ 是条件期望算子, 则算子 $U := T \circ E_{\mathcal{B}} : L^1(S) \rightarrow X$ 有界, 进而由 X 的 RNP 知 U 可被函数 $\phi \in L^\infty(S; X)$ 表出. 前面说明了 $E_{\mathcal{B}}$ 能定义在 $L^\infty(S)$ 上, 特别可以进一步说明 $E_{\mathcal{B}}$ 的限制为 $L^\infty(S) \rightarrow L^\infty(S, \mathcal{B})$ 的有界正算子, 进而由定理 13.2 知 $E_{\mathcal{B}}$ 存在 $L^\infty(S; X) \rightarrow L^\infty(S, \mathcal{B}; X)$

的唯一有界且 (在定理 13.2 意义下) 弱 * 连续的延拓 (注意虽说这里用了下一节的结果, 但并没有循环论证). 接下来说明 T 能被 $E_{\mathcal{B}}\phi$ 表出. 事实上, 对任意满足 $\mu(B) < \infty$ 的 $B \in \mathcal{B}$ 有

$$T\mathbf{1}_B = U\mathbf{1}_B = \int_S \mathbf{1}_B \phi d\mu = \int_S E_{\mathcal{B}}\mathbf{1}_B \phi d\mu = \int_S \mathbf{1}_B E_{\mathcal{B}}\phi d\mu.$$

其中上式的最后一个等号在 ϕ 为 X 值 μ -简单函数时显见, 对一般的 ϕ 这里用到了简单函数逼近与控制收敛定理. 现在上式表明 $Tf = \int_S f E_{\mathcal{B}}\phi d\mu$ 对全体 μ -简单函数 f 均成立, 利用简单函数逼近即得一般情形. $\square$

下述结果表明 RNP 是被可分确定的.

定理 12.9

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间, 则对 Banach 空间 X 而言下述断言等价:

- (i) X 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP;
- (ii) X 的每个可分闭子空间关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP.

为证明上述结果, 我们需要下述引理:

引理 12.15

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间. 若 $\phi \in L^1(S; X)$, 则集合 $\{\int_A \phi d\mu : A \in \mathcal{A}\}$ 在 X 中相对紧^a.

^a相对紧指的就是预紧.

证明 取定 $\varepsilon > 0$, 设 $\psi = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{B_n} \otimes x_n$ 作为 μ -简单函数满足 $\|\phi - \psi\|_{L^1(S; X)} < \varepsilon$, 则对全体 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$\int_A \phi d\mu = \sum_{n=1}^N \mu(A \cap B_n) x_n + \int_A (\phi - \psi) d\mu \in K_\varepsilon + \varepsilon \overline{B_X},$$

其中

$$K_\varepsilon = \left\{ \sum_{n=1}^N c_n x_n : c_n \geq 0, \sum_{n=1}^N |c_n| \|x_n\|_X \leq \|\phi\|_{L^1(S; X)} + \varepsilon \right\}$$

作为 $(\|\phi\|_{L^1(S; X)} + \varepsilon) \overline{B_Y}$ 的闭子集是紧集, 其中 $Y = \text{span}\{x_1, \dots, x_N\}$ 是有限维 Banach 空间²³. 因此 $\{\int_A \phi d\mu : A \in \mathcal{A}\}$ 完全有界, 进而该集合相对紧. $\square$

注 本注特别解释前述证明中的蓝色部分, 在 MSE 上也有对应解释. 因为完备空间中的完全有界集和预紧集等价, 故只需要证明 $\{\int_A \phi d\mu : A \in \mathcal{A}\}$ 完全有界, 后者其实等价于证明对每个 $\varepsilon > 0$ 均存在紧集 $K_\varepsilon \subset X$ 使得

$$\left\{ \int_A \phi d\mu : A \in \mathcal{A} \right\} \subset K_\varepsilon + \varepsilon \overline{B_X}.$$

我们特别给出下述引理:

引理 12.16

设 X 是赋范空间, $M \subset X$, 则下述断言等价:

- (i) M 完全有界;
- (ii) 对每个 $\varepsilon > 0$ 均存在紧集 $K \subset X$ 使得 $M \subset K + \varepsilon \overline{B_X}$.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 $\varepsilon > 0$, 因为 M 完全有界, 故存在有限集 $\{x_j : j \in J\} \subset X$ 使得 $M \subset \bigcup_{j \in J} x_j + \varepsilon \overline{B_X}$. 记 $K := \{x_j : j \in J\}$, 则显见 K 是紧集, 且 $M \subset K + \varepsilon \overline{B_X}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): 任取 $\varepsilon > 0$, 由条件知总存在 $K_\varepsilon \subset X$ 使得 $M \subset K_\varepsilon + \varepsilon \overline{B_X}$. 由 K 紧知它必完全有界, 因此存在有限集 $\{x_j : j \in J\}$ 使得 $K \subset \bigcup_{j \in J} x_j + \varepsilon \overline{B_X}$, 进而

$$M \subset K + \varepsilon \overline{B_X} \subset \left(\bigcup_{j \in J} x_j + \varepsilon \overline{B_X} \right) + \varepsilon \overline{B_X} \subset \bigcup_{j \in J} x_j + 2\varepsilon \overline{B_X}.$$

²³这里 $\sum_{n=1}^N \mu(A \cap B_n) x_n \in K_\varepsilon$ 纯粹是三角不等式. 它其实就是 $\|\psi\|_{L^1(S; X)} \leq \|\phi\|_{L^1(S; X)} + \|\psi - \phi\|_{L^1(S; X)}$.

由 ε 的任意性即知 M 完全有界. □

我们更多时候用的是引理 12.15 的下述形式:

引理 12.17

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间. 若 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 可表示, 则集合 $\{T\mathbf{1}_A: A \in \mathcal{A}\}$ 在 X 中相对紧. ♡

证明 因为 T 可表示, 故存在 $\phi \in L^\infty(S; X) \subset L^1(S; X)$ 使得 $T\mathbf{1}_A = \int_A \phi d\mu$, 由引理 12.15 即得结论. □

下面证明定理 12.9.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 设 X 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, Y 是一个闭子空间. 现对任意定义在 $\mathcal{A}$ 上关于 μ 绝对连续的有界变差 Y 值测度 F , 由 X 的 RNP 知存在函数 $\phi \in L^1(S; X)$ 使得

$$F(A) = \int_A \phi d\mu, \quad A \in \mathcal{A}.$$

因为 F 在 Y 中取值, 故对全体 $A \in \mathcal{A}$ 而言均有 $\int_A \phi d\mu \in Y$, 进而由命题 12.13 知 ϕ a.e. 在 Y 中取值, 由此即得 Y 的 RNP.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 X 的每个可分闭子空间均关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, 设 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 是有界算子. 现在只要 T 能在 X 的某可分闭子空间 Y 中取值, 由 Y 的 RNP 与定理 12.8 即知 T 作为 $L^1(S) \rightarrow Y$ 的有界算子可表示, 进而它作为 $L^1(S) \rightarrow X$ 的有界算子同样可表示, 由定理 12.8 即得 X 的 RNP. 因此下面的主要目标是证明 T 在可分闭子空间 Y 中取值.

取定穷竭列 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$, 我们证明对全体 $n \geq 1$ 而言, 集合 $\{T\mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}}: A \in \mathcal{A}\}$ 均在 X 中相对紧. 考虑反证, 设存在 $n \geq 1$ 使得 $\{T\mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}}: A \in \mathcal{A}\}$ 并不相对紧, 则 $\overline{\{T\mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}}: A \in \mathcal{A}\}}$ 并不自列紧, 这说明存在集列 $\{A_j\}_{j \geq 1} \subset \mathcal{A}$ 使得序列 $\{T\mathbf{1}_{A_j \cap S^{(n)}}\}_{j \geq 1}$ 在 X 中没有收敛子列. 设 $\mathcal{A}^{(n)}$ 是集列 $\{A_j \cap S^{(n)}\}_{j \geq 1}$ 生成的 σ 代数, 则 $(S, \mathcal{A}^{(n)})$ 是可数可生成的, 进而由命题 12.19 知 $L^1(S, \mathcal{A}^{(n)})$ (注意这是通常的可积函数空间, 而非 Bochner 空间) 可分, 因此由 T 的连续性知 T 在该空间上的限制在 X 的某个可分闭子空间 $X^{(n)}$ 中取值. 因为 $X^{(n)}$ 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, 故由引理 12.14 知 $X^{(n)}$ 关于 $(S, \mathcal{A}^{(n)}, \mu|_{\mathcal{A}^{(n)}})$ 同样有 RNP, 从而限制后的算子可表示. 但进一步引理 12.17 表明序列 $\{T\mathbf{1}_{A_j \cap S^{(n)}}: j \geq 1\}$ 相对紧, 特别该序列存在收敛子列, 矛盾! 因此每个 $\{T\mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}}: A \in \mathcal{A}\}$ 均在 X 中相对紧.

接下来证明 T 的可分取值性. 根据相对紧的定义显见相对紧集必可分, 故存在 X 的可分闭子空间 Y 包含 $\{T\mathbf{1}_{A \cap S^{(n)}}: n \geq 1, A \in \mathcal{A}\}$. 利用穷竭列的逼近知 Y 包含 $\{T\mathbf{1}_A: A \in \mathcal{A}, \mu(A) < \infty\}$, 从而由简单函数逼近知 Y 包含 $\{Tf: f \in L^1(S)\}$, 因此 T 在 Y 中取值. □

现在我们终于可以给一个具有 RNP 的不平凡的空间例子了. 回忆对 Banach 空间 X 而言, 如果典则嵌入 $X \rightarrow X^{**}$ 是满射, 就称 X 自反.

定理 12.10

下面列出的每个条件都表明 X 关于任何 σ 有限测度空间有 RNP:

- (i) X 可作为可分的对偶空间,
 - (ii) X 自反.
- ♡

证明 设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间.

(i): 根据条件知存在 Banach 空间 Y 使得 $X = Y^*$ 且 Y^* 可分, 下面验证每个有界算子 $T: L^1(S) \rightarrow Y^*$ 均可表示.

任取 $y \in Y$, 定义

$$\langle y, T \rangle: L^1(S) \rightarrow \mathbb{K}, \quad f \mapsto \langle y, T \rangle f := \langle y, Tf \rangle_{Y \times Y^*}$$

显见 $\langle y, T \rangle \in (L^1(S))^*$, 且 $\|\langle y, T \rangle\|_{L^1(S) \rightarrow \mathbb{K}} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow Y^*} \|y\|_Y$. 因为 S σ 有限, 故 $(L^1(S))^* = L^\infty(S)$, 从而对每个 $\langle y, T \rangle \in (L^1(S))^*$ 而言均存在唯一函数 $\phi_y \in L^\infty(S)$ 满足

$$\|\phi_y\|_{L^\infty} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow Y^*} \|y\|_Y, \quad (12.21)$$

且

$$\langle y, T \rangle f = \int_S \phi_y f d\mu, f \in L^1(S). \quad (12.22)$$

因为 Y^* 可分, 故 Y 可分, 进而可取 Y 的可数稠密子集 $\{y_n\}_{n \geq 1}$. 若存在标量 $q_n \in \mathbb{Q}$ (若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) 或 $q_n \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ (若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) 使得 $y = \sum_{n=1}^N q_n y_n$, 则

$$\langle y, T \rangle f = \sum_{n=1}^N q_n \langle y_n, T \rangle f = \int_S \sum_{n=1}^N q_n \phi_{y_n} f d\mu, f \in L^1(S). \quad (12.23)$$

比对(12.22),(12.23)可知对 a.e. $s \in S$ 均有

$$\phi_y(s) = \sum_{n=1}^N q_n \phi_{y_n}(s). \quad (12.24)$$

因为只有可数个 y 能写成 $\sum_{n=1}^N q_n y_n$, 故通过遍历 y_n 知存在零测集 $\mathcal{N} \subset S$ 使得(12.24)对全体 $s \in S \setminus \mathcal{N}$ 与具有前述形式的全体 $y = \sum_{n=1}^N q_n y_n$ 均成立. 现在(12.21),(12.24)表明对 a.e. 取定的 $s \in S$ 而言, 关于 y 的映射 $y \mapsto \phi_y(s)$ 都能延拓为线性泛函 $\phi(s) \in Y^*$, 且 $\|\phi(s)\|_{Y^*} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow Y^*}$. 由 $\langle y, \phi(s) \rangle_{Y \times Y^*} = \phi_y(s)$ 可知函数 $s \mapsto \phi(s)$ 弱 * 可测. 因为 Y^* 可分, 故由 Pettis 可测定理知函数 $s \mapsto \phi(s)$ 实际上强可测²⁴, 故 $\phi \in L^\infty(S; Y^*)$ 且 $\|\phi\|_{L^\infty(S; Y^*)} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow Y^*}$. 现对全体 $y \in Y$ 有

$$\langle y, Tf \rangle_{Y \times Y^*} = \langle y, T \rangle f = \int_S \langle y, \phi \rangle_{Y \times Y^*} f d\mu, \quad (12.25)$$

故 T 可被 ϕ 表示.

(ii): 当 X 自反时, 由自反对闭子空间的稳定性知 X 的每个闭子空间均自反, 又因为对偶保持可分自反, 故 X 的每个可分闭子空间均可作为可分的对偶空间, 进而由 (i) 知 X 的每个可分闭子空间均有 RNP, 由定理 12.9 即知 X 本身有 RNP. $\square$

推论 12.18

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间, X 自反或 X^* 可分, 则对全体 $1 \leq p < \infty$ 均有同构

$$(L^p(S; X))^* = L^q(S; X^*), \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

σ 有限性假设在 $1 < p < \infty$ 时可以去掉. 

证明 当 X 自反时, 知 X^* 同样自反, 由定理 12.10 与定理 12.7 立得结论. 当 X^* 可分时同样由定理 12.10 与定理 12.7 立得结论. 去除 σ 有限性后由推论 12.17 即得结论. $\square$

例 12.9

定理 12.10 表明空间 $l^p(1 \leq p < \infty)$ 与 $L^p(S)(1 < p < \infty)$ 均有 RNP.

下面给出一些不具有 RNP 的 Banach 空间.

例 12.10

空间 $c_0, l^\infty, C[0, 1], L^\infty(0, 1)$ 关于单位区间 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ 不具有 RNP, 其中 λ 是 Lebesgue 测度. 下面说明 c_0 不具有 RNP. 考虑算子

$$T: L^1(0, 1) \rightarrow c_0, f \mapsto (Tf)_{n \geq 1}, (Tf)_n := \int_0^1 f(t) \sin(2\pi nt) dt.$$

弱 T 能被函数 $\phi \in L^\infty(0, 1; c_0)$ 表示, 则对全体下标 n 均有

$$\int_0^1 f(t) \sin(2\pi nt) dt = (Tf)_n = \int_0^1 f(t) \phi_n(t) dt, \quad \forall f \in L^1(0, 1),$$

²⁴为什么能直接从弱 * 可测推强可测? Pettis 可测定理说的是弱可测加可分取值推强可测, 这里能说 X 是 X^{**} 的稠子空间吗?

因此只能对 a.e. $t \in (0, 1)$ 有

$$\phi_n(t) = \sin(2\pi nt).$$

但只要取 $t \in (0, 1)$ 是无理数即知 $\phi(t) \in l^\infty \setminus c_0$, 这与 $\phi \in L^\infty(0, 1, c_0)$ 矛盾!

因为 c_0 是 $l^\infty, C[0, 1], L^\infty(0, 1)$ 的闭子空间 (特别对 $C[0, 1]$ 这是因为支集不交的任意正函数正规化列张成的闭线性空间等距同构于 c_0), 故由定理 12.9 知 $l^\infty, C[0, 1], L^\infty(0, 1)$ 都不能有 RNP.

例 12.11

$L^1(0, 1)$ 没有 RNP, 为此考虑证明恒同算子 $I : L^1(0, 1) \rightarrow L^1(0, 1)$ 不可表示. 根据反证法, 设存在函数 $\phi \in L^\infty(0, 1; L^1(0, 1))$ 使得

$$f = \int_0^1 f(t)\phi(t)dt, \quad f \in L^1(0, 1).$$

这特别表明对全体 $a \in (0, 1)$ 与足够小的 $h > 0$ 有

$$\frac{1}{2h} \mathbf{1}_{(a-h, a+h)} = \frac{1}{2h} \int_{a-h}^{a+h} \phi(t)dt.$$

由 Lebesgue 微分定理 13.17 知对 a.e. $a \in (0, 1)$ 有

$$\left\| \frac{1}{2h} \int_{a-h}^{a+h} \phi(t)dt - \phi(a) \right\|_{L^1(0, 1)} \leq \frac{1}{2h} \int_{a-h}^{a+h} \|\phi(t) - \phi(a)\|_{L^1(0, 1)} dt,$$

且右式在 $h \rightarrow 0$ 时收敛到 0, 但另一方面显见对全体 $a \in (0, 1)$ 而言 $\frac{1}{2h} \mathbf{1}_{(a-h, a+h)}$ 均不会收敛到 $L^1(0, 1)$ 内, 矛盾!

单位区间 $[0, 1]$ 的泛性

定义 12.14 给出的 RNP 和几何视角的相性并不好, 这是因为它不仅要求 RNP 依赖于 X , 还限定了一个特定的测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$. 实际上我们可以把测度空间的限制去掉, 此即下述结果:

定理 12.11

对 Banach 空间 X 而言, 下述断言等价:

- (i) X 关于单位区间 $[0, 1]$ 有 RNP;
- (ii) X 关于任何 σ 有限测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP.

因此我们可以把定义 12.14 修补成下述形式:

定义 12.16

若 Banach 空间 X 关于 $[0, 1]$ 有 Radon-Nikodým 性质, 就称 X 有 Radon-Nikodým 性质 (简称为 X 有 RNP).

为证明定理 12.11, 我们需要一步步搭建从 $[0, 1]$ 到任意 σ 有限测度空间之间的桥梁, 为此需要引入诸多工具. 对有限测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 而言, 若对全体实数 $0 < t < 1$ 与全体集合 $A \in \mathcal{A}$ 而言, 均存在不交集 $A_0, A_1 \in \mathcal{A}$ 使得

$$A_0 \subset A, \quad A_1 \subset A, \quad \mu(A_0) = (1-t)\mu(A), \quad \mu(A_1) = t\mu(A),$$

就称 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 可除²⁵.

²⁵ σ 有限测度可除当且仅当其非原子. 虽说这件事后头不会用到, 不过至少能说明可除 σ 有限测度在原子性上和 $[0, 1]$ 没有太大区别.

引理 12.18

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是可除可数可生成概率空间, I 是各分量均为 0 或 1 的全体有限维向量构成的集合 (简便起见把 I 中的元素记为 $\epsilon_1 \cdots \epsilon_n$), 则存在 $\mathcal{A}$ 中的集族 $\{A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}\}_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n \in I}$ 具有下述性质:

(i) 对任意 $\epsilon_1 \cdots \epsilon_n \in I$ 均有

$$\mu(A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}) = 2^{-n};$$

(ii) 对任意 $\epsilon_1 \cdots \epsilon_n \in I$ 而言, $A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}$ 总能表为不交并:

$$A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n} = A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n 0} \cup A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n 1};$$

(iii) 集族 $\{A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}\}_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n \in I}$ 生成 σ 代数 $\mathcal{A}$.



证明 该引理的证明基于一个符合直觉的简单构造, 我们在这里只勾画一个大致框架, 细节就省略了.

既然 $\mathcal{A}$ 可数可生成, 故可设 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个生成集列, 进一步不妨设 A_n 测度非零, 且 $\bigcup_{n \geq 1} A_n = S$. 归纳应用可除性并用二进制表示 $\mu(A_1)$ 知可记 $A_1 = \bigcup_{m \geq 1} A_{1m}$, 其中 $A_{1m} \in \mathcal{A}$ 两两不交, 且 $\mu(A_{1m}) = 2^{-k_{1m}}$, 其中 $k_{1m} \geq 0$ 是整数. 称现在得到的集合 A_{1m} 为**首代集合**, 记 $\mathcal{G}_1 = \{A_{1m} : m \geq 1\}$.

接下来对 $G \in \mathcal{G}_1$ 考虑集合 $G \cap A_2$. 同样根据可除性与二进制表示知每个 $G \cap A_2$ 都能写成 $\mathcal{A}$ 中测度为 2^{-k} (其中 $k \geq 0$ 依照二进制表示选取) 的集合的不交并, 记这一过程得到的集合为**二代集合**, 全体二代集合构成的集族记为 $\mathcal{G}_2$.

归纳进行前述操作, 可以得到 n 代集合 ($n = 1, 2, \dots$) 对应的集族 $\mathcal{G}_n$. 根据 $\mathcal{G}_n$ 的构造可知只要 A, A' 分别是 $\mathcal{G}_m, \mathcal{G}_n$ 中的集合 ($m \leq n$), 则要么 $A' \subset A$, 要么 $A \cap A' = \emptyset$. 现在利用可除性可以把 $\mathcal{G} := \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{G}_n$ 关于测度 μ 完备化得到二进集族 $\mathcal{H}$, 且对每个 $n = 0, 1, \dots$ 而言, 在下述意义下 $\mathcal{H}$ 中恰好包含 2^n 个测度为 2^{-n} 的集合: $\mathcal{H}$ 中每个测度为 2^{-n} 的集合都能表成 $\mathcal{H}$ 中测度为 2^{-n-1} 的两个集合的不交并. 现在 $\mathcal{H}$ 生成的 σ 代数包含 $\{A_n\}$, 进而该 σ 代数就是 $\mathcal{A}$, 重排这些集合即得待证性质. $\square$

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间, 若 $\mathcal{A}$ 中的两个集合 A_1, A_2 满足 $\mu(A_1 \Delta A_2) = 0$ (其中 $A_1 \Delta A_2 = (A_1 \cup A_2) \setminus (A_1 \cap A_2)$ 是 A_1, A_2 的对称差), 就称 A_1, A_2 μ -等价. 显见 μ -等价是 $\mathcal{A}$ 上的等价关系, 进而记 A 在该等价关系下的等价类为 $[A]$, 知集合

$$[\mathcal{A}] := \{[A] : A \in \mathcal{A}\}$$

关于距离函数 $\text{dist}([A_1], [A_2]) = \mu(A_1 \Delta A_2)$ 构成度量空间. 称这样得到的度量空间 $[\mathcal{A}]$ 为关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 的测度代数. 通过下述定义可以把集合运算过渡到 $[\mathcal{A}]$ 内:

$$[A_1] \cap [A_2] := [A_1 \cap A_2], [A_1] \cup [A_2] := [A_1 \cup A_2], [A]^c := [A^c].$$

μ 也可以通过下述方式定义为 $[\mathcal{A}]$ 上的函数:

$$\mu([A]) := \mu(A).$$

引理 12.19

设 $(S, \mathcal{A}, \mu), (T, \mathcal{B}, \nu)$ 是可除可数可生成的概率空间, 则存在保距双射 $j : [\mathcal{A}] \rightarrow [\mathcal{B}]$ 保持交并补运算, 且

$$\mu(A) = \nu(B) \Leftrightarrow j([A]) = [B], \forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}.$$

另若在 $j([A]) = [B]$ 时定义 $j(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$, 则 j 能诱导出下述 Banach 空间之间的等距同构:

$$j : L^1(S) \simeq L^1(T).$$



证明 分别取由引理 12.18 给出的 $\{A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}\}_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n \in I} \subset \mathcal{A}, \{B_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}\}_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n \in I} \subset \mathcal{B}$, 定义

$$j([A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}]) := [B_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}],$$

通过保持交并补可以把 j 延拓到有限个不交集之并构成的空间上. 由引理 12.18 知形如 $A_{\epsilon_1 \cdots \epsilon_n}$ 的集合之并构成的集族定义了关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 的测度代数中的一个稠子集, 对 $(T, \mathcal{B}, \nu)$ 也有类似结果, 因此 j 可以进一步延拓到关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 的测度代数的某个稠子集上. 因为 j 作为稠子集之间的映射等距, 故 j 在全测度代数上具有作为等距

映射的唯一延拓, 该延拓便是命题中的保距双射. $\square$

接下来可以证明定理12.11了.

证明 显见 (ii) $\Rightarrow$ (i), 因此只需证明 (i) $\Rightarrow$ (ii).

第一步 证明若 X 关于 $[0, 1]$ 有 RNP, 则 X 关于任何可除可数可生成的有限测度空间均有 RNP.

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是可除可数可生成的有限测度空间, 不妨设 $\mu(S) = 1$. 因为 $([0, 1], \mathcal{B}, |\cdot|)$ 同样是可除可数可生成的概率空间 (其中 $\mathcal{B}$ 是 $[0, 1]$ 的 Borel σ 代数, $|\cdot|$ 是 Lebesgue 测度), 故由引理12.19知映射 $j: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 能诱导等距同构 $j: L^1(S) \rightarrow L^1(0, 1)$.

根据定理12.8, 验证 RNP 就是验证对应算子的可表示性. 设 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 是有界线性算子, 因为 j 作为同构不影响有界性, 故算子 $\tilde{T} = T \circ j^{-1}: L^1(0, 1) \rightarrow X$ 同样是有界线性算子, 由 X 关于 $[0, 1]$ 有 RNP 知 $\tilde{T}$ 可被函数 $\phi \in L^\infty(0, 1; X)$ 表示. 记 $\psi \in L^\infty(S; X)$ 为 $\psi = k\phi$, 其中 $k: L^\infty(0, 1; X) \rightarrow L^\infty(S; X)$ 是满足下式的唯一有界线性算子:

$$k\left(\sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{B_n} \otimes x_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n,$$

其中 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 X 中的序列, 不交集列 $\{A_n\}_{n \geq 1}, \{B_n\}_{n \geq 1}$ 满足 $j([A_n]) = [B_n] (\forall n \geq 1)$. 现对全体 $f \in L^1(S)$ 有

$$Tf = (\tilde{T} \circ j)f = \int_0^1 (jf)(t)\phi(t)dt \stackrel{(A)}{=} \int_S f k\phi d\mu = \int_S f\psi d\mu,$$

其中 (A) 是用可数值函数逼近 f, ϕ , 再用 j, k 的性质得到的. 由上式即知 T 能被 ψ 表示, 故由定理12.8知 X 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP.

第二步 证明若 X 关于任何可除可数可生成的有限测度空间均有 RNP, 则 X 关于任何可数可生成的有限测度空间均有 RNP.

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是可数可生成的有限测度空间, $(\tilde{S}, \tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mu})$ 是可除可数可生成的有限测度空间, 且

$$\tilde{S} = S \times [0, 1], \tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \times \mathcal{B}([0, 1]), \tilde{\mu} = \mu \times |\cdot|,$$

其中 $|\cdot|$ 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 设 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 是有界线性算子, 定义

$$r: L^1(\tilde{S}) \rightarrow L^1(S), f(s, t) \mapsto (rf)(s) = \int_0^1 f(s, t)dt,$$

另定义 $\tilde{T} = T \circ r: L^1(\tilde{S}) \rightarrow X$. 因为 X 关于 $(\tilde{S}, \tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mu})$ 有 RNP, 故 $\tilde{T}$ 能被函数 $\phi \in L^\infty(\tilde{S}; X)$ 表示. 现对 $f \in L^1(S)$ 记 $\tilde{f}(s, t) := f(s)$, 则 $\tilde{f} \in L^1(\tilde{S})$, $r\tilde{f} = f$, 且

$$\begin{aligned} Tf &= T(r\tilde{f}) = \tilde{T}\tilde{f} = \int_0^1 \int_S \tilde{f}(s, t)\phi(s, t)d\mu(s)dt \\ &= \int_S f(s) \int_0^1 \phi(s, t)dt d\mu(s) = \int_S f(s)\psi(s)d\mu(s), \end{aligned}$$

其中函数 $\psi \in L^\infty(S; X)$ 定义为 $\psi(s) = \int_0^1 \phi(s, t)dt$, 故 T 能被 ψ 表示.

第三步 证明若 X 关于任何可数可生成的有限测度空间均有 RNP, 则 X 关于任何有限测度空间均有 RNP.

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间, 为证 X 关于 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 有 RNP, 由定理12.9知不妨设 X 可分, 进而由可分性与 Hahn-Banach 定理知在 X^* 的单位球 B_{X^*} 内可取用于逼近 X 中范数的序列 $\{x_n^*\}_{n \geq 1}$. 现取 $T: L^1(S) \rightarrow X$ 为有界线性算子, 记 $\tilde{T}: L^2(S) \rightarrow X$ 为 T 在 $L^2(S)$ 上的限制, 则 $\tilde{T}^*x_n^* \in (L^2(S))^* = L^2(S)$, 进而可以在 $L^2(S)$ 上生成一个使得函数列 $\{\tilde{T}^*x_n^*\}_{n \geq 1}$ 中的每个函数均可测的 σ 代数 $\mathcal{B}$. 因为每个 $\tilde{T}^*x_n^*$ 均能被 μ -简单函数逼近, 故 $\mathcal{B}$ 同样可由 μ -简单函数的可测性生成, 进而 $\mathcal{B}$ 可数可生成. 记 $E_{\mathcal{B}}$ 为 $L^2(S)$ 到 $L^2(S, \mathcal{B})$ 上的正交投影, 则对任意 $f \in L^2(S)$ 有

$$\begin{aligned} \langle \tilde{T}f, x_n^* \rangle_{X \times X^*} &= \langle f, \tilde{T}^*x_n^* \rangle_{L^2(S) \times (L^2(S))^*} = \langle f, E_{\mathcal{B}}\tilde{T}^*x_n^* \rangle_{L^2(S) \times (L^2(S))^*} \\ &= \langle E_{\mathcal{B}}f, \tilde{T}^*x_n^* \rangle_{L^2(S) \times (L^2(S))^*} = \langle \tilde{T}E_{\mathcal{B}}f, x_n^* \rangle_{X \times X^*}. \end{aligned}$$

故由推论12.11知对全体 $f \in L^2(S)$ 均有 $\tilde{T}f = \tilde{T}E_{\mathcal{B}}f$.

现在因为 X 关于 $(S, \mathcal{B}, \mu|_{\mathcal{B}})$ 有 RNP, 故算子 $T|_{L^2(S, \mathcal{B}; X)}$ 可被函数 $\phi \in L^1(S, \mathcal{B}; X)$ 表示. 于是对 $f \in L^2(S)$

而言, 由引理 12.14 证明中提到的条件期望性质可知

$$Tf = \tilde{T}f = \tilde{T}E_{\mathcal{B}}f = \int_S \phi(E_{\mathcal{B}}f)d\mu = \int_S \phi f d\mu,$$

其中 $E_{\mathcal{B}}$ 表示条件期望在 $L^1(S; X)$ 上的延拓 (注意这种延拓的存在性由定理 13.1 给出, 这里提前用这个定理不会导致循环论证). 由 $L^2(S) \cap L^1(S)$ 在 $L^1(S)$ 中稠密知等式 $Tf = \int_S \phi f d\mu$ 可以延拓到 $f \in L^1(S)$ 上, 因此 ϕ 能表示 T .

第四步 证明若 X 关于任何有限测度空间有 RNP, 则 X 关于任何 σ 有限测度空间有 RNP.

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ 有限测度空间, 由 σ 有限性知可记 $S = \bigcup_{n \geq 1} S^{(n)}$, 其中 $\{S^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是穷竭列. 给定算子 $T: L^1(S) \rightarrow X$, 考虑它在闭子空间 $L^1(S^{(n)})$ 上的限制算子 $T|_{L^1(S^{(n)})}$ 与前述结论知存在表示函数 $\phi_n \in L^\infty(S^{(n)}; X)$ 使得

$$\|\phi_n\|_{L^\infty(S^{(n)}; X)} = \|T|_{L^1(S^{(n)})}\|_{L^1(S^{(n)}) \rightarrow X} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X}.$$

容易验证只要 $m \leq n$, 函数 ϕ_n 就满足 $\phi_n|_{S^{(m)}} = \phi_m$, 因此 $\phi(s) := \phi_n(s) (s \in S^{(n)})$ 定义了函数 $\phi \in L^\infty(S; X)$, 且 $\|\phi\|_{L^\infty(S; X)} \leq \|T\|_{L^1(S) \rightarrow X}$. 因为 ϕ 在 $L^1(S^{(n)})$ 所张成的在 $L^1(S)$ 中稠密的子空间上表示 T , 故 ϕ 在整个 $L^1(S)$ 上也表示 T . $\square$

第十三章 Bochner 空间上的算子

Banach 值函数分析学的一个核心问题是所谓的 L^p 延拓问题: 对给定的定义在 $L^p(S)$ 上的有界线性算子 T 而言, 下述表达式在何时能定义 $L^p(S; X)$ 上的有界线性算子 $T \otimes I_X$:

$$(T \otimes I_X)(f \otimes x) := Tf \otimes x.$$

本章第一节我们会说明上述结果在一些特定情形下确实成立, 例如 X 是 Hilbert 空间或 T 正定. 另一方面, $T \otimes I_X$ 对任意 Banach 空间 X 均有界的一个必要条件是 T 被正算子控制, 但用上正算子之后研究那些在 $L^p(S)$ 中的有界性依赖于消失性的算子 T 就很困难了, 而消失性会出现在 Fourier 变换, Hilbert 变换与调和分析中更一般的 Calderón-Zygmund 算子中, 也会出现在随机分析的 Itô 恒等式中. 在第一节末我们会说明前面这些算子能为一般的 L^p 延拓问题提供反例, 之后的章节主要干的事其实就是讨论对特定的算子 T 而言, 怎样的 Banach 空间类 X 能使得 $T \otimes I_X$ 有界.

在某些情况下, $L^p(S; X)$ 上算子的有界性问题是有一套通用的处理方法的. 第二节我们会介绍一种特定情况, 即向量值版本的 Riesz-Thorin 插值与 Marcinkiewicz 插值, 且我们还会特别关注 Marcinkiewicz 插值中的常数. 另外我们会给出空间 $L^p(S; X)$ 上复插值与实插值的一套完备证明. 第三节我们会研究实分析中一些经典结果的向量值版本, 如 Hardy-Littlewood 极大函数与 Lebesgue 微分定理.

本章剩余部分彼此独立, 这些部分分开讨论了三个主题, 它们都会在后继章节中经常用到. 这些主题提供了目前为止介绍的方法的一些直觉性表述. 第五节我们会研究 X 值函数的微分性质, 给出向量值 Sobolev 空间与分数阶向量值 Sobolev 空间中的一些元素. 第四节我们会继续讨论向量值 Fourier 变换. 因为 Fourier-Plancherel 定理在 Bochner 空间 $L^2(\mathbb{R}^d; X)$ 中失效了 (其中 X 是不与 Hilbert 空间同构的 Banach 空间), 这便自然引出了 Fourier 型的概念. 我们还会简单介绍向量值 Schwartz 函数与向量值缓增分布. 最后在第六节, 我们会研究向量值条件期望. 条件期望不仅在概率论与随机分析中很重要, 它也在调和分析中有重要作用: 条件期望可以作为逼近过程中的平均算子.

13.1 L^p 延拓定理

如前言所述, Banach 值分析学的一个核心问题是下述延拓问题: 设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, 给定 $L^p(S)$ 上的有界线性算子 T . 设 I_X 为 X 上的恒同算子, 定义 $L^p(S) \otimes X$ 上的线性算子 $T \otimes I_X$ 为

$$(T \otimes I_X)(f \otimes x) := Tf \otimes x.$$

可以验证上述算子良定义. 因为 $1 \leq p < \infty$ 时由引理 12.5 知 $L^p(S) \otimes X$ 在 $L^p(S; X)$ 中稠密, 故我们很自然地会问 $T \otimes I_X$ 能否延拓为 $L^p(S; X)$ 上的有界算子. 更一般地, 这个问题也可以对两个不同的 L^p 空间之间的算子提. 可惜的是如果不对 T 或 X 进一步限定条件, 则就算是 $p = 2$, 这种有界延拓一般也不存在. 实际上之后的章节一大部分都是在寻找使得有界延拓存在的条件.

我们从算子 $T : L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)$ 的延拓结果开始, 且任取 Banach 空间 X . 延拓的存在性主要用到的就是三角不等式:

命题 13.1

设 $1 \leq p \leq \infty$, $T : L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)$ 是有界线性算子, X 是 Banach 空间, 则 $T \otimes I_X$ 能唯一延拓为 $L^1(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; X)$ 的有界算子, 且

$$\|T \otimes I_X\|_{L^1(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; X)} = \|T\|_{L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)}.$$

证明 考虑 μ_1 -简单函数 $\sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$ (其中 $A_n \in \mathcal{A}_1$ 是 μ_1 -有限测度不交集), 由三角不等式知

$$\left\| \sum_{n=1}^N T \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right\|_{L^p(S_2; X)} \leq \sum_{n=1}^N \|T \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n\|_{L^p(S_2; X)}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^N \|T \mathbf{1}_{A_n}\|_{L^p(S_2)} \|x_n\|_X \\
&\leq \|T\|_{L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)} \sum_{n=1}^N \|\mathbf{1}_{A_n}\|_{L^1(S_1)} \|x_n\|_X \\
&= \|T\|_{L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)} \sum_{n=1}^N \|\mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n\|_{L^1(S_1; X)} \\
&= \|T\|_{L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)} \left\| \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right\|_{L^1(S_1; X)}.
\end{aligned}$$

因此 $T \otimes I_X$ 能被估计 $\|T \otimes I_X\|_{L^1(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; X)} \leq \|T\|_{L^1(S_1) \rightarrow L^p(S_2)}$ 控制上界. 反向不等式根据 T 算子范数的定义是显见的. $\square$

将上述结果稍做推广可以得到下述结果, 该结果实际上已经包含很多有意义的例子了:

命题 13.2

设 $1 \leq p < \infty$, X 与 $L^p(S')$ 的商空间的一个闭子空间同构, 则 $L^p(S)$ 上的每个有界线性算子 T 都能延拓为 $L^p(S; X)$ 上的有界算子 $T \otimes I_X$. 另若前述同构是等距同构, 则

$$\|T \otimes I_X\|_{L^p(S; X) \rightarrow L^p(S; X)} = \|T\|_{L^p(S) \rightarrow L^p(S)}.$$

注 $L^p(0, 1)$ 的闭子空间有:

- l^2 (若 $1 \leq p < \infty$);
- l^q (若 $p \leq q \leq 2$);
- $L^q(0, 1)$ (若 $p \leq q \leq 2$).

上述三种空间都能等距同构到 $L^p(0, 1)$ 内. 我们之后会说明怎样找到这种等距同构.

证明 我们用下述三步证明命题 13.2.

第一步 设 $X \subset L^p(S', \mu')$ 是闭子空间, $x_n \in X, g_n \in L^p(S, \mu) (n = 1, \dots, N)$. 由命题 12.2 与可积函数蕴含的强 μ -可测性知 x_n 支在 S' 的 σ 有限子集上, 而 $g_n \in L^p(S)$ 与 $Tg_n \in L^p(S)$ 支在 S 的 σ 有限子集上. 通过 σ 有限性, 我们就可以利用 Fubini 定理 12.10 研究 $T \otimes I_X$ 在 $f = \sum_{n=1}^N g_n \otimes x_n$ 上的作用了:

$$\begin{aligned}
\|(T \otimes I_X)f\|_{L^p(S; X)}^p &= \int_S \left\| \sum_{n=1}^N Tg_n \otimes x_n \right\|_X^p d\mu(s) \\
&= \int_S \left\| \sum_{n=1}^N Tg_n \otimes x_n(s') \right\|_{L^p(S')}^p d\mu(s) \\
&= \int_S' \left\| \sum_{n=1}^N Tg_n \otimes x_n(s') \right\|_{L^p(S')}^p d\mu'(s') \\
&\leq \|T\|_{L^p(S) \rightarrow L^p(S)}^p \int_{S'} \left\| \sum_{n=1}^N g_n \otimes x_n(s') \right\|_{L^p(S)}^p d\mu'(s') \\
&= \|T\|_{L^p(S) \rightarrow L^p(S)}^p \int_S \left\| \sum_{n=1}^N g_n \otimes x_n(s') \right\|_{L^p(S')}^p d\mu(s) \\
&= \|T\|_{L^p(S) \rightarrow L^p(S)}^p \|f\|_{L^p(S; X)}^p.
\end{aligned}$$

第二步 设 $\iota: X \hookrightarrow L^p(S')/Z$, 其中 Z 是 $L^p(S')$ 的一个闭子空间, 设 $q_Z: L^p(S') \rightarrow L^p(S')/Z$ 是商映射, 下面说明映射 $I_{L^p(S)} \otimes q_Z: L^p(S) \otimes L^p(S') \rightarrow L^p(S) \otimes (L^p(S')/Z)$ 是有界映射. 考虑 μ -简单函数 $\sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$ (其中 A_n 是 μ -有限测度不交集), 知

$$\left\| I_{L^p(S)} \otimes q_Z \left(\sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right) \right\|_{L^p(S) \otimes (L^p(S')/Z)} = \left\| \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes q_Z(x_n) \right\|_{L^p(S) \otimes (L^p(S')/Z)}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^N \|\mathbf{1}_{A_n}\|_{L^p(S)} \|q_Z(x_n)\|_{L^p(S')/Z} \\
&= \sum_{n=1}^N \|\mathbf{1}_{A_n}\|_{L^p(S)} \inf_{x \in q_Z(x_n)} \|x\|_{L^p(S')} \\
&\leq \sum_{n=1}^N \|\mathbf{1}_{A_n}\|_{L^p(S)} \|x_n\|_{L^p(S')} \\
&= \left\| \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right\|_{L^p(S) \otimes L^p(S')}.
\end{aligned}$$

这说明

$$\|I_{L^p(S)} \otimes q_Z\|_{L^p(S) \otimes L^p(S') \rightarrow L^p(S) \otimes (L^p(S')/Z)} \leq \|q_Z\|_{L^p(S') \rightarrow L^p(S')/Z},$$

进一步取 $\|x_n\|_{L^p(S')} = \inf_{x \in q_Z(x_n)} \|x\|_{L^p(S')}$ 即知

$$\|I_{L^p(S)} \otimes q_Z\|_{L^p(S) \otimes L^p(S') \rightarrow L^p(S) \otimes (L^p(S')/Z)} = \|q_Z\|_{L^p(S') \rightarrow L^p(S')/Z}.$$

现在任取 $f \in L^p(S), q_Z \circ \iota(x) \in L^p(S')/Z$ 知

$$\begin{aligned}
T \otimes I_{L^p(S')/Z}(f \otimes q_Z \circ \iota(x)) &= Tf \otimes q_Z \circ \iota(x) \\
&= (I_{L^p(S)} \otimes q_Z)(Tf \otimes \iota(x)) \\
&= (I_{L^p(S)} \otimes q_Z)(T \otimes \iota \circ I_X)(f \otimes x)
\end{aligned}$$

由第一步给出的 $T \otimes \iota \circ I_X$ 的有界性与前文阐述的 $I_{L^p(S)} \otimes q_Z$ 的有界性即知 $T \otimes I_{L^p(S')/Z}$ 可以自然地由 $L^p(S) \otimes (L^p(S')/Z)$ 有界延拓到 $L^p(S; L^p(S')/Z)$ 上, 藉由同构 ι 进一步可以成为 $L^p(S; X)$ 上的有界算子, 其范数依赖于 $\|q_Z\|_{L^p(S') \rightarrow L^p(S')/Z}$ 与 $\|\iota\|_{X \rightarrow L^p(S')/Z}$.

第三步 若 X 与 $L^p(S')$ 的商空间的某个闭子空间等距同构, 则 $\|\iota\|_{X \rightarrow L^p(S')/Z} = 1$, 重复第二步的过程并细致给出范数即得待证的范数等式. $\square$

13.1.1 T 为正算子时 $T \otimes I_X$ 的有界性

当 T 为正算子¹时, 命题13.2可以进一步强化:

定理 13.1

设 $1 \leq p_1 < \infty, 1 \leq p_2 \leq \infty, T : L^{p_1}(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 是有界线性算子, X 是 Banach 空间. 若 T 是正算子, 则 $T \otimes I_X$ 可唯一延拓为 $L^{p_1}(S_1; X) \rightarrow L^{p_2}(S_2; X)$ 的有界算子, 且

$$\|T \otimes I_X\|_{L^{p_1}(S_1; X) \rightarrow L^{p_2}(S_2; X)} = \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)}.$$



证明 设 $f \in L^{p_1}(S_1) \otimes X$ 是 μ_1 -简单函数, 记 $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 其中 $A_n \in \mathcal{A}_1$ 两两不交. 由 T 的正性知 $|T\mathbf{1}_{A_n}| = T\mathbf{1}_{A_n}$, 且 $p_2 \neq \infty$ 时有

$$\begin{aligned}
\left\| (T \otimes I_X) \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right\|_{L^{p_2}(S_2; X)} &= \left[\int_{S_2} \left\| \sum_{n=1}^N T\mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right\|_X^{p_2} d\mu_2 \right]^{\frac{1}{p_2}} \\
&\leq \left[\int_{S_2} \left[\sum_{n=1}^N |T\mathbf{1}_{A_n}| \|x_n\|_X \right]^{p_2} d\mu_2 \right]^{\frac{1}{p_2}} \\
&= \left[\int_{S_2} \left[T \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \|x_n\|_X \right]^{p_2} d\mu_2 \right]^{\frac{1}{p_2}} \\
&= \left\| T \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \|x_n\|_X \right\|_{L^{p_2}(S_2)}
\end{aligned}$$

¹即 $f \geq 0 \Rightarrow Tf \geq 0$.

$$\begin{aligned} &\leq \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)} \left\| \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \|x_n\|_X \right\|_{L^{p_1}(S_1)} \\ &= \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)} \left\| \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \right\|_{L^{p_1}(S_1; X)}. \end{aligned}$$

$p_2 = \infty$ 时显见上述结果同样成立. 因为 μ_1 -简单函数构成的空间在 $L^{p_1}(S_1; X)$ 中稠密, 故 $T \otimes I$ 可以唯一有界延拓为 $L^{p_1}(S_1; X) \rightarrow L^{p_2}(S_2; X)$ 的算子, 且 $\|T \otimes I_X\|_{L^{p_1}(S_1; X) \rightarrow L^{p_2}(S_2; X)} \leq \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)}$. 进一步取 f 形如 $g \otimes x$ (其中 $g \in L^{p_1}(S_1), \|x\|_X = 1$) 即得 $\|T \otimes I_X\|_{L^{p_1}(S_1; X) \rightarrow L^{p_2}(S_2; X)} = \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)}$. $\square$

注意前述结果不包含 $p_1 = \infty$ 的情形. 为讨论这种情形, 我们需要引入下述概念:

定义 13.1

若函数 $f: S \rightarrow X$ 形如 $f = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{A_n} x_n$ (其中 $A_n \in \mathcal{A}$ 是不交有限 μ -测度集), 就称 f 为可数取值 μ -简单函数.



引理 13.1

全体有界可数取值 μ -简单函数构成的空间在 $L^\infty(S; X)$ 中稠密.



证明 任取 $f \in L^\infty(S; X)$. 因为 f μ -本质可分取值, 故不妨设 X 可分, 同时由命题 12.2 知可设 μ σ 有限. 设 $\{A^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是有限 μ -测度不交集构成的穷竭列.

取定 $\varepsilon > 0$, 设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 为 X 的稠子集, 不失一般性设 $j \neq k$ 时 $x_j \neq x_k$. 现对每个 $s \in S$, 记 $n(s)$ 为第一个使得 $\|f(s) - x_n\|_X < \varepsilon$ 的下标 $n \geq 1$. 对 $N \geq 1$ 记 $A_N := \{s : n(s) = N\}$, 根据 $n(s)$ 的构造显见 A_N 提取的是那些使得 $f(s)$ 足够靠近 x_n 并远离 $x_k (k \leq n-1)$ 的 $s \in S$. 显见 $\{A_N\}_N$ 两两不交, 于是把 f 看成是它自身的一个强可测表示²可知

$$A_N = \{s : \|f - x_N\|_X < \varepsilon\} \cap \left[\bigcap_{n=1}^{N-1} \{s : \|f - x_n\|_X \geq \varepsilon\} \right] \in \mathcal{A}.$$

因此 $g(s) = \sum_{n, N \geq 1} \mathbf{1}_{A_N \cap A^{(n)}} \otimes x_N$ 是可数取值 μ -简单函数. 容易验证 g 有界, 且 $\|f - g\|_{L^\infty(S; X)} \leq \varepsilon$. $\square$

现设 $T: L^\infty(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1) \rightarrow L^p(S_2, \mathcal{A}_2, \mu_2) (1 \leq p \leq \infty)$ 是有界线性算子, $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n \in L^\infty(S_1; X)$ 是可数取值 μ -简单函数 (其中 $\{A_n\} \subset \mathcal{A}_1$ 是有限测度不交集). 通过仿照先前对 $I \otimes I_X$ 的定义, 我们自然会希望定义

$$(T \otimes I_X)f := \sum_{n \geq 1} T \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n.$$

然而, 下例表明上述定义一般并不是良定义.

例 13.1

设 $S_1 = \mathbb{N}, S_2 = \{0\}, X = \mathbb{K}$, 此时 $L^\infty(S_1), L^p(\{0\})$ 分别等同于 l^∞ 与 $\mathbb{K}$. 考虑有界正算子 $T: l^\infty \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto Tx := \text{Lim } x$, 其中 Lim 表示 Banach 极限^a. 现在常值函数 $\mathbf{1}$ 可表为级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbf{1}_{\{n\}}$ 的点态极限, 但

$$T\mathbf{1} = 1 \neq 0 = \sum_{n \in \mathbb{N}} T\mathbf{1}_{\{n\}}.$$

^aBanach 极限指的是一个连续线性泛函 $\phi: l^\infty \rightarrow \mathbb{K}$, 它满足对任意 $\{x_n\} \in l^\infty$ 均有正性 (即 $x_n \geq 0 (\forall n \in \mathbb{N}) \Rightarrow \phi(x) \geq 0$), 平移不变性 (即 $\phi(x) = \phi(Sx)$, 其中 S 是平移算子 $(Sx)_n = x_{n+1}$) 与收敛相容性 (即若 x 收敛, 则 $\phi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$). Banach 极限本质上是极限算子 $\lim: c \rightarrow \mathbb{K}$ 在 l^∞ 上的延拓, 其中 $c \subset l^\infty$ 是 l^∞ 中全体收敛列构成的空间.

²回忆命题 12.3 表明强 μ -可测只能说明 f μ -a.e. 等于某强可测函数, 这并不意味着 f 本身强可测, 而只有 f 强可测我们才能说 $\{s : \|f - x_N\|_X < \varepsilon\} \in \mathcal{A}$.

引理 13.2

设 $\{g_n\}_{n \geq 1}$ 为 $L^\infty(S)$ 中的非负函数列, 且 $\sum_{n \geq 1} g_n$ a.e. 收敛到函数 $G \in L^\infty(S)$. 设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 为 X 中的收敛序列, 则 $\sum_{n \geq 1} g_n \otimes x_n$ a.e. 收敛到函数 $F \in L^\infty(S; X)$, 且极限 $F = \sum_{n \geq 1} g_n \otimes x_n$ 在拓扑 $\tau(L^\infty(S; X), L^1(S; X^*))$ 下成立.

证明 设 $M_1, M_2 \geq 0$ 满足 $\|x_n\|_X \leq M_1, 0 \leq G \leq M_2$ a.e., 则对 a.e. $s \in S$ 有:

$$\sum_{n \geq 1} \|g_n(s)x_n\|_X \leq M_1 \sum_{n \geq 1} g_n(s) \leq M_1 M_2.$$

因此对 a.e. $s \in S$ 而言, 级数 $F(s) := \sum_{n \geq 1} g_n(s)x_n$ 均在 $\|\cdot\|_X$ 的意义下收敛³, 且 $\|F\|_{L^\infty(S; X)} \leq M_1 M_2$.

为证第二条结果, 设 $h \in L^1(S; X^*)$, 则由控制收敛定理知

$$\begin{aligned} \limsup_{k \rightarrow \infty} \left| \left\langle \sum_{n=k+1}^{\infty} g_n \otimes x_n, h \right\rangle_{L^\infty(S; X) \times L^1(S; X^*)} \right| &\leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_S \sum_{n=k+1}^{\infty} g_n(s) \|h(s)\|_{X^*} d\mu(s) \|x_n\|_X \\ &\leq M_1 \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_S \sum_{n=k+1}^{\infty} g_n(s) \|h(s)\|_{X^*} d\mu(s) = 0. \end{aligned}$$

□

定理 13.2

设 $(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1), (S_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 为 σ 有限测度空间, $1 \leq p, q \leq \infty$ 满足 $1/p + 1/q = 1, T : L^\infty(S_1) \rightarrow L^q(S_2)$ 作为有界算子能成为某个 $L^p(S_2) \rightarrow L^1(S_1)$ 的算子的伴随, 且该算子在 $1 < p \leq \infty$ 时是正算子, 则 $T \otimes I_X$ 的定义域可以从 μ -简单函数延拓为可数取值 μ -简单函数, 进一步 $T \otimes I_X$ 可唯一有界延拓为 $L^\infty(S_1; X) \rightarrow L^q(S_2; X)$ 的算子, 且

$$\|T \otimes I_X\|_{L^\infty(S_1; X) \rightarrow L^q(S_2; X)} = \|T\|_{L^\infty(S_1) \rightarrow L^q(S_2)}.$$

□

证明 根据条件, 设 $V : L^p(S_2) \rightarrow L^1(S_1)$ 是有界线性算子, 且 $T = V^*$. 显见若 T 是正算子, 则 V 也是正算子, 进而 (在 $1 < p \leq \infty$ 时⁴) 由定理 13.1 或 (在 $p = 1$ 时) 命题 13.1 知算子 $V \otimes I_{X^*}$ 可以唯一延拓为 $L^p(S_2; X^*) \rightarrow L^1(S_1; X^*)$ 的有界算子. 对 $k = 1, 2$ 而言, 根据 $\|\cdot\|_{X^*}$ 的定义显见 X 是 X^{**} 中可用于逼近 X^* 中范数的闭子空间, 故由命题 12.27 知 $L^\infty(S_k; X)$ 可等距同构为 $(L^1(S_k; X^*))^*$ 的闭子空间. 下面只需在该同构意义下证明伴随算子 $U := (V \otimes I_{X^*})^*$ 把 $L^\infty(S_1; X)$ 映入 $L^q(S_2; X)$, 这是因为可以说明 U 恰为 $T \otimes I_X$ 的延拓.

根据引理 13.1, 只需证明对全体可数取值 μ -简单函数 $f \in L^\infty(S_1; X)$ 均有 $Uf \in L^q(S_2; X)$. 现设 $f = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 其中 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的有限测度不交集列, $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 为 X 中的有界序列, 设 $f_k = \sum_{n=1}^k \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$ 为 f 对应的部分和, 则由引理 13.2 知 $f_k \rightarrow f$ 在 X 中同时在 a.e. 与 $(L^1(S_1; X^*))^*$ 的弱*拓扑意义下成立. 根据伴随算子的定义知对任意测试函数 ϕ 有

$$\langle Uf_k, \phi \rangle_{L^q(S_2; X) \times L^p(S_2; X^*)} = \langle f_k, V \otimes I_{X^*}(\phi) \rangle_{L^\infty(S_1; X) \times L^1(S_1; X^*)}.$$

因为 $f_k \rightarrow f$ 在 $(L^1(S_1; X^*))^*$ 的弱*拓扑下成立, 故

$$\langle f_k, V \otimes I_{X^*}(\phi) \rangle_{L^\infty(S_1; X) \times L^1(S_1; X^*)} \rightarrow \langle f, V \otimes I_{X^*}(\phi) \rangle_{L^\infty(S_1; X) \times L^1(S_1; X^*)} = \langle Uf, \phi \rangle_{L^q(S_2; X) \times L^p(S_2; X^*)},$$

因此 $Uf_k \rightarrow Uf$ 在 $(L^p(S_2; X^*))^*$ 的弱*拓扑下成立. 另一方面, 取 $\phi = \mathbf{1}_B \otimes x^* \in L^p(S_2; X^*)$ 知

$$\begin{aligned} \langle Uf_k, \phi \rangle_{L^q(S_2; X) \times L^p(S_2; X^*)} &= \langle f_k, V \mathbf{1}_B \otimes x^* \rangle_{L^\infty(S_1; X) \times L^1(S_1; X^*)} \\ &= \sum_{n=1}^k \langle \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n, V \mathbf{1}_B \otimes x^* \rangle_{L^\infty(S_1; X) \times L^1(S_1; X^*)} \\ &= \sum_{n=1}^k \langle T \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n, \mathbf{1}_B \otimes x^* \rangle_{L^\infty(S_1; X) \times L^1(S_1; X^*)}. \end{aligned}$$

³可以验证 Cauchy 收敛准则, 其中基本列的验证用到的是 $\mathbb{R}$ 中的有界列必有收敛子列, 注意取子列对级数的极限其实没有什么影响.

⁴25.5.21: 为什么 $p = \infty$ 也可以用定理 13.1? 定理 13.1 说的是 $p_1 < \infty$ 时的延拓, $p_1 = \infty$ 不是我们现在要优化的事情吗?

由测试函数的任意性⁵即知 $Uf_k = \sum_{n=1}^k T(\mathbf{1}_{A_n}) \otimes x_n$, 由 $T: L^\infty(S_1) \rightarrow L^q(S_2)$ 即知 $Uf_k \in L^q(S_2; X)$. 根据 T 的正性知 $T(\mathbf{1}_{A_n}) \geq 0$, 且 a.e. 有

$$\sum_{n=1}^N T(\mathbf{1}_{A_n}) = T \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \leq T(\mathbf{1}),$$

这说明级数 $\sum_{n \geq 1} T(\mathbf{1}_{A_n})$ a.e. 收敛, 且其极限在 $L^q(S_2)$ 内, 从而再次由引理 13.2 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} Uf_k = F$ 同时在 a.e. 与 $(L^p(S_1; X^*))^*$ 的弱*拓扑意义下成立, 其中 $F = \sum_{n \geq 1} T(\mathbf{1}_{A_n}) \otimes x_n$. 因此 $Uf = F$, 结论得证. $\square$

13.1.2 $T \otimes I_H$ 在 Hilbert 空间 H 中的有界性

对于 Hilbert 空间 H 而言, $T \otimes I_H$ 的 L^p 有界性不再要求 T 的正性. 这一结果首先由 Paley, Marcinkiewicz 与 Zygmund 于二十世纪三十年代给出, 它给出了 Gauss 方法在泛函分析的首个应用实例. 这里我们首先对 Gauss 方法进行初等介绍, 在之后的章节我们会对这种方法进行系统讨论.

13.1.2.1 Gauss 核随机变量

我们首先引入一些相关的术语. 随机变量指的是定义在概率空间 $(\Omega, \mathbb{P})$ 上的标量值可测函数. 可积随机变量的 Lebesgue 积分称为该随机变量的期望, 记之为

$$\mathbb{E}\xi := \int_{\Omega} \xi d\mathbb{P}.$$

若对全体 $N \geq 1$ 与全体 Borel 集 $B_1, \dots, B_N$ 均有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^N \{\omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \in B_n\}\right) = \prod_{n=1}^N \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \in B_n\}),$$

就称随机变量 $\xi_1, \dots, \xi_N$ 独立. 可见若 $\{\xi_n\}_{1 \leq n \leq N}$ 是在 $\mathbb{K}$ 中取值的独立可积随机变量有限列, 则它们的乘积 $\prod_{n=1}^N \xi_n$ 可积, 且

$$\mathbb{E} \prod_{n=1}^N \xi_n = \prod_{n=1}^N \mathbb{E}\xi_n.$$

称随机变量 γ 为方差为 $\sigma^2 > 0$ 的有心 Gauss 核, 如果其分布为

$$\mathbb{P}(\gamma \in B) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_B e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$$

(其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$ 是任意 Borel 集) 或

$$\mathbb{P}(\gamma \in B) = \frac{1}{\pi\sigma^2} \int_B e^{-\frac{|z|^2}{\sigma^2}} dz$$

(其中 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $B \subset \mathbb{C}$ 是任意 Borel 集). 在这两种情况下, 若进一步有 $\sigma^2 = 1$, 就称 γ 为标准 Gauss 核.

容易验证对全体 $1 \leq p < \infty$ 而言, 有心 Gauss 核随机变量均在 $L^p(\Omega)$ 内. 实值情形下它们的 L^p 范数可以精确计算出来:

$$\|\gamma\|_{L^p}^p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{\mathbb{R}} |x|^p e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{2^{\frac{p}{2}} \sigma^p}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right), \quad (13.1)$$

其中 $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ 是 Euler Γ 函数. 我们之后特别在没有明确 γ 的时候默认 $\|\gamma\|_{L^p}$ 指的是标准 Gauss 核的 L^p 范数:

$$\|\gamma\|_{L^p} = \frac{2^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(1).$$

若随机变量列 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 中的每个分量都是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathbb{P})$ 上的独立标准 Gauss 核随机变量, 就

⁵这段式子的主要目的就是说明 $Uf_k = \sum_{n=1}^k T(\mathbf{1}_{A_n}) \otimes x_n$, 但是和前注问题相同, 在 $p < \infty$ 时这里直接令 ϕ 为 μ -简单函数, 用稠密性可以很顺利地过去, 但 $p = \infty$ 时我怎样证明这个结果?

称 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 是 Gauss 列. 根据独立性可知在 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时对全体 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^N$ 均有

$$\mathbb{P}((\gamma_1, \dots, \gamma_N) \in B) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}}} \int_B e^{-\frac{|t|^2}{2\sigma^2}} dt. \quad (13.2)$$

可以验证若 $Q: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是正交变换, 则

$$\mathbb{P}(Q(\gamma_1, \dots, \gamma_N) \in B) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{N}{2}}} \int_{Q^*B} e^{-\frac{|t|^2}{2\sigma^2}} dt,$$

通过换元知上右式与 13.2 右式实际上是相同的. 这说明 $Q(\gamma_1, \dots, \gamma_N)$ 和 $(\gamma_1, \dots, \gamma_N)$ 具有相同的分布, 且 $Q(\gamma_1, \dots, \gamma_N)$ 是另一个独立标准实 Gauss 核构成的随机变量列. 特别对 $a_n \in \mathbb{R}$ 而言, 只要 $\sum_{n=1}^N a_n^2 = 1$, 那么 $\sum_{n=1}^N a_n \gamma_n$ 就同样是标准 Gauss 核.

对于复 Gauss 核序列而言, 对酉变换 $U: \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ 与满足 $\sum_{n=1}^N |a_n|^2 = 1$ 的 $a_n \in \mathbb{C}_N$ 仿照前述证明即可得到类似的结果. 这种不变性可以导出下述结果, 它在命题 13.2 后实际上也提到过:

命题 13.3

设 Ω 是 Gauss 列 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 的背景概率空间, $p \in [1, \infty)$, 则 $L^p(\Omega)$ 存在一个与 l^2 等距同构的闭子空间, 且该闭子空间可以看成是 $L^p(\Omega)$ 中全体有限和 $\sum_{n \geq 1} a_n \gamma_n$ 构成空间的闭包^a.

^a此时可以把 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 理解成一组基底.

证明 前面已经说明了只要 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 是 Gauss 列, 则 $\|a\|_{l^2}^{-1} \sum_{n \geq 1} a_n \gamma_n$ 是标准 Gauss 核, 因此

$$\left\| \sum_{n \geq 1} a_n \gamma_n \right\|_{L^p(\Omega)} = \|\gamma\|_{L^p} \|a\|_{l^2}. \quad (13.3)$$

这说明映射 $a \mapsto \|\gamma\|_{L^p}^{-1} \sum_{n \geq 1} a_n \gamma_n$ 是 l^2 到 $L^p(\Omega)$ 某闭子空间上的等距嵌入. $\square$

Hilbert 空间的延拓定理

我们现在可以给出本小节的主要结果了:

定理 13.3 (Paley-Marcinkiewicz-Zygmund)

设 $(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1), (S_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 是测度空间, $1 \leq p_1, p_2 < \infty$, $T: L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)$ 是有界线性算子. 设 H 是 Hilbert 空间, 则 $T \otimes I_H$ 可唯一延拓为 $L^{p_1}(S_1; H) \rightarrow L^{p_2}(S_2; H)$ 的有界线性算子, 且

$$\|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)} \leq \|T \otimes I_H\|_{L^{p_1}(S_1; H) \rightarrow L^{p_2}(S_2; H)} \leq M_{p_1, p_2} \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)},$$

其中

$$M_{p_1, p_2} = \max \left\{ \frac{\|\gamma\|_{L^{p_1}}}{\|\gamma\|_{L^{p_2}}}, 1 \right\}.$$

证明 我们首先简化一下之后的证明. 因为简单函数逼近表明 $L^{p_1}(S_1) \otimes H$ 在 $L^{p_1}(S; H)$ 中稠密, 而 $T \otimes I_H$ 显然是 $L^{p_1}(S_1) \otimes H \rightarrow L^{p_2}(S_2; H)$ 的, 故只需说明 $T \otimes I_H$ 对 $L^{p_1}(S_1) \otimes H$ 中的输入有界. 根据算子范数的定义, 总存在序列 $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset L^{p_1}(S_1) \otimes H$ 满足 $\|f_n\|_{L^{p_1}(S_1; H)} = 1 (\forall n \geq 1)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T \otimes I_H f_n\|_{L^{p_2}(S_2; H)} = \|T \otimes I_H\|_{L^{p_1}(S_1; H) \rightarrow L^{p_2}(S_2; H)}.$$

因此只需考虑 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T \otimes I_H f_n\|_{L^{p_2}(S_2; H)}$ 即可. 又因为每个 $f \in L^{p_1}(S_1) \otimes H$ 实际上都在 H 的某个有限维子空间内取值, 故不失一般性可设 H 可分, 进而 H 与 l^2 等距同构⁶, 于是 H 也能与命题 13.3 提到的 $L^2(\Omega)$ 中的闭子空间等距同构, 因此可记 $H = G := G^2(\Omega)$ 为 $L^2(\Omega)$ 中全体形如 $\sum_{n=1}^N a_n \gamma_n$ 的随机变量构成集合的闭包, 其中 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 是取定的独立标准 Gauss 核随机变量构成的随机变量列.

根据前述讨论, 我们只需证明 $T \otimes I_G$ 有界, 且其范数被 $M_{p_1, p_2} \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)}$ 控制. 任取 $f \in L^{p_1}(S_1; G)$, 因为 $\{\gamma_n\}_{n \geq 1}$ 是 G 的一组正交基, 故可记 $f = \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n$, $f_n = \mathbb{E}(\overline{\gamma_n} f)$ (当然在实值情况下共轭就省掉了). 现

⁶ 参看 [HB]pg.144 Rmk.10.

由(13.3)与 Fubini 定理 12.13 知

$$\begin{aligned}
\|(T \otimes I_G)f\|_{L^{p_2}(S_2;G)} &= \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n T f_n \right\|_{L^{p_2}(S_2;G)} \\
&= \left[\int_{S_2} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n T f_n(s) \right\|_{L^2(\Omega)}^{p_2} d\mu_2(s) \right]^{\frac{1}{p_2}} \\
&= \left[\int_{S_2} \|\{\gamma_n T f_n(s)\}\|_{\ell^2}^{p_2} d\mu_2(s) \right]^{\frac{1}{p_2}} \\
&= \left[\int_{S_2} \|\gamma\|_{L^{p_2}}^{-p_2} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n T f_n \right\|_{L^{p_2}(\Omega)}^{p_2} d\mu_2(s) \right]^{\frac{1}{p_2}} \\
&= \|\gamma\|_{L^{p_2}}^{-1} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n T f_n \right\|_{L^{p_2}(S_2;L^{p_2}(\Omega))} \\
&= \|\gamma\|_{L^{p_2}}^{-1} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n T f_n \right\|_{L^{p_2}(\Omega;L^{p_2}(S_2))} \\
&\leq \|\gamma\|_{L^{p_2}}^{-1} \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_2}(\Omega;L^{p_1}(S_1))}.
\end{aligned}$$

接下来分两种情况考虑.

若 $p_2 < p_1$, 则由 Hölder 不等式知 $\mathbb{E}(\xi^{\frac{p_2}{p_1}}) \leq (\mathbb{E}\xi)^{\frac{p_2}{p_1}}$, 因此

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_2}(\Omega;L^{p_1}(S_1))} &\leq \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_1}(\Omega;L^{p_1}(S_1))} \\
&= \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_1}(S_1;L^{p_1}(\Omega))} \\
&= \|\gamma\|_{L^{p_1}} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_1}(S_1;G)} \\
&= \|\gamma\|_{L^{p_1}} \|f\|_{L^{p_1}(S_1;G)}.
\end{aligned}$$

因此 $\|T \otimes I_G\|_{L^{p_1}(S_1;G) \rightarrow L^{p_2}(S_2;G)} \leq \|\gamma\|_{L^{p_1}} \|\gamma\|_{L^{p_2}}^{-1} \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)}$.

若 $p_2 \geq p_1$, 则考虑指标为 $p_2/p_1 \geq 1$ 的 Minkowski 不等式知

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_2}(\Omega;L^{p_1}(S_1))} &\leq \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_1}(S_1;L^{p_2}(\Omega))} \\
&= \|\gamma\|_{L^{p_2}} \left\| \sum_{n \geq 1} \gamma_n f_n \right\|_{L^{p_1}(S_1;G)} \\
&= \|\gamma\|_{L^{p_2}} \|f\|_{L^{p_1}(S_1;G)}.
\end{aligned}$$

因此 $\|T \otimes I_G\|_{L^{p_1}(S_1;G) \rightarrow L^{p_2}(S_2;G)} \leq \|T\|_{L^{p_1}(S_1) \rightarrow L^{p_2}(S_2)}$. □

实 Banach 空间复化空间上的延拓结果

因为复 Gauss 核序列也有类似的不变性, 故上述证明用到的技术同样可以在实 Banach 空间 X 复化空间的语境下导出有用的延拓结果. 回忆对 Banach 空间 X 而言, 其复化 $X_{\mathbb{C}}$ 指的是空间 $X \times X$, 其上装备下述复标量乘法:

$$(a + ib)(x_1, x_2) := (ax_1 - bx_2, bx_1 + ax_2),$$

在赋上述乘法后, $X_{\mathbb{C}}$ 成为复向量空间, 明晰起见我们把 (x_1, x_2) 写成 $x_1 + ix_2$. 可以说明在 $X_{\mathbb{C}}$ 上存在某个范数, 使得 $X_{\mathbb{C}}$ 关于该范数成为 Banach 空间, 且只要 $T: X \rightarrow Y$ 是有界线性算子, 则其复化算子 $T_{\mathbb{C}}(x_1 + ix_2) := Tx_1 + iTx_2$ 的算子范数与 T 的算子范数相同. 现在对空间与算子作复化之后, 关于 L^p 延拓问题我们自然会多问

一句: 如果 T 是两个 L^p 空间之间的有界线性算子, 那 $(T \otimes I_X)_\mathbb{C}$ 能成为 $L^p(X_\mathbb{C})$ 之间的有界算子吗? 其范数与 $T \otimes I_X$ 的范数相同吗? 为说明这件事, 我们需要具体赋 $X_\mathbb{C}$ 上的范数如下:

引理 13.3

设 X 为实 Banach 空间, $p \in [1, \infty)$. 若记

$$\|x_1 + ix_2\|_{X_\mathbb{C}^{\gamma,p}} := \frac{1}{\|\gamma_1\|_{L^p}} (\mathbb{E} \|\gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2\|_X^p)^{\frac{1}{p}},$$

其中 γ_1, γ_2 是独立实值标准 Gauss 核, 则 $\|\cdot\|_{X_\mathbb{C}^{\gamma,p}}$ 是 $X_\mathbb{C}$ 上的范数, 且 $(X_\mathbb{C}, \|\cdot\|_{X_\mathbb{C}^{\gamma,p}})$ 是复 Banach 空间, 记该空间为 $X_\mathbb{C}^{\gamma,p}$.

证明 我们这里只验证该范数与标量乘法相容, 即

$$\|(a + ib)(x_1 + ix_2)\|_{X_\mathbb{C}^{\gamma,p}} = |a + ib| \|x_1 + ix_2\|_{X_\mathbb{C}^{\gamma,p}}.$$

不妨设 $|a + ib| = 1$, 注意到

$$\gamma_1(ax_1 - bx_2) + \gamma_2(bx_1 + ax_2) = (a\gamma_1 + b\gamma_2)x_1 + (-b\gamma_1 + a\gamma_2)x_2.$$

记

$$Q := \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

由 $|a + ib| = 1$ 知 Q 是正交阵, 故 $Q(\gamma_1, \gamma_2)^T$ 同样是独立标准 Gauss 核对, 进而

$$\mathbb{E} \|(a\gamma_1 + b\gamma_2)x_1 + (-b\gamma_1 + a\gamma_2)x_2\|_X^p = \mathbb{E} \|\gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2\|_X^p.$$

此即待证式. □

注 当 $X = \mathbb{R}$ 时, 可以验证 $\|x_1 + ix_2\|_{\mathbb{R}_\mathbb{C}^{\gamma,p}} = (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}} (\forall p \in [1, \infty))$. 这是因为不妨设 $(x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}} = 1$, 进而 $x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2$ 同样是标准 Gauss 核, 于是 $(\mathbb{E} |\gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2|^p)^{\frac{1}{p}} = \|\gamma_1\|_{L^p}$, 通过 scaling 即得一般情形. 由此可知 $\mathbb{R}_\mathbb{C}^{\gamma,p}$ 与 $(\mathbb{C}, |\cdot|_\mathbb{C})$ 实际上是重合的.

命题 13.4

设 X, Y 为实 Banach 空间, $p \in [1, \infty)$, $(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1), (S_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 是 σ 有限测度空间. 取定 $T : L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; Y)$ 为有界线性算子, 定义 $T_\mathbb{C}$ 为

$$T_\mathbb{C}(f + ig) := Tf + iTg, \quad \forall (f + ig) \in L^p(S_1; X_\mathbb{C}^{\gamma,p}),$$

则 $T_\mathbb{C}$ 是 $L^p(S_1; X_\mathbb{C}^{\gamma,p}) \rightarrow L^p(S_2; Y_\mathbb{C}^{\gamma,p})$ 的有界线性算子, 且

$$\|T_\mathbb{C}\|_{L^p(S_1; X_\mathbb{C}^{\gamma,p}) \rightarrow L^p(S_2; Y_\mathbb{C}^{\gamma,p})} = \|T\|_{L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; Y)}.$$

证明 观察到 $Jf := f + i0$ 能把 $L^p(S_1; X)$ 等距同构为 $L^p(S_1; X_\mathbb{C}^{\gamma,p})$ 的一个 (实线性) 子空间. 因为 $T_\mathbb{C}J = JT$, 故显见 $\|T_\mathbb{C}\|_{L^p(S_1; X_\mathbb{C}^{\gamma,p}) \rightarrow L^p(S_2; Y_\mathbb{C}^{\gamma,p})} \geq \|T\|_{L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; Y)}$. 反向不等式的证明实际上只需要用到定义与 Fubini 定理. 设 Ω 是 γ_1, γ_2 对应的背景概率空间, 则

$$\begin{aligned} \|\gamma\|_{L^p} \|T_\mathbb{C}(f + ig)\|_{L^p(S_2; Y_\mathbb{C}^{\gamma,p})} &= \|\gamma_1 Tf + \gamma_2 Tg\|_{L^p(S_2; L^p(\Omega; Y))} \\ &= \|T(\gamma_1 f + \gamma_2 g)\|_{L^p(\Omega; L^p(S_2; Y))} \\ &\leq \|T\|_{L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; Y)} \|\gamma_1 f + \gamma_2 g\|_{L^p(\Omega; L^p(S_1; X))} \\ &= \|T\|_{L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; Y)} \|\gamma_1 f + \gamma_2 g\|_{L^p(S_1; L^p(\Omega; X))} \\ &= \|\gamma\|_{L^p} \|T\|_{L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; Y)} \|f + ig\|_{L^p(S_1; X_\mathbb{C}^{\gamma,p})}. \end{aligned}$$

□

推论 13.1

设 X 为实 Banach 空间, $p \in [1, \infty)$, $(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1), (S_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 为 σ 有限测度空间. 设有界线性算子 $T : L^p(S_1; \mathbb{R}) \rightarrow L^p(S_2; \mathbb{R})$ 有有界延拓 $T \otimes I_X : L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; X)$, 则 $T_{\mathbb{C}} : L^p(S_1; \mathbb{C}) \rightarrow L^p(S_2; \mathbb{C})$ 同样有有界延拓:

$$T_{\mathbb{C}} \otimes I_{X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p}} : L^p(S_1; X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p}) \rightarrow L^p(S_2; X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p}),$$

且 $T_{\mathbb{C}} \otimes I_{X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p}}$ 的范数与 $T \otimes I_X$ 的范数相同.



注 这里 $T_{\mathbb{C}}$ 是命题 13.4 在 $X = Y = \mathbb{R}$ 时给出的 T 的复延拓.

证明 注意单纯作为集合而言有 $X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p} = X_{\mathbb{C}}$, 因此可以验证

$$L^p(S_1; \mathbb{C}) \otimes X_{\mathbb{C}} = (L^p(S_1; \mathbb{R}) \otimes X)_{\mathbb{C}},$$

这里 $Y_{\mathbb{C}}$ 对应实线性空间 Y 关于前述两种方式的复化空间. 进一步, 下述算子等式在定义域为代数张量积空间时成立:

$$T_{\mathbb{C}} \otimes I_{X_{\mathbb{C}}} = (T \otimes I_X)_{\mathbb{C}}.$$

对 $T \otimes I_X$ 应用命题 13.4 知上右式可延拓为 $L^p(S_1; X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p}) \rightarrow L^p(S_2; X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p})$ 的有界线性算子, 且其算子范数和 $T \otimes I_X : L^p(S_1; X) \rightarrow L^p(S_2; X)$ 的算子范数相同, 故由上述等式知上左式同样可作该延拓. $\square$

注 如果把命题 13.4 与推论 13.1 谈的空间 $L^p(S_1, Z) (Z \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, X, X_{\mathbb{C}}^{\gamma, p}\})$ 换成下述子空间:

$$L_0^p(S_1; Z) := \left\{ f \in L^p(S_1; Z) : \int_{S_1} f d\mu_1 = 0 \right\},$$

其中 $(S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 是有限测度空间, 则可以验证前述证明依旧成立. 注意乘积空间值函数零均值当且仅当它的两个分量都是零均值.

13.1.3 一些反例

接下来我们给出一些具体的反例算子, 它们的向量值延拓未必有界. 我们的第一个反例可以追溯到 Bochner 积分理论问世之初, 该反例由 Bochner 与 1933 年给出, 同年他提出了 Bochner 积分.

例 13.2 (Fourier 变换)

Fourier 变换

$$\mathcal{F}f(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad f \in L^1(\mathbb{R})$$

是 $L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ 的有界算子, 且由 Plancherel 定理 (定理 13.19) 知它在 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 上的限制能延拓为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的一个等距同构 (称为 Fourier-Plancherel 变换). 因此由 Riesz-Thorin 定理 (定理 13.12) 知它可以插值成为 $L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}) (\forall p \in [1, 2], 1/p + 1/p' = 1)$ 的范数不超过 1 的有界算子 (即 Hausdorff-Young 定理). 另通过 scaling 可以验证要想把 $\mathcal{F}$ 能延拓为 $L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^q(\mathbb{R})$ 的有界算子, 就只能有 $q = p'$.

根据命题 13.1 显见 Fourier 变换可以延拓为有界算子 $\mathcal{F} \otimes I_X : L^1(\mathbb{R}; X) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}; X)$. 因为 X 值简单函数构成的空间在 $L^1(\mathbb{R}; X)$ 中稠密, 且 Fourier 变换把这类函数映入 $C_0(\mathbb{R}; X)$, 故实际上前述延拓是 $L^1(\mathbb{R}; X) \rightarrow C_0(\mathbb{R}; X)$ 的 (参看引理 13.18). 下面说明 Fourier 变换并不能进一步延拓为 $L^p(\mathbb{R}; l^r) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}; l^r) (1 \leq r < p \leq 2)$ 的有界算子.

设 $f \in C_c(\mathbb{R})$ 是支在 $(0, 1)$ 上的非零函数, 对 $N \geq 1$ 定义 $f_N \in C_c(\mathbb{R}; l^r)$ 为

$$f_N := \sum_{n=0}^N f(\cdot + n) \otimes e_{n+1},$$

则由 $f(\cdot + n)$ 支集的不变性知

$$\begin{aligned}\|f_N\|_{L^p(\mathbb{R}; l^r)} &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{n=0}^N |f(x+n)|^r \right]^{\frac{p}{r}} dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^N |f(x+n)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= N^{\frac{1}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}.\end{aligned}$$

另一方面知 $(\mathcal{F} \otimes I_r)f_N(\xi) = \sum_{n=0}^N e^{i2\pi n\xi} \mathcal{F}f(\xi) \otimes e_{n+1}$, 进而

$$\begin{aligned}\|(\mathcal{F} \otimes I_r)f_N\|_{L^{p'}(\mathbb{R}; l^r)} &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{n=0}^N |e^{i2\pi n\xi} \mathcal{F}f(\xi)|^r \right]^{\frac{p'}{r}} d\xi \right]^{\frac{1}{p'}} \\ &= N^{\frac{1}{r}} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}f(\xi)|^{p'} d\xi \right]^{\frac{1}{p'}} \\ &= N^{\frac{1}{r}} \|\mathcal{F}f\|_{L^{p'}(\mathbb{R})},\end{aligned}$$

$p' = \infty$ 是同样可以验证上述等式成立. 现有

$$\|\mathcal{F} \otimes I_r\|_{L^p(\mathbb{R}; l^r) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}; l^r)} \geq N^{\frac{1}{r} - \frac{1}{p}} \frac{\|\mathcal{F}f\|_{L^{p'}(\mathbb{R})}}{\|f\|_{L^p(\mathbb{R})}}.$$

因为我们设了 $r < p$, 故令 $N \rightarrow \infty$ 即知 $\mathcal{F} \otimes I_r$ 没法延拓为 $L^p(\mathbb{R}; l^r) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}; l^r)$ 的有界算子.

另外, 若 $1 \leq p \leq 2, p' < r \leq \infty$, 则 Fourier 变换同样没法延拓为 $L^p(\mathbb{R}; l^r) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}; l^r)$ 的有界算子, 为此只需要对函数 $f_N(x) = \sum_{n=0}^N e^{-i2\pi nx} f(x) \otimes e_{n+1}$ 重复前述证明即可.

不过对于剩下的指标范围 $1 \leq p \leq 2, p \leq r \leq p'$ 而言, Fourier 变换确实可以延拓为 $L^p(\mathbb{R}; l^r) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}; l^r)$ 的有界算子, 这是因为指标在这一范围内时空间 $L^p(\mathbb{R}; l^r)$ 可以等同为 $L^1(\mathbb{R}; l^{r_0})$ 与 $L^2(\mathbb{R}; l^2)$ 的复插值空间, 其中 $1 \leq r_0 \leq \infty$ 是关于 r 的指标, 利用复插值即可得到有界性结果. 我们通常简称这种情形为 l^r 具有 p -Fourier 型, 在后面的小节我们会更细致地讨论这件事. 另外对圆周上的 Fourier 变换我们同样可以得到类似结果, 参看例??.

例 13.3 (Hilbert 变换)

M. Riesz 的一个经典结果就是证明了依主值积分定义的 Hilbert 变换

$$Hf(x) = \text{p.v.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{x-y} dy, \quad x \in \mathbb{R}$$

是 $L^p(\mathbb{R}) * (1 < p < \infty)$ 上的有界算子. 回忆 Hilbert 变换的重要性体现在其 Fourier 乘子意义:

$$\mathcal{F}(Hf)(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi), \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}),$$

其中 $\mathcal{F}$ 是 Fourier-Plancherel 变换, 从而 H 是乘子函数 $m(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi)$ 对应的 p 次 Fourier 乘子. 下面我们说明对任意 $1 \leq p < \infty$ 而言, H 均没法延拓为 $L^p(\mathbb{R}; l^1)$ 上的有界算子.

取定 $1 \leq p < \infty$, 设 $f_N \in L^p(\mathbb{R}; l^1)$ 为 $f_N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(n-1, n)} \otimes e_n$, 其中 e_n 是 l^1 中的第 n 个单位向量. 显见

$$\|f_N\|_{L^p(\mathbb{R}; l^1)} = N^{\frac{1}{p}}.$$

另一方面直接计算可知

$$H\mathbf{1}_{(a,b)}(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| 1 + \frac{b-a}{x-b} \right|, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{a, b\},$$

故

$$(H \otimes I_{l^1})f_N(x) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \log \left| 1 + \frac{1}{x-n} \right| e_n, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, \dots, N\},$$

从而

$$\begin{aligned}\|(H \otimes I_{l^1})f\|_{L^p(\mathbb{R}; l^1)}^p &= \frac{1}{\pi^p} \int_{\mathbb{R}} \left[\sum_{n=1}^N \left| \log \left| 1 + \frac{1}{x-n} \right| \right| \right]^p dx \\ &\geq \frac{1}{\pi^p} \sum_{k=1}^N \int_k^{k+1} \left[\sum_{n=1}^k \log \left(1 + \frac{1}{x-n} \right) \right]^p dx.\end{aligned}$$

现对 $x \in (k, k+1)$ 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^k \log \left(1 + \frac{1}{x-n} \right) &\geq \sum_{n=1}^k \log \left(1 + \frac{1}{k-n+1} \right) \\ &\stackrel{(A)}{\geq} \frac{1}{2} \sum_{n=1}^l \frac{1}{k-n+1} \geq \frac{1}{2} \log(k),\end{aligned}$$

其中 (A) 是因为 $y \in [0, 1]$ 时 $\log(1+y) \geq y/2$. 由上式进一步知

$$\begin{aligned}\|(H \otimes I_{l^1})f\|_{L^p(\mathbb{R}; l^1)} &\geq \frac{1}{2\pi} \left[\sum_{k=1}^N \log^p(k) \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\geq \frac{1}{2\pi} \left[\sum_{k=\lceil N/2 \rceil}^N \log^p(k) \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\geq \frac{1}{2\pi} \left(\frac{N}{2} \right)^{\frac{1}{p}} \log \left(\frac{N}{2} \right).\end{aligned}$$

这说明 $\|H \otimes I_{l^1}\|_{L^p(\mathbb{R}; l^1) \rightarrow L^p(\mathbb{R}; l^1)} \geq (2\pi)^{-1} 2^{-\frac{1}{p}} \log(N/2)$, 后者在 $N \rightarrow \infty$ 时趋无穷.

对于离散版本的 Fourier 变换与 Hilbert 变换, 我们也有类似的不可延拓性结果, 这是因为连续情形下它们分别不能延拓为 $L^p(\mathbb{T}; l^r) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{Z}; l^r)$ ($r \in [1, p) \cup (p', \infty]$) 或 $L^p(\mathbb{T}; l^1) \rightarrow L^p(\mathbb{T}; l^1)$ 的有界算子. 这里离散 Hilbert 变换我们记成 $\tilde{H}$, 它指的是乘子函数 $m(n) = -i \operatorname{sgn}(n)$ (简便起见记 $\operatorname{sgn}(0) = 0$) 对应的 p 次 Fourier 乘子. 类似于连续 Hilbert 变换, 可以证明 $\tilde{H}$ 在 $L^p(\mathbb{T})$ ($1 < p < \infty$) 上有界. 另设乘子函数

$$\tilde{m}(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n \geq 0, \end{cases}$$

知 $\tilde{m}(n)$ 诱导了 Riesz 投影:

$$R: \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{ink} \mapsto \sum_{n \geq 0} c_n e^{ink}.$$

显见 $R = \frac{1}{2}(i\tilde{H} + I + P)$, 其中 P 是到常值函数上的投影. 根据 $\tilde{H}$ 的不可延拓性可以说明 Riesz 投影同样不能延拓为 $L^p(\mathbb{T}; l^1) \rightarrow L^p(\mathbb{T}; l^1)$ 的有界算子. 不过我们之后会说明对于 UMD 空间 X 而言, Riesz 投影是 $L^p(\mathbb{T}; X) \rightarrow L^p(\mathbb{T}; X)$ 有界的.

例 13.4 (Wiener-Itô 等距变换)

设

Fourier-Plancherel 变换, Hilbert 变换与 Wiener-Itô 等距变换在何种 Banach 空间类里有有界延拓这一问题已经发展出了一大类成果. 作为本书主要内容的一个预告, 我们这里先给出这三类算子的确切答案.

定理 13.4 (Kwapień)

对 Banach 空间 X 而言, 下述断言等价:

- (i) Fourier-Plancherel 变换能延拓为 $L^2(\mathbb{R}; X) \rightarrow L^2(\mathbb{R}; X)$ 的有界算子;
- (ii) X 同构于某 Hilbert 空间.



定理 13.5 (Burkholder-Bourgain)

对 Banach 空间 X 而言, 下述断言等价:

- (i) 存在 (等价地也是对任意) $1 < p < \infty$ 使得 Hilbert 变换能延拓为 $L^p(\mathbb{R}; X) \rightarrow L^p(\mathbb{R}; X)$ 的有界算子;
- (ii) X 是 UMD 空间.



上述两个结果的证明相当庞大, 不过下述结果相对来说更初等一些.

定理 13.6

对 Banach 空间 X 而言, 下述断言等价:

- (i) Wiener-Itô 等距变换能延拓为 $L^2(\mathbb{R}_+; X) \rightarrow L^2(\Omega; X)$ 的有界算子;
- (ii) X 具有 2 型.



之后的章节中我们会研究具有 UMD 性质的 Banach 空间类, 该空间类包含了 Hilbert 空间与 $L^p(1 < p < \infty)$ 空间. 型的概念我们会在更后面讨论. 注意 c_0, l^1 与任何以这两个空间为子空间的 Banach 空间都没有 UMD 性质与 2 型性质 (进一步实际上没有非平凡型).

我们之后会看到 L^2 空间之间的有界算子总是具有某种特定的 Gauss 型 X 值延拓.

13.2 Bochner 空间的插值

在诸多情况下我们都需要空间 $L^p(S; X)$ 与其上算子的插值结果, 本节我们就对这类结果展开讨论. 这里首先引入一些便于后续表述的概念.

13.2.1 经典插值理论回顾: 复插值与实插值

插值对

定义 13.2

若 Banach 空间 X_0, X_1 均能连续嵌入到某 Hausdorff 拓扑线性空间 $\mathcal{X}$ 内, 就称序对 (X_0, X_1) 为插值对.

**例 13.5**

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, 则对全体 $1 \leq p_0, p_1 \leq \infty$ 而言, 序对 $(L^{p_0}(S), L^{p_1}(S))$ 均为插值对, 其中连续嵌入的目标空间为 $\mathcal{X} = L^0(S)$. 这里我们在 $L^0(S)$ 上赋下述平移不变度量:

$$d_\infty(f, g) := \inf\{a \geq 0 : \mu(|f - g| \geq a) \leq a\} \wedge 1.$$

若 S 还是 σ 有限测度空间, 则 $L^0(S)$ 上的拓扑还可以用依测度收敛来诱导.

命题 13.5

若 (X_0, X_1) 是插值对, 则空间

$$X_0 \cap X_1 = \{x \in \mathcal{X} : x \in X_0 \wedge x \in X_1\},$$

$$X_0 + X_1 = \{x \in \mathcal{X} : x = x_0 + x_1, x_0 \in X_0, x_1 \in X_1\}$$

分别是赋下述范数的 Banach 空间:

$$\|x\|_{X_0 \cap X_1} := \max\{\|x\|_{X_0}, \|x\|_{X_1}\},$$

$$\|x\|_{X_0 + X_1} := \inf\{\|x_0\|_{X_0} + \|x_1\|_{X_1} : x = x_0 + x_1, x_0 \in X_0, x_1 \in X_1\}.$$



证明 显见 $\|\cdot\|_{X_0 \cap X_1}$ 首先是范数. 为验证完备性, 设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 为 $X_0 \cap X_1$ 中关于 $\|\cdot\|_{X_0 \cap X_1}$ 的 Cauchy 列, 则由 $\|\cdot\|_{X_0 \cap X_1}$ 的定义知 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 同时是 $(X_0, \|\cdot\|_{X_0})$ 与 $(X_1, \|\cdot\|_{X_1})$ 中的 Cauchy 列. 因为 X_0, X_1 均连续嵌入 $\mathcal{X}$, 同时 $\mathcal{X}$ 还是 Hausdorff 空间, 故 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 X_0 和 X_1 中的极限作为 $\mathcal{X}$ 中的元素是重合的, 记之为 x , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 同时在 X_0, X_1 中成立, 自然也在 $X_0 \cap X_1$ 中成立.

下面研究 $\|\cdot\|_{X_0+X_1}$, 首先说明 $\|\cdot\|_{X_0+X_1}$ 确为范数, 为此只需验证 $\|x\|_{X_0+X_1} = 0 \Rightarrow x = 0$. 取 $\{y_n^0\}_n \subset X_0, \{y_n^1\}_n \subset X_1$ 使得 $x = y_n^0 + y_n^1$, 且 $\|y_n^0\|_{X_0} + \|y_n^1\|_{X_1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $x = y_n^0 + y_n^1 \rightarrow 0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立, 故 $x = 0$.

为证 X_0+X_1 的完备性, 注意到该完备性等价于 X_0+X_1 中任意绝对收敛序列的收敛性. 现设 $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|_{X_0+X_1} < \infty$, 记 $x_n = y_n^0 + y_n^1, y_n^0 \in X_0, y_n^1 \in X_1, \|y_n^0\|_{X_0} + \|y_n^1\|_{X_1} < \|x_n\|_{X_0+X_1} + 2^{-n}$, 则级数 $\sum_{j=1}^{\infty} y_n^0, \sum_{j=1}^{\infty} y_n^1$ 分别在 X_0, X_1 中绝对收敛, 记 $y^0 = \sum_{j=1}^{\infty} y_n^0, y^1 = \sum_{j=1}^{\infty} y_n^1, x := y^0 + y^1$. 现由 $x_n = y_n^0 + y_n^1$ 知

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N x_n \right\|_{X_0+X_1} = \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} (y_n^0 + y_n^1) \right\|_{X_0+X_1} \leq 2^{-N} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_n\|_{X_0+X_1} \rightarrow 0, N \rightarrow \infty.$$

故 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 在 $X_0 + X_1$ 中成立. □

注 注意 $X_0 \cap X_1$ 与 $X_0 + X_1$ 和嵌入目标空间 $\mathcal{X}$ 的具体选取独立.

根据定义立得压缩嵌入关系 $X_0 \cap X_1 \hookrightarrow X_0, X_0 \cap X_1 \hookrightarrow X_1$. 另由分解

$$x_0 = x_0 + 0, x_1 = 0 + x_1$$

知同样有压缩嵌入关系 $X_0 \hookrightarrow X_0 + X_1, X_1 \hookrightarrow X_0 + X_1$.

例 13.6

若 (X_0, X_1) 作为插值对满足 $X_0 \cap X_1$ 在 X_0, X_1 中均稠密, 则序对 (X_0^*, X_1^*) 是嵌入目标空间 $\mathcal{X} = (X_0 \cap X_1)^*$ 对应的插值对.

复插值

复插值理论需要用到向量值全纯映射, 因此我们首先讨论一下向量值全纯映射的定义与性质. 称区域为 $\mathbb{C}$ 的连通开子集. 若 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域, X 是 Banach 空间, 且函数 $f: D \rightarrow X$ 满足对全体 $z_0 \in D$ 而言, 极限

$$f'(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

在 X 中均存在, 就称 f 全纯.

命题 13.6

设 Z 是 X^* 的弱*稠密线性子空间, 则对局部有界强可测函数 $f: D \rightarrow X$ 而言下述断言等价:

- (i) f 全纯;
- (ii) $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 对全体 $x^* \in Z$ 均全纯.

证明 根据 x^* 作为泛函的连续性立得 (i) $\Rightarrow$ (ii), 因此只需证明 (ii) $\Rightarrow$ (i).

根据 f 的强有界性与 Pettis 可测定理 12.2 可设 X 可分. 因为 Z 在 X^* 中弱*稠, 故对每个 $x^* \in X^*$ 而言, $\langle f(s), x^* \rangle_{X \times X^*}$ 都能写成全纯函数列 $\{\langle f(s), x_n^* \rangle_{X \times X^*}\}_n$ 的点态极限 (其中 $\{x_n^*\}_n \subset Z$), 且 f 的局部有界性表明 $\{\langle f(s), x_n^* \rangle_{X \times X^*}\}_n$ 是一致局部有界的. 因为一致局部有界全纯函数列的点态极限同样是全纯函数⁷, 故实际上对全体 $x^* \in X^*$ 而言 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均全纯⁸.

现在取定 $z_0 \in D$, 设 $r > 0$ 足够小, 使得闭圆盘 $\text{disc}\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\}$ 在 D 内. 记

$$V = \left\{ \frac{1}{h-g} \left(\frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} - \frac{f(z_0+g) - f(z_0)}{g} \right) : |g|, |h| < \frac{r}{2} \right\}.$$

⁷ 参看 [WR] pg.214 Thm.10.28, 全纯函数列的一致局部有界性保证了紧集上的一致收敛性.

⁸ 这里同样用到了定理 12.1 证明中提到的 [TJML] 上的推论: 若 X 可分, Y 是 X^* 的弱*稠密线性子空间, 且 Y 弱*列闭, 则 $Y = X^*$. 这里是把 Y 看成 X^* 中使得 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 全纯的全体 x^* 构成的集合.

取定 $x^* \in Z$, 则对全体 $|g|, |h| < r/2$ 由 Cauchy 积分公式知

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{h-g} \left\langle \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - \frac{f(z_0+g)-f(z_0)}{g}, x^* \right\rangle_{X \times X^*} \right| \\ &= \left| \frac{1}{i2\pi} \frac{1}{h-g} \int_{|z-z_0|=r} \langle f(z), x^* \rangle_{X \times X^*} \left(\frac{1}{h} \left(\frac{1}{z-(z_0+h)} - \frac{1}{z-z_0} \right) - \frac{1}{g} \left(\frac{1}{z-(z_0+g)} - \frac{1}{z-z_0} \right) \right) dz \right| \\ &= \left| \frac{1}{i2\pi} \int_{|z-z_0|=r} \langle f(z), x^* \rangle_{X \times X^*} \frac{1}{(z-(z_0+h))(z-(z_0+g))(z-z_0)} dz \right| \\ &\leq \sup_{0 \leq \theta \leq 2\pi} |\langle f(re^{i\theta}), x^* \rangle_{X \times X^*}| \cdot \frac{2}{r} \cdot \frac{2}{r} \cdot \frac{1}{r} < \infty, \end{aligned}$$

因此对每个 $x^* \in X^*$ 而言, 集合 $\{\langle v, x^* \rangle_{X \times X^*} : v \in V\}$ 均有界, 由一致有界原理即知 V 本身是有界集, 故存在有限常数 M 使得 $|g|, |h| < r/2$ 时有

$$\left\| \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - \frac{f(z_0+g)-f(z_0)}{g} \right\|_X \leq M|h-g|.$$

故由 Cauchy 收敛准则即知 $\lim_{h \rightarrow 0} (f(z_0+h)-f(z_0))/h$ 在 X 中存在. $\square$

注 命题 13.6 使得我们可以把全纯函数的很多经典结果拓展到向量值情形上, 这些拓展的证明一般来说要么是把向量值函数和泛函复合后应用上述结果, 要么直接就是重复标量版本对应结果的证明. 比方说向量值全纯函数的导函数 $f' : D \rightarrow X$ 同样全纯 (这是因为每个 $\langle f', x^* \rangle_{X \times X^*}$ 均全纯), 且向量值版本的 Cauchy 积分公式依旧成立 (因为对每个 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 而言 Cauchy 积分公式成立). 另外, 向量值全纯函数可以局部表为系数在 X 中的幂级数 (只需重复标量情形的证明), 且最大值原理依旧成立: 若 D 是开区域, $f : D \rightarrow X$ 全纯, 则 $z \mapsto \|f(z)\|_X$ 不会在 D 的任意内点处取到局部极大值 (这是因为只要 $\|f(z)\|_X$ 在 $z_0 \in D$ 处取局部极大值, $x^* \in X^*$ 满足 $|\langle f(z_0), x^* \rangle_{X \times X^*}| = \|f(z_0)\|_X, \|x^*\|_{X^*} = 1$, 则对 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 可得 $|\langle f(z_0), x^* \rangle_{X \times X^*}| = \|f(z_0)\|_X \geq \|f(z)\|_X \geq |\langle f(z), x^* \rangle_{X \times X^*}| (\forall z \in D)$, 这与标量情形的最大值原理矛盾).

推论 13.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, X, Y 是 Banach 空间, Z 是 Y^* 中可用于逼近 Y 中范数的子空间, 则对向量值函数 $f : D \rightarrow L(X, Y)$ 而言下述断言等价:

- (i) f 全纯;
- (ii) 对全体 $x \in X$ 而言 fx 全纯;
- (iii) 对全体 $x \in X, y^* \in Z$ 而言 $\langle fx, y^* \rangle_{Y \times Y^*}$ 全纯.



证明 考虑泛函族 $\{x \otimes y^*\}_{x \in X, y^* \in Z} \subset (L(X, Y))^*$ 张成的线性空间, 显见 $\text{span}\{x \otimes y^*\}_{x \in X, y^* \in Z}$ 是 $(L(X, Y))^*$ 中可用于逼近 $L(X, Y)$ 中范数的空间, 进而 (i), (iii) 的等价性由命题 13.6 立得, 进而 (ii), (iii) 的等价性同样立得. $\square$

下面回到复插值理论. 对拓扑空间 T 而言, 定义 $C_b(T; X)$ 为全体有界连续函数 $f : T \rightarrow X$ 关于一致范数 $\|f\|_{C_b} := \sup_{x \in T} \|f(x)\|_X$ 构成的 Banach 空间. 现在取定复 Banach 空间构成的插值对 (X_0, X_1) , 下面我们会用前面介绍的向量值全纯函数理论定义复 Banach 空间 $[X_0, X_1]_\theta$ ($0 < \theta < 1$), 使得下述连续包含关系成立:

$$X_0 \cap X_1 \hookrightarrow [X_0, X_1]_\theta \hookrightarrow X_0 + X_1.$$

考虑开带状区域

$$\mathbb{S} = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \text{Re } z < 1\},$$

记 $\bar{\mathbb{S}}$ 为 $\mathbb{S}$ 的闭包.

定义 13.3

记 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 为具有下列性质的全体连续函数 $f : \bar{\mathbb{S}} \rightarrow X_0 + X_1$ 构成的复线性空间:

- (i) f 作为 $\mathbb{S}$ 上的 $X_0 + X_1$ 值函数全纯;
- (ii) 函数 $v \mapsto f(iv)$ 在 $C_b(\mathbb{R}; X_0)$ 内;

(iii) 函数 $v \mapsto f(1+iv)$ 在 $C_b(\mathbb{R}; X_1)$ 内.

空间 $\mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 定义为 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 的子空间, 其中元素满足

$$\lim_{|v| \rightarrow \infty} \|f(iv)\|_{X_0} = \lim_{|v| \rightarrow \infty} \|f(1+iv)\|_{X_1} = 0.$$

命题 13.7

$\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 在赋下述范数后成为 Banach 空间:

$$\|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} := \max \left\{ \sup_{v \in \mathbb{R}} \|f(iv)\|_{X_0}, \sup_{v \in \mathbb{R}} \|f(1+iv)\|_{X_1} \right\},$$

且 $\mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 在该范数下成为 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 的闭子空间.

证明 只需证明第一条断言, 第二条断言根据范数的构造立得. 为此又只需证明完备性.

现设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 中的 Cauchy 列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(i \cdot), \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1+i \cdot)$ 分别在 $C_b(\mathbb{R}; X_0), C_b(\mathbb{R}; X_1)$ 中存在. 因为 $X_0 \hookrightarrow X_0 + X_1, X_1 \hookrightarrow X_0 + X_1$, 故这两个极限均在 $C_b(\mathbb{R}; X_0 + X_1)$ 中存在. 现由 Hadamard 三线引理 2.14 知 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 在 $C_b(\mathbb{S}; X_0 + X_1)$ 中是 Cauchy 列, 进而 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 能收敛到某极限 $f \in C_b(\mathbb{S}; X_0 + X_1)$, 且根据该一致收敛性知 f 在 $\mathbb{S}$ 上的限制全纯. $\square$

定义 13.4

对 $0 < \theta < 1$ 而言, 复插值空间 $[X_0, X_1]_\theta$ 定义为 $x \in X_0 + X_1$ 构成的复线性空间, 其中每个 x 都对存在 $f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 使得 $f(\theta) = x$.

命题 13.8

设 $0 < \theta < 1$, 则 $x \in X_0 + X_1$ 在 $[X_0, X_1]_\theta$ 内当且仅当存在 $f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 使得 $f(\theta) = x$, 且 $[X_0, X_1]_\theta$ 关于下述范数成为 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta} &:= \inf \{ \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} : f(\theta) = x \} \\ &= \inf \{ \|f\|_{\mathcal{H}_0(X_0, X_1)} : f(\theta) = x \}. \end{aligned}$$

证明 $\Leftarrow$ 是显然的, 下面证明 $\Rightarrow$. 若存在 $f \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 使得 $x = f(\theta)$, 则对 $\delta > 0$ 构造 $f_\delta \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 为 $f_\delta(z) = \exp(\delta(z^2 - \theta^2))f(z)$, 知 $x = f_\delta(\theta)$. 另有

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \|f_\delta\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} = \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}.$$

下面证明 $[X_0, X_1]_\theta$ 的完备性, 为此只需证明 $[X_0, X_1]_\theta$ 中每个在 $\|\cdot\|_{[X_0, X_1]_\theta}$ 意义下绝对收敛的级数均收敛即可. 设 $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|_{[X_0, X_1]_\theta} < \infty$, 由 $\|\cdot\|_{[X_0, X_1]_\theta}$ 的构造知对每个 x_n 都能取函数 $g_n \in [X_0, X_1]_\theta$ 使得 $g_n(\theta) = x_n, \|g_n\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq \|x_n\|_{[X_0, X_1]_\theta} + 2^{-n}$, 进而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ 在 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 的意义下绝对收敛, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} g_n = g \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$. 记 $x := g(\theta)$, 则

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N x_n \right\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} g_n \right\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq 2^{-N} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_n\|_{[X_0, X_1]_\theta} \rightarrow 0, N \rightarrow \infty.$$

因此 $x = \sum_{n \geq 1} x_n$ 在 $[X_0, X_1]_\theta$ 意义下成立. $\square$

对每个 $x \in X$ 取 $f(\theta) \equiv x$ 即可由定义得下述等距同构:

$$[X, X]_\theta = X.$$

另对每个 $f \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 取 $g(z) = f(1-z)(z \in \mathbb{S})$ 知 $g \in \mathcal{H}(X_1, X_0)$, 进一步根据该构造与定义可得下述等距同构:

$$[X_0, X_1]_\theta = [X_1, X_0]_{1-\theta}.$$

引理 13.4

对全体 $0 < \theta < 1$ 而言, 均有下述压缩嵌入成立:

$$X_0 \cap X_1 \hookrightarrow [X_0, X_1]_\theta \hookrightarrow X_0 + X_1.$$

证明 任取 $x \in X_0 \cap X_1$, 知常值函数 $f_x := x$ 在 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 内, 且 $f_x(\theta) = x$, 同时

$$\|x\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \|f_x\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq \max\{\|x\|_{X_0}, \|x\|_{X_1}\} = \|x\|_{X_0 \cap X_1}.$$

故 $X_0 \cap X_1 \hookrightarrow [X_0, X_1]_\theta$.

再设 $x \in [X_0, X_1]_\theta$, 记 $f \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 满足 $f(\theta) = x$, 则 $x \in X_0 + X_1$, 且由全纯函数的最大值原理知

$$\begin{aligned} \|x\|_{X_0 + X_1} &= \|f(\theta)\|_{X_0 + X_1} \leq \max\left\{\sup_{v \in \mathbb{R}} \|f(iv)\|_{X_0 + X_1}, \sup_{v \in \mathbb{R}} \|f(1 + iv)\|_{X_0 + X_1}\right\} \\ &\leq \max\left\{\sup_{v \in \mathbb{R}} \|f(iv)\|_{X_0}, \sup_{v \in \mathbb{R}} \|f(1 + iv)\|_{X_1}\right\} \\ &= \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}. \end{aligned}$$

对全体可取到的 f 取下确界即知 $\|x\|_{X_0 + X_1} \leq \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta}$, 故 $[X_0, X_1]_\theta \hookrightarrow X_0 + X_1$. $\square$

空间 $[X_0, X_1]_\theta$ 的重要性是通过下述结果体现的, 注意该结果蕴含了经典的 Riesz-Thorin 插值定理 2.24:

定理 13.7 (算子的复插值)

设 $(X_0, X_1), (Y_0, Y_1)$ 是插值对, $T: X_0 + X_1 \rightarrow Y_0 + Y_1$ 是 $X_0 \rightarrow Y_0, X_1 \rightarrow Y_1$ 的有界线性算子, 且其范数满足

$$\|T\|_{X_0 \rightarrow Y_0} = A_0, \quad \|T\|_{X_1 \rightarrow Y_1} = A_1,$$

则对每个 $0 < \theta < 1$ 而言, 算子 T 均把 $[X_0, X_1]_\theta$ 映入 $[Y_0, Y_1]_\theta$, 且

$$\|T\|_{[X_0, X_1]_\theta \rightarrow [Y_0, Y_1]_\theta} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta.$$

证明 对 T 提的范数条件表明 T 是 $X_0 + X_1 \rightarrow Y_0 + Y_1$ 的有界线性算子, 且 $\|T\|_{X_0 + X_1 \rightarrow Y_0 + Y_1} \leq \max\{A_0, A_1\}$.

现设 T 作为 $X_0 \rightarrow Y_0$ 与 $X_1 \rightarrow Y_1$ 的算子均非零, 取定 $x \in [X_0, X_1]_\theta$, 记 $f \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 满足 $f(\theta) = x$, 定义函数 $g: \bar{\mathbb{S}} \rightarrow Y_0 + Y_1$ 为

$$g(z) := \left(\frac{A_0}{A_1}\right)^{z-\theta} T f(z), \quad z \in \bar{\mathbb{S}}.$$

显见 g 在 $\bar{\mathbb{S}}$ 上连续, 在 $\mathbb{S}$ 上全纯, $g(\theta) = T f(\theta) = T x$, 且

$$\begin{aligned} \|g(iv)\|_{Y_0} &\leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f(iv)\|_{X_0}, \\ \|g(1 + iv)\|_{Y_1} &\leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f(1 + iv)\|_{X_1}, \end{aligned}$$

因此 $g \in \mathcal{H}(Y_0, Y_1)$ 且 $\|g\|_{\mathcal{H}(Y_0, Y_1)} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}$, 故 $T x \in [Y_0, Y_1]_\theta$ 且 $\|T x\|_{[Y_0, Y_1]_\theta} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}$.

现对每个取定的 x 而言, 对该式两端关于经取定的这个 x 诱导的全体 f 取下确界即得

$$\|T x\|_{[Y_0, Y_1]_\theta} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta},$$

此即待证.

若 $A_0 = 0$, 则取

$$g_\varepsilon(z) = \varepsilon^{z-\theta} T f(z),$$

知

$$\begin{aligned} \|g_\varepsilon(iv)\|_{Y_0} &= 0, \\ \|g_\varepsilon(1 + iv)\|_{Y_1} &\leq \varepsilon^{1-\theta} A_1 \|f(1 + iv)\|_{X_1}, \end{aligned}$$

故 $\|g_\varepsilon\|_{\mathcal{H}(Y_0, Y_1)} \leq \varepsilon^{1-\theta} A_1 \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}$, 从而 $\|T x\|_{[Y_0, Y_1]_\theta} \leq \varepsilon^{1-\theta} A_1 \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $\|T x\|_{[Y_0, Y_1]_\theta} = 0$.

若 $A_1 = 0$, 我们利用 $[X_0, X_1]_\theta = [X_1, X_0]_{1-\theta}$ 把 X_0, X_1 调换位置并把 θ 换成 $1 - \theta$. 因为 $[Y_0, Y_1]_\theta =$

$[Y_1, Y_0]_{1-\theta}$, 故 $\|Tx\|_{[Y_0, Y_1]_\theta} = \|Tx\|_{[Y_1, Y_0]_{1-\theta}} = 0$. $\square$

作为定理13.7的一个简单应用, 取定 $x \in X_0 \cap X_1$, 分别考虑 $\mathbb{K} \rightarrow X_0$ 与 $\mathbb{K} \rightarrow X_1$ 的映射 $c \mapsto cx$, 利用前述插值可得

$$\|x\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \|x\|_{X_0}^{1-\theta} \|x\|_{X_1}^\theta, \quad x \in X_0 \cap X_1. \quad (13.4)$$

下面考虑空间 $\mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$, 其中 $f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 满足对任意 $z \in \mathbb{S}$ 均有 $f(z) \in X_0 \cap X_1$, 且 $z \mapsto f(z)$ 作为 $\mathbb{S} \rightarrow X_0 \cap X_1$ 的函数全纯.

引理 13.5

$\mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$ 在 $\mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 中稠密.

证明 任取 $f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1)$, 记 $f_\delta(z) := e^{\delta z^2} f(z)$, 由 f 的衰减性知 $\delta \rightarrow 0$ 时 $\|f - f_\delta\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \rightarrow 0$.

现取定 $\delta > 0$, 记 $g = f_\delta$, 则只需证明对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $h \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$ 使得

$$\|g - h\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} < \varepsilon. \quad (13.5)$$

注意到估计

$$|e^{\delta z^2}| \leq M e^{-\delta |\operatorname{Im} z|^2}, \quad \forall z \in \overline{\mathbb{S}}, \quad (13.6)$$

其中 M 是独立于 z 的常数, 知对每个正整数 $n \geq 1$ 而言级数 $G_n(z) := \sum_{m \in \mathbb{Z}} g(z + imn)$ 均在 $X_0 + X_1$ 中绝对收敛 (进而 G_n 对每个 $z \in \overline{\mathbb{S}}$ 均良定义), 且在 $\overline{\mathbb{S}}$ 上局部一致收敛 (进而结合 $f: \overline{\mathbb{S}} \rightarrow X_0 + X_1$ 连续可知 G_n 关于 $z \in \overline{\mathbb{S}}$ 连续). 进一步可知 G_n 在 $\mathbb{S}$ 上全纯, $G_n|_{i\mathbb{R}} \in C_b(\mathbb{R}; X_0)$, $G_n|_{1+i\mathbb{R}} \in C_b(\mathbb{R}; X_1)$, 且 G_n 满足下述周期关系:

$$G_n(z) = G_n(z + in).$$

接下来利用 g 的速降性证明存在 $r > 0$ 与 $n \geq 1$ 使得

$$\|e^{rz^2} G_n(z) - g(z)\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} < \varepsilon.$$

根据 $\|\cdot\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}$ 的定义, 只需证明

$$\max \left\{ \sup_{v \in \mathbb{R}} \|e^{r(iv)^2} G_n(iv) - g(iv)\|_{X_0}, \sup_{v \in \mathbb{R}} \|e^{r(1+iv)^2} G_n(1+iv) - g(1+iv)\|_{X_1} \right\} < \varepsilon.$$

根据三角不等式知进一步只需证明

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \|e^{r(iv)^2} G_n(iv) - G_n(iv)\|_{X_0} < \varepsilon, \quad (13.7)$$

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \|G_n(iv) - g(iv)\|_{X_0} < \varepsilon, \quad (13.8)$$

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \|e^{r(1+iv)^2} G_n(1+iv) - G_n(1+iv)\|_{X_1} < \varepsilon, \quad (13.9)$$

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \|G_n(1+iv) - g(1+iv)\|_{X_1} < \varepsilon. \quad (13.10)$$

由(13.6)知对取定的 $\varepsilon > 0$ 总存在足够大的 $R > 0$ 使得 $v \notin [-R, R]$ 时 $\|g(u+iv)\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} < \varepsilon$, 进一步对 (现在已经取定的) R 而言存在足够小的 $r > 0$ 使得 $v \in [-R, R]$ 时 $|e^{r(iv)^2} - 1|$ 与 $|e^{r(1+iv)^2} - 1|$ 均小于 ε . 又因为已知 $G_n|_{i\mathbb{R}} \in C_b(\mathbb{R}; X_0)$, $G_n|_{1+i\mathbb{R}} \in C_b(\mathbb{R}; X_1)$, 故

$$\sup_{v \in [-R, R]} \|e^{r(iv)^2} G_n(iv) - G_n(iv)\|_{X_0} < \varepsilon, \quad (13.11)$$

$$\sup_{v \in [-R, R]} \|e^{r(1+iv)^2} G_n(1+iv) - G_n(1+iv)\|_{X_1} < \varepsilon. \quad (13.12)$$

另一方面, 同样由(13.6)知对 (现在已经取定的) r 而言存在 $R' > R > 0$ 使得 $v \notin [-R', R']$ 时 $|e^{r(iv)^2}|$ 与 $|e^{r(1+iv)^2}|$ 均小于 ε , 且

$$\|G_n(iv)\|_{X_0} \leq \sum_{m \in \mathbb{Z}} |e^{-\delta(v+mn)^2}| \|f(iv)\|_{X_0} \stackrel{(A)}{\leq} \varepsilon \sum_{m \in \mathbb{Z}} |e^{-\delta(v+mn)^2}| \stackrel{(B)}{\leq} C\varepsilon,$$

其中 (A) 源于 $f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 蕴含的衰减性质, (B) 源于 $\sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-\delta(v+mn)^2} < \infty$, 这里 $C > 0$ 是不依赖于 ε 的常

数. 同理可得 $\|G_n(1+iv)\|_{X_1} \leq C\varepsilon$, 因此 $v \notin [-R', R]$ 时由三角不等式知同样有

$$\sup_{v \notin [-R', R']} \|e^{r(iv)^2} G_n(iv) - G_n(iv)\|_{X_0} < (C+1)\varepsilon, \quad (13.13)$$

$$\sup_{v \notin [-R', R']} \|e^{r(1+iv)^2} G_n(1+iv) - G_n(1+iv)\|_{X_1} < (C+1)\varepsilon. \quad (13.14)$$

现在针对 (13.7), (13.9) 我们还需证明 $v \in [-R', -R] \cup [R, R']$ 的情形. 此时对 $|e^{r(iv)^2} - 1|, |e^{r(1+iv)^2} - 1|$ 我们只能用一致上界来控制, 因此不等式右端的 ε 同样只能靠 $G_n(iv), G_n(1+iv)$ 产生. 因为已知 $v \notin [-R, R]$ 时 $\|g(iv)\|_{X_0} < \varepsilon, \|g(1+iv)\|_{X_1} < \varepsilon$, 故根据三角不等式我们可以考虑证明

$$\sup_{v \in [-R', -R] \cup [R, R']} \|G_n(iv) - g(iv)\|_{X_0} < \varepsilon, \quad (13.15)$$

$$\sup_{v \in [-R', -R] \cup [R, R']} \|G_n(1+iv) - g(1+iv)\|_{X_1} < \varepsilon. \quad (13.16)$$

注意到

$$\|G_n(iv) - g(iv)\|_{X_0} = \left\| \left(\sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-r(v+mn)^2} - 1 \right) g(iv) \right\|_{X_0} \leq \left| \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-r(v+mn)^2} - 1 \right| \|g(iv)\|_{X_0}.$$

当 $v \in [-R', R] \cup [R, R']$ 时显见总可以取 (相对于 R') 足够大的 n 使得 $\left| \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-r(v+mn)^2} - 1 \right| < C$, 结合 $\|g(iv)\|_{X_0} < \varepsilon$ 立得 (13.15), 类似可证 (13.16). 结合 (13.11)-(13.16) 与三角不等式即得 (13.7), (13.9).

针对 (13.8), (13.10), 当 $v \in [-R, R]$ 时可以进一步调整 n 使得⁹ $\left| \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-r(v+mn)^2} - 1 \right| < \varepsilon$, 而当 $v \notin [-R', R']$ 时已知 $\|G_n(iv)\|_{X_0} < C\varepsilon, \|g(iv)\|_{X_0} < \varepsilon$, 利用三角不等式立得 (13.8), 类似即证 (13.10).

至此我们只需用 $\mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$ 中的函数在 $\mathcal{H}(X_0, X_1)$ 中逼近 $z \mapsto e^{rz^2} G_n(z)$ 即可. 现对每个取定的正整数 m , 记 $\Gamma_{m,n}$ 为逆时针方向的矩形围线 $\partial\{z : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1, 0 \leq |\operatorname{Im} z| \leq mn\}$. 因为 G_n 在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 故对全体 $k \in \mathbb{Z}$ 而言 $z \mapsto e^{2\pi k z/n} G_n(z)$ 均在 $\Gamma_{m,n}$ 围成的矩形内全纯, 进而由 Cauchy 积分定理可知

$$\int_{\Gamma_{m,n}} e^{2\pi k z/n} G_n(z) dz = 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

将上式沿边界写开并整理即得

$$\int_{-mn}^{mn} e^{2\pi k(iv)/n} G_n(iv) dv - \int_{-mn}^{mn} e^{2\pi k(1+iv)/n} G_n(1+iv) dv = \int_0^1 e^{2\pi k(v+i)/n} G_n(v+i) dv - \int_0^1 e^{2\pi kv/n} G_n(v) dv, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

因此上左式实际上是与 m 无关的有限量, 故对任取的 $\delta > 0$ 总能找到足够大的 m 使得

$$\frac{1}{m} \left\| \int_{-mn}^{mn} e^{-2\pi(iv)k/n} G_n(iv) dv - \int_{-mn}^{mn} e^{-2\pi(1+iv)k/n} G_n(1+iv) dv \right\|_{X_0+X_1} < \delta.$$

根据 G_n 沿虚轴方向的周期性与 Euler 公式可知上式等同于

$$\left\| \int_{-n}^n e^{-2\pi(iv)k/n} G_n(iv) dv - \int_{-n}^n e^{-2\pi(1+iv)k/n} G_n(1+iv) dv \right\|_{X_0+X_1} < \delta.$$

因为 $\delta > 0$ 是任取的, 故上式表明

$$\int_{-n}^n e^{-2\pi(iv)k/n} G_n(iv) dv = \int_{-n}^n e^{-2\pi(1+iv)k/n} G_n(1+iv) dv, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

注意到上左式在 X_0 中, 而上右式在 X_1 中, 故实际上上式两端同在 $X_0 \cap X_1$ 中. 又因为上式两端都可以看成是 $[-n, n]$ 上的 Fourier 系数表达式, 故上式表明 $v \mapsto G_n(iv)$ 与 $v \mapsto G_n(1+iv)$ 的 Fourier 系数同在 $X_0 \cap X_1$ 内. 根据 Fejér 定理¹⁰, 这两个函数都能被它们 Fourier 系数的 Césaro 和分别在 $C([-n, n]; X_0), C([-n, n]; X_1)$ 上一致逼近, 这便定义¹¹了 $z \mapsto G_n(z)$ 在矩形 $\{z : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1, |\operatorname{Im} z| \leq n\}$ 上对应的 Césaro 逼近. 将该逼近依照 G_n 的周期性延拓到 $\mathbb{S}$ 上, 并对每项同乘 e^{rz^2} 即得 $z \mapsto e^{rz^2} G_n(z)$ 的待求逼近. $\square$

⁹这一步调整和前面 $v \in [-R', -R] \cup [R, R']$ 时对 n 提的条件不矛盾, 实际上这里的调整更加细化了前面的设定.

¹⁰参看 [Zo] pg.442 定理 4.

¹¹25.8.6: 这里是怎么定义出来的?

推论 13.3

对全体 $0 < \theta < 1, x \in [X_0, X_1]_\theta$ 与 $\varepsilon > 0$ 而言, 总存在函数 $h \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$ 使得

$$\|h(\theta) - x\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \varepsilon \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta}, \quad \|h\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq (1 + 2\varepsilon) \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta}.$$

特别地, $X_0 \cap X_1$ 在 $[X_0, X_1]_\theta$ 中稠密.



证明 由命题13.8知对取定的 $x \in [X_0, X_1]_\theta$ 总存在 $f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1)$ 使得 $f(\theta) = x$, 且

$$\|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq (1 + \varepsilon) \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta}.$$

由引理13.5知存在 $h \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$ 使得 $\|h - f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq \varepsilon \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta}$. 现由 $\|\cdot\|_{[X_0, X_1]_\theta}$ 的定义即知

$$\|h(\theta) - x\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \|h - f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq \varepsilon \|x\|_{[X_0, X_1]_\theta}.$$

□

为建立复插值和之后提到的实插值之间的联系, 这里我们还需要做一些准备工作 (准确来说是需要推论13.4). 为此首先预备一下工具. 定义带状区域 $\mathbb{S}$ 上的 Poisson 核为

$$P_j(u + iv; t) = \frac{\sin(\pi u) e^{\pi(v-t)}}{\sin^2(\pi u) + (\cos(\pi u) - (-1)^j e^{\pi(v-t)})^2}, \quad j = 0, 1.$$

上述形式是对单位圆盘上的 Poisson 核应用共形映射 $z \mapsto (e^{i\pi z} - i)/(e^{i\pi z} + i)$ 得到的. 进一步对圆盘上的 Poisson 公式¹²应用该共形变换可知对任意在 $\bar{\mathbb{S}}$ 上连续的有界调和函数 $\phi: \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}$ 均有:

$$\phi(u + iv) = \sum_{j=0,1} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(j + it) P_j(u + iv; t) dt, \quad u + iv \in \mathbb{S}. \quad (13.17)$$

进一步把全纯函数分为实部与虚部进行讨论即得下述表示:

引理 13.6 (带状区域上的 Poisson 公式)

设 $f: \bar{\mathbb{S}} \rightarrow X$ 作为有界连续函数在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 则对全体 $z \in \mathbb{S}$ 均有 $f(z) = f_0(z) + f_1(z)$, 其中

$$f_j(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(j + it) P_j(z; t) dt, \quad j = 0, 1.$$



特别对调和函数 $\phi(u + iv) = 1 - u, \phi(u + iv) = u$ 应用(13.17)并取 θ 处的结果可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_0(\theta; t) dt = 1 - \theta, \quad \int_{-\infty}^{\infty} P_1(\theta; t) dt = \theta, \quad 0 < \theta < 1. \quad (13.18)$$

引理 13.7

对全体 $0 < \theta < 1$ 与 $f \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 均有:

$$(i) \quad \log \|f(\theta)\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \sum_{j=0,1} \int_{-\infty}^{\infty} \log \|f(j + it)\|_{X_j} P_j(\theta; t) dt;$$

$$(ii) \quad \|f(\theta)\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \left[\frac{1}{1 - \theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|f(it)\|_{X_0} P_0(\theta; t) dt \right]^{1-\theta} \left[\frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|f(1 + it)\|_{X_1} P_1(\theta; t) dt \right]^\theta.$$



证明 记 $\phi_j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是满足下式的有界光滑函数:

$$\phi_0(v) \geq \log \|f(iv)\|_{X_0}, \quad \phi_1(v) \geq \log \|f(1 + iv)\|_{X_1}; \quad v \in \mathbb{R}. \quad (13.19)$$

设 $\Phi: \bar{\mathbb{S}} \rightarrow \mathbb{C}$ 作为连续函数在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 且其实部为

$$\operatorname{Re} \Phi(u + iv) = \sum_{j=0,1} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_j(t) P_j(u + iv; t) dt.$$

由 P_j 调和知上右式调和, 进而将上式与(13.17)比对可知 $\operatorname{Re} \Phi(iv) = \phi_0(v), \operatorname{Re} \Phi(1 + iv) = \phi_1(v)$. 回到(13.19)可

¹² 参看 [LCE] pg.37 (33).

知

$$\log(e^{-\phi_0(v)}\|f(iv)\|_{X_0}) = \log(e^{-\operatorname{Re}\Phi(iv)}\|f(iv)\|_{X_0}) = \log(\|e^{-\Phi(iv)}f(iv)\|_{X_0}) \leq 1,$$

进而

$$\|e^{-\Phi(iv)}f(iv)\|_{X_0} \leq 1,$$

同理可证

$$\|e^{-\Phi(1+iv)}f(1+iv)\|_{X_1} \leq 1,$$

于是由 $\|\cdot\|_{[X_0, X_1]_\theta}$ 的定义知

$$\|e^{-\Phi(\theta)}f(\theta)\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq 1.$$

这表明 $\|f(\theta)\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq e^{\operatorname{Re}\Phi(\theta)}$, 进而

$$\log\|f(\theta)\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq \operatorname{Re}\Phi(\theta) = \sum_{j=0,1} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_j(t) P_j(\theta; t) dt = \sum_{j=0,1} \int_{-\infty}^{\infty} \phi_j(t) P_j(\theta; t) dt.$$

对上右式关于全体满足(13.19)的 ϕ_0, ϕ_1 取下确界即得 (i).

针对 (ii), $j=0$ 时由 Jensen 不等式与(13.18)知

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \log\|f(it)\|_{X_0} P_0(\theta; t) dt &= (1-\theta) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \log\|f(it)\|_{X_j} P_0(\theta; t) dt \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} P_0(\theta; t) dt \right)^{-1} \\ &\leq (1-\theta) \log \left(\int_{-\infty}^{\infty} \|f(it)\|_{X_j} \frac{P_0(\theta; t)}{1-\theta} dt \right) \\ &= \log \left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|f(it)\|_{X_j} \frac{P_0(\theta; t)}{1-\theta} dt \right)^{1-\theta} \right]. \end{aligned}$$

同理可证

$$\int_{-\infty}^{\infty} \log\|f(1+it)\|_{X_1} P_1(\theta; t) dt \leq \log \left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|f(1+it)\|_{X_1} \frac{P_1(\theta; t)}{\theta} dt \right)^{\theta} \right].$$

故

$$\sum_{j=0,1} \int_{-\infty}^{\infty} \log\|f(j+it)\|_{X_j} P_j(\theta; t) dt \leq \log \left\{ \left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|f(it)\|_{X_j} \frac{P_0(\theta; t)}{1-\theta} dt \right)^{1-\theta} \right] \left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} \|f(1+it)\|_{X_1} \frac{P_1(\theta; t)}{\theta} dt \right)^{\theta} \right] \right\}$$

将上式代入 (i) 并对得式两端同取指数即得 (ii). □

注意到对任意 $p \in [1, \infty]$ 均有 $P_j(\theta; \cdot) \in L^p(\mathbb{R})$ ($j=0,1$), 故由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \|f(it)\|_{X_0} P_0(\theta; t) dt &\leq \|f(i\cdot)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}; X_0)} \|P_0(\theta, \cdot)\|_{L^{p'_0}(\mathbb{R})}, \\ \int_{-\infty}^{\infty} \|f(1+it)\|_{X_1} P_1(\theta; t) dt &\leq \|f(1+i\cdot)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}; X_1)} \|P_1(\theta; \cdot)\|_{L^{p'_1}(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

结合 $A^{1-\theta}B^\theta \leq (1-\theta)A + \theta B$ 即得下述结论:

推论 13.4

设 $p_0, p_1 \in [1, \infty]$, $\theta \in (0, 1)$. 若 $f \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 满足

$$f(i\cdot) \in L^{p_0}(\mathbb{R}; X_0), \quad f(1+i\cdot) \in L^{p_1}(\mathbb{R}; X_1),$$

则 $f(\theta) \in [X_0, X_1]_\theta$, 且

$$\|f(\theta)\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq C_{\theta, p'_0, p'_1} (\|f(i\cdot)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}; X_0)} + \|f(1+i\cdot)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}; X_1)}),$$

其中 $C_{\theta, p'_0, p'_1} = \max\{\|P_0(\theta; \cdot)\|_{L^{p'_0}(\mathbb{R})}, \|P_1(\theta; \cdot)\|_{L^{p'_1}(\mathbb{R})}\}$.



实插值

接下来用所谓的 K -方法定义实插值空间, 该方法给每个插值对 (X_0, X_1) 与每组指标 $0 < \theta < 1, 1 \leq p \leq \infty$ 对应了一个插值空间 $X_{\theta,p}$. 现对 $t > 0$ 与 $x \in X_0 + X_1$ 定义下述 K -泛函:

$$K(t, x; X_0, X_1) := \inf\{\|x_0\|_{X_0} + t\|x_1\|_{X_1} : x_0 \in X_0, x_1 \in X_1, x = x_0 + x_1\}.$$

对每个取定的 $x \in X_0 + X_1$ 而言, 显见函数 $t \mapsto K(t, x; X_0, X_1)$ 均不减且关于 t 连续. 另对每个取定的 $t > 0$ 而言, 函数 $x \mapsto K(t, x; X_0, X_1)$ 均次可加. 同时易得下述恒等式:

$$tK(t^{-1}, x; X_0, X_1) = K(t, x; X_1, X_0).$$

定义 13.5 (通过 K -方法得到的实插值空间)

对 $0 < \theta < 1$ 与 $1 \leq p \leq \infty$, 定义

$$(X_0, X_1)_{\theta,p} := \{x \in X_0 + X_1 : \|x\|_{\theta,p} < \infty\},$$

其中

$$\|x\|_{\theta,p} = \begin{cases} \left(\int_0^\infty [t^{-\theta} K(t, x; X_0, X_1)]^p \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty, \\ \operatorname{ess\,sup}_{t>0} t^{-\theta} K(t, x; X_0, X_1), & p = \infty. \end{cases}$$

容易验证 $(X, X)_{\theta,p} = X$, 且

$$(X_0, X_1)_{\theta,p} = (X_1, X_0)_{1-\theta,p}, \quad 1 \leq p \leq \infty, \quad 0 < \theta < 1,$$

其中两个空间上的范数是等价的. 上式的证明只需在范数定义中把 t 换成 $1/s$ 即可.

命题 13.9

设 $0 < \theta < 1, 1 \leq p \leq \infty$, 则空间 $(X_0, X_1)_{\theta,p}$ 在赋范 $\|\cdot\|_{\theta,p}$ 后成为 Banach 空间. 另对 $1 \leq p_0 \leq p_1 \leq \infty$ 有下述连续嵌入成立:

$$X_0 \cap X_1 \hookrightarrow (X_0, X_1)_{\theta,p_0} \hookrightarrow (X_0, X_1)_{\theta,p_1} \hookrightarrow X_0 + X_1. \quad (13.20)$$

证明 简便起见, 下面记 $K(t, x) := K(t, x; X_0, X_1)$. (13.20) 中的第一条与第三条嵌入关系可直接由下式得出¹³:

$$\min\{1, t\} \|x\|_{X_0+X_1} \leq K(t, x) \leq \min\{1, t\} \|x\|_{X_0 \cap X_1}. \quad (13.21)$$

为证明第二条嵌入关系, 注意到 $1 \leq p < \infty$ 时有

$$\begin{aligned} K(t, x) &\sim_{\theta,p} t^\theta K(t, x) \left(\int_t^\infty s^{-\theta p} \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq t^\theta \left(\int_t^\infty [s^{-\theta} K(s, x)]^p \frac{ds}{s} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq t^\theta \|x\|_{\theta,p}. \end{aligned} \quad (13.22)$$

$p = \infty$ 时上述结果是显见的. 现由 (13.22) 知 $1 \leq p_0 \leq p_1 < \infty$ 时有

$$\begin{aligned} \|x\|_{\theta,p_1} &\leq \left(\int_0^\infty [t^{-\theta} K(t, x)]^{p_0} \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{p_1}} \cdot \operatorname{ess\,sup}_{t>0} (t^{-\theta} K(t, x))^{1-p_0/p_1} \\ &\leq \|x\|_{\theta,p_0}^{p_0/p_1} \cdot \|x\|_{\theta,p_0}^{1-p_0/p_1} \\ &= \|x\|_{\theta,p_0}. \end{aligned}$$

其余情形类似可证.

下面证明 $(X_0, X_1)_{\theta,p}$ 的完备性. 特别这里我们只考虑 $1 \leq p < \infty$ 的情形, $p = \infty$ 的情形是要更简单的. 现设

¹³注意第二个不等号预设了 $x \in X_0 \cap X_1$.

$\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 中的 Cauchy 列, 由 $(X_0, X_1)_{\theta, p} \hookrightarrow X_0 + X_1$ 是 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 同样是 $X_0 + X_1$ 中的 Cauchy 列, 进而由 $X_0 + X_1$ 完备可知设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 $X_0 + X_1$ 中收敛到 x . 依照 Cauchy 准则知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1 \forall n, m \geq N (\|x_n - x_m\|_{\theta, p} < \varepsilon).$$

进而由三角不等式知对任意 $0 < r < R < \infty$ 与 $m \geq n \geq N$ 有¹⁴

$$\begin{aligned} \left(\int_r^R [t^{-\theta} K(t, x - x_n)]^p \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\int_r^R [t^{-\theta} (K(t, x - x_m) + K(t, x_n - x_m))]^p \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \varepsilon + \left(\int_r^R [t^{-\theta} K(t, x - x_m)]^p \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned} \quad (13.23)$$

现在希望说明(13.23)左式在 $n \rightarrow \infty, r \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$ 时趋零. 结合不等式

$$K(t, y) \leq \max\{1, t\} \|y\|_{X_0 + X_1}$$

与收敛关系 $x_m \rightarrow x(X_0 + X_1)$ 可知(13.23)右式第二项在 $m \rightarrow \infty$ 时趋零, 于是在(13.23)中令 $m \rightarrow \infty, r \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$ 可知

$$\|x - x_n\|_{\theta, p} \leq \varepsilon, \forall n \geq N.$$

因此 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p}$, 且 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 的意义下收敛到 x . □

下述结果说明 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 是 X_0, X_1 之间的插值空间:

定理 13.8 (算子的实插值)

设 $(X_0, X_1), (Y_0, Y_1)$ 是插值对, $T: X_0 + X_1 \rightarrow Y_0 + Y_1$ 是线性映射, 且其算子范数满足

$$\|T\|_{X_0 \rightarrow Y_0} = A_0, \quad \|T\|_{X_1 \rightarrow Y_1} = A_1,$$

则对全体 $0 < \theta < 1$ 与 $1 \leq p \leq \infty$ 而言, 算子 T 都是 $(X_0, X_1)_{\theta, p} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, p}$ 的, 且

$$\|T\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, p}} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta.$$



证明 首先设 $A_0 \neq 0$. 取定 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p}$, 记 $x = x_0 + x_1, x_0 \in X_0, x_1 \in X_1$, 则对每个 $t > 0$ 均有

$$\|Tx_0\|_{Y_0} + t\|Tx_1\|_{Y_1} \leq A_0 \left(\|x_0\|_{X_0} + t \frac{A_1}{A_0} \|x_1\|_{X_1} \right),$$

进而

$$K(Tx, t; Y_0, Y_1) \leq A_0 K\left(x, t \frac{A_1}{A_0}; X_0, X_1\right).$$

在上右式中考虑代换 $s = tA_1/A_0$ 可知 $1 \leq p < \infty$ 时有

$$\begin{aligned} \|Tx\|_{\theta, p}^p &= \int_0^\infty [t^{-\theta} K(Tx, t; Y_0, Y_1)]^p \frac{dt}{t} \\ &\leq \int_0^\infty \left[t^{-\theta} A_0 K\left(x, t \frac{A_1}{A_0}; X_0, X_1\right) \right]^p \frac{dt}{t} \\ &= A_0^p \left(\frac{A_1}{A_0} \right)^{\theta p} \int_0^\infty [s^{-\theta} K(x, s; X_0, X_1)]^p \frac{ds}{s} \\ &= A_0^{(1-\theta)p} A_1^{\theta p} \|x\|_{\theta, p}^p. \end{aligned}$$

类似可得 $p = \infty$ 的情形.

针对 $A_0 = 0, A_1 \neq 0$ 的情形, 对调上述证明中 A_0, A_1 对应的位置即可. 最后若 $A_0 = A_1 = 0$, 则只能有 $T = 0$, 命题无所可证. □

读者可能会疑惑既然算子的复插值 13.7 已经蕴含了经典的 Riesz-Thorin 插值了, 那上面提到的实插值能怎样体现在经典 Lebesgue 空间理论中? 实际上上述结果可以用来刻画特定的 L^p 范数, 为此我们介绍所谓的第一均值法.

¹⁴这里使用这个式子而不直接用 $\|x - x_n\|_{\theta, p}$ 是因为我们需要一个 ε 来一致控制全体在 (r, R) 上的积分. 如果没有这个式子, 直接套用 $K(t, y) \leq \max\{1, t\} \|y\|_{X_0 + X_1}$ 的话, 积分会随着 $r \rightarrow 0$ 爆掉, 进而没法得到一致控制.

定义 13.6 (第一均值法)

设 (X_0, X_1) 是 Banach 空间插值对, 则对 $0 < \theta < 1, 1 \leq p_0, p_1 \leq \infty$ 定义 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 为全体 $x \in X_0 + X_1$ 构成的集合, 其中 x 满足存在强可测函数 $u_0 : (0, \infty) \rightarrow X_0, u_1 : (0, \infty) \rightarrow X_1$ 使得:

(i) $x = u_0(t) + u_1(t), \forall \text{ a.e. } t > 0$;

(ii) $t \mapsto t^{j-\theta} u_j(t)$ 在 $L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)$ 内 ($j = 0, 1$).

$(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 上的范数定义为:

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} := \inf_{x=u_0+u_1} \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \right\},$$

其中下确界在满足性质 (i), (ii) 的全体容许分解 $x \equiv u_0 + u_1$ 中取.



引理 13.8

空间 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 是 Banach 空间, 且有下列嵌入关系成立:

$$X_0 \cap X_1 \hookrightarrow (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \hookrightarrow X_0 + X_1.$$



证明 显见 $\|\cdot\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 首先是范数. 类似于命题 13.5, $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 的完备性等价于其中全体绝对收敛序列的收敛性. 现设 $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} < \infty$, 另设每个 x_n 都对应容许分解 $x_n = u_0^n(t) + u_1^n(t)$, 且

$$\max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} u_0^n(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1^n(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \right\} \leq \|x_n\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} + 2^{-n}.$$

于是级数 $\sum_{n \geq 1} t^{-\theta} u_0^n(t), \sum_{n \geq 1} t^{1-\theta} u_1^n(t)$ 分别在 $L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0), L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)$ 中收敛. 记

$$t^{-\theta} u_0(t) := \sum_{n \geq 1} t^{-\theta} u_0^n(t),$$

$$t^{1-\theta} u_1(t) := \sum_{n \geq 1} t^{1-\theta} u_1^n(t),$$

$$x := u_0(t) + u_1(t),$$

则由 $x_n = u_0^n(t) + u_1^n(t)$ 知

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{n=1}^N x_n \right\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} &\leq \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} (u_0^n(t) + u_1^n(t)) \right\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \|u_0^n(t) + u_1^n(t)\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \\ &\leq 2 \sum_{n=N+1}^{\infty} \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} u_0^n(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1^n(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \right\} \\ &\leq 2 \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_n\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} + 2^{-N+1} \rightarrow 0, N \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 在 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 中成立.

接下来说明嵌入关系. 针对第一条关系, 取定 $x \in X_0 \cap X_1$, 往证 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$. 注意到函数 $u_0 = \mathbf{1}_{[1, \infty)} \otimes x, u_1 = \mathbf{1}_{(0, 1)} \otimes x$ 满足在 $(0, \infty)$ 上 $u_0 + u_1 \equiv x$, 且容易验证 $t \mapsto t^{-\theta} u_0(t) \in L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0), t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t) \in L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)$, 进一步有

$$\|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} = (\theta p_0)^{-1/p_0} \|x\|_{X_0},$$

$$\|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} = ((1-\theta)p_1)^{-1/p_1} \|x\|_{X_1}.$$

故 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$, 且

$$\|x\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}} \leq \max \left\{ (\theta p_0)^{-1/p_0}, ((1-\theta)p_1)^{-1/p_1} \right\} \|x\|_{X_0 \cap X_1}.$$

上述估计同时表明第一条嵌入关系还是连续的.

针对第二条关系, 设 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$, 依照定义设 $x = u_0(t) + u_1(t)$, 对该式两端同在 $(1, 2)$ 上积分可知

$$x = \int_1^2 (tu_0(t) + tu_1(t)) \frac{dt}{t} \in X_0 + X_1,$$

进而对范数有

$$\begin{aligned} \|x\|_{X_0+X_1} &\leq \left\| \int_1^2 tu_0(t) \frac{dt}{t} \right\|_{X_0} + \left\| \int_1^2 tu_1(t) \frac{dt}{t} \right\|_{X_1} \\ &\stackrel{(A)}{\leq} \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} \cdot \|t \mapsto t^{1+\theta}\|_{L^{p'_0}((1,2), \frac{dt}{t})} \\ &\quad + \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \cdot \|t \mapsto t^\theta\|_{L^{p'_1}((1,2), \frac{dt}{t})}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是在测度 dt/t 下应用 Hölder 不等式. 现在针对全体容许分解 $x = u_0 + u_1$ 对上式取下确界可知

$$\|x\|_{X_0+X_1} \leq 2C_{\theta, p_0, p_1} \|x\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}},$$

其中 $C_{\theta, p_0, p_1} := \max \left\{ \|t \mapsto t^{1+\theta}\|_{L^{p'_0}((1,2), \frac{dt}{t})}, \|t \mapsto t^\theta\|_{L^{p'_1}((1,2), \frac{dt}{t})} \right\}$. 上述估计同时表明第二条嵌入关系是连续的. $\square$

第一均值法的意义在于实际上可以说明 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 与实插值空间 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ ($\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$) 在等价范数意义下重合. 为此我们首先证明 $p_0 = p_1 = p$ 的情形.

命题 13.10

设 (X_0, X_1) 是 Banach 空间插值对, $1 \leq p \leq \infty, 0 < \theta < 1$, 则 $(X_0, X_1)_{\theta, p} = (X_0, X_1)_{\theta, p, p}^{(m)}$, 其中范数满足下述等价关系:

$$\frac{1}{2} \|x\|_{\theta, p} \leq \|x\|_{\theta, p, p}^{(m)} \leq \|x\|_{\theta, p}. \quad (13.24)$$

进一步, 定义 13.6 中的函数可以升级为连续函数 $u_0 : (0, \infty) \rightarrow X_0, u_1 : (0, \infty) \rightarrow X_1$. 

证明 取定 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p, p}^{(m)}$, 记 $K(t, x) := K(t, x; X_0, X_1)$. 设 $x \equiv u_0 + u_1$ 是定义 13.6 给出的容许分解, 则对 a.e. $t > 0$ 有

$$K(t, x) \leq \|u_0(t)\|_{X_0} + t\|u_1(t)\|_{X_1}.$$

上式两端同乘 $t^{-\theta}$ 后关于 t 取 L^p 范数知

$$\begin{aligned} \|t \mapsto t^{-\theta} K(t, x)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} &\leq \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} + \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \\ &\leq 2 \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \right\} < \infty. \end{aligned}$$

由上式立得 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p}$. 对上式两端同时在全体容许分解 $x \equiv u_0 + u_1$ 中取下确界即得 (13.24) 左式.

下面证明反向不等式, 设 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p}$ 非零, 取定 $\varepsilon > 0$, 则由 K -泛函的定义知对每个 $t_0 > 0$ 均存在分解 $x = x_{0, t_0} + x_{1, t_0} \in X_0 + X_1$ 使得

$$\|x_{0, t_0}\|_{X_0} + t_0\|x_{1, t_0}\|_{X_1} < (1 + \varepsilon)K(t_0, x).$$

因为 $K(t_0, x)$ 本身是关于 t_0 的连续函数, 故对每个 t_0 总存在小区间 I_{t_0} 使得对全体 $t \in I_{t_0}$ 均有

$$\|x_{0, t_0}\|_{X_0} + t\|x_{1, t_0}\|_{X_1} < (1 + \varepsilon)K(t, x).$$

显见 $\bigcup_{t_0 > 0} I_{t_0}$ 是 $(0, \infty)$ 的一个开覆盖, 由 $(0, \infty)$ 第二可数即知该开覆盖存在可数子覆盖 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, 设通过前述方法生成 I_n 的分解为 $x \equiv x_{0, n} + x_{1, n}$, 记

$$\begin{cases} u_0(t) = x_{0, n}, & t \in I_n \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N} \setminus \{n\}} I_k, \\ u_1(t) = x_{1, n}, & t \in I_n \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{N} \setminus \{n\}} I_k, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N},$$

特别若 $n < m, I_n \cap I_m \neq \emptyset$, 则取 $u_0(t) = x_{0, n}, u_1(t) = x_{1, n} (t \in I_n \cap I_m)$. 显见 $u_j : (0, \infty) \rightarrow X_j (j = 0, 1)$ 作为

分段常值函数满足 $x = u_0(t) + u_1(t) (\forall t > 0)$, 且

$$\|u_0(t)\|_{X_0} + t\|u_1(t)\|_{X_1} < (1 + \varepsilon)K(t, x), \quad \forall t > 0.$$

在上式两端同乘 $t^{-\theta}$ 并关于 t 取 L^p 范数知

$$\begin{aligned} \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} &\leq (1 + \varepsilon) \|t \mapsto t^{-\theta} K(t, x)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}, \\ \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} &\leq (1 + \varepsilon) \|t \mapsto t^{-\theta} K(t, x)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}, \end{aligned}$$

由上两式立得

$$\max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \right\} \leq (1 + \varepsilon) \|x\|_{\theta, p}.$$

故分解 $x = u_0 + u_1$ 满足定义 13.6 的 (i), (ii). 又因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 故由 $\|\cdot\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 的定义即得 (13.24) 右式. 最后为提升 u_0, u_1 的正则性, 只需在定义 u_0, u_1 时将重叠的小区间部分上的值更改为两端区间上函数取值的线性插值即可. $\square$

下面给出 $\|\cdot\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 的一个估计.

命题 13.11

设 $1 \leq p_0 \leq p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1$, 设 $1/p = (1 - \theta)/p_0 + \theta/p_1$, 则对全体 $x \in X_0 \cap X_1$ 均有

$$\frac{1}{4} \|x\|_{\theta, p} \leq \|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq 2 \|x\|_{\theta, p}. \quad (13.25)$$

命题 13.10 已经把 $p_0 = p_1$ 的情形证完了, 因此这里不妨设 $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$. 为证命题 13.11, 我们还需作下述准备. 对取定的 $x \in X_0 \cap X_1$ 与 $t \geq 0$, 记

$$f(x, t) := \inf \{ \|x_1\|_{X_1} : x = x_0 + x_1, \|x_0\|_{X_0} \leq t \}.$$

显见 $f(x, t)$ 关于 t 是非负不增凸函数, 且 $t \geq \|x\|_{X_0}$ 时 $f(x, t) = 0$. 现在断言

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} = \inf_w \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}, \|t \mapsto t^{1-\theta} f(x, w(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \right\}, \quad (13.26)$$

其中下确界在全体非负连续函数 w 中取. 事实上, 取 $w(t) = \|u_0(t)\|_{X_0}$ 并在 f 的定义中取 $x_0 = u_0(t), x_1 = u_1(t)$ 即得

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq \inf_w \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}, \|t \mapsto t^{1-\theta} f(x, w(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \right\}.$$

针对反向不等式, 对取定的 $x \in X_0 \cap X_1$, 由命题 13.10 知只需考虑连续函数分解 $x = u_0(t) + u_1(t)$, 进而 $\|u_0(t)\|_{X_0}, \|u_1(t)\|_{X_1}$ 均为非负连续函数, 于是对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 w 使得

$$\begin{aligned} \inf_w \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} &\leq \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \\ \inf_w \|t \mapsto t^{1-\theta} f(x, w(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} &\leq (1 + \varepsilon) \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}. \end{aligned}$$

故

$$\inf_w \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}, \|t \mapsto t^{1-\theta} f(x, w(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \right\} \leq (1 + \varepsilon) \|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)},$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 (13.26).

现在首先设 $p_1 < \infty$. 取定 $0 \neq x \in X_0 \cap X_1$, 记 $f(t) := f(x, t)$. 取 $s_0 := \min\{s \geq 0 : f(s) = 0\}$, 则 $0 < s_0 \leq \|x\|_{X_0} < \infty$, 且 f 在区间 $[0, s_0]$ 上严格减¹⁵. 记:

$$\alpha := \alpha(x) := \theta^{(p_0 - p_1)/p} \|t \mapsto t^{1-\theta} f(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}^{p_1 - p_0},$$

进一步记连续函数 $v^{-1} : [0, s_0] \rightarrow [0, \infty)$ 为:

$$v^{-1}(s) := \alpha^{p/(p_0 p_1)} s^{p/p_1} f(s)^{-p/p_0}, \quad (13.27)$$

则由 f 严格减立得 v^{-1} 严格增, 且 $v^{-1}(0) = 0, \lim_{s \rightarrow s_0} v^{-1}(s) = \infty$. 既然 v^{-1} 连续且单调, 根据反函数定理即知

¹⁵这是因为一方面 f 在 $[0, \infty)$ 上不增且凸, 另一方面需要在 $[s_0, \infty)$ 上为零. 同时通过取 $x_0 = t_0 x$ 可知对任意小的 $t_0 > 0$ 总有 $f(0) > f(t_0)$, 该性质与凸性一起保证了递减的严格性.

v^{-1} 存在反函数 $v : [0, \infty) \rightarrow [0, s_0)$ 满足

$$t = \alpha^{p/(p_0 p_1)} v(t)^{p/p_1} f(v(t))^{-p/p_0},$$

或等价地对全体 $t > 0$ 均有¹⁶

$$\alpha t^{-\theta p_0} v(t)^{p_0} = t^{(1-\theta)p_1} f(v(t))^{p_1}. \quad (13.28)$$

另在 $p_1 = \infty$ 时定义 $v^{-1} : [0, s_0) \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$v^{-1}(s) := f(s)^{-p/p_0} \theta^{-1/p_0} \|t \mapsto t^{1-\theta} f(t)^\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}^{p/p_0}. \quad (13.29)$$

于是由 $p_0 = (1-\theta)p$ 知对全体 $\tau > 0$ 均有

$$\tau^{1-\theta} f(v(\tau)) = \theta^{-1/p} \|t \mapsto t^{1-\theta} f(t)^\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}. \quad (13.30)$$

引理 13.9

在命题 13.11 的假设下, 若另有 $p_0 < \infty$, 则

$$\|t \mapsto t^{-\theta} v(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} = \|t \mapsto t^{1-\theta} f(v(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} = \theta^{-1/p} \|t \mapsto t^{1-\theta} f(t)^\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}.$$



注 上述结果表明这三个量其中一个为无穷时另外两个必为无穷, 同时若其中一个是有限值, 则另外两个必为相同的有限值.

证明 换元 $t = v^{-1}(s)$ 并分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{-\theta p_0} v(t)^{p_0} \frac{dt}{t} &= \int_0^{s_0} v^{-1}(s)^{-\theta p_0 - 1} s^{p_0} \frac{d}{ds}(v^{-1}(s)) ds \\ &= -\frac{1}{\theta p_0} \int_0^{s_0} s^{p_0} \frac{d}{ds}(v^{-1}(s)^{-\theta p_0}) ds \\ &= \frac{1}{\theta} \int_0^{s_0} s^{p_0 - 1} v^{-1}(s)^{-\theta p_0} ds, \end{aligned}$$

其中边界项没出现是因为只要积分 $\int_0^\infty t^{-\theta p_0} v(t)^{p_0} \frac{dt}{t}$ 收敛, 则必有 $\lim_{s \downarrow 0} s v^{-1}(s)^{-\theta} = 0$, $\lim_{s \rightarrow s_0} s v^{-1}(s)^{-\theta} = 0$, 接下来说明这件事. 考虑反证, 若 $\limsup_{s \downarrow 0} s v^{-1}(s)^{-\theta} \neq 0$, 则换元 $t = v(s)$ 后可知 $\limsup_{t \rightarrow \infty} t^{-\theta} v(t) > 0$, 于是依照上极限的定义知存在 $\varepsilon > 0$ 与序列 $t_n \uparrow \infty$ 满足 $t_{n+1} - t_n \geq 1$, $t_n^{-\theta} v(t_n) \geq \varepsilon$. 现在对足够大的 n 总有 $(t_n + 1)^{-\theta} \geq t_n^{-\theta}/2$, 进而对全体 $t \in [t_n, t_{n+1}]$ 均有

$$t^{-\theta} v(t) \geq (t_n + 1)^{-\theta} v(t_{n+1}) \geq \frac{1}{2} t_{n+1}^{-\theta} v(t_{n+1}) \geq \frac{1}{2} \varepsilon.$$

这与可积性条件矛盾! 故只能有 $\lim_{s \downarrow 0} s v^{-1}(s)^{-\theta} = 0$. 另由 $\lim_{s \rightarrow s_0} v^{-1}(s) = \infty$ 立得 $\lim_{s \rightarrow s_0} s v^{-1}(s)^{-\theta} = 0$, 至此事实证毕.

现若 $p_1 < \infty$, 则由 α 与 v^{-1} 的定义(13.27)知

$$\begin{aligned} \frac{1}{\theta} \int_0^{s_0} v^{-1}(s)^{-\theta p_0} s^{p_0 - 1} ds &= \frac{1}{\theta} \alpha^{-\theta p/p_1} \int_0^\infty f(s)^{\theta p} s^{-\theta p_0 p/p_1 + p_0 - 1} ds \\ &= \frac{1}{\theta} \alpha^{-\theta p/p_1} \int_0^\infty s^{(1-\theta)p} f(s)^{\theta p} \frac{ds}{s} \\ &= \theta^{-p_0/p} \left(\int_0^\infty s^{(1-\theta)p} f(s)^{\theta p} \frac{ds}{s} \right)^{p_0/p}. \end{aligned}$$

这表明只要引理结论中的第一个量有限, 那第三个量就也有限, 且这两者相等. 反推上述过程即知第三个量的有限性也能保证第一个量的有限性.

针对第二个量, 换元 $t = v^{-1}(s)$, 代入(13.27)并分部积分知

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{(1-\theta)p_1} f(v(t))^{p_1} \frac{dt}{t} &= \int_0^{s_0} v^{-1}(s)^{(1-\theta)p_1 - 1} f(s)^{p_1} \frac{d}{ds}(v^{-1}(s)) ds \\ &= \frac{1}{(1-\theta)p_1} \int_0^{s_0} f(s)^{p_1} \frac{d}{ds}(v^{-1}(s)^{(1-\theta)p_1}) ds \end{aligned}$$

¹⁶回忆 $1/p = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$.

$$\begin{aligned}
&\stackrel{(A)}{=} \frac{1}{(1-\theta)p_1} \alpha^{(1-\theta)p/p_0} \int_0^\infty f(s)^{p_1} \frac{d}{ds} (s^{(1-\theta)p} f(s)^{-(1-\theta)pp_1/p_0}) ds \\
&\stackrel{(B)}{=} -\frac{1}{(1-\theta)p_1} \alpha^{(1-\theta)p/p_0} \int_0^\infty s^{(1-\theta)p} f(s)^{-(1-\theta)pp_1/p_0} \frac{d}{ds} (f(s)^{p_1}) ds \\
&= -\frac{1}{(1-\theta)p_1(1-(1-\theta)p/p_0)} \alpha^{(1-\theta)p/p_0} \int_0^\infty s^{(1-\theta)p} \frac{d}{ds} (f(s)^{p_1(1-(1-\theta)p/p_0)}) ds \\
&= \frac{1}{p_1(1-(1-\theta)p/p_0)} p \alpha^{(1-\theta)p/p_0} \int_0^\infty f(s)^{p_1(1-(1-\theta)p/p_0)} s^{(1-\theta)p-1} ds \\
&= \theta^{-p_1/p} \left(\int_0^\infty s^{(1-\theta)p} f(s)^{\theta p} \frac{ds}{s} \right)^{p_1/p},
\end{aligned}$$

其中 (A) 中积分区域的改变是因为在 $[s_0, \infty)$ 上 $f(s) \equiv 0$, (B) 中无边界项是因为 $1 - (1-\theta)pp_1/p_0 > 0$, 于是分部积分产生的两个边界项均为 0. 至此 $p_1 < \infty$ 的情形得证.

另若 $p_1 = \infty$, 则利用依(13.29)定义的 v^{-1} , 仿照 $p_1 < \infty$ 对应情形的处理可以证明第一个量和第三个量相等. 第二个量的相关结论此时由(13.30)立得. $\square$

引理 13.10

在命题13.11的条件下, 沿用前述记号, 若 $1 \leq p_0 < \infty, p_0 \leq p_1 \leq \infty$, 则对全体 $x \in X_0 \cap X_1$ 而言引理13.9中的三个量均有限, 且

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq \theta^{-1/p} \|t \mapsto t^{1-\theta} f(t)^\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \leq 2\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}.$$

证明 针对第一个待证式, 只需考虑引理13.9并在(13.26)中令 $w = v$ 即可.

对于第二个待证式, 设 $w : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是满足 $(t \mapsto t^{-\theta} w(t)) \in L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}), (t \mapsto t^{1-\theta} f(x, w(t))) \in L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})$ 的非负连续函数. 记

$$M := M(w) := \{t > 0 : v(t) \leq w(t)\}.$$

首先设 $p_1 < \infty$, 考虑拆分 $\int_0^\infty = \int_M + \int_{M^c}$, 由引理13.9, 三角不等式, (13.28)与 f 不增知

$$\begin{aligned}
I &:= \theta^{-1/p} \|t^{1-\theta} f(t)^\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} = \|t^{-\theta} v(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} \\
&\leq \left(\int_M t^{-\theta p_0} v(t)^{p_0} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_0} + \alpha^{-1/p_0} \left(\int_{M^c} t^{(1-\theta)p_1} f(v(t))^{p_1} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_0} \\
&\leq \left(\int_M t^{-\theta p_0} w(t)^{p_0} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_0} + \alpha^{-1/p_0} \left(\int_{M^c} t^{(1-\theta)p_1} f(w(t))^{p_1} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_0} < \infty.
\end{aligned}$$

进一步记

$$I_0 := \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \quad I_1 := \|t \mapsto t^{1-\theta} f(w(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)},$$

由 α 的定义即知

$$I \leq I_0 + I^{-(p_1-p_0)/p_0} I_1^{p_1/p_0}.$$

记 $K_0 := I_0/I, K_1 := I_1/I, q := p_1/p_0 \geq 1$, 则上式可以进一步写成

$$1 \leq K_0 + K_1^q.$$

这特别表明 $\max\{K_0, K_1\} \geq 1/2$, 即

$$\begin{aligned}
I &\leq 2 \max\{I_0, I_1\} \\
&\leq 2 \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}, \|t \mapsto t^{1-\theta} f(w(t))\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \right\}.
\end{aligned}$$

现在对上式关于全体容许函数 w 取下确界即得待证第二式.

$p_1 = \infty$ 的情形证明是类似的. 依旧记

$$M = \{t > 0 : v(t) \leq w(t)\}.$$

如果 M 是 $(0, \infty)$ 的一个真子集, 则由 (13.30) 知 $I = t^{1-\theta} f(v(t))$, 进而

$$I \stackrel{(D)}{\leq} \sup_{t \in M^c} t^{1-\theta} f(v(t)) \leq \sup_{t \in M^c} t^{1-\theta} f(w(t)) \leq I_1 \leq \max\{I_0, I_1\},$$

其中 I, I_0, I_1 和前述定义相同. 这里 (D) 是因为 M^c 至少是正测集, 后者是通过 M 的闭性得到的. 另若 $M = (0, \infty)$, 则由引理 13.9 知

$$I = \|t \mapsto t^{-\theta} v(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \leq \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} = I_0 \leq \max\{I_0, I_1\},$$

至此即得结论. $\square$

现在可以开始证明命题 13.11 了.

证明 $p_0 = p_1$ 的情形已经在命题 13.10 中证过了, 故只需考虑 $p_0 < p_1$. 记

$$J := \theta^{-1/p} \|t \mapsto t^{1-\theta} f(t)\|_{L^p(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})}.$$

由引理 13.10 知 J 有限当且仅当 $\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 有限, 且有下述双边估计成立:

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq J \leq 2\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}.$$

但另一方面 (p, p, p) 同样是满足命题 13.11 的三元数组, 于是在引理 13.10 中代入 $p_0 = p_1 = p$ 知 J 有限当且仅当 $\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 有限, 且有下述双边估计成立:

$$\|x\|_{\theta, p, p}^{(m)} \leq J \leq 2\|x\|_{\theta, p, p}^{(m)}.$$

结合上述两条双边估计即知

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq 2\|x\|_{\theta, p, p}^{(m)} \leq 4\|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}.$$

另一方面由命题 13.10 知

$$\frac{1}{2}\|x\|_{\theta, p} \leq \|x\|_{\theta, p, p}^{(m)} \leq \|x\|_{\theta, p},$$

由此立得结论. $\square$

为阐明下一条结果, 我们还需要用到所谓的第二均值法, 该方法会新引入一个空间 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$. 之后我们会看到这个新引入的空间实际上和实插值空间 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 重合 (其中 $1/p = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$).

定义 13.7 (Lions-Peetre 方法)

设 $1 \leq p_0 \leq p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1$, 定义空间 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 为全体 $x \in X_0 + X_1$ 构成的集合, 其中每个 x 都对应存在强可测函数 $u: (0, \infty) \rightarrow X_0 \cap X_1$ 满足:

- (i) 在 $X_0 + X_1$ 的收敛意义下有 $x = \int_0^\infty u(t) \frac{dt}{t}$;
- (ii) $t \mapsto t^{j-\theta} u(t)$ 在 $L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)$ ($j = 0, 1$) 内.



在 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 定义下述范数:

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1} := \inf_u \max \left\{ \|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \right\},$$

其中下确界在全体满足定义 13.7 的函数 u 中取. $\|\cdot\|_{\theta, p_0, p_1}$ 的形式显然很像 $\|\cdot\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$, 事实上之后会证明

$$(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} = (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1},$$

且这两个空间上的范数等价. 上述结果特别表明 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 是 Banach 空间.

另需注意到定义 13.7(i) 中反常积分在 $X_0 + X_1$ 中的绝对收敛性可以直接由 (ii) 推知. 这是因为对 $\tau > 0$ 有:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \|u(t)\|_{X_0+X_1} \frac{dt}{t} &\leq \int_0^\tau \|u(t)\|_{X_0} \frac{dt}{t} + \int_\tau^\infty \|u(t)\|_{X_1} \frac{dt}{t} \\ &\leq \|t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} \|t^\theta\|_{L^{p'_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \\ &\quad + \|t^{(1-\theta)} u(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \|t^{-(1-\theta)}\|_{L^{p'_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \\ &< \infty. \end{aligned} \tag{13.31}$$

$p_1 = \infty$ 时上述结论同样成立. 仿照上述过程同样可以证明对全体 $0 < a < b < \infty$ 均有 $\int_a^b u(t) \frac{dt}{t} \in X_0 \cap X_1$, 这一点后面还会用到.

引理 13.11

对全体 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 均有

$$\|x\|_{\theta, p_0, p_1} = \inf_u \left(\|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}^{1-\theta} \cdot \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}^{\theta} \right),$$

其中下确界在满足定义 13.7 的全体 u 中取.



证明 首先观察到对任意 $0 < \theta < 1$ 与实数 $a, b > 0$ 均有

$$\inf_{\mu > 0} \max\{\mu^{\theta} a, \mu^{\theta-1} b\} = a^{1-\theta} b^{\theta}. \quad (13.32)$$

这是因为 (13.32) 左式除以 $a^{1-\theta} b^{\theta}$ 后为

$$\inf_{\mu > 0} \max\left\{\left(\frac{\mu a}{b}\right)^{\theta}, \left(\frac{\mu a}{b}\right)^{\theta-1}\right\} = \inf_{\lambda > 0} \max\{\lambda^{\theta}, \lambda^{\theta-1}\} = 1.$$

现若 $t \mapsto u(t)$ 满足定义 13.7 的条件, 则对每个 $\mu > 0$ 而言 $t \mapsto u(\mu t)$ 同样满足条件, 且

$$\begin{aligned} \|t \mapsto t^{-\theta} u(\mu t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} &= \mu^{\theta} \|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \\ \|t \mapsto t^{1-\theta} u(\mu t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} &= \mu^{\theta-1} \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}. \end{aligned}$$

在 (13.32) 中代入

$$a = \|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}, \quad b = \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}$$

立得待证结论. □

引理 13.12

设 $1 \leq p_0 < \infty, p_0 \leq p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1$, 则 $X_0 \cap X_1$ 在 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 中稠密.



证明 取定 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$, 取 u 是满足定义 13.7 条件的任意函数. 取 $\varphi_n \in C_c(0, \infty)$ 满足 $0 \leq \varphi_n \leq 1, \varphi_n(t) = 1 (\forall t \in [1/n, n])$, 则 $x_n := \int_0^{\infty} \varphi_n(t) u(t) \frac{dt}{t} \in X_0 \cap X_1$, 且

$$x - x_n = \int_0^{\infty} (1 - \varphi_n(t)) u(t) \frac{dt}{t},$$

其中反常积分在 $X_0 + X_1$ 意义下收敛. 因为在 $I_n = [1/n, n]$ 上 $1 - \varphi_n(t) = 0$, 故由引理 13.11 知

$$\|x - x_n\|_{\theta, p_0, p_1} \leq \|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(I_n^c, \frac{dt}{t}; X_0)}^{1-\theta} \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t)\|_{L^{p_1}(I_n^c, \frac{dt}{t}; X_1)}^{\theta}.$$

由定义 13.7 知上右式在 $n \rightarrow \infty$ 时趋零. 注意 $L^{p_0}(I_n^c, \frac{dt}{t}; X_0)$ 对应的这一项范数能趋零是因为条件设了 $p_0 < \infty$.

□

命题 13.12 (两种均值法的等价)

设 (X_0, X_1) 是 Banach 空间插值对, $1 \leq p_0 \leq p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1, 1/p = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$, 则

$$(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} = (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1},$$

且其上范数满足下述等价关系:

$$\frac{1}{6} \|x\|_{\theta, p_0, p_1} \leq \|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq C_{\theta} \|x\|_{\theta, p_0, p_1}, \quad (13.33)$$

其中 $C_{\theta} = \max\{\theta^{-1}, (1-\theta)^{-1}\}$.



注 下面给出的证明同样表明可以定义 13.7 中的 u 升级为连续函数.

证明 取定 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$, 记 $x = \int_0^{\infty} u(t) \frac{dt}{t}$ (其中 u 依定义 13.7 确定), 记

$$u_0(t) := \int_0^t u(s) \frac{ds}{s}, \quad u_1(t) := \int_t^{\infty} u(s) \frac{ds}{s},$$

则对全体 $t > 0$ 均有 $u_0(t) + u_1(t) = x$. 进一步由(13.31)知用于定义 $u_0(t), u_1(t)$ 的积分作为 Bochner 积分分别在 X_0, X_1 中存在.

下面先估计 $t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)$ 的 $L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)$ 范数. 由带 Haar 测度 dt/t 的乘法群 $(0, \infty)$ 上的 Young 卷积不等式知

$$\begin{aligned} \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} &= \left(\int_0^\infty \left\| \int_0^t (t/s)^{-\theta} \mathbf{1}_{(1, \infty)}(t/s) \cdot s^{-\theta} u(s) \frac{ds}{s} \right\|_{X_0}^{p_0} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_0} \\ &\leq \|t \mapsto t^{-\theta} \mathbf{1}_{(1, \infty)}(t)\|_{L^1(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t})} \|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} \\ &\leq \frac{1}{\theta} \|t \mapsto t^{-\theta} u(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} < \infty. \end{aligned}$$

同理可证

$$\|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \leq \frac{1}{1-\theta} \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} < \infty.$$

因此 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$, 结合上述两式即得(13.33)第二式.

下面证明反向不等式, 设 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 取定, 依定义 13.6 取函数 $u_j : \mathbb{R}^+ \rightarrow X_j (j=0, 1)$. 设 $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是在 $[0, 1] \cup [3, \infty)$ 上恒为零, 图像线性连接 $(1, 0), (2, 1), (3, 0)$ 三点的帐篷型分段线性函数. 记 $\varphi(t) := tg(t)$, 则容易验证

$$\int_0^\infty \varphi(t) \frac{dt}{t} = \int_0^\infty g(t) dt = 1.$$

现定义函数 $v_j \in C^1(0, \infty; X_j) (j=0, 1)$ 为

$$v_j(t) := \int_0^\infty \varphi(t/\tau) u_j(\tau) \frac{d\tau}{\tau}, \quad t > 0,$$

则由 $u_0 + u_1 \equiv x$ 可得 $v_0 + v_1 \equiv x$, 且对全体 $r > 0$ 均有

$$\begin{aligned} \|v_0(r)\|_{X_0} &= \left\| \int_{r/3}^r \varphi(r/\tau) u_0(\tau) \frac{d\tau}{\tau} \right\|_{X_0} \leq \int_{r/3}^r \|u_0(\tau)\|_{X_0} \frac{d\tau}{\tau} \\ &\leq \left(\int_{r/3}^r \tau^{\theta p_0'} \frac{d\tau}{\tau} \right)^{1/p_0'} \left(\int_0^\infty \tau^{-\theta p_0} \|u_0(\tau)\|_{X_0}^{p_0} \frac{d\tau}{\tau} \right)^{1/p_0}, \end{aligned}$$

进一步由上式可知 $p_0 > 1$ 时 $\lim_{r \downarrow 0} \|v_0(r)\|_{X_0} = 0$. 另若 $p_0 = 1$, 则直接对 $\int_{r/3}^r \|u_0(\tau)\|_{X_0} \frac{d\tau}{\tau}$ 放缩可得相同结果. 同理可证 $\lim_{R \rightarrow \infty} \|v_1(R)\|_{X_1} = 0$. 现定义 $u \in C((0, \infty); X_0) \cap C((0, \infty); X_1) = C((0, \infty); X_0 \cap X_1)$ 为

$$u(t) := tv_0'(t) = -tv_1'(t), \quad t > 0.$$

于是由前述收敛性质知

$$\begin{aligned} \int_0^\infty u(t) \frac{dt}{t} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{1/R}^R v_0'(t) dt = \lim_{R \rightarrow \infty} (v_0(R) - v_0(1/R)) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} (x - v_1(R) - v_0(1/R)) = x, \end{aligned}$$

其中最后的收敛是在 $X_0 + X_1$ 意义下的.

现对 $j=0, 1$ 知

$$t^{j-\theta} \|u(t)\|_{X_j} = t^{1+j-\theta} \|v_j'(t)\|_{X_j} \leq \int_0^\infty (t/\tau)^{1+j-\theta} |\varphi'(t/\tau)| \tau^{j-\theta} \|u_j(\tau)\|_{X_j} \frac{d\tau}{\tau}.$$

注意到上右式的积分同样是先前提到的卷积形式. 因为 $|\varphi'(t)| = |g(t) + tg'(t)|$ 支在 $[1, 3]$ 上, 在 $[1, 2]$ 上等于 $2t-1$, 在 $[2, 3]$ 上等于 $2t-3$, 故通过初等计算即知

$$c_{0, \varphi} := \int_0^\infty t^{1-\theta} |\varphi'(t)| \frac{dt}{t} \leq 2, \quad c_{1, \varphi} := \int_0^\infty t^{2-\theta} |\varphi'(t)| \frac{dt}{t} \leq 6,$$

进而由 Young 卷积不等式知

$$\left(\int_0^\infty t^{(j-\theta)p_j} \|u(t)\|_{X_j}^{p_j} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_j} \leq c_{j, \varphi} \left(\int_0^\infty t^{(j-\theta)p_j} \|u_j(t)\|_{X_j}^{p_j} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_j}.$$

故 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$, 且由上述估计即得(13.33)第一式. □

现在我们可以证明下述基本结果了:

定理 13.9 (Lions-Peetre)

设 (X_0, X_1) 是 Banach 空间插值对, $1 \leq p_0 \leq p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1, 1/p := (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$, 则

$$(X_0, X_1)_{\theta, p} = (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} = (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1},$$

其中范数满足下述等价关系:

$$\frac{1}{12} \|x\|_{\theta, p_0, p_1} \leq \|x\|_{\theta, p} \leq 4C_\theta \|x\|_{\theta, p_0, p_1}, \quad (13.34)$$

其中 $C_\theta = \max\{\theta^{-1}, (1-\theta)^{-1}\}$. 同时有

$$\frac{1}{2} \|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq \|x\|_{\theta, p} \leq 4 \|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}. \quad (13.35)$$

证明 [第一步.] 首先考虑 $1 \leq p_0 = p_1 = p \leq \infty$ 的情形. 由命题 13.10 与命题 13.12 知 $(X_0, X_1)_{\theta, p} = (X_0, X_1)_{\theta, p, p}^{(m)} = (X_0, X_1)_{\theta, p, p}$, 且其上范数满足等价关系 (13.34).

[第二步.] 现在考虑 $1 \leq p_0 \leq p_1 \leq \infty, p_0 < \infty$ 的情形. 注意到对 $x \in X_0 \cap X_1$ 而言, 结合命题 13.11 与命题 13.12 立得估计 (13.34). 根据第一步的结果与引理 13.12 知 $X_0 \cap X_1$ 同时在 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 和 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 中稠密, 通过稠密性诱导的逼近过程即得此种情形下的 (13.34).

[第三步.] 因为由命题 13.12 已知 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} = (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$, 而第一步与第二步的结果表明 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1} = (X_0, X_1)_{\theta, p}$ 有等价范数, 故 $(X_0, X_1)_{\theta, p} = (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 同样有等价范数, 且由 (13.25) 与 $X_0 \cap X_1$ 在 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 中的稠密性知对任意 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p}$ 均有

$$\frac{1}{4} \|x\|_{\theta, p} \leq \|x\|_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \leq 2 \|x\|_{\theta, p}, \quad p_0 \leq p_1 \leq \infty, p_0 < \infty.$$

另若 $p_0 = p_1 = \infty$, 则由命题 13.10 即得类似结果. 至此 (13.35) 得证. $\square$

下述推论是上述证明的一个副产品:

推论 13.5

对任意 $1 \leq p < \infty, 0 < \theta < 1$ 而言, $X_0 \cap X_1$ 均在 $(X_0, X_1)_{\theta, p}$ 中稠密.

定理 13.10 (算子实插值的第二个版本)

设 $(X_0, X_1), (Y_0, Y_1)$ 是 Banach 空间插值对. 设 $T: X_0 + X_1 \rightarrow Y_0 + Y_1$ 是线性算子, 且

$$\|T\|_{X_0 \rightarrow Y_0} = A_0, \quad \|T\|_{X_1 \rightarrow Y_1} = A_1,$$

则:

(i) 对全体 $1 \leq p \leq \infty, 0 < \theta < 1$ 而言, 算子 T 都是 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$ 的, 且

$$\|T\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta.$$

(ii) 对全体 $1 \leq p \leq \infty, 0 < \theta < 1$ 而言, 算子 T 都是 $(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 的, 且

$$\|T\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta.$$

证明 这里我们只证明 (i), (ii) 的证明基本上是完全相同的. 首先观察到第一均值法同样满足类似引理 13.11 的结论. 现在先设 $A_0 \neq 0$, 取定 $x \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}^{(m)}$, 记 $x \equiv u_0 + u_1$ 满足 $t^{j-\theta} u_j(t) \in L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)$, 则

$$\begin{aligned} & \|t \mapsto t^{-\theta} T u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}^{1-\theta} \cdot \|t \mapsto t^{1-\theta} T u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}^\theta \\ & \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|t \mapsto t^{-\theta} u_0(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}^{1-\theta} \cdot \|t \mapsto t^{1-\theta} u_1(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}^\theta \end{aligned}$$

上式两端同在全体容许的 u_0, u_1 中取下确界即得待证结论. $\square$

复插值 v.s. 实插值

本节我们证明对任意复 Banach 空间插值对 (X_0, X_1) 均有下述包含关系成立:

$$(X_0, X_1)_{\theta,1} \hookrightarrow [X_0, X_1]_{\theta} \hookrightarrow (X_0, X_1)_{\theta,\infty},$$

另外只要做一些额外的工作, 就可以得到一个与 X_0, X_1 的 Fourier 型有关的更优结果. 设 $p \in [1, 2]$, 称复 Banach 空间 X 的 Fourier 型为 p , 如果 Hausdorff-Young 不等式对 X 值函数的 Fourier 变换成立, 即 Fourier 变换 $\mathcal{F} : L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R})$ 能延拓为有界算子 $\mathcal{F} : L^p(\mathbb{R}; X) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}; X)$ ($1/p + 1/p' = 1$). 由 Fourier 变换自身的有界性与命题 13.1 知全体 Banach 空间至少都有 1-Fourier 型. 又因为 Kwapien 定理 13.4 表明 Plancherel 定理能延拓到 Hilbert 空间上, 故全体 Hilbert 空间都有 2-Fourier 型.

定理 13.11 (Peetre)

设 (X_0, X_1) 是复 Banach 空间插值对. 若 X_0, X_1 分别有 p_0 -Fourier 型和 p_1 -Fourier 型, 则对全体 $0 < \theta < 1$ 均有下述连续嵌入关系成立:

$$(X_0, X_1)_{\theta,p} \hookrightarrow [X_0, X_1]_{\theta} \hookrightarrow (X_0, X_1)_{\theta,p'}, \quad (13.36)$$

其中 $1/p = (1 - \theta)/p_0 + \theta/p_1, 1/p + 1/p' = 1$.

推论 13.6

对 Hilbert 空间插值对 (H_0, H_1) 而言, 对全体 $0 < \theta < 1$ 均有

$$(H_0, H_1)_{\theta,2} = [H_0, H_1]_{\theta},$$

且上式两端范数等价.

下面证明定理 13.11.

证明 首先说明 $(X_0, X_1)_{\theta,p} \hookrightarrow [X_0, X_1]_{\theta}$. 由推论 13.5 与 $p < \infty$ 知 $X_0 \cap X_1$ 在 $(X_0, X_1)_{\theta,p}$ 中稠密, 于是由定理 13.9 知只需证明存在常数 C 使得对全体 $x \in X_0 \cap X_1$ 均有

$$\|x\|_{[X_0, X_1]_{\theta}} \leq C \|x\|_{(X_0, X_1)_{\theta,p_0,p_1}}. \quad (13.37)$$

依照定义 13.7 取定函数 u , 记 $u_k := \mathbf{1}_{(1/k,k)} u$ 在 $(X_0, X_1)_{\theta,p}$ 中诱导的元素为 x_k , 进一步记

$$f_k(z) := \int_0^\infty t^{z-\theta} u_k(t) \frac{dt}{t}, \quad z \in \mathbb{S}.$$

显见 $f_k(\theta) = x_k$. 类似于 (13.31) 的过程可以说明上述积分在 $X_0 \cap X_1$ 内收敛, 进一步可以说明 f_k 在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 函数 $v \mapsto f_k(j + iv) \in X_j$ 连续, 且在 $X_0 + X_1$ 的意义下有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(\theta) = x$. 现在考虑代换 $t = e^{-2\pi s}$, 记 $v_k(s) := u_k(e^{-2\pi s})$, 则

$$\begin{aligned} \|t \mapsto t^{-\theta} u_k(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} &= \left(\int_0^\infty t^{-\theta p_0} \|u_k(t)\|_{X_0}^{p_0} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_0} \\ &= (2\pi)^{1/p_0} \left(\int_{-\infty}^\infty e^{2\pi \theta p_0 s} \|v_k(s)\|_{X_0}^{p_0} ds \right)^{1/p_0} \\ &= (2\pi)^{1/p_0} \|s \mapsto e^{2\pi \theta s} v_k(s)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}; X_0)}. \end{aligned}$$

类似可得

$$\|t \mapsto t^{1-\theta} u_k(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} = (2\pi)^{1/p_1} \|s \mapsto e^{(\theta-1)s} v_k(s)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}; X_1)}.$$

同样在该代换下有

$$\frac{1}{2\pi} f_k(z) = \int_{-\infty}^\infty e^{-2\pi z s} e^{2\pi \theta s} v_k(s) ds.$$

现取 $z = iy, z = 1 + iy (y \in \mathbb{R})$, 则 $f_k(z)$ 此时可以视作某个 Fourier 变换, 进而就可以用 X_0, X_1 上的 Fourier 型条

件了. 由此可知对 $j \in \{0, 1\}$ 有

$$\begin{aligned} \|f_k(j+i\cdot)\|_{L^{p'_j}(\mathbb{R}; X_j)} &\leq 2\pi\varphi_{p_j, X_j}\|s \mapsto e^{2\pi(\theta-j)s}u_k(s)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}; X_j)} \\ &= (2\pi)^{1/p'_j}\varphi_{p_j, X_j}\|t \mapsto t^{j-\theta}u_k(t)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)} \\ &\leq (2\pi)^{1/p'_j}\varphi_{p_j, X_j}\|x\|_{\theta, p_0, p_1}, \end{aligned} \quad (13.38)$$

其中 φ_{p_j, X_j} 是 Fourier 变换 $\mathcal{F}: L^{p_j}(\mathbb{R}; X_j) \rightarrow L^{p'_j}(\mathbb{R}; X_j)$ 的算子范数. 现由推论 13.4 与 $\|\cdot\|_{[X_0, X_1]_\theta}$ 的定义即知

$$\|x_k\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq C\|x\|_{\theta, p_0, p_1}, \quad (13.39)$$

其中 $C = C_{\theta, p_0, p_1} \max_{j \in \{0, 1\}} (2\pi)^{1/p'_j} \varphi_{p_j, X_j}$.

现在把 (13.38) 中的 f_k 换成 $f_k - f_l$, 再用一次推论 13.4 知

$$\|x_k - x_l\|_{[X_0, X_1]_\theta} \leq C\|t \mapsto t^{j-\theta}(u_k(t) - u_l(t))\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)}.$$

因为 $p_0, p_1 < \infty$, 故由定义 13.7 对 $t \mapsto t^{j-\theta}u$ 提的可积性条件知上右式在 $k, l \rightarrow \infty$ 时趋零, 故序列 $\{x_k\}_{k \geq 1}$ 是 $[X_0, X_1]_\theta$ 中的 Cauchy 列, 进而该序列能收敛到 $y \in [X_0, X_1]_\theta$. 因为同时在 $X_0 + X_1$ 中有 $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(\theta)$, 故只能有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x([X_0, X_1]_\theta)$, 进而在 (13.39) 中令 $k \rightarrow \infty$ 立得 (13.37).

下面证明 (13.36) 第二式. 由推论 13.3 知只需对全体形如 $x = f(\theta) \in X_0 \cap X_1$ ($f \in \mathcal{H}_0(X_0, X_1; X_0 \cap X_1)$) 的元素说明

$$\|x\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p'}} \leq C\|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}. \quad (13.40)$$

现取定 $x = f(\theta)$ 满足前述形式, 则函数 $g(z) := e^{z^2 - \theta^2} f(z)$ 满足对全体 $x \in (0, 1)$ 而言, $y \mapsto g(x + iy)$ 均为在 $X_0 \cap X_1$ 内取值的 Schwartz 函数, $g(\theta) = x$, 且

$$\|g(j + i2\pi\cdot)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}; X_j)} \leq C_{p_j}\|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}, \quad (13.41)$$

其中 $C_{p_j} = \|e^{j-(2\pi\cdot)^2}\|_{L^{p_j}(\mathbb{R})} \leq 2$. 取

$$w(t) := \frac{1}{i2\pi} \int_{\theta-i\infty}^{\theta+i\infty} t^{\theta-z} g(z) dz,$$

则容易验证 $w: (0, \infty) \rightarrow X_0 \cap X_1$ 连续. 应用代换 $t = e^s, z = \theta + i2\pi r$ 即知

$$\begin{aligned} \int_0^\infty w(t) \frac{dt}{t} &= \int_{\mathbb{R}} w(e^s) ds = \frac{1}{i2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\theta-i\infty}^{\theta+i\infty} e^{(\theta-z)s} g(z) dz ds \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi sr} g(\theta + i2\pi r) ds dr \\ &\stackrel{(A)}{=} g(\theta) = x, \end{aligned}$$

其中 (A) 用到了 Schwartz 函数的 Fourier 反演. 另由 Cauchy 积分公式知对全体 $\eta \in (0, 1)$ 均有¹⁷

$$w(t) = \frac{1}{i2\pi} \int_{\eta-i\infty}^{\eta+i\infty} t^{\theta-z} g(z) dz \stackrel{(B)}{=} -t^\theta \int_{\mathbb{R}} t^{-i2\pi y} g(i2\pi y) dy, \quad (13.42)$$

其中 (B) 用到了代换 $z = \eta + i2\pi r$ 并在 X_0 的意义下令 $\eta \downarrow 0$ 了. 再令 $t = e^s$ 知

$$\begin{aligned} \|t \mapsto t^{-\theta} w(t)\|_{L^{p'_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} &= \left\| t \mapsto \int_{\mathbb{R}} t^{-i2\pi y} g(i2\pi y) dy \right\|_{L^{p'_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)} \\ &= \left\| s \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi y s} g(i2\pi y) dy \right\|_{L^{p'_0}(\mathbb{R}; X_0)} \\ &= \|(g(i2\pi\cdot))^\wedge\|_{L^{p'_0}} \\ &\stackrel{(C)}{\leq} \varphi_{p_0, X_0} \|g(i2\pi\cdot)\|_{L^{p_0}} \\ &\stackrel{(D)}{\leq} 2\varphi_{p_0, X_0} \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}, \end{aligned}$$

¹⁷这里 (B) 的后一项书上没有带符号, 但从围道积分看的话围道的积分方向应该会产生一个负号?

其中 (C) 用到了 X_0 的 p_0 -Fourier 型条件, (D) 用到了 (13.41). 类似在 (13.42) 中令 $\eta \uparrow 1$ 知

$$\|t \mapsto t^{1-\theta} w(t)\|_{L^{p'_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)} \leq \varphi_{p_1, X_1} \|g(1 + i2\pi \cdot)\|_{L^{p_1}} \leq 2\varphi_{p_1, X_1} \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}.$$

于是定义 13.7 表明

$$\|x\|_{\theta, p'_0, p'_1} \leq 2 \max\{\varphi_{p_0, X_0}, \varphi_{p_1, X_1}\} \|f\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)}.$$

最后利用定理 13.9, 取

$$C = 8 \max\{\varphi_{p_0, X_0}, \varphi_{p_1, X_1}\} \max\{\theta^{-1}, (1-\theta)^{-1}\}$$

即得 (13.40). □

13.2.2 Riesz-Thorin 插值定理

定义在不同 L^p 空间上的有界算子之间的插值结果可能最早就是由 M. Riesz 提出的, 该结果的现代版本归功于 Thorin.

定理 13.12 (Riesz-Thorin)

设 X, Y 均为复 Banach 空间, $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$, $(S_0, \mathcal{A}_0, \mu), (S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 均为测度空间, $T : L^{p_0}(S_0; X) + L^{p_1}(S_0; X) \rightarrow L^0(S_1; Y)$ 为线性算子, 且 T 将 $L^{p_0}(S_0; X)$ 映入 $L^{q_0}(S_1; X)$, 将 $L^{p_1}(S_0; X)$ 映入 $L^{q_1}(S_1; X)$. 若

$$\|Tf\|_{L^{q_j}(S_1; Y)} \leq A_j \|f\|_{L^{p_j}(S_0; X)}, \quad \forall f \in L^{p_j}(S_0; X), \quad j = 0, 1,$$

则对全体 $0 < \theta < 1$ 而言 T 均将 $L^{p_\theta}(S_0; X)$ 映入 $L^{q_\theta}(S_1; Y)$, 且

$$\|Tf\|_{L^{q_\theta}(S_1; Y)} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)}, \quad \forall f \in L^{p_\theta}(S_0; X),$$

其中

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

该结果的证明需要预备 Hadamard 三线引理¹⁸. 现考虑开带状区域:

$$\mathbb{S} := \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}.$$

引理 13.13 (Hadamard 三线引理)

设 $F : \mathbb{S} \rightarrow X$ 作为连续函数在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 且

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(iv)\|_X \leq A_0, \quad \sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(1+iv)\|_X \leq A_1.$$

则 F 在 $\mathbb{S}$ 上一致有界, 且对全体 $0 < \theta < 1$ 均有

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(\theta + iv)\|_X \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta.$$

证明 取定 $F : \mathbb{S} \rightarrow X$, 知对每个 $\varepsilon > 0$ 而言, 函数 $F_\varepsilon(z) = A_0^{z-1} A_1^{-z} \exp(\varepsilon z(z-1)) F(z)$ 均满足引理条件, 且 F_ε 对应的 A_0, A_1 均为 1. 进一步根据 $F_\varepsilon(z)$ 自带的指数知 $\lim_{v \rightarrow \infty} \|F_\varepsilon(u+iv)\|_X = 0$ 关于 $u \in [0, 1]$ 一致, 故对足够大的 R 而言, 在矩形围线 $\partial\{z : \operatorname{Re} z \in [0, 1], |\operatorname{Im} z| \leq R\}$ 上总有 $\|F_\varepsilon\|_X \leq 1$, 于是由 F_ε 全纯与最大模原理知 $\|F_\varepsilon\|_X \leq 1$ 在该矩形区域内同样成立, 令 $R \rightarrow \infty$ 即知 $\|F_\varepsilon\|_X \leq 1$ 在 $\mathbb{S}$ 上成立. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 并取 $z = \theta + iv$ 即得待证结果. □

下面证明定理 13.12.

证明 若 $p_0 = p_1 = \infty$, 则对全体 $f \in L^\infty(S_0; X)$ 均有 $Tf \in L^{q_0}(S_1; Y) \cap L^{q_1}(S_1; Y)$, 进而由 Hölder 不等式知

$$\|Tf\|_{L^{q_\theta}(S_1; Y)} \leq \|Tf\|_{L^{q_0}(S_1; Y)}^{1-\theta} \|Tf\|_{L^{q_1}(S_1; Y)}^\theta \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{L^\infty(S_0; X)}^{1-\theta} \|f\|_{L^\infty(S_0; X)}^\theta = A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{L^\infty(S_0; X)}.$$

¹⁸回忆经典的三线引理 2.14 是对解析函数 (或者至少是复数值函数) 提的, 这里的三线引理需要对 X 值函数提.

至此 $p_0 = p_1 = \infty$ 的情形得证, 下面设 $\min\{p_0, p_1\} < \infty$, 此时必有 $p_\theta < \infty$. 现对 $z \in \bar{\mathbb{S}}$ 定义 $p_z, q_z \in \mathbb{C}$ 为

$$\frac{1}{p_z} = \frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1}, \quad \frac{1}{q'_z} = \frac{1-z}{q'_0} + \frac{z}{q'_1},$$

其中 q'_0, q'_1, q'_z 为 q_0, q_1, q_z 的共轭指标. 记 $a: S_0 \rightarrow X, b: S_1 \rightarrow Y^*$ 分别为 μ_0 -简单函数与 μ_1 -简单函数, 进一步对每个 $z \in \bar{\mathbb{S}}$ 定义 μ_0 -简单函数 $f_z \in L^{p_0}(S_0; X) \cap L^{p_1}(S_0; X)$ 与 μ_1 -简单函数 $g_z \in L^{q'_0}(S_1; Y^*) \cap L^{q'_1}(S_1; Y^*)$ 为

$$f_z(s_0) = \mathbf{1}_{\{a(s_0) \neq 0\}} \|a(s_0)\|_X^{p_\theta/p_z} \frac{a(s_0)}{\|a(s_0)\|_X},$$

$$g_z(s_1) = \mathbf{1}_{\{b(s_1) \neq 0\}} \|b(s_1)\|_{Y^*}^{q'_\theta/q'_z} \frac{b(s_1)}{\|b(s_1)\|_{Y^*}}.$$

则 $Tf_z \in L^{q_0}(S_1; Y) \cap L^{q_1}(S_1; Y)$, 且函数

$$F: \bar{\mathbb{S}} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto F(z) := \int_{S_1} \langle Tf_z, g_z \rangle_{Y \times Y^*} d\mu_1$$

在 $\bar{\mathbb{S}}$ 上连续, 在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 同时对全体 $v \in \mathbb{R}$ 均有

$$|F(iv)| \leq A_0 \|f_{iv}\|_{L^{p_0}(S_0; X)} \|g_{iv}\|_{L^{q'_0}(S_1; Y^*)} \leq A_0 \|a\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)}^{p_\theta/p_0} \|b\|_{L^{q'_\theta}(S_1; Y^*)}^{q'_\theta/q'_0},$$

类似可得

$$|F(1+iv)| \leq A_1 \|a\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)}^{p_\theta/p_1} \|b\|_{L^{q'_\theta}(S_1; Y^*)}^{q'_\theta/q'_1}.$$

于是由三线引理知

$$\begin{aligned} \left| \int_{S_1} \langle Ta, b \rangle_{Y \times Y^*} d\mu_1 \right| &= |F(\theta)| \\ &\leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|a\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)}^{(1-\theta)p_\theta/p_0} \|b\|_{L^{q'_\theta}(S_1; Y^*)}^{(1-\theta)q'_\theta/q'_0} \|a\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)}^{\theta p_\theta/p_1} \|b\|_{L^{q'_\theta}(S_1; Y^*)}^{\theta q'_\theta/q'_1} \\ &\leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|a\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)} \|b\|_{L^{q'_\theta}(S_1; Y^*)}. \end{aligned}$$

对上式两端在全体 μ_1 -简单函数 $b \in L^{q'_\theta}(S_1; Y^*)$ 中取上确界, 由命题 12.27 与推论 12.16 即知

$$\|Ta\|_{L^{q_\theta}(S_1; Y)} \leq A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|a\|_{L^{p_\theta}(S_0; X)}.$$

由 $p_\theta < \infty$ 知 μ_0 -简单函数构成的空间在 $L^{p_\theta}(S_0; X)$ 中稠密, 故 T 在该简单函数空间上的限制能唯一延拓成 $L^{p_\theta}(S_0; X) \rightarrow L^{q_\theta}(S_1; Y)$ 的有界算子 $\tilde{T}$, 且其算子范数至多为 $A_0^{1-\theta} A_1^\theta$.

最后还需验证对全体 $f \in L^{p_\theta}(S_0; X)$ 均有 $\tilde{T}f = Tf$. 为此设 $p_0 \leq p_1$, 记 $f = \mathbf{1}_{\{\|f\|_X > 1\}} f + \mathbf{1}_{\{\|f\|_X \leq 1\}} f =: f^0 + f^1$, 显见 $f^j \in L^{p_j}(S_0; X) (j=0, 1)$. 现若 μ_0 -简单函数列 $\{f_n\}$ 满足 $f_n \rightarrow f (L^{p_\theta}(S_0; X))$, 则对 f_n 同作前述分解知 $f_n^j \rightarrow f^j (L^{p_j}(S_0; X))$, 进而在 $L^{q_j}(S_1; Y)$ 的意义下有

$$\tilde{T}f^j = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{T}f_n^j = \lim_{n \rightarrow \infty} Tf_n^j = Tf^j.$$

故

$$\tilde{T}f = \tilde{T}f^0 + \tilde{T}f^1 = Tf^0 + Tf^1 = Tf.$$

□

13.2.3 Marcinkiewicz 插值定理

在特定的应用情形中, 算子的 L^2 有界性通常是 (利用 Fourier 方法等) 已经证毕的. 为得到算子的 $L^p (1 < p < 2)$ 有界性, 一个思路是证明算子的 L^1 有界性, 再用 Riesz-Thorin 插值定理得到结果. 然而实际上经常会出现的情况是 L^2 有界算子没法进一步成为 L^1 有界算子, 因此这个思路大部分情况下是不适用的. Marcinkiewicz 插值定理处理的就是这种情况, 它表明实际上我们不需要得到 L^1 处的端点有界性估计, 而只需证明算子关于 $L^{1,\infty}$ 范数的 (更弱的) 有界性, 即弱 $(1,1)$ 型有界性. 另外, 不同于 Riesz-Thorin 插值只对线性算子有效, Marcinkiewicz 插值定理对次线性算子同样有效, 而 Hardy-Littlewood 极大算子正是后者.

对于强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 与 $p \in [1, \infty)$, 考虑下述广义实数:

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)} := \sup_{r>0} r(\mu(\|f\|_X > r))^{1/p}.$$

进而可以定义空间 $L^{p,\infty}(S;X)$ 为:

$$L^{p,\infty}(S;X) := \{f: S \rightarrow X \text{ 强 } \mu\text{-可测} : \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)} < \infty\}.$$

和经典理论相同, 这里称 $L^{p,\infty}(S;X)$ 为弱 $L^p(S;X)$. 由 $r^p \mathbf{1}_{\{\|f\|_X > r\}} \leq \|f\|_X^p$ 立得 $L^p(S;X) \subset L^{p,\infty}(S;X)$, 且对全体 $f \in L^p(S;X)$ 均有

$$\|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)} \leq \|f\|_{L^p(S;X)}.$$

回忆 $L^0(S;X)$ 是全体强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ (的等价类) 构成的线性空间. 现设 $(S_0, \mathcal{A}_0, \mu_0), (S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 是测度空间, 称定义在 $L^0(S_0;X)$ 某线性子空间 E 上, 在 $L^0(S_1;Y)$ 中取值的映射 T 是次线性的, 如果对全体 $f \in E$ 与 $c \in \mathbb{K}$ 均有

$$\|T(cf)\|_Y = |c| \|T(f)\|_Y, \text{ a.e.,}$$

且对全体 $f, g \in E$ 均有

$$\|T(f+g)\|_Y \leq \|T(f)\|_Y + \|T(g)\|_Y, \text{ a.e..}$$

定理 13.13 (Marcinkiewicz)

设 X, Y 是 Banach 空间, $0 < p_0 < p_1 \leq \infty$, $(S_0, \mathcal{A}_0, \mu_0), (S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 是测度空间, $T: L^{p_0}(S_0;X) + L^{p_1}(S_0;X) \rightarrow L^0(S_1;Y)$ 是满足下式的次线性算子:

$$\|Tf\|_{L^{p_j,\infty}(S_1;Y)} \leq A_j \|f\|_{L^{p_j}(S_0;X)}, \quad \forall f \in L^{p_j}(S_0;X), \quad j = 0, 1,$$

其中 $L^{\infty,\infty} := L^\infty$. 对全体 $\theta \in (0, 1)$, 记 $p_\theta \in (p_0, p_1)$ 为

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}.$$

则有下列估计成立:

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^{p_\theta}(S_1;Y)} &\leq c(\theta, p_0, p_1) \left(\frac{A_0}{1-\theta} \right)^{1-\theta} \left(\frac{A_1}{\theta} \right)^\theta \|f\|_{L^{p_\theta}}, \\ \|Tf\|_{L^{p_\theta,\infty}(S_1;Y)} &\leq c(\theta, p_0, p_1) \left(\frac{A_0}{1-\theta} \right)^{1-\theta} \left(\frac{A_1}{\theta} \right)^\theta \|f\|_{L^{p_\theta,\infty}(S_0;X)}, \end{aligned} \quad (13.43)$$

其中

$$c(\theta, p_0, p_1) = \left\{ \left(\frac{\Gamma(p_\theta - p_0 + 1) \Gamma(p_0 + 1)}{\Gamma(p_\theta)} \right)^{\frac{p_1 - p_\theta}{p_1 - p_0}} p_1^{\frac{p_\theta - p_0}{p_1 - p_0}} \frac{p_1 - p_0}{(p_1 - p_\theta)(p_\theta - p_0)} \right\}^{\frac{1}{p_\theta}}$$

且

$$c(\theta, p_0, \infty) = \left\{ \frac{\Gamma(p_\theta - p_0) \Gamma(p_0 + 1)}{\Gamma(p_\theta)} \right\}^{\frac{1}{p_\theta}}.$$

大多数实际应用情形下, 用到 Marcinkiewicz 插值定理时用的都是下述推论:

推论 13.7 ($p_0 = 1, p_1 = \infty$ 时的 Marcinkiewicz 插值定理)

设 X, Y 是 Banach 空间, $(S_0, \mathcal{A}_0, \mu_0), (S_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 是测度空间, $T: L^1(S_0;X) + L^\infty(S_0;X) \rightarrow L^0(S_1;Y)$ 作为次线性算子满足

$$\|Tf\|_{L^{p,\infty}(S_1;Y)} \leq B_p \|f\|_{L^p(S_0;X)}, \quad \forall f \in L^p(S_0;X), \quad p = 1, \infty,$$

其中 $L^{\infty,\infty} := L^\infty$, 则对全体 $p \in (1, \infty)$ 均有下述估计成立:

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^p(S_1;Y)} &\leq p' B_1^{1/p} B_\infty^{1/p'} \|f\|_{L^p(S_0;X)}, \\ \|Tf\|_{L^{p,\infty}(S_1;Y)} &\leq p' B_1^{1/p} B_\infty^{1/p'} \|f\|_{L^{p,\infty}(S_0;X)}. \end{aligned}$$

注 实际上上述不等式中的常数 p' 是最优的, 不过这件事我们留到下一章证明.

下面首先证明推论13.7.

证明 因为推论13.7只是定理13.13在 $p_0 = 1, p_1 = \infty$ 时的情形, 故由 $p = p_\theta$ 立得 $\theta = 1/p'$, 于是

$$\left(\frac{1}{1-\theta}\right)^{1-p} \left(\frac{1}{\theta}\right)^\theta = p^{1/p} (p')^{1/p'},$$

且

$$c(1/p', 1, \infty) = \left(\frac{1}{p-1}\right)^{1/p}.$$

故

$$c(1/p', 1, \infty) \left(\frac{B_0}{1-\theta}\right)^{1-\theta} \left(\frac{B_1}{\theta}\right)^\theta = p' B_1^{1/p} B_\infty^{1/p'}.$$

□

回到定理13.13, 我们需要预备下述分解引理:

引理 13.14

设 $f \in L^p(S; X)$ 或 $f \in L^{p,\infty}(S; X)$, $\lambda > 0$, 考虑分解

$$f = \tilde{f}^\lambda + \tilde{f}_\lambda,$$

其中

$$\begin{aligned}\tilde{f}^\lambda &:= \left(f - \lambda \frac{f}{\|f(\cdot)\|_X}\right) \cdot \mathbf{1}_{\{\|f(\cdot)\|_X > \lambda\}}, \\ \tilde{f}_\lambda &:= f \cdot \mathbf{1}_{\{\|f(\cdot)\|_X \leq \lambda\}} + \lambda \frac{f}{\|f(\cdot)\|_X} \cdot \mathbf{1}_{\{\|f(\cdot)\|_X > \lambda\}}.\end{aligned}$$

则对 $0 < p_0 < p < p_1 < \infty$ 而言, $\tilde{f}^\lambda, \tilde{f}_\lambda$ 满足

$$\begin{aligned}\int_0^\infty p\lambda^{p-p_0-1} \|\tilde{f}^\lambda\|_{L^{p_0}(S;X)}^{p_0} d\lambda &= \frac{\Gamma(p_0+1)\Gamma(p-p_0)}{\Gamma(p)} \|f\|_{L^p(S;X)}^p, \\ \int_0^\infty p\lambda^{p-p_1-1} \|\tilde{f}_\lambda\|_{L^{p_1}(S;X)}^{p_1} d\lambda &= \frac{p_1}{p_1-p} \|f\|_{L^p(S;X)}^p.\end{aligned}\tag{13.44}$$

同时

$$\begin{aligned}\|\tilde{f}^\lambda\|_{L^{p_0}(S;X)}^{p_0} &\leq \frac{\Gamma(p_0+1)\Gamma(p-p_0)}{\Gamma(p)} \lambda^{p_0-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p, \\ \|\tilde{f}_\lambda\|_{L^{p_1}(S;X)}^{p_1} &\leq \frac{p_1}{p_1-p} \lambda^{p_1-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p,\end{aligned}\tag{13.45}$$

另有 $\|\tilde{f}_\lambda\|_{L^\infty(S;X)} \leq \lambda$.

♡

注 注意虽说(13.44)谈的是强型空间中的等式, 而(13.45)谈的是弱型空间中的估计, 但这两个结果右端对应的常数是相等的. 其中包含 Γ 函数的分式是经由下式得到的:

$$\int_0^1 u^{\alpha-1} (1-u)^{\beta-1} du = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{(1+u)^{\alpha+\beta}} du, \quad \alpha, \beta > 0.$$

如果读者并不对引理结果右端的特殊常数形式感兴趣, 在定理13.13的证明中直接依高度分解:

$$f = f^\lambda + f_\lambda, \quad f^\lambda = f \cdot \mathbf{1}_{\{\|f(\cdot)\|_X > \lambda\}}, \quad f_\lambda = f \cdot \mathbf{1}_{\{\|f(\cdot)\|_X \leq \lambda\}}$$

也是可以的.

下面证明引理13.14.

证明 对于(13.44)的第一个等式, 知

$$\begin{aligned}\int_0^\infty p\lambda^{p-p_0-1} \|\tilde{f}^\lambda\|_{L^{p_0}(S;X)}^{p_0} d\lambda &= \int_0^\infty p\lambda^{p-p_0-1} \int_S (\|f(\cdot)\|_X - \lambda)_+^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= \int_S \int_0^{\|f(\cdot)\|_X} p\lambda^{p-p_0-1} (\|f(\cdot)\|_X - \lambda)^{p_0} d\lambda d\mu\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= p \|f\|_{L^p(S;X)}^p \int_0^1 u^{p-p_0-1} (1-u)^{p_0} du \\
&= p \|f\|_{L^p(S;X)}^p \frac{\Gamma(p-p_0)\Gamma(p_0+1)}{\Gamma(p+1)},
\end{aligned}$$

由 $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$ 即得待证式. 对于(13.44)第二个等式知¹⁹

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty p \lambda^{p-p_1-1} \|\tilde{f}_\lambda\|_{L^{p_1}(S;X)}^{p_1} d\lambda &= \int_0^\infty p \lambda^{p-p_1-1} \int_S (\|f(\cdot)\|_X \wedge \lambda)^{p_1} d\mu d\lambda \\
&= \int_S \left(\int_0^{\|f(\cdot)\|_X} p \lambda^{p-1} d\lambda + \int_{\|f(\cdot)\|_X}^\infty p \lambda^{p-p_1-1} \|f(\cdot)\|_X^{p_1} d\lambda \right) d\mu \\
&= \|f\|_{L^p(S;X)}^p \left(1 + \frac{p}{p_1-p} \right) = \|f\|_{L^p(S;X)}^p \frac{p_1}{p_1-p}.
\end{aligned}$$

针对弱型不等式(13.45), 知

$$\begin{aligned}
\|\tilde{f}^\lambda\|_{L^{p_0}(S;X)}^{p_0} &= \int_S (\|f(\cdot)\|_X - \lambda)_+^{p_0} d\mu = \int_0^\infty p_0 t^{p_0-1} \mu(\|f(\cdot)\|_X > \lambda + t) dt \\
&\leq \int_0^\infty \frac{p_0 t^{p_0-1}}{(\lambda + t)^p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p dt = \int_0^\infty \frac{p_0 u^{p_0-1}}{(1+u)^p} du \cdot \lambda^{p_0-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p \\
&= p_0 \frac{\Gamma(p_0)\Gamma(p-p_0)}{\Gamma(p)} \lambda^{p_0-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p \\
&= \frac{\Gamma(p_0+1)\Gamma(p-p_0)}{\Gamma(p)} \lambda^{p_0-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p,
\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}
\|\tilde{f}_\lambda\|_{L^{p_1}(S;X)}^{p_1} &= \int_S (\|f(\cdot)\|_X \wedge \lambda)^{p_1} d\mu = \int_0^\infty p_1 t^{p_1-1} \mu(\|f(\cdot)\|_X \wedge \lambda > t) dt \\
&= \int_0^\lambda p_1 t^{p_1-1} \mu(\|f(\cdot)\|_X > t) dt \leq \int_0^\lambda p_1 t^{p_1-p-1} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p dt \\
&= \frac{p_1}{p_1-p} \lambda^{p_1-p} \|f\|_{L^{p,\infty}(S;X)}^p.
\end{aligned}$$

由 $\tilde{f}_\lambda$ 的构造立得 $\|\tilde{f}_\lambda\|_{L^\infty(S;X)}$ 的估计. □

现在我们可以着手证明 Marcinkiewicz 插值定理了.

证明 设 $\alpha > 0$ 为待定系数, 简记 $p = p_\theta$. 对 $f \in L^p(S_0; X)$ 或 $L^{p,\infty}(S_0; X)$ 而言, 取 $\lambda > 0$, 考虑引理13.14引入的分解

$$f = \tilde{f}^{\alpha\lambda} + \tilde{f}_{\alpha\lambda}.$$

另取待定正数 θ_0, θ_1 满足 $\theta_0 + \theta_1 = 1$, 则对高度集 $\{\|Tf(\cdot)\|_Y > \lambda\}$ 有下述估计成立:

$$\mu_1(\|Tf(\cdot)\|_Y > \lambda) \leq \mu_1(\|T\tilde{f}^{\alpha\lambda}\|_Y > \theta_0\lambda) + \mu_1(\|T\tilde{f}_{\alpha\lambda}\|_Y > \theta_1\lambda).$$

接下来分 p_1 取值的两种情形进行讨论.

$p_1 < \infty$ 的情形.

针对强型不等式, 知

$$\begin{aligned}
\|Tf\|_{L^p(S_1;Y)}^p &= \int_0^\infty p \lambda^p \mu_1(\|Tf\|_Y > \lambda) \frac{d\lambda}{\lambda} \\
&\leq p \int_0^\infty \lambda^p [\mu_1(\|T\tilde{f}^{\alpha\lambda}(\cdot)\|_Y > \theta_0\lambda) + \mu_1(\|T\tilde{f}_{\alpha\lambda}(\cdot)\|_Y > \theta_1\lambda)] \frac{d\lambda}{\lambda} \\
&\leq p \int_0^\infty \lambda^p \left[\left(\frac{A_0}{\theta_0\lambda} \right)^{p_0} \|\tilde{f}^{\alpha\lambda}\|_{L^{p_0}(S_0;X)}^{p_0} + \left(\frac{A_1}{\theta_1\lambda} \right)^{p_1} \|\tilde{f}_{\alpha\lambda}\|_{L^{p_1}(S_0;X)}^{p_1} \right] \frac{d\lambda}{\lambda} \\
&= \left[\left(\frac{A_0}{\theta_0} \right)^{p_0} \alpha^{p_0-p} \frac{\Gamma(p-p_0)\Gamma(p_0+1)}{\Gamma(p)} + \left(\frac{A_1}{\theta_1\lambda} \frac{\alpha^{p_1-p} p_1}{p_1-p} \right) \right] \|f\|_{L^p(S_0;X)}^p,
\end{aligned}$$

¹⁹回忆 $a \wedge b = \min\{a, b\}$.

其中最后一步是 scaling 后应用(13.44)式. 类似对于 $p_1 < \infty$ 的弱型不等式有:

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^{p,\infty}(S_1;Y)}^p &= \sup_{\lambda>0} \lambda^p \mu_1(\|Tf(\cdot)\|_Y > \lambda) \\ &\leq \sup_{\lambda>0} \lambda^p [\mu_1(\|T\tilde{f}^{\alpha\lambda}\|_Y > \theta_0\lambda) + \mu_1(\|T\tilde{f}_{\alpha\lambda}(\cdot)\|_Y > \theta_1\lambda)] \\ &\leq \sup_{\lambda>0} \lambda^p \left[\left(\frac{A_0}{\theta_0\lambda}\right)^{p_0} \|\tilde{f}^{\alpha\lambda}\|_{L^{p_0}(S_0;X)}^{p_0} + \left(\frac{A_1}{\theta_1\lambda}\right)^{p_1} \|\tilde{f}_{\alpha\lambda}\|_{L^{p_1}(S_0;X)}^{p_1} \right] \\ &\leq \left[\left(\frac{A_0}{\theta_0}\right)^{p_0} \alpha^{p_0-p} \frac{\Gamma(p-p_0)\Gamma(p_0+1)}{\Gamma(p)} + \left(\frac{A_1}{\theta_1}\right)^{p_1} \frac{\alpha^{p_1-p} p_1}{p_1-p} \right] \|f\|_{L^{p,\infty}(S_0;X)}^p, \end{aligned}$$

其中最后一步源自(13.45)式. 最后通过调整 $\alpha > 0$ 使得右式系数最小可知应有

$$\alpha = \left(\frac{\Gamma(p-p_0+1)\Gamma(p_0+1)}{p_1\Gamma(p)} \right)^{1/(p_1-p_0)} \left(\frac{A_0}{\theta_0} \right)^{p_0/(p_1-p_0)} \left(\frac{A_1}{\theta_1} \right)^{-p_1/(p_1-p_0)},$$

取 $\theta_0 = 1 - \theta, \theta_1 = \theta$ 即得待证结果.

$p_1 = \infty$ 的情形.

$p_1 = \infty$ 时, 取 $\alpha = \theta_1/A_1$, 则 $\|\tilde{f}_{\alpha\lambda}\|_{L^\infty(S_0;X)} \leq \alpha\lambda = \lambda\theta_1/A_1$, 于是 $\|T\tilde{f}_{\alpha\lambda}\|_{L^\infty(S_1;Y)} \leq A_1\|\tilde{f}_{\alpha\lambda}\|_{L^\infty(S_0;X)} \leq \theta_1\lambda$, 从而此时包含 $\mu_1(\|T\tilde{f}_{\alpha\lambda}(\cdot)\|_Y > \theta_1\lambda) = 0$ 的计算都可以省掉了. 重复 $p_1 < \infty$ 时的计算知

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^p(S_1;Y)}^p &\leq \left(\frac{A_0}{\theta_0}\right)^{p_0} \alpha^{p_0-p} \frac{\Gamma(p-p_0)\Gamma(p_0+1)}{\Gamma(p)} \|f\|_{L^p(S_0;X)}^p \\ &\leq \left(\frac{A_0}{\theta_0}\right)^{p_0} \left(\frac{A_1}{\theta_1}\right)^{p-p_0} \frac{\Gamma(p-p_0)\Gamma(p_0+1)}{\Gamma(p)} \|f\|_{L^p(S_0;X)}^p, \end{aligned}$$

把上述过程中的 L^p 范数换成 $L^{p,\infty}$ 范数得到的结果也是一样的. 同样取 $\theta_0 = 1 - \theta, \theta_1 = \theta$ 即得待证结果. $\square$

13.2.4 $L^p(S; X)$ 的复插值

例13.5已经表明对任意测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 与任意指数对 $1 \leq p_0, p_1 \leq \infty$ 而言, 空间对 $(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))$ 都可以表为 (嵌入测度空间 $L^0(S; X_0 + X_1)$ 的) 插值对, 进而我们可以讨论该空间对的复插值.

定理 13.14 ($L^p(S; X)$ 的复插值)

设 $1 \leq p_0 \leq p_1 < \infty$ 或 $1 \leq p_0 < p_1 = \infty, 0 < \theta < 1$, 则对任意复 Banach 空间插值对 (X_0, X_1) 与任意测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 而言, 均有下述等距同构成立:

$$[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta = L^{p_\theta}(S; [X_0, X_1]_\theta),$$

其中 $1/p_\theta = (1 - \theta)/p_0 + \theta/p_1$.

上述结果的证明需要预备下述逼近结果:

引理 13.15

记 $\Sigma(X_0, X_1)$ 为全体 μ -简单函数 $f: S \rightarrow X_0 \cap X_1$ 构成的复线性空间, 则在定理13.14的条件下 $\Sigma(X_0, X_1)$ 同时在 $L^{p_\theta}(S; [X_0, X_1]_\theta)$ 与 $[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta$ 中稠密.

证明 推论13.3已经表明 $X_0 \cap X_1$ 在 $[X_0, X_1]_\theta$ 中稠密, 故 $\Sigma(X_0, X_1)$ 在全体 μ -简单函数 $f: S \rightarrow [X_0, X_1]_\theta$ 构成的复线性空间中稠密, 后者又依引理12.5在 $L^{p_\theta}(S; [X_0, X_1]_\theta)$ 中稠密, 至此立得第一条结论.

针对第二条结论, 由推论13.3已知 $L^{p_0}(S; X_0) \cap L^{p_1}(S; X_1)$ 在 $[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta$ 中稠密, 故只需对取定的 $f \in L^{p_0}(S; X_0) \cap L^{p_1}(S; X_1)$ 与 $\varepsilon > 0$ 找到 $g \in \Sigma(X_0, X_1)$ 使得

$$\|f - g\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} < \varepsilon$$

即可. 为此首先注意到只要简单函数列 $\{\mathbf{1}_{S_n}\}_n$ 满足在 $\{f \neq 0\}$ 上 $\mathbf{1}_{S_n} \uparrow \mathbf{1}$ μ -a.e., 则由(13.4)知

$$\|f - \mathbf{1}_{S_n} f\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} \leq \|f - \mathbf{1}_{S_n} f\|_{L^{p_0}(S; X_0)}^{1-\theta} \|f - \mathbf{1}_{S_n} f\|_{L^{p_1}(S; X_1)}^\theta$$

$$\leq \|f - \mathbf{1}_{S_n} f\|_{L^{p_0}(S; X_0)}^{1-\theta} \|f\|_{L^{p_1}(S; X_1)}^\theta \rightarrow 0,$$

其中最后一步用到了 $p_0 < \infty$ 与 $\mathbf{1}_{S_n} \uparrow \mathbf{1}$ μ -a.e.. 注意上述结果表明我们进一步只需讨论 $\mathbf{1}_{S_n} f$, 于是只要取 $S_n := \{\|f(\cdot)\|_{X_0} \geq 1/n\}$, 就能设 f 支在某个有限测度集 S' 上. 容易验证此时

$$\|f\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} = \|f\|_{[L^{p_0}(S'; X_0), L^{p_1}(S'; X_1)]_\theta}.$$

因为已经设了 $f \in L^{p_0}(S; X_0) \cap L^{p_1}(S; X_1)$, 故 f 在 S' 上 a.e. 在 $X_0 \cap X_1$ 中取值, 下面说明 f 实际上作为在 $X_0 \cap X_1$ 中取值的函数强 μ -可测. 注意到 $X_0^* + X_1^*$ 可用于逼近 $X_0 \cap X_1$ 的范数²⁰, 且对每个 $x^* \in X_0^* + X_1^*$ 而言函数 $\langle f, x^* \rangle_{X_0 \cap X_1 \times (X_0^* + X_1^*)} : S \rightarrow \mathbb{K}$ 均 μ -可测. 因为 f 在 X_0, X_1 中均强 μ -可测, 故由 Pettis 可测定理 12.3 知存在可分子空间 $X'_0 \subset X_0$ 与 $X'_1 \subset X_1$ 使得 f μ -a.e. 在 X'_0, X'_1 中取值, 进而 f μ -a.e. 在 $X'_0 \cap X'_1$ 中取值. 至此为应用 Pettis 可测定理 12.3 说明 f 在 $X_0 \cap X_1$ 上的强 μ -可测性, 只需说明 $X'_0 \cap X'_1$ 在 $X_0 \cap X_1$ 中可分即可. 事实上, 设 X'_0, X'_1 分别能被半径为 $\delta > 0$ 的可数球族 $\{B_{0,i}\}, \{B_{1,j}\}$ 覆盖, 则集族 $B_{ij} := B_{0,i} \cap B_{1,j}$ 可覆盖 $X'_0 \cap X'_1$, 同时每个 B_{ij} 都能被某个球心在 $X_0 \cap X_1$ 中, 半径为 2δ 的开球包含. 这便选出了 $X'_0 \cap X'_1$ 的可数 2δ -网, 由 $\delta > 0$ 的任意性即得 $X'_0 \cap X'_1$ 确实在 $X_0 \cap X_1$ 中可分.

现在既然 f 作为在 $X_0 \cap X_1$ 中取值的函数已经强 μ -可测了, 由强 μ -可测的定义即知存在可数值函数 $g : S' \rightarrow X_0 \cap X_1, s \mapsto g(s) := \sum_{k \geq 1} \mathbf{1}_{B_k(s)} x_k$ 满足

$$\|f - g\|_{L^\infty(S'; X_0 \cap X_1)} < \varepsilon,$$

其中 $B_k \subset S'$ 两两不交. 记 $C_k := \bigcup_{j=1}^k B_k$, 则 $\mathbf{1}_{C_k} g$ 是 μ -简单函数, 进而 $\mathbf{1}_{C_k} g \in \Sigma(X_0, X_1)$, 于是由 (13.4) 可知

$$\|f - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} \leq \|f - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{L^{p_0}(S'; X_0)}^{1-\theta} \|f - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{L^{p_1}(S'; X_1)}^\theta.$$

当 k 足够大时知

$$\begin{aligned} \|f - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{L^{p_0}(S'; X_0)} &\leq \|f - g\|_{L^{p_0}(S'; X_0)} + \|g - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{L^{p_0}(S'; X_0)} \\ &\leq \mu(S')^{1/p_0} \|f - g\|_{L^\infty(S'; X_0 \cap X_1)} + \varepsilon \\ &\leq \varepsilon(\mu(S')^{1/p_0} + 1). \end{aligned}$$

同时

$$\begin{aligned} \|f - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} &\leq \|f\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} + \|g\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} \\ &\leq 2\|f\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} + \|g - f\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} \\ &\leq 2\|f\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} + \varepsilon \mu(S')^{1/p_1}. \end{aligned}$$

结合前述估计即知对足够大的 k 有

$$\|f - \mathbf{1}_{C_k} g\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} \leq \varepsilon^{1-\theta} (\mu(S')^{1/p_0} + 1)^{1-\theta} (2\|f\|_{L^{p_1}(S'; X_1)} + \varepsilon \mu(S')^{1/p_1})^\theta,$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即得待证结论. $\square$

现在可以证明定理 13.14 了.

证明 简记 $p = p_\theta$. 由引理 13.15 知只需对 $f \in \Sigma(X_0, X_1)$ 证明下述范数等式即可:

$$\|f\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} = \|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}. \quad (13.46)$$

现取定非零的 $f \in \Sigma(X_0, X_1)$, 不妨设 $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 其中 $A_n \subset S$ 可测且两两不交, $x_n \in X_0 \cap X_1$. 下面首先证明 (13.46) 的 $\leq$ 关系. 任取 $\varepsilon > 0$, 对 $1 \leq n \leq N$ 取函数 $h_n \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 满足 $h_n(\theta) = x_n$, 且

$$\|h_n\|_{\mathcal{H}(X_0, X_1)} \leq (1 + \varepsilon) \|x_n\|_{[X_0, X_1]_\theta}.$$

考虑 μ -简单函数 $g : S \rightarrow \mathcal{H}(X_0, X_1), s \mapsto g(s) := \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n}(s) \otimes h_n$, 定义连续函数 $F : \overline{\mathbb{S}} \rightarrow L^{p_0}(S; X_0) +$

²⁰这是因为对任取的 $x \in X_0 \cap X_1$, 根据定义知 $\|x\|_{X_0 \cap X_1} = \max(\|x\|_{X_0}, \|x\|_{X_1})$, 而该式右端相当于在 $\sup_{x^* \in X_0^*} |\langle x, x^* \rangle_{X_0 \times X_0^*}| / \|x^*\|_{X_0^*}$ 和 $\sup_{x^* \in X_1^*} |\langle x, x^* \rangle_{X_1 \times X_1^*}| / \|x^*\|_{X_1^*}$ 中取最大值, 于是 x^* 可以统一在 $X_0^* + X_1^*$ 中取值.

$L^{p_1}(S; X_1)$ 为:

$$(F(z))(s) := (g(s))(z) \left[\frac{\|f(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}}{\|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}} \right]^{p\left(\frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_1}\right)(\theta - z)}, \quad s \in S.$$

由 $g(s)$ 在 $\mathbb{S}$ 上全纯可知 F 同样在 $\mathbb{S}$ 上全纯, 且 $F(\theta) = f(\theta)$. 进一步由 $g(s) \in \mathcal{H}(X_0, X_1)$ 知 $v \mapsto F(iv), v \mapsto F(1 + iv)$ 分别是在 $L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)$ 中取值的连续函数. 注意到

$$\theta p p_0 \left(\frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_1} \right) = -p p_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p_0} \right) = p - p_0,$$

于是

$$\begin{aligned} \|F(iv)\|_{L^{p_0}(S; X_0)}^{p_0} &= \int_S \left\| (g(s))(iv) \left[\frac{\|f(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}}{\|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}} \right]^{p\left(\frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_1}\right)(\theta - iv)} \right\|_{X_0}^{p_0} d\mu(s) \\ &= \sum_{n=1}^N \int_{A_n} \|h_n(iv)\|_{X_0}^{p_0} \frac{\|f(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}^{p-p_0}}{\|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}^{p-p_0}} d\mu(s) \\ &\leq (1 + \varepsilon)^{p_0} \sum_{n=1}^N \|x_n\|_{[X_0, X_1]_\theta}^{p_0} \int_{A_n} \frac{\|f(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}^{p-p_0}}{\|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}^{p-p_0}} d\mu(s) \\ &= (1 + \varepsilon)^{p_0} \int_S \|f(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}^{p_0} \frac{\|f(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}^{p-p_0}}{\|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}^{p-p_0}} d\mu(s) \\ &= (1 + \varepsilon)^{p_0} \|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}^{p_0}. \end{aligned}$$

类似可得

$$\|F(1 + iv)\|_{L^{p_1}(S; X_1)} \leq (1 + \varepsilon) \|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}.$$

故 $F \in \mathcal{H}(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))$, 因此 $f \in [L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta$, 且

$$\|f\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta} \leq \|F\|_{\mathcal{H}(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))} \leq (1 + \varepsilon) \|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)}.$$

针对(13.46)的 $\geq$ 关系, 再取 $f \in \Sigma(X_0, X_1)$, 取函数 $F \in \mathcal{H}(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))$ 满足 $F(\theta) = f$. 由引理 13.7, Hölder 不等式 (配凑指标 $1/p = (1 - \theta)/p_0 + \theta/p_1$), Jensen 不等式与(13.18)知

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)} &\leq \left[\int_S \|(F(\theta))(s)\|_{[X_0, X_1]_\theta}^p d\mu(s) \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\int_S \left[\frac{1}{1 - \theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|(F(it))(s)\|_{X_0} P_0(\theta; t) dt \right]^{(1-\theta)p} \left[\frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|(F(1 + it))(s)\|_{X_1} P_1(\theta; t) dt \right]^{\theta p} d\mu(s) \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\int_S \left[\frac{1}{1 - \theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|(F(it))(s)\|_{X_0} P_0(\theta; t) dt \right]^{p_0} d\mu(s) \right]^{(1-\theta)/p_0} \\ &\quad \times \left[\int_S \left[\frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|(F(1 + it))(s)\|_{X_1} P_1(\theta; t) dt \right]^{p_1} d\mu(s) \right]^{\theta/p_1} \\ &\leq \left[\int_S \frac{1}{1 - \theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|(F(it))(s)\|_{X_0}^{p_0} P_0(\theta; t) dt d\mu(s) \right]^{(1-\theta)/p_0} \\ &\quad \times \left[\int_S \frac{1}{\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \|(F(1 + it))(s)\|_{X_1}^{p_1} P_1(\theta; t) dt d\mu(s) \right]^{\theta/p_1} \\ &\leq \sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(iv)\|_{L^{p_0}(S; X_0)}^{1-\theta} \cdot \sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(1 + iv)\|_{L^{p_1}(S; X_1)}^\theta \\ &\leq \max \left\{ \sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(iv)\|_{L^{p_0}(S; X_0)}, \sup_{v \in \mathbb{R}} \|F(1 + iv)\|_{L^{p_1}(S; X_1)} \right\} \\ &\leq \|F\|_{\mathcal{H}(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))}. \end{aligned}$$

对上式两端同时在全体容许的 F 中取下确界即得

$$\|f\|_{L^p(S; [X_0, X_1]_\theta)} \leq \|f\|_{[L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)]_\theta}.$$

至此即得待证结论. □

例 13.7

作为定理13.14的一个应用, 本例说明只要 $1 \leq p \leq 2$, 且 T 是 $L^p(S)$ 上的有界线性算子, 则对全体 $p \leq q \leq 2$ 而言, $T \otimes I_X (X = L^q(S))$ 都能有界延拓到 $L^p(S; X)$ 中. 这一结果进一步拓展了命题13.2.

首先, 根据命题13.2知 $T \otimes I_{L^p(S)}$ 能有界延拓到 $L^p(S; L^p(S))$ 上 (记延拓后的算子依旧是 $T \otimes I_{L^p(S)}$). 又由定理13.3知 $T \otimes I_{L^2(S)}$ 能有界延拓到 $L^p(S; L^2(S))$ 上 (记延拓后的算子依旧是 $T \otimes I_{L^2(S)}$), 于是对每个 $f = f_1 + f_2 \in L^p(S; L^p(S)) + L^p(S; L^2(S)) (f_1 \in L^p(S; L^p(S)), f_2 \in L^p(S; L^2(S)))$ 均能定义算子 $\tilde{T}$ 为

$$\tilde{T}f := (T \otimes I_{L^p(S)})(f_1) + (T \otimes I_{L^2(S)})(f_2).$$

只要 $p \neq 2$, $\tilde{T}$ 就是良定义的. 这是因为若另取 $f = f'_1 + f'_2 (f'_1 \in L^p(S; L^p(S)), f'_2 \in L^p(S; L^2(S)))$, 则

$$L^p(S; L^p(S)) \ni f_1 - f'_1 = f'_2 - f_2 \in L^p(S; L^2(S)).$$

因此

$$(T \otimes I_{L^p(S)})(f_1 - f'_1) = (T \otimes I_{L^2(S)})(f_1 - f'_1) = (T \otimes I_{L^2(S)})(f'_2 - f_2),$$

故

$$(T \otimes I_{L^p(S)})(f_1) + (T \otimes I_{L^2(S)})(f_2) = (T \otimes I_{L^p(S)})(f'_1) + (T \otimes I_{L^2(S)})(f'_2).$$

现在对 $\tilde{T}$ 应用算子的复插值13.7知 $\tilde{T}$ 同样是 $[L^p(S; L^p(S)), L^p(S; L^2(S))]_\theta = L^p(S; L^q(S))$ 上的有界线性算子, 其中 $\theta \in (0, 1)$ 由 $1/q = (1 - \theta)/p + \theta/2$ 确定. 因为 $L^q(S) \hookrightarrow L^p(S) + L^2(S)$, 故 $T \otimes I_{L^q(S)}$ 在 $L^p(S; L^q(S))$ 上的延拓实际上就是 $\tilde{T}$, 此即待证结论. □

作为定理13.14的第二个应用, 下面我们给出 Clarkson 不等式的一个简洁的插值证明.

推论 13.8 (Clarkson 不等式)

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, 则:

(i) 对全体 $1 \leq p \leq 2$ 与 $f, g \in L^p(S)$ 均有

$$(\|f + g\|_{L^p(S)}^p + \|f - g\|_{L^p(S)}^p)^{1/p} \leq 2^{1/p} (\|f\|_{L^p(S)}^p + \|g\|_{L^p(S)}^p)^{1/p},$$

且

$$(\|f + g\|_{L^p(S)}^{p'} + \|f - g\|_{L^p(S)}^{p'})^{1/p'} \leq 2^{1/p'} (\|f\|_{L^p(S)}^p + \|g\|_{L^p(S)}^p)^{1/p}.$$

(ii) 对全体 $2 \leq p < \infty$ 与 $f, g \in L^p(S)$ 均有

$$(\|f + g\|_{L^p(S)}^p + \|f - g\|_{L^p(S)}^p)^{1/p} \leq 2^{1/p'} (\|f\|_{L^p(S)}^p + \|g\|_{L^p(S)}^p)^{1/p},$$

且

$$(\|f + g\|_{L^p(S)}^p + \|f - g\|_{L^p(S)}^p)^{1/p} \leq 2^{1/p} (\|f\|_{L^p(S)}^{p'} + \|g\|_{L^p(S)}^{p'})^{1/p'}.$$



证明 这里只证明 (i) 对应的两个不等式, (ii) 对应的不等式可以类似进行证明. 取 $1 \leq p \leq 2$, 在空间 $L^r(S) \oplus_r L^r(S) = l^r(\{1, 2\}; L^r(S))$ 上考虑下述算子:

$$T : (f, g) \mapsto (f + g, f - g).$$

一方面易证 $\|T\|_{l^1(\{1, 2\}; L^1(S)) \rightarrow l^1(\{1, 2\}; L^1(S))} = 2$, 另一方面由平行四边形等式知 $\|T\|_{l^2(\{1, 2\}; L^2(S)) \rightarrow l^2(\{1, 2\}; L^2(S))} = \sqrt{2}$. 现记 $1/p = (1 - \theta)/1 + \theta/2 = 1 - \theta/2$ (进而 $\theta = 2/p'$), 则由定理13.14与算子的复插值13.7知

$$\begin{aligned} \|T\|_{l^p(\{1, 2\}; L^p(S)) \rightarrow l^p(\{1, 2\}; L^p(S))} &= \|T\|_{[l^1(\{1, 2\}; L^1(S)), l^2(\{1, 2\}; L^2(S))]_\theta \rightarrow [l^1(\{1, 2\}; L^1(S)), l^2(\{1, 2\}; L^2(S))]_\theta} \\ &\leq 2^{1-2/p'} \cdot \sqrt{2}^{2/p'} = 2^{1-1/p'} = 2^{1/p}. \end{aligned}$$

此即 (i) 第一条不等式. 为证第二条不等式, 注意到

$$\|T(f, g)\|_{L^1(S) \oplus_\infty L^1(S)} = \max\{\|f + g\|_{L^1(S)}, \|f - g\|_{L^1(S)}\}$$

$$\leq \|f\|_{L^1(S)} + \|g\|_{L^1(S)} = \|(f, g)\|_{L^1(S) \otimes_1 L^1(S)}.$$

另显见 $L^1(S) \oplus_r L^1(S) = l^r(\{1, 2\}; L^1(S))$, $L^2(S) \oplus_2 L^2(S) = l^2(\{1, 2\}; L^2(S))$. 现在第二条不等式要求的是 $\|T\|_{l^p(\{1, 2\}; L^p(S)) \rightarrow l^{p'}(\{1, 2\}; L^p(S))}$, 一方面前述过程已经指出 $\theta = 2/p'$ 时有

$$l^p(\{1, 2\}; L^p(S)) = [l^1(\{1, 2\}; L^1(S)), l^2(\{1, 2\}; L^2(S))]_\theta.$$

另一方面

$$l^{p'}(\{1, 2\}; L^p(S)) = [l^\infty(\{1, 2\}; L^1(S)), l^2(\{1, 2\}; L^2(S))]_\theta,$$

于是由定理 13.14 知

$$\begin{aligned} \|T\|_{l^p(\{1, 2\}; L^p(S)) \rightarrow l^{p'}(\{1, 2\}; L^p(S))} &\leq \|T\|_{l^1(\{1, 2\}; L^1(S)) \rightarrow l^\infty(\{1, 2\}; L^1(S))}^{1-\theta} \|T\|_{l^2(\{1, 2\}; L^2(S)) \rightarrow l^2(\{1, 2\}; L^2(S))}^\theta \\ &\leq 1^{1-\theta} \sqrt{2}^\theta = 2^{1/p'}. \end{aligned}$$

此即 (i) 第二条不等式. □

实 Banach 空间的复化

很多情况下我们会希望在实 Banach 空间的背景下应用复插值, 比方说在实系数 PDE 理论中利用复插值刻画分数阶微分算子. 回忆推论 13.3 表明若 (Y_0, Y_1) 是复 Banach 空间插值对, 则 $Y_0 \cap Y_1$ 在 $[Y_0, Y_1]_\theta$ 中稠密, 据此可以给出下述自然定义.

现设 (X_0, X_1) 是实 Banach 空间插值对, Y_i 是 $X_i (i = 0, 1)$ 的复化空间 (注意该复化空间在等价范数意义下唯一), 则 X_0, X_1 的复插值空间定义为

$$[X_0, X_1]_\theta := \overline{X_0 \cap X_1}^{[Y_0, Y_1]_\theta}.$$

显见上述空间作为复 Banach 空间 $[Y_0, Y_1]_\theta$ 的实线性子空间可以成为实 Banach 空间. 例如我们有

$$[L^{p_0}(S; \mathbb{R}), L^{p_1}(S; \mathbb{R})]_\theta = L^{p_\theta}(S; \mathbb{R}),$$

其中 $1 \leq p_0, p_1 < \infty, 1/p_\theta = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$. 这是因为根据定义有

$$\begin{aligned} [L^{p_0}(S; \mathbb{R}), L^{p_1}(S; \mathbb{R})]_\theta &= \overline{L^{p_0}(S; \mathbb{R}) \cap L^{p_1}(S; \mathbb{R})}^{[L^{p_0}(S; \mathbb{C}), L^{p_1}(S; \mathbb{C})]_\theta} \\ &= \overline{L^{p_0}(S; \mathbb{R}) \cap L^{p_1}(S; \mathbb{R})}^{L^{p_\theta}(S; \mathbb{C})} \\ &= L^{p_\theta}(S; \mathbb{R}). \end{aligned}$$

13.2.5 $L^p(S; X)$ 的实插值

在处理完 $L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1)$ 之间的复插值后, 接下来我们考虑这类空间之间的实插值. 回忆对任意 Banach 空间插值对 (E_0, E_1) 均在等价范数意义下有:

$$(E_0, E_1)_{\theta, p} = (E_0, E_1)_{\theta, p_0, p_1},$$

其中 $(E_0, E_1)_{\theta, p}$ 是通常的实插值空间 (其中 $1/p := (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$), $(E_0, E_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 是经由第二均值法给出的插值空间 (参看定理 13.9). 后者能在下述结果中将同构映射变为等距映射:

定理 13.15 ($L^p(S; X)$ 的实插值)

设 $1 \leq p_0 < \infty, p_0 \leq p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1, 1/p_\theta := (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$, 则对任意 Banach 空间插值对 (X_0, X_1) 与任意测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 而言, 均有下述 Banach 空间自然等距同构成立:

$$(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))_{\theta, p_0, p_1} = L^{p_\theta}(S; (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}).$$

注 定理 13.15 的证明依赖于下述类似于引理 13.15 的结果, 该结果的证明基本上就是逐字逐句重复引理 13.15 的对应证明, 唯一不同的地方在于用 $\{\mathbf{1}_{S_n} f\}_n$ 逼近 f 时我们改用引理 13.11 的对数凸性结果与引理 13.12 的稠密性结果, 而非适用于复插值的对数凸性估计 (13.4).

引理 13.16

在定理 13.15 的条件下, 全体 μ -简单函数 $f: S \rightarrow X_0 \cap X_1$ 构成的空间在 $(L^{p_0}(S; X_0), L^{p_1}(S; X_1))_{\theta, p_0, p_1}$ 中稠密.



下面证明定理 13.15.

证明 简记 $p := p_\theta, Y_j := L^{p_j}(S; X_j) (j \in \{0, 1\})$. 回忆在 $X_0 \cap X_1$ 中取值的 μ -简单函数构成的空间同时 (依推论 13.5) 在 $L^p(S; (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1})$ 与 (依引理 13.16) $(Y_0, Y_1)_{\theta, p}$ 中稠密 ($p_0 < \infty$ 是在这里用到的). 因此利用 Cauchy 列论证可知只需对任意 μ -简单函数 $f: S \rightarrow X_0 \cap X_1$ 证明待证范数估计即可.

第一步: 证明 $\subset$ 关系.

回到 $(E_0, E_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 的定义 13.7, 对取定的 μ -简单函数 $f \in (Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 总存在强可测函数 $u: (0, \infty) \rightarrow Y_0 \cap Y_1$ 满足:

(i) $(t \mapsto t^{j-\theta} u(t)) \in L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; Y_j) (j \in \{0, 1\})$;

(ii) 在 $Y_0 + Y_1$ 的收敛意义下有 $f = \int_0^\infty u(t) \frac{dt}{t}$.

由命题 12.18 知²¹ 对 a.e. $\forall s \in S$ 均在 $X_0 + X_1$ 的意义下有 $f(s) = \int_0^\infty u(t, s) \frac{dt}{t}$, 其中 $u(t, s) := (u(t))(s)$. 进而由引理 13.11 知对 a.e. $\forall s \in S$ 有:

$$\|f(s)\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}} \leq \|t \mapsto t^{-\theta} u(t, s)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}^{1-\theta} \cdot \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t, s)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}^\theta.$$

于是由 (配凑指标为 $1/p = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$ 的) Hölder 不等式与 Fubini 定理知:

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^p(S; (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1})} &\leq \left(\int_S \|t \mapsto t^{-\theta} u(t, s)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}^{p_0} d\mu(s) \right)^{(1-\theta)/p_0} \\ &\quad \times \left(\int_S \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t, s)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}^{p_1} d\mu(s) \right)^{\theta/p_1} \\ &= \left(\int_0^\infty \int_S \|t \mapsto t^{-\theta} u(t, s)\|_{X_0}^{p_0} d\mu(s) \frac{dt}{t} \right)^{(1-\theta)/p_0} \\ &\quad \times \left(\int_0^\infty \int_S \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t, s)\|_{X_1}^{p_1} d\mu(s) \frac{dt}{t} \right)^{\theta/p_1} \\ &= \|t \mapsto t^{-\theta} u(t, \cdot)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; Y_0)}^{1-\theta} \|t \mapsto t^{1-\theta} u(t, \cdot)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; Y_1)}^\theta. \end{aligned}$$

上式两端同时在能表出 f 的全体容许的 u 中取下确界, 由引理 13.11 即得 $\subset$.

第二步: 证明 $\supset$ 关系.

不妨设 $f = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} \otimes x_n$, 其中不交集 $A_n \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(A_n) < \infty, x_n \in X_0 \cap X_1$ 均为非零元. 取定 $\varepsilon > 0$, 由定义 13.7 知对每个 $x_n \in (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}$ 而言, 总能找到强可测函数 $u_n: (0, \infty) \rightarrow X_0 \cap X_1$ 满足在 $X_0 + X_1$ 意义下有 $x_n = \int_0^\infty u_n(t) \frac{dt}{t}$, 且

$$\|t^{j-\theta} u_n(t)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)} \leq (1+\varepsilon) \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}, \quad j \in \{0, 1\}.$$

记

$$v_n(t) := u_n(t) \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}^\nu,$$

其中 ν 是待定指标. 知

$$\int_0^\infty v_n(t) \frac{dt}{t} = \int_0^\infty u_n(t) \frac{dt}{t} = x_n,$$

于是利用代换 $\tau = t \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}^\nu (j \in \{0, 1\})$ 知

$$\|t \mapsto t^{j-\theta} v_n(t)\|_{L^{p_j}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_j)} = \left(\int_0^\infty t^{(j-\theta)p_j} \|v_n(t)\|_{X_j}^{p_j} \frac{dt}{t} \right)^{1/p_j}$$

²¹ 25.8.22: 在具体证明这件事的时候我被绕晕了, 不过这件事看起来就肯定是对的. 主要是命题 12.18 是怎么用在这的? 它是只为了对关于 u 的 Bochner 积分 a.e. 点态赋值吗?

$$\begin{aligned}
&= \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}^{(\theta-j)\nu} \left(\int_0^\infty \tau^{(j-\theta)p_j} \|u_n(\tau)\|_{X_j}^{p_j} \frac{d\tau}{\tau} \right)^{1/p_j} \\
&\leq \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}^{(\theta-j)\nu} \times (1+\varepsilon) \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}} \\
&\leq (1+\varepsilon) \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}^{(\theta-j)\nu+1}.
\end{aligned}$$

处于配凑上的考虑, 需要让 $((\theta-j)\nu+1)p_j = p$, 解得 $\nu = p\left(\frac{1}{p_0} - \frac{1}{p_1}\right)$. 现由引理 13.11 知

$$\begin{aligned}
\|f\|_{(Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}} &= \left\| \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} x_n \right\|_{(Y_0, Y_1)_{\theta, p_0, p_1}} \\
&\leq \left\| t \mapsto t^{-\theta} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} v_n(t) \right\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; Y_0)}^{1-\theta} \\
&\quad \times \left\| t \mapsto t^{1-\theta} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{A_n} v_n(t) \right\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; Y_1)}^{\theta} \\
&= \left(\sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|t \mapsto t^{-\theta} v_n(t)\|_{L^{p_0}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_0)}^{p_0} \right)^{(1-\theta)/p_0} \\
&\quad \times \left(\sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|t \mapsto t^{1-\theta} v_n(t)\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}; X_1)}^{p_1} \right)^{\theta/p_1} \\
&\leq (1+\varepsilon) \left(\sum_{n=1}^N \mu(A_n) \|x_n\|_{(X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1}}^p \right)^{1/p} \\
&= (1+\varepsilon) \|f\|_{L^p(S; (X_0, X_1)_{\theta, p_0, p_1})}.
\end{aligned}$$

□

13.3 Hardy-Littlewood 极大算子

在经典的 (在欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 上进行的) 泛函分析理论中, Hardy-Littlewood 极大算子已经扮演了很重要的角色了. 虽说极大算子本身是次线性的, 但它实际上是研究线性算子的一个通用工具. 只要把极大算子定义中的绝对值换成范数, 就可以得到它在向量值函数语境下的定义了:

$$Mf(x) := \sup_{B \ni x} \int_B \|f(y)\|_X dy := \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B \|f(y)\|_X dy, \quad (13.47)$$

其中上确界在全体包含 x 的欧氏球中取, 记号 $\int$ 表示积分平均. 容易验证在相差常数倍的意义下, 用欧氏方体 (不论是任意方体还是诸边平行于坐标轴的方体) 仿照上式定义得到的极大算子和用欧氏球定义的极大算子等价. 同时, 上确界的范围也可以改成以 x 为球心 (或中心) 的全体欧氏球 (或欧氏方体), 这一变动只会导致 $Mf(x)$ 的取值多乘某个依赖于维数的常数.

根据定义显见

$$Mf(x) = M(\|f\|_X)(x), \quad \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} = \|\|f\|_X\|_{L^p(\mathbb{R}^d)},$$

于是 M 在 Bochner 空间 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 上的有界性可以从该算子在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上的有界性立即推出. 不过为了论述的完整性起见, 我们这里还是重新证一下有界性.

引理 13.17 (Vitali 覆盖引理)

设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有限球列, 则存在子列 $\mathcal{B}_0$ 满足每个 $B \in \mathcal{B}$ 都能包含在某个 $3B'$ 中, 其中 $B' \in \mathcal{B}_0$, $3B'$ 表示与 B' 同心, 半径三倍于 B' 半径的球.

♡

证明 对球列 $\mathcal{B}$ 包含球的个数 n 归纳. 若 $n=1$, 则取 $\mathcal{B}_0 = \mathcal{B}$ 立得结论. 现设结论对 n 成立, 记 $\mathcal{B}$ 是包含 $n+1$ 个球的集列, 设 B_0 是 $\mathcal{B}$ 中半径最小的 (某个) 球, 取 $\mathcal{B}' := \mathcal{B} \setminus \{B_0\}$. 根据归纳假设, 存在 $\mathcal{B}'$ 的子列 $\mathcal{B}'_0$ 满足每

个 $B \in \mathcal{B}'$ 均包含在某个 $3B'$ 中, 其中 $B' \in \mathcal{B}'_0$. 现在分两种情况进行讨论:

如果 B_0 和每个 $B' \in \mathcal{B}'_0$ 都不交, 则取 $\mathcal{B}_0 := \mathcal{B}'_0 \cup \{B_0\}$ 即得欲求子列. 否则考虑 B_0 与某个 $B' \in \mathcal{B}'_0$ 相交的情形, 根据 B_0 的取法知 B' 的半径不会小于 B_0 , 进而 $B_0 \subset 3B'$, 因此 $\mathcal{B}_0 := \mathcal{B}'_0$ 即为欲求子列. $\square$

若 $w \in L^0(\mathbb{R}^d)$ 是非负函数, 则记

$$L^p(\mathbb{R}^d, w; X) := L^p(\mathbb{R}^d, w(x)dx; X),$$

对 Borel 子集 $B \subset \mathbb{R}^d$ 而言, 进一步记

$$w(B) := \int_B w(x)dx.$$

定理 13.16 (Hardy-Littlewood 极大定理)

设 M 是依(13.47)定义的 Hardy-Littlewood 极大算子, $w \in L^0(\mathbb{R}^d)$ 是非负函数.

(i) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d, Mw; X)$, 则对全体 $t > 0$ 均有:

$$tw(\{Mf > t\}) = t \int_{\{Mf > t\}} w(y)dy \leq 3^d \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d, Mw; X)}.$$

(ii) 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d, Mw; X)$ ($1 < p \leq \infty$), 则:

$$\|Mf\|_{L^p(\mathbb{R}^d, w)} \leq 3^{d/p} p' \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d, Mw; X)}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

证明 首先证明 (i). 根据 M 的定义, 对每个 $x \in \{Mf > t\}$ 而言, 总存在 $B_x \ni x$ 使得 $f_B \|f\|_X > t$, 进而 $\bigcup_{x \in \{Mf > t\}} B_x$ 构成 $\{Mf > t\}$ 的一个开覆盖. 注意要证明 (i) 对应的不等式, 只需证明 $\{Mf > t\}$ 中的每个紧集均满足该不等式即可. 现任取紧集 $K \subset \{Mf > t\}$, 知 K 总能被 $\{B_x\}$ 中的有限子列 $\mathcal{B}$ 覆盖. 设 $\mathcal{B}_0$ 是 $\mathcal{B}$ 经由 Vitali 覆盖引理诱导的子列, 则

$$\begin{aligned} w(K) &\leq w\left(\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B\right) \leq w\left(\bigcup_{B \in \mathcal{B}_0} 3B\right) \\ &\leq \sum_{B \in \mathcal{B}_0} \frac{w(3B)}{|3B|} 3^d |B| \\ &\stackrel{(*)}{\leq} \sum_{B \in \mathcal{B}_0} \inf_{z \in B} Mw(z) \frac{3^d}{t} \int_B \|f(y)\|_X dy \\ &\leq \frac{3^d}{t} \sum_{B \in \mathcal{B}_0} \int_B \|f(y)\|_X Mw(y) dy \\ &\leq \frac{3^d}{t} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d, Mw; X)}, \end{aligned} \tag{13.48}$$

其中 (*) 是因为对全体 $z \in B$ 均有

$$Mw(z) = \sup_{B' \ni z} \frac{w(B')}{|B'|} \geq \frac{w(3B)}{|3B|}.$$

由(13.48)与 K 的任意性即知将 K 换成 $\{Mf > t\}$ 结果依旧成立.

接下来证明 (ii) 在 $p = \infty$ 时的情形. 若 $w(x) = 0$ 对 Lebesgue 意义下的 a.e. $x \in \mathbb{R}^d$ 均成立, 则待证式左式为 0, 此时结果无所可证. 若存在 Lebesgue 正测集使得在该集合内 $w(x) > 0$, 则根据 M 的定义即知对每个 x 均有²² $Mw(x) > 0$. 现在显见对每个 $x \in \mathbb{R}^d$ 均有

$$Mf(x) \leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)},$$

于是

$$\|Mf\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d, w; X)} \leq \|Mf\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} \leq \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} = \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d, Mw; X)}.$$

至此 (ii) 在 $p = \infty$ 时的结论得证.

²²这个结果确保了 $L^\infty(\mathbb{R}^d, Mw; X) = L^\infty(\mathbb{R}^d; X)$. 注意只要测度 ν 和 Lebesgue 测度 dx 对应的零测集相同, 就必有 $L^\infty(\nu) = L^\infty(dx)$, 而 $Mw > 0$ 正好保证了这一点.

现若 $p \in (1, \infty)$, 利用 Marcinkiewicz 定理 (准确来说是推论 13.7) 与前述结果即得待证结果. $\square$

13.3.1 Lebesgue 点与微分

若向量值函数 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow X$ 在 $\mathbb{R}^d$ 的每个紧子集上均 (Bochner) 可积, 就称该函数局部可积, 记这类函数 (对应的等价类) 构成的空间为 $L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$. 仿照经典理论, 我们可以定义局部可积向量值函数的 Lebesgue 点:

定义 13.8 (Lebesgue 点)

称 $x \in \mathbb{R}^d$ 为函数 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$ 的 Lebesgue 点, 如果

$$\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \int_B \|f(y) - f(x)\|_X dy = 0,$$

其中 B 是包含 x 的球.

对任意 Lebesgue 点 $x \in \mathbb{R}^d$ 而言, 根据定义立得

$$\lim_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \int_B f(y) dy = f(x).$$

下述结论是 Hardy-Littlewood 极大定理的一个推论:

定理 13.17 (Lebesgue 微分定理)

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$, 则有 a.e. 的 $x \in \mathbb{R}^d$ 均为 f 的 Lebesgue 点.

证明 因为待证结论是局部的, 故只需证明 $f \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 的情形即可²³. 记

$$\Lambda f(x) := \limsup_{\substack{B \ni x \\ |B| \rightarrow 0}} \int_B \|f(y) - f(x)\|_X dy.$$

显见只要 f 在 x 处连续, 就必有 $\Lambda f(x) = 0$, 且对每个 x 均有 $\Lambda f(x) \leq Mf(x) \leq \|f(x)\|_X$. 现在要证明 $\Lambda f(x) = 0$ a.e., 只需证明对每个 $\varepsilon > 0$ 而言 $\{\Lambda f > \varepsilon\}$ 均零测即可. 为此由引理 12.7 知对每个给定的 $\delta > 0$ 均存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^d; X)$ 满足 $\|f - g\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} < \delta$. 现有

$$\Lambda f(x) = \Lambda(f - g + g)(x) \leq \Lambda(f - g)(x) + \Lambda g(x) \leq M(f - g)(x) + \|f(x) - g(x)\|_X + 0,$$

进而

$$\begin{aligned} |\{\Lambda f > \varepsilon\}| &\leq |\{M(f - g)(x) > \varepsilon/2\}| + |\{\|f(x) - g(x)\|_X > \varepsilon/2\}| \\ &\leq \frac{2 \cdot 3^d}{\varepsilon} \|f - g\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} + \frac{2}{\varepsilon} \|f - g\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \leq \frac{2}{\varepsilon} (3^d + 1) \delta. \end{aligned}$$

由 δ 的任意性即知对任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $|\{\Lambda f > \varepsilon\}| = 0$. $\square$

特别在一维情形下, 下述单边 Lebesgue 微分定理也是很有用的:

推论 13.9

若 x 是函数 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}; X)$ 的 Lebesgue 点, 则

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \|f(y) - f(x)\|_X dy = \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_{x-h}^x \|f(y) - f(x)\|_X dy = 0.$$

证明 考虑 $I = (x - h, x + h)$, 知 $1/h = 2/|I|$, 于是 $\frac{1}{h} \int_x^{x+h}$ 的结果由

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} \|f(y) - f(x)\|_X dy \leq \frac{2}{|I|} \int_I \|f(y) - f(x)\|_X dy$$

即得. 同理可证 $\frac{1}{h} \int_{x-h}^x$ 的相关结果. $\square$

²³这是因为只要紧集 K 包含点 x , 那么 x 是 f 的 Lebesgue 点当且仅当 x 是 $\mathbf{1}_K f$ 的 Lebesgue 点, 因此对每个点都可以做这种截断把 f 优化成 L^1 函数.

接下来关于点态极限的一般存在性结果证明方法和定理13.17是类似的, 该结果在鞅变换中有重要应用.

命题 13.13

设 (S, Σ, μ) 是测度空间, $p \in [1, \infty)$, $\{T_n\}_{n \geq 1}$ 作为 $X \rightarrow L^{p, \infty}(S; Y)$ 的有界线性算子列满足存在常数 $C \geq 0$ 使得对全体 $x \in X$ 均有

$$\|\limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\|_Y\|_{L^{p, \infty}(S)} \leq C \|x\|_X.$$

进一步设存在 X 的稠密线性子空间 X_0 使得对 $x_0 \in X_0$ 有

$$Tx_0(s) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x_0(s) \exists, \forall \text{ a.e. } s \in S. \quad (13.49)$$

则 T 能唯一延拓为 $X \rightarrow L^{p, \infty}(S; Y)$ 且算子范数不超过 C 的有界线性算子, 且(13.49)对全体 $x \in X$ 均成立.



注 实际上对双指标算子列 $\{T_{m,n}\}_{m,n \geq 1}$ 而言, 上述命题结果在 $m, n \rightarrow \infty$ 时依旧成立, 为此只需稍微修改一下下述证明即可.

证明 取定 $x \in X$, 定义震荡算子 $Ox : S \rightarrow \mathbb{R}^+$ 为

$$Ox(s) := \limsup_{n \rightarrow \infty} \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_n x(s) - T_m x(s)\|_Y,$$

显见 $Ox(s) \leq 2 \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n x(s)\|_Y$ 点态成立. 现在只要 $Ox = 0$ a.e., 根据定义即知对每个 $x \in X$ 而言 $\{T_n x\}_{n \geq 1}$ 对 a.e. 源自 S 的输入都是 Y 中的 **Cauchy** 列, 进而该序列能 a.e. 在 Y 的意义下收敛到某函数 $Tx : S \rightarrow Y$. 显见这样定义的算子 T 是线性的, 其有界性由 a.e. 成立的不等式 $\|Tx(s)\|_Y \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n x(s)\|_Y$ 与 T_n 满足的一致有界条件立得.

现在证明 $Ox = 0$ a.e., 为此只需证明对全体 $\varepsilon > 0$ 均有 $\mu(Ox > \varepsilon) = 0$. 因为对每个 $x_0 \in X_0$ 与 a.e. $s \in S$ 而言 $\{T_n x_0\}$ 已经是 Y 中的 **Cauchy** 列了, 故至少对全体 $x_0 \in X_0$ 均有 $Ox_0 = 0$ a.e.. 现由三角不等式知对 a.e. $s \in S$ 有:

$$Ox(s) \leq O(x - x_0)(s) + Ox_0(s) \leq O(x - x_0)(s) \leq 2 \limsup_{n \geq 1} \|T_n(x - x_0)(s)\|_Y.$$

进一步由 T_n 满足的一致有界条件知

$$\mu(Ox(\cdot) > \varepsilon) \leq \mu(2 \limsup_{n \geq 1} \|T_n(x - x_0)(\cdot)\|_Y > \varepsilon) \leq \frac{2^p C^p}{\varepsilon^p} \|x - x_0\|_X^p.$$

上式两端同时在全体 $x_0 \in X_0$ 中取下确界即得待证结论. □

13.3.2 卷积与逼近

作为 Lebesgue 微分定理的应用, 接下来研究一些关于下述卷积的有用逼近结果:

$$\phi_\varepsilon * f(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \phi_\varepsilon(y) f(x - y) dy, \quad \phi_\varepsilon(y) := \frac{1}{\varepsilon^d} \phi\left(\frac{y}{\varepsilon}\right).$$

作为热身, 回忆命题12.20已经表明只要 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ ($p \in [1, \infty)$), $\phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 就有 $\phi_\varepsilon * f \rightarrow c_\phi f$ ($L^p(\mathbb{R}^d; X)$, $\varepsilon \downarrow 0$), 其中 $c_\phi := \int_{\mathbb{R}^d} \phi(y) dy$. 这里我们进一步给出点态收敛的结果:

定理 13.18

设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$, $\phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$, x 是 f 的 Lebesgue 点, 则点态收敛

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \phi_\varepsilon * f(x) = c_\phi f(x), \quad c_\phi := \int_{\mathbb{R}^d} \phi(y) dy$$

在下述条件中的任意一条成立时成立:

- (i) ϕ 紧支有界,

(ii) ϕ 的最小径向递减主部可积, 即

$$(z \mapsto \Phi(z) := \operatorname{ess\,sup}_{|y| \geq |z|} |\phi(y)|) \in L^1(\mathbb{R}^d), \quad (13.50)$$

且 $Mf(x) < \infty$.

另外对任意 $p \in [1, \infty]$ 而言, 只要 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$, 则 $Mf(x) < \infty$ 对 Lebesgue 点 x 是自动成立的. 

显见(13.50)成立的一个充分条件为 ϕ 存在任意一个在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中的径向递减主部, 例如只要

$$|\phi(y)| \leq C(1 + |y|)^{-d-\varepsilon},$$

那么(13.50)就成立.

证明 回忆(12.9), 现在在两种情形下我们都希望证明

$$F_\varepsilon(x) := \int_{\mathbb{R}^d} |\phi(y)| \|f(x - \varepsilon y) - f(x)\|_X dy \rightarrow 0, \quad \varepsilon \downarrow 0.$$

当 (i) 成立时, 上述结论是显见的. 这是因为此时存在足够大的以原点为半径的球 B_0 使得 $|\phi| \leq C\mathbf{1}_{B_0}/|B_0|$, 进而

$$F_\varepsilon(x) \leq C \int_{B_0} \|f(x - \varepsilon y) - f(x)\|_X dy = C \int_{x+\varepsilon B_0} \|f(z) - f(x)\|_X dz \rightarrow 0,$$

其中最后的收敛是因为 $x + \varepsilon B_0$ 在 Lebesgue 点定义包含的球族中.

当 (ii) 成立时, 注意到 $\Phi(z)$ 本身是仅依赖于 $|z|$ 的递减函数, 故实际上可以把 $\Phi(z)$ 写成

$$\Phi(z) = \int_{[|z|, \infty)} d\mu(t),$$

其中 μ 是 $\mathbb{R}^+$ 上的某个正测度, 进而

$$\begin{aligned} F_\varepsilon(x) &\leq \int_{\mathbb{R}^d} \Phi(y) \|f(x - \varepsilon y) - f(x)\|_X dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \left(\int_{|y| \leq t} \|f(x - \varepsilon y) - f(x)\|_X dy \right) d\mu(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} |B(0, t)| \left(\int_{B(x, \varepsilon t)} \|f(z) - f(x)\|_X dz \right) d\mu(t). \end{aligned} \quad (13.51)$$

根据 Lebesgue 微分定理的证明过程可知上右式积分内括号的部分关于 ε, t 能被 $Mf(x) + \|f(x)\|_X$ 一致控制, 且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时括号内部分对每个取定的 t 均趋零. 又因为

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^+} |B(0, t)| d\mu(t) &= \int_{\mathbb{R}^+} \int_{|z| \leq t} dz d\mu(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{[|z|, \infty)} d\mu(t) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \Phi(z) dz < \infty, \end{aligned} \quad (13.52)$$

故由控制收敛定理即知 $F_\varepsilon(x) \rightarrow 0$.

接下来证明定理的最后一条断言. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ ($p \in [1, \infty]$), x 是 f 的 Lebesgue 点. 根据 Lebesgue 点的定义知存在 $\varepsilon > 0$ 使得

$$\int_B \|f(y) - f(x)\|_X dy \leq 1,$$

其中 B 满足 $x \in B, |B| < \varepsilon$. 显见所有这样的 B 均满足

$$\int_B \|f(y)\|_X dy \leq \|f(x)\|_X + 1.$$

另一方面, 若 $|B| \geq \varepsilon$, 则

$$\int_B \|f(y)\|_X dy \leq |B|^{-1/p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq \varepsilon^{-1/p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}.$$

故

$$Mf(x) \leq \max(\|f(x)\|_X + 1, \varepsilon^{-1/p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}) < \infty,$$

此即待证结论. $\square$

从前述证明中我们也可以特别提取出下述有用的估计:

命题 13.14

设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$, $\phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 有满足(13.50)的径向递减主部 Φ , 则

$$\sup_{\varepsilon > 0} \|\phi_\varepsilon * f(x)\|_X \leq \|\Phi\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} Mf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

证明 既然局部可积函数是 a.e. 定义的, 故可以重定义 f 在单点 x 处的值为 $f(x) = 0$, 此时待证式由(13.51), (13.52)立得 (注意这两个估计都不需要 x 是 Lebesgue 点). $\square$

13.4 Fourier 变换

本节研究向量值 Fourier 变换. 这其实甚至可以算一个独立方向, 因此我们这里只介绍该理论中后面会用到的部分. 特别地, 我们只考虑 $\mathbb{R}^d$ 的情形, 这种情形的大部分结论同样可以迁移到之后对环面 $\mathbb{T}^d$ 的讨论中.

因为 Fourier 变换包含了对 X 中的向量乘复指数这一操作, 故本节我们默认所有出现的 Banach 空间都是复的.

定义 13.9 (Fourier 变换)

Fourier 变换指的是算子 $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^d; X) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d; X)$, $f \mapsto \hat{f}$, 其定义为:

$$\mathcal{F}f(\xi) := \hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

Fourier 逆变换指的是算子 $\mathcal{F}^{-1} : L^1(\mathbb{R}^d; X) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d; X)$, $f \mapsto \check{f}$, 其定义为:

$$\mathcal{F}^{-1}f(x) := \check{f}(x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

这里我们暂时先把 Fourier 逆变换当成一个普通的称呼, 之后会像在经典理论中一样说明它确实在某种意义下是 Fourier 变换的逆变换. Fourier 变换与 Fourier 逆变换是 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中经典理论对应算子的张量延拓, 这是因为至少在 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 的稠子空间 $L^1(\mathbb{R}^d) \otimes X$ 中有

$$\left(\sum_{n=1}^N g_n \otimes x_n \right)^\wedge = \sum_{n=1}^N \hat{g}_n \otimes x_n,$$

Fourier 逆变换也是同理的.

如果进一步记 f 的反射为

$$\tilde{f}(\cdot) := f(-\cdot),$$

则显见

$$\check{f} = (\hat{f})^\sim = (\tilde{f})^\wedge, \quad \hat{f} = (\check{f})^\sim = (\tilde{f})^\vee, \quad (13.53)$$

因此只要变换 $f \mapsto \hat{f}$ 有任何性质, $f \mapsto f^\vee$ 就也应该有对应的性质.

后面我们会说明标量 Fourier 变换的 L^1 结果都可以延拓到向量值情形, 但 L^2 结果只有在 X 是 Hilbert 空间时才能延拓. 前者的一个典例即为 Riemann-Lebesgue 引理, 它表明 Fourier 变换把 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 映入 $C_0(\mathbb{R}^d; X)$ (衰减连续函数空间).

引理 13.18 (Riemann-Lebesgue)

设 X 是任意 Banach 空间, 则对全体 $f \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 均有 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R}^d; X)$, 且 $\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)}$. 

证明 待证估计是放大不等式的直接推论, 因此只需证明 $\widehat{f}$ 连续且衰减. 连续性由 $\xi \mapsto e^{-i2\pi x \cdot \xi}$ 连续与控制收敛定理立得.

下面证明衰减性, 即 $\widehat{f}(\xi) \rightarrow 0 (|\xi| \rightarrow \infty)$, 为此考虑稠密性论证. 因为 $\|\widehat{f}(\xi) - \widehat{g}(\xi)\|_X \leq \|f - g\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)}$, 故只对 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 的稠子空间 E 中的元素证明衰减性即可. 一种方法是取 $E = L^1(\mathbb{R}^d) \otimes X$, 直接由经典的 Riemann-Lebesgue 引理即得结论.

这里我们也可以考虑另一种方法, 这种方法其实还是仿照经典方法进行证明. 取 $E = C_c^1(\mathbb{R}^d; X)$, 记 $\partial_j := \partial/\partial x_j$ 为关于第 j 个分量的偏导数, 由分部积分立得:

$$i2\pi\xi_j\widehat{f}(\xi) = - \int_{\mathbb{R}^d} \partial_j e^{-i2\pi x \cdot \xi} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i2\pi x \cdot \xi} \partial_j f(x) dx = \widehat{\partial_j f}(\xi).$$

因此

$$\|\widehat{f}(\xi)\|_X \leq \frac{C}{|\xi|} \sum_{j=1}^d \|\xi_j \widehat{f}(\xi)\|_X \leq \frac{C}{2\pi|\xi|} \sum_{j=1}^d \|\widehat{\partial_j f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} \leq \frac{C}{2\pi|\xi|} \sum_{j=1}^d \|\partial_j f\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0.$$

□

13.4.1 反演公式与 Plancherel 定理

回忆下述经典结果:

引理 13.19

Gauss 核 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 满足 $\widehat{g} = g$. 

命题 13.15 (Fourier 反演)

设函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 的 Fourier 变换满足 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$, 则在 f 的全体 Lebesgue 点处均有 $f = (\widehat{\widehat{f}})^\vee$. 

证明 由引理 13.19 知 Gauss 核 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 满足

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) e^{-i2\pi x \cdot \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi,$$

其中第二个等号是因为 g 是实值函数, 于是取复共轭不会改变式子值. 应用代换 $x \mapsto x/\varepsilon$ 可得

$$g_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} g\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = \int_{\mathbb{R}^d} g(\varepsilon\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi.$$

现对 f 的 Lebesgue 点 $x \in \mathbb{R}^d$, 由定理 13.18 已知 $g_\varepsilon * f(x) \rightarrow f(x) (\varepsilon \downarrow 0)$, 进而

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} g_\varepsilon(y) f(x-y) dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} \left[\int_{\mathbb{R}^d} g(\varepsilon y) e^{i2\pi y \cdot \xi} d\xi \right] f(x-y) dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} g(\varepsilon y) \left[\int_{\mathbb{R}^d} e^{-i2\pi(x-y) \cdot \xi} f(x-y) dy \right] e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} g(\varepsilon\xi) \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \\ &\stackrel{(A)}{=} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi = (\widehat{\widehat{f}})^\vee(x), \end{aligned}$$

其中 (A) 源自控制收敛定理, 后者又是因为 $\widehat{f}$ 可积, 且 $g(\varepsilon\xi) \rightarrow g(0) = 1 (\varepsilon \downarrow 0)$. 至此即得 $f(x) = (\widehat{\widehat{f}})^\vee(x)$. 

如果只需要得到 $f = (\widehat{\widehat{f}})^\vee$ a.e. 这一更弱结果, 实际上是不需要定理 13.18 的. 此时只需应用命题 12.20 并取 a.e. 收敛子列 $g_{\varepsilon_j} * f$ 即可.

Plancherel 定理

首先引入由 X 值 L^1 函数的 Fourier 逆变换构成的下述函数类:

$$\check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) := \{g \in L^\infty(\mathbb{R}^d; X) : g = \check{f}\}.$$

下面说明 Fourier 变换 (或它在 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 上的限制) 能自然延拓为有界算子

$$\mathcal{F} : \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \rightarrow L^1(\mathbb{R}^d; X), \check{g} = f \mapsto \mathcal{F}f := \hat{f} := g \in L^1(\mathbb{R}^d; X).$$

引理 13.20

Fourier 变换在 $\check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 上是良定义的, 且对 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中的函数而言, 该算子与 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 上的 Fourier 变换重合.



证明 若 $f = \check{h} = \check{g}, h, g \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$, 则 $k := g - h$ 满足 $k \in L^1(\mathbb{R}^d; X), \check{k} = \check{g} - \check{h} = 0 \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$, 进而命题 13.15 表明 $k = (\check{k})^\vee = (0)^\vee = 0$, 故 $g = h$, 良定义得证.

现设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 满足 $f = \check{h}, h \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$, 则命题 13.15 表明 $h = (\check{h})^\vee = \hat{f}$, 故在 $\check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 上定义的 Fourier 变换作用在 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中的函数上时与前文定义的 Fourier 变换相同. $\square$

针对 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 上的 Fourier 分析问题, 空间 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 十分重要, 这是因为该空间上的 Fourier 变换良定义. 下述引理进一步给出了稠密性结果.

引理 13.21

设 $p \in [1, \infty)$, 则:

- (i) $L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密.
- (ii) $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密.



证明 首先证明 (ii). 注意到 $\check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \subset L^\infty(\mathbb{R}^d; X)$, 故由 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap L^\infty(\mathbb{R}^d; X) \subset L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 知 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \subset L^p(\mathbb{R}^d; X)$. 现在任取 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$, 考虑卷积 $g_\varepsilon * f \in L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$ (其中 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$). 由下一条引理的第二种情形知 $(g_\varepsilon * f)^\wedge = g(\varepsilon \cdot) \hat{f}$ 作为 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中函数与 $L^\infty(\mathbb{R}^d; X)$ 中函数的乘积在 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中, 故 $g_\varepsilon * f \in \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$. 由命题 12.20 知 $g_\varepsilon * f \rightarrow f$ ($L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$), 由此即得待证稠密性.

回到 (i), 由前述证明知 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \subset L^p(\mathbb{R}^d; X)$, 故 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \subset L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$, 简便起见记 $A = L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$. 现由 (ii) 知 A 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密, 而已知 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密, 故 $A \subset L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密, 至此即得待证结论. $\square$

引理 13.22

设下述条件之一成立:

- (i) $f \in \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X), g \in L^1(\mathbb{R}^d)$,
 - (ii) $f \in L^1(\mathbb{R}^d; X), g \in \check{L}^1(\mathbb{R}^d)$,
- 则 $g * f \in \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X), \widehat{g * f} = \hat{g} \hat{f}$.



证明 我们只证明 (i) 成立的情形, (ii) 成立时的证明是类似的. 知

$$\begin{aligned} (g * f)(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} g(x-y) \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{i2\pi y \cdot \xi} d\xi dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left[\int_{\mathbb{R}^d} g(x-y) e^{i2\pi(y-x) \cdot \xi} dy \right] \hat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(\xi) \hat{f}(\xi) e^{i2\pi x \cdot \xi} d\xi \\ &= (\hat{g} \hat{f})^\vee(x), \end{aligned}$$

其中 $\widehat{g\hat{f}}$ 作为 $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 中函数与 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中函数之积在 $L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中. 至此即得 $g * f \in \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$, $\widehat{g * f} = \widehat{g\hat{f}}$.
□

现在可以证明下述结果了:

定理 13.19 (Plancherel 定理)

设 H 是 Hilbert 空间, 若 $f \in L^2(\mathbb{R}^d; H) \cap L^1(\mathbb{R}^d; H)$, 则 $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d; H)$, 且

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^d; H)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d; H)}. \quad (13.54)$$

特别地, Fourier 变换 (或准确来说是 Fourier 变换在 $L^2(\mathbb{R}^d; H) \cap L^1(\mathbb{R}^d; H)$ 上的限制) 能延拓为 $L^2(\mathbb{R}^d; H)$ 上的等距同构.



注 上述结果所诱导的 $L^2(\mathbb{R}^d; H)$ 上的等距同构 $\mathcal{F}$ 通常称为 *Fourier-Plancherel* 变换.

证明 记 H 上的内积为 $(\cdot, \cdot)_H$. 由 Fubini 定理知对任意 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d; H)$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^d} (\hat{f}(x)|g(x))_H dx = \int_{\mathbb{R}^d} (f(x)|\check{g}(x))_H dx.$$

针对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d; H) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; H)$, 在上式中取 $g = \hat{f}$, 应用 Fourier 反演定理即得(13.54). 又因为引理 13.21 表明 $L^1(\mathbb{R}^d; H) \cap \check{L}^1(\mathbb{R}^d; H)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^d; H) \cap L^2(\mathbb{R}^d; H)$ 中稠密, 故利用稠密性论证即得待证结论. □

定理 13.4 先前指出过只要把 H 换成任何一个非 Hilbert 的 Banach 空间, 前述定理都不再成立. 实际上向量值版本的 Plancherel 定理也可以用 Paley-Marcinkiewicz-Zygmund 延拓定理 13.3 与标量版本的 Plancherel 定理直接得到.

现在 Riemann-Lebesgue 引理 13.18 与 Plancherel 定理 13.19 表明 Fourier 变换在 $L^1(\mathbb{R}^d; H) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d; H)$ 与 $L^2(\mathbb{R}^d; H) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d; H)$ 时都是范数至多为 1 的有界线性算子, 于是由算子的复插值 13.7 与 Bochner 空间的复插值 13.14 (或 Riesz-Thorin 插值定理 13.12) 立得下述推论:

推论 13.10 (Hausdorff-Young)

对任意 $p \in [1, 2]$ 而言, Fourier 变换作为 $L^p(\mathbb{R}^d; H) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^d; H)$ ($1/p + 1/p' = 1$) 的算子均有界, 且范数至多为 1.



13.4.2 Fourier 型

例 13.2 已经指出向量值 Hausdorff-Young 不等式对某些特定的 Banach 空间并不成立. 因此对给定的 $p \in (1, 2]$, 我们自然会问对怎样的 Banach 空间而言, 作为 $L^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^d)$ 算子的 Fourier 变换能有界延拓为 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \rightarrow L^{p'}(\mathbb{R}^d; X)$ 的算子? 本小节就来回答该问题. 注意本小节的内容之后都不会用到, 不过我们会提一下 Fourier 型和概率论中型这个概念的关系.

13.4.3 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$

把 Schwartz 函数与缓增分布的经典理论拓展到向量值情形是相当有用的. 本小节与下一小节的内容从短期来看其实只会被用在 Bessel 势空间的处理上, 并且这一处理其实更多是出于美学考虑, 本质上可以绕开的. 因此这里收录本小节只是教学用途, 不过后面它确实会有很重要的应用.

现设 X 为 Banach 空间.

定义 13.10 (Schwartz 类)

定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的 X 值函数构成的 Schwartz 类指的是空间

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X) := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^d; X) : \|f\|_{\alpha, \beta} := \|x \mapsto x^\beta \partial^\alpha f(x)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} < \infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^d\}. \quad (13.55)$$



(13.55)中的可数半范族定义了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 上的局部凸拓扑, 进一步该半范族可诱导距离函数:

$$d(f, g) := \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^d} \sum_{\beta \in \mathbb{R}^d} 2^{-|\alpha| - |\beta|} \frac{\|f - g\|_{\alpha, \beta}}{1 + \|f - g\|_{\alpha, \beta}},$$

故 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 是完备度量空间. 容易验证对每个 $p \in [1, \infty]$ 而言, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 都是 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 的线性子空间, 且包含映射 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X) \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 连续.

接下来的两条结果中, 默认 X 是复 Banach 空间.

命题 13.16

Fourier 变换把 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 连续映到自身.

证明 容易验证

$$\partial^\alpha \widehat{f}(\xi) = [(-i2\pi x)^\alpha f]^\wedge(\xi), \quad (i2\pi)^\beta \xi^\beta \widehat{f}(\xi) = [\partial^\beta f]^\wedge.$$

因此

$$\|\widehat{f}\|_{\alpha, \beta} = \|\xi \mapsto \xi^\beta \partial^\alpha \widehat{f}(\xi)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} = (2\pi)^{|\alpha| - |\beta|} \|[\partial^\beta (x \mapsto x^\alpha f(x))]^\wedge\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)},$$

而

$$\|[\partial^\beta (x^\alpha f)^\wedge]\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} \leq \|\partial^\beta (x^\alpha f)\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \leq \sum_{\gamma \leq \beta \wedge \alpha} \binom{\beta}{\gamma} \frac{\alpha!}{(\alpha - \gamma)!} \|x^{\alpha - \gamma} \partial^{\beta - \gamma} f\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)}.$$

同时

$$\begin{aligned} \|x^{\alpha - \gamma} \partial^{\beta - \gamma} f\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} &\leq \|(1 + |x|)^{-d-1}\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \|(1 + |x|)^{d+1} x^{\alpha - \gamma} \partial^{\beta - \gamma} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)} \\ &\leq c_d \sum_{|\theta| \leq d+1} \frac{(d+1)!}{\theta! (d+1 - |\theta|)!} \|x^{\theta + \alpha - \gamma} \partial^{\beta - \gamma} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d; X)}, \end{aligned}$$

故

$$\|\widehat{f}\|_{\alpha, \beta} \leq c_{d, \alpha, \beta} \sum_{\substack{\gamma \leq \alpha \wedge \beta \\ |\theta| \leq d+1}} \|f\|_{\beta - \gamma, \theta + \alpha - \gamma},$$

至此即得待证结论. □

针对不同的情形, 我们之后会用到不同的测试函数空间:

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d; X) := C_c^\infty(\mathbb{R}^d; X), \quad \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X) := C_c^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X),$$

显见这两个空间都是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 的子空间. 另定义这类函数的 Fourier 逆变换构成的空间为:

$$\widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d; X) := \{g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X) : \exists f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d; X) (g = \check{f})\},$$

$$\widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X) := \{g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X) : \exists f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X) (g = \check{f})\}.$$

关于这些空间, 有下述基本的稠密性结果成立:

命题 13.17

下述空间均在 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \cap \widetilde{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密 (进而由引理 13.21 知也在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密):

- (i) $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X), \mathcal{D}(\mathbb{R}^d; X), \widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d; X), \mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X) (\forall p \in [1, \infty))$,
- (ii) $\widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X) (\forall p \in (1, \infty))$.

证明 设 $\phi, \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\phi(0) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{\phi} = 1, \int_{\mathbb{R}^d} \varphi = \widehat{\varphi}(0) = 1$. 记 $\varphi_t(x) = t^{-d} \varphi(t^{-1}x)$, 随着 $\varepsilon, \delta \downarrow 0, R \rightarrow \infty$ 知:

- $\|\phi(\varepsilon \cdot) f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0, \|[\phi(\varepsilon \cdot) f - f]^\wedge\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} = \|\widehat{\phi_\varepsilon} * \widehat{f} - \widehat{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0$.
- $\|\varphi_\delta * f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0, \|[\varphi_\delta * f - f]^\wedge\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} = \|\widehat{\varphi}(\delta \cdot) \widehat{f} - \widehat{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0$.
- $p > 1 \Rightarrow \|\varphi_R * f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0, \|[\varphi_R * f]^\wedge\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} = \|\widehat{\varphi}(R \cdot) \widehat{f}\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)} \rightarrow 0$.

现在 $\varphi_\delta * f$ 已经是光滑函数了. 若取 ϕ 紧支, 则 $\phi(\varepsilon \cdot)(\varphi_\delta * f) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d; X)$, 因此由前述收敛结果知该函数在任意 $L^p(p \in [1, \infty))$ 意义下均收敛到 $f \in (L^p \cap \widehat{L}^1)(\mathbb{R}^d; X)$. 类似地, 已知 $\widehat{\phi}_\varepsilon * \widehat{f} = (\phi(\varepsilon \cdot)f)^\wedge$ 光滑, 若取 $\widehat{\phi}$ 紧支, 则 $\widehat{\phi}(\delta \cdot)(\widehat{\phi}_\varepsilon * \widehat{f}) = [\varphi_\delta * (\phi(\varepsilon \cdot)f)^\wedge] \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d; X)$, 从而 $\varphi_\delta * (\phi(\varepsilon \cdot)f) \in \widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d; X)$, 且由前述收敛结果知该函数在任意 $L^p(p \in [1, \infty))$ 意义下收敛到 $f \in (L^p \cap \widehat{L}^1)(\mathbb{R}^d; X)$. 因为 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d; X)$ 和 $\widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d; X)$ 都在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 内, 故这两种情形都能推知 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; X)$ 的稠密性.

若额外令 $\widehat{\phi} \equiv 1$ 在原点附近成立, 则 $(\widehat{\phi}(\delta \cdot) - \widehat{\phi}(R \cdot))(\widehat{\phi}_\varepsilon * \widehat{f}) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X)$, 进而由前述收敛结果知 $p \in (1, \infty)$ 时函数 $(\varphi_\delta - \varphi_R) * (\phi(\varepsilon \cdot)f) \in \widetilde{\mathcal{D}}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}; X)$ 能逼近 $f \in (L^p \cap \widehat{L}^1)(\mathbb{R}^d; X)$. $\square$

13.4.4 缓增分布空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$

对局部凸空间 E 和 X 而言, 记 $\mathcal{L}(E, X)$ 为 $E \rightarrow X$ 的全体连续线性算子构成的空间. 当 X 是 Banach 空间时, $\mathcal{L}(E, X)$ 上依半范族 $p_y(T) = \|T(y)\|_X (y \in E)$ 生成的拓扑 $\mathcal{L}(E, X)$ 是局部凸的. 在该拓扑下 $T_n \rightarrow T(\mathcal{L}(E, X))$ 当且仅当 $T_n(y) \rightarrow T(y)(X)$ 对全体 $y \in E$ 均成立. 特别当 E, X 均为 Banach 空间时, 该拓扑与 $\mathcal{L}(E, X)$ 上的强算子拓扑重合.

定义 13.11 (缓增分布)

空间

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X) := \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^d), X)$$

称为 X 值缓增分布空间.



根据前面的论述, $u_n \rightarrow u(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X))$ 当且仅当 $u_n(\phi) \rightarrow u(\phi)(X)$ 对全体 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 均成立.

例 13.8

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d), x \in X$, 则 $u \otimes x : \phi \mapsto u(\phi)x$ 定义了 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 中的一个元素.

例 13.9

设 $p \in [1, \infty]$, 则每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 都能依下式诱导一个缓增分布 $u_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$:

$$u_f(\phi) := \int_{\mathbb{R}^d} f\phi(x)dx.$$

由 $\|u_f(\phi)\|_X \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \|\phi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)}$ 与 $\|\phi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)} \leq \|(1 + |\cdot|)^{-k}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d)} \|(1 + |\cdot|)^k \phi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)}$ (其中 k 足够大) 知映射 $f \mapsto u_f$ 连续. 由命题 13.20 可知该映射是单射, 故它实际上定义了连续嵌入 $L^p(\mathbb{R}^d; X) \hookrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$. 后面我们在把 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中的元素提到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 中时就默认用这个嵌入.

类似地, 若 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow X$ 是在远处至多多项式增长的强可测函数 (即 $\|f(x)\|_X \leq C(1 + |x|)^k$), 则前述定义同样可以诱导缓增分布 u_f , 其满足 $\|u_f(\phi)\|_X \leq C\|(1 + |\cdot|)^k \phi\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}$.

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上的连续线性算子通过稠密性论证都能连续延拓到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 中. 这是因为设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^d))$ 连续, 则其伴随算子 $T' : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 同样连续, 于是根据对偶论证立知 T' 可连续延拓为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上的算子:

$$(T'(u))(\phi) = u(T(\phi)), \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

特别对 $v = u \otimes x (u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d))$ 而言有 $T'(v) = (T'(u)) \otimes x$.

上述构造可以用到调和分析的很多标准算子上, 比如缩放, 平移, 卷积, 微分, 反射与 Fourier 变换. 有时我们会在诸如 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 的这种收敛级别应用类似的变换, 此时还需要验证该变换是否和前述变换重合. 一般来说这种验证很容易, 它通常都是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \otimes X$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中稠密这件事的推论.

例 13.10 (分布导数)

仿照经典意义约定多重指标后, 对多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^d$ 可定义 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上的分布导数 ∂^α 为

$$\partial^\alpha u(\phi) := (-1)^{|\alpha|} u(\partial^\alpha \phi).$$

例 13.11 (点态乘积)

和在远处至多多项式增长的函数 $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 作点态乘积这件事能在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上定义一个连续线性变换, 进而根据前述结果, 该变换能连续延拓到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上:

$$(\zeta u)(\phi) := u(\zeta \phi).$$

在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 上, 该定义与点态乘积的定义重合.

例 13.12 (Fourier 变换)

命题 13.16 已经表明 Fourier 变换 $\phi \mapsto \hat{\phi}$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上连续, 进而根据前述论证知它可以连续延拓到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上:

$$\hat{u}(\phi) := u(\hat{\phi}).$$

特别对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d; X) \cup \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 与 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 而言, Fubini 定理表明

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f} \phi dx = \int_{\mathbb{R}^d} f \hat{\phi} dx,$$

因此在 $L^1(\mathbb{R}^d; X) \cup \check{L}^1(\mathbb{R}^d; X)$ 上这两种 Fourier 变换的定义重合.

例 13.13 (Fourier 乘子)

结合前两条例子, 对给定的在远处多项式增长的函数 $m \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 而言, 可定义 Fourier 乘子 $T_m \in \mathcal{L}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X))$ 为

$$T_m u := (m \hat{u})^\vee.$$

不过我们同样可以用前面描述的抽象构造方法来定义该映射. 具体来说, 我们首先在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上定义 T_m 为 $T_m \phi := (m \hat{\phi})^\vee$, 再把该算子依 $(T_m u)(\phi) := u(T_m \phi)$ 延拓到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上. 显见这两种对 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上连续算子 T_m 的定义重合.

之后在定义 ?? 中我们还会再给一个 Fourier 乘子的定义, 彼时我们不再对 m 提光滑性要求, 只要求 m 点态有界. 不过就目前而言, 我们还是先要求 m 光滑且在远处至多有多项式增长.

例 13.14 (和 Schwartz 函数的卷积)

给定函数 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 可以定义 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 上的连续映射 $u \mapsto g * u$ 为:

$$(g * u)(\phi) := u(\tilde{g} * \phi),$$

其中 $\tilde{g}(x) := g(-x)$. 因为当 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 时有

$$\int_{\mathbb{R}^d} (g * f)(x) \phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) (\tilde{g} * \phi)(y) dy,$$

故在 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 上前述定义与卷积的通常定义 $f \mapsto g * f$ 重合.

关于缓增分布 $g * u$ 我们还有下述 (与经典情形类似的) 光滑性结果成立:

命题 13.18

若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$, $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 则 $g * u \in C^\infty(\mathbb{R}^d; X)$, 且 $g * u$ 及其各阶导数均至多多项式增长.



证明 回忆 $(\tau^h \psi)(x) := \psi(x - h)$, 知对全体 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 均有

$$(g * u)(\phi) = \int_{\mathbb{R}^d} u(\tau^x(\tilde{g})) \phi(x) dx.$$

上式表明 $g * u$ 可由函数 $x \mapsto u(\tau^x(\tilde{g}))$ 依积分诱导.

下面说明 $g * u \in C^\infty$, 且对全体多重指标 α 均有 $\partial^\alpha(g * u)(x) = u(\tau^x(\partial^\alpha \tilde{g}))$. 为此显见只需证 $\alpha = e_j$ 的情形. 现令 $t \rightarrow 0$, 知:

$$\frac{1}{t}((g * u)(x + te_j) - (g * u)(x)) = \frac{1}{t}(u(\tau^{x+te_j}(\tilde{g})) - u(\tau^x(\tilde{g}))) \rightarrow u(\tau^x \partial^\alpha g),$$

其中最后的收敛性是因为对全体 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 均有 $(\tau^{te_j}(\phi) - \phi)/t \rightarrow \partial^\alpha \phi(\mathcal{S}(\mathbb{R}^d))$. 至此光滑性得证.

下面说明 $\partial^\alpha(g * u)$ 至多多项式增长. 因为 u 是缓增分布, 故根据定义知存在整数 N 与常数 $C \geq 0$ 使得在(13.55)的记号下有:

$$\begin{aligned} |\partial^\alpha(g * u)(x)| &= |u(\tau^x(\partial^\alpha \tilde{g}))| \leq C \sum_{|\beta|, |\gamma| \leq N} \|\tau^x(\partial^\alpha \tilde{g})\|_{\beta, \gamma} \\ &= C \sum_{|\beta|, |\gamma| \leq N} \sup_{y \in \mathbb{R}^d} |x + y|^\gamma |\partial^{\alpha+\beta} \tilde{g}(y)|. \end{aligned}$$

显见上右式关于 x 至多多项式增长. □

最后我们给出一个稠密性结果, 该结果会在 Bessel 势空间的研究中用到:

命题 13.19

$C_c^\infty(\mathbb{R}^d; X)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$ 中序列稠密.

证明 取定 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d; X)$, 希望构造 $f_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; X)$ 使得对全体 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 均有 $u_{f_n}(\phi) \rightarrow u(\phi)(X)$. 现任取测试函数 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^d} \zeta(x) dx = 1$, 记 $\zeta_n(x) := n^d \zeta(nx)$. 另记 $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $0 \leq \theta \leq 1$ 点态成立, 且在 $\{|x| \leq 1\}$ 上 $\theta \equiv 1$. 进一步记 $\theta_n(x) := \theta(x/n)$.

现定义 $f_n: \mathbb{R}^d \rightarrow X$ 为 $f_n(x) = \theta_n \cdot (\tilde{\zeta}_n * u)$, 由命题 13.18 知 $f_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; X)$, 且对每个 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 均有

$$u_{f_n}(\phi) = u_f(\zeta_n * (\theta_n \phi)) \rightarrow u_f(\phi), \quad n \rightarrow \infty,$$

其中收敛关系是因为 $\zeta_n * (\theta_n \phi) \rightarrow \phi(\mathcal{S}(\mathbb{R}^d))$.

13.5 Sobolev 空间与可微性

本节我们应用前面发展的工具, 对在 Banach 空间 X 中取值的函数的微分性质进行更细致的研究. 我们将会重新引入弱导数的概念, 并讨论它与 a.e. 可微之间的关系. 顺着这个思路我们会进一步介绍 Sobolev 空间 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d; X)$, 并讨论它的一些性质. 另外我们还会刻画 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 与 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d; X)$ 之间的实插值.

13.5.1 弱导数

和经典理论一样约定多重指标记号. 设 $D \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, 称函数 $f: D \rightarrow X$ 局部可积 (记作 $f \in L_{loc}^1(D; X)$), 如果 f 在 D 的每个紧子集上均 Bochner 可积. 记 $C_c^\infty(D)$ 为紧支在 D 内的 C^∞ 函数构成的空间.

定义 13.12 (弱导数)

设 $D \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $\alpha \in \mathbb{N}^d$ 是多重指标. 称函数 $g \in L_{loc}^1(D; X)$ 是函数 $f \in L_{loc}^1(D; X)$ 的 α 阶弱导数, 如果

$$\int_D f(x) \partial^\alpha \phi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_D g(x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(D).$$

类似可以定义弱梯度与弱 Laplace 算子. ♣

对于 $L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 中的函数, 如果把该函数看成缓增分布, 则上述定义与分布导数的定义此时是重合的.

下述结果解决了弱导数的唯一性问题: 只要弱导数存在, 它就必唯一. 因此当 g 是 f 的 α 阶弱导数时, 可以称 g 就是 f 的弱导数, 记

$$\partial^\alpha f := g.$$

命题 13.20

若函数 $f \in L^1_{loc}(D; X)$ 满足

$$\int_D f(x)\phi(x)dx = 0, \forall \phi \in C_c^\infty(D),$$

则 $f = 0$ a.e..

证明 [第一步.] 要说明在 D 上 $f = 0$ a.e., 只需说明在紧包含于 D 的任意球 B 上均有 $f = 0$ a.e.. 现任取满足该要求的球 B , 取与 B 同心且包含 B 的球 $\tilde{B} \subset D$, 取 $\psi \in C_c^\infty(D)$ 满足在 B 内 $\psi = 1$, 在 $\tilde{B}$ 外 $\psi = 0$. 因为在 B 上 $\psi f = f$, 故只需说明 $\psi f = 0$, 此时 ψf 本质上是定义在全空间 $\mathbb{R}^d$ 上的函数.

[第二步.] 由第一步的说明可知只需考虑 $D = \mathbb{R}^d, f \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 的情形. 现设 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\phi(x) = 0(|x| \geq 1)$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} \phi(x)dx = 1$. 对 $t > 0$ 记 $\phi_t(x) := t^{-d}\phi(t^{-1}x)$. 现对全体 $t > 0$ 和 $x \in \mathbb{R}^d$ 而言, 由条件可知

$$(\phi_t * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \phi_t(x-y)f(y)dy = 0.$$

令 $t \downarrow 0$, 由命题 12.20 知 $\phi_t * f \rightarrow f(L^1(\mathbb{R}^d; X))$, 故 $0 = \phi_t * f \rightarrow f(L^1(\mathbb{R}^d; X))$. □

之后我们还会用到下述结果:

命题 13.21

若 $D \subset \mathbb{R}^d$ 是开连通集, $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$ 在 D 上有弱梯度 $\nabla f = 0$, 则 f a.e. 为某常数.

证明 [第一步.] 对全体 $\phi, \psi \in C_c^\infty(D)$ 均有

$$\int_D (\phi(x)\nabla\psi(x) + \nabla\phi(x)\psi(x))f(x)dx = - \int_D \phi(x)\psi(x)\nabla f(x)dx,$$

故 ψf 有弱梯度 $\nabla(\psi f) = \nabla\psi f + \psi\nabla f$. 特别若在某闭球 $B \subset D$ 上有 $\psi = 1$, 则在 B 上必有 $\nabla(\psi f) = 0$.

[第二步.] 由第一步的说明可知只需考虑 $D = \mathbb{R}^d, f \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 的情形. 取非负函数 $\zeta \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^d} \zeta(x)dx = 1$, 记 $\zeta_n(x) := n^d\zeta(nx)$, 则知 $\zeta_n * f \in C^1(\mathbb{R}^d; X)$, 且容易验证

$$\nabla(\zeta_n * f) = \zeta_n * (\nabla f) = 0.$$

故 $\zeta_n * f$ 是常值 (记之为 C_n). 仿照前述证明知由命题 12.20 立得待证结论. □

13.5.2 Sobolev 空间 $W^{k,p}(D; X)$

设 X 是 Banach 空间.

定义 13.13 (Sobolev 空间 $W^{k,p}(D; X)$)

设 $D \subset \mathbb{R}^d$ 是开集. 对 $k \in \mathbb{N}, p \in [1, \infty]$ 而言, Sobolev 空间 $W^{k,p}(D; X)$ 定义为具有全体 $|\alpha| \leq k$ 阶弱导, 且这些弱导均在 $L^p(D; X)$ 中的函数 $f \in L^p(D; X)$ 构成的空间.

若在 Sobolev 空间上装备下述范数:

$$\|f\|_{W^{k,p}(D; X)} := \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(D; X)},$$

则 $W^{k,p}(D; X)$ 成为 Banach 空间. 为此只需注意到只要 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $W^{k,p}(D; X)$ 中的 Cauchy 列, 则对全体 $|\alpha| \leq k$ 而言弱导数列 $\{\partial^\alpha f_n\}_{n \geq 1}$ 就必是 $L^p(D; X)$ 中的 Cauchy 列, 进而该序列能收敛到某个 f^α . 记 $f := f^0$, 之后验证其弱导数满足 $D^\alpha f = f^\alpha$, 且确有 $f_n \rightarrow f(W^{[k,p]}(D; X))$ 即可.

在某些情形下, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 我们还会用 $\left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(D)}^p\right)^{1/p}$ 这一等价范数. 另若 $p = 2$, 则 $W^{2,p}(D)$ 赋该范数时成为 Hilbert 范数.

方便起见, 我们用 $D = \mathbb{R}^d$ 时的一个简单逼近结果结束本小节. 约定常系数微分算子指的是任何形如线性组合 $A = \sum_{m=1}^M c_m \partial^{\alpha_m}$ 的算子, 其中 α_m 是多重指标, $c_m \in \mathbb{K}$ 是常系数. 由此可以定义函数 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 的弱 A -导数.

引理 13.23

设 A 是常系数微分算子, 则存在函数 $f_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d; X)$ 使得

$$f_j \rightarrow f, Af_j \rightarrow Af (L^p(\mathbb{R}^d; X)).$$



证明 取测试函数 $\theta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足在 $\{|x| \leq 1\}$ 上 $\theta \equiv 1$, 记 $\theta_m(x) = \theta(x/m)$, 容易验证只要 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 有弱 A -导数, 函数 $\theta_m f$ 就有弱 A -导数, 且 $m \rightarrow \infty$ 时 $\theta_m f \rightarrow f, Af_m \rightarrow Af (L^p(\mathbb{R}^d; X))$. 因此不妨设 f 紧支.

现在另取测试函数 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}^d} \zeta(x) dx = 1$, 记 $\zeta_n(x) := n^d \zeta(nx)$. 容易验证 $\zeta_n * f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 且该卷积具有弱 A -导数 $A(\zeta_n * f) = \zeta_n * Af$. 由命题 12.20 即知 $\zeta_n * f \rightarrow f, A(\zeta_n * f) \rightarrow \zeta_n * Af \rightarrow Af (L^p(\mathbb{R}^d; X))$. $\square$

推论 13.11

对全体 $k \in \mathbb{N}, p \in [1, \infty)$ 而言, $C_c^\infty(\mathbb{R}^d; X)$ 都是 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d; X)$ 的稠子空间.



13.5.3 a.e. 可微性

Sobolev 空间 $W^{k,p}(D; X)$ 是从弱导数存在的动机出发而被提出的. 下面我们研究这类空间中函数的 a.e. 可微性问题. 因为可微性问题是局部问题, 故不妨设 $D = \mathbb{R}^d$.

我们从 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d; X)$ 的差商刻画入手. 设 $h \in \mathbb{R}^d$, 记

$$\delta_j^t f(x) := \frac{1}{t}(f(x + te_j) - f(x)), \quad 1 \leq j \leq d, t \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

其中 e_j 是 $\mathbb{R}^d$ 的第 j 个标准单位向量. 在本小节的研究中, 实际上我们只需要用到下面的第一条结果即可:

命题 13.22

设 X 是 Banach 空间.

(i) 设 $1 \leq p \leq \infty$. 若 $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d; X)$, 则

$$\|\delta_j^t f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq \|\partial_j f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}, \quad 1 \leq j \leq d, t \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

其中 $\partial_j f$ 表示 f 的第 j 个偏导.

(ii) 设 $1 < p < \infty$. 若 X 有 Radon-Nikodým 性质, 且对全体 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$ 均存在常数 $C \geq 0$ 使得

$$\|\delta_j^t f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq C, \quad 1 \leq j \leq d, t \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

则 $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d; X)$, 且

$$\|\partial_j f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq C, \quad 1 \leq j \leq d.$$



注 前述结果 (ii) 实际上也是 Radon-Nikodým 性质的一种刻画, 这件事是定理 13.20 的直接推论. 注意当 $p = 1$ 时, 就算是 $X = \mathbb{K}, d = 1$ 的经典情形, (ii) 也是错的: 验证 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 即可.

证明 (i): 根据稠密性, 只需考虑 $f \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$, 此时

$$f(x+h) - f(x) = \int_0^1 \frac{d}{ds} f(x+sh) ds = \int_0^1 \nabla f(x+sh) \cdot h ds. \quad (13.56)$$

取 $h = te_j$ 知

$$\|\delta_j^t f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} \leq \int_0^1 \|\partial_j f(\cdot + se_j)\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)} ds = \|\partial_j f\|_{L^p(\mathbb{R}^d; X)}.$$

(ii): 取定 $f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$, 设 C 是条件给出的常数. 对全体 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^d} (f(x+h) - f(x))\phi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)(\phi(x-h) - \phi(x))dx.$$

根据条件与 Hölder 不等式, 对全体 $t > 0$ 与 $h := te_j$ 而言上式表明

$$\left\| \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \frac{\phi(x - te_j) - \phi(x)}{t} dx \right\|_X \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d; X)}, \quad 1 \leq j \leq d.$$

令 $t \downarrow 0$ 可得

$$\left\| \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_j \phi(x) dx \right\|_X \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d; X)}. \quad (13.57)$$

因此 $\phi \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_j \phi(x) dx$ 定义了有界算子 $T_j : L^{p'}(\mathbb{R}^d) \rightarrow X$. 现在希望证明 $T_j(\phi) = - \int_{\mathbb{R}^d} \partial_j f(x) \phi(x) dx$. 注意当 $\phi = \mathbf{1}_A$ 时这就是证明 $T_j(\mathbf{1}_A) = \int_A \partial_j f(x) dx$, 换句话说只要 ϕ 是示性函数, 我们要证的事就是 T_j 作为 X 值测度的刻画, 这正是 RNP 蕴含的性质. 因此下面的思路就是根据 T_j 的定义造一个 X 值测度, 再用 RNP 给出它的积分表示.

现取定 $\mathbb{R}^d$ 中的递增球列 $\{B_n\}_{n \geq 1}$ 满足 $\bigcup_{n \geq 1} B_n = \mathbb{R}^d$, 定义 $G_{j,n} : \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \rightarrow X$ 为 $G_{j,n}(A) := T_j(\mathbf{1}_{A \cap B_n})$. 仿照定理 12.7(i) $\Rightarrow$ (ii) 的证明可知 $G_{j,n}$ 是 X 值有界变差测度 (这里需要 $p > 1$). 因为 X 有 RNP, 故 $G_{j,n}$ 能被在 B_n 外为零的函数 $g_{j,n} \in L^1(\mathbb{R}^d; X)$ 依下式表出:

$$T_j(\mathbf{1}_{A \cap B_n}) = \int_A g_{j,n}(x) dx.$$

仿照定理 12.7 的证明可知依上述过程诱导的函数 $g_{j,n}$ 在它们支集重合的地方均相等, 因此把它们全部拼起来能得到在全空间上定义的函数 $g_j \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$.

根据线性性, 对简单函数 ϕ 而言上式表明

$$T_j \phi = \int_{\mathbb{R}^d} g_j(x) \phi(x) dx.$$

因为简单函数在 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 中稠密, 故上式可延拓到 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 上. 结合上式与 T 的定义可知

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_j \phi(x) dx = T_j \phi = \int_{\mathbb{R}^d} g_j(x) \phi(x) dx.$$

故在弱的意义下有 $g_j = -\partial_j f$.

下面说明 $\partial_j f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$. 仿照 (13.57) 可知对全体 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d) \otimes X^*$ 均有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} \langle f(x), \partial_j \phi(x) \rangle_{X \times X^*} dx \right| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d; X)}.$$

结合上式与弱导数的定义知全体 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d) \otimes X^*$ 均有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} \langle \partial_j f(x), \phi(x) \rangle_{X \times X^*} dx \right| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^d; X)}.$$

因为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d) \otimes X^*$ 作为 $L^{p'}(\mathbb{R}^d; X^*)$ 可用于逼近 $L^{p'}(\mathbb{R}^d; X^*)$ 的范数 (参看命题 12.27, 13.17), 故 $\partial_j f \in L^p(\mathbb{R}^d; X)$.

□

作为 Lebesgue 微分定理的应用, 下面证明每个 Lipschitz 连续函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow X$ 均 a.e. 可微当且仅当 X 具有 Radon-Nikodým 性质. 在命题 13.22 的证明中我们已经说明了 RNP 能用来证明满足特定 Lipschitz 估计的函数 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow X$ 弱导数的存在性. 下面我们关注一维情形, 着手证明弱可微性与 a.e. 可微性之间的等价关系. 这些结果中有的可以拓展到高维情形, 但这种拓展需要对 Sobolev 空间的进一步认识.

我们从针对弱导数与 a.e. 导数的一种微积分基本定理入手. 为区分这两种导数, 下面用 f' 表示 a.e. 导数, 用 ∂f 表示 (在弱导数存在时的) 弱导数. 约定

$$\int_a^t g(s) ds := - \int_t^a g(s) ds, \quad t < a.$$

引理 13.24

设 $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}; X)$, $a \in \mathbb{R}$, 定义 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 为

$$f(t) := \int_a^t g(s) ds,$$

则 f 的弱导数 ∂f 与 a.e. 导数 f' 均在 $L^1_{loc}(\mathbb{R}; X)$ 中存在, 且 $\partial f = f' = g$.



证明 对任意测试函数 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 均有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(t) \phi'(t) dt &= \int_a^\infty \int_a^t g(s) \phi'(t) ds dt - \int_{-\infty}^a \int_t^a g(s) \phi'(t) ds dt \\ &= \int_a^\infty \int_s^\infty g(s) \phi'(t) dt ds - \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^s g(s) \phi'(t) dt ds \\ &= - \int_a^\infty \phi(s) g(s) ds - \int_{-\infty}^a \phi(s) g(s) ds. \end{aligned}$$

故 f 的弱导数存在且等于 g .

下面证明 f 在 (a, ∞) 上 a.e. 可微, 且其导数为 g . $(-\infty, a)$ 上的结果证明是类似的.

任取 $b > a$, 记 $g_n: (a, b) \rightarrow X$ ($n \geq 1$) 为满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$ a.e. 的有界连续函数. 回忆引理 12.5 后的注表明形如 $\sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(t_{n-1}, t_n)} \otimes x_n$ 的阶梯函数在 $L^1(a, b; X)$ 中稠密, 且显见每个示性函数 $\mathbf{1}_{(t_{n-1}, t_n)}$ 都能在 $L^1(a, b)$ 的意义下被有界连续函数逼近, 故由 Riesz 引理知这样的函数列确实能取到. 现对非负函数 $s \mapsto \|g(s) - g_n(s)\|_X$ 应用 Lebesgue 微分定理 (推论 13.9) 知存在零测集 N 使得对全体 $t \in (a, b) \setminus N$ 均有

$$\begin{aligned} \limsup_{h \downarrow 0} \left\| \frac{1}{h} (f(t+h) - f(t)) - g(t) \right\|_X &\leq \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \|g(s) - g(t)\|_X ds \\ &\leq \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \|g(s) - g_n(s)\|_X ds \\ &\quad + \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \|g_n(s) - g_n(t)\|_X ds + \|g_n(t) - g(t)\|_X \\ &= 2\|g_n(t) - g(t)\|_X. \end{aligned}$$

上式两端令 $n \rightarrow \infty$ 即得 f 的 a.e. 右可微性, f 的 a.e. 左可微性类似可证. $\square$

根据 Lebesgue 微分定理知引理 13.24 中 g 的原函数 f 在每个有界区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上均绝对连续, 即对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta > 0$ 使得只要 $\{(a_n, b_n)\}$ 是 I 中的不交区间列, 且 $\sum_{n \geq 1} (b_n - a_n) < \delta$, 则

$$\sum_{n \geq 1} \|f(b_n) - f(a_n)\|_X < \varepsilon.$$

由此出发我们自然会问: 是否每个 (局部) 绝对连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 都能成为某个 (局部) Bochner 可积函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow X$ 的原函数? 定理 13.20 就给出了答案, 不过在证明该结果之前我们需要先进一步研究一下 a.e. 导数与弱导数之间的关系.

称函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 在 $W^{1,p}_{loc}(\mathbb{R}; X)$ 内, 如果 $f \in L^p_{loc}(\mathbb{R}; X)$ 且有在 $L^p_{loc}(\mathbb{R}; X)$ 中的弱导数.

命题 13.23

设 $p \in [1, \infty]$. 对局部绝对连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 而言, 下述诸命题等价:

- (i) $f \in W^{1,p}_{loc}(\mathbb{R}; X)$;
- (ii) 存在函数 $g \in L^p_{loc}(\mathbb{R}; X)$ 使得

$$f(t) - f(s) = \int_s^t g(r) dr, \quad \forall -\infty < s < t < \infty;$$

- (iii) f a.e. 可微, 且 $f' \in L^p_{loc}(\mathbb{R}; X)$.

当上述命题成立时有 $\partial f = g = f'$ a.e..



为证 (iii) $\Rightarrow$ (ii), 我们还需要一个覆盖引理. 称覆盖 E 的球族 $\mathcal{B}$ 为 Vitali 覆盖, 如果对全体 $x \in E$ 与全体 $r > 0$

而言总存在半径不超过 r 的球 $B \in \mathcal{B}$ 包含 x .

引理 13.25

设 $\mathcal{B}$ 是全测度可测集 $E \subset (a, b)$ 的一个 Vitali 覆盖, 则对全体 $\delta > 0$ 均存在不交球 $B_1, \dots, B_N \in \mathcal{B}$ 满足

$$\left| E \setminus \bigcup_{n=1}^N B_n \right| \leq \delta.$$



证明 不妨设 $\delta < b - a$. 取 $E_1 := E$, 因为 E 是全测度集, 故能取到紧集 $K_1 \subset E_1$ 满足 $|K_1| > \delta$, 对应取 $B_1, \dots, B_{N_1}$ 为 K_1 在球族 $\mathcal{B}$ 中的有限覆盖. 根据 Vitali 覆盖引理 13.17 知在该有限覆盖中存在两两不交的球 $B_{n_1}, \dots, B_{n_{k_1}}$ 满足

$$\sum_{j=1}^{k_1} |B_{n_j}| \geq \frac{1}{3} |K_1| > \frac{1}{3} \delta.$$

若 $|E \setminus \bigcup_{j=1}^{k_1} B_{n_j}| < \delta$, 则 $B_{n_1}, \dots, B_{n_{k_1}}$ 就是待求的不交球. 否则进一步取 $E_2 := E_1 \setminus \bigcup_{j=1}^{k_1} \overline{B_{n_j}}$, 知 $|E_2| > \delta$, 进而可取紧集 $K_2 \subset E_2$ 满足 $|K_2| > \delta$. 进一步用 $\mathcal{B}$ 中前述过程没有用过的球覆盖 K_2 (因为 $\mathcal{B}$ 是 Vitali 覆盖这件事允许了我们取足够小半径的球, 故这种覆盖是能取到的), 于是由 Vitali 覆盖引理知在该覆盖中存在不交球 $B_{n_{k_1+1}}, \dots, B_{n_{k_2}}$ 满足

$$\sum_{j=k_1+1}^{k_2} |B_{n_j}| \geq \frac{1}{3} |K_2| > \frac{1}{3} \delta.$$

若 $|E \setminus \bigcup_{j=1}^{k_2} B_{n_j}| \leq \delta$, 则 $B_1, \dots, B_{n_{k_2}}$ 即为待求的不交球, 否则继续该选取过程.

注意前述选取过程必在有限步终止, 这是因为

$$|E_n| < |E_{n-1}| - \frac{1}{3} \delta < \dots < |E_1| - \frac{1}{3} (n-1) \delta |E_1| = (b-a) - \frac{1}{3} (n-1) \delta.$$

故当 n 足够大时总会有 $|E_n| \leq \delta$. □

上述引理可用来证明下述结果:

引理 13.26

设 $f: [0, 1] \rightarrow X$ 局部绝对连续且 a.e. 可微. 若 $f' = 0$ a.e., 则 f 是常值.



证明 取定 $\varepsilon > 0$, 依绝对连续的定义取 $\delta > 0$. 取定 $0 \leq a < b \leq 1$, 设 $E \subset (a, b)$ 作为全测度可测集满足 f 在其上可微且导数为零. 因为对每个 $x \in E$ 均有 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) = 0$, 根据极限定义即知对每个 $r > 0$ 总存在包含 x 且长度不超过 r 的开区间 $(a_x, b_x) \subset (a, b)$ 使得

$$\|f(b_x) - f(a_x)\|_X < \varepsilon(b_x - a_x).$$

现在 $\{(a_x, b_x)\}_{x \in E}$ 构成了 E 的一个 Vitali 覆盖, 故由引理 13.25 知可取该覆盖中的有限个不交区间 $I_1, \dots, I_N$ 满足 $\sum_{n=1}^N |I_n| \geq (b-a) - \delta$. 若记 $I_n = (a_n, b_n)$, 则

$$\sum_{n=1}^N \|f(b_n) - f(a_n)\|_X < \varepsilon \sum_{n=1}^N (b_n - a_n) < \varepsilon(b-a).$$

另一方面, $\bigcup_n I_n$ 的补集由至多 $N+1$ 个总长度不超过 δ 的不交区间 $J_m = [c_m, d_m]$ 组成, 于是由 f 的绝对连续性知

$$\sum_{J_m} \|f(d_m) - f(c_m)\|_X < \varepsilon.$$

结合前述两种估计可知 $\|f(b) - f(a)\|_X < \varepsilon(b-a) + \varepsilon$. 因为 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 故 $f(a) = f(b)$. □

现在可以证明命题 13.23 了.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 取定实数 $s < s'$, 定义 $h: [s, s'] \rightarrow X$ 为 $h(t) := \int_a^t g(r) dr$, 其中 g 是 f 的弱导数. 由引理 13.24 知 h 存在弱导数 $\partial h = \partial f$. 另由命题 13.21 知 $f - h \equiv x$ 为常值, 进而对全体 $t \in [s, s']$ 均有 $f(t) = x + \int_s^t g(r) dr$. 令

$t \downarrow s$ 即知 $x = f(s)$, 由此即得 (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (i) 与 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 均可由引理 13.24 推知.

(iii) $\Rightarrow$ (ii): 取定实数 $s < s'$, 记 $h(t) := \int_s^t f'(r)dr$. 由引理 13.24 知该函数绝对连续, a.e. 可微, 且其导数为 f' , 因此在 $[s, s']$ 上 $f - h$ 绝对连续, a.e. 可微, 且其导数为 0, 于是引理 13.26 表明 $f - h$ 是常值. 至此重复前述证明即得结果. $\square$

定理 13.20

对任意 Banach 空间 X 而言, 下述诸断言等价:

- (i) X 具有 Radon-Nikodým 性质;
- (ii) 每个局部绝对连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 均 a.e. 可微;
- (iii) 每个局部 Lipschitz 连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 均 a.e. 可微;
- (iv) 每个局部绝对连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 均在 $W_{loc}^{1,1}(\mathbb{R}; X)$ 中;
- (v) 每个局部 Lipschitz 连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 均在 $W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}; X)$ 中.



证明 (i) $\Rightarrow$ (iii): 用命题 13.22 是可以推出该结果的, 不过这里我们介绍另一种证明. 注意只需说明 f 在有限区间 $I = (a, b)$ 上 a.e. 可微即可. 现对 $a \leq s < t \leq b$ 定义

$$T\mathbf{1}_{(s,t)} := f(t) - f(s),$$

用线性性将该定义延拓到阶梯函数上. 此时对 $g = \sum_{n=1}^N c_n \mathbf{1}_{(t_{n-1}, t_n)}$ 有

$$\|Tg\|_X \leq L \sum_{n=1}^N |c_n|(t_n - t_{n-1}) = L\|g\|_{L^1(\mathbb{R}^d; X)},$$

其中 L 是 f 的 Lipschitz 常数. 于是 T 能延拓为范数不超过 L 的 $L^1(I) \rightarrow X$ 的有界算子, 进一步由定理 12.7 知 T 可被函数 $\phi \in L^\infty(I; X)$ 表出, 因此对全体 $t \in I$ 均有

$$f(t) - f(a) = T\mathbf{1}_{(a,t)} = \int_a^t \phi(r)dr,$$

由引理 13.24 即得待证结果.

(iii) $\Leftrightarrow$ (v): 该结果由命题 13.23 立得, 注意 Lipschitz 函数的 a.e. 导数必有界.

(v) $\Rightarrow$ (i): 设 $T: L^1(0, 1) \rightarrow X$ 为有界算子, 定义 $f: [0, 1] \rightarrow X$ 为

$$f(t) := T\mathbf{1}_{(0,t)}.$$

则对全体 $0 \leq s < t \leq 1$ 均有

$$\|f(t) - f(s)\|_X \leq \|T\|_{L^1(0,1) \rightarrow X} \|\mathbf{1}_{(s,t)}\|_{L^1(\mathbb{R})} = (t-s)\|T\|_{L^1(0,1) \rightarrow X},$$

故 f Lipschitz 连续. 进一步记 $f(t) = f(0)(t < 0)$, $f(t) = f(1)(t > 1)$, 此时 f 延拓为 $\mathbb{R}$ 上的 Lipschitz 函数. 因为已知 (iii) $\Leftrightarrow$ (v), 故可设 f' 是 f 的 a.e. 导数. 容易验证 $f' \in L^\infty(\mathbb{R}; X)$, 且 $\|f'\|_{L^\infty(\mathbb{R}; X)} \leq L$, 其中 L 为 f 的 Lipschitz 常数. 于是由命题 13.23 知对全体 $0 \leq a < b \leq 1$ 均有

$$T\mathbf{1}_{(a,b)} = f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(t)f'(t)dt.$$

故 $T\phi = \int_0^1 \phi(t)f'(t)dt$ 对全体阶梯函数 ϕ 均成立. 因为阶梯函数在 $L^1(0, 1)$ 中稠密且 T 有界, 故该关系能延拓到任意 $\phi \in L^1(0, 1)$ 上, 这说明 T 能被 f' 表出, 故由定理 12.8 与定理 12.11 知 X 关于 $[0, 1]$ 具有 RNP.

(v) $\Rightarrow$ (iv): 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 绝对连续, 由命题 13.23 知只需证明 f a.e. 可微, 且其 a.e. 导数在有限区间上可积. 通过 scaling 和平移知不妨设 $I = (0, 1)$. 现定义函数 $V_f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$V_f(t) := \sup_{n=1}^N \|f(t_n) - f(t_{n-1})\|_X,$$

其中上确界在全体有限分划 $0 = t_0 < \cdots < t_N = t$ 中取. 根据 f 绝对连续可知 $V_f(t)$ 有限, 且显见 V_f 关于 t 不减, 因此函数

$$h(t) := \frac{V_f(t) + t}{V_f(1) + 1}$$

绝对连续, 严格增, 且满足 $h(0) = 0, h(1) = 1$. 另对全体 $0 \leq s \leq t \leq 1$ 均有

$$\|f(t) - f(s)\|_X \leq V_f(t) - V_f(s) \leq (V_f(1) + 1)(h(t) - h(s)).$$

故 $f \circ h^{-1}$ 在 $[0, 1]$ 上 Lipschitz 连续, 且其 Lipschitz 常数不超过 $V_f(1) + 1$. 因为 (v) $\Leftrightarrow$ (iii), 故 $f \circ h^{-1}$ a.e. 可微 (不妨设对应的零测集为 N_0), 且由上式知 $f \circ h^{-1}$ 的导数 a.e. 被 $V_f(1) + 1$ 控制 (不妨设对应的零测集为 N_1). 另知 h a.e. 可微 (不妨设对应的零测集为 N_2), 根据后面会证明的引理 13.27 还可知 h' 可积. 因为 $|h(t) - h(s)| \geq |t - s| / (V_f(1) + 1)$, 故 h^{-1} 把零测集映成零测集, 于是由链式法则知 $f = (f \circ h^{-1}) \circ h$ 在零测集 $N := h^{-1}(N_0 \cup N_1) \cup N_2$ 的补集上可微, $f'(t) = (f \circ h^{-1})'(h(t)) \cdot h'(t)$, 且

$$\|f'(t)\|_X \leq (V_f(1) + 1)|h'(t)|.$$

故 f' Bochner 可积.

(iv) $\Rightarrow$ (ii): 这是命题 13.23 的直接推论.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 只需注意 Lipschitz 函数必绝对连续即可. □

最后我们还需要补上证明 (v) $\Rightarrow$ (ii) 时用到的下述事实:

引理 13.27

若 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ 不增且绝对连续, 则 f a.e. 可微, 且 f' 局部可积.



证明 对 $a < b$ 设 $\mu([a, b]) := f(b) - f(a)$, 将该定义延拓到左闭右开区间的有限并上. 由 Carathéodory 延拓定理知 μ 能延拓为定义在 $\mathbb{R}$ 上且在有界区间上有限的 Borel 测度 μ . 下面证明 μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 为此取定 $\varepsilon > 0$, 设 δ 依绝对连续定义出现.

若 B 是 Lebesgue 测度满足 $|B| < \delta/2$ 的 Borel 集, 则由测度论的结果知存在 $I_n = [a_n, b_n] (n = 1, \dots, N)$ 满足 $|B \Delta \bigcup_{n=1}^N I_n| < \delta/2, \mu(B \Delta \bigcup_{n=1}^N I_n) < \varepsilon$. 前者表明

$$\sum_{n=1}^N (b_n - a_n) = \bigcup_{n=1}^N |I_n| < \delta.$$

于是由 f 的绝对连续性知

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N I_n\right) = \sum_{n=1}^N (f(b_n) - f(a_n)) < \varepsilon.$$

故 $\mu(B) < 2\varepsilon$, 由此即得 μ 的绝对连续性. 现对区间 $(-r, r)$ 应用 Radon-Nikodým 定理知 μ 存在密度 $g \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, 且对全体 $a < b$ 均有

$$f(b) - f(a) = \int_a^b g(s) ds.$$

现由引理 13.24 即得待证结论.

注 定理 13.20(i) $\Rightarrow$ (ii) 的证明还能用下述更直接的思路 (不过该思路的严格表述要更麻烦一点). 考虑 X 值 Stieltjes 积分

$$G(A) := \int_0^1 \mathbf{1}_A df,$$

可以证明上述积分定义了关于 Lebesgue 测度绝对连续的有界变差 X 值测度. 如果用 $\phi \in L^1(0, 1; X)$ 表示该测度的密度, 则

$$f(t) = \int_0^t \phi(t) dt,$$

由引理 13.24 即得待证结果.

推论 13.12

设 X 自反.

(i) 每个局部绝对连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 均 a.e. 可微, 且 $f \in W^{1,1}_{loc}(\mathbb{R}; X)$.

(ii) 每个局部 Lipschitz 连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 均 a.e. 可微, 且 $f \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}; X)$.
在上述两种情形下, a.e. 导数与弱导数都是重合的.



13.6 条件期望

下面研究一类重要算子: 条件期望. 这类算子之后会经常出现. 特别地, 下一章中我们就会用该算子定义鞅.

在调和与分析中, 条件期望是用在各种平均过程中的. 调和与分析通常都是在赋 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}^d$ 上展开研究, 因此关于条件期望, 我们会在 σ 有限测度空间的框架下进行讨论.

在概率论中, 条件期望都只是对可积函数定义的. 因为概率空间本身是有限测度的, 故此时条件期望自动能对 L^p 函数良定义. 然而在 σ 有限的语境下, 我们没法再直接对 L^p 函数定义条件期望了, 因此我们会考虑某种具有能使条件期望定义合理的最少局部可积条件的强可测函数. 就算是对更简单的概率空间而言, 这种设置也能带来很多便利.

本节我们默认 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, X 是 Banach 空间. 回忆 $L^0(S; X)$ 指的是 a.e. 意义下等价的全体强 μ -可测函数 $f: S \rightarrow X$ 构成的线性空间. 当我们希望强调空间赋的 σ 代数时, 会记 $L^0(S, \mathcal{A}; X)$. 特别当 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 是子 σ 代数时, 空间 $L^0(S, \mathcal{F}; X)$ 是在测度空间 $(S, \mathcal{F}, \mu|_{\mathcal{F}})$ 上定义的. 显见该空间与 $L^0(S; X)$ 中具有强 $\mathcal{F}$ -可测表示的那些函数构成的子空间重合. 通常称 $L^0(S, \mathcal{F}; X)$ 中的元素为 $L^0(S; X)$ 中的 $\mathcal{F}$ -可测元.

给定子 σ 代数 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$, 对函数 $f \in L^0(S; X)$ 而言, 记

$$\mathcal{F}_f := \{F \in \mathcal{F} : \mathbf{1}_F f \in L^1(S; X)\}.$$

定义 13.14

称函数 $f \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 如果 S 能被至多可数个 $\mathcal{F}_f$ 中的集合覆盖. 来自 $\mathcal{F}_f$ 的任意覆盖列都称为 f 在 $\mathcal{F}$ 中的穷竭列.



f 的穷竭列能取成不交列: 若 $\{F_n\}_{n \geq 1}$ 是穷竭列, 则取 $\tilde{F}_1 = F_1, \tilde{F}_{n+1} = F_{n+1} \setminus \bigcup_{j=1}^n F_j (j \geq 1)$, 可以验证 $\{\tilde{F}_n\}_{n \geq 1}$ 同样是穷竭列.

f 关于 $\mathcal{F}$ 的 σ 可积性使得我们可以把函数 f 分成关于 σ 代数 $\mathcal{F}$ 的不同可积部分. 这使得就算 f 在 S 上没有全局可积性, 我们也可以谈 f 的条件期望.

下面两条结果给出了 σ 可积性的简单实例.

命题 13.24

每个 $f \in L^0(S; X)$ 均在 $\mathcal{A}$ 上 σ 可积.



证明 因为 f 本身强 μ -可测, 故由命题 12.2 知存在不交分解 $S = F_0 \cup F_1, F_0, F_1 \in \mathcal{A}$ 使得在 F_0 上 $f \equiv 0$ a.e., 且 μ 在 F_1 上 σ 有限. 设 $\{F^{(n)}\}_{n \geq 1}$ 是 $(\mu$ 的 σ 有限性诱导的) F_1 的穷竭列, 对每个 $j \geq 1$ 记 $F_j = \{\|f\|_X \leq j\}$, 则一方面 f 在 F_0 上可积, 另一方面对每组 $j, n \geq 1$ 而言 f 都在 $F_{jn} := F^{(n)} \cap F_j$ 上可积. 显见 $\{F_{jn}\}_{j,n}$ 同样是 S 源自 $\mathcal{A}$ 的穷竭列, 故 $\{F_{jn}\}_{j,n}$ 是 f 在 $\mathcal{A}$ 中的穷竭列. $\square$

虽说每个 $f \in L^0(S; X)$ 都在 $\mathcal{A}$ 上 σ 可积, 但这类函数并不一定在 $\mathcal{A}$ 的子 σ 代数上 σ 可积. 比如取 $S = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是 Borel σ 代数, 则函数 $\mathbf{1}$ 在 $\mathcal{A}$ 上 σ 可积, 却不在子 σ 代数 $\mathcal{F} = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ 上 σ 可积. 这种缺陷甚至没法用 μ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限来改良: 只要 f 在每个区间 $[n, n+1)$ 上不可积, 则 f 就没法在这些区间生成的子 σ 代数上 σ 可积. 不过只要我们对 f 提全局可积性条件, 这种事就不会发生了:

命题 13.25

若 μ 在 $\mathcal{A}$ 的子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 且 $1 \leq p \leq \infty$, 则每个函数 $f \in L^p(S; X)$ 均在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积.



证明 设 $\{S_n\}_{n \geq 1}$ 是 μ 的 σ 有限性诱导的 $\mathcal{F}$ 中的有限 μ 测度穷竭列. 由 Hölder 不等式知 $\mathbf{1}_{S_n} f \in L^1(S; X)$, 故 $\{S_n\}_{n \geq 1}$ 是 f 在 $\mathcal{F}$ 中的一个穷竭列. $\square$

定义 13.15 (条件期望)

设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 是子 σ 代数, 称函数 $g \in L^0(S, \mathcal{F}; X)$ 是函数 $f \in L^0(S; X)$ 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望, 如果

$$\int_F g d\mu = \int_F f d\mu, \quad \forall F \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g. \quad (13.58)$$



如果不提 f 的 σ 可积性假设, 在上述条件中就可以永远取 $\mathcal{F}_f = \{\emptyset\}$, 这时候上述定义就没什么意义了. 因此后面我们总设 f 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积. 该条件同时表明只要条件期望存在, 它就唯一 (参看定理 13.21). 此时可以进一步证明 $\mathcal{F}_f \subset \mathcal{F}_g$, 于是 (13.58) 对全体 $F \in \mathcal{F}_f$ 均成立. 如果此时还设 μ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 则 f 关于 $\mathcal{F}$ 存在唯一条件期望 g (参看定理 13.22).

然而一般来说验证 (13.58) 是有点麻烦的, 我们希望通过在 $\mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$ 的某个合适子集族 $\mathcal{C}$ 上验证 (13.58) 来给出条件期望的一个判别法, 为此需要引入下述定义:

定义 13.16

设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 是子 σ 代数, 称集族 $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{F}$ 的一个穷竭理想, 如果它具有下述两条性质:

- (i) 对全体 $C \in \mathcal{C}$ 与全体 $F \in \mathcal{F}$ 均有 $C \cap F \in \mathcal{C}$,
- (ii) S 能被 $\mathcal{C}$ 中至多可数个集合覆盖.



例 13.15

对 σ 有限测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 而言, 全体 μ 测度有限的集合构成的集族是 $\mathcal{A}$ 的一个穷竭理想.

任意穷竭理想都包含覆盖 S 的不交列, 这是因为由 (ii) 知存在集列 $\{C_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{C}$ 覆盖 S . 记 $C'_1 = C_1, C'_{n+1} = C_{n+1} \setminus \bigcup_{j=1}^n C_j$, 因为 $C'_{n+1} = C_{n+1} \cap \left(\bigcup_{j=1}^n C_j\right)^c, \left(\bigcup_{j=1}^n C_j\right)^c \in \mathcal{F}$, 故 (i) 表明 $C'_{n+1} \in \mathcal{C}$.

穷竭理想对交运算是封闭的:

引理 13.28

若 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ 都是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 则 $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 且

$$\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 = \{C_1 \cap C_2 : C_1 \in \mathcal{C}_1, C_2 \in \mathcal{C}_2\}.$$



证明这里就省略了. $\square$

例 13.16

常值函数 $\mathbf{1}$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积当且仅当 μ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 这又当且仅当 $\mathcal{F}_1$ (即 $h = \mathbf{1}$ 时的 $\mathcal{F}_h$) 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想. 更一般地, 函数 $f \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积当且仅当测度 $d\nu := \|f\|_X d\mu$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 这又当且仅当 $\mathcal{F}_f$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想. 特别若 $f \in L^0(S, \mathcal{F}; X)$, 则命题 13.24 表明 $\mathcal{F}_f$ 自动成为 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想.

下述结果简化了条件 (13.58) 的验证.

命题 13.26

设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 是子 σ 代数, $f \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, $g \in L^0(S, \mathcal{F}; X)$ 取定, 则下述断言等价:

- (i) g 是 f 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望;
- (ii) 存在 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想 $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$ 满足

$$\int_C g d\mu = \int_C f d\mu, \quad \forall C \in \mathcal{C}. \quad (13.59)$$



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 由例 13.16 知 $\mathcal{F}_f, \mathcal{F}_g$ 都是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 于是由引理 13.28 知 $\mathcal{C} = \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$ 也是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想,

由条件期望的定义立得(13.59).

(ii)⇒(i): 取 S 的不交覆盖 $\{C_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{C}$, 取定 $F \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$. 由(13.59)与 $F \cap C_n \in \mathcal{C}$ 知

$$\int_{C_n \cap F} g d\mu = \int_{C_n \cap F} f d\mu.$$

对上式两端关于 n 求和, 由控制收敛定理即得(13.58). □

例 13.17

若 f_1, f_2 均 σ 可积, 且有条件期望 g_1, g_2 , 则对全体标量 c_1, c_2 而言函数 $c_1 g_1 + c_2 g_2$ 都是 $c_1 f_1 + c_2 f_2$ 的条件期望. 这是因为由引理 13.28 知 $\mathcal{C} := \mathcal{F}_{f_1} \cap \mathcal{F}_{f_2} \cap \mathcal{F}_{g_1} \cap \mathcal{F}_{g_2}$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 于是由命题 13.26 立得结论. 从这个例子就可以看出穷竭理想可操作性相当大, 毕竟如果算的是 $\mathcal{F}_{c_1 f_1 + c_2 f_2} \cap \mathcal{F}_{c_1 g_1 + c_2 g_2}$ 的某种最大穷竭理想, 工作量就会相当大了.

例 13.18 ($\mathcal{F}$ 中集合的限制)

若 $f \in L^0(S; X)$ 存在关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望 g , 则对每个 $A \in \mathcal{F}$ 而言, $1_A g$ 都是 $1_A f$ 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望. 这是因为对每个 $F \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$ 均有 $F \cap A \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$, 于是

$$\int_F 1_A f d\mu = \int_{F \cap A} f d\mu = \int_{F \cap A} g d\mu = \int_F 1_A g d\mu.$$

例 13.19 (作用有界算子)

若 $f \in L^0(S; X)$ 存在关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望 g , $T: X \rightarrow Y$ 是有界算子, 则 Tg 是 Tf 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望. 该结果的证明类似于前例, 这里只需用到 $\mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g \subset \mathcal{F}_{Tf} \cap \mathcal{F}_{Tg}$.

上例特别标明对每个 $x^* \in X^*$ 而言, 函数 $\langle g, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 都是 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的条件期望.

例 13.20 (平均)

对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 记 $\mathcal{F}_n$ 是二进方体族 $Q_k^n = 2^{-n}(k + [0, 1)^d) (k \in \mathbb{Z}^d)$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中生成的 σ 代数. 显见函数 $f \in L^0(\mathbb{R}^d; X)$ 关于 $\mathcal{F}_n$ σ 可积当且仅当 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d; X)$, 此时 f 关于 $\mathcal{F}_n$ 的条件期望存在, 其表为:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \left(\frac{1}{|Q_k^n|} \int_{Q_k^n} f(x) dx \right) 1_{Q_k^n}.$$

例 13.21 (函数的偶部分)

设 $f \in L^0(\mathbb{R}; X)$, 其中在 $\mathbb{R}$ 上取 Borel σ 代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与 Lebesgue 测度. 记 $\mathcal{F} = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : -B = B\}$, 则 $g: \mathbb{R} \rightarrow X, t \mapsto g(t) = \frac{1}{2}(f(t) + f(-t))$ 是 f 在 $\mathcal{F}$ 上的条件期望. 这是因为 $g \in L^0(S, \mathcal{F}; X)$, $\mathcal{F}_f \subset \mathcal{F}_g$, 且对每个 $B \in \mathcal{F}_f = \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$ 均有

$$\int_B f(t) dt = \int_B f(-t) dt = \int_B g(t) dt.$$

13.6.1 唯一性

本小节证明条件期望的唯一性. 我们首先从一些标量函数的引理入手. 取定测度空间 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mu)$, 设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 是子 σ 代数.

引理 13.29

给定 $f \in L^0(S, \mathcal{F})$, 设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}_f$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想. 若对全体 $C \in \mathcal{C}$ 均有 $\int_C f d\mu \geq 0$ (或 $= 0$, 或 ≤ 0), 则 $f \geq 0$ (或 $= 0$, 或 ≤ 0) a.e.. ♡

证明 对 f 的任意 $\mathcal{F}$ -可测表示, 均有 $F_k := \{f < -1/k\} \in \mathcal{F} (\forall k \geq 1)$. 现对取定的 $C \in \mathcal{C}$ 知 $C \cap F_k \in \mathcal{C}$, 于是 f

在该集合上的可积性表明 $\mu(C \cap F_k) < \infty$, 且

$$0 \leq \int_{C \cap F_n} f d\mu \leq -\frac{1}{k} \mu(C \cap F_k) \leq 0,$$

故只能有 $\mu(C \cap F_n) = 0$. 因为 $\{f < 0\} = \bigcup_{k \geq 1} F_k$, 故 $\mu(C \cap \{f < 0\}) = 0$. 令 C 跑遍 S 的可数覆盖即知 $\mu(\{f < 0\}) = 0$, 此即 $f \geq 0$ a.e..

对于 ≤ 0 的假设, 只需将前文的 f 改为 $-f$ 即可. 结合这两种情形即得 $= 0$ 的情形. $\square$

引理 13.30

设 $f \in L^0(S)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积. 若 $g \in L^0(S)$ 是 f 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望, 则 $\mathcal{F}_f \subset \mathcal{F}_g$, 且

$$\int_F f d\mu = \int_F g d\mu, \quad \forall F \in \mathcal{F}_f. \quad (13.60)$$

证明 如果 f, g 是复值函数, 知 $\mathcal{F}_f = \mathcal{F}_{\operatorname{Re} f} \cap \mathcal{F}_{\operatorname{Im} f}$, $\mathcal{F}_g = \mathcal{F}_{\operatorname{Re} g} \cap \mathcal{F}_{\operatorname{Im} g}$, 由此可见 $\operatorname{Re} g, \operatorname{Im} g$ 分别是 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ 的条件期望, 因此只需证明实值函数情形即可.

根据命题 13.26, $\mathcal{C} = \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 因此可取集列 $\{C_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{C}$ 覆盖 S . 进一步根据定义 13.16 后的观察, 可取 C_n 彼此不交.

现取定 $F \in \mathcal{F}_f$, 取 g 的 $\mathcal{F}$ -可测表示, 知 $\{g \geq 0\} \in \mathcal{F}$, 故 $F \cap C_n \cap \{g \geq 0\} \in \mathcal{C}$, 且

$$\int_{F \cap C_n \cap \{g \geq 0\}} g d\mu = \int_{F \cap C_n \cap \{g \geq 0\}} f d\mu.$$

上式两端关于 n 求和, 对左式用单调收敛定理, 右式用控制收敛定理可知

$$\int_{F \cap \{g \geq 0\}} g d\mu = \int_{F \cap \{g \geq 0\}} f d\mu.$$

同理可证 $\int_{F \cap \{g < 0\}} g d\mu = \int_{F \cap \{g < 0\}} f d\mu$, 故

$$\begin{aligned} \int_F |g| d\mu &= \int_{F \cap \{g \geq 0\}} g d\mu - \int_{F \cap \{g < 0\}} g d\mu \\ &= \int_{F \cap \{g \geq 0\}} f d\mu - \int_{F \cap \{g < 0\}} f d\mu \leq \int_F |f| d\mu < \infty, \end{aligned}$$

且

$$\int_F d\mu = \int_{F \cap \{g \geq 0\}} g d\mu + \int_{F \cap \{g < 0\}} g d\mu = \int_F f d\mu.$$

上述第一式表明 $F \in \mathcal{F}_g$ (进而 $\mathcal{F}_f \subset \mathcal{F}_g$), 第二式即 (13.60).

在证明条件期望唯一性之前, 我们还需要前两条引理的下述有用推论:

引理 13.31

设 $f_1, f_2 \in L^0(S)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, $g_1, g_2 \in L^0(S)$ 分别是这两个函数关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望. 若 $f_1 \leq f_2$ a.e., 则 $g_1 \leq g_2$ a.e.. $\heartsuit$

证明 在引理条件下, 例 13.17 表明 $g := g_2 - g_1$ 是非负函数 $f := f_2 - f_1$ 的条件期望, 因此只需证明 g 非负即可. 由引理 13.30 知对全体 $F \in \mathcal{F}_f$ 均有 $\int_F g d\mu = \int_F f d\mu \geq 0$.

$$\int_F g d\mu = \int_F f d\mu \geq 0.$$

进一步对 g 与 $\mathcal{C} = \mathcal{F}_f$ 应用引理 13.29 即得 $g \geq 0$ a.e.. $\square$

定理 13.21 (条件期望的唯一性)

设 $f \in L^0(S; X)$ 关于 $\mathcal{F}$ σ 可积. 若 $g \in L^0(S; X), \tilde{g} \in L^0(S; X)$ 都是 f 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望, 则 $g = \tilde{g}$ a.e.. $\heartsuit$

证明 任取 $x^* \in X^*$, 由例 13.19 知 $\langle g, x^* \rangle_{X \times X^*}, \langle \tilde{g}, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 都是 $\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 的条件期望. 另由引理 13.30 知对全

体 $F \in \mathcal{F}_{\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}}$ 均有 $F \in \mathcal{F}_{\langle g, x^* \rangle_{X \times X^*}} \cap \mathcal{F}_{\langle \tilde{g}, x^* \rangle_{X \times X^*}}$, 故

$$\int_F \langle g, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu = \int_F \langle f, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu = \int_F \langle \tilde{g}, x^* \rangle_{X \times X^*} d\mu.$$

对 $\langle g - \tilde{g}, x^* \rangle_{X \times X^*}$ 与 $\mathcal{C} = \mathcal{F}_{\langle f, x^* \rangle_{X \times X^*}}$ 用引理 13.29 即知 $\langle g, x^* \rangle_{X \times X^*} = \langle \tilde{g}, x^* \rangle_{X \times X^*}$, 进一步由推论 12.11 立得待证结论. $\square$

上述结果说明只要 σ 可积函数 $f \in L^0(S; X)$ 的条件期望存在, 它作为 $L^0(S; \mathcal{F}; X)$ 中的元素就必唯一. 之后我们记 σ 可积函数 $f \in L^0(S; X)$ 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望 (在存在时) 为 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F})$.

之后我们还会用到下述放大不等式:

引理 13.32

设 $f \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 上 σ 可积. 若 f 与 $\|f\|_X$ 关于 $\mathcal{F}$ 的条件期望均存在, 则下式 a.e. 成立:

$$\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F})\|_X \leq \mathbb{E}(\|f\|_X|\mathcal{F}).$$



证明 只需证明 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的情形即可. 因为强可测函数 a.e. 在 X 的可分子空间中取值, 故不妨设 X 可分. 设 $\{x_n^*\}_{n \geq 1}$ 是 X^* 中可用于逼近范数的单位向量列.

由例 13.19 知对全体 $n \geq 1$ 而言, $\langle f, x_n^* \rangle_{X \times X^*}$ 的条件期望均存在, 且

$$\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F})\|_X = \sup_{n \geq 1} \langle \mathbb{E}(f|\mathcal{F}), x_n^* \rangle_{X \times X^*} = \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}(\langle f, x_n^* \rangle_{X \times X^*} | \mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(\|f\|_X | \mathcal{F}), \text{ a.e.,}$$

其中最后一步源自引理 13.31 与 $\langle f, x_n^* \rangle_{X \times X^*} \leq \|f\|_X$ a.e.. $\square$

13.6.2 存在性

下面解决条件期望的存在性问题. 和前文一致, 这里取定测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$, 设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ 是子 σ 代数.

定理 13.22 (条件期望的存在性)

若函数 $f \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 则 f 关于 $\mathcal{F}$ 存在条件期望. 此时 f 的条件期望作为 $L^0(S; \mathcal{F}; X)$ 中的元素唯一, 记之为 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F})$, 有 $\mathcal{F}_f \subset \mathcal{F}_{\mathbb{E}(f|\mathcal{F})}$, 且

$$\int_F f d\mu = \int_F \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) d\mu, \quad \forall F \in \mathcal{F}. \quad (13.61)$$

另若 $\{F_n\}_{n \geq 1}$ 是 f 在 $\mathcal{F}$ 中的不交穷竭列, 则

$$\mathbb{E}(f|\mathcal{F}) = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{F_n} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{F_n} f | \mathcal{F}). \quad (13.62)$$



前一小节已经说明过: 常值函数 $\mathbf{1}$ 在 $\mathcal{F}$ 上的 σ 可积性等价于 μ 在 $\mathcal{F}$ 上的 σ 有限性. 这也就是为什么我们只在 σ 有限的 σ 代数上考虑条件期望. 之后我们也会举例说明如果不给 σ 有限性这个条件的话会出现什么反常现象.

定理 13.22 的证明需要分几步进行, 为此我们首先预备下述引理.

引理 13.33 (在 $L^2(S)$ 中的存在性)

若 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 则每个 $f \in L^2(S)$ 关于 $\mathcal{F}$ 都存在唯一条件期望, 该条件期望在 $L^2(S)$ 中, 可表为 Pf , 其中 P 是 $L^2(S) \rightarrow L^2(S, \mathcal{F})$ 的正交投影.



证明 因为 μ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 故集族 $\mathcal{F}_1$ (即常值函数 $h = \mathbf{1}$ 的 $\mathcal{F}_h$) 是 $\mathcal{F}$ 的一个穷竭理想. 由 $f, Pf \in L^2(S)$ 与 Cauchy-Schwarz 不等式知 $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_{Pf}$. 现任取 $F \in \mathcal{F}_1$, 由正交投影的自伴性知

$$\int_F Pf d\mu = \int_S \mathbf{1}_F (Pf) d\mu = \int_S (P\mathbf{1}_F) f d\mu = \int_S \mathbf{1}_F f d\mu = \int_F f d\mu.$$



引理 13.34 (在 $L^1(S)$ 中的存在性)

若 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 则每个 $f \in L^1(S)$ 关于 $\mathcal{F}$ 均存在唯一条件期望, 该条件期望在 $L^1(S)$ 中, 且其满足

$$\begin{aligned}\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F})\|_{L^1(S)} &\leq \|f\|_{L^1(S)}, \\ \int_F \mathbb{E}(f|\mathcal{F})d\mu &= \int_F fd\mu, \quad \forall F \in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

♡

证明 首先设 $f \in L^1(S) \cap L^\infty(S)$, 此时 $f, |f| \in L^2(S)$, 故由引理 13.33 知它们的条件期望均存在, 且由引理 13.32 知

$$\int_S |\mathbb{E}(f|\mathcal{F})|d\mu \leq \int_S \mathbb{E}(|f||\mathcal{F})d\mu = \int_S |f|d\mu,$$

其中最后一步源自 (13.60) 与 $f \in L^1(S) \Rightarrow S \in \mathcal{F}_{|f|}$.

现在已经说明了条件期望在 $L^1(S)$ 的稠子空间 $L^1(S) \cap L^\infty(S)$ 中依 L^1 范数成为映入闭子空间 $L^1(S, \mathcal{F})$ 的压缩算子, 因此该算子能唯一延拓为 $L^1(S) \rightarrow L^1(S, \mathcal{F})$ 的压缩算子, 记之为 P , 下面证明对每个 $f \in L^1(S)$ 而言 Pf 都是 f 的条件期望. 现设 $f_n = \mathbf{1}_{\{|f| \leq n\}}f$, 知 $f_n \in L^1(S) \cap L^\infty(S)$, $f_n \rightarrow f$ ($L^1(S)$), 且对全体 $F \in \mathcal{F}$ 均有

$$\begin{aligned}\int_F Pf d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F Pf_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F})d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n d\mu = \int_F f d\mu,\end{aligned}$$

其中倒数第二步用到了 (13.60) 与 $\mathcal{F}_{f_n} = \mathcal{F}$. □

给出标量结果后, 下面可以考虑向量值情形了:

定理 13.23 ($L^1(S; X)$ 中的存在性)

若 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 则每个 $f \in L^1(S; X)$ 均关于 $\mathcal{F}$ 存在唯一条件期望, 该条件期望在 $L^1(S; X)$ 中, 且满足

$$\begin{aligned}\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F})\|_{L^1(S; X)} &\leq \|f\|_{L^1(S; X)}, \\ \int_F \mathbb{E}(f|\mathcal{F})d\mu &= \int_F fd\mu, \quad \forall F \in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

♡

证明 由引理 13.34 知算子 $\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{F})$ 是在 $L^1(S)$ 上良定义的压缩算子, 且由引理 13.31 知 $\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{F})$ 是正算子. 故由定理 13.1 知 $\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{F})$ 能延拓为 $L^1(S; X)$ 上的压缩算子. 为验证该延拓确实是 $L^1(S; X)$ 上的条件期望算子, 注意由条件期望的定义立得 $\mathbb{E}(g \otimes x|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(g|\mathcal{F}) \otimes x$, 故对 μ -简单函数而言该延拓算子确为条件期望. 仿照引理 13.34 的过程, 用 μ -简单函数列逼近 f 即得一般情形的验证.

同样由引理 13.34 知待证不等式与等式对 μ -简单函数成立, 进而考虑 μ -简单函数的逼近立得待证结果. □

现在可以证明定理 13.22 了.

证明 首先证明只要 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 则在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积的每个 $f \in L^0(S; X)$ 都关于 $\mathcal{F}$ 存在条件期望.

取定 f 在 $\mathcal{F}$ 中的不交穷竭列 $\{F_n\}_{n \geq 1}$. 因为定理 13.23 表明可积函数必存在条件期望, 故函数 $\sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{F_n} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{F_n} f|\mathcal{F})$ 良定义. 由命题 13.26 知 $\mathcal{C}_n = \mathcal{F}_{\mathbf{1}_{F_n} f} \cap \mathcal{F}(\mathbb{E}(\mathbf{1}_{F_n} f|\mathcal{F}))$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 进而容易验证 $\mathcal{C} := \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{C}_n|_{F_n}$ 是 $\mathcal{F}$ 的穷竭理想, 其中 $\mathcal{C}_n|_{F_n} := \{C \cap F_n : C \in \mathcal{C}_n\}$, 这说明函数 $\sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{F_n} \mathbb{E}(\mathbf{1}_{F_n} f|\mathcal{F})$ 是 f 的一个条件期望.

现在只需验证 (13.61) 了. 任取 $F \in \mathcal{F}_f$, 知 $\mathbf{1}_F f \in L^1(S; X)$, 于是定理 13.23 表明该函数存在条件期望 $h \in L^1(S; X)$, 且

$$\int_S h d\mu = \int_S \mathbf{1}_F f d\mu = \int_F f d\mu.$$

另一方面, 由例 13.18 知 $\mathbf{1}_F f$ 的条件期望 h 实际上是 $\mathbf{1}_F \mathbb{E}(f|\mathcal{F})$, 故 $\mathbf{1}_F \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) \in L^1(S; X)$, 且

$$\int_F \mathbb{E}(f|\mathcal{F})d\mu = \int_S h d\mu = \int_F f d\mu.$$

□

条件期望不存在的例子

下面说明 μ 在 $\mathcal{F}$ 不 σ 有限时, 就算是对 (在任意子 σ 代数上都 σ 可积的) 函数 $f \in L^1(S)$ 而言, 条件期望也可能不存在.

例 13.22

设 S 是带孤立点 s_1 , 赋测度 μ 的集合, 且 μ 满足 $\mu\{s_1\} = 1, \mu(S \setminus \{s_1\}) = \infty$. 容易验证函数 $f(s_1) = a, f(s) = 0 (s \neq s_1)$ 在 $\mathcal{F} = \{\emptyset, S\}$ 上 σ 可积, 但 f 关于 $\mathcal{F}$ 有条件期望当且仅当 $a = 0$ (即 f 及其条件期望均为零值函数). 这是因为根据 f 的积分性质知条件期望必为常值函数, 又由条件期望的强 μ -可测性知 f 的条件期望只能是零值函数. 如果 $a \neq 0$, (13.58) 就不再成立了.

13.6.3 条件极限定理

下面讨论积分学中基本极限定理的条件期望版本. 这些结果的证明和它们的原始版本思路是一样的: 我们还是先证明单调收敛定理, 再证明 Fatou 引理, 最后证明控制收敛定理.

定理 13.24 (条件单调收敛)

设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $L^0(S)$ 中的非负不减函数列, $f \in L^0(S)$ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 且 μ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限. 若 $f_n \uparrow f$ a.e., 则 $\{\mathbb{E}(f_n|\mathcal{F})\}$ 与 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F})$ 均存在, 且

$$\mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}) \uparrow \mathbb{E}(f|\mathcal{F}).$$



证明 因为 f_n 非负, 且 f 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 故全体 f_n 在 $\mathcal{F}$ 上均 σ 可积, 进而定理 13.22 表明 $\mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}), \mathbb{E}(f|\mathcal{F})$ 均存在.

因为条件期望算子是单调正算子, 故下述不等式 a.e. 成立:

$$0 \leq \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(f_{n+1}|\mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(f|\mathcal{F}).$$

故 $\{\mathbb{E}(f_n|\mathcal{F})\}_{n \geq 1}$ 是 a.e. 有界不减列, 从而该序列存在 a.e. 点态极限 $g \in L^0(S, \mathcal{F})$, 且 $0 \leq g \leq \mathbb{E}(f|\mathcal{F})$. 下面只需说明 $g = \mathbb{E}(f|\mathcal{F})$.

对全体 $F \in \mathcal{F}_f$ 而言, 均有 $F \in \mathcal{F}_{f_n}$, 故

$$\int_F g d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n d\mu = \int_F f d\mu,$$

其中第一步和最后一步源自经典的单调收敛定理. □

注意条件单调收敛定理中 f 的 σ 可积性不能忽略:

例 13.23

设 $S = (0, 1)$ 上赋 Borel σ 代数与 Lebesgue 测度, 记 $\mathcal{F} = \{\emptyset, (0, 1)\}$, 考虑函数 $f(t) = 1/t, f_n(t) = \mathbf{1}_{(1/n, 1)} f$. 显见每个 f_n 都关于 $\mathcal{F}$ 存在条件期望, 但 f 关于 $\mathcal{F}$ 并没有条件期望.

定理 13.25 (条件 Fatou 引理)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $L^0(S)$ 中的非负函数列, $f \in L^0(S)$, 且 $\{f_n\}, f$ 均在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积. 若 $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ a.e., 则下述不等式 a.e. 成立:

$$\mathbb{E}(f|\mathcal{F}) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}).$$



证明 取 $\phi_n := \inf_{m \geq n} f_m$, 知 $0 \leq \phi_n \uparrow f = \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} f_m$. 由条件单调收敛定理即知:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) &= \mathbb{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n|\mathcal{F}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\phi_n|\mathcal{F}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} \mathbb{E}(f_m|\mathcal{F}) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}). \end{aligned}$$

上式中的不等号 $\leq$ 源自对全体 $m \geq n$ 均有 $\phi_n \leq f_m$, 因此对全体 $m \geq n$ 均有 $\mathbb{E}(\phi_n|\mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(f_m|\mathcal{F})$.

定理 13.26 (条件控制收敛)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $L^0(S; X)$ 中满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e. 的序列, 且存在在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积的函数 $g \in L^0(S)$ 使得 $\|f_n\|_X \leq g$ a.e., 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\|f_n - f\|_X|\mathcal{F})$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F})$ 均 a.e. 存在, 且 a.e. 满足下述结果:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\|f_n - f\|_X|\mathcal{F}) &= 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}) &= \mathbb{E}(f|\mathcal{F}).\end{aligned}$$



证明 由 f_n 被在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积的函数 g a.e. 控制知 f_n 与 f 均在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 进而定理 13.22 表明 f 与 f_n 均存在唯一条件期望.

记 $g_n := \|f_n - f\|_X$, 由 $f_n \rightarrow f$ a.e. 知 $g_n \rightarrow 0$ a.e., 另由 $\|f_n\|_X \leq g$ a.e. 知 $0 \leq g_n \leq 2g$ a.e.. 设 $\psi_n = \sup_{m \geq n} g_m$, 则在 a.e. 意义下有 $0 \leq \psi_n \leq 2g$ 与 $\psi_n \downarrow 0$, 进而条件单调收敛定理表明 $\mathbb{E}(2g - \psi_n|\mathcal{F}) \uparrow \mathbb{E}(2g|\mathcal{F})$ a.e., 故 $n \rightarrow \infty$ 时 $\mathbb{E}(\psi_n|\mathcal{F}) \downarrow 0$ a.e.. 又因为 $0 \leq g_n \leq \psi_n$, 故 $\mathbb{E}(g_n|\mathcal{F}) \downarrow 0$ a.e., 由引理 13.32 即得待证结果. $\square$

13.6.4 条件期望满足的不等式与等式

条件期望的下述关键不等式实际上是命题 12.11 的条件期望版本, 它推广了引理 13.32.

命题 13.27 (条件 Jensen 不等式)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是下半连续凸函数, $f \in L^0(S; X)$ 满足 f 与 $\phi \circ f$ 均在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 则下式 a.e. 成立:

$$\phi \circ \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(\phi \circ f|\mathcal{F}).$$



证明 因为 f 作为可测函数至少 a.e. 可分取值, 故不妨设 X 可分, 此时引理 12.3 表明存在 $X \rightarrow \mathbb{R}$ 的仿射函数列 $\phi_i(x) = \text{Re}\langle x, y_i^* \rangle_{X \times X^*} + a_i$ 使得 $\phi(x) = \sup_i \phi_i(x)$, 于是

$$\phi \circ \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) = \sup_i \phi_i \circ \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) = \sup_i \mathbb{E}(\phi_i \circ f|\mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(\phi \circ f|\mathcal{F}) \text{ a.e..}$$

$\square$

推论 13.13 (L^p 压缩性)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $p \in [1, \infty)$, $f \in L^p(S; X)$, 则 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F})$ 存在, 且其 a.e. 满足下述不等式:

$$\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F})\|_X^p \leq \mathbb{E}(\|f\|_X^p|\mathcal{F}). \quad (13.63)$$

特别有 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F}) \in L^p(S; X)$, 且

$$\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F})\|_{L^p(S; X)} \leq \|f\|_{L^p(S; X)}.$$



证明 由命题 13.25 知 f 与 $\|f\|_X^p$ 均在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, 进而 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F})$ 与 $\mathbb{E}(\|f\|_X^p|\mathcal{F})$ 均存在. 现对 $\phi(x) = \|x\|_X^p$ 应用条件 Jensen 不等式即得 (13.63), 再对 (13.63) 两端积分并对右式应用引理 13.34 即得 L^p 范数控制. $\square$

接下来预备几条常用的条件期望恒等式. 在接下来的命题 13.28, 13.29 中, 设 X_1, X_2, Y 是 Banach 空间, 映射

$$\beta: X_1 \times X_2 \rightarrow Y$$

是有界双线性映射. 这种映射的典例有下述两条:

$$X_1 = \mathbb{K}, X_2 = X, Y = X, \beta(c, x) = cx; \quad (\text{标量乘积})$$

$$X_1 = X, X_2 = X^*, Y = \mathbb{K}, \beta(x, x^*) = \langle x, x^* \rangle_{X \times X^*}. \quad (\text{对偶})$$

命题 13.28 (提出 $\mathcal{F}$ -可测的项)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $g \in L^0(S; \mathcal{F}; X_1)$, 且 $f \in L^0(S; X_2)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 则 $\beta(g, f) \in L^0(S; Y)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 且下述等式 a.e. 成立:

$$\mathbb{E}(\beta(g, f)|\mathcal{F}) = \beta(g, \mathbb{E}(f|\mathcal{F})).$$



证明 由 f 的 σ 可积性知 $\mathcal{F}_f$ 中存在穷竭列 $\{F_i\}_i$, 进一步由 β 有界知函数 $\beta(g, f)$ 在每个 $F_i \cap \{\|g\|_{X_1} \leq j\} \in \mathcal{F}$ 上均可积, 后者依 i, j 成为 S 的一个可数覆盖, 故 $\beta(g, f)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 因此定理 13.22 表明 $\mathbb{E}(\beta(g, f)|\mathcal{F})$ 至少存在唯一.

为证待证等式, 简便起见先考虑 $g = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{1}_{F_i}$ 的情形, 此时对 $F \in \mathcal{F}_f \subset \mathcal{F}_{\mathbb{E}(f|\mathcal{F})}$ 有:

$$\begin{aligned} \int_F \beta(g, \mathbb{E}(f|\mathcal{F})) d\mu &= \sum_{i=1}^n \beta\left(x_i, \int_{F \cap F_i} \mathbb{E}(f|\mathcal{F}) d\mu\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \beta\left(x_i, \int_{F \cap F_i} f d\mu\right) = \int_F \beta(g, f) d\mu. \end{aligned}$$

又因为 $\mathcal{F}_f$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个穷竭理想, 故 $\beta(g, \mathbb{E}(f|\mathcal{F}))$ 是 $\beta(f, g)$ 的条件期望.

对于一般情形, 根据强 μ -可测的定义知可取简单函数列

$$g_n \in L^0(S, \mathcal{F}; X_1)$$

使得 $g_n \rightarrow g$ 点态成立, 且 $\|g_n\|_{X_1} \leq \|g\|_{X_1}$. 由 β 有界进一步知

$$\begin{aligned} \beta(g_n, f) &\rightarrow \beta(g, f), \\ \beta(g_n, \mathbb{E}(f|\mathcal{F})) &\rightarrow \beta(g, \mathbb{E}(f|\mathcal{F})), \end{aligned}$$

且

$$\|\beta(g_n, f)\|_Y \leq \|\beta\|_{X_1 \times X_2 \rightarrow Y} \cdot \|g_n\|_{X_1} \cdot \|f\|_{X_2} \leq \|\beta\|_{X_1 \times X_2 \rightarrow Y} \cdot \|g\|_{X_1} \cdot \|f\|_{X_2}.$$

另一方面, 利用穷竭列 $F_i \cap \{\|g\|_{X_1} \leq j\}$ 可说明 $\|\beta\|_{X_1 \times X_2 \rightarrow Y} \cdot \|g\|_{X_1} \cdot \|f\|_{X_2}$ 同样在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 故由条件控制收敛定理知

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\beta(g, f)|\mathcal{F}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\beta(g_n, f)|\mathcal{F}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \beta(g_n, \mathbb{E}(f|\mathcal{F})) = \beta(g, \mathbb{E}(f|\mathcal{F})). \end{aligned}$$

□

上述结果还能拓展成 g 为算子值函数的情形, 这会在下一章的引理??中讨论.

作为命题 13.28 的一个应用, 下面证明条件期望的自伴性.

命题 13.29 (自伴性)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $f_1 \in L^0(S; X_1), f_2 \in L^0(S; X_2)$ 均在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积. 若 $\beta(f_1, \mathbb{E}(f_2|\mathcal{F})), \beta(f_2, \mathbb{E}(f_1|\mathcal{F}))$ 均在某个 $F \in \mathcal{F}$ 上可积, 则 $\beta(\mathbb{E}(f_1|\mathcal{F}), \mathbb{E}(f_2|\mathcal{F}))$ 也在同一集合上可积, 且

$$\int_F \beta(f_1, \mathbb{E}(f_2|\mathcal{F})) d\mu = \int_F \beta(\mathbb{E}(f_1|\mathcal{F}), f_2) d\mu = \int_F \beta(\mathbb{E}(f_1|\mathcal{F}), \mathbb{E}(f_2|\mathcal{F})) d\mu.$$



证明 记 $g_i := \mathbb{E}(f_i|\mathcal{F}) (i = 1, 2)$. 由命题 13.28 知 $\beta(f_1, g_2)$ 关于 $\mathcal{F}$ 存在条件期望:

$$\mathbb{E}(\beta(f_1, g_2)|\mathcal{F}) = \beta(g_1, g_2).$$

根据条件, 上左式在 $F \in \mathcal{F}_{\beta(f_1, g_2)} \cap \mathcal{F}_{\beta(g_1, g_2)}$ 上可积, 进而上右式在同一集合上可积, 且

$$\int_F \beta(f_1, g_2) d\mu = \int_F \mathbb{E}(\beta(f_1, g_2)|\mathcal{F}) d\mu = \int_F \beta(g_1, g_2) d\mu.$$

显见 f_1, f_2 地位相当, 交换 f_1, f_2 的位置即得另一待证等式.

□

命题 13.30 (幂次性质)

设 μ 在子 σ 代数 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 上 σ 有限. 若 $h \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{G}$ 上 σ 可积, 则其条件期望存在且满足:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(h|\mathcal{F})|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(h|\mathcal{G}).$$



注 如果去掉在 $\mathcal{G}$ 上的 σ 有限性条件, 是可能会出现 $\mathbb{E}(h|\mathcal{F})$ 与 $\mathbb{E}(h|\mathcal{G})$ 只有一个存在的情形的. 比如设 $(S, \mathcal{A}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), dx)$, $\mathcal{G} = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$, $\mathcal{F} = \sigma([0, \infty))$, $h(t) = \text{sgn}(t)/(1+t^2)$, 则 $\mathbb{E}(h|\mathcal{G}) = 0$, 同时 $\mathbb{E}(h|\mathcal{F})$ 不存在. 再比如对同样的 $\mathcal{G}$ 设 $\mathcal{F} = \sigma(\{[k, k+1), k \in \mathbb{Z}\})$, $h = \mathbf{1}$, 则 $\mathbb{E}(h|\mathcal{F}) = h$, 但 $\mathbb{E}(h|\mathcal{G})$ 不存在. 注意第二个例子中测度 dx 就只在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限.

证明 因为 h 在 $\mathcal{G}$ 上 σ 可积 (进而也在 $\mathcal{F}$ 上可积), 且 μ 在 $\mathcal{G}$ 上 σ 有限 (进而也在 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限), 故由定理 13.22 知 $g := \mathbb{E}(h|\mathcal{G})$, $f := \mathbb{E}(h|\mathcal{F})$ 均存在. 又因为

$$\mathcal{G}_f = \mathcal{F}_f \cap \mathcal{G} \supset \mathcal{F}_h \cap \mathcal{G} = \mathcal{G}_h,$$

故 f 在 $\mathcal{G}$ 上 σ 可积, 于是 f 同样存在条件期望.

现在任取 $G \in \mathcal{G}_h \subset \mathcal{F}_h$, 知

$$\int_G g d\mu = \int_G \mathbb{E}(h|\mathcal{G}) d\mu = \int_G h d\mu = \int_G \mathbb{E}(h|\mathcal{F}) d\mu = \int_G f d\mu,$$

故 g 是 f 关于 $\mathcal{G}$ 的条件期望. □

一致可积性与条件期望**定义 13.17 (一致可积)**

设 $1 \leq p < \infty$, 称子集 $T \subset L^p(S; X)$ 一致 p -可积 (或在 $p=1$ 时简称一致可积), 如果

(i) 对全体 $\varepsilon > 0$ 均存在 $r > 0$ 使得

$$\sup_{f \in T} \int_S \mathbf{1}_{\{\|f\|_X > r\}} \|f\|_X^p d\mu \leq \varepsilon.$$

(ii) 对全体 $\varepsilon > 0$ 均存在有限测度集 $B \in \mathcal{A}$ 使得

$$\sup_{f \in T} \int_{B^c} \|f\|_X^p d\mu \leq \varepsilon.$$



注意 (ii) 在 μ 是有限测度时自动成立. l^1 中的标准单位向量满足 (i) 但不满足 (ii).

例 13.24

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间, $1 < p < \infty$, 本例说明 $L^p(S)$ 中的任意有界集 T 均一致可积. 为此记 $C := \sup_{f \in T} \int_S |f|^p d\mu < \infty$, 在集合 $\{|f| > r\}$ 上知 $|f| \leq |f|^p/r^{p-1}$, 于是

$$\sup_{f \in T} \int_S \mathbf{1}_{\{|f| > r\}} |f| d\mu \leq \sup_{f \in T} \int_S |f|^p / r^{p-1} d\mu = C/r^{p-1} \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty.$$

命题 13.31

集合 $T \subset L^1(S)$ 一致可积当且仅当该集合在 $L^1(S)$ 中有界, 满足定义 13.17(ii), 且对每个 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\delta > 0$ 使得对全体 $A \in \mathcal{A}$ 均有

$$\mu(A) < \delta \Rightarrow \sup_{f \in T} \int_A |f| d\mu \leq \varepsilon.$$



注 注意有界性条件在这里不能省略, 反例可验证 $\{ne_n : n \geq 1\} \subset l^1$, 其中 e_n 是第 n 个标准单位向量.

证明 $\Leftarrow$: 任取 $\varepsilon > 0$, 依条件取 $\delta > 0$, 记 $C := \sup_{f \in T} \|f\|_{L^1(S)}$, 取 $r > C/\delta$, 则 $\mu(|f| > r) \leq C/r < \delta$, 此时对 $A = \{|f| > r\}$ 应用条件即得定义 13.17(i).

$\Rightarrow$: 任取 $\varepsilon > 0$, 依定义 13.17(i) 取 $r > 0$ 满足

$$\sup_{f \in T} \int_S \mathbf{1}_{\{|f| > r\}} |f| d\mu \leq \varepsilon.$$

取 $\delta = \varepsilon/r$, 则对全体 $f \in T$ 与 $A \in \mathcal{A}$ 而言, 只要 $\mu(A) < \delta$, 就有

$$\int_A |f| d\mu \leq \int_{A \cap \{|f| > r\}} |f| d\mu + r\mu(A) \leq 2\varepsilon.$$

为证 T 在 $L^1(S)$ 中有界, 取有限 μ 测度集 $B \in \mathcal{A}$ 满足 $\sup_{f \in T} \int_{B^c} |f| d\mu \leq \varepsilon$, 则

$$\|f\|_{L^1(S)} \leq \varepsilon + \int_S \mathbf{1}_{\{|f| > r\}} |f| d\mu + \int_B \mathbf{1}_{\{|f| \leq r\}} |f| d\mu \leq 2\varepsilon + r\mu(B).$$

□

下述结果是一致可积性定义与命题 13.31 的直接推论:

命题 13.32

(i) 任意单点集均一致可积.

(ii) 若 T_1, T_2 一致可积, 则它们的代数和

$$T_1 + T_2 := \{f_1 + f_2 : f_1 \in T_1, f_2 \in T_2\}$$

一致可积.

(iii) 若 T 一致可积, 则其控制包^a

$$\{g : \exists f \in T \text{ s.t. } |g| \leq |f| \text{ a.e.}\}$$

一致可积.

^a原文是 solid hull, 这里我不知道标准译法是什么, 只好自己起了个名字了.

♠

注 注意 (i) 等价于说 $\nu(A) := \int_A |f| d\mu$ 定义了绝对连续测度.

下面给出一个在一致可积条件下成立的收敛性结果, 为此首先预备依测度收敛的相关结果. 回忆依测度收敛的标准定义:

定义 13.18

设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是定义在测度空间 S 上的标量值可测函数列.

(i) 称 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ μ -a.s. 收敛到 f , 如果存在 μ -零测集 $N \in \mathcal{A}$ 使得 $f_n \rightarrow f$ 在 $S \setminus N$ 上点态成立.

(ii) 称 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 依 μ -测度收敛到 f , 如果对全体 $r > 0$ 与全体有限测度集 $A \in \mathcal{A}$ 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap \{|f_n - f| > r\}) = 0.$$

(iii) 称 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是依 μ -测度 Cauchy 列, 如果对全体 $r > 0$ 与全体有限测度集 $A \in \mathcal{A}$ 均有

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \mu(A \cap \{f_n - f_m > r\}) = 0.$$

♣

之后在测度很明确的时候我们就省略 μ -这个前缀了.

引理 13.35

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ σ 有限, $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 S 上的标量值可测函数列. 如哦 $f_n \rightarrow f$ a.s., 则 $f_n \rightarrow f$ 依测度成立.

♥

证明 取 $r > 0$, 设 $A \in \mathcal{A}$ 是有限测度集, 则由控制收敛定理立知 $\mu(A \cap \{|f_n - f| > r\}) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

□

反之还有下述结果成立:

引理 13.36

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ σ 有限, $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 S 上的依测度标量值可测函数 Cauchy 列, 则存在 S 上的可测函数 f 与子列 $\{f_{n_k}\}_{k \geq 1}$ 使得 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e..

♥

证明 设 $A \in \mathcal{A}$ 是有限测度集, 下面断言

$$\lim_{n,m \rightarrow \infty} \int_S |f_n - f_m| \wedge \mathbf{1}_A d\mu = 0.$$

为证该断言, 任取 $\varepsilon > 0$, 取足够小的 $r \in (0, 1)$ 满足 $r\mu(A) < \varepsilon$, 则

$$\begin{aligned} \int_S |f_n - f_m| \wedge \mathbf{1}_A d\mu &\leq \mu(A \cap \{|f_n - f_m| > r\}) + \int_{A \cap \{|f_n - f_m| \leq r\}} r d\mu \\ &< \mu(A \cap \{|f_n - f_m| > r\}) + \varepsilon. \end{aligned}$$

因为 $\{f_n\}$ 是依测度 Cauchy 列, 故上右式第一项在 $n, m \rightarrow \infty$ 时趋零, 再由 ε 的任意性即证断言.

现设 $S^{(1)} \subset S^{(2)} \subset \dots$ 是 μ 的一个穷竭列, 由前述断言知存在 $n_1 < n_2 < \dots$ 使得 $k \geq j$ 时

$$\int_S |f_{n_k} - f_{n_j}| \wedge \mathbf{1}_{S^{(j)}} d\mu < 2^{-j}.$$

上式表明对全体 $m \geq 1$ 均在 $L^1(S^{(m)})$ 意义下有 $\lim_{j,k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_{n_j}| = 0$, 因此 $\{f_{n_k}\}$ 至少在 $S^{(1)}$ 上存在 a.e. 收敛子列, 进一步重复前述过程知可在该子列中取在 $S^{(2)}$ 上 a.e. 收敛的子列. 重复该过程, 利用对角线论证即得在 S 上 a.e. 收敛的子列. $\square$

回到一致可积性的讨论, 下面讨论一致可积性与收敛性的关系.

命题 13.33

设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是可测函数列, 则 $f_n \rightarrow f$ ($L^1(S)$) 当且仅当 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 一致可积, 且 $f_n \rightarrow f$ 依测度成立.

证明 $\Leftarrow$: 设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 一致可积且 $f_n \rightarrow f$ 依测度成立. 由命题 13.32 知集合 $\{|f_n - f| : n \geq 1\}$ 一致可积, 进而由命题 13.31 知该集合在 $L^1(S)$ 中有界. 又因为 $|f_n - f| \rightarrow 0$ 依测度成立, 故只需考虑 $f = 0$ 的情形. 现任取 $\varepsilon > 0$, 取 $r > 0$ 与有限测度集 $A \in \mathcal{A}$ 使得

$$\|\mathbf{1}_{A^c} f_n\|_{L^1(S)} < \varepsilon, \quad \int_S \mathbf{1}_{\{|f_n| > r\}} |f_n| d\mu \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq 1.$$

由引理 13.36 知存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得 $\mathbf{1}_A f_{n_k} \rightarrow 0$ a.e., 于是

$$\begin{aligned} \|f_{n_k}\|_{L^1(S)} &\leq \varepsilon + \|\mathbf{1}_A f_{n_k}\|_{L^1(S)} \\ &\leq \varepsilon + \int_S \mathbf{1}_{\{|f_{n_k}| > r\}} |f_{n_k}| d\mu + \int_S \mathbf{1}_{\{|f_{n_k}| \leq r\}} \mathbf{1}_A |f_{n_k}| d\mu \\ &\leq 2\varepsilon + \int_S \mathbf{1}_{\{|f_{n_k}| \leq r\}} \mathbf{1}_A |f_{n_k}| d\mu. \end{aligned}$$

由控制收敛定理即知 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|_{L^1(S)} \leq 2\varepsilon$, 进而由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即得待证结果.

$\Rightarrow$: 设 $f_n \rightarrow f$ ($L^1(S)$), 则对 $r > 0$ 有

$$\mu(\{|f_n - f| > r\}) \leq \frac{1}{r} \|f_n - f\|_{L^1(S)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

由此即得依测度收敛性. 为证一致可积性, 由命题 13.32 知只需证明 $\{f_n - f : n \geq 1\}$ 一致可积, 因此不妨设 $f = 0$.

现任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N \geq 1$ 满足对全体 $n \geq N$ 均有 $\|f_n\|_{L^1(S)} < \varepsilon$, 进而对全体 $r > 0$ 而言显见 $\int_{\{|f_n| > r\}} |f_n| d\mu < \varepsilon$ ($\forall n \geq N$). 另对 $1 \leq n \leq N$ 而言, 由命题 13.32(i) 知总存在 $r_n > 0$ 使得 $\int_{\{|f_n| > r_n\}} |f_n| d\mu < \varepsilon$, 取 $r := \max\{r_n : 1 \leq n \leq N\}$ 即得定义 13.17(i).

定义 13.17(ii) 的验证是类似的. 取上述过程中的 N , 对每个 $1 \leq n \leq N$ 由命题 13.32 知总存在有限测度集 $B_n \in \mathcal{A}$ 使得 $\|\mathbf{1}_{B_n^c} f_n\|_{L^1(S)} < \varepsilon$, 故对 $B := \bigcup_{n=1}^N B_n$ 有 $\|\mathbf{1}_{B^c} f_n\|_{L^1(S)} < \varepsilon$ ($\forall n \geq 1$). $\square$

回到向量值情形, 下述结果给出了子 σ 代数族生成的条件期望族的一致 p -可积性:

命题 13.34

设 $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的子 σ 代数族, μ 在 $\mathcal{F} := \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ 上 σ 有限, $1 \leq p < \infty$, 则对全体 $f \in L^p(S; X)$ 而言函数族 $\{\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_i) : i \in I\}$ 均一致 p -可积.

注 这里 $\mathcal{F}$ 的 σ 有限性假设不能弱化为 μ 在每个 $\mathcal{F}_i$ 上均 σ 有限. 比如取 $(S, \mathcal{A}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), dx)$, 记

$$\mathcal{D}_n := \{2^{-n}([0, 1) + k) : k \in \mathbb{Z}\}, n \in \mathbb{Z}$$

为边长为 2^{-n} 的标准二进方体族, $\mathcal{F}_n := \sigma(\mathcal{D}_n)$ 为 $\mathcal{D}_n$ 生成的 σ 代数, 则 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 成为 σ 有限滤子²⁴. 现对 $f := \mathbf{1}_{[0,1)}$ 与 $n \geq 0$, 可设 $f_{-n} := \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_{-n}) = 2^{-n}\mathbf{1}_{[0,2^n)}$. 现在对于有限测度集 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 而言, 随着 $n \rightarrow \infty$, f_n 的大部分正部总会跑到 B 外面, 因此定义 13.17(ii) 没法满足. 注意该滤子的极限情形为 $\mathcal{F} = \{\emptyset, (-\infty, 0), [0, \infty), \mathbb{R}\}$.

证明 由条件 Jensen 不等式知 $\|\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_i)\|_X^p \leq \mathbb{E}(\|f\|_X^p|\mathcal{F}_i)$, 故由命题²⁵13.32 知不妨设 $X = \mathbb{R}, p = 1$, 往证每个 $f \in L^1(S)$ 诱导的函数族 $\{\mathbb{E}(|f||\mathcal{F}_i)\}$ 的一致可积性.

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得只要 $\mu(A) \leq \delta$, 就有 $\int_A |f|d\mu \leq \varepsilon$. 对取定的 $i \in I$, 简记 $g_i := \mathbb{E}(|f||\mathcal{F}_i)$, 记 $r := \|f\|_{L^1(S)}/\delta$, 知 $\mu(|g_i| > r) \leq \|g_i\|_{L^1(S)}/r = \delta$. 因为 $\{|g_i| > r\}$ 首先是 $\mathcal{F}_i$ -可测的, 故

$$\int_S \mathbf{1}_{\{|g_i| > r\}} |g_i| d\mu = \int_S \mathbf{1}_{\{|g_i| > r\}} |f| d\mu \leq \varepsilon.$$

由 μ 在 $\mathcal{F}$ 上的 σ 有限性知可取穷尽 S 的有限测度递增列 $B_k \in \mathcal{F}$, 由控制收敛定理知 $\int_{B_k^c} |f|d\mu \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 现对任取的 $\varepsilon > 0$, 取 $B := B_k$ 足够大使得前述积分不超过 ε , 则由条件 Jensen 不等式与 $\mathcal{F}_i \supset \mathcal{F} \supset B^c$ 上条件期望的定义知

$$\int_{B^c} |\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_i)|d\mu \leq \int_{B^c} \mathbb{E}(|f||\mathcal{F}_i)d\mu = \int_{B^c} |f|d\mu \leq \varepsilon.$$

□

²⁴即 μ 在各 σ 代数上均 σ 有限的单调 σ 代数族, 这个概念会在下一章正式引入.

²⁵25.9.14: 我没看懂这里是怎么用命题 13.32 的. 我想可能是用的 (iii), $X = \mathbb{R}$ 可以理解成只需验证控制包 $\{\mathbb{E}(\|f\|_X^p|\mathcal{F}_i)\}$, 但 $p = 1$ 是怎么归出来的?

第十四章 鞅

本章主要关于鞅论, 所介绍的技术会作为后两章的主要工具. 通过调和与分析中平均与逼近的手段, 我们可以在前一章中发展的 σ 有限测度空间上的条件期望框架下继续进行讨论. 前进鞅和后退鞅¹在后续处理中都会考虑.

在第1节介绍完主要定义后, 第2节主要会介绍极大不等式. 这里我们会给出带非负权重 w 的非负鞅 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 的 Doob 极大不等式的一般形式. 该形式能迅速导出 Hardy-Littlewood 极大不等式与 Fefferman-Stein 极大不等式.

第3节介绍前进鞅与后退鞅的鞅收敛定理. 对 L^1 有界鞅的处理需要前面提到的 Radon-Nikodým 性质.

第4节介绍的 Davis-Gundy 分解定理为第5节的好- λ 不等式作了铺垫. 这两条结果又能导出本章的重点, 即算子值鞅变换的外插定理. 端点情形同时需要奇异积分 Cotlar 不等式的鞅版本.

作为示例, 我们会用算子值鞅变换介绍鞅型与鞅余型不等式中的等价范数. 更重要的是, 我们还会在后续章节说明 Hilbert 变换与更一般的奇异积分算子以及 Fourier 乘子的估计都能划归为要么结构良好, 要么行为良好的鞅变换.

第6节我们会用 Paley-Walsh 鞅证明鞅的一些逼近结果. 这类鞅的结构相对非常简单, 之后我们会用该逼近过程把很多证明中的陈述划归为这类简单鞅类.

本章全章我们都会关注不同鞅不等式中常数的数量行为. 一些情形中我们甚至能确定最佳常数.

14.1 定义与基本性质

设 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $(I, \leq)$ 是序集, X 是 Banach 空间. 回忆定理13.22表明只要 μ 在 $\mathcal{A}$ 的子 σ 代数 $\mathcal{F}$ 上 σ 有限, $f \in L^0(S; X)$ 在 $\mathcal{F}$ 上 σ 可积, 则条件期望 $\mathbb{E}(f|\mathcal{F})$ 存在且作为 $L^0(S; X)$ 中的元素唯一.

定义 14.1 (滤子, 适应性, 鞅)

- (i) 称 $\mathcal{A}$ 的子 σ 代数族 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in I}$ 是 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 中的滤子, 如果 $m, n \in I, m \leq n$ 时总有 $\mathcal{F}_m \subset \mathcal{F}_n$. 若 μ 在每个 $\mathcal{F}_n$ 上均 σ 有限, 就称该滤子 σ 有限.
- (ii) 称 $L^0(S; X)$ 中的函数族 $\{f_n\}_{n \in I}$ 适应于滤子 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in I}$, 如果对每个 $n \in I$ 均有 $f_n \in L^0(S, \mathcal{F}_n; X)$.
- (iii) 称 $L^0(S; X)$ 中的函数族 $\{f_n\}_{n \in I}$ 是关于 σ 有限滤子 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in I}$ 的鞅, 如果该函数族适应于 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in I}$, 且对全体角标 $m \leq n$ 而言函数 f_n 都在 $\mathcal{F}_m$ 上 σ 可积, 且

$$\mathbb{E}(f_n|\mathcal{F}_m) = f_m.$$



¹原文是 forward martingale 和 backward martingale. 我没找到中文对应的翻译, 这里是自己起的名.

参考文献

- [ABAH] A. B. 布林斯基, A. H. 施利亚耶夫. 随机过程论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [CMWS] Camil Muscalu, Wilhelm Schlag. *Classical and Multilinear Harmonic Analysis (Vol.1)*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [CR] Colin Bennett, Robert Sharpley. *Interpolation of Operators*[M]. Florida: Academic Press, Inc., 1988.
- [CY] Cong Wu, Yongjin Li. *On the Triangle Inequality in Quasi-Banach Spaces*[J]. J. Inequal. Pure and Appl. Math., 9(2)(2008), Art. 41, 4 pp.
- [DY] 丁勇. 现代分析基础 (第 2 版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2013.
- [FL] Gerald B. Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.
- [Fou] Jean Baptiste Joseph Fourier. *Théorie analytique de la chaleur*[M]. Paris: Chez Firmin Didot, Père Et Fils, 1822.
- [GAE] G. A. Edgar. *Measurability in a Banach Space*[J]. Indiana University Mathematics Journal. 26(4)(1977), 663-677.
- [HB] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*[M]. New York: Springer, 2011.
- [HJR] Hajer Bahouri, Jean-Yves Chemin, Raphael Danchin. *Fourier Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations*[M]. Berlin: Springer, 2011.
- [JYC] Jean-Yves Chemin. *Localization in Fourier space and Navier-Stokes system*. 2005.
- [KD] Klaus Deimling. *Nonlinear Functional Analysis*[M]. Berlin: Springer, 1985.
- [KY] Kosaku Yosida. *Functional Analysis*[M]. New York: Springer, 1980.
- [LCE] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations: SECOND EDITION*[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.
- [LG1] Loukas Grafakos. *Classical Fourier Analysis*[M]. New York: Springer, 2014.
- [LG2] Loukas Grafakos. *Modern Fourier Analysis*[M]. New York: Springer, 2014.
- [LG3] Loukas Grafakos. *Fundamentals of Fourier Analysis*[M]. New York: Springer, 2024.
- [LPD] 刘培德. 拓扑线性空间与算子谱理论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [LVA] Lars V. Ahlfors. *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*[M]. New York: McGraw-Hill, Inc., 1979.
- [MMD] Mahlon M. Day. *Normed Linear Spaces*[M]. Berlin: Springer, 1970.
- [Miao1] 苗长兴, 张波. 偏微分方程的调和分析方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- [Miao2] 苗长兴. 调和分析及其在偏微分方程中的应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [JD] Javier Duoandikoetxea. *Fourier Analysis*[M]. Rhode Island: American Mathematical Society, 1995.
- [SAPR] S. Alinhac, P. Gerard. 拟微分算子和 Nash-Moser 定理 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.

- [SF] C. Fefferman, Elias M. Stein. *H^p Spaces of Several Variables*[J]. Acta Mathematica. 129(1)(1972), 137-193.
- [ST1] Elias M. Stein, Rami Shakarchi. *Fourier Analysis: An Introduction*[M]. New Jersey: Princeton University Press, 2003.
- [ST4] Elias M. Stein, Rami Shakarchi. *Functional Analysis: Introduction to Further Topics in Analysis*[M]. New Jersey: Princeton University Press, 2011.
- [ST5] Elias M. Stein. *Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality and Oscillatory Integrals*[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1993.
- [ST6] Elias M. Stein. *Note on the class $L \log L$* [J]. Studia Math. 32(1969), 305-310.
- [STW] Elias M. Stein, N. J. Weiss. *An extension of theorem of Marcinkiewicz and some of its applications*[J]. J. Math. Mech. 8(1959), 263-284.
- [SW] L. Schwartz. 广义函数论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [TMA] Tom M. Apostol. *Mathematical Analysis*[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [TJML] Tuomas Hytönen, Jan van Neerven, Mark Veraar, Lutz Weis. *Analysis in Banach Spaces Volume I: Martingales and Littlewood-Paley Theory*[M]. Switzerland: Springer, 2016.
- [UN] Umberto Neri. *Singular Integrals*[M]. Berlin: Springer, 1971.
- [WL] 汪林. 实分析中的反例 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [WR] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*[M]. Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1987.
- [ZGQ] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (第二版)(上)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2021.
- [ZMQ] 周民强. 实变函数论 (第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [Zo] B. A. 卓里奇. 数学分析 (第二卷)(第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.