




更进一步的泛函分析学习笔记

作者：UN

组织：北京师范大学数学科学学院

时间：2024.4.8 起著

模板来源：<https://github.com/ElegantLaTeX/>

封面来源：<https://www.pixiv.net/artworks/67787485>



道虽远，不行不至；事虽难，不为不成。

目录

第一部分 从拓扑空间出发的泛函分析	1
第一章 拓扑空间简介	2
1.1 基本概念	2
1.1.1 开集, 闭集, 邻域系	2
1.1.2 粘着集, 闭包, 内部	4
1.1.3 拓扑空间的比较和拓扑子空间	4
1.1.4 Hausdorff 空间	5
1.2 收敛序列和连续映射	5
1.3 紧性	7
1.4 乘积拓扑	10
第二章 四大定理的回顾	13
2.1 Hahn-Banach 定理	13
2.1.1 Hahn-Banach 定理的解析形式: 线性泛函的延拓	13
2.1.2 Hahn-Banach 定理的几何形式: 凸集的分离	15
2.1.3 双重对偶空间 E^{**} , 正交关系	17
2.1.4 共轭凸函数理论速览	18
2.2 一致有界原理与闭图像定理	24
2.2.1 Baire 纲定理	24
2.2.2 一致有界原理	24
2.2.3 开映射定理与闭图像定理	26
2.2.4 拓扑余子空间, 右 (左) 可逆算子	28
2.2.5 再论正交关系	30
2.2.6 无界线性算子引论, 伴随算子的定义	32
2.2.7 闭像集算子的刻画, 满射算子的刻画	34
第三章 弱拓扑, 自反空间, 可分空间, 一致凸性	37
3.1 使一族映射连续的最粗糙拓扑	37
3.2 弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 的定义与基本性质	38
3.3 弱拓扑, 凸集与线性算子	40
3.4 弱 * 拓扑 $\sigma(E^*, E)$	41
3.5 自反空间	45
3.6 可分空间	49
3.7 一致凸空间	52
3.8 局部凸空间的共轭理论	54
第四章 L^p 空间	58
4.1 关于积分人人须知的结果	58
4.2 L^p 空间的定义与初等性质	59
4.3 L^p 的自反性, 可分性与对偶	60
4.3.1 $1 < p < \infty$ 的情况	60

4.3.2 $p = 1$ 的情况	63
4.3.3 $p = \infty$ 的情况	65
4.4 卷积与正则化	66
4.5 磨光子	68
4.6 L^p 中的强紧性判别法	69
第五章 Hilbert 空间	72
5.1 定义, 初等性质, 到闭凸集上的投影	72
5.2 Hilbert 空间的对偶空间	74
5.3 Stampacchia 定理与 Lax-Milgram 定理	76
5.4 Hilbert 和, 正交基	79
第二部分 算子谱论	82
第六章 紧算子的谱理论	83
6.1 有界线性算子的谱	83
6.2 紧算子	117
6.3 Riesz-Fredholm 定理	141
6.4 紧算子的谱理论	145
6.4.1 紧算子的谱	145
6.4.2 不变子空间	149
6.5 Hilbert-Schmidt 定理	163
第七章 Hille-Yosida 定理	189
7.1 极大单调算子的定义与初等性质	189
7.2 演化方程 $\frac{du}{dt} + Au = 0, u(0) = u_0$ 在 $[0, +\infty)$ 上解的存在性与唯一性	191
7.3 正则性	197
7.4 自伴算子的情形	199
第八章 Banach 代数	202
8.1 代数的预备知识	202
8.2 Banach 代数	211
8.2.1 Banach 代数的定义	211
8.2.2 代数的极大理想与 Gelfand 表示	214
8.3 例子与应用	240
8.4 C^* 代数	254
参考文献	272

第一部分

从拓扑空间出发的泛函分析

第一章 拓扑空间简介

本章选自 [20].

1.1 基本概念

1.1.1 开集, 闭集, 邻域系

定义 1.1 (拓扑, 开集, 拓扑空间)

设 E 是一个集合, 称 E 的子集族 τ (即 $\tau \subset \mathcal{P}(E)$) 是一个拓扑, 如果 τ 满足下述条件:

- (i) $E \in \tau, \emptyset \in \tau$.
 - (ii) τ 中任意多个元素的并仍然是 τ 中的元素 (即满足任意并性质).
 - (iii) τ 中有限个元素的交仍然是 τ 中的元素 (即满足有限交性质).
- 称 τ 中的元素为开集, 称 (E, τ) (或简记为 E) 为拓扑空间.

例 1.1

- (1) $\tau = \{\emptyset, E\}$ 是 E 上的拓扑, 称为平凡拓扑.
- (2) $\tau = \mathcal{P}(E)$ 是 E 上的拓扑, 称为离散拓扑.

例 1.2 (度量空间) 设 E 是一个非空集合, d 是定义在 $E \times E$ 上的实值函数. 若任取 $x, y, z \in E$, 有

- (i) 非负性: $d(x, y) \geq 0$;
- (ii) 正定性: $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- (iii) 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iv) 三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$,

就称 d 是集合 E 上的一个度量 (或称距离), 称 (E, d) 为度量空间.

设 (E, d) 是度量空间, E 上的子集族 τ 定义为: 设 $U \subset E$, 且

$$U \in \tau \Leftrightarrow \forall x \in U \exists r > 0 (B(x, r) \subset U)$$

其中 $B(x, r) = \{y \in E : d(y, x) < r\}$. 则 τ 是 E 上的一个拓扑, 称 τ 为由距离 d 诱导的拓扑.

定义 1.2 (可度量化空间)

若 E 上的拓扑 τ 可由某个距离 d 诱导, 则称 (E, τ) 是一个可度量化空间.

注 1.1 同一个拓扑可以被不同的距离 (乃至无限个距离) 诱导. 如 d 是 E 上的距离, 则 $d, \min\{1, d\}, rd (r > 0)$ 在 E 上诱导的拓扑是一样的.

定义 1.3 (闭集)

设 (E, τ) 是一个拓扑空间, $A \subset E$. 若 A 的补集 A^c 是关于拓扑 τ 的开集, 则称 A 是关于拓扑 τ 的闭集.

由开集和闭集的互补关系立得闭集的下述性质:

定理 1.1 (闭集的基本性质)

设 (E, τ) 是一个拓扑空间, 则

- (i) $E, \emptyset$ 都是闭集;
- (ii) 任意多个闭集的交仍然是闭集 (即闭集满足任意交性质).
- (iii) 有限多个闭集的并仍然是闭集 (即闭集满足有限并性质).

注 1.2 可以用定理 1.1 中的性质 (i)-(iii) 来定义 E 上的拓扑 $\mathcal{F}$, 此时称 $\mathcal{F}$ 中的元素为闭集, 称它们的补集为开集. 特别注意: 无限多个开集的交未必是开集, 无限多个闭集的并未必是闭集.

定义 1.4 (邻域, 邻域系, 邻域基)

设 (E, τ) 是拓扑空间, $x \in E$.

- (i) 若 $V \subset E$ 满足: 存在开集 $U \in \tau$, 使得 $x \in U, U \subset V$, 则称集合 V 为 x 的邻域. 用 $\mathcal{N}(x)$ 表示 x 点处所有邻域构成的集族, 称之为 x 的邻域系.
- (ii) 若 $\mathcal{B}(x)$ 是 $\mathcal{N}(x)$ 的子集族, 且满足对任意 $V \in \mathcal{N}(x)$, 总存在 $U \in \mathcal{B}(x)$ 使得 $U \subset V$, 则称 $\mathcal{B}(x)$ 为 x 的邻域基 (或称基础邻域系).



例 1.3

- (i) $\mathcal{N}(x)$ 是 x 处的邻域基.
- (ii) 含有 x 的所有开集族是 x 的一个邻域基, 但由 x 的所有闭邻域构成的集族未必是 x 的一个邻域基.
- (iii) 设 (E, d) 是一个度量空间, 其拓扑由 d 诱导, $x \in E$, $\mathcal{B}(x)$ 表示所有中心在 x , 半径为 $\frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^+)$ 的开球构成的集族, 则 $\mathcal{B}(x)$ 是 x 的邻域基.

邻域基有下述运算性质:

定理 1.2

设 E 是一个拓扑空间, $x \in E$, 则:

- (i) $V \in \mathcal{N}(x) \Rightarrow x \in V$.
- (ii) $V \in \mathcal{N}(x), U \supset V \Rightarrow U \in \mathcal{N}(x)$.
- (iii) $\mathcal{N}(x)$ 中有限个元素的交仍然属于 $\mathcal{N}(x)$.
- (iv) 对任意 $V \in \mathcal{N}(x)$, 存在 $U \in \mathcal{N}(x)$, 满足 $U \subset V$ 且任取 $y \in U$ 都有 $U \in \mathcal{N}(y)$.



上面的 (iv) 实际上刻画了开集的性质, 即:

定理 1.3

设 (E, τ) 是一个拓扑空间, 且对任意 $x \in E$, 记 $\mathcal{B}(x)$ 为其邻域基, $U \subset E$, 则

$$U \text{ 是开集} \Leftrightarrow \forall x \in U \exists V \in \mathcal{B}(x) (V \subset U).$$

因此, U 是开集当且仅当它是它其中任意一点的邻域.



证明 当 U 是开集, 任取 $x \in U$, 因为本身就存在开集 $U \subset U$, 故 U 是 x 的邻域, 亦即 $U \in \mathcal{B}(x)$.

当 $\forall x \in U \exists V \in \mathcal{B}(x) (V \subset U)$, 根据 $\mathcal{B}(x)$ 的定义知存在开集 O_x 使得

$$x \in O_x \subset V \subset U.$$

因此 $U = \bigcup_{x \in U} O_x$, 又因为任意开集的并还是开集, 故 U 是开集.

事实上, 集合 E 上的拓扑可由其上的邻域基唯一确定, 而邻域基可以事先由公理约定.

定理 1.4

设 E 是非空集合. 若对任意 $x \in E$, $\mathcal{B}(x)$ 表示关于 x 的由 E 的子集构成的非空集族, 且其满足:

- (i) $\forall V \in \mathcal{B}(x) (x \in V)$.
 - (ii) $\forall (U, V) \in \mathcal{B}(x) \times \mathcal{B}(x) \exists W \in \mathcal{B}(x) (W \subset U \cap V)$.
 - (iii) 对任意 $V \in \mathcal{B}(x)$, 存在 $U \subset V$ 满足 $x \in U$, 且对任意 $y \in U$ 均存在 $W \in \mathcal{B}(y)$ 使得 $W \subset U$.
- 则存在 E 上唯一的拓扑 τ 使得对每一个 $x \in E$ 而言, $\mathcal{B}(x)$ 都是 x 关于拓扑 τ 的邻域基.



1.1.2 粘着集, 闭包, 内部

定义 1.5 (凝聚点, 粘着点, 粘着集)

设 (E, τ) 是拓扑空间, $A \subset E$.

(i) 设 $x \in E$, 若任取 $V \in \mathcal{N}(x)$ 均有

$$(V \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset,$$

则称 x 为 A 的凝聚点.

(ii) 若 x 是 A 中的元素或 A 的凝聚点, 则称 x 是 A 的粘着点. 也就是说当 x 是 A 的粘着点时有

$$V \cap A \neq \emptyset, \quad \forall V \in \mathcal{N}(x).$$

(iii) 称 A 的所有粘着点构成的集合为 A 的粘着集, 记作 $\bar{A}$.



注 1.3 $x \notin \bar{A} \Leftrightarrow \exists V \in \mathcal{N}(x)(V \cap A = \emptyset)$.

定理 1.5

设 E 是一个拓扑空间, $A \subset E$.

(i) $\bar{A}$ 是 E 中包含 A 的最小闭集, 等价地, $\bar{A}$ 是 E 中包含 A 的所有闭集之交.

(ii) A 是闭集当且仅当 $\bar{A} = A$, 等价地, A 是闭集当且仅当 A 含有它自身所有的粘着点.



注 1.4 E 中包含 A 的最小闭集称为 A 的闭包, 因此 A 的闭包和粘着集相同.

定义 1.6 (稠密)

设 $A \subset E$, 若 $\bar{A} = E$, 则称 A 在 E 中稠密.



定义 1.7 (内部)

设 E 是拓扑空间, $x \in E, A \subset E$. 若 A 是 x 的一个邻域, 则称 x 为 A 的内点, 并称由 A 的所有内点构成的集合为 A 的内部, 记作 A° .



定理 1.6

设 E 是拓扑空间, $A \subset E$.

(i) A° 是包含于 A 的所有开集的并, 等价地, A° 是包含于 A 的最大开集.

(ii) A 是开集当且仅当 $A^\circ = A$.



定义 1.8 (边界)

设 E 是拓扑空间, $A \subset E$. 令 $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$, 称 ∂A 为 A 的边界.



定理 1.7

设 E 是拓扑空间, A, B 都是 E 的子集, 则

(i) $\overline{A^\circ} = \bar{A}, (A^\circ)^\circ = A^\circ$.

(ii) $E \setminus A^\circ = \overline{E \setminus A}$.

(iii) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}, (A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.



1.1.3 拓扑空间的比较和拓扑子空间

在同一个集合 E 上可以定义多个不同的拓扑, 这些拓扑之间可以建立偏序关系:

定义 1.9 (拓扑的强弱)

设 τ, τ' 是集合 E 上的两个拓扑. 若 $\tau' \subset \tau$, 则称 τ 是 τ' 的强拓扑 (也就是说, 每个 τ' 中的开集也是 τ 中的开集).

对集合 E 而言, 其上的离散拓扑 $\tau = \mathcal{P}(E)$ 是最强的拓扑, 平凡拓扑 $\tau = \{\emptyset, E\}$ 是最弱的拓扑.

下面我们讨论拓扑子空间的概念. 设 (E, τ) 是一个拓扑空间, $F \subset E$, 定义

$$\tau_F = \{U \cap F : U \in \tau\}.$$

容易验证 τ_F 是子集 F 上的拓扑, 称该拓扑为 F 上由 τ 诱导的拓扑. 相应地, 我们称 (F, τ_F) 是 (E, τ) 的拓扑子空间.

定理 1.8

设 F 是 E 的拓扑子空间, $A \subset F$, 那么 A 是 F 中的闭集当且仅当存在 E 中的闭集 B 使得 $A = B \cap F$.

1.1.4 Hausdorff 空间**定义 1.10 (Hausdorff 空间)**

设 (E, τ) 是拓扑空间, 若任取 $x, y \in E, x \neq y$, 均存在 $U \in \mathcal{N}(x), V \in \mathcal{N}(y)$ 使得 $U \cap V = \emptyset$, 则称拓扑空间 (E, τ) 是 Hausdorff 空间 (或称为分离空间).

显见离散拓扑空间和度量空间是 Hausdorff 空间, 而至少有两个元素的平凡拓扑空间不是 Hausdorff 空间.

定理 1.9

设 E 是拓扑空间, 则 E 是 Hausdorff 空间当且仅当对任意一点 $x \in E$, 其所有闭邻域的交为单点集 $\{x\}$.

证明 任取 $x \in E$, 设 F 是 x 全体闭邻域的交集, 则 F 首先是闭集. 若 E 是 Hausdorff 空间, 任取 E 中不同于 x 的元素 y , 知存在开集 $V \in \mathcal{N}(y)$ 与 $U \in \mathcal{N}(x)$ 满足 $V \cap U = \emptyset$, 因此 $U \subset V^c$, 故 V^c 是 x 的闭邻域. 由此知 $F \subset V^c$, 故 $y \notin F$, 这说明 $F = \{x\}$.

反之, 若 $F = \{x\}$ 且 y 是 E 中不同于 x 的元素, 则总存在 x 的闭邻域 U 使得 $y \notin U$, 由此知 U^c 为开集且 $y \in U^c$, 故 E 是 Hausdorff 空间. $\square$

推论 1.1

若拓扑空间 E 是 Hausdorff 空间, 则对任意 $x \in E$ 有

$$\bigcap_{V \in \mathcal{N}(x)} V = \{x\}.$$

上述推论的逆命题一般不正确. 在分析学中一般不使用非 Hausdorff 空间, 故以后我们默认提到的拓扑空间都是 Hausdorff 空间. 显见任何 Hausdorff 空间的子空间依旧是 Hausdorff 空间.

1.2 收敛序列和连续映射**定义 1.11 (极限)**

设 (E, τ) 是拓扑空间, $\{x_n\}$ 是 E 中的序列, $x \in E$. 若任取 $V \in \mathcal{N}(x)$, 总存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq n_0$ 时有 $x_n \in V$, 则称 $\{x_n\}$ 收敛于 x , 并称 x 为序列 $\{x_n\}$ 的极限, 记作 $\tau - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 在不混淆的情形下记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

注 1.5

1. 上述定义中的 $\mathcal{N}(x)$ 可以换成任意邻域基 $\mathcal{B}(x)$.
2. 若 E 是 Hausdorff 空间, 则 E 中任一序列至多只有一个极限.

定义 1.12 (粘着值)

设 $\{x_n\}$ 是拓扑空间 E 中的序列, $x \in E$. 若任取 $V \in \mathcal{N}(x)$, 对任意 $n_0 \in \mathbb{N}$, 总存在 $n \geq n_0$ 使得 $x_n \in V$, 则称 x 是序列 $\{x_n\}$ 的粘着值.



从定义中可见粘着值之于极限就相当于数学分析中的子列极限之于极限. 关于粘着值有下述定理成立:

定理 1.10

设 $\{x_n\}$ 是拓扑空间 E 上的序列, $x \in E$. 令

$$A_n = \{x_m : m \geq n\},$$

则 x 是 $\{x_n\}$ 的粘着值当且仅当 $x \in \bigcap_n \overline{A_n}$.

**注 1.6**

- (i) 设 $A \subset E$, 上述定理意味着 $\overline{A}$ 含有 A 中全体收敛序列的极限值 (也含有 A 中所有序列的粘着值). 当 E 是度量空间时, $\overline{A}$ 正是由 A 中所有收敛序列的极限值构成. 然而在一般拓扑空间下, 该结论未必成立, 此时 $\overline{A}$ 中可能含有 A 中收敛序列极限值以外的其他元素.
- (ii) 度量空间和一般拓扑空间的根本区别在于: 度量拓扑可以由收敛序列刻画, 但一般拓扑不能这样. 下面讨论连续映射.

定义 1.13 (连续)

设 E, F 是两个拓扑空间, $f: E \rightarrow F$ 是一个映射, 且 $x \in E$. 若任取 $V \in \mathcal{N}(f(x))$, 总存在 $U \in \mathcal{N}(x)$, 使得 $f(U) \subset V$, 则称 f 在 x 点连续. 也就是说, 只要 f 在 x 点连续, 则对任意 $V \in \mathcal{N}(f(x))$, 都有 $f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(x)$. 若映射 f 在 E 上每一点都连续, 则称 f 在 E 上连续.



注 1.7 显见若 f 在 x 点连续且 $\{x_n\}$ 收敛到 x , 那么 $\{f(x_n)\}$ 收敛到 $f(x)$. 在度量空间下, 这一命题的逆命题也成立, 亦即若 E, F 是度量空间, 那么由 $x_n \rightarrow x \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$ 可推知 f 在 x 点连续. 但对一般拓扑空间而言, 该命题不成立.

定理 1.11

设 E, F 是两个拓扑空间, $f: E \rightarrow F$ 是一个映射, 那么下面的命题等价:

- (i) f 在 E 上连续.
- (ii) 任取 F 中的开集 O , $f^{-1}(O)$ 都是 E 中的开集.
- (iii) 任取 F 中的闭集 A , $f^{-1}(A)$ 都是 E 中的闭集.

**推论 1.2**

两个连续映射的复合映射依旧连续.



注 1.8 设 τ, τ' 是 E 上的两个拓扑, 则 τ 是 τ' 的强拓扑当且仅当 E 上的恒等映射 $\text{Id}_E: (E, \tau) \rightarrow (E, \tau')$ 是连续的.

特别注意连续映射未必把开集映成开集.

定义 1.14 (开映射, 同胚映射)

设 E, F 是拓扑空间, $f: E \rightarrow F$ 是映射.

- (i) 若任取开集 $O \subset E$, $f(O)$ 都是 F 中的开集, 则称 $f: E \rightarrow F$ 是开映射.
- (ii) 若 f 是双射, f, f^{-1} 均连续 (也就是说 f 同时是连续双射和开映射), 则称 $f: E \rightarrow F$ 为同胚映射. 若

E, F 之间存在同胚映射, 则称 E, F 同胚.



1.3 紧性

定义 1.15 (开覆盖, 紧集)

设 E 是拓扑空间.

- (i) 若 E 上的开集族 $\{O_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 满足 $E = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} O_i$, 则称 $\{O_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是 E 的开覆盖.
- (ii) 若 E 的任意一个开覆盖 $\{O_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 中都可取出有限子覆盖, 则称 E 是紧的 (也就是说, 存在 $\mathcal{I}$ 的有限子集 $\mathcal{J}$ 使得 $\bigcup_{i \in \mathcal{J}} O_i = E$).



由开集和闭集的互补性立得下述定理.

定理 1.12

拓扑空间 E 是紧的当且仅当任取 E 的一族闭集 $\{F_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 均有

$$\left(\forall \text{有限集 } \mathcal{J} \subset \mathcal{I} \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathcal{J}} F_i \neq \emptyset \right) \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i \neq \emptyset.$$



注 1.9 我们称上述定理中提到的闭集族 $\{F_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 具有的性质为有限交性质, 即

$$\forall \text{有限集 } \mathcal{J} \subset \mathcal{I}, \bigcap_{i \in \mathcal{J}} F_i \neq \emptyset.$$

因此上述定理可表述为: 拓扑空间 E 是紧的当且仅当任意具有有限交性质的闭集族中所有元素的交集非空.

大多数情况下, 我们使用的命题是下述特殊情形:

推论 1.3

设 E 是紧拓扑空间, $\{F_n\}_{n \geq 1}$ 是 E 中单调递减的非空闭集族, 则

$$\bigcap_{n \geq 1} F_n \neq \emptyset.$$



下面的定理介绍拓扑子空间紧性的判定方法:

定理 1.13

设 E 是拓扑空间, $F \subset E$ 是子空间, 则 F 是紧的当且仅当在 E 中的开集族 $\{O_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 满足 $F \subset \bigcup_{i \in \mathcal{I}} O_i$ 时, 存在有限集 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ 使得 $F \subset \bigcup_{i \in \mathcal{J}} O_i$ (也就是说, F 的任一在 E 中的开覆盖 $\{O_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 都存在有限子覆盖).



证明 设 $F \subset E$, E 中的开集族 $\{O_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 满足 $F \subset \bigcup_{i \in \mathcal{I}} O_i$, 令

$$U_i = O_i \cap F, \quad i \in \mathcal{I}.$$

则 $\{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是空间 F 上的开覆盖. 反之, F 的任一开覆盖 $\{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 均可表示为上述形式.

现若 F 是紧子空间, 则存在有限集 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ 使得 $F = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} U_i$, 因此 $F \subset \bigcup_{i \in \mathcal{J}} O_i$. 反之, 若存在有限集 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ 使得 $F \subset \bigcup_{i \in \mathcal{J}} O_i$, 则

$$F = F \cap \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} O_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} U_i,$$

因此 F 是紧子空间.



定理 1.14

设 E 是拓扑空间, $F \subset E$ 是子空间.

- (i) 若 E 是 Hausdorff 空间且 F 是紧的, 那么 F 是 E 的闭子集.
- (ii) 若 E 是紧 Hausdorff 空间, 则 F 是紧的当且仅当 F 是 E 的闭子集.



证明 (i) 设 $x \in F^c$. 因为 E 是 Hausdorff 空间, 故对任意 $y \in F$, 均存在 E 中的开集 U_y, V_y 使得 $x \in U_y, y \in V_y, U_y \cap V_y = \emptyset$, 因此

$$F \subset \bigcup_{y \in F} V_y.$$

因为 F 是紧的, 故存在有限个点 $y_1, \dots, y_n$ 使得

$$F \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}.$$

相应地, 令 $U = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$, 则 U 是 E 中含有 x 的开集, 且

$$U \cap \left(\bigcup_{i=1}^n V_{y_i} \right) = \emptyset.$$

故 $U \cap F = \emptyset$. 这说明对任意 $x \in F^c$, 总能找到完全包含在 F^c 中的开集 U 作为 x 的邻域, 从而 F^c 是开集, 故 F 是闭集.

(ii) 设 E 是紧空间, F 是 E 中的闭集. 设 $\{F_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是 F 中一族具有有限交性质的闭集, 因为 F 本身是 E 中的闭集, 故 F_i 同样是 E 中的闭集. 根据定理 1.12 与 E 的紧性知 $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i \neq \emptyset$, 进而由定理 1.12 可得 F 的紧性. $\square$

在任一 Hausdorff 空间上, 如果一个具有有限交性质的集族是紧集族, 那么该紧集族中所有元素的交集非空. 换言之, 我们有下述结论:

定理 1.15

设 E 是 Hausdorff 空间, $\{K_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是 E 中的紧集族, 若 $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} K_i = \emptyset$, 则存在有限个 K_i 使得它们的交集是空集.



证明 在集族 $\{K_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 中任取一个元素, 记为 K_0 . 因为 $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} K_i = \emptyset$, 故 $\{K_i^c\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是 K_0 的开覆盖¹. 由 K_0 的紧性知存在有限集 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ 使得 $K_0 \subset \bigcup_{i \in \mathcal{J}} K_i^c$, 因此

$$K_0 \cap \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} K_i \right) = \emptyset.$$

此即欲证. $\square$

推论 1.4

设 E 是紧 Hausdorff 空间, 则 E 中每一点均有一个紧邻域基.



证明 取 $x \in E$, V 是 x 的一个开邻域, 则 V^c 是闭集, 进而 V^c 是紧集. 根据定理 1.9, 任取 x 的闭邻域 U , 知

$$\bigcap_{U \in \mathcal{N}(x)} (U \cap V^c) = \left(\bigcap_{U \in \mathcal{N}(x)} U \right) \cap V^c = \{x\} \cap V^c = \emptyset;$$

进而由定理 1.15 知存在有限个紧集 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{N}(x)$ 使得 $\bigcap_{i=1}^n (U_i \cap V^c) = \emptyset$, 因此

$$U_1 \cap \dots \cap U_n \subset V.$$

因为上左式中有有限紧邻域之交依旧是 x 的紧邻域, 故 x 存在紧邻域基. $\square$

对于一个非紧的空间, 上述结论也可能正确, 例如 $\mathbb{R}$. 这便启发我们给出下述定义:

¹Hausdorff 空间的条件用在这里了: Hausdorff 空间中的紧集必为闭集.

定义 1.16 (局部紧空间)

设 E 是拓扑空间, 若 E 上的每一点均有一个紧邻域, 则称 E 为局部紧空间.



此时推论 1.4 可修改为下述定理:

定理 1.16

若 E 是局部紧 Hausdorff 空间, 则 E 中每一点均有一个紧邻域基.



紧性在连续映射下不变, 即:

定理 1.17

设 E 是紧空间, F 是拓扑空间, $f: E \rightarrow F$ 是连续映射, 则 $f(E)$ 是 F 的紧子空间.



证明 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 $f(E)$ 的开覆盖, 即 $f(E) \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, 则 $E = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i)$. 因为 f 连续, 故 $f^{-1}(U_i)$ 是 E 中的开集. 因为 E 本身是紧集, 故存在有限个元素 $i_1, \dots, i_n$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^n f^{-1}(U_{i_k}),$$

因此 $f(E) \subset \bigcup_{k=1}^n U_{i_k}$, 从而 $f(E)$ 是 F 的紧子空间. □

推论 1.5

设 E, F 是拓扑空间, $f: E \rightarrow F$ 是连续映射, 则只要 $K \subset E$ 是紧集, $f(K)$ 也就是紧集.

**推论 1.6**

设 E 是紧空间, F 是 Hausdorff 空间, $f: E \rightarrow F$ 是连续单射, 则 f 是 $E \rightarrow f(E)$ 的同胚映射.



证明 只需说明 $f^{-1}: f(E) \rightarrow E$ 连续即可. 设 A 是 E 中的闭集, 因为 E 是紧空间, 故 A 是紧集. 又因为 f 连续, 故 $f(A)$ 是紧集, 因此 $f(A) = (f^{-1})^{-1}(A)$ 是 $f(E)$ 中的闭集, 从而 f^{-1} 是连续映射. □

推论 1.7

设 E 是紧空间, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 则 f 在 E 上有界, 且能取到上确界和下确界.



证明 由前述推论知 $f(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的紧集, 进而其为有界闭集, 自然存在上下确界. □

本节末尾我们给出著名的 Urysohn 引理 (证明就略过了):

定理 1.18 (Urysohn 引理)

设 E 是局部紧 Hausdorff 空间, A, B 是 E 中不相交的非空闭集, 且其中一个是紧集, 则存在连续函数 $f: E \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f|_A \equiv 0, f|_B \equiv 1$.



注 1.10 当 (E, d) 是度量空间时, 取

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}, \quad d(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$$

即可说明结论成立. 我们称具有 Urysohn 引理提到的性质的空间为**正规空间**, 因此局部紧 Hausdorff 空间和可度量化空间都是正规空间.

1.4 乘积拓扑

定义 1.17 (直积, 基础开集, 乘积拓扑)

设 (E_i, τ_i) 是一族拓扑空间, $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 称为族 $\{E_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 的直积, 其中的元素记为 $x = (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i (x_i \in E_i, \forall i \in \mathcal{I})$, 称 x_i 为 x 的坐标.

(i) 若 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{I}$ 的有限子集, $U_i (i \in \mathcal{J})$ 是拓扑空间 (E_i, τ_i) 上的开集, 则称

$$O = \prod_{i \in \mathcal{J}} U_i \times \prod_{i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{J}} E_i$$

为 E 的基础开集.

(ii) 称由基础开集的并构成的集合为 E 中的开集. 事实上, 所有这种开集构成了 E 上的拓扑, 称该拓扑为 $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 上的乘积拓扑.



注 1.11

- (i) 如果 $\mathcal{I}$ 是有限集, 则 O 是基础开集当且仅当 $O = \prod_{i \in \mathcal{I}} U_i$, 其中 U_i 是 E_i 中的开集. 特别注意如果 $\mathcal{I}$ 是无限集, 则前文提到的这种开集的直积通常不是乘积拓扑空间中的开集.
- (ii) $\mathbb{R}^n$ 上的自然拓扑与 $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 上的乘积拓扑一致.
- (iii) 若对每个 $i \in \mathcal{I}$ 而言, F_i 都是 E_i 中的闭集, 则 $\prod_{i \in \mathcal{I}} F_i$ 是 E 中的闭集.
- (iv) 设 $x = (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in E$, 且对每个 $i \in \mathcal{I}$ 而言, 记 $\mathcal{N}(x_i)$ 为 x_i 在 E_i 中的邻域系. 则 x 在 E 中的一个邻域基可由下述集合构成:

$$\prod_{i \in \mathcal{J}} V_i \times \prod_{i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{J}} E_i,$$

其中 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{I}$ 的有限子集, 且对每个 $i \in \mathcal{J}$ 均有 $V_i \in \mathcal{N}(x_i)$.

(v) 拓扑空间的乘积满足结合律.

下面的定理解释了前面定义的乘积拓扑是自然的, 也就是说它是使得 $\prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 上每个正规投影都连续的最弱拓扑.

定理 1.19 (乘积空间拓扑的最弱拓扑刻画)

设 $\{E_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是一族拓扑空间, $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$, 记 τ 为 E 上的乘积拓扑, 另对每个 $i \in \mathcal{I}$, 记 p_i 为 $E \rightarrow E_i$ 的正规投影, 即 $p_i(x) = x_i (x = (x_i)_{i \in \mathcal{I}})$. 那么 τ 是 E 上使得每个 $p_i (i \in \mathcal{I})$ 都连续的最弱拓扑, 且每个 $p_i (i \in \mathcal{I})$ 都是开映射.



证明 对每个 $i \in \mathcal{I}$, 设 U_i 是 E_i 中的开集, 则

$$p_i^{-1}(U_i) = U_i \times \prod_{j \neq i} E_j.$$

根据乘积拓扑的定义即知 $p_i^{-1}(U_i)$ 是 E 中的开集, 因此 p_i 是连续映射.

下面说明 τ 的最弱性. 设 σ 是 E 上另一个使每个 $p_i (i \in \mathcal{I})$ 都连续的拓扑, 则对每个 $E_i (i \in \mathcal{I})$ 上的开集 U_i 而言, $U_i \times \prod_{j \neq i} E_j$ 作为某开集在连续映射下的原像集是关于 σ 的开集. 对这样的开集 $U_i \times \prod_{j \neq i} E_j$ 求有限交可知拓扑 τ 中的基础开集是拓扑 σ 中的开集, 因此 $\tau \leq \sigma$, 亦即 τ 是使得 E 上所有正规投影均连续的最弱拓扑.

最后说明在拓扑 τ 下每个 p_i 都是开映射. 设 O 是 E 中的开集, 并设 $x \in O$. 因为 O 本身是 E 中基础开集之并, 故 x 必属于某个基础开集 $U = \prod_{i \in \mathcal{I}} U_i$ (其中 U_i 是 E_i 中的开集, 且除去有限个情形后总有 $U_i = E_i$), 且 $U \subset O$. 这说明 $U_i \subset p_i(O)$, 即

$$x_i \in U_i \subset p_i(O).$$

因此 $p_i(O)$ 是其中每个点的邻域, 故 $p_i(O)$ 是 E_i 中的开集, 从而 p_i 是开映射. □

下面的推论刻画了乘积拓扑空间中序列的收敛性, 即序列在乘积拓扑空间中的收敛等价于依坐标收敛, 这意

味着乘积拓扑正是我们期望刻画的拓扑.

推论 1.8

设 $\{E_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是一族拓扑空间, $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 是乘积拓扑空间.

- (i) 设 $\{x^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 E 中的序列, 其中 $x^n = (x_i^n)_{i \in \mathcal{I}}$, 另记 $x = (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in E$, 则 $\{x^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在乘积拓扑空间 E 中收敛到 x 当且仅当对每个 $i \in \mathcal{I}$ 而言, $\{x_i^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在空间 E_i 中收敛到 x_i .
- (ii) 设 F 是拓扑空间, $f: F \rightarrow E$ 是映射, 则 f 是 $F \rightarrow (E, \tau)$ 的连续映射当且仅当对每个 $i \in \mathcal{I}$ 而言, $p_i \circ f$ 是 $F \rightarrow E_i$ 的连续映射.



证明 (i) 设 $\{x^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛到 x , 因为 p_i 连续, 故对每个 $i \in \mathcal{I}$ 都有 $\{x_i^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛到 x_i .

反之若对每个 $i \in \mathcal{I}$ 都有 $\{x_i^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛到 x_i , 设 O 是 τ 中含有点 x 的任意开集, 则存在基础开集

$$U = \prod_{i \in \mathcal{J}} U_i \times \prod_{i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{J}} E_i$$

满足 $x \in U \subset O$, 其中 $\mathcal{J}$ 是有限集, U_i 是 E_i 中的开集. 现在因为 $\mathcal{J}$ 是有限集, 故存在 n_0 使得 $n \geq n_0$ 时, 对每个 $i \in \mathcal{J}$ 总有 $x_i^n \in U_i$. 也就是说, 当 $n \geq n_0$ 时有 $x^n \in O$, 因此 $\{x^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛到 x .

(ii) 的证明与 (i) 是类似的, 这里就省略了. □

注 1.12 如果所有的 $E_i (i \in \mathcal{I})$ 都是同一个集合 F , 那么这种情况下

$$\prod_{i \in \mathcal{I}} E_i = \prod_{i \in \mathcal{I}} F = \{f: \mathcal{I} \rightarrow F, i \mapsto f(i) \in F\}.$$

也就是说, $\prod_{i \in \mathcal{I}} F$ 中的元素是指标集 $\mathcal{I}$ 到集合 F 的映射, 这种直积集通常记为 $F^{\mathcal{I}}$. 若取 $F = \mathbb{R}$, 则 $\prod_{i \in \mathcal{I}} = \mathbb{R}^{\mathcal{I}}$ 中的元素就是从指标集 $\mathcal{I}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数. 例如令 $\mathcal{I} = \mathbb{N}$, 则 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的元素就是实无穷序列 $(x_1, x_2, \dots)$.

当我们在 $\mathbb{R}^{\mathcal{I}}$ 上赋乘积拓扑后, 由推论 1.8 可知, $\mathbb{R}^{\mathcal{I}}$ 中的序列 $\{f_n\}$ 依乘积拓扑收敛到 $f \in \mathbb{R}^{\mathcal{I}}$ 等价于 f_n 作为 $\mathcal{I}$ 上的函数列逐点收敛到函数 f , 这说明乘积拓扑是刻画函数逐点收敛的拓扑.

定理 1.20

如果对每个 $i \in \mathcal{I}$, E_i 都是 Hausdorff 空间, 则乘积拓扑空间 $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 也是 Hausdorff 空间.



证明 设 $x = (x_i)_{i \in \mathcal{I}}, y = (y_i)_{i \in \mathcal{I}}$ 是 $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 中的两个不同元素, 则存在 $i_0 \in \mathcal{I}$ 使得 $x_{i_0} \neq y_{i_0}$. 因为 E_{i_0} 是 Hausdorff 空间, 故存在 E_{i_0} 中的开集 U_{i_0}, V_{i_0} , 使得 $x_{i_0} \in U_{i_0}, y_{i_0} \in V_{i_0}, U_{i_0} \cap V_{i_0} = \emptyset$. 因此

$$x \in U = U_{i_0} \times \prod_{i \neq i_0} E_i, \quad y \in V = V_{i_0} \times \prod_{i \neq i_0} E_i.$$

这里 U, V 是乘积拓扑空间 E 中的两个基础开集, 且满足 $U \cap V = \emptyset$, 因此 $E = \prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 同样是 Hausdorff 空间. □

下面讨论反映乘积拓扑空间稳定性的重要性质: 紧性. 我们首先给出两个成员情形下的结论:

定理 1.21

设 E_1, E_2 是两个紧拓扑空间, 则乘积拓扑空间 $E = E_1 \times E_2$ 依旧是紧的.



证明 设 $\{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是 E 上的开覆盖, 则任取 $x = (x_1, x_2) \in E$, 必存在 $i_x \in \mathcal{I}$ 使得 $x \in U_{i_x}$. 根据乘积拓扑的定义知存在 V_x, W_x 分别是 x_1, x_2 在相应拓扑上的开邻域, 且 $V_x \times W_x \subset U_{i_x}$. 现在固定 $x_2 \in E_2$, 设 $F = E_1 \times \{x_2\}$, 则 $\{V_x\}_{x \in F}$ 是 E_1 上的一个开覆盖. 因为 E_1 是紧的, 故存在 F 的有限子集 $\mathcal{J}(x_2)$ 使得 $\{V_x\}_{x \in \mathcal{J}(x_2)}$ 覆盖 E_1 . 下面令

$$A_{x_2} = \bigcup_{x \in \mathcal{J}(x_2)} W_x,$$

则 A_{x_2} 是含有 x_2 的开集. 当 x_2 在 E_2 中变动时, 可知 $\{A_{x_2}\}_{x_2 \in E_2}$ 是 E_2 的开覆盖, 因此由 E_2 的紧性知存在有限集 $K \subset E_2$ 使得相应的有限族 $\{A_{x_2}\}_{x_2 \in K}$ 覆盖 E_2 . 由此知

$$E = \bigcup_{x \in \mathcal{J}} V_x \times W_x, \quad \mathcal{J} = \bigcup_{x_2 \in K} \mathcal{J}(x_2).$$

现由上述讨论, 任取 $a = (a_1, a_2) \in E$ 时, 必存在某个 $x_2 \in K$ 使得 $a_2 \in A_{x_2}$, 进而存在 $x \in \mathcal{J}(x_2)$ 使得 $a_1 \in V_x$,

这里确定的 $x \in \mathcal{J}$ 且 $a \in V_x \times W_x$. 因此 E 能被 $\{U_{i_x}\}_{x \in \mathcal{J}}$ 覆盖. 又因为 $\mathcal{J}$ 时有限集, 故 E 是紧的. $\square$

一般情形下有下述结论成立 (证明就省略了):

定理 1.22 (Tychonoff)

设 $\{E_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ 是一族紧拓扑空间, 则乘积拓扑空间 $\prod_{i \in \mathcal{I}} E_i$ 依旧是紧的.



最后, 可以说明可度量化在可数乘积运算下是稳定的 (证明就省略了):

定理 1.23

设 $\{E_n\}_{n \geq 1}$ 是一族可度量化的拓扑空间, 则乘积拓扑空间 $E = \prod_{n \in \mathbb{N}} E_n$ 也可度量化.



第二章 四大定理的回顾

本章选自 [2].

2.1 Hahn-Banach 定理

2.1.1 Hahn-Banach 定理的解析形式: 线性泛函的延拓

Hahn-Banach 定理解析形式的证明需要用到 Zorn 引理, 为此需要准备一些定义. 设 P 是具有 (偏) 序关系 $\leq$ 的集合, 称 $Q \subset P$ 是全序集 (totally ordered), 如果对 Q 中的任意两个元素 a, b , 要么 $a \leq b$, 要么 $b \leq a$. 称 P 是归纳集 (inductive), 如果其中的任意全序子集都有上界.

引理 2.1 (Zorn)

任意非空归纳序集都有最大元.

定理 2.1 (Hahn-Banach 定理的解析形式)

设 E 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ 作为函数满足^a

$$p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \forall x \in E, \forall \lambda > 0, \quad (2.1)$$

$$p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad \forall x, y \in E. \quad (2.2)$$

设 $G \subset E$ 是线性子空间, $g: G \rightarrow \mathbb{R}$ 作为线性泛函满足

$$g(x) \leq p(x), \quad \forall x \in G. \quad (2.3)$$

在上述条件下, 存在定义在 E 上的线性泛函 f , 使得对任意 $x \in G$ 均有 $g(x) = f(x)$, 且

$$f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in E. \quad (2.4)$$

^a满足(2.1),(2.2)的函数 p 有时又称为 Minkowski 泛函.

证明 考虑集合

$$P = \left\{ h : D(h) \subset E \rightarrow \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} D(h) \text{ 是 } E \text{ 的线性子空间} \\ h \text{ 是线性的, } G \subset D(h), \\ h \text{ 是 } g \text{ 的延拓, } h(x) \leq p(x) (\forall x \in D(h)) \end{array} \right. \right\}$$

在 P 上定义序关系:

$$(h_1 \leq h_2) \Leftrightarrow (D(h_1) \subset D(h_2) \wedge h_2 \text{ 是 } h_1 \text{ 的延拓}).$$

显见 P 非空, 因为 $g \in P$. 下面说明 P 是归纳集. 设 $Q \subset P$ 是全序子集, 记 $Q = \{h_i\}_{i \in \mathcal{I}}$, 另记

$$D(h) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} D(h_i), \quad h(x) = h_i(x), x \in D(h_i), i \in \mathcal{I}.$$

显见上式中的 h 良定义, $h \in P$, 且 h 是 Q 的一个上界. 现在对 P 应用 Zorn 引理可得其最大元 f .

下面说明 $D(f) = E$. 若 $D(f) \neq E$, 则取 $x_0 \notin D(f)$, 记 $D(h) = D(f) + \mathbb{R}x_0$, 且对任意 $x \in D(f)$ 记

$$h(x + tx_0) = f(x) + t\alpha, \quad t \in \mathbb{R}$$

其中常数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是为满足 $h \in P$ 而选取的. 现在需要说明

$$f(x) + t\alpha \leq p(x + t\alpha), \quad \forall x \in D(f), \forall t \in \mathbb{R}.$$

由齐次性(2.1)知只需验证

$$\begin{cases} f(x) + \alpha \leq p(x + x_0), & \forall x \in D(f) \\ f(x) - \alpha \leq p(x - x_0), & \forall x \in D(f) \end{cases}$$

即可. 也就是说, α 需要满足

$$\sup_{y \in D(f)} \{f(y) - p(y - x_0)\} \leq \alpha \leq \inf_{x \in D(f)} \{p(x + x_0) - f(x)\}.$$

因为由三角不等式(2.2)知

$$f(x) + f(y) \leq p(x + y) \leq p(x + x_0) + p(y - x_0)$$

故

$$f(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - f(x), \quad \forall x \in D(f), \forall y \in D(f),$$

因此前面要求的 α 肯定是存在的, 由此可知 $f \leq h$. 但因为 $f \neq h$, 故这与 f 是 P 的最大元矛盾! $\square$

解析形式的 Hahn-Banach 定理多用于对偶空间的研究. 回忆 E 的对偶空间 (dual space) E^* 是 E 上全体线性泛函构成的空间, 其上范数定义为

$$\|f\|_{E^*} = \sup_{\substack{\|x\| \leq 1 \\ x \in E}} |\langle f, x \rangle|.$$

本科泛函分析中已经说明了就算 E 不完备的赋范空间, E^* 也是 Banach 空间, 这是因为 $\mathbb{R}$ 是完备的.

解析形式的 Hahn-Banach 定理有下述重要推论:

推论 2.1

设 $G \subset E$ 是线性子空间, 如果 $g: G \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函, 则它在 E 上存在延拓 $f \in E^*$, 且

$$\|f\|_{E^*} = \|g\|_{G^*}.$$

证明 令 $p(x) = \|g\|_{G^*} \|x\|_E$ 即可. $\square$

推论 2.2

对任意 $x_0 \in E$, 总存在 $f_0 \in E^*$ 使得

$$\|f_0\|_{E^*} = \|x_0\|_E, \quad \langle f_0, x_0 \rangle = \|x_0\|_E^2.$$

证明 在推论 2.1 中令 $G = \mathbb{R}x_0, g(tx_0) = t\|x_0\|^2$ 即可.

注 2.1 推论 2.2 中给出的 f_0 一般来说不是唯一的. 但如果 E^* 是严格凸空间¹, 例如 Hilbert 空间或 L^p 空间 ($1 < p < \infty$), 则 f_0 唯一. 在一般情况下, 对任意 $x_0 \in E$ 记

$$F(x_0) = \{f_0 \in E^* : \|f_0\|_{E^*} = \|x_0\|_E, \langle f_0, x_0 \rangle = \|x_0\|_E^2\}.$$

称 (多值) 映射 $x_0 \mapsto F(x_0)$ 为 $E \rightarrow E^*$ 的对偶映射 (duality map).

推论 2.3

对任意 $x \in E$ 均有

$$\|x\|_E = \sup_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle| = \max_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle|.$$

证明 不妨设 $x \neq 0$, 显见

$$\sup_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle| \leq \|x\|.$$

另一方面, 由推论 2.2 知存在 $f_0 \in E^*$ 使得 $\|f_0\|_{E^*} = \|x\|_E, \langle f_0, x \rangle = \|x\|_E^2$, 取 $f_1 = f_0/\|x\|$ 即可. $\square$

¹称赋范空间 E 严格凸, 如果对任意 $t \in (0, 1)$ 与任意 $x, y \in E$, 由 $\|x\| = \|y\| = 1, x \neq y$ 可推知 $\|tx + (1-t)y\| < 1$.

2.1.2 Hahn-Banach 定理的几何形式: 凸集的分离

我们从超平面的一些预备知识出发. 下面默认 E 是赋范线性空间.

定义 2.1 (仿射超平面 (affine hyperplane))

E 上的仿射超平面 H 是 E 的一个子集, 其形如

$$H = \{x \in E : f(x) = \alpha\},$$

其中 f 是不恒为零的线性泛函^a, $\alpha \in \mathbb{R}$ 是给定的常数. 我们将上式简记为 $H = [f = \alpha]$, 称 $f = \alpha$ 是 H 的方程.

^a注意这里我们没有要求连续性.

命题 2.1

超平面 $H = [f = \alpha]$ 是闭集当且仅当 f 连续.

证明 从连续性的定义出发显见 f 连续 $\Rightarrow H$ 是闭集. 反之设 H 是闭集, 因为 f 不恒为零, 故 H^c 是非空开集. 取 $x_0 \in H^c$, 知 $f(x_0) \neq \alpha$, 不妨设 $f(x_0) < \alpha$.

取定 $r > 0$ 满足 $B(x_0, r) \subset H^c$, 下面说明

$$f(x) < \alpha, \quad \forall x \in B(x_0, r). \quad (2.5)$$

这是因为若存在 $x_1 \in B(x_0, r)$ 使得 $f(x_1) > \alpha$, 根据球 $B(x_0, r)$ 的凸性知线段

$$\{x_t = (1-t)x_0 + tx_1 : t \in [0, 1]\}$$

被囊括在 $B(x_0, r)$ 内, 因此对任意 $t \in [0, 1]$ 均有 $f(x_t) \neq \alpha$. 另一方面, 如果取 $t = \frac{f(x_1) - \alpha}{f(x_1) - f(x_0)}$, 可得 $f(x_t) = \alpha$, 这便导出了矛盾. 因此(2.5)式成立. 由(2.5)式知

$$f(x_0 + rz) < \alpha, \quad \forall z \in B(0, 1).$$

因此 f 连续, 且 $\|f\|_{E^*} \leq \frac{1}{r}(\alpha - f(x_0))$. □

定义 2.2 (分离 (separate), 严格分离 (strictly separate), 凸集 (convex set))

设 A, B 是 E 的子集. 称超平面 $H = [f = \alpha]$ 分离 A, B , 如果

$$f(x) \leq \alpha (\forall x \in A), \quad f(x) \geq \alpha (\forall x \in B).$$

称 H 严格分离 A, B , 如果存在 $\varepsilon > 0$ 使得

$$f(x) \leq \alpha - \varepsilon (\forall x \in A), \quad f(x) \geq \alpha + \varepsilon (\forall x \in B).$$

从几何上看, A, B 能够被某超平面 H 分离意味着 A 在由 H 确定的其中一个半空间中, 而 B 在另一半空间中.

称 $A \subset E$ 是凸集, 如果

$$tx + (1-t)y \in A, \quad \forall x, y \in A, \forall t \in [0, 1].$$

定理 2.2 (Hahn-Banach 定理的第一几何形式)

设 $A \subset E, B \subset E$ 是满足 $A \cap B = \emptyset$ 的非空凸集, 另设其一是开集, 则存在闭超平面分离 A, B .

定理2.2的证明需要下述两个引理作为铺垫:

引理 2.2

设 $C \subset E$ 是开凸集, $0 \in C$. 对任意 $x \in E$, 记^a

$$p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\},$$

则 p 满足齐次性与三角不等式, 存在常数 M 使得 $0 \leq p(x) \leq M\|x\|$ ($\forall x \in E$), 且 $C = \{x \in E : p(x) < 1\}$.

^a称 p 为 C 的度规或 Minkowski 泛函.



证明 p 的齐次性是显见的. 对于 p 的有界性, 取 $r > 0$ 满足 $B(0, r) \subset C$, 则

$$p(x) \leq \frac{1}{r}\|x\|, \quad \forall x \in E.$$

取 $M = \frac{1}{r}$ 即可.

对于 C 的等价刻画, 设 $x \in C$, 因为 C 是开集, 故存在足够小的 $\varepsilon > 0$ 使得 $(1 + \varepsilon)x \in C$, 因此 $p(x) \leq \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$, 这说明 $C \subset \{x \in E : p(x) < 1\}$. 反之, 若 $p(x) < 1$, 则存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $\alpha^{-1}x \in C$, 因此 $x = \alpha(\alpha^{-1}x) + (1 - \alpha)0 \in C$, 故 $\{x \in E : p(x) < 1\} \subset C$.

对于三角不等式, 设 $x, y \in E, \varepsilon > 0$. 由齐次性与 C 的等价刻画知 $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in C, \frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in C$, 因此对任意 $t \in [0, 1]$ 均有

$$\frac{tx}{p(x)+\varepsilon} + \frac{(1-t)y}{p(y)+\varepsilon} \in C.$$

取

$$t = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}$$

可得

$$\frac{x+y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C$$

再次由齐次性与 C 的等价刻画可得 $p(x+y) < p(x) + p(y) + 2\varepsilon$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 成立, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得欲证. $\square$

引理 2.3

设 $C \subset E$ 是非空开凸集, $x_0 \in E \setminus C$, 则存在 $f \in E^*$ 使得 $f(x) < f(x_0)$ ($\forall x \in C$). 特别地, 超平面 $[f = f(x_0)]$ 分离 $\{x_0\}$ 和 C .



证明 不妨设 $0 \in C$. 记 C 的度规为 p , 另记 $G = \mathbb{R}x_0$, 取线性泛函 $g : G \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(tx_0) = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

显见

$$g(x) \leq p(x), \quad \forall x \in G.$$

于是由 Hahn-Banach 定理的解析形式 2.1 知在 E 上存在 g 的延拓 f , 其满足

$$f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in E.$$

特别地, 根据 g 的构造知 $f(x_0) = 1$, 且由 p 的有界性知 f 是连续线性泛函. 由 p 的三角不等式即得对任意 $x \in C$ 均有 $f(x) < 1$. $\square$

下面来证明定理 2.2.

证明 设 $C = A - B$, 可以说明 C 同样是凸集, 且因为 $C = \bigcup_{y \in B} (A - y)$, 故 C 也是开集, 另因 $A \cap B \neq \emptyset$, 故 $0 \notin C$. 由引理 2.3 知存在 $f \in E^*$ 使得

$$f(z) < 0, \quad \forall z \in C,$$

亦即

$$f(x) < f(y), \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

取定常数 α 满足

$$\sup_{x \in A} f(x) \leq \alpha \leq \inf_{y \in B} f(y),$$

可见超平面 $[f = \alpha]$ 分离 A, B , 由 f 的连续性即得该超平面的闭性. $\square$

定理 2.3 (Hahn-Banach 定理的第二几何形式)

设 $A \subset E, B \subset E$ 是满足 $A \cap B = \emptyset$ 的两个非空凸集, 另设 A 是闭集, B 是紧集, 则存在闭超平面严格分离 A, B . 

证明 设 $C = A - B$, 可以说明 C 依旧是闭凸集, 且 $0 \notin C$. 因此存在 $r > 0$ 使得 $B(0, r) \cap C = \emptyset$, 由 Hahn-Banach 定理的第一几何形式 2.2 知存在闭超平面分离 $B(0, r)$ 和 C , 亦即存在 $f \in E^*$ 满足 $f \neq 0$, 且

$$f(x - y) \leq f(rz), \quad \forall x \in A, \forall y \in B, \forall z \in B(0, 1).$$

这说明

$$f(x - y) \leq -r\|f\|_{E^*}, \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

记 $\varepsilon = \frac{1}{2}r\|f\| > 0$, 可得

$$f(x) + \varepsilon \leq f(y) - \varepsilon, \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

选取 α 满足

$$\sup_{x \in A} f(x) + \varepsilon \leq \alpha \leq \inf_{y \in B} f(y) - \varepsilon,$$

此即超平面 $[f = \alpha]$ 严格分离 A, B . $\square$

注 2.2 如果只设 $A \subset E, B \subset E$ 是不交的非空凸集, 那么一般来说是没法用闭超平面分离 A, B 的. 甚至于就算 A, B 都是闭集, 也可以构造不能用闭超平面分离的反例. 然而, 如果 E 是有限维空间, 我们就总可以用闭超平面分离两个不交非空凸集.

从 Hahn-Banach 定理的几何形式出发, 可以得到下述推论:

推论 2.4

设 $F \subset E$ 是线性子空间, 且 $\overline{F} \neq E$, 则存在 $f \in E^*$ 使得 $f \neq 0$ 的同时有

$$\langle f, x \rangle = 0, \quad \forall x \in F. \quad \text{img alt="heart icon" data-bbox="888 595 903 607"/>$$

证明 取 $x_0 \in E \setminus \overline{F}$, 在 Hahn-Banach 定理的第二几何形式 2.3 中代入 $A = \overline{F}, B = \{x_0\}$ 知存在闭超平面 $[f = \alpha]$ 严格分离 $\overline{F}$ 和 $\{x_0\}$. 于是

$$\langle f, x \rangle < \alpha < \langle f, x_0 \rangle, \quad \forall x \in F.$$

因为 F 本身关于乘法封闭, 故对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 而言均有 $\lambda \langle f, x \rangle < \alpha$, 这说明只能有 $\langle f, x \rangle = 0 (\forall x \in F)$. $\square$

注 2.3 推论 2.4 经常被用来证明线性子空间 $F \subset E$ 的稠密性. 也就是说, 要说明 $F \subset E$ 在 E 中稠, 只需说明在 F 上恒为零的连续线性泛函在 E 上也恒为零.

2.1.3 双重对偶空间 E^{**} , 正交关系

设 E 是赋范线性空间, E^* 是它的对偶空间, 其上范数定义为

$$\|f\|_{E^*} = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle|.$$

双重对偶空间 E^{**} 定义为 E^* 的对偶空间, 其上范数定义为

$$\|\xi\|_{E^{**}} = \sup_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} |\langle \xi, f \rangle|, \quad \xi \in E^{**}.$$

从 E 到 E^{**} 存在一个典则单射 (canonical injection) J : 取定 $x \in E$, 知映射 $f \mapsto \langle f, x \rangle$ 是 E^* 上的连续线性泛函, 因此这个映射是 E^{**} 中的元素, 记该映射为 Jx , 则有:

$$\langle Jx, f \rangle_{(E^{**}, E^*)} = \langle f, x \rangle_{(E^*, E)}, \quad \forall x \in E, \forall f \in E^*. \quad (2.6)$$

显见 J 是线性的, 同时 J 是等距映射, 亦即 $\|Jx\|_{E^{**}} = \|x\|_E$. 这是因为

$$\|Jx\|_{E^{**}} = \sup_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} |\langle Jx, f \rangle| = \sup_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} |\langle f, x \rangle| = \|x\|_E.$$

一般来说, 典则映射 J 并不是 $E \rightarrow E^{**}$ 的满射, 不过通过这一映射, 我们可以把 E 等同于 E^{**} 的一个子空间. 如果 J 能够成为满射, 就称 E 是自反空间, 此时把 E^{**} 与 E 视作同一空间.

定义 2.3 (空间的正交)

若 $M \subset E$ 是线性子空间, 则记

$$M^\perp = \{f \in E^* : \langle f, x \rangle = 0, \forall x \in M\}.$$

若 $N \subset E^*$ 是线性子空间, 则记

$$N^\perp = \{x \in E : \langle f, x \rangle = 0, \forall f \in N\}.$$

根据定义, $N^\perp$ 是 E (而非 E^{**}) 的子集. 显见 $M^\perp$ (或 $N^\perp$) 是 E^* (或 E) 的闭线性子空间. 称 $M^\perp$ (或 $N^\perp$) 是正交于 M (或 N) 的空间.



命题 2.2

设 $M \subset E$ 是线性子空间, 则

$$(M^\perp)^\perp = \overline{M}.$$

设 $N \subset E^*$ 是线性子空间, 则

$$(N^\perp)^\perp \supset \overline{N}.$$



证明 显见 $M \subset (M^\perp)^\perp$, 又因为 $(M^\perp)^\perp$ 是闭集, 故 $\overline{M} \subset (M^\perp)^\perp$. 下面说明 $(M^\perp)^\perp \subset \overline{M}$. 若存在 $x_0 \in (M^\perp)^\perp \setminus \overline{M}$, 由 Hahn-Banach 定理的第二几何形式 2.3 知存在闭超平面严格分离 $\{x_0\}$ 和 $\overline{M}$, 根据严格分离的定义知存在 $f \in E^*$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle f, x \rangle < \alpha < \langle f, x_0 \rangle, \quad \forall x \in M.$$

因为 M 是线性空间, 故只能有 $\langle f, x \rangle = 0 (\forall x \in M)$, 且 $\langle f, x_0 \rangle > 0$. 因此 $f \in M^\perp$, 又由 $x_0 \in (M^\perp)^\perp$ 知 $\langle f, x_0 \rangle = 0$, 矛盾!

$N \subset (N^\perp)^\perp$ 是显然的, 因此 $\overline{N} \subset (N^\perp)^\perp$. □

注 2.4 不同于 E 的情形, 对于 E^* 而言, $(N^\perp)^\perp$ 是可能严格大于 $\overline{N}$ 的. 我们不妨尝试证明 $(N^\perp)^\perp = \overline{N}$, 看看证明在哪个地方过不去. 设 $f_0 \in E^*$ 满足 $f_0 \in (N^\perp)^\perp \setminus \overline{N}$, 对 E^* 用 Hahn-Banach 定理知可以严格分离 $\{f_0\}$ 和 $\overline{N}$, 因此存在 $\xi \in E^{**}$ 使得 $\langle \xi, f_0 \rangle > 0$. 为了导出矛盾, 我们需要说明 $\langle \xi, f_0 \rangle = 0$, 但这一式子的成立需要 $\xi \in E$, 而 E^{**} 未必等于 E , 证明至此就过不去了. 也就是说, 只要 E 是自反空间, 那么就确实有 $(N^\perp)^\perp = \overline{N}$. 在一般情况下, 可以证明 $(N^\perp)^\perp$ 在弱 * 拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 下与 N 的闭包重合.

2.1.4 共轭凸函数理论速览

共轭凸函数与凸分析理论在单调算子理论, 非线性半群理论与 PDE 中都有应用, 因此我们在这里讨论一下共轭凸函数. 我们从下半连续函数和凸函数的一些简单事实开始. 设 φ 是定义在 E 上, 在 $(-\infty, +\infty]$ 中取值的函数. 记 $D(\varphi)$ 是 φ 的定义域, 即

$$D(\varphi) = \{x \in E : \varphi(x) < +\infty\}.$$

定义 2.4 (上图 (epigraph))

函数 φ 的上图是集合^a

$$\text{epi } \varphi = \{(x, \lambda) \in E \times \mathbb{R} : \varphi(x) \leq \lambda\}.$$

^a这里设 $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, 因此 λ 不会取到 ∞ .




图 2.1: 上图示意.

设 E 是拓扑空间, 回忆下半连续的定义:

定义 2.5 (下半连续 (lower semicontinuous, l.s.c))

称函数 $\varphi : E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 下半连续, 如果对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 而言, 集合

$$[\varphi \leq \lambda] = \{x \in E : \varphi(x) \leq \lambda\}$$

均为闭集.



下半连续函数有下述基本性质:

- (i) 若 φ 下半连续, 则 $\text{epi } \varphi$ 是 $E \times \mathbb{R}$ 中的闭集, 反之亦然.
- (ii) 若 φ 下半连续, 则对任意 $x \in E$ 与任意 $\varepsilon > 0$, 存在 x 的某邻域使得

$$\varphi(y) \geq \varphi(x) - \varepsilon, \quad \forall y \in V$$

反之亦然. 特别地, 若 φ 下半连续, 则对 E 中任意趋向 x 的序列 $\{x_n\}$ 均有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) \geq \varphi(x)$$

若 E 是度量空间, 则反之亦然.

- (iii) 若 φ_1, φ_2 都下半连续, 则 $\varphi_1 + \varphi_2$ 下半连续.
- (iv) 若 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 是下半连续函数族, 则其上包络是下半连续函数, 亦即

$$\varphi(x) := \sup_{i \in I} \varphi_i(x)$$

下半连续.

- (v) 若 E 是紧集, φ 下半连续, 则 $\inf_E \varphi$ 能够达到.

现设 E 是线性空间, 回忆凸函数的定义:

定义 2.6 (凸函数 (convex function))

函数 $\varphi: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 称为凸函数, 如果

$$\varphi(tx + (1-t)y) \leq t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y), \quad \forall x, y \in E, \forall t \in (0, 1).$$



凸函数有下述基本性质:

- (i) 若 φ 是凸函数, 则 $\text{epi } \varphi$ 是 $E \times \mathbb{R}$ 中的凸集, 反之亦然.
- (ii) 若 φ 是凸函数, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 集合 $[\varphi \leq \lambda]$ 都是凸集, 但反之不成立.
- (iii) 若 φ_1, φ_2 都是凸函数, 则 $\varphi_1 + \varphi_2$ 是凸函数.
- (iv) 若 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 是凸函数族, 则其上包络 $\sup_i \varphi_i$ 是凸函数.

下面默认 E 是赋范线性空间.

定义 2.7 (共轭函数 (conjugate function))

设 $\varphi: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是满足 $\varphi \not\equiv \infty$ (亦即 $D(\varphi) \neq \emptyset$) 的函数, 定义其共轭函数 $\varphi^*: E^* \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 为^a

$$\varphi^*(f) = \sup_{x \in E} \{\langle f, x \rangle - \varphi(x)\}, \quad f \in E^*.$$

^a有时称 φ^* 为 φ 的 Legendre 变换.



注意到 φ^* 总是 E^* 上的下半连续凸函数. 这是因为任取 $x \in E$, 函数 $f \mapsto \langle f, x \rangle - \varphi(x)$ 都是 E^* 上的连续凸函数 (进而是下半连续凸函数), 从而 x 跑遍 E 时形成的函数族的上包络同样是下半连续凸函数.

注 2.5 显见

$$\langle f, x \rangle \leq \varphi(x) + \varphi^*(f), \quad \forall x \in E, \forall f \in E^*,$$

该不等式称为 Young 不等式. 如果令 $E = E^* = \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \frac{1}{p}|t|^p$, $\varphi^*(s) = \frac{1}{p'}|s|^{p'}$ (其中 $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$), 那么上述不等式就成为了经典的 Young 不等式:

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{p'}b^{p'}, \quad \forall a, b \geq 0.$$

命题 2.3

设 $\varphi: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是下半连续凸函数, 且 $\varphi \not\equiv +\infty$, 则 $\varphi^* \not\equiv +\infty$. 特别地, φ 总在某仿射连续函数之上.



证明 设 $x_0 \in D(\varphi)$, $\lambda_0 < \varphi(x_0)$. 在空间 $E \times \mathbb{R}$ 中对 $A = \text{epi } \varphi$, $B = \{(x_0, \lambda_0)\}$ 用 Hahn-Banach 定理的第二几何形式 2.3 知存在 $E \times \mathbb{R}$ 中的闭超平面 $H = [\Phi = \alpha]$ 严格分离 A, B . 注意到函数 $E \ni x \mapsto \Phi((x, 0))$ 是 E 上的连续线性泛函, 故存在 $f \in E^*$ 使得 $\Phi((x, 0)) = \langle f, x \rangle$. 取 $k = \Phi((0, 1))$, 知

$$\Phi((x, \lambda)) = \langle f, x \rangle + k\lambda, \quad \forall (x, \lambda) \in E \times \mathbb{R}.$$

因为闭超平面 $[\Phi = \alpha]$ 严格分离 A, B , 可设在 A 上 $\Phi > \alpha$, 在 B 上 $\Phi < \alpha$, 则

$$\langle f, x \rangle + k\lambda > \alpha, \quad \forall (x, \lambda) \in \text{epi } \varphi,$$

且

$$\langle f, x_0 \rangle + k\lambda_0 < \alpha.$$

特别有

$$\langle f, x \rangle + k\varphi(x) > \alpha, \quad \forall x \in D(\varphi), \quad (2.7)$$

因此

$$\langle f, x_0 \rangle + k\varphi(x_0) > \alpha > \langle f, x_0 \rangle + k\lambda_0$$

这说明 $k > 0$, 进而由(2.7)式知

$$\left\langle -\frac{1}{k}f, x \right\rangle - \varphi(x) < -\frac{\alpha}{k}, \quad \forall x \in D(\varphi),$$

因此 $\varphi^*\left(-\frac{1}{k}f\right) < +\infty$. $\left\langle -\frac{1}{k}f, x \right\rangle + \frac{\alpha}{k}$ 正是欲求的仿射连续函数. $\square$

如果我们对 φ^* 再用一次算子 $*$, 就能得到定义在 E^{**} 上的函数 φ^{**} , 但 E^{**} 不如 E 好研究. 因为 $E \subset E^{**}$, 故我们谈 φ^{**} 时会把它限制在 E 上, 亦即

$$\varphi^{**}(x) := \sup_{f \in E^*} [\langle f, x \rangle - \varphi^*(f)], \quad x \in E.$$

定理 2.4 (Fenchel-Moreau)

若 $\varphi: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是下半连续凸函数, 且 $\varphi \not\equiv +\infty$, 则 $\varphi^{**} = \varphi$.



证明 我们分两步来证明.

第一步: 另设 $\varphi \geq 0$, 往证 $\varphi^{**} = \varphi$.

由 φ^* 的定义知对 $\forall x \in E$ 与 $\forall f \in E^*$ 均有 $\langle f, x \rangle - \varphi^*(f) \leq \varphi(x)$, 因此 $\varphi^{**} \leq \varphi$. 为证 $\varphi^{**} = \varphi$, 考虑反证法, 设 $\exists x_0 \in E$ 使得 $\varphi^{**}(x_0) < \varphi(x_0)$. 考虑证明 $\varphi(x_0) = +\infty$, 而 $\varphi^{**}(x_0)$ 始终有限. 现在在空间 $E \times \mathbb{R}$ 中对 $A = \text{epi } \varphi, B = (x_0, \varphi^{**}(x_0))$ 应用 Hahn-Banach 定理的第二几何形式, 由命题 2.3 知 $\exists f \in E^*, k \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle f, x \rangle + k\lambda > \alpha, \quad \forall (x, \lambda) \in \text{epi } \varphi, \quad (2.8)$$

$$\langle f, x_0 \rangle + k\varphi^{**}(x_0) < \alpha. \quad (2.9)$$

在(2.8)式中取定 $x \in D(\varphi)$ 并令 $\lambda \rightarrow +\infty$ 可知只能有 $k \geq 0$ (这里我们没法像命题 2.3 的证明一样断言 $k > 0$; $k = 0$ 是可能出现的, 这种情况对应 $E \times \mathbb{R}$ 中的一个“铅直”超平面). 现取 $\varepsilon > 0$, 因为 $\varphi \geq 0$, 故由(2.8)式知

$$\langle f, x \rangle + (k + \varepsilon)\varphi(x) \geq \alpha, \quad \forall x \in D(\varphi).$$

因此

$$\varphi^*\left(-\frac{f}{k + \varepsilon}\right) \leq -\frac{\alpha}{k + \varepsilon}.$$

由 $\varphi^{**}(x_0)$ 的定义可知

$$\varphi^{**}(x_0) \geq \left\langle -\frac{f}{k + \varepsilon}, x_0 \right\rangle - \varphi^*\left(-\frac{f}{k + \varepsilon}\right) \geq \left\langle -\frac{f}{k + \varepsilon}, x_0 \right\rangle + \frac{\alpha}{k + \varepsilon}.$$

因此

$$\langle f, x_0 \rangle + (k + \varepsilon)\varphi^{**}(x_0) \geq \alpha, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

这便与(2.9)式矛盾了. $\varphi \geq 0$ 的情况得证.

第二步: 一般情况.

取定 $f_0 \in D(\varphi^*)$ (由命题 2.3 可知 $D(\varphi^*) \neq \emptyset$), 定义

$$\bar{\varphi}(x) = \varphi(x) - \langle f_0, x \rangle + \varphi^*(f_0)$$

知 $\bar{\varphi}$ 同样是下半连续凸函数, 且 $\bar{\varphi} \geq 0$. 根据 φ^* 的定义知 $\bar{\varphi} \geq 0$, 因此由第一步的结论知 $(\bar{\varphi})^{**} = \bar{\varphi}$, 下面计算 $(\bar{\varphi})^*$ 与 $(\bar{\varphi})^{**}$, 知

$$(\bar{\varphi})^*(f) = \varphi^*(f + f_0) - \varphi^*(f_0),$$

$$(\bar{\varphi})^{**}(x) = \varphi^{**}(x) - \langle f_0, x \rangle + \varphi^*(f_0).$$

因为 $(\bar{\varphi})^{**} = \bar{\varphi}$, 故 $\varphi^{**} = \varphi$. $\square$

下面给出一些适用于 Fenchel-Moreau 定理的例子.

例 2.1 考察 $\varphi(x) = \|x\|$, 显见

$$\varphi^*(f) = \begin{cases} 0, & \|f\| \leq 1, \\ +\infty, & \|f\| > 1. \end{cases}$$

因此

$$\varphi^{**}(x) = \sup_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} \langle f, x \rangle.$$

此时由 Fenchel-Moreau 定理得到的等式

$$\varphi^{**} = \varphi$$

实际上就是推论 2.3.

例 2.2 取定非空集合 $K \subset E$, 设

$$I_K(x) = \begin{cases} 0, & x \in K, \\ +\infty, & x \notin K. \end{cases}$$

函数 I_K 称为 K 的**指示函数 (indicator function)**(这与示性函数是不同的). 显见 I_K 是凸函数当且仅当 K 是凸集, I_K 是下半连续函数当且仅当 K 是闭集. I_K 的共轭函数 $(I_K)^*$ 称为 K 的**支撑函数 (supporting function)**.

显见如果 $K = M$ 是线性子空间, 那么 $(I_M)^* = I_{M^\perp}$, $(I_M)^{**} = I_{(M^\perp)^\perp}$. 若 M 是闭子空间, 由 I_M 的下半连续凸性可得 $(I_M)^{**} = I_M$, 这实际上就是 $(M^\perp)^\perp = M$. 在这种意义下, Fenchel-Moreau 定理和命题 2.2 说的其实是一回事.

我们用共轭函数的另一有用性质结束本节.

定理 2.5 (Fenchel-Rockafellar)

设 $\varphi, \psi: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是凸函数, 且存在 $x_0 \in D(\varphi) \cap D(\psi)$ 使得 φ 在 x_0 处连续, 则

$$\begin{aligned} \inf_{x \in E} (\varphi(x) + \psi(x)) &= \sup_{f \in E^*} (-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)) \\ &= \max_{f \in E^*} (-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)) = -\min_{f \in E^*} (\varphi^*(-f) + \psi^*(f)). \end{aligned}$$

Fenchel-Rockafellar 定理的证明需要下述引理:

引理 2.4

若 $C \subset E$ 是凸集, 则 C° 也是凸集. 另若 $C^\circ \neq \emptyset$, 则

$$\overline{C} = \overline{(C^\circ)^\circ}.$$

引理 2.4 的证明就略过了, 下面证明 Fenchel-Rockafellar 定理.

证明 记

$$\begin{aligned} a &= \inf_{x \in E} (\varphi(x) + \psi(x)), \\ b &= \sup_{f \in E^*} (-\varphi^*(-f) - \psi^*(f)). \end{aligned}$$

易证 $b \leq a$. 若 $a = -\infty$, 则定理结论是显见的, 下设 $a \in \mathbb{R}$. 令 $C = \text{epi } \varphi$, 因为 φ 至少在 x_0 处连续, 故 $C^\circ \neq \emptyset$. 现在对于 $A = C^\circ$ 与

$$B = \{(x, \lambda) \in E \times \mathbb{R} : \lambda \leq a - \psi(x)\},$$

知 A, B 均为非空凸集. 另有 $A \cap B = \emptyset$, 这是因为若 $(x, \lambda) \in A$, 则 $\lambda > \varphi(x)$, 而另一方面由 a 的定义知 $\varphi(x) \geq a - \psi(x)$, 故 $(x, \lambda) \notin B$.

对 A, B 应用 Hahn-Banach 定理的第二几何形式可得闭超平面 H 分离 A, B , 进而 H 同样分离 $\overline{A}, B$. 但由引理 2.4 知 $\overline{A} = \overline{C}$, 故存在 $f \in E^*, k \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $E \times \mathbb{R}$ 中的超平面 $H = [\Phi = \alpha]$ 分离 C, B , 其中

$$\Phi((x, \lambda)) = \langle f, x \rangle + k\lambda, \quad \forall (x, \lambda) \in E \times \mathbb{R}.$$

因此可设

$$\langle f, x \rangle + k\lambda \geq \alpha, \quad \forall (x, \lambda) \in C, \quad (2.10)$$

$$\langle f, x \rangle + k\lambda \leq \alpha, \quad \forall (x, \lambda) \in B. \quad (2.11)$$

取 $x = x_0$, 在(2.10)式中令 $\lambda \rightarrow +\infty$ 可得 $k \geq 0$, 下面说明进一步有

$$k > 0. \quad (2.12)$$

考虑反证法, 设 $k = 0$, 则由 $\Phi \neq 0$ 知 $\|f\| \neq 0$. 由(2.10), (2.11)两式可得

$$\langle f, x \rangle \geq \alpha, \quad \forall x \in D(\varphi),$$

$$\langle f, x \rangle \leq \alpha, \quad \forall x \in D(\psi).$$

又因为存在足够小的 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $B(x_0, \varepsilon_0) \subset D(\varphi)$, 故

$$\langle f, x_0 + \varepsilon_0 z \rangle \geq \alpha, \quad \forall z \in B(0, 1),$$

这说明 $\langle f, x_0 \rangle \geq \alpha + \varepsilon_0 \|f\|$. 另一方面, 因为 $x_0 \in D(\psi)$, 故 $\langle f, x_0 \rangle \leq \alpha$, 结合前述结果知只能有 $\|f\| = 0$, 矛盾! (2.12)式由此得证.

由(2.10), (2.11)两式可知

$$\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) \leq -\frac{\alpha}{k}$$

且

$$\psi^*\left(\frac{f}{k}\right) \leq \frac{\alpha}{k} - a,$$

因此

$$-\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) - \psi^*\left(\frac{f}{k}\right) \geq \alpha.$$

另一方面, 由 b 的定义可得

$$-\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) - \psi^*\left(\frac{f}{k}\right) \leq b,$$

结合 $b \leq a$ 即得

$$a = b = -\varphi^*\left(-\frac{f}{k}\right) - \psi^*\left(\frac{f}{k}\right).$$

□

例 2.3 设 K 是非空凸集, 利用 Fenchel-Rockafellar 定理可以说明对任意 $x_0 \in E$ 均有

$$\text{dist}(x_0, K) = \inf_{x \in K} \|x - x_0\| = \max_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} (\langle f, x_0 \rangle - I_K^*(f)). \quad (2.13)$$

这是因为取 $\varphi(x) = \|x - x_0\|, \psi(x) = I_K(x)$ 可得

$$\inf_{x \in K} \|x - x_0\| = \inf_{x \in E} (\varphi(x) + \psi(x)).$$

由 Fenchel-Rockafellar 定理即得(2.13)式. 特别在 $K = M$ 为线性子空间时有

$$\text{dist}(x_0, M) = \inf_{x \in M} \|x - x_0\| = \max_{\substack{f \in M^\perp \\ \|f\| \leq 1}} \langle f, x_0 \rangle.$$

注 2.6 (2.13)式在 $\inf_{x \in K} \|x - x_0\|$ 没法达到时可以提供一些有用的信息. 这种情况多见于极小曲面理论: 此时原始问题(即 $\inf_{x \in E} (\varphi(x) + \psi(x))$) 一般没有解, 但其对偶问题(即 $\max_{f \in E^*} (-\varphi^*(-f) - \psi^*(f))$) 有解.

例 2.4 若 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续凸函数, $M \subset E$ 是线性子空间, 则

$$\inf_{x \in M} \varphi(x) = -\min_{f \in M^\perp} \varphi^*(f).$$

在 Fenchel-Rockafellar 定理中令 $\psi = I_M$ 即得上述结论.

2.2 一致有界原理与闭图像定理

2.2.1 Baire 纲定理

下面的结果在本节的证明中至关重要.

定理 2.6 (Baire)

设 X 是完备距离空间, $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是 X 的闭子集列. 若

$$X_n^\circ = \emptyset, \quad \forall n \geq 1$$

则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n \right)^\circ = \emptyset.$$



注 2.7 通常还会用到 Baire 纲定理的下述形式. 设 X 是非空完备距离空间, $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是其中的闭集列, 且

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = X,$$

则存在 n_0 使得 $X_{n_0}^\circ \neq \emptyset$.

证明 设 $O_n = X_n^c$, 则 O_n 是开集, 且对每个 $n \geq 1$ 而言, O_n 都在 X 中稠密, 往证 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ 在 X 中稠密. 设 ω 是 X 中的非空开集, 我们考虑证明 $\omega \cap G \neq \emptyset$.

记

$$B(x, r) = \{y \in X : d(y, x) < r\},$$

任取 $x_0 \in \omega, r_0 > 0$ 满足

$$\overline{B(x_0, r_0)} \subset \omega$$

因为 O_1 是开集且在 X 中稠密, 故可以进一步取 $x_1 \in B(x_0, r_0) \cap O_1, r_1 > 0$ 满足

$$\begin{cases} \overline{B(x_1, r_1)} \subset B(x_0, r_0) \cap O_1, \\ 0 < r_1 < \frac{r_0}{2}, \end{cases}$$

归纳可知存在序列 $\{x_n\}, \{r_n\}$ 使得

$$\begin{cases} \overline{B(x_{n+1}, r_{n+1})} \subset B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}, \quad \forall n \geq 0, \\ 0 < r_{n+1} < \frac{r_n}{2}. \end{cases}$$

显见 $\{x_n\}$ 是 X 中的基本列, 设 $x_n \rightarrow l$.

因为 $x_{n+p} \in B(x_n, r_n)$ 对任意 $n \geq 0$ 与任意 $p \geq 0$ 均成立, 故令 $p \rightarrow \infty$ 可得

$$l \in \overline{B(x_n, r_n)}, \quad \forall n \geq 0.$$

特别有 $l \in \omega \cap G$, 此即欲证. □

2.2.2 一致有界原理

定理 2.7 (Banach-Steinhaus 一致有界原理 (共鸣定理))

设 E, F 是 Banach 空间, $\{T_i\}_{i \in I}$ 是 $E \rightarrow F$ 的连续线性算子族 (该算子族未必可数). 若

$$\sup_{i \in I} \|T_i x\| < \infty, \quad \forall x \in E. \quad (2.14)$$

则

$$\sup_{i \in I} \|T_i\|_{E \rightarrow F} < \infty. \quad (2.15)$$

也就是说, 存在常数 c 使得

$$\|T_i x\| \leq c \|x\|, \quad \forall x \in E, \forall i \in I.$$



注 2.8 一致有界原理的结论是相当出人意外的, 它将点态估计升级成了全局估计 (一致估计).

证明 对 $n \geq 1$, 记

$$X_n = \{x \in E : \forall i \in I, \|T_i x\| \leq n\},$$

由 T_i 的连续性知 X_n 是闭集, 由(2.14)式知

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = E.$$

因为 $E \neq \emptyset$, 由 Baire 纲定理知存在 $n_0 \geq 1$ 使得 $X_{n_0}^\circ \neq \emptyset$. 取 $x_0 \in E, r > 0$ 满足 $B(x_0, r) \subset X_{n_0}$, 由 X_n 的构造可得

$$\|T_i(x_0 + rz)\| \leq n_0, \quad \forall i \in I, \forall z \in B(0, 1).$$

由 T_i 的线性性与范数的三角不等式进而可得

$$r \|T_i\|_{E \rightarrow F} \leq n_0 + \|T_i x_0\|,$$

此即(2.15)式. □

从一致有界原理能推知下述结果.

推论 2.5

设 E, F 是 Banach 空间, $\{T_n\}$ 是 $E \rightarrow F$ 的连续线性算子列, 且对 $\forall x \in E$ 而言, $T_n x$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时均收敛到 Tx , 则

- (i) $\sup_n \|T_n\|_{E \rightarrow F} < \infty$,
- (ii) $T \in L(E, F)$,
- (iii) $\|T\|_{E \rightarrow F} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|_{E \rightarrow F}$.



证明 由极限 Tx 的存在性知 (i) 是一致有界原理的直接推论, 进而存在常数 c 使得

$$\|T_n x\| \leq c \|x\|, \quad \forall n, \forall x \in E.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\|Tx\| \leq c \|x\|, \quad \forall x \in E.$$

又因为 T 显然是线性的, 故 (ii) 得证. 最后因为

$$\|T_n x\| \leq \|T_n\|_{E \rightarrow F} \|x\|, \quad \forall x \in E,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 (iii).

推论 2.6

设 G 是 Banach 空间, $B \subset G$. 若对任意 $f \in G^*$ 而言, 集合 $f(B) = \{\langle f, x \rangle : x \in B\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的有界集, 则 B 在 G 中有界.



证明 在一致有界原理中令 $E = G^*, F = \mathbb{R}, I = B$, 对任意 $b \in B$ 记

$$T_b(f) = \langle f, b \rangle, \quad f \in E = G^*,$$

于是由 $f(B)$ 的有界性知

$$\sup_{b \in B} |T_b(f)| < \infty, \quad \forall f \in E.$$

由一致有界原理进而知存在常数 c 使得

$$|\langle f, b \rangle| \leq c \|f\|, \quad \forall f \in G^*, \forall b \in B.$$

根据 Hahn-Banach 定理, 可以取到某个 $f \in G^*$ 使得 $|\langle f, b \rangle| = \|b\|, \|f\| = 1$, 因此

$$\|b\| \leq c, \quad \forall b \in B.$$

□

注 2.9 推论 2.6 表明要想证明某个集合 B 有界, 只需关注有界线性泛函在 B 上的作用即可. 这件事其实在有限维空间我们干过很多次: 要说明某个集合有界, 只需说明该集合内的元素和全体线性基作内积均有界即可, 典例即各分量均有界的集合是有界的. 上述结果在某种意义上展示了无穷维空间中“内积”的运用. 有时我们也把推论 2.6 概括为“弱有界” $\Leftrightarrow$ “强有界”.

下面阐述推论 2.6 的对偶形式:

推论 2.7

设 G 是 Banach 空间, $B^* \subset G^*$. 若对任意 $x \in G$ 而言, 集合 $\langle B^*, x \rangle := \{\langle f, x \rangle : f \in B^*\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的有界集, 则 B^* 在 G^* 中有界.

♡

证明 在一致有界原理中令 $E = G, F = \mathbb{R}, I = B^*$, 对任意 $b \in B^*$ 记

$$T_b(x) = \langle b, x \rangle, \quad x \in G = E.$$

由条件可知存在常数 c 使得

$$|\langle b, x \rangle| \leq c \|x\|, \quad \forall b \in B^*, \forall x \in G.$$

进而由 $\|b\|$ 的定义即知

$$\|b\| \leq c, \quad \forall b \in B^*.$$

2.2.3 开映射定理与闭图像定理

本节介绍 Banach 空间的两个基本结果.

定理 2.8 (开映射定理)

设 E, F 是 Banach 空间, T 是 $E \rightarrow F$ 的连续线性满射, 则存在常数 $c > 0$ 使得

$$T(B_E(0, 1)) \supset B_F(0, c). \quad (2.16)$$

♡

注 2.10 (2.16) 式表明 E 中的任意开集在作用 T 之后的象依旧是 F 中的开集. 这是因为设 U 是 E 中的开集, 任取 $y_0 \in T(U)$, 知存在 $x_0 \in U$ 使得 $y_0 = Tx_0$. 取 $r > 0$ 满足 $B(x_0, r) \subset U$, 知这可以转化为 $x_0 + B(0, r) \subset U$, 两边作用 T 可得

$$y_0 + T(B(0, r)) \subset T(U)$$

由 (2.16) 式得

$$T(B(0, r)) \supset B(0, rc)$$

因此

$$B(y_0, rc) \subset T(U).$$

从开映射定理出发可以得到下述用于证明算子逆连续性的重要结论.

推论 2.8

设 E, F 是 Banach 空间, T 是 $E \rightarrow F$ 的连续线性双射, 则 T^{-1} 是 $F \rightarrow E$ 的连续线性算子.



我们先证明推论 2.8.

证明 由 (2.16) 式与 T 是单射知只要 $x \in E$ 满足 $\|Tx\| \leq c$, 就必有 $\|x\| < 1$, 由范数的齐次性可得

$$\|x\| \leq \frac{1}{c} \|Tx\|, \quad \forall x \in E$$

此即 T^{-1} 的连续性. □

另外, 开映射定理还能导出下面的范数等价定理:

推论 2.9 (范数等价定理)

设 E 是线性空间, 其上赋有范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$. 若 E 在这两种范数下都是 Banach 空间, 且存在常数 $C \geq 0$ 使得

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \quad \forall x \in E.$$

则这两个范数等价, 亦即存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|x\|_1 \leq c\|x\|_2, \quad \forall x \in E.$$



同样地, 我们先证明范数等价定理 2.9.

证明 在推论 2.8 中代入

$$E = (E, \|\cdot\|_1), F = (E, \|\cdot\|_2), T = \text{Id}$$

即可. □

下面我们着手证明开映射定理.

证明 我们把证明分成两部分进行.

第一部分: 从 T 的满射性推导它在单位球上的非退化性

这部分设 T 是 $E \rightarrow F$ 的线性满射, 往证存在常数 $c > 0$ 使得

$$\overline{T(B(0, 1))} \supset B(0, 2c). \quad (2.17)$$

记 $X_n = \overline{nT(B(0, 1))}$. 因为 T 是满射, 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = F$, 又因为 $F \neq \emptyset$, 故由 Baire 纲定理知存在 n_0 使得 $X_{n_0}^\circ \neq \emptyset$, 因此

$$(\overline{T(B(0, 1))})^\circ \neq \emptyset.$$

取 $c > 0, y_0 \in F$ 满足

$$B(y_0, 4c) \subset \overline{T(B(0, 1))}, \quad (2.18)$$

特别地, $y_0 \in \overline{T(B(0, 1))}$, 再根据 T 的线性性与 $B(0, 1)$ 关于原点的对称性可知

$$-y_0 \in \overline{T(B(0, 1))}. \quad (2.19)$$

将 (2.18), (2.19) 两式相加可得

$$B(0, 4c) \subset \overline{T(B(0, 1))} + \overline{T(B(0, 1))}.$$

另一方面, 因为 $\overline{T(B(0, 1))}$ 是凸集, 故

$$\overline{T(B(0, 1))} + \overline{T(B(0, 1))} = 2\overline{T(B(0, 1))}$$

此即 (2.17) 式.

第二部分: 从 T 的连续性与 (2.17) 式推导欲证结论.

这部分考虑 T 是 $E \rightarrow F$ 的连续线性算子, 且其满足 (2.17) 式, 往证

$$T(B(0, 1)) \supset B(0, c). \quad (2.20)$$

任取 $y \in F$ 满足 $\|y\| < c$, 要证明(2.20)式, 就是要找到 $x \in E$ 使得

$$\|x\| < 1, Tx = y. \quad (2.21)$$

由(2.17)式知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists z \in E \left(\|z\| < \frac{1}{2} \wedge \|y - Tz\| < \varepsilon \right). \quad (2.22)$$

取 $\varepsilon = c/2$, 根据上式知存在 $z_1 \in E$ 使得

$$\|z_1\| < \frac{1}{2}, \|y - Tz_1\| < \frac{c}{2}.$$

把 y 换成 $y - Tz_1$, ε 换成 $c/4$, 重复这一过程知存在 $z_2 \in E$ 使得

$$\|z_2\| < \frac{1}{4}, \|(y - Tz_1) - Tz_2\| < \frac{c}{4}.$$

进一步重复该过程, 归纳可得序列 $\{z_n\}$ 满足

$$\|z_n\| < \frac{1}{2^n}, \|y - T(z_1 + z_2 + \cdots + z_n)\| < \frac{c}{2^n}, \quad \forall n.$$

显见序列 $x_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n$ 是 E 中的基本列, 设 $x_n \rightarrow x$, 由 T 的连续性即得 $\|x\| < 1, y = Tx$. $\square$

定理 2.9 (闭图像定理)

设 E, F 是 Banach 空间, T 是 $E \rightarrow F$ 的线性算子. 若 T 的图 $G(T) = \{(x, Tx) : x \in E\}$ 是 $E \times F$ 中的闭集, 则 T 连续.



注 2.11 闭图像定理的逆命题是显然成立的, 因为任意连续映射 (不管线性与否) 的图都是闭集.

证明 在 E 上考虑两种范数:

$$\|x\|_1 = \|x\|_E + \|Tx\|_F, \|x\|_2 = \|x\|_E$$

(其中 $\|\cdot\|_1$ 称为图范数). 根据 $G(T)$ 的闭性知 E 在 $\|\cdot\|_1$ 下同样是 Banach 空间, 而 E 本身在 $\|\cdot\|_2$ 下是 Banach 空间, 且显见 $\|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1$. 故由范数等价定理知这两个范数等价, 因此存在常数 $c > 0$ 使得 $\|x\|_1 \leq c\|x\|_2$, 此即 $\|Tx\|_F \leq c\|x\|_E$, 因此 T 连续. $\square$

2.2.4 拓扑余子空间, 右 (左) 可逆算子

我们先讨论由开映射定理出发得到的 Banach 空间闭子空间的一些几何性质.

定理 2.10

设 E 是 Banach 空间, 若 G, L 是两个闭子空间, 且 $G + L$ 是闭集, 则存在常数 $C \geq 0$ 使得

$$\begin{cases} \text{每个 } z \in G + L \text{ 均可分解为 } z = x + y, \text{ 其中 } x \in G, y \in L. \\ \text{且 } \|x\| \leq C\|z\|, \|y\| \leq C\|z\|. \end{cases} \quad (2.23)$$



证明 考虑乘积空间 $G \times L$, 在其上赋范

$$\|[x, y]\| = \|x\| + \|y\|.$$

另对空间 $G + L$ 赋 E 上的范数. 现在定义映射 $T : G \times L \rightarrow G + L$ 为 $T[x, y] = x + y$, 显见 T 是连续线性满射, 进而由开映射定理知存在常数 $c > 0$ 使得只要 $z \in G + L$ 满足 $\|z\| < c$, 它就能写成 $z = x + y$, 其中 $x \in G, y \in L, \|x\| + \|y\| < 1$. 根据范数的齐次性知每个 $z \in G + L$ 都能表为

$$z = x + y, \quad x \in G, y \in L, \|x\| + \|y\| \leq \frac{1}{c}\|z\|.$$



推论 2.10

在定理2.10的假设下, 存在常数 C 使得

$$\text{dist}(x, G \cap L) \leq C(\text{dist}(x, G) + \text{dist}(x, L)), \quad \forall x \in E. \quad (2.24)$$

证明 取定 $x \in E, \varepsilon > 0$, 根据 dist 的定义知存在 $a \in G, b \in L$ 使得

$$\|x - a\| \leq \text{dist}(x, G) + \varepsilon, \|x - b\| \leq \text{dist}(x, L) + \varepsilon.$$

对 $z = a - b$ 应用定理2.10知存在 $a' \in G, b' \in L$ 使得

$$a - b = a' + b', \|a'\| \leq C\|a - b\|, \|b'\| \leq C\|a - b\|.$$

故 $a - a' \in G \cap L$, 且

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, G \cap L) &\leq \|x - (a - a')\| \leq \|x - a\| + \|a'\| \\ &\leq \|x - a\| + C\|a - b\| \leq \|x - a\| + C(\|x - a\| + \|x - b\|) \\ &\leq (1 + C)\text{dist}(x, G) + \text{dist}(x, L) + (1 + 2C)\varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得欲证.

注 2.12 推论2.10的逆命题同样成立: 如果 G, L 是满足(2.24)式的闭子空间, 那么 $G + L$ 同样是闭子空间.

定义 2.8 (拓扑余子空间 (topological complement))

设 $G \subset E$ 是 Banach 空间 E 的闭子空间. 称 E 的子空间 L 为 G 的拓扑余子空间 (简称为余子空间), 如果

- (i) L 是闭集,
- (ii) $G \cap L = \{0\}, G + L = E$.

上述情形成立时, 称 G, L 在 E 中互为余子空间, 此时每个 $z \in E$ 都能唯一地表为 $z = x + y, x \in G, y \in L$. 根据定理2.10, 投影算子 $z \mapsto x, z \mapsto y$ 是连续线性算子 (这一性质同样可以作为余子空间的定义).

例 2.5 每个有限维子空间 G 都具有余子空间. 这是因为设 $e_1, \dots, e_n$ 为 G 的一组基, 显见每个 $x \in G$ 都能表为 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. 记 $\varphi_i(x) = x_i$, 由 Hahn-Banach 定理的解析形式知每个 φ_i 都能延拓为定义在 E 上的连续线性泛函 $\tilde{\varphi}_i$, 可以验证 $L = \bigcap_{i=1}^n (\tilde{\varphi}_i)^{-1}(0)$ 正是 G 的余子空间.

例 2.6 任意余维²有限的闭子空间 G 都具有余子空间. 只需找到使得 $G \cap L = \{0\}, G + L = E$ 的任意有限维空间 L (亦即 G 的有限维正交补空间) 即可, 下面介绍这种情形的典例.

设 $N \subset E^*$ 是 p 维子空间, 则

$$G = \{x \in E : \langle f, x \rangle = 0, \forall f \in N\} = N^\perp$$

是余维为 p 的闭集. 这是因为取 $f_1, \dots, f_p$ 为 N 的基, 则由 Hahn-Banach 定理知存在 $e_1, \dots, e_p \in E$ 使得

$$\langle f_i, e_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, p.$$

(这是因为对映射

$$x \in E \mapsto \Phi(x) = (\langle f_1, x \rangle, \dots, \langle f_p, x \rangle)$$

而言, 显见 Φ 是满射, 否则由 Hahn-Banach 定理的第二几何形式知存在 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \neq 0$ 使得

$$\alpha \cdot \Phi(x) = \left\langle \sum_{i=1}^p \alpha_i f_i, x \right\rangle = 0, \quad \forall x \in E,$$

这显然是不可能的.)

显见 $\{e_i\}_{1 \leq i \leq p}$ 线性独立, 因此该向量组张成的空间就是 G 的余子空间.

例 2.7 Hilbert 空间中的每个闭子空间都有余子空间.

注 2.13 需要注意就算在自反空间中, 我们也能构造不具有余子空间的闭子空间. Lindenstrauss-Tzafriri 表明: 任何

²若存在 $X \subset E$ 使得 $G + X = E$, 就称 $\dim X$ 为 G 的余维数, 记作 $\text{codim } G$.

不同构于 Hilbert 空间的 Banach 空间都存在不具有余子空间的闭子空间.

定义 2.9 (右逆算子 (right inverse), 左逆算子 (left inverse))

设 $T \in L(E, F)$, T 的右逆算子为算子 $S \in L(F, E)$, 其满足 $T \circ S = \text{Id}_F$. T 的左逆算子为算子 $S \in L(F, E)$, 其满足 $S \circ T = \text{Id}_E$.



下面的结果给出了逆算子存在的充要条件.

定理 2.11 (右逆算子的存在性)

设 $T \in L(E, F)$ 是满射, 则下述命题等价:

- (i) T 具有右逆算子.
- (ii) $N(T) = T^{-1}(0)$ 在 E 中具有余子空间.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 设 S 是 T 的右逆, 可以验证 $R(S) = S(F)$ 正是 $N(T)$ 在 E 中的余子空间.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 L 是 $N(T)$ 的余子空间, 令 P 为 $E \rightarrow L$ 的 (连续) 投影算子. 任取 $f \in F$, 记 x 为 $Tx = f$ 的解 (因为 T 是满射, 所以解必定存在). 现定义 $Sf = Px$, 注意到 S 的定义实际上与 x 的选择无关 (可能存在的 x 之间的差异被投影抹去了), 易证 $S \in L(F, E)$ 且 $T \circ S = \text{Id}_F$. $\square$

注 2.14 存在自反空间 E, F , 它们之间存在不具有右逆算子的连续线性满射. 例如对没有拓扑余子空间的闭子空间 $G \subset E$, 取 $F = E/G$, T 是 $E \rightarrow F$ 的典则投影.

定理 2.12 (左逆算子的存在性)

设 $T \in L(E, F)$ 是单射, 则下述命题等价:

- (i) T 具有左逆算子.
- (ii) $R(T) = T(E)$ 是闭子空间, 且它在 F 中具有余子空间.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 记 $f = TS(f) + (f - TSf)$, 显见 $R(T)$ 是闭子空间, 且 $N(S)$ 是 $R(T)$ 的余子空间.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 P 是 $F \rightarrow R(T)$ 的连续投影算子. 取 $f \in F$, 因为 $Pf \in R(T)$, 故存在唯一的 $x \in E$ 使得 $Tx = Pf$. 令 $Sf = x$, 可见 $S \circ T = \text{Id}_E$. 另由推论 2.8 可知 S 连续. $\square$

2.2.5 再论正交关系

我们首先给出空间的和运算, 交运算与正交运算之间的关系.

命题 2.4

设 G, L 是 E 的闭子空间, 则

$$G \cap L = (G^\perp + L^\perp)^\perp, \quad (2.25)$$

$$G^\perp \cap L^\perp = (G + L)^\perp. \quad (2.26)$$



证明 (2.25): 首先证明 $G \cap L \subset (G^\perp + L^\perp)^\perp$. 取 $x \in G \cap L$, $f \in G^\perp + L^\perp$, 显见 $\langle f, x \rangle = 0$, 此即 $G \cap L \subset (G^\perp + L^\perp)^\perp$. 再说明 $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset G \cap L$. 显见 $G^\perp \subset G^\perp + L^\perp$, 因此 $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset G^{\perp\perp} = G$, 类似可得 $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset L$, 因此 $(G^\perp + L^\perp)^\perp \subset G \cap L$.

(2.26) 的证明与上述证明是类似的. $\square$

通过命题 2.2, 容易得到下述结果:

推论 2.11

设 G, L 是 E 的闭子空间, 则

$$(G \cap L)^\perp \supset \overline{G^\perp + L^\perp}, \quad (2.27)$$

$$(G^\perp \cap L^\perp)^\perp = \overline{G + L}. \quad (2.28)$$



下面给出一些更深刻的结果.

定理 2.13

设 G, L 是 Banach 空间 E 的闭子空间, 则下述命题等价:

- (i) $G + L$ 在 E 中闭,
- (ii) $G^\perp + L^\perp$ 在 E^* 中闭,
- (iii) $G + L = (G^\perp \cap L^\perp)^\perp$,
- (iv) $G^\perp + L^\perp = (G \cap L)^\perp$.



证明 (i) $\Leftrightarrow$ (iii) 由 (2.28) 式立得, (iv) $\Rightarrow$ (ii) 显见, 下面证明 (i) $\Rightarrow$ (iv), (ii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (iv). 由 (2.27) 式知只需证明 $(G \cap L)^\perp \subset G^\perp + L^\perp$ 即可. 任取 $f \in (G \cap L)^\perp$, 对每个 $x \in G + L$, 记 $x = a + b, a \in G, b \in L$, 定义泛函 $\varphi: G + L \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\varphi(x) = \langle f, a \rangle.$$

显见 φ 与 x 的分解方式无关, 且 φ 是线性映射. 由定理 2.10 知可选取 a, b 使得 $\|a\| \leq C\|x\|$, 因此

$$|\varphi(x)| \leq C\|x\|, \quad \forall x \in G + L.$$

利用 Hahn-Banach 定理的解析形式将 φ 延拓为 E 上的连续线性泛函 $\tilde{\varphi}$, 可得:

$$f = (f - \tilde{\varphi}) + \tilde{\varphi}, \quad f - \tilde{\varphi} \in G^\perp, \tilde{\varphi} \in L^\perp.$$

此即 $(G \cap L)^\perp \subset G^\perp + L^\perp$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 由推论 2.10 知存在常数 C 使得

$$\text{dist}(f, G^\perp \cap L^\perp) \leq C(\text{dist}(f, G^\perp) + \text{dist}(f, L^\perp)), \quad \forall f \in E^*. \quad (2.29)$$

另一方面, 在 Fenchel-Rockafellar 定理 2.5 中令 $\varphi(x) = I_{B_E}(x) - \langle f, x \rangle, \psi(x) = I_G(x)$ (其中 $B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$) 可得

$$\text{dist}(f, G^\perp) = \sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle, \quad \forall f \in E^*. \quad (2.30)$$

类似可得

$$\text{dist}(f, L^\perp) = \sup_{\substack{x \in L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle, \quad \forall f \in E^* \quad (2.31)$$

结合 (2.26) 式, 利用与上述结果相同的方法可得

$$\text{dist}(f, G^\perp \cap L^\perp) = \text{dist}(f, (G + L)^\perp) = \sup_{\substack{x \in \overline{G+L} \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle, \quad \forall f \in E^*. \quad (2.32)$$

现结合 (2.29)-(2.32) 式可得

$$\sup_{\substack{x \in \overline{G+L} \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \leq C \left(\sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle + \sup_{\substack{x \in L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f, x \rangle \right), \quad \forall f \in E^*. \quad (2.33)$$

下面说明由 (2.33) 式可得

$$\overline{B_G + B_L} \supset \frac{1}{C} B_{\overline{G+L}}. \quad (2.34)$$

考虑反证法, 若存在 $x_0 \in \overline{G+L}$ 满足 $\|x_0\| \leq \frac{1}{C}, x_0 \notin \overline{B_G + B_L}$, 则存在 E 中的闭超平面严格分离 $\{x_0\}$ 与

$\overline{B_G + B_L}$, 因此存在 $f_0 \in E^*$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle f_0, x \rangle < \alpha < \langle f_0, x_0 \rangle, \quad \forall x \in B_G + B_L.$$

由此可得

$$\sup_{\substack{x \in G \\ \|x\| \leq 1}} \langle f_0, x \rangle + \sup_{\substack{x \in L \\ \|x\| \leq 1}} \langle f_0, x \rangle \leq \alpha < \langle f_0, x_0 \rangle,$$

这与(2.33)式矛盾! (2.34)式即证.

最后, 考察空间 $X = G \times L$, 在其上赋范

$$\|(x, y)\| = \max(\|x\|, \|y\|),$$

以及 $Y = \overline{G + L}$, 在其上赋 E 的范数. 显见映射 $T: X \rightarrow Y, (x, y) \mapsto x + y$ 是连续线性的, 进而由(2.34)式知

$$\overline{T(B_X)} \supset \frac{1}{C} B_Y.$$

利用开映射定理证明过程的第二部分可得

$$T(B_X) \supset \frac{1}{2C} B_Y$$

这说明 T 实际上是 $X \rightarrow Y$ 的满射, 故 $G + L = \overline{G + L}$.

2.2.6 无界线性算子引论, 伴随算子的定义

定义 2.10 (无界线性算子 (unbounded linear operator))

设 E, F 是 Banach 空间, 称线性映射 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 为 $E \rightarrow F$ 的无界线性算子, 如果它定义在线性子空间 $D(A) \subset E$ 上且在 F 中取值. $D(A)$ 称为 A 的定义域.



回忆有界算子 A 指的是 $D(A) = E$ 且存在常数 $c \geq 0$ 使得

$$\|Au\| \leq c\|u\|, \quad \forall u \in E.$$

注 2.15 无界线性算子显然可能有界, 因此“无界”这个词其实不太妥当, 但通常都是这么用的.

关于无界线性算子需要注意下述定义:

$$A \text{ 的图 (graph) } = G(A) = \{(u, Au) : u \in D(A)\} \subset E \times F,$$

$$A \text{ 的像集 (range) } = R(A) = \{Au : u \in D(A)\} \subset F,$$

$$A \text{ 的核 (kernel) } = N(A) = \{u \in D(A) : Au = 0\} \subset E.$$

回忆如果 $G(A)$ 在 $E \times F$ 中是闭集, 就称 A 为闭算子.

注 2.16 一般来说我们用下述方法证明 A 是闭算子: 取 $D(A)$ 中的序列 $\{u_n\}$ 使得在 E 中 $u_n \rightarrow u$, 在 F 中 $Au_n \rightarrow f$, 往证 $u \in D(A), f = Au$. 因为只谈论闭算子时没有涉及线性性, 故这套证明中不能只考虑 $u_n \rightarrow 0, Au_n \rightarrow F$ 的情况.

注 2.17 在实际应用中, 我们碰到的无界算子大多都是闭算子, 且其定义域 $D(A)$ 在 E 中稠密.

定义 2.11 (无界算子的伴随算子 (adjoint))

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义域在 E 中稠密的无界线性算子, 我们依照下述方法定义无界算子 $A^*: D(A^*) \subset F^* \rightarrow E^*$. 令

$$D(A^*) = \{v \in F^* : \exists c > 0 (|\langle v, Au \rangle| \leq c\|u\|, \forall u \in D(A))\}.$$

显见 $D(A^*)$ 是 F^* 的一个线性子空间, 下面定义 A^*v . 取定 $v \in D(A^*)$, 定义映射 $g: D(A) \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(u) = \langle v, Au \rangle, \quad \forall u \in D(A).$$

知

$$|g(u)| \leq c\|u\|, \quad \forall u \in D(A).$$

于是由 Hahn-Banach 定理的解析形式知存在线性映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 作为 g 的延拓满足

$$|f(u)| \leq c\|u\|, \quad \forall u \in E.$$

因此 $f \in E^*$. 又因为 $D(A)$ 在 E 中稠密, 故该延拓唯一. 定义

$$A^*v = f.$$

无界线性算子 $A^*: D(A^*) \subset F^* \rightarrow E^*$ 就称为 A 的伴随算子. 简单来说, A 与 A^* 之间的关系为:

$$\langle v, Au \rangle_{F^*, F} = \langle A^*v, u \rangle_{E^*, E}, \quad \forall u \in D(A), \forall v \in D(A^*).$$



注 2.18 其实前面在延拓 g 的时候不需要用到 Hahn-Banach 定理. 因为 $D(A)$ 在 E 中稠密, g 在 $D(A)$ 上一致连续, 且 $\mathbb{R}$ 完备, 故只需要用连续性即可完成延拓.

注 2.19 就算 A 是闭算子, $D(A^*)$ 也可能在 F^* 中不稠密, 但这种情况相当病态. 事实上, 如果 A 是闭算子, 那么在弱*拓扑 $\sigma(F^*, F)$ 下 $D(A^*)$ 确实在 F^* 中稠密. 特别当 F 是自反空间时, $D(A^*)$ 在通常的范数拓扑下在 F^* 中稠密.

注 2.20 如果 A 是有界算子, 那么 A^* 同样是 $F^* \rightarrow E^*$ 的有界算子, 且

$$\|A^*\|_{F^* \rightarrow E^*} = \|A\|_{E \rightarrow F}.$$

这是因为 A 有界时显见 $D(A^*) = F^*$. 根据 A^* 的定义知

$$|\langle A^*v, u \rangle| = |\langle v, Au \rangle| \leq \|A\| \|u\| \|v\|, \quad \forall u \in E, \forall v \in F^*.$$

这说明 $\|A^*v\| \leq \|A\| \|v\|$, 进而 $\|A^*\| \leq \|A\|$.

另一方面, 知

$$|\langle v, Au \rangle| = |\langle A^*v, u \rangle| \leq \|A^*\| \|u\| \|v\|, \quad \forall u \in E, \forall v \in F^*,$$

由 Hahn-Banach 定理的解析形式, 通过选取恰当的 v 即知 $\|Au\| \leq \|A^*\| \|u\|$, 因此 $\|A\| \leq \|A^*\|$.

命题 2.5

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义在 E 的某稠密子集上的无界线性算子, 则 A^* 是闭算子 (即 $G(A^*)$ 在 $F^* \times E^*$ 中闭).



证明 取 $v_n \in D(A^*)$ 满足 $v_n \rightarrow v$ 在 F^* 中成立, $A^*v_n \rightarrow f$ 在 E^* 中成立, 往证 $v \in D(A^*)$, $A^*v = f$.

根据伴随算子的定义知

$$\langle v_n, Au \rangle = \langle A^*v_n, u \rangle, \quad \forall u \in D(A).$$

在上式两端令 $n \rightarrow \infty$ 有

$$\langle v, Au \rangle = \langle f, u \rangle, \quad \forall u \in D(A).$$

于是对 $\forall u \in D(A)$ 有 $|\langle v, Au \rangle| \leq \|f\| \|u\|$, 此即 $v \in D(A^*)$, 根据 A^* 的定义立得 $A^*v = f$. □

A 的图与 A^* 的图之间有一个非常简单的正交关系: 考察同构:

$$I: F^* \times E^* \rightarrow E^* \times F^*, \quad I((v, f)) = (-f, v). \quad (2.35)$$

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义在 E 的某稠密子集上的无界线性算子, 则

$$I(G(A^*)) = G(A)^\perp.$$

这是因为取 $(v, f) \in F^* \times E^*$, 可得

$$\begin{aligned}(v, f) \in G(A^*) &\Leftrightarrow \langle f, u \rangle = \langle v, Au \rangle, \quad \forall u \in D(A) \\ &\Leftrightarrow -\langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle = 0, \quad \forall u \in D(A) \\ &\Leftrightarrow (-f, v) \in G(A)^\perp.\end{aligned}$$

下面再探讨伴随算子与原算子的像集与核之间的正交关系.

推论 2.12

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义在 E 的某稠密子集上的无界闭线性算子, 则

- (i) $N(A) = R(A^*)^\perp$,
- (ii) $N(A^*) = R(A)^\perp$,
- (iii) $N(A)^\perp \supset \overline{R(A^*)}$,
- (iv) $N(A^*)^\perp = \overline{R(A)}$.



证明 由命题 2.2 可直接由 (i), (ii) 推知 (iii), (iv), 故只需证明 (i), (ii). 记 $X = E \times F, X^* = E^* \times F^*$, 另记

$$G = G(A), L = E \times \{0\}$$

为 X 的子空间. 易证

$$N(A) \times \{0\} = G \cap L, \quad (2.36)$$

$$E \times R(A) = G + L. \quad (2.37)$$

显见 $L^\perp = \{0\} \times E^*$, 又由 (2.35) 式知 $G^\perp = I(G(A^*))$, 于是

$$\{0\} \times N(A^*) = G^\perp \cap L^\perp. \quad (2.38)$$

根据 A 的线性性, $D(A)$ 至少是对加法封闭的, 故

$$R(A^*) \times F^* = G^\perp + L^\perp. \quad (2.39)$$

下面来证明推论 2.12. 对于 (i), 由 (2.39) 式知

$$\begin{aligned}R(A^*)^\perp \times \{0\} &= (G^\perp + L^\perp)^\perp \stackrel{(A)}{=} G \cap L \\ &\stackrel{(B)}{=} N(A) \times \{0\}.\end{aligned}$$

其中 (A) 是 (2.25) 式; (B) 是 (2.36) 式. 对于 (ii), 由 (2.37) 式知

$$\begin{aligned}\{0\} \times R(A)^\perp &= (G + L)^\perp \stackrel{(C)}{=} G^\perp \cap L^\perp \\ &\stackrel{(D)}{=} \{0\} \times N(A^*),\end{aligned}$$

其中 (C) 是 (2.26) 式; (D) 是 (2.38) 式.

注 2.21 对于 (iii) 需要特别注意: 就算 A 是有界线性算子, $N(A)^\perp$ 也可能不等于 $\overline{R(A^*)}$. 但在弱 * 拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 下 $N(A)^\perp$ 总是 $R(A^*)$ 的闭包, 特别若 E 自反, 则 $N(A)^\perp = \overline{R(A^*)}$.

2.2.7 闭像集算子的刻画, 满射算子的刻画

定理 2.14 (闭像集算子的刻画)

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义在 E 的某稠密子集上的无界闭线性算子, 则下述命题等价:

- (i) $R(A)$ 是闭集,
- (ii) $R(A^*)$ 是闭集,
- (iii) $R(A) = N(A^*)^\perp$,
- (iv) $R(A^*) = N(A)^\perp$.



证明 采用与推论2.12相同的记号知:

- (i) $\Leftrightarrow G + L$ 在 X 中闭 (见(2.37)式),
- (ii) $\Leftrightarrow G^\perp + L^\perp$ 在 X^* 中闭 (见(2.39)式),
- (iii) $\Leftrightarrow G + L = (G^\perp \cap L^\perp)^\perp$ (见(2.37),(2.38)式),
- (iv) $\Leftrightarrow (G \cap L)^\perp = G^\perp + L^\perp$ (见(2.36),(2.39)式).

由定理2.13即得欲证. □

注 2.22 设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是无界闭线性算子, 则 $R(A)$ 是闭集当且仅当存在常数 C 使得

$$\text{dist}(u, N(A)) \leq C\|Au\|, \quad \forall u \in D(A).$$

下面的结果给出了满射算子的一个常用刻画.

定理 2.15 (满射算子的刻画)

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义在 E 的某稠密子集上的无界闭线性算子, 则下述命题等价:

- (i) A 是满射 (即 $R(A) = F$),
- (ii) 存在常数 C 使得

$$\|v\| \leq C\|A^*v\|, \quad \forall v \in D(A^*),$$

- (iii) $N(A^*) = \{0\}$, 且 $R(A^*)$ 是闭集.

注 2.23 (ii) $\Rightarrow$ (i) 在实际应用中常用于证明算子 A 是满射 (在 PDE 中对应的正是方程的可解性), 过程如下: 设 v 满足 $A^*v = f$, 往证 $\|v\| \leq C\|f\|$ (其中 C 与 f 无关). 该方法称为**先验估计 (a priori estimates)**, 在这一方法中我们并不需要关心方程 $A^*v = f$ 是否有解, 而是**先验地**假定 v 就是方程的解, 并尝试估计 v 的范数.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 记

$$B^* = \{v \in D(A^*) : \|A^*v\| \leq 1\}.$$

下面先证明 B^* 有界. 因为 $B^* \subset F^*$, 由一致有界原理知只需证明对 $\forall f_0 \in F$ 而言, 集合 $\langle B^*, f_0 \rangle$ 在 $\mathbb{R}$ 中有界. 因为 A 是满射, 故对这样的 $f_0 \in F$ 总会存在 $u_0 \in D(A)$ 使得 $Au_0 = f_0$. 因此对任意 $v \in B^*$ 有

$$\langle v, f_0 \rangle = \langle v, Au_0 \rangle = \langle A^*v, u_0 \rangle$$

于是

$$|\langle v, f_0 \rangle| \leq \|u_0\|.$$

在 B^* 的有界性得证后, 任取 $v \in D(A^*)$, 由范数的齐次性知

$$\left\| A^* \left(\frac{v}{2\|A^*v\|} \right) \right\| \leq 1$$

因此 $v/2\|A^*v\| \in B^*$, 亦即存在 $C > 0$ 使得 $\|v\| \leq C\|A^*v\|$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 只要 $A^*v = 0$, 由 (ii) 立得 $v = 0$, 此即 $N(A^*) = \{0\}$. 再设 $f_n = A^*v_n \rightarrow f$, 将 $v_n - v_m$ 代入 (ii) 可知 $\{v_n\}$ 自身也是基本列, 因此可设 $v_n \rightarrow v$. 由命题2.5知 A^* 是闭算子, 故 $A^*v = f \in R(A)$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). 因为 $R(A^*)$ 是闭集, 由闭像集算子的刻画2.14知 $R(A) = N(A^*)^\perp$, 又由 $N(A^*) = \{0\}$ 知 $N(A^*)^\perp = F$, 此即 $R(A) = F$. □

上述结果具有下述对偶表述:

定理 2.16

设 $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是定义在 E 的某稠密子集上的无界闭线性算子, 则下述命题等价:

- (i) A^* 是满射 (即 $R(A^*) = F^*$),
- (ii) 存在常数 C 使得

$$\|u\| \leq C\|Au\|, \quad \forall u \in D(A),$$

(iii) $N(A) = \{0\}$, 且 $R(A)$ 是闭集.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 记

$$B = \{u \in D(A) : \|Au\| \leq 1\},$$

往证 B 有界, 由一致有界原理的推论2.6知只需证明对 $\forall f \in E^*$ 而言, 集合 $\langle f, B \rangle$ 在 $\mathbb{R}$ 中有界即可. 因为 A^* 是满射, 故总能找到 $v \in F^*$ 使得 $A^*v = f$. 因此对任意 $u \in B$ 有

$$\langle f, u \rangle = \langle A^*v, u \rangle = \langle v, Au \rangle$$

于是

$$|\langle f, u \rangle| \leq \|v\|.$$

(ii) 进而由范数的齐次性得证.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 显见 $N(A) = \{0\}$. 设 $f_n = Au_n \rightarrow f$, 由 (ii) 可知 $\{u_n\}$ 自身也是基本列, 因此可设 $u_n \rightarrow u$, 由 A 的闭性即得 $Au = f \in R(A)$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). 由闭像集算子的刻画2.14(iv) 立得结论. □

注 2.24 如果另外知道要么 $\dim E < \infty$, 要么 $\dim F < \infty$, 则有下列等价成立:

A 是满射 $\Leftrightarrow A^*$ 是单射,

A^* 是满射 $\Leftrightarrow A$ 是单射.

这是因为此时 $R(A)$ 和 $R(A^*)$ 为有限维空间, 进而它们是闭空间. 但在一般情形下, 只有下述关系成立:

A 是满射 $\Rightarrow A^*$ 是单射,

A^* 是满射 $\Rightarrow A$ 是单射.

反命题不再成立的例子如下: 取 $E = F = l^2$, 对每个 $x \in l^2$ 记 $x = \{x_n\}_{n \geq 1}$, 取 $Ax = \{\frac{1}{n}x_n\}_{n \geq 1}$. 显见 A 是有界算子, 且 $A^* = A$, A^* 和 A 此时都是单射, 但它们不是满射. 同时 $R(A)$ 和 $R(A^*)$ 都在对应空间稠密, 但它们不是闭集.

第三章 弱拓扑, 自反空间, 可分空间, 一致凸性

本章选自 [2].

3.1 使一族映射连续的最粗糙拓扑

我们从拓扑中最基本的概念开始. 设 X 是 (没有赋任何结构的) 一个集合, $\{Y_i\}_{i \in I}$ 是一族拓扑空间. 现在有一族映射 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 满足对每个 $i \in I$ 而言, φ_i 都是 $X \rightarrow Y_i$ 的. 考虑下述问题:

问题一. 在 X 上构造一个拓扑使得所有映射 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 均连续. 如果可能的话找出满足条件的最经济的拓扑 $\mathcal{T}$ (即具有最少开集的拓扑).

注意到如果我们给 X 装备离散拓扑 (即 X 的每个子集都是开集), 自然会有每个 φ_i 都连续, 但这个拓扑肯定不是最经济的, 实际上它是最不经济的! 之后我们会发现, 实际上在 X 上总是存在 (唯一) 的最经济拓扑 $\mathcal{T}$ 使得每个 φ_i 都连续. 该拓扑称为 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 生成的最粗糙拓扑 (或最弱拓扑).

若 $\omega_i \subset Y_i$ 是开集, 根据连续性的要求, $\varphi_i^{-1}(\omega_i)$ 也需要是 $\mathcal{T}$ 中的开集. 随着 ω_i 跑遍 Y_i 中所有开集, i 跑遍 I 中所有指标, 我们可以得到由 $\varphi_i(\omega_i)$ 形成的 X 的一个子集族, 其中的每个元素都需要在拓扑 $\mathcal{T}$ 中. 记该子集族为 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, 显见 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 本身不一定是拓扑, 故我们可以将问题归结为:

问题二. 对给定的集合 X 与 X 中的子集族 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, 构造最经济的拓扑 $\mathcal{T}$ 使得对全体 $\lambda \in \Lambda$ 而言, U_λ 都是开集.

也就是说, 我们需要找到 X 的某个最经济的子集族 $\mathcal{F}$, 使得该子集族对有限交与任意并封闭, 且对 $\forall \lambda \in \Lambda$ 均有 $U_\lambda \in \mathcal{F}$. 我们可以从 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 中的有限交开始构造, 亦即形如 $\bigcap_{\lambda \in \Gamma} U_\lambda$ ($\Gamma \subset \Lambda$ 是有限集) 的集合. 将所有这些有限交收集起来可以得到一个新集族, 记之为 Φ , 可见 Φ 是包含 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 且对有限交封闭的 X 的子集族, 但它依旧未必对任意并封闭. 因此, 我们下一步考察由 Φ 中全体元素的任意并构成的集族 $\mathcal{F}$. 显见 $\mathcal{F}$ 对任意并封闭, 但经过这一改动后没法确定 $\mathcal{F}$ 是否还对有限交封闭, 于是我们给出下述引理:

引理 3.1

集族 $\mathcal{F}$ 确对有限交封闭.

引理的证明就省略了.

注 3.1 特别注意前面构造 $\mathcal{F}$ 的顺序是不能颠倒的. 虽说先取任意并再取有限交也很自然, 但这样生成的集族只对有限交封闭, 而不会再对任意并封闭. 要想得到对任意并的封闭性, 还需要再取一次任意并.

总结一下前述讨论, 对拓扑 $\mathcal{F}$ 而言, 其中的开集都是由形如 $\varphi_i^{-1}(\omega_i)$ 的集合的有限交的任意并构成的. 因此对每个取定的 $x \in X$, 设 V_i 是 $\varphi_i(x)$ 在 Y_i 中的邻域, x 在拓扑 $\mathcal{F}$ 下的邻域基就由形如 $\bigcap_{i \in J} \varphi_i^{-1}(V_i)$ 的集合组成¹.

之后我们就可以在 X 上赋使得映射族 $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ 连续的最弱拓扑 $\mathcal{F}$ 了. 下面给出拓扑 $\mathcal{F}$ 的两条基本简单性质.

命题 3.1 (最弱拓扑的收敛性)

设 $\{x_n\}$ 是 X 中的序列, 则 $x_n \rightarrow x$ 在 $\mathcal{F}$ 下成立当且仅当 $\varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$ 对任意 $i \in I$ 成立.

证明 若 $x_n \rightarrow x$, 因为每个 φ_i 都在 $\mathcal{F}$ 下连续, 故 $\varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$. 反之, 设 U 是 x 的某邻域, 根据前述邻域基的构造可设 $U = \bigcap_{i \in J} \varphi_i^{-1}(V_i)$ (其中 $J \subset I$ 是有限集). 现任取 $i \in J$, 根据 $\varphi_i(x_n) \rightarrow \varphi_i(x)$ 知存在正整数 N_i 使得 $n \geq N_i$ 时有 $\varphi_i(x_n) \in V_i$, 于是 $n \geq N = \max_{i \in J} N_i$ 时 $x_n \in U$, 此即 $x_n \rightarrow x$. $\square$

¹ 回忆在拓扑空间下, 点 x 的邻域本质上是 x 的一族邻域, 其满足 x 的每个邻域都会包含该集族中的某元素.

命题 3.2 (映射在最弱拓扑下的连续性)

设 Z 是拓扑空间, ψ 是 $Z \rightarrow X$ 的映射, 则 ψ 连续当且仅当对每个 $i \in I$ 而言, 映射 $\varphi_i \circ \psi : Z \rightarrow Y_i$ 均连续. 

证明 若 ψ 连续, 则显见对每个 $i \in I$ 而言 $\varphi_i \circ \psi$ 均连续. 反之, 往证对 X 中的每个开集 U 而言 $\psi^{-1}(U)$ 都是 Z 中的开集. 根据 $\mathcal{F}$ 的构造知 U 形如 $\bigcup_{\text{arbitrary}} \bigcap_{\text{finite}} \varphi_i^{-1}(\omega_i)$, 其中 ω_i 是 Y 中的开集. 故

$$\psi^{-1}(U) = \bigcup_{\text{arbitrary finite}} \bigcap \psi^{-1}(\varphi_i^{-1}(\omega_i)) = \bigcup_{\text{arbitrary finite}} \bigcap (\varphi_i \circ \psi)^{-1}(\omega_i),$$

因为 $\varphi_i \circ \psi$ 连续, 故 $\psi^{-1}(U)$ 是 Z 中的开集. □

3.2 弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 的定义与基本性质

设 E 是 Banach 空间, $f \in E^*$. 记 $\varphi_f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性泛函 $\varphi_f(x) = \langle f, x \rangle$. 随着 f 跑遍 E^* , 可以得到 $E \rightarrow \mathbb{R}$ 的泛函族 $\{\varphi_f\}_{f \in E^*}$. 下面我们在 E (由 $\|\cdot\|$ 诱导的) 的通常拓扑之外再定义 E 上的一个新拓扑:

定义 3.1 (弱拓扑 (weak topology))

E 上的弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 指的是泛函族 $\{\varphi_f\}_{f \in E^*}$ 生成的最弱拓扑. 

注意到每个映射 φ_f 在通常拓扑下已经连续了, 故弱拓扑只会弱于通常拓扑.

命题 3.3

弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 是 Hausdorff 拓扑 (即弱拓扑是分离的). 

证明 取 $x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2$, 往证弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 中存在开集 O_1, O_2 使得 $x_1 \in O_1, x_2 \in O_2, O_1 \cap O_2 = \emptyset$. 根据 Hahn-Banach 定理的第二几何形式, 存在闭超平面严格分离 $\{x_1\}, \{x_2\}$, 因此存在 $f \in E^*$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle f, x_1 \rangle < \alpha < \langle f, x_2 \rangle.$$

取

$$\begin{aligned} O_1 &= \{x \in E : \langle f, x \rangle < \alpha\} = \varphi_f^{-1}((-\infty, \alpha)), \\ O_2 &= \{x \in E : \langle f, x \rangle > \alpha\} = \varphi_f^{-1}((\alpha, +\infty)). \end{aligned}$$

可见 O_1, O_2 是 $\sigma(E, E^*)$ 下的开集, 且它们满足要求的性质. □

命题 3.4 (弱拓扑的邻域基)

设 $x_0 \in E$, 取定 $\varepsilon > 0$ 与 E^* 中的有限集 $\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$, 记

$$V = V(f_1, f_2, \dots, f_k; \varepsilon) = \{x \in E : |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \dots, k\}.$$

则 V 是 x_0 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下的邻域, 且跑遍 $\varepsilon > 0, k \in \mathbb{N}, f_i \in E^*$ 后得到的集族正是 x_0 在 $\sigma(E, E^*)$ 下的一族邻域基. 

证明 把 V 写成

$$V = \bigcap_{i=1}^k \varphi_{f_i}^{-1}((a_i - \varepsilon, a_i + \varepsilon)), \quad a_i = \langle f_i, x_0 \rangle.$$

由 φ_{f_i} 的连续性可知 V 是弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下的开集, 且 $x_0 \in V$, 这说明 V 是 x_0 在 $\sigma(E, E^*)$ 下的邻域. 反之, 设 U 是 x_0 在 $\sigma(E, E^*)$ 下的一个邻域, 根据 $\sigma(E, E^*)$ 的构造知存在开集 $W \ni x_0$ 满足 $W \subset U$, 且 W 形如 $\varphi_{f_i}^{-1}(\omega_i)$ 的有限交, 其中 ω_i 是 $a_i = \langle f_i, x_0 \rangle$ 在 $\mathbb{R}$ 中的邻域. 由 $\mathbb{R}$ 中的开集构造可知总存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $(a_i - \varepsilon, a_i + \varepsilon) \subset \omega_i$ 对 $\forall i$ 成立. 故 $x_0 \in V \subset W \subset U$. □

如果 E 中的序列 $\{x_n\}$ 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下收敛到 x , 就将这一收敛记为

$$x_n \rightharpoonup x.$$

为避免歧义, 有时将这一收敛称为 $x_n \rightharpoonup x$ 在 $\sigma(E, E^*)$ 中是弱收敛. 另称 $x_n \rightarrow x$ 为强收敛, 意为 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

命题 3.5 (弱收敛的性质)

设 $\{x_n\}$ 是 E 中的序列, 则

- (i) $x_n \rightharpoonup x \Leftrightarrow \langle f, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle, \forall f \in E^*$.
- (ii) 若 $x_n \rightarrow x$ 是强收敛, 则 $x_n \rightharpoonup x$.
- (iii) 若在 $\sigma(E, E^*)$ 中 $x_n \rightharpoonup x$, 则 $\{\|x_n\|\}$ 有界, 且 $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.
- (iv) 若在 $\sigma(E, E^*)$ 中 $x_n \rightharpoonup x$, 且在 E^* 中 $f_n \rightarrow f$ (即 $\|f_n - f\|_{E^*} \rightarrow 0$), 则 $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$.

证明 (i) 由最弱拓扑的收敛性 3.1 与弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 的定义即得欲证.

(ii) 因为 $|\langle f, x_n \rangle - \langle f, x \rangle| \leq \|f\| \|x_n - x\|$, 由 (i) 即得欲证. 这条性质说明弱拓扑比强拓扑 (即范数拓扑) 弱.

(iii) 由 (i) 知对每个 $f \in E^*$ 而言, 序列 $\{\langle f, x_n \rangle\}_n$ 都是有界的, 根据一致有界原理的推论 2.6 可知 $\{x_n\}$ 本身是 E 中的有界集, 亦即 $\{\|x_n\|\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界集. 在不等式

$$|\langle f, x_n \rangle| \leq \|f\| \|x_n\|$$

两端令 $n \rightarrow \infty$, 可得

$$|\langle f, x \rangle| \leq \|f\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|,$$

再由 Hahn-Banach 定理可得

$$\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\langle f, x \rangle| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

(iv) 考虑不等式

$$|\langle f_n, x_n \rangle - \langle f, x \rangle| \leq |\langle f_n - f, x_n \rangle| + |\langle f, x_n - x \rangle| \leq \|f_n - f\| \|x_n\| + |\langle f, x_n - x \rangle|,$$

结合 (i), (iii) 即得欲证.

命题 3.6 (有限维空间中弱拓扑与通常拓扑的等价性)

若 E 是有限维空间, 则弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 与通常拓扑是同一拓扑. 特别地, 序列 $\{x_n\}$ 弱收敛当且仅当其强收敛.

证明 因为弱拓扑总比通常拓扑包含更少开集, 故只需说明每个通常拓扑下的开集在弱拓扑下也是开集即可. 设 $x_0 \in E$, U 是 x_0 在通常拓扑下的邻域, 往证存在 x_0 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下的邻域 V 满足 $V \subset U$, 从邻域基的角度出发只需说明存在 $f_1, \dots, f_k \in E^*$ 与 $\varepsilon > 0$ 满足

$$V = \{x \in E : |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \dots, k\} \subset U$$

即可. 现取 $r > 0$ 满足 $B(x_0, r) \subset U$, 取 E 中的一组标准基 $e_1, \dots, e_k$, 知每个 $x \in E$ 都能表成 $x = \sum_{i=1}^k x_i e_i$, 且投影映射 $x \mapsto x_i$ 显然是 E 上的连续线性泛函, 记之为 f_i , 则有

$$\|x - x_0\| \leq \sum_{i=1}^k |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < k\varepsilon, \quad \forall x \in V.$$

令 $\varepsilon = r/k$ 即得 $V \subset U$. □

注 3.2 根据弱拓扑的最弱性可知弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 中的开集 (或闭集) 总是强拓扑中的开集 (或闭集). 命题 3.6 表明有限维空间中这两个拓扑等价, 但在无限维空间中弱拓扑总是严格粗糙于强拓扑的. 也就是说, 总存在集合是强拓扑中的开集 (或闭集), 但不是弱拓扑中的开集 (或闭集). 下面给出两个例子:

例 3.1 设 E 是无穷维空间, $S = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ 是其中的单位球面. 下面我们说明 S 不可能在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$

中闭, 进一步还有

$$\overline{S}^{\sigma(E, E^*)} = B_E. \quad (3.1)$$

其中 $\overline{S}^{\sigma(E, E^*)}$ 表示 S 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下的闭包, B_E 表示 E 中的闭单位球 $\{x \in E : \|x\| \leq 1\}$.

首先, 我们说明只要 $x_0 \in E$ 满足 $\|x_0\| < 1$, 就有 $x_0 \in \overline{S}^{\sigma(E, E^*)}$. 设 V 是 x_0 在 $\sigma(E, E^*)$ 中的一个邻域, 往证 $V \cap S \neq \emptyset$. 从邻域基的角度出发可设

$$V = \{x \in E : |\langle f_i, x - x_0 \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \dots, k\}, \quad \varepsilon > 0, f_1, \dots, f_k \in E^*.$$

取 $y_0 \in E$ 满足 $y_0 \neq 0$, 且

$$\langle f_i, y_0 \rangle = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

这样的 y_0 是能取到的, 否则映射 $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^k, x \mapsto (\langle f_i, x \rangle)_{1 \leq i \leq k}$ 就是单射了, 此时 φ 成为 E 到 $\varphi(E)$ 的同构, 从而 $\dim E \leq k$, 这与 E 的无限维假设矛盾². 现取函数 $g(t) = \|x_0 + ty_0\|$, 显见 g 在 $[0, \infty)$ 上连续, $g(0) < 1, g(t) \rightarrow +\infty (t \rightarrow \infty)$, 故存在 $t_0 > 0$ 使得 $\|x_0 + t_0 y_0\| = 1$, 也就是说 $x_0 + t_0 y_0 \in V \cap S$, 因此

$$S \subset B_E \subset \overline{S}^{\sigma(E, E^*)}.$$

为完成(3.1)式的证明, 只需再说明 B_E 是 $\sigma(E, E^*)$ 下的闭集即可, 但由 Hahn-Banach 定理知

$$B_E = \bigcap_{\substack{f \in E^* \\ \|f\| \leq 1}} \{x \in E : |\langle f, x \rangle| \leq 1\},$$

上右式是弱拓扑中闭集的交集 (见定理3.1), 故 B_E 在 $\sigma(E, E^*)$ 中闭. □

例 3.2 无限维空间 E 中的单位球 $U = \{x \in E : \|x\| < 1\}$ 不可能是弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 中的开集. 用反证法, 如果 U 是弱拓扑下的开集, 则其补集 $U^c = \{x \in E : \|x\| \geq 1\}$ 是弱拓扑下的闭集, 于是 $S = B_E \cap U^c$ 也应该是弱拓扑下的闭集, 这与前例矛盾了. □

注 3.3 无限维空间中的弱拓扑不可度量化. 也就是说, 在 E 上不存在能诱导出弱拓扑的度量 (也不存在这样的范数). 但是我们可以说明, 如果 E^* 是可分空间, 就可以在 E 上定义一个范数, 使其在 E 的有界子集上能诱导出弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$.

注 3.4 一般来说, 在无限维空间中, 存在弱收敛但不强收敛的序列. 例如, 若 E^* 可分或 E 自反, 就能构造序列 $\{x_n\} \subset E$ 使得 $\|x_n\| = 1, x_n \rightharpoonup 0$. 但同样存在每个弱收敛序列都强收敛的无限维空间, 如 l^1 . 这样的空间通常都很罕见, 性质也比较病态. 这一事实并不与前面提到的弱拓扑与强拓扑不同相冲突 (回忆两个具有相同收敛列的度量空间有相同拓扑, 但两个具有相同收敛列的拓扑空间未必有相同拓扑).

3.3 弱拓扑, 凸集与线性算子

前面说明了弱拓扑下的闭集都是强拓扑下的闭集, 但在无限维空间中反之不然. 下面说明对于凸集而言, 在弱拓扑下闭就等价于在强拓扑下闭.

定理 3.1 (凸集的闭性等价)

若 $C \subset E$ 是凸集, 则 C 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下闭当且仅当它在强拓扑下闭.

证明 只需设 C 是强拓扑中的闭集, 往证 C 是弱拓扑中的闭集即可. 考虑说明 C 的补集 C^c 是弱拓扑中的开集, 为此设 $x_0 \notin C$. 因为 C 是凸集, 根据 Hahn-Banach 定理知存在闭超平面严格分离 $\{x_0\}$ 与 C , 因此存在 $f \in E^*$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle f, x_0 \rangle < \alpha < \langle f, y \rangle, \quad \forall y \in C.$$

取

$$V = \{x \in E : \langle f, x \rangle < \alpha\},$$

²从几何角度看, 当 E 是无限维空间的时候, x_0 在拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下的每个邻域都至少包含一条过 x_0 延伸到无穷远的直线.

知 $x_0 \in V, V \cap C = \emptyset$ (即 $V \subset C^c$) 且 V 是 $\sigma(E, E^*)$ 中的开集, 故 C^c 是 $\sigma(E, E^*)$ 中的开集. $\square$

注 3.5 这一证明说明闭凸集等于所有包含该集合的闭半空间之交.

推论 3.1 (Mazur)

设 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x , 则存在由 x_n 的凸线性组合构成的序列 $\{y_n\}$ 强收敛到 x . $\heartsuit$

证明 记 $C = \text{conv}(\bigcup_{p=1}^{\infty} \{x_p\})$ 是 $\{x_n\}$ 的凸包. 因为 x 从属于 $\bigcup_{p=1}^{\infty} \{x_p\}$ 在弱拓扑下的闭包, 故它显然从属于 C 在弱拓扑下的闭包. 根据定理 3.1 知 $x \in \overline{C}$, 此即欲证. $\square$

推论 3.2

设 $\varphi: E \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是强拓扑下的下半连续凸函数, 则它在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 中下半连续. $\heartsuit$

证明 任取 $\lambda \in \mathbb{R}$, 由 φ 的性质知集合

$$A = \{x \in E : \varphi(x) \leq \lambda\}$$

是凸集且在强拓扑下闭. 根据定理 3.1 知 A 同样是弱拓扑下的闭集, 因此 φ 在弱拓扑下半连续. $\square$

注 3.6 一般来说很难直接证明函数在弱拓扑下半连续, 推论 3.2 给出了一条路径:

φ 作为凸函数在强拓扑下连续 $\Rightarrow \varphi$ 在弱拓扑下半连续.

例如, 函数 $\varphi(x) = \|x\|$ 作为凸函数是强拓扑下的连续函数, 因此它在弱拓扑下半连续, 由此可知只要 $x_n \rightharpoonup x$, 则 $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$.

定理 3.2

设 E, F 是 Banach 空间, $T: E \rightarrow F$ 是线性算子, 则 T 在强拓扑下连续当且仅当其在弱拓扑下连续. $\heartsuit$

证明 设 T 在强拓扑下连续. 由映射在最弱拓扑下的连续性 3.2 知只需证明对 $\forall f \in F^*$ 而言, 映射 $x \mapsto \langle f, Tx \rangle$ 都是在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下 $E \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续映射, 但显见映射 $x \mapsto \langle f, Tx \rangle$ 是 E 上的连续线性泛函, 故 T 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下连续.

反之, 设 T 是 $(E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ 的连续算子, 则 $G(T)$ 是 $(E \times F, \sigma(E, E^*) \times \sigma(F, F^*))$ 中的闭集. 因为 $\sigma(E, E^*) \times \sigma(F, F^*) = \sigma(E \times F, (E \times F)^*)$, 故 $G(T)$ 作为弱拓扑中的闭集必定是强拓扑中的闭集, 由闭图像定理即知 $T: E \rightarrow F$ 在强拓扑下连续. $\square$

注 3.7 上面的断言可以进一步细化: 如果在 E 上赋强拓扑, F 上赋弱拓扑, 且 $T: E \rightarrow F$ 在这种拓扑下连续, 则 T 在 E, F 同时赋强拓扑时也连续. 因此对线性算子而言, 强 $\rightarrow$ 弱, 弱 $\rightarrow$ 弱, 强 $\rightarrow$ 弱时的连续性质是一样的. 但另一方面, 只有很少的线性算子能保证弱 $\rightarrow$ 强时依旧连续, 弱 $\rightarrow$ 强时线性算子保持连续性当且仅当 T 强 $\rightarrow$ 强连续, 且 $\dim R(T) < \infty$.

另外, 一般情况下, 在 E, F 同时赋强拓扑时连续的非线性映射在它们同时赋弱拓扑下并不连续, 这是非线性问题与线性问题主要的不同点之一.

3.4 弱*拓扑 $\sigma(E^*, E)$

目前为止, 我们已经研究了 E^* 上的两种拓扑:

- (i) E^* 上范数诱导的通常拓扑 (强拓扑),
- (ii) 依照弱拓扑构造方式生成的弱拓扑 $\sigma(E^*, E^{**})$.

下面我们定义 E^* 上称为弱*拓扑的第三种拓扑, 记之为 $\sigma(E^*, E)$ (这里的*意在提示这一拓扑只定义在对偶空间上). 对每个 $x \in E$, 考察线性泛函 $\varphi_x: E^* \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto \varphi_x(f) = \langle f, x \rangle$. 随着 x 跑遍 E , 我们可以得到 $E^* \rightarrow \mathbb{R}$ 的泛函族 $\{\varphi_x\}_{x \in E}$.

定义 3.2 (弱*拓扑 (weak* topology))

弱*拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 定义为 E^* 上由泛函族 $\{\varphi_x\}_{x \in E}$ 生成的最弱拓扑.



因为 $E \subset E^{**}$, 故拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 显然要弱于拓扑 $\sigma(E^*, E^{**})$, 即 $\sigma(E, E^*)$ 包含的开集 (或闭集) 比 $\sigma(E^*, E^{**})$ 更少, 后者包含的开集 (或闭集) 又比强拓扑更少.

注 3.8 读者可能会疑惑为什么我们这么执着于弱拓扑. 这是因为一个拓扑越粗糙, 其中的紧集就越多. 例如 E^* 中的闭单位球 B_{E^*} 不可能是强拓扑下的紧集 (除非 E^* 是有限维的, 这将在后面进行证明), 但它总是弱*拓扑下的紧集. 既然紧集在诸多学科中 (例如力学的最小作用量存在性) 都是基本概念, 我们也就不难理解弱*拓扑的重要性了.

命题 3.7

弱*拓扑是 Hausdorff 拓扑.



证明 取 $f_1, f_2 \in E^*$ 满足 $f_1 \neq f_2$, 知存在 $x \in E$ 使得 $\langle f_1, x \rangle \neq \langle f_2, x \rangle$, 不妨设 $\langle f_1, x \rangle < \langle f_2, x \rangle$, 知存在 α 使得

$$\langle f_1, x \rangle < \alpha < \langle f_2, x \rangle.$$

记

$$O_1 = \{f \in E^* : \langle f, x \rangle < \alpha\} = \varphi_x^{-1}((-\infty, \alpha)),$$

$$O_2 = \{f \in E^* : \langle f, x \rangle > \alpha\} = \varphi_x^{-1}((\alpha, +\infty)).$$

由 φ_x 的连续性知 O_1, O_2 是 $\sigma(E^*, E)$ 中的开集, 显见 $f_1 \in O_1, f_2 \in O_2$ 且 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$. □

命题 3.8 (弱*拓扑的邻域基)

设 $f_0 \in E^*$, 对给定的有限集 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset E$ 与 $\varepsilon > 0$, 记

$$V = V(x_1, x_2, \dots, x_k; \varepsilon) = \{f \in E^* : |\langle f - f_0, x_i \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \dots, k\}.$$

则 V 是 f 在拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 下的一个邻域. 当 ε 跑遍全体正数, k 跑遍全体正整数, x_i 跑遍 E 时, V 形成的集族构成 f_0 在 $\sigma(E^*, E)$ 中的邻域基.



证明 这与弱拓扑的邻域基 3.4 证明是一样的. □

如果 E^* 中的序列 $\{f_n\}$ 在弱*拓扑下收敛到 f , 就记之为

$$f_n \xrightarrow{*} f.$$

为免歧义, 有时我们会强调 $f_n \xrightarrow{*} f$ 在 $\sigma(E^*, E)$ 中, $f_n \rightharpoonup f$ 在 $\sigma(E^*, E^{**})$ 中, $f_n \rightarrow f$ 在强拓扑中.

命题 3.9 (弱*收敛的性质)

设 $\{f_n\}$ 是 E^* 中的序列, 则

- (i) $f_n \xrightarrow{*} f \Leftrightarrow \forall x \in E (\langle f_n, x \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle)$.
- (ii) 若 $f_n \rightarrow f$, 则 $f_n \rightharpoonup f$. 若 $f_n \rightharpoonup f$, 则 $f_n \xrightarrow{*} f$.
- (iii) 若 $f_n \xrightarrow{*} f$, 则 $\{\|f_n\|\}$ 有界, 且 $\|f\| \leq \liminf \|f_n\|$.
- (iv) 若 $f_n \xrightarrow{*} f, x_n \rightarrow x$, 则 $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$.



证明 这与弱收敛的性质 3.5 证明是一样的. □

注 3.9 如果在 $f_n \xrightarrow{*} f$ (乃至 $f_n \rightharpoonup f$) 的同时只知道 $x_n \rightarrow x$, 一般来说是没法推知 $\langle f_n, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle$ 的. 例如在 l^2 中设 $f_n = x_n = T_n(\{\frac{1}{n^2}\}_n)$ (其中 T_n 是右推移算子), 显见 $f_n \rightharpoonup 0, x_n \rightarrow 0$, 但 $\langle f_n, x_n \rangle$ 恒为某常值.

注 3.10 当 E 是有限维空间时, 前面提到的在 E^* 上的三种拓扑 (强拓扑, 弱拓扑, 弱*拓扑) 均重合. 这是因为由 $\dim E = \dim E^{**}$ 知典则映射 $J: E \rightarrow E^{**}$ 是满射, 因此 $\sigma(E^*, E) = \sigma(E^*, E^{**})$.

命题 3.10

若 $\varphi: E^* \rightarrow \mathbb{R}$ 是在弱*拓扑下连续的线性泛函, 则存在 $x_0 \in E$ 使得

$$\langle \varphi, f \rangle = \langle f, x_0 \rangle, \quad \forall f \in E^*.$$

命题3.10的证明需要下述代数引理:

引理 3.2

设 X 是线性空间, $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_k$ 是 X 上的 $k+1$ 个线性泛函, 它们满足

$$(\langle \varphi_i, v \rangle = 0, \forall i = 1, \dots, k) \Rightarrow (\langle \varphi, v \rangle = 0) \quad (3.2)$$

则存在常数 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ 使得 $\varphi = \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i$.

下面证明引理3.2.

证明 考察依下式定义的映射:

$$F: X \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}, \quad u \mapsto (\langle \varphi, u \rangle, \langle \varphi_1, u \rangle, \dots, \langle \varphi_k, u \rangle).$$

由(3.2)式知 $a = (1, 0, \dots, 0) \notin R(F)$, 又由 φ 的连续性与线性性知 $R(F)$ 是闭凸集, 因此在 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中存在严格分离 $\{a\}$ 与 $R(F)$ 的超平面. 也就是说, 存在常数 $\lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_k$ 与 α 满足

$$\lambda < \alpha < \lambda \langle \varphi, u \rangle + \sum_{i=1}^k \lambda_i \langle \varphi_i, u \rangle, \quad \forall u \in X.$$

如果存在 $u \in X$ 使得 $\lambda \langle \varphi, u \rangle + \sum_{i=1}^k \lambda_i \langle \varphi_i, u \rangle \neq 0$, 就总能通过选取某个 v 使得 $\lambda \langle \varphi, v \rangle + \sum_{i=1}^k \lambda_i \langle \varphi_i, v \rangle$ 任意小, 因此只能有

$$\lambda \langle \varphi, u \rangle + \sum_{i=1}^k \lambda_i \langle \varphi_i, u \rangle = 0, \quad \forall u \in X.$$

由此可知 $\lambda < 0$, 因此 $\lambda \neq 0$, 此即欲证. □

下面证明命题3.10.

证明 因为 φ 在弱*拓扑下连续, 故在 $\sigma(E^*, E)$ 中存在 0 的邻域 V 使得

$$|\langle \varphi, f \rangle| < 1, \quad \forall f \in V.$$

从邻域基的角度出发可设

$$V = \{f \in E^* : |\langle f, x_i \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \dots, k\},$$

其中 $x_i \in E, \varepsilon > 0$. 下面说明

$$(\langle f, x_i \rangle = 0, \forall i = 1, 2, \dots, k) \Rightarrow (\langle \varphi, f \rangle = 0). \quad (3.3)$$

用反证法, 若 $\langle \varphi, f \rangle \neq 0$ 时 $\langle f, x_i \rangle = 0$ 对 $\forall i = 1, 2, \dots, k$ 成立, 则对任意 $M \in \mathbb{R}$ 而言, Mf 总会在 V 中, 通过调整 M 的大小可使得 $|\langle \varphi, Mf \rangle| \geq 1$, 矛盾! 故(3.3)式成立. 现在对 $\varphi, x_1, \dots, x_k$ 应用引理3.2可得

$$\langle \varphi, f \rangle = \sum_{i=1}^k \lambda_i \langle f, x_i \rangle = \left\langle f, \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \right\rangle, \quad \forall f \in E^*.$$

□

推论 3.3

设 E^* 中的超平面 H 是 $\sigma(E^*, E)$ 中的闭集, 则 H 具有形式:

$$H = \{f \in E^* : \langle f, x_0 \rangle = \alpha\},$$

其中 $x_0 \in E, x_0 \neq 0, \alpha \in \mathbb{R}$.

□

证明 由 H 是 E^* 中的超平面可知可设

$$H = \{f \in E^* : \langle \varphi, f \rangle = \alpha\},$$

其中 φ 是 E^* 上的线性泛函, $\varphi \neq 0$. 下面说明 φ 在 $\sigma(E^*, E)$ 下的连续性, 由线性性知只需说明 φ 在 0 处连续. 取 $f_0 \notin H$, 设 V 是 f_0 在 $\sigma(E^*, E)$ 下的一个邻域, 且 $V \subset H^c$ (这样的 V 能取到正是因为 H^c 是开集), 从邻域基的角度出发可设

$$V = \{f \in E^* : |\langle f - f_0, x_i \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, 2, \dots, k\}.$$

显见 V 是凸集, 故要么

$$\langle \varphi, f \rangle < \alpha, \quad \forall f \in V \quad (3.4)$$

要么

$$\langle \varphi, f \rangle > \alpha, \quad \forall f \in V. \quad (3.5)$$

不妨设(3.4)式成立, 可得

$$\langle \varphi, g \rangle < \alpha - \langle \varphi, f_0 \rangle, \quad \forall g \in W = V - f_0.$$

因为 $-W = W$, 故

$$|\langle \varphi, g \rangle| < |\alpha - \langle \varphi, f_0 \rangle|, \quad \forall g \in W. \quad (3.6)$$

因为 $W \subset E^*$ 是 0 的邻域, 故(3.6)式表明在 $\sigma(E^*, E)$ 下 φ 在 0 处连续. 由命题 3.10 即知存在 $x_0 \in E$ 使得

$$\langle \varphi, f \rangle = \langle f, x_0 \rangle, \quad \forall f \in E^*.$$

□

注 3.11 第一次推到这里的时候可能会采用下述方法: 因为 $\sigma(E^*, E)$ 弱于通常拓扑, 故 H 作为 $\sigma(E^*, E)$ 中的闭集一定是通常拓扑下的闭集, 利用通常拓扑下的闭超平面形式即得 $H = \{f \in E^* : \langle f, x_0 \rangle = \alpha\}$. 但这么做实际上是有问题的: 典则映射 $J: E \rightarrow E^{**}$ 未必是满射, 因此这里出现的 x_0 未必落在 E 内. 实际上, 在典则映射不满的情况下, $\sigma(E^*, E)$ 要严格弱于 $\sigma(E^*, E^{**})$. 例如, 取 $\xi \in E^{**} \setminus J(E)$, 显见

$$H = \{f \in E^* : \langle \xi, f \rangle = 0\}$$

是 $\sigma(E^*, E^{**})$ 中的闭集, 但由推论 3.3 知 H 并不是 $\sigma(E^*, E)$ 中的闭集. 通过这个例子我们也可以发现在强拓扑下闭的凸集未必在弱*拓扑下闭. 需记住在 E^* 中有两类闭凸集:

- (a) 在强拓扑下闭的凸集 (由凸集的闭性等价 3.1 知这也就是在 $\sigma(E^*, E^{**})$ 下闭的凸集),
- (b) 在 $\sigma(E^*, E)$ 下闭的凸集.

定理 3.3 (Banach-Alaoglu-Bourbaki)

对于 Banach 空间 E 而言, 闭单位球

$$B_{E^*} = \{f \in E^* : \|f\| \leq 1\}$$

在弱*拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 中紧.



注 3.12 B_{E^*} 的紧性是弱*拓扑的最本质性质. 这是因为有结果表明: E^* 的闭单位球在强拓扑下紧当且仅当 E 有限维. 因此只要 E^* 是无限维空间, B_{E^*} 就不会是强拓扑下的紧集, 但它总能成为弱*拓扑下的紧集.

证明 证明的主要思路在于把 E^* 拉入乘积空间 $\mathbb{R}^E$, 再在乘积空间中用 Tychonoff 定理 1.22 证明命题. 现考虑由全体 $E \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射构成的直积 $Y = \mathbb{R}^E$, 记 Y 的元素为 $\omega = \{\omega_x\}_{x \in E}, \omega_x \in \mathbb{R}$. 可以说明 Y 上能赋乘积拓扑, 即 Y 上全体映射 $\omega \mapsto \omega_x$ (在 x 跑遍 E 时) 诱导出的最弱拓扑, 而这又是点态收敛对应的拓扑 (见推论 1.8).

下面默认 E^* 上赋弱*拓扑 $\sigma(E^*, E)$. 因为 E^* 本质上是由 $E \rightarrow \mathbb{R}$ 的一些特殊的映射 (即连续线性映射) 组成的, 故可以将 E^* 看成 Y 的一个子集. 准确来说, 设 $\Phi: E^* \rightarrow Y$ 是 E^* 到 Y 的典则映射, 可知

$$\Phi(f) = \{\omega_x\}_{x \in E}, \quad \text{其中 } \omega_x = \langle f, x \rangle,$$

往证 $\Phi: E^* \rightarrow \Phi(E^*)$ 是同胚. 因为对每个固定的 $x \in E$ 而言, 映射 $E^* \ni f \mapsto (\Phi(f))_x = \langle f, x \rangle$ 作为作用在 f 上的泛函依照弱*拓扑的构造连续, 根据该连续性可知对 $\forall x \in E$ 而言 $\varphi_x \circ \Phi: E^* \rightarrow \mathbb{R}$ 均连续, 故由映射在最弱拓扑下的连续性 3.2 知 $\Phi: E^* \rightarrow Y$ 连续. 另外, 逆映射 $\Phi^{-1}: \Phi(E^*) \rightarrow E^*$ 在 $\Phi(E^*)$ 上赋 Y 的子空间拓扑时也连续, 这是因为再次应用映射在最弱拓扑下的连续性 3.2 知只需说明对每个取定的 $x \in E$, 映射 $Y \ni \omega \mapsto \langle \Phi^{-1}(\omega), x \rangle \in \mathbb{R}$ 在 $\Phi(E^*)$ 上关于 Y 的子空间拓扑连续, 而由 $\omega \in \Phi(E^*)$ 知必存在 $f \in E^*$ 使得 $\omega = \Phi(f)$, 于是

$$\langle \Phi^{-1}(\omega), x \rangle = \langle f, x \rangle = \omega_x$$

这正是乘积空间拓扑所要保证连续的正规投影 (见定理 1.19), 因此映射 $\omega \mapsto \omega_x$ 必连续. 至此, 我们便证明了 Φ 是 E^* 到 $\Phi(E^*)$ 上的同胚.

现在把闭单位球 B_{E^*} 同胚到乘积空间 Y 中, 设 $\Phi(B_{E^*}) = K$, 其中

$$K = \{\omega \in Y : |\omega_x| \leq \|x\|, \omega_{x+y} = \omega_x + \omega_y, \omega_{\lambda x} = \lambda \omega_x, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E\}.$$

因为同胚保持紧性, 故只需证明 K 在 Y 的乘积空间拓扑下成为紧集即可. 把 K 写成 $K = K_1 \cap K_2$, 其中

$$K_1 = \{\omega \in Y : |\omega_x| \leq \|x\|, \forall x \in E\},$$

$$K_2 = \{\omega \in Y : \omega_{x+y} = \omega_x + \omega_y, \omega_{\lambda x} = \lambda \omega_x, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E\}.$$

根据乘积拓扑的构造, K_1 可以进一步写成一族紧区间的乘积:

$$K_1 = \prod_{x \in E} [-\|x\|, +\|x\|].$$

因为每个 $[-\|x\|, +\|x\|]$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的紧集, 故由 Tychonoff 定理 1.22 知 K_1 是 Y 中的紧集. 下面再说明 K_2 是 Y 中的闭集. 对任意取定的 $\lambda \in \mathbb{R}, x, y \in E$, 因为映射 $\omega \mapsto \omega_{x+y} - \omega_x - \omega_y, \omega \mapsto \omega_{\lambda x} - \lambda \omega_x$ 依照乘积拓扑的构造必定连续, 故集合

$$A_{x,y} = \{\omega \in Y : \omega_{x+y} - \omega_x - \omega_y = 0\}$$

$$B_{\lambda,x} = \{\omega \in Y : \omega_{\lambda x} - \lambda \omega_x = 0\}$$

是 Y 中的闭集, 因此

$$K_2 = \left[\bigcap_{x,y \in E} A_{x,y} \right] \cap \left[\bigcap_{\substack{x \in E \\ \lambda \in \mathbb{R}}} B_{\lambda,x} \right]$$

作为闭集的任意交是 Y 中的闭集. 最后, 因为 $K_1 \cap K_2$ 可以视作紧空间 K_1 的闭子空间, 故 $K = K_1 \cap K_2$ 是 Y 中的紧集, 此即欲证. $\square$

3.5 自反空间

定义 3.3 (自反空间 (reflexive space))

设 E 是 Banach 空间, $J: E \rightarrow E^{**}$ 是 E 到 E^{**} 中依 (2.6) 式定义的典则映射. 若 J 是满射 (即 $J(E) = E^{**}$), 就称 E 是自反的.



当 E 是自反空间时, 一般把 E^{**} 就看成 E , 此时 J 是 $E \rightarrow E^{**}$ 的保范同构,

注 3.13 分析中的很多重要空间都是自反空间. 显见有限维空间是自反空间 (因为 $\dim E = \dim E^* = \dim E^{**}$)³. 另外在 $1 < p < \infty$ 时, L^p (与 l^p) 也是自反空间, 同时 Hilbert 空间都是自反空间. 然而, 也有一些重要空间并不自反, 例如:

- L^1, L^∞ (与 l^1, l^∞) 不是自反空间.
- 无限维紧度量空间 K 上的连续函数构成的空间 $C(K)$ 不是自反空间.

注 3.14 自反空间的定义必须通过典则映射 J . 事实上, 存在非自反空间 E 满足 E 与 E^{**} 等距同构.

下述结果给出了自反空间的一条基本性质:

³然而需要特别注意 E 与 E^* 并不等距同构, 它们之间可能只存在线性同构.

定理 3.4 (Kakutani(角谷静夫))

设 E 是 Banach 空间, 则 E 自反当且仅当

$$B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$$

在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下紧.



证明 设 E 自反, 知 $J(B_E) = B_{E^{**}}$. 由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理 3.3 知 $B_{E^{**}}$ 是弱*拓扑 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下的紧集, 因此只要能说明 J^{-1} 是从赋 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 的 E^{**} 到赋 $\sigma(E, E^*)$ 的 E 的连续映射, 就能得到 J 是同胚, 从而利用同胚的保紧性即得 B_E 的紧性. 根据映射在最弱拓扑下的连续性 3.2, 只需证明对每个取定的 $f \in E^*$ 而言, 映射 $\varphi_f \circ J^{-1} : \xi \mapsto \langle f, J^{-1}\xi \rangle$ 在赋 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 的 E^{**} 上连续即可. 又因为 $\langle f, J^{-1}\xi \rangle = \langle \xi, f \rangle$, 而映射 $\xi \mapsto \langle \xi, f \rangle$ 依照 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 的构造必定连续, 故 J^{-1} 连续, 因此 B_E 在 $\sigma(E, E^*)$ 中紧.

逆命题的证明更为精细, 它需要下述两条引理:

引理 3.3 (Helly)

设 E 是 Banach 空间, $f_1, \dots, f_k \in E^*, \gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{R}$ 是给定的元素, 则下述两条性质等价:

(i) 对 $\forall \varepsilon > 0$ 均存在 $x_\varepsilon \in E$ 使得 $\|x_\varepsilon\| \leq 1$ 的同时有

$$|\langle f_i, x_\varepsilon \rangle - \gamma_i| < \varepsilon, \quad \forall i = 1, \dots, k.$$

(ii) $|\sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i| \leq \|\sum_{i=1}^k \beta_i f_i\|, \forall \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}.$



下面证明 Helly 引理 3.3. 对于 (i) $\Rightarrow$ (ii), 取定 $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}$, 令 $S = \sum_{i=1}^k |\beta_i|$. 由 (i) 知

$$\left| \sum_{i=1}^k \beta_i \langle f_i, x_\varepsilon \rangle - \sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i \right| \leq \varepsilon S,$$

因此

$$\left| \sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i \right| \leq \left\| \sum_{i=1}^k \beta_i f_i \right\| \|x_\varepsilon\| + \varepsilon S \leq \left\| \sum_{i=1}^k \beta_i f_i \right\| + \varepsilon S.$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 故 (ii) 成立.

对于 (ii) $\Rightarrow$ (i), 取 $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k) \in \mathbb{R}^k$, 考虑下述映射:

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad x \mapsto (\langle f_1, x \rangle, \dots, \langle f_k, x \rangle).$$

现在性质 (i) 就是在说 $\gamma \in \overline{\varphi(B_E)}$. 现在考虑反证, 若 (i) 不成立, 则 $\gamma \notin \overline{\varphi(B_E)}$, 因此 $\{\gamma\}$ 与 $\overline{\varphi(B_E)}$ 必能在 $\mathbb{R}^k$ 中被某超平面严格分离, 亦即存在 $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) \in \mathbb{R}^k$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\beta \cdot \varphi(x) < \alpha < \beta \cdot \gamma, \quad \forall x \in B_E.$$

把上式两端写开即

$$\left\langle \sum_{i=1}^k \beta_i f_i, x \right\rangle < \alpha < \sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i, \quad \forall x \in B_E,$$

因此

$$\left\| \sum_{i=1}^k \beta_i f_i \right\| \leq \alpha < \sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i$$

这与 (ii) 矛盾!

**引理 3.4 (Goldstine)**

设 E 是任意 Banach 空间, 则 $J(B_E)$ 在拓扑 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下是 $B_{E^{**}}$ 的稠子集, 因此 $J(E)$ 在拓扑 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下是 E^{**} 的稠子集.



下面证明 Goldstine 引理 3.4. 取 $\xi \in B_{E^{**}}$, 设 V 是 ξ 在拓扑 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下的邻域, 往证 $V \cap J(B_E) \neq \emptyset$. 利用

弱*拓扑的邻域基刻画3.8, 可设

$$V = \{\eta \in E^{**} : |\langle \eta - \xi, f_i \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, \dots, k\},$$

其中 $f_1, \dots, f_k \in E^*$ 取定, $\varepsilon > 0$. 现需找到 $x \in B_E$ 使得 $J(x) \in V$, 即

$$|\langle f_i, x \rangle - \langle \xi, f_i \rangle| < \varepsilon, \quad \forall i = 1, \dots, k.$$

记 $\gamma_i = \langle \xi, f_i \rangle$, 根据 Helly 引理3.3, 只需验证

$$\left| \sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i \right| \leq \left\| \sum_{i=1}^k \beta_i f_i \right\|,$$

而

$$\left| \sum_{i=1}^k \beta_i \gamma_i \right| = \left| \left\langle \xi, \sum_{i=1}^k \beta_i f_i \right\rangle \right| \leq \|\xi\| \left\| \sum_{i=1}^k \beta_i f_i \right\|$$

由 $\|\xi\| \leq 1$ 即得欲证. □

现在着手证明逆命题. 根据映射在最弱拓扑下的连续性3.2, 因为对每个取定的 $f \in E^*$ 而言, 映射 $x \mapsto \langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle$ 总关于 $\sigma(E, E^*)$ 连续, 故典则映射 $J: E \rightarrow E^{**}$ 实际上总是从 $\sigma(E, E^*)$ 到 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 的连续映射. 因为连续映射把紧集映成紧集, 故由 B_E 在 $\sigma(E, E^*)$ 下是紧集知 $J(B_E)$ 是 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下的紧集. 由 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 的 Hausdorff 性可知 $J(B_E)$ 同样是 $\sigma(E^{**}, E)$ 中的闭集, 又因为 Goldstine 引理3.4表明 $J(B_E)$ 在 $B_{E^{**}}$ 中稠, 故只能有 $J(B_E) = B_{E^{**}}$, 因此 $J(E) = E^{**}$, 此即欲证. □

关于自反空间的紧性性质, 我们还有下述两条结果:

定理 3.5

设 E 是自反 Banach 空间, $\{x_n\}$ 是 E 中的有界序列, 则 $\{x_n\}$ 存在在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$. ♥

定理 3.6 (Eberlein-Smulian)

设 E 作为 Banach 空间满足 E 中的每个有界列都有在 $\sigma(E, E^*)$ 下收敛的子列, 则 E 自反. ♥

这两条定理的证明先省略了.

注 3.15 定理3.4, 定理3.5与定理3.6并不是同一件事的重申, 我们可以回忆:

(i) 若 X 是度量空间, 则

$$X \text{ 紧} \Leftrightarrow X \text{ 中的任意序列都有收敛子列}.$$

(ii) 存在紧拓扑空间 X 使得其中的序列不存在任何收敛子列. 这种空间的典例为 $X = B_{E^*}$, 根据 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理可知 B_{E^*} 是 $\sigma(E^*, E)$ 中的紧集, 但在 $E = l^\infty$ 时可以构造 X 中不存在收敛子列的序列.

(iii) 就算 X 是拓扑空间且 X 中的任意序列都有收敛子列, X 也未必紧.

下面给出自反空间的更多性质.

命题 3.11 (闭线性子空间对自反性的继承)

设 E 是自反 Banach 空间, $M \subset E$ 是 E 的闭线性子空间, 则 M 自反. ♠

证明 当在 M 上赋 E 的范数后, M 上可以自动出现两种弱拓扑:

(a) 由 $\sigma(E, E^*)$ 诱导出的拓扑.

(b) 它自身的弱拓扑 $\sigma(M, M^*)$.

事实上, 这两种拓扑是相同的, 这是因为由 Hahn-Banach 定理知 M 上的每个连续线性泛函都是 E 上连续线性泛函在 M 上的限制, 于是 $\sigma(M, M^*)$ 需要确保连续的每个线性泛函 $f \in M^*$ 均具有在 E 中的延拓 $f' \in E^*$. 现在根据 Kakutani 定理, 要证明 M 自反, 只需证明 B_M 在 $\sigma(M, M^*)$ (或等价地在 $\sigma(E, E^*)$) 中紧. 然而, 因为 B_E 已经在 $\sigma(E, E^*)$ 中紧, 且由凸集的闭性等价3.1知 M 在 $\sigma(E, E^*)$ 中闭, 故 B_M 在 $\sigma(E, E^*)$ 中紧. □

推论 3.4 (对偶保持自反性)

Banach 空间 E 自反当且仅当其对偶空间 E^* 自反.



证明 $\Rightarrow$: 因为 E 自反, 故 $E^{**} = E$. 设 $J: E \rightarrow E^{**}$ 是典则映射, 任取 $\varphi \in E^{***}$, 知映射 $x \mapsto \langle \varphi, Jx \rangle$ 是 E 上的连续线性泛函, 记该映射为 f , 则

$$\langle \varphi, Jx \rangle = \langle f, x \rangle, \quad \forall x \in E.$$

但 $f \in E^*$, 故 $\langle f, x \rangle = \langle Jx, f \rangle$, 于是

$$\langle \varphi, Jx \rangle = \langle Jx, f \rangle, \quad \forall x \in E.$$

因为 J 是满射, 所以当 x 跑遍 E 时 Jx 跑遍 E^{**} , 因此

$$\langle \varphi, \xi \rangle = \langle \xi, f \rangle, \quad \forall \xi \in E^{**}.$$

这说明 $E^* \rightarrow E^{***}$ 的典则映射是满射.

$\Leftarrow$: 根据前述结论, 由 E^* 自反可知 E^{**} 自反. 因为 $J(E)$ 是 E^{**} 在强拓扑下的闭子空间, 故由命题 3.11 知 $J(E)$ 自反. 若能说明线性等距同构保持自反性, E 自反就自然成立了.

下面说明线性等距同构保持自反. 若 E, F 是 Banach 空间, $T: E \rightarrow F$ 是线性等距同构, 则考虑映射 $T^*: E^* \rightarrow F^*, f \mapsto f \circ T^{-1}$, 可以验证 T^* 是 $E^* \rightarrow F^*$ 的线性等距同构, 类似基于 T^* 可以构造 $E^{**} \rightarrow F^{**}$ 的线性等距同构 $T^{**}: \xi \mapsto \xi \circ (T^*)^{-1}$. 现设 E 自反, 任取 $\xi \in F^{**}$, 知存在 $\tau \in E^{**}$ 使得 $T^{**}\tau = \xi$, 由 E 的自反性可知

$$\langle \xi, g \rangle = \langle T^*\tau, g \rangle = \langle \tau, (T^*)^{-1}g \rangle = \langle (T^*)^{-1}g, J_E^{-1}\tau \rangle = \langle g, T(J_E^{-1}\tau) \rangle, \quad \forall \xi \in F^{**}, \forall g \in F^*.$$

其中 $J_E: E \rightarrow E^{**}$ 是典则映射. 容易验证 $T \circ J_E^{-1}: E^{**} \rightarrow F$ 是满射, 下面说明 $T^{**} \circ (T \circ J_E^{-1})^{-1} = T^{**} \circ J_E \circ T^{-1}$ 实际上就是 $F \rightarrow F^{**}$ 的典则映射. 任取 $x \in F, f \in F^*$, 重复上述过程知

$$\langle T^{**} \circ J_E \circ T^{-1}x, f \rangle = \langle f, x \rangle.$$

这正是典则映射的定义. 现在 $T^{**} \circ J_E \circ T^{-1}$ 显然是 $F \rightarrow F^{**}$ 的满射, 故 F 自反. □

推论 3.5 (自反空间弱拓扑下的紧集判定)

设 E 是自反 Banach 空间, $K \subset E$ 是强拓扑下的有界闭凸子集, 则 K 在 $\sigma(E, E^*)$ 下紧.



证明 因为 K 是凸集, 故由凸集的闭性等价 3.1 知 K 在强拓扑下闭等价于 K 在 $\sigma(E, E^*)$ 下闭. 另一方面, 根据 K 有界知存在常数 m 使得 $K \subset mB_E$, 而 Kakutani 定理 3.4 表明 mB_E 在 $\sigma(E, E^*)$ 下紧, 因此 K 作为紧集的闭子集自然在 $\sigma(E, E^*)$ 下紧. □

推论 3.6 (自反空间下半连续凸函数的最小值)

设 E 是自反 Banach 空间, $A \subset E$ 是强拓扑下的非空闭凸子集, 设 $\varphi: A \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是下半连续凸函数, $\varphi \not\equiv +\infty$, 且

$$\lim_{\substack{x \in A \\ \|x\| \rightarrow \infty}} \varphi(x) = +\infty \quad (A \text{ 有界时忽略该假设.}) \quad (3.7)$$

则 φ 可在 A 上达到最小值, 亦即存在 $x_0 \in A$ 使得

$$\varphi(x_0) = \min_A \varphi.$$



证明 任取 $a \in A$ 满足 $\varphi(a) < +\infty$, 考察集合

$$\tilde{A} = \{x \in A : \varphi(x) \leq \varphi(a)\}.$$

根据 (3.7) 式知 $\tilde{A}$ 是强拓扑下的有界闭凸集, 进而由自反空间弱拓扑下的紧集判定 3.5 知 $\tilde{A}$ 是 $\sigma(E, E^*)$ 下的紧集. 另一方面, 推论 3.2 表明 φ 在 $\sigma(E, E^*)$ 下依旧下半连续, 因此根据下半连续函数的基本性质 (v) 可知 φ 在 $\tilde{A}$ 上达

到最小值, 即存在 $x_0 \in \tilde{A}$ 使得

$$\varphi(x_0) \leq \varphi(x), \quad \forall x \in \tilde{A}.$$

当 $x \in A \cap \tilde{A}$ 时, 知 $\varphi(x_0) \leq \varphi(a) < \varphi(x)$, 故

$$\varphi(x_0) \leq \varphi(x), \quad \forall x \in A.$$

□

注 3.16 推论 3.6 正是自反空间与凸函数在变分法与优化论的许多问题中重要地位的基石.

定理 3.7 (自反空间之间无界线性算子的延拓)

设 E, F 是自反 Banach 空间, $A: D(A) \subset E \rightarrow F$ 是无界闭线性算子, 且 $D(A)$ 在 E 中稠密. 则 $D(A^*)$ 在 F^* 中稠密, 因此 $A^{**}: D(A^{**}) \subset E^{**} \rightarrow F^{**}$ 良定义, 它也能视作 $E \rightarrow F$ 的无界算子, 于是

$$A^{**} = A.$$

♥

注 3.17 回忆

$$D(A^*) = \{v \in F^* : \exists c > 0 (|\langle v, Au \rangle| \leq c \|u\|, \forall u \in D(A))\}$$

$$\langle v, Au \rangle_{F^*, F} = \langle A^* v, u \rangle_{E^*, E}, \quad \forall u \in D(A), \forall v \in D(A^*).$$

证明 首先证明 $D(A^*)$ 在 F^* 中稠密. 设 φ 是 F^* 上的连续线性泛函, 且 φ 在 $D(A^*)$ 上为零, 由推论 2.4 知只需说明在 F^* 上 $\varphi \equiv 0$ 即可. 因为 F 自反, 故 $\varphi \in F$, 且

$$\langle w, \varphi \rangle = 0, \quad \forall w \in D(A^*). \quad (3.8)$$

若 $\varphi \neq 0 = A(0)$, 则 $(0, \varphi) \notin G(A) \subset E \times F$, 而由 A 的闭性知 $G(A)$ 是闭集, 故由 Hahn-Banach 定理的第二几何形式知 $E \times F$ 中存在严格分离 $\{(0, \varphi)\}$ 与 $G(A)$ 的闭超平面, 亦即存在 $(f, v) \in E^* \times F^*$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle < \alpha < \langle v, \varphi \rangle, \quad \forall u \in D(A).$$

因为 $u \mapsto \langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle$ 依旧是 $D(A)$ 上的连续线性泛函, 故只能有

$$\langle f, u \rangle + \langle v, Au \rangle = 0, \quad \forall u \in D(A). \quad (3.9)$$

且

$$\langle v, \varphi \rangle \neq 0.$$

由 (3.9) 式知 $v \in D(A^*)$, 在 (3.8) 式中取 $w = v$ 即得矛盾.

下面说明 $A^{**} = A$. 回忆 (2.35) 式, 知

$$I(G(A^*)) = G(A)^\perp, \quad I(G(A^{**})) = G(A^*)^\perp,$$

又因为由 A 的闭性知 $G(A)$ 闭, 于是 $G(A)^{\perp\perp} = G(A)$, 因此

$$G(A^{**}) = G(A)^{\perp\perp} = G(A).$$

□

3.6 可分空间

定义 3.4 (可分空间 (separable space))

若度量空间 E 存在可数稠密子集, 就称 E 可分.

♣

分析中的许多重要空间都是可分空间, 例如有限维空间, $L^p(l^p)$ ($1 \leq p < \infty$) 与紧度量空间 K 上的连续函数空间 $C(K)$. 然而, $L^\infty(l^\infty)$ 并不可分.

命题 3.12 (可分性的传递性)

设 E 是可分度量空间, $F \subset E$ 是任意子集, 则 F 可分.



证明 设 $\{u_n\}$ 是 E 的可数稠密子集, $\{r_m\}$ 是满足 $r_m \rightarrow 0$ 的任意正数列. 现在对每个 m, n 而言, 在 $B(u_n, r_m) \cap F$ 非空时选取一个点 $a_{m,n} \in B(u_n, r_m)$, 可见 $\{a_{m,n}\}$ 是 F 的可数稠密子集. $\square$

定理 3.8 (Banach)

设 E 是 Banach 空间, 若 E^* 可分, 则 E 可分.



注 3.18 上述定理的逆命题并不正确. 考虑可分空间 $E = L^1$, 其对偶空间 $E^* = L^\infty$ 并不可分.

证明 设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 E^* 的可数稠密子集. 因为

$$\|f_n\| = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| \leq 1}} \langle f_n, x \rangle,$$

故存在 $x_n \in E$ 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \langle f_n, x_n \rangle \geq \frac{1}{2} \|f_n\|.$$

记 L_0 为 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 以 $\mathbb{Q}$ 为背景所张成的线性空间; 也就是说, L_0 包含系数在 $\mathbb{Q}$ 中的 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 的全体有限线性组合. 这样构造的 L_0 是可数的, 这是因为对每个整数 n , 记 Λ_n 为 $\{x_n\}_{1 \leq k \leq n}$ 以 $\mathbb{Q}$ 为背景张成的空间. 显见 Λ_n 可数, 且 $L_0 = \bigcup_{n \geq 1} \Lambda_n$, 因此 L_0 可数.

现在记 L 为 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 以 $\mathbb{R}$ 为背景张成的线性空间. 显见 L_0 是 L 的稠密子集, 如果能说明 L 是 E 的稠密子空间, 证明就结束了 (因为这样就说明了 L_0 是 E 的可数稠密子集). 设 $f \in E^*$ 是在 L 上取值为零的连续线性泛函, 我们考虑用推论 2.4 证明 L 的稠密性, 这就是要说明 $f = 0$. 根据 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 的稠密性, 任取 $\varepsilon > 0$, 总存在整数 N 使得 $\|f - f_N\| < \varepsilon$, 因此

$$\frac{1}{2} \|f_N\| \leq \langle f_N, x_N \rangle \stackrel{(A)}{=} \langle f_N - f, x_N \rangle < \varepsilon$$

(其中 (A) 是因为 $\langle f, x_N \rangle = 0$). 现有 $\|f\| \leq \|f - f_N\| + \|f_N\| < 3\varepsilon$, 因此 $f = 0$. $\square$

推论 3.7

设 E 是 Banach 空间, 则

$$E \text{ 自反且可分} \Leftrightarrow E^* \text{ 自反且可分}.$$



证明 根据对偶对自反性的保持 3.4 与前述 Banach 定理 3.8 已经有

$$E^* \text{ 自反且可分} \Rightarrow E \text{ 自反且可分},$$

$$E \text{ 自反且可分} \Rightarrow E^* \text{ 自反}.$$

现若 E 自反且可分, 根据自反性知 $E^{**} = J(E)$, 而典则嵌入保持子空间的稠密性, 故 E^{**} 可分, 由 Banach 定理 3.8 即知 E^* 可分. $\square$

可分性和弱拓扑下的可度量性关系密切. 回忆拓扑空间 X 可度量指的是 X 上存在能诱导 X 上拓扑的度量.

定理 3.9 (可分与单位闭球可度量的等价性)

若 E 是可分 Banach 空间, 则 B_{E^*} 在弱*拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 下可度量. 反之, 若 B_{E^*} 在 $\sigma(E^*, E)$ 下可度量, 则 E 可分.



上述命题还有下述“对偶”表述:

定理 3.10

若 E 是满足 E^* 可分的 Banach 空间, 则 B_E 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下可度量. 反之, 若 B_E 在 $\sigma(E, E^*)$ 下可度量, 则 E^* 可分.



下面证明定理3.9.

证明 设 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 B_E 的可数稠密子集. 对任意 $f \in E^*$, 记

$$[f] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |\langle f, x_n \rangle|.$$

容易说明 $[\cdot]$ 是 E^* 上的范数, 且 $[f] \leq \|f\|$. 现在记 $d(f, g) = [f - g]$ 为该范数对应的度量, 下面说明度量 d 在 B_{E^*} 上诱导的拓扑与 $\sigma(E^*, E)$ 在 B_{E^*} 上的限制 (为叙述方便, 依旧把该拓标记为 $\sigma(E^*, E)$) 是相同的.

首先说明 $\sigma(E^*, E)$ 中的开集是 d 诱导拓扑中的开集. 根据定理1.3, 只需说明 B_{E^*} 中全体点在 $\sigma(E^*, E)$ 下的全体邻域都是 d 诱导拓扑中的开集即可. 现取 $f_0 \in B_{E^*}$, 记 V 是 f_0 在 $\sigma(E^*, E)$ 下的邻域. 为证 V 是 d 诱导拓扑中的开集, 就是要找到 $r > 0$ 使得

$$U = \{f \in B_{E^*} : d(f, f_0) < r\} \subset V.$$

根据弱*拓扑的邻域基3.8, 不妨设

$$V = \{f \in B_{E^*} : |\langle f - f_0, y_i \rangle| < \varepsilon, \forall i = 1, \dots, k\},$$

其中 $\varepsilon > 0, y_1, \dots, y_k \in E$. 根据 $f - f_0$ 的线性性与 ε 的任意性, 不失一般性可以再设 $\|y_i\| \leq 1 (i = 1, \dots, k)$, 于是 $\{y_i\}_{i=1}^k \subset B_E$. 因为 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 B_E 的稠子集, 故对每个 i 而言均存在整数 n_i 使得

$$\|y_i - x_{n_i}\| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

取 $r > 0$ 满足

$$2^{n_i} r < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall i = 1, \dots, k.$$

下面说明对这样的 r 即有 $U \subset V$. 这是因为若 $d(f, f_0) < r$, 根据 $d(f, g)$ 的构造知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |\langle f - f_0, x_n \rangle| < r,$$

因此

$$\frac{1}{2^{n_i}} |\langle f - f_0, x_{n_i} \rangle| < r, \quad \forall i = 1, \dots, k.$$

于是

$$|\langle f - f_0, y_i \rangle| = |\langle f - f_0, y_i - x_{n_i} \rangle + \langle f - f_0, x_{n_i} \rangle| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

这说明 $f \in V$.

下面再说明 d 诱导拓扑中的开集是 $\sigma(E^*, E)$ 中的开集. 任取 $f_0 \in B_{E^*}$, 取定 $r > 0$, 现在需要找到 f_0 在 $\sigma(E^*, E)$ 中的某邻域 V 使得

$$V \subset U = \{f \in B_{E^*} : d(f, f_0) < r\}.$$

与前文同理, 不妨设

$$V = \{f \in B_{E^*} : \langle f - f_0, x_i \rangle < \varepsilon, \forall i = 1, \dots, k\},$$

其中 ε, k 就是我们用来调整以使得 $V \subset U$ 的量. 现在对 $f \in V$ 有

$$\begin{aligned} d(f, f_0) &= \sum_{n=1}^k \frac{1}{2^n} |\langle f - f_0, x_n \rangle| + \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |\langle f - f_0, x_n \rangle| \\ &< \varepsilon + \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} (\|f\| + \|f_0\| \|x_n\|) < \varepsilon + 2 \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \varepsilon + \frac{1}{2^{k-1}}. \end{aligned}$$

取 $\varepsilon = \frac{r}{2}$, 令 k 充分大以满足 $\frac{1}{2^{k-1}} < \frac{r}{2}$ 即可.

反之, 设 B_{E^*} 在 $\sigma(E^*, E)$ 下可度量, 往证 E 可分. 记

$$U_n = \left\{ f \in B_{E^*} : d(f, 0) < \frac{1}{n} \right\}$$

另记 V_n 是 0 在 $\sigma(E^*, E)$ 中的邻域, 且其满足 $V_n \subset U_n$. 不妨设

$$V_n = \{f \in B_{E^*} : |\langle f, x \rangle| < \varepsilon_n, \forall x \in \Phi_n\},$$

其中 $\varepsilon_n > 0, \Phi_n$ 是 E 的有限子集. 记

$$D = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Phi_n,$$

显见 D 可数.

显见 D 以 $\mathbb{Q}$ 为背景张成的线性空间在 D 以 $\mathbb{R}$ 为背景张成的线性空间中稠密, 往证 D 以 $\mathbb{R}$ 为背景张成的线性空间 $D_{\mathbb{R}}$ 在 E 中稠密, 为此考虑推论 2.4. 设 $f \in E^*$ 满足 $\langle f, x \rangle = 0 (\forall x \in D_{\mathbb{R}})$, 根据 f 的线性性知 $\langle f, x \rangle = 0 (\forall x \in D)$, 由 D 的构造可知 $f \in V_n (\forall n)$, 因此 $f \in U_n (\forall n)$, 这说明 $f = 0$. $\square$

对于定理 3.10, 证明 E^* 可分 $\Rightarrow B_E$ 在 $\sigma(E, E^*)$ 中可度量的过程与前面完全一样, 只需把 E 和 E^* 的位置对调即可. 但是它的逆命题不能再用前面的方法了, 这是因为 E 未必是自反空间, 当 $E^{**} \supsetneq J(E)$ 时, 就算构造了与前面类似的 $D \subset E^*$, 通过推论 2.4 我们只能设 $x \in E^{**}$ 满足 $\langle x, f \rangle = 0 (\forall f \in D)$, 而这没法说明 x 在 $V_n \subset E$ 中. 这一方向的证明我们就暂时省略了.

注 3.19 我们需要再次强调: 若 E 是无穷维空间, 则全空间 E (或 E^*) 在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ (或弱 * 拓扑 $\sigma(E^*, E)$) 下并不可度量化. 特别地, E^* 上由范数 $[\cdot]$ 诱导的拓扑与弱 * 拓扑并不相同.

推论 3.8

设 E 是可分 Banach 空间, $\{f_n\}$ 是 E^* 中的有界序列, 则该序列存在在弱 * 拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 下收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$. 

证明 不失一般性, 可设 $\|f_n\| \leq 1 (\forall n)$. 根据 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理 3.3, 集合 B_{E^*} 在弱 * 拓扑 $\sigma(E^*, E)$ 中紧, 由可分与单位闭球可度量的等价性 3.9 知 B_{E^*} 在 $\sigma(E^*, E)$ 下可度量. 回忆在度量空间下, 紧集等价于自列紧集, 故 B_{E^*} 在 $\sigma(E^*, E)$ 的意义下是自列紧集. 利用有界的定义, 设存在 $M > 0$ 使得 $\{f_n\} \subset MB_{E^*}$, 容易说明 MB_{E^*} 同样是 $\sigma(E^*, E)$ 下的可度量紧集, 由其列紧性即得欲证. $\square$

最后我们给出定理 3.5 的证明, 为方便阅读这里重申内容:

定理 3.11 (自反空间的弱列紧性)

设 E 是自反 Banach 空间, $\{x_n\}$ 是 E 中的有界序列, 则 $\{x_n\}$ 存在在弱拓扑 $\sigma(E, E^*)$ 下收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$. 

证明 设 M_0 是由 $\{x_n\}$ 以 $\mathbb{R}$ 为背景张成的线性空间, 记 $M = \overline{M_0}$, 仿照 Banach 定理 3.8 证明中的过程可以说明 M 可分. 又因为 M 是 E 的闭线性子空间, 由闭线性子空间对自反性的继承 3.11 可知 M 也是自反空间. 现在因为 M 自反且可分, 由推论 3.7 可知 M^* 也自反且可分, 于是由 M^* 的可分性与定理 3.10 可知 B_M 是弱拓扑 $\sigma(M, M^*)$ 下的可度量紧集. 根据度量空间中紧性与自列紧性的等价, 可知 M 中的有界列 $\{x_n\}$ 在 $\sigma(M, M^*)$ 的意义下必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 又因为命题 3.11 的证明中已经指出在 M 上 $\sigma(E, E^*)$ 所诱导的拓扑与 $\sigma(M, M^*)$ 实际上是同一种拓扑, 故 $\{x_{n_k}\}$ 在 $\sigma(E, E^*)$ 的意义下收敛. $\square$

3.7 一致凸空间

定义 3.5 (一致凸 (uniformly convex))

若 Banach 空间 E 满足

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in E \left(\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1, \|x - y\| > \varepsilon \Rightarrow \left\| \frac{x + y}{2} \right\| < 1 - \delta \right),$$

就称 E 一致凸. 

一致凸性可以看成单位球的几何性质: 如果我们在单位球中牵一条长度为 ε 的弦, 则这条弦的中点必须落在

半径为 $1 - \delta$ 的球内 (其中 $\delta > 0$). 特别地, 这说明单位球面必须是“圆”的, 它不能包含任何线段.

例 3.3 设 $E = \mathbb{R}^2$, 则范数 $\|x\|_2 = [|x_1|^2 + |x_2|^2]^{\frac{1}{2}}$ 一致凸, 而范数 $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$, $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|)$ 并不一致凸. 画出这些范数下单位球的形状就能知道原因了.

例 3.4 之后会说明在 $1 < p < \infty$ 时, L^p 都是一致凸空间, 且 Hilbert 空间也是一致凸空间.

定理 3.12 (Milman-Pettis)

每个一致凸 Banach 空间均自反.



注 3.20 一致凸性本身是范数的几何性质, 范数的等价并不保持其一致凸性. 另一方面, 自反性是一个拓扑性质: 范数的等价保持空间的自反性. 因此, 上述定理的结果非常惊人: 它表明一个几何性质能导出一个拓扑性质. 通过上述定理, 我们会经常用一致凸性来证明自反性, 但一致凸性并不是干这件事的最佳工具: 存在一些诡异的自反空间, 在它们上面不存在任何一致凸的等价范数!

证明 设 $\xi \in E^{**}$ 满足 $\|\xi\| = 1$, 往证 $\xi \in J(B_E)$. 因为 $J(B_E)$ 在强拓扑下是 E^{**} 中的闭集, 故只需说明

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in B_E (\|\xi - J(x)\| \leq \varepsilon). \quad (3.10)$$

取定 $\varepsilon > 0$, 设 $\delta > 0$ 是一致凸性产生的数. 因为 $\|\xi\| = 1$, 故总能取到 $f \in E^*$ 使得 $\|f\| = 1$ 的同时有

$$\langle \xi, f \rangle > 1 - \frac{\delta}{2}. \quad (3.11)$$

记

$$V = \left\{ \eta \in E^{**} : |\langle \eta - \xi, f \rangle| < \frac{\delta}{2} \right\}$$

根据弱*拓扑的邻域基 3.8 可知 V 是 ξ 在弱*拓扑 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下的邻域. 根据 Goldstine 引理 3.4, $J(B_E)$ 在 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下是 $B_{E^{**}}$ 的稠子集, 因此 $V \cap J(B_E) \neq \emptyset$, 故可设 $x \in B_E$ 满足 $J(x) \in V$. 下面说明这个 x 就满足 (3.10) 式.

考虑反证法, 设 $\|\xi - Jx\| > \varepsilon$, 即 $\xi \in (Jx + \varepsilon B_{E^{**}})^c = W$. 因为 $B_{E^{**}}$ 在 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下闭⁴, 而闭性是平移与缩放不变的, 故 $Jx + \varepsilon B_{E^{**}}$ 是 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 中的闭集, 因此 W 是 ξ 在拓扑 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 下的邻域. 再次应用 Goldstine 引理 3.4, 知 $V \cap W \cap J(B_E) \neq \emptyset$, 这说明存在 $y \in B_E$ 使得 $J(y) \in V \cap W$. 因为 $J(x), J(y) \in V$, 故

$$\begin{aligned} |\langle f, x \rangle - \langle \xi, f \rangle| &< \frac{\delta}{2}, \\ |\langle f, y \rangle - \langle \xi, f \rangle| &< \frac{\delta}{2}. \end{aligned}$$

将上述两式相加可得

$$2\langle \xi, f \rangle < \langle f, x + y \rangle + \delta \leq \|x + y\| + \delta.$$

与 (3.11) 式结合可知

$$\left\| \frac{x + y}{2} \right\| > 1 - \delta.$$

根据一致凸性, 上式成立时只能有 $\|x - y\| \leq \varepsilon$, 但这与 $J(y) \in W$ 所蕴含的 $\|x - y\| > \varepsilon$ 矛盾! 至此即证命题. $\square$

我们最后以一致凸性的一个有用性质来收尾.

命题 3.13

设 E 是一致凸 Banach 空间, $\{x_n\} \subset E$ 满足 $x_n \rightharpoonup x$ 在 $\sigma(E, E^*)$ 中成立, 且

$$\limsup \|x_n\| \leq \|x\|,$$

则 $x_n \rightarrow x$ 在强拓扑意义下成立.



⁴前者显然, 对后者而言, 由 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 是 Hausdorff 拓扑知 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 中的紧集一定是闭集, 根据 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理 3.3 可得 $B_{E^{**}}$ 在 $\sigma(E^{**}, E^*)$ 中紧.

证明 不妨设 $x \neq 0$ (否则结论显然成立). 记

$$\lambda_n = \max(\|x_n\|, \|x\|), y_n = \lambda_n^{-1} x_n, y = \|x\|^{-1} x,$$

可知 $\lambda_n \rightarrow \|x\|$, 且 $y_n \hookrightarrow y$ 在 $\sigma(E, E^*)$ 中成立. 根据弱收敛的性质 3.5(iii) 可知

$$\|y\| \leq \liminf \|(y_n + y)/2\|.$$

另一方面, 注意到 $\|y\| = 1, \|y_n\| \leq 1$, 故 $\|(y_n + y)/2\| \rightarrow 1$, 根据一致凸性知只能有 $\|y_n - y\| \rightarrow 0$, 因此 $x_n \rightarrow x$ 在强拓扑意义下成立. $\square$

3.8 局部凸空间的共轭理论

本节选自 [13]. 回忆拓扑空间 E 到 F 的同胚 f 指的是 $E \rightarrow F$ 的连续双射, 且 f^{-1} 同样连续. 现若 X 是线性空间, $a \in X, 0 \neq \lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ 是背景数域), 则定义

$$T_a : X \rightarrow X, x \mapsto T_a(x) = a + x (\forall x \in X);$$

$$M_\lambda : X \rightarrow X, x \mapsto M_\lambda(x) = \lambda x (\forall x \in X),$$

分别称 T_a, M_λ 为 X 上的加法算子和数乘算子. 通过同胚的定义可以验证下述结果成立:

命题 3.14

设 X 是拓扑线性空间, 则 $T_a, M_\lambda (\lambda \neq 0)$ 是 $X \rightarrow X$ 的到上同胚, 且

$$T_a^{-1} = T_{-a}, M_\lambda^{-1} = M_{\lambda^{-1}}. \quad (3.12)$$

因此平移和数乘缩放是保开集的运算:

推论 3.9

设 X 是拓扑线性空间, $x \in X, 0 \neq \lambda \in \mathbb{K}$, 则

- (i) $V \subset X$ 是开集当且仅当 $x + \lambda V$ 是开集.
- (ii) $V \subset X$ 是 0_X 的邻域当且仅当 $x + \lambda V$ 是 x 的邻域. 特别若 $V \subset X$ 是 0_X 的邻域, 则 $-V$ 和 λV 都是 0_X 的邻域.
- (iii) 若 $V \subset X$ 是开集, 则对任意 $A \subset X$ 而言 $A + V = \bigcup_{x \in A} (x + V)$ 均为开集.

根据推论 3.9(ii), 对于拓扑线性空间 X 而言, 0_X 的邻域基可以通过平移成为任意一点的邻域基, 因此我们把 0_X 的邻域基称为 X 的局部基.

定义 3.6

若拓扑线性空间 (X, τ) 存在由凸集构成的局部基, 则称 X 是局部凸的.

前面我们提过弱拓扑可以用最弱拓扑来定义, 对于局部凸空间而言弱拓扑也是用这种思路得到的, 不过我们会着重强调可分点性在其中的作用:

定义 3.7

设 X 是某个集合, $\{Y_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是一族拓扑空间, τ_λ 是 Y_λ 上的拓扑, $T_\lambda : X \rightarrow Y_\lambda$ 是一族映射, 记 $\mathcal{F} = \{T_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$. 若对任意 $x_1, x_2 \in X$ 而言, 只要 $x_1 \neq x_2$, 就存在 $\lambda \in \Lambda$ 使得 $T_\lambda x_1 \neq T_\lambda x_2$, 则称 $\mathcal{F}$ 是可分点的.

特别若 $(Y_\lambda, \tau_\lambda) = (\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}}) (\forall \lambda \in \Lambda)$, X 是赋范线性空间, 则由 Hahn-Banach 定理可知 $X \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续线性泛函构成的映射族必可分点. 仿照最弱拓扑的构造可以得到下述结果:

定理 3.13

设 $X, \{Y_\lambda : \lambda \in \Lambda\}, \{\tau_\lambda : \lambda \in \Lambda\}, \{T_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 的设置和定义 3.7 相同, 记形如 $\{T_\lambda^{-1}(B) : B \in \tau_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$ 的全体集合的任意有限交构成的集族为 U , 则:

- (i) U 可生成 X 上的拓扑 τ , 且 U 是 τ 的局部基.
 - (ii) 若 $\mathcal{F}$ 可分点, 且每个 τ_λ 是 Hausdorff 拓扑, 则 τ 也是 Hausdorff 拓扑.
 - (iii) 若 X 是线性空间, 每个 Y_λ 都是拓扑线性空间, 每个 T_λ 都是线性映射, $\mathcal{F}$ 可分点, 则 (X, τ) 是拓扑线性空间.
 - (iv) 若每个 Y_λ 都是局部凸空间, 则 (X, τ) 是局部凸空间.
 - (v) τ 是使得每个 T_λ 均连续的最弱拓扑.
- 称 X 上的拓扑 τ 为 $\mathcal{F}$ 拓扑, 记之为 $\tau_{\mathcal{F}}$.



记 X' 是 X 上的线性泛函的全体 (注意这里线性泛函不需要连续), 称 X' 为 X 的代数对偶空间. 注意此时 X' 上还没赋任何拓扑. 下述结果给出了上述结果中 $(Y_\lambda, \tau_\lambda) = (\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}})(\forall \lambda \in \Lambda)$ 的特殊情形:

定理 3.14

设 X 是线性空间, $\mathcal{F} \subset X', \mathcal{F} \neq \emptyset$, 定义

$$p_{x'}(x) = |\langle x', x \rangle_{X' \times X}|, \quad \forall x \in X, \quad (3.13)$$

记 $P = \{p_{x'} : x' \in \mathcal{F}\}$, $\tau_{\mathcal{F}}$ 是由形如 $\{x : |\langle x', x \rangle_{X' \times X}| < r, \forall x' \in \mathcal{F}, r > 0\}$ 的全体集合生成的拓扑, 则:

- (i) 每个 $p_{x'}$ 都是 X 上的半范数.
- (ii) 若 $\mathcal{F}$ 在 X 上可分点, 则 P 是 X 上的可分点半范数族, $\tau_{\mathcal{F}}$ 成为 X 上的局部凸拓扑.
- (iii) 若 $\mathcal{F}$ 可数, 则 $(X, \tau_{\mathcal{F}})$ 可度量化.
- (iv) 每个 $x' \in \mathcal{F}$ 都是 $(X, \tau_{\mathcal{F}})$ 上的连续线性泛函.
- (v) $(X, \tau_{\mathcal{F}})$ 是使得每个 $x' \in \mathcal{F}$ 连续的最弱拓扑.
- (vi) 网 $\{x_\lambda : \lambda \in \Lambda\} \subset X$ 在拓扑 $\tau_{\mathcal{F}}$ 下收敛于 $x \in X$ 当且仅当

$$\lim_{\lambda \in \Lambda} \langle x', x_\lambda \rangle_{X' \times X} = \langle x', x \rangle_{X' \times X}, \quad \forall x' \in \mathcal{F}.$$

(vii) 集合 $E \subset X$ 有界当且仅当对 $\forall x' \in \mathcal{F}$ 均有 $\sup_{x \in E} |\langle x', x \rangle_{X' \times X}| < \infty$.

(viii) 若 (X, τ') 本身是拓扑线性空间, $\mathcal{F} \subset X^*$, 则 $\tau_{\mathcal{F}} \subset \tau'$.

**定义 3.8**

设 (X, τ) 是局部凸空间, X^* 是 X 的对偶空间. 当 $\mathcal{F} = X^*$ 时, 称 X 上的 $\mathcal{F}$ 拓扑为 X 上的弱拓扑, 记为 $\sigma(X, X^*)$.



因为对局部凸空间 (X, τ) 而言 X^* 在 X 上可分点⁵, 故由定理 3.14(ii) 立得:

推论 3.10

若 (X, τ) 是局部凸空间, 则 $(X, \sigma(X, X^*))$ 是局部凸空间.



我们还需回忆引理 3.2, 方便起见我们把它表成下述形式:

引理 3.5

设 X 是线性空间, $x', x'_1, \dots, x'_n \in X'$, 则 $x' = \alpha_1 x'_1 + \dots + \alpha_n x'_n$ 当且仅当 $\bigcap_{i=1}^n N(x'_i) \subset N(x')$.



接下来可以介绍局部凸空间中一个相当不平凡的结果了, 该结果实际上蕴含了定理 3.1.

⁵这其实就是 Hahn-Banach 定理的几何形式.

定理 3.15

设 (X, τ) 是局部凸空间, X' 是 X 的代数共轭, $x' \in X'$, 则 $x' \in (X, \sigma(X, X^*))^*$ 当且仅当 $x' \in (X, \tau)^*$, 即

$$(X, \sigma(X, X^*))^* = (X, \tau)^*. \quad (3.14)$$

也就是说, x' 是 τ 连续的当且仅当 x' 是 $\sigma(X, X^*)$ 连续的. 

证明 因为 $(X, \sigma(X, X^*))$ 是使得每个 $x^* \in X^*$ 均连续的最弱拓扑, 故 τ 连续的线性泛函必 $\sigma(X, X^*)$ 连续, 从而 $(X, \tau)^* \subset (X, \sigma(X, X^*))^*$.

反之, 设 $x' \in (X, \sigma(X, X^*))^*$, 则由定理 3.14 知对任意 $\varepsilon > 0$ 而言 $\{x : |\langle x', x \rangle_{X' \times X}| < \varepsilon\}$ 均为 $\sigma(X, X^*)$ 中的开集, 进而存在 $x'_1, \dots, x'_n \in (X, \tau)^*$ 与 $\delta > 0$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^n \{x : |\langle x'_i, x \rangle_{X' \times X}| < \delta\} \subset \{x : |\langle x', x \rangle_{X' \times X}| < \varepsilon\}. \quad (3.15)$$

若 $x \in \bigcap_{i=1}^n N(x'_i)$, 则由线性性知对任意 $\lambda > 0$ 均有 $\lambda x \in \bigcap_{i=1}^n N(x'_i)$, 进而由 (3.15) 知 $|\langle x', \lambda x \rangle_{X' \times X}| < \varepsilon$, 即 $|\langle x', x \rangle_{X' \times X}| < \varepsilon/\lambda$. 令 $\lambda \rightarrow \infty$ 即得 $\langle x', x \rangle_{X' \times X} = 0$, 故 $x \in N(x')$, 即 $\bigcap_{i=1}^n N(x'_i) \subset N(x')$. 由引理 3.5 知

$$x' = \alpha_1 x'_1 + \dots + \alpha_n x'_n \in (X, \tau)^*,$$

故 $(X, \sigma(X, X^*))^* \subset (X, \tau)^*$. □

接下来进一步研究局部凸空间对偶空间上的弱*拓扑. 仍设 (X, τ) 是局部凸空间, X^* 是 X 的对偶空间. 对每个 $x \in X$, 在 X^* 上定义

$$\langle f_x, x^* \rangle_{X^{**} \times X^*} = \langle x^*, x \rangle_{X^* \times X}, \forall x^* \in X^*,$$

类似于曾经对双重对偶空间的讨论, 可以说明 f_x 是 X^* 上的线性泛函 (即 $f_x \in (X^*)'$), f_x 由 x 唯一确定, 且 $\{f_x : x \in X\}$ 在 X^* 上可分点. 定义 $J : X \rightarrow (X^*)', x \mapsto f_x$ 是 $X \rightarrow (X^*)'$ 的典则嵌入映射, 显见 $J(X) \subset (X^*)'$. 下面进一步确定 $(X^*)'$ 上的拓扑:

定义 3.9

设 (X, τ) 是局部凸空间, X^* 是 X 的对偶空间, $\mathcal{F} = \{f_x : x \in X\}$, f_x 是前面定义的线性泛函, 则称 X^* 上的 $\mathcal{F}$ 拓扑是 X^* 上的弱*拓扑, 记之为 $\sigma(X^*, X)$. 

类似于 Banach 空间情形下的弱*拓扑, 局部凸空间情形下的弱*拓扑具有下述性质:

定理 3.16

设 (X, τ) 是局部凸空间, X^* 是 X 的对偶空间, 则:

- (i) $(X^*, \sigma(X^*, X))$ 是局部凸空间.
- (ii) 对每个 $x \in X$, 若定义

$$p_x : X^* \rightarrow \mathbb{R}, x^* \mapsto p_x(x^*) = |\langle x^*, x \rangle_{X^* \times X}|,$$

则 $\{p_x : x \in X\}$ 是 X^* 上的可分点半范数族, 它生成的拓扑正是 $\sigma(X^*, X)$.

- (iii) 定义

$$U := \{x^* \in X^* : |\langle x^*, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, x_i \in X, 1 \leq i \leq n\},$$

则全体 $\{U : n \geq 1, \varepsilon > 0\}$ 构成 $\sigma(X^*, X)$ 的局部基.

- (iv) $\sigma(X^*, X)$ 是使得每个 $f_x(x \in X)$ 连续的最弱拓扑.
- (v) 在弱*拓扑下, 网 $\{x_\lambda^* : \lambda \in \Lambda\} \subset X^*$ 收敛于 x^* 当且仅当

$$\lim_{\lambda \in \Lambda} \langle x_\lambda^*, x \rangle_{X^* \times X} = \langle x^*, x \rangle_{X^* \times X}, \forall x \in X.$$

- (vi) 在弱*拓扑下, 集合 $E \subset X^*$ 有界当且仅当对 $\forall x \in X$ 均有 $\sup_{x^* \in E} |\langle x^*, x \rangle_{X^* \times X}| < \infty$. 

下述结果是引入本节的主要目的, 它给出了判断 X^{**} 中的元素何时在 X 中的判别法:

定理 3.17

设 (X, τ) 是局部凸空间, X^* 是 X 的对偶空间, 则

$$(X^*, \sigma(X^*, X))^* = X. \quad (3.16)$$



证明 容易验证 $X \subset (X^*, \sigma(X^*, X))^*$, 下面证明 $(X^*, \sigma(X^*, X))^* \subset X$. 设 $y \in (X^*, \sigma(X^*, X))^*$, 则

$$\{x^* : |\langle y, x^* \rangle_{(X^*)' \times X^*}| < \varepsilon\}$$

是 $\sigma(X^*, X)$ 中的开集, 故由定理 3.17(iii) 知存在 $x_1, \dots, x_n \in X$ 与 $\delta > 0$ 使得

$$\{x^* : |\langle x^*, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \delta, 1 \leq i \leq n\} \subset \{x^* : |\langle y, x^* \rangle_{(X^*)' \times X^*}| < \varepsilon\}.$$

另一方面每个 x_i 通过典则嵌入 J 都可以视作 $(X^*)'$ 中的元素. 现在仿照定理 3.15 的证明可知 $\bigcap_{i=1}^n N(x_i) \subset N(y)$, 进而在 $(X^*)'$ 上对 $y, x_1, \dots, x_n$ 应用引理 3.5 即得

$$y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \in X,$$

故 $(X^*, \sigma(X^*, X))^* \subset X$.

注 3.21

- 上述结果特别提醒了对偶空间是要结合拓扑来谈的. 一般来说我们默认 X^{**} 是 $(X^*, \|\cdot\|_{X^*})$ 的对偶空间, 而 $\|\cdot\|_{X^*}$ 没法很好地和序偶 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(X^*)' \times X^*}$ 相容, 这才会导致 $X \subsetneq X^{**}$ 等一系列问题.
- 根据上述结果可知只要 $x^{**} \in X^{**}$ 在 X^* 中弱*连续 (进一步只需在单位开球中弱*连续), 则 $x^{**} \in X$.

第四章 L^p 空间

本章选自 [2].

记 $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, 此时 Ω 是集合, 且

(i) $\mathcal{M}$ 是 Ω 中的 σ -代数. 也就是说, $\mathcal{M}$ 是 Ω 的某些子集构成的集族, 其中

(a) $\emptyset \in \mathcal{M}$,

(b) $A \in \mathcal{M} \Rightarrow A^c \in \mathcal{M}$,

(c) 当 $\forall n (A_n \in \mathcal{M})$ 时 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

(ii) μ 是一个测度 (measure), 即 μ 作为 $\mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ 的函数满足

(a) $\mu(\emptyset) = 0$,

(b) 当 $\{A_n\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的不交可数集族时有 $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

称 $\mathcal{M}$ 中的元素为可测集 (measurable set). 有时我们把 $\mu(A)$ 写成 $|A|$. 另外, 尽管下述假设并不是本质上的, 我们还是考虑:

(iii) Ω 是 σ -有限的, 即存在 $\mathcal{M}$ 中的可数集族 $\{\Omega_n\}$ 使得 $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n$, 且对 $\forall n$ 均有 $\mu(\Omega_n) < \infty$.

如果集合 $E \in \mathcal{M}$ 满足 $\mu(E) = 0$, 就称 E 为零测集 (null set). 如果一个性质在 Ω 上除去某零测集后处处成立, 就称该性质 a.e. 成立.

在阅读本章时, 可测函数 (measurable function), 可积函数 (integrable function) 与 L^p 空间的一些基本性质已经应该是老朋友了, 因此我们不再给出它们的具体说明. 一般我们把 $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的全体可积函数构成的空间记为 $L^1(\Omega, \mu)$, 简记之为 $L^1(\Omega)$ (或 L^1). 另外简便起见, 我们把积分写成 $\int f$ 而非 $\int_{\Omega} f d\mu$, 且在 L^1 范数上作下述符号约定:

$$\|f\|_{L^1} = \|f\|_1 = \int_{\Omega} |f| d\mu = \int |f|.$$

同时, L^1 中两元素的相等是在 a.e. 意义下的. 接下来我们回忆 L^1 上的一些最基本性质.

4.1 关于积分人人须知的结果

定理 4.1 (Beppo Levi 单调收敛定理)

设 $\{f_n\} \subset L^1$ 满足

(i) $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq f_{n+1} \leq \dots$ 在 Ω 上 a.e.

(ii) $\sup_n \int f_n < \infty$.

则 $f_n(x)$ 在 Ω 上 a.e. 收敛到某有限极限. 若记该极限为 $f(x)$, 则 $f \in L^1$, 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$.



定理 4.2 (Lebesgue 控制收敛定理)

设 $\{f_n\} \subset L^1$ 满足

(i) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 在 Ω 上 a.e.

(ii) 存在 $g \in L^1$ 使得对 $\forall n$ 而言, $|f_n(x)| \leq g(x)$ 在 Ω 上 a.e.

则 $f \in L^1$, 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$.



引理 4.1 (Fatou 引理)

设 $\{f_n\} \subset L^1$ 满足

(i) 对 $\forall n$ 而言, $f_n \geq 0$ a.e.

(ii) $\sup_n \int f_n < \infty$.

对 a.e. $x \in \Omega$ 记 $f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq +\infty$, 则 $f \in L^1$, 且

$$\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$



在 $\Omega = \mathbb{R}^N$ 这一最基础的情况下, $\mathcal{M}$ 由 Lebesgue 可测集组成, μ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 记 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 为 $\mathbb{R}^N$ 中全体紧支连续函数构成的空间, 即

$$C_c(\mathbb{R}^N) = \{f \in C(\mathbb{R}^N) : \exists K \subset \mathbb{R}^N \forall x \in \mathbb{R}^N \setminus K (f(x) = 0), \text{ 其中 } K \text{ 是紧集}\}$$

定理 4.3 ($C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中的稠密性)

空间 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中稠密, 即

$$\forall f \in L^1(\mathbb{R}^N) \forall \varepsilon > 0 \exists f_1 \in C_c(\mathbb{R}^N) (\|f - f_1\|_1 \leq \varepsilon).$$



设 $(\Omega_1, \mathcal{M}_1, \mu_1), (\Omega_2, \mathcal{M}_2, \mu_2)$ 是两个 σ -有限测度空间, 通过乘积测度可以在直积 $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ 上定义测度空间结构 $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$.

定理 4.4 (Tonelli)

设 $F(x, y) : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, 且

(i) $\int_{\Omega_2} |F(x, y)| d\mu_2 < \infty$ 对 a.e. $x \in \Omega_1$ 成立,

(ii) $\int_{\Omega_1} d\mu_1 \int_{\Omega_2} |F(x, y)| d\mu_2 < \infty$,

则 $F \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2)$.



定理 4.5 (Fubini)

设 $F \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2)$, 则对 a.e. $x \in \Omega_1$ 而言, $F(x, y) \in L^1_y(\Omega_2)$, $\int_{\Omega_2} F(x, y) d\mu_2 \in L^1_x(\Omega_1)$. 类似地, 对 a.e. $y \in \Omega_2$ 而言, $F(x, y) \in L^1_x(\Omega_1)$, $\int_{\Omega_1} F(x, y) d\mu_1 \in L^1_y(\Omega_2)$. 另有下述积分换序成立:

$$\int_{\Omega_1} d\mu_1 \int_{\Omega_2} F(x, y) d\mu_2 = \int_{\Omega_2} d\mu_2 \int_{\Omega_1} F(x, y) d\mu_1 = \iint_{\Omega_1 \times \Omega_2} F(x, y) d\mu_1 d\mu_2.$$



4.2 L^p 空间的定义与初等性质

定义 4.1 (L^p)

设 $p \in \mathbb{R}$ 满足 $1 < p < \infty$, 则记

$$L^p(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ 可测, 且 } |f|^p \in L^1(\Omega)\}$$

并记

$$\|f\|_{L^p} = \|f\|_p = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu \right]^{\frac{1}{p}}.$$

容易验证 $\|\cdot\|_p$ 是范数.



定义 4.2 (L^∞)

记

$$L^\infty(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ 可测, 且存在常数 } C \text{ 使得 } |f(x)| \leq C \text{ 在 } \Omega \text{ 上 a.e.}\}$$

并记

$$\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_\infty = \inf\{C : |f(x)| \leq C \text{ 在 } \Omega \text{ 上 a.e.}\}$$

同样可以验证 $\|\cdot\|_\infty$ 是范数.

对 $1 \leq p \leq \infty$, 约定 p' 为其共轭指标 (conjugate exponent):

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

定理 4.6 (Hölder 不等式)

设 $1 \leq p \leq \infty, f \in L^p, g \in L^{p'}$, 则 $fg \in L^1$, 且

$$\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

注 4.1 Hölder 不等式有下述拓展: 设 $f_1, \dots, f_k$ 满足

$$f_i \in L^{p_i}, \quad 1 \leq i \leq k, \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k} \leq 1$$

则 $f = f_1 \cdots f_k \in L^p$, 且

$$\|f\|_p \leq \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_k\|_{p_k}.$$

特别若 $f \in L^p \cap L^q (1 \leq p \leq q \leq \infty)$, 则对 $\forall r$ 满足 $p \leq r \leq q$, 总有 $f \in L^r$, 且成立下述插值不等式 (interpolation inequality):

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^\alpha \|f\|_q^{1-\alpha}, \quad \frac{1}{r} = \frac{\alpha}{p} + \frac{1-\alpha}{q}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

定理 4.7

L^p 是线性空间, $\|\cdot\|_p$ 对任意 $1 \leq p \leq \infty$ 均为范数.

定理 4.8 (Fischer-Riesz)

L^p 在 $1 \leq p \leq \infty$ 时是 Banach 空间.

定理 4.9 (Riesz)

设 $\{f_n\} \subset L^p, f \in L^p$ 满足 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 与函数 $h \in L^p$ 使得

- (i) $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ 在 Ω 上 a.e.
- (ii) $|f_{n_k}(x)| \leq h(x) (\forall k)$ 在 Ω 上 a.e.

4.3 L^p 的自反性, 可分性与对偶

我们分下述三种情况考虑:

- (A) $1 < p < \infty$,
- (B) $p = 1$,
- (C) $p = \infty$.

4.3.1 $1 < p < \infty$ 的情况

在 $1 < p < \infty$ 时, L^p 的性质是最令人舒适的: 它自反, 可分, 且 L^p 的对偶正是 $L^{p'}$.

定理 4.10

在 $1 < p < \infty$ 时 L^p 自反.

证明 证明分为下述三步:

第一步: Clarkson 第一不等式. 设 $2 \leq p < \infty$, 我们断言

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p), \quad \forall f, g \in L^p. \quad (4.1)$$

下面证明(4.1)式. 事实上, 只要能证明

$$\left| \frac{a+b}{2} \right|^p + \left| \frac{a-b}{2} \right|^p \leq \frac{1}{2}(|a|^p + |b|^p), \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (4.2)$$

令 $a = f(x), b = g(x)$ 并在两端对 x 积分即得(4.1)式, 故我们转而考虑(4.2)式. 注意到函数

$$(x^2 + 1)^{\frac{p}{2}} - x^p - 1$$

在 $[0, \infty)$ 上递增, 由此可得

$$\alpha^p + \beta^p \leq (\alpha^2 + \beta^2)^{\frac{p}{2}}, \quad \forall \alpha, \beta \geq 0.$$

取 $\alpha = \left| \frac{a+b}{2} \right|, b = \left| \frac{a-b}{2} \right|$ 即得

$$\left| \frac{a+b}{2} \right|^p + \left| \frac{a-b}{2} \right|^p \leq \left(\left| \frac{a+b}{2} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{2} \right|^2 \right)^{\frac{p}{2}} = \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2} \right)^{\frac{p}{2}} \leq \frac{1}{2}(|a|^p + |b|^p).$$

至此即得(4.1)式.

第二步: $2 \leq p < \infty$ 时 L^p 一致凸, 此时它自反. 事实上, 取定 $\varepsilon > 0$, 设 $f, g \in L^p$ 满足 $\|f\|_p \leq 1, \|g\|_p \leq 1, \|f - g\|_p > \varepsilon$, 由 Clarkson 第一不等式(4.1)知

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p < 1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p,$$

因此 $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p < 1 - \delta$, 其中 $\delta = 1 - [1 - (\varepsilon/2)^p]^{\frac{1}{p}} > 0$. 这说明 L^p 是一致凸的, 由 Milman-Pettis 定理 3.12 即知 L^p 自反.

第三步: $1 < p \leq 2$ 时 L^p 自反. 设 $1 < p < \infty$, 按照下述方法定义算子 $T: L^p \rightarrow (L^{p'})^*$: 固定 $u \in L^p$, 知映射 $L^{p'} \ni f \mapsto \int u f$ 定义了 $L^{p'}$ 上的一个连续线性泛函, 因此这一映射是 $(L^{p'})^*$ 中的元素, 记之为 Tu . 即:

$$\langle Tu, f \rangle = \int u f, \quad \forall f \in L^{p'}.$$

现在断言

$$\|Tu\|_{(L^{p'})^*} = \|u\|_p, \quad \forall u \in L^p. \quad (4.3)$$

这是因为一方面根据 Hölder 不等式知

$$|\langle Tu, f \rangle| \leq \|u\|_p \|f\|_{p'}, \quad \forall f \in L^{p'}$$

因此 $\|Tu\|_{(L^{p'})^*} \leq \|u\|_p$. 另一方面, 记

$$f_0(x) = |u(x)|^{p-2}u(x) \quad (u(x) = 0 \text{ 时 } f_0(x) = 0)$$

显见

$$f_0 \in L^{p'}, \|f_0\|_{p'} = \|u\|_p^{p-1}, \langle Tu, f_0 \rangle = \|u\|_p^p;$$

因此

$$\|Tu\|_{(L^{p'})^*} \geq \frac{\langle Tu, f_0 \rangle}{\|f_0\|_{p'}} = \|u\|_p. \quad (4.4)$$

故 T 实际上是 $L^p \rightarrow (L^{p'})^*$ 的等距同构, 又因为 L^p 是 Banach 空间, 故 $T(L^p)$ 是 $(L^{p'})^*$ 的闭线性子空间.

现设 $1 < p \leq 2$, 第二步说明了 $L^{p'}$ 自反, 由对偶保持自反性 3.4 知 $(L^{p'})^*$ 也自反. 因为闭线性子空间继承自反性 (命题 3.11), 故 $T(L^p)$ 自反, 而推论 3.4 的证明中说明了线性等距同构保持自反性, 故 L^p 自反. $\square$

注 4.2 事实上, $1 < p \leq 2$ 时 L^p 也是一致凸空间, 这需要用到 $1 < p \leq 2$ 时成立的 Clarkson 第二不等式:

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^{p'} \leq \left(\frac{1}{2}\|f\|_p^p + \frac{1}{2}\|g\|_p^p \right)^{\frac{1}{p-1}}, \quad \forall f, g \in L^p.$$

这一不等式的具体证明我们就省略了.

定理 4.11 (Riesz 表示定理)

设 $1 < p < \infty$, $\phi \in (L^p)^*$, 则存在唯一函数 $u \in L^{p'}$ 使得

$$\langle \phi, f \rangle = \int u f, \quad \forall f \in L^p$$

且

$$\|u\|_{p'} = \|\phi\|_{(L^p)^*}.$$



注 4.3 Riesz 表示定理 4.11 在 L^p 空间理论中非常重要. 它表明 $1 < p < \infty$ 时 L^p 上的每个连续线性泛函都能“具体地”表为某个积分. 映射 $\phi \mapsto u$ 作为线性等距同构允许我们把“抽象的”空间 $(L^p)^*$ 与 $L^{p'}$ 等同起来.

在 Riesz 表示定理得证后, 我们将统一作下述恒同约定:

$$(L^p)^* = L^{p'}.$$

证明 考察算子

$$T: L^{p'} \rightarrow (L^p)^*, \langle Tu, f \rangle = \int u f, \quad \forall u \in L^{p'}, \forall f \in L^p.$$

定理 4.10 证明中的第三步表明

$$\|Tu\|_{(L^p)^*} = \|u\|_{p'}, \quad \forall u \in L^{p'}.$$

我们断言 T 是满射. 事实上, 记 $E = T(L^{p'})$, 因为 E 已经是 $(L^p)^*$ 的闭子空间了, 故只需证明 E 在 $(L^p)^*$ 中稠密, 为此考虑推论 2.4. 设 $h \in (L^p)^{**}$ 满足 $\langle h, Tu \rangle = 0 (\forall u \in L^{p'})$, 因为 L^p 自反, 故 $h \in L^p$, 因此 $\int u h = 0 (\forall u \in L^{p'})$. 取 $u = |h|^{p-2}h$ 即知 $h = 0$. $\square$

定理 4.12 ($C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中的稠密性)

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中稠密.



在证明定理 4.12 前, 我们先作下述符号约定: **截断算子 (truncation operation)** $T_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$T_n r = \begin{cases} r, & |r| \leq n \\ \frac{nr}{|r|}, & |r| > n. \end{cases}$$

给定集合 $E \subset \Omega$, 定义示性函数 (**characteristic function**) χ_E 为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in \Omega \setminus E. \end{cases}$$

证明 首先, 我们断言对给定的 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 与 $\varepsilon > 0$ 而言, 存在函数 $g \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$ 与紧集 $K \subset \mathbb{R}^N$ 使得 $\text{supp } g \subset K$, 且

$$\|f - g\|_p < \varepsilon. \quad (4.5)$$

事实上, 设 χ_n 是 $B(0, n)$ 的示性函数, 记 $f_n = \chi_n T_n f$. 根据控制收敛定理可知 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, 因此可在 n 足够大时取 $g = f_n$. 下一步, 对于已经取出的 g , 根据 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中的稠密性知任意给定 $\delta > 0$, 总存在 $g_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ 使得

$$\|g - g_1\|_1 < \delta.$$

不妨设 $\|g_1\|_\infty \leq \|g\|_\infty$, 否则可用 $T_n g_1$ 代替 g_1 (其中 $n = \|g\|_\infty$). 知

$$\|g - g_1\|_p \leq \|g - g_1\|_1^{\frac{1}{p}} \|g - g_1\|_\infty^{1 - \frac{1}{p}} \leq \delta^{\frac{1}{p}} (2\|g\|_\infty)^{1 - \frac{1}{p}},$$

取 δ 足够小使得

$$\delta^{\frac{1}{p}} (2\|g\|_\infty)^{1 - \frac{1}{p}} < \varepsilon$$

即可. $\square$

定义 4.3 (可分测度空间 (separable measure space))

称测度空间 Ω 可分, 如果存在 $\mathcal{M}$ 中的可数集族 $\{E_n\}$ 使得由 $\{E_n\}$ 生成的 σ -代数与 $\mathcal{M}$ 重合 (即 $\mathcal{M}$ 是包含所有 E_n 的最小 σ -代数.)



例 4.1 测度空间 $\Omega = \mathbb{R}^N$ 是可分的. 这是因为可取 $\{E_n\}$ 为以有理点为球心, 以有理数为半径的开球族, 显见 $\mathbb{R}^N$ 中的每个开集都可以表为某些 E_n 的并. 更一般地, 只要 Ω 是可分度量空间, $\mathcal{M}$ 由 Borel 集组成 (即 $\mathcal{M}$ 是 Ω 中的开集生成的 σ -代数), 则 Ω 是可分测度空间.

定理 4.13 (L^p 的可分性)

设 Ω 是可分测度空间, 则 $1 \leq p < \infty$ 时 $L^p(\Omega)$ 可分.



这里我们只考虑 $\Omega = \mathbb{R}^N$ 的情况, 一般情况的证明需要更多技巧. 注意从该定理出发, 可以得到只要可测集 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, 那么 $L^p(\Omega)$ 就可分. 这是因为存在 $L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^N)$ 的典则同构 (即在 Ω 外令函数值为 0 的延拓映射); 因此 $L^p(\Omega)$ 与 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 的某闭线性子空间等距同构, 根据闭线性子空间对可分性的继承 3.11 与线性等距同构保持可分性即知 $L^p(\Omega)$ 可分.

证明 当 $\Omega = \mathbb{R}^N$ 时, 记 $\mathcal{R}$ 为 $\mathbb{R}^N$ 中形如 $R = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k)$ ($a_k, b_k \in \mathbb{Q}$) 的集合构成的可数集族, 记 $\mathcal{E}$ 为函数族 $\{\chi_R\}_{R \in \mathcal{R}}$ 以 $\mathbb{Q}$ 为背景张成的线性空间, 即 $\mathcal{E}$ 由 χ_R 的全体有理系数有限线性组合构成, 显见 $\mathcal{E}$ 可数.

下面说明 $\mathcal{E}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中稠密. 取定 $f \in L^p(\mathbb{R}^N)$, $\varepsilon > 0$, 根据定理 4.12 知存在 $f_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ 使得 $\|f - f_1\|_p < \varepsilon$, 设 $R \in \mathcal{R}$ 是包含 $\text{supp } f_1$ 的方体. 对取定的 $\delta > 0$, 容易构造函数 $f_2 \in \mathcal{E}$ 满足 $\|f_1 - f_2\|_\infty < \delta$, $\text{supp } f_2 \subset R$. 由此可知

$$\|f_1 - f_2\|_p \leq \|f_1 - f_2\|_\infty |R|^{\frac{1}{p}} < \delta |R|^{\frac{1}{p}}$$

现在取 $\delta > 0$ 满足 $\delta |R|^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$, 可知 $\|f - f_2\|_p < 2\varepsilon$, 因此 $\mathcal{E}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中稠密. $\square$

4.3.2 $p = 1$ 的情况

我们从 $L^1(\Omega)$ 对偶空间的描述开始介绍.

定理 4.14 (Riesz 表示定理)

设 $\phi \in (L^1)^*$, 则存在唯一函数 $u \in L^\infty$ 使得

$$\langle \phi, f \rangle = \int u f, \quad \forall f \in L^1$$

且

$$\|u\|_\infty = \|\phi\|_{(L^1)^*}.$$



注 4.4 定理 4.14 表明 L^1 上的每个连续线性泛函都能“具体地”表为某个积分. 映射 $\phi \mapsto u$ 作为线性等距同构允许我们把“抽象的”空间 $(L^1)^*$ 与 L^∞ 等同起来. 在上述定理得证后, 我们将统一作下述恒同约定:

$$(L^1)^* = L^\infty.$$

证明 设 $\{\Omega_n\}$ 为 Ω 中的可测集列, 其满足 $\Omega = \bigcup_{n=1}^\infty \Omega_n$, $|\Omega_n| < \infty$ ($\forall n$). 记 $\chi_n = \chi_{\Omega_n}$.

u 的唯一性首先是显然的, 这是因为若 $u \in L^\infty$ 满足

$$\int u f = 0, \quad \forall f \in L^1$$

取 $f = \chi_n \text{sgn } u$ (约定 $\text{sgn } 0 = 0$) 可知 $u = 0$ 在 Ω_n 上 a.e., 令 n 跑遍 $\mathbb{N}$ 即知 $u = 0$ 在 Ω 上 a.e.

下面说明 u 的存在性. 首先构造函数 $\theta \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\theta(x) \geq \varepsilon_n > 0, \quad \forall x \in \Omega_n.$$

这样的 θ 肯定存在. 事实上, 只要定义 θ 在 Ω_1 上取值为 α_1 , 在 $\Omega_2 \setminus \Omega_1$ 上取值为 $\alpha_2, \dots$, 在 $\Omega_n \setminus \Omega_{n-1}$ 上取值为 α_n

等等, 调整 $\alpha_n > 0$ 的值使得 $\theta \in L^2$ 即可.

根据 Hölder 不等式, $\theta f \in L^1$, 于是映射 $L^2(\Omega) \ni f \mapsto \langle \phi, \theta f \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的连续线性泛函. 根据 $p = 2$ 时的 Riesz 表示定理 4.11 知存在函数 $v \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\langle \phi, \theta f \rangle = \int v f, \quad \forall f \in L^2(\Omega). \quad (4.6)$$

记 $u(x) = v(x)/\theta(x)$. 因为在 Ω 上 $\theta > 0$, 故 u 首先是良定义的. 另外显见 u 可测, 且 $u\chi_n \in L^2(\Omega)$, 下面说明 u 就是欲求的函数. 对 $g \in L^\infty(\Omega)$, 令 $f = \chi_n g/\theta$, 因为 f 在 Ω_n 上有界且在 Ω_n 外为零, 故 $f \in L^2(\Omega)$, 将其代入 (4.6) 式可得

$$\langle \phi, \chi_n g \rangle = \int u \chi_n g, \quad \forall g \in L^\infty(\Omega), \forall n. \quad (4.7)$$

下面我们说明 $u \in L^\infty(\Omega)$, 且

$$\|u\|_\infty \leq \|\phi\|_{(L^1)^*}. \quad (4.8)$$

取定常数 $C > \|\phi\|_{(L^1)^*}$, 记

$$A = \{x \in \Omega : |u(x)| > C\}.$$

下面说明 A 是零测集. 在 (4.7) 式中取 $g = \chi_A \operatorname{sgn} u$ 可得

$$\int_{A \cap \Omega_n} |u| \leq \|\phi\|_{(L^1)^*} |A \cap \Omega_n|$$

因此

$$C|A \cap \Omega_n| \leq \|\phi\|_{(L^1)^*} |A \cap \Omega_n|.$$

这说明只能有 $|A \cap \Omega_n| = 0 (\forall n)$, 因此 A 是零测集, 这便证明了 (4.8) 式.

最后, 我们说明

$$\langle \phi, h \rangle = \int u h, \quad \forall h \in L^1(\Omega). \quad (4.9)$$

这只需要在 (4.7) 式中取 $g = T_n h$, 观察到 $\chi_n T_n h \rightarrow h$ 在 $L^1(\Omega)$ 意义下成立, 利用 Hölder 不等式与 Lebesgue 控制收敛定理即得上式.

为完成定理 4.14 的证明, 我们还需验证 $\|u\|_\infty = \|\phi\|_{(L^1)^*}$. 由 (4.9) 式知

$$|\langle \phi, h \rangle| \leq \|u\|_\infty \|h\|_1, \quad \forall h \in L^1(\Omega)$$

因此 $\|\phi\|_{(L^1)^*} \leq \|u\|_\infty$, 结合 (4.8) 式即得欲证. $\square$

注 4.5 除非 Ω 仅包含有限个原子¹(此时 $L^1(\Omega)$ 有限维), 不然空间 $L^1(\Omega)$ 不可能自反. 这是因为如若 $L^1(\Omega)$ 自反, 则只可能有下述两种情况出现:

- (i) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\omega \subset \Omega$ 可测且 $0 < \mu(\omega) < \varepsilon$.
- (ii) 存在 $\varepsilon > 0$ 使得对每个可测集 $\omega \subset \Omega$ 而言, 只要 $\mu(\omega) > 0$, 就有 $\mu(\omega) \geq \varepsilon$.

对于情形 (i), 可以构造递减可测集列 $\{\omega_n\}$ 使得 $\mu(\omega_n) > 0 (\forall n)$, 且 $\mu(\omega_n) \rightarrow 0$. (其中一个构造方法为任取集列 $\{\omega'_k\}$ 满足 $0 < \mu(\omega'_k) < 1/2^k$, 令 $\omega_n = \bigcup_{k=n}^\infty \omega'_k$.) 记 $\chi_n = \chi_{\omega_n}$, 定义 $u_n = \chi_n / \|\chi_n\|_1$. 因为 $\|\chi_n\|_1 = 1$ 且 $L^1(\Omega)$ 自反, 根据定理 3.5 与 $\{u_n\}$ 有界知存在子列 (依旧记为 $\{u_n\}$) 与 $u \in L^1$ 使得 $u_n \rightharpoonup u$ 在弱拓扑 $\sigma(L^1, L^\infty)$ 意义下成立, 亦即

$$\int u_n \phi \rightarrow \int u \phi, \quad \forall \phi \in L^\infty.$$

另一方面, 取定 j , 对 $n > j$ 可知 $\int u_n \chi_j = 1$. 在等式两端令 $n \rightarrow \infty$ 并由控制收敛定理可得 $\int u \chi_j = 1 (\forall j)$. 然而如果对 $\int u \chi_j$ 取 $j \rightarrow \infty$ 并应用控制收敛定理, 应该得到 $\int u \chi_j \rightarrow 0$, 矛盾!

对于情形 (ii), 此时空间 Ω 必为原子测度空间², 且 Ω 可表为不交原子 $\{a_n\}$ 的可数并 (除非它仅包含有限多个

¹若测度空间 (Ω, μ) 的可测子集 A 满足 $\mu(A) > 0$, 且对任意可测集 $B \subset A$ 而言, 要么 $\mu(B) = 0$, 要么 $\mu(B) = \mu(A)$, 就称 A 是 X 的一个原子.

²即包含原子的测度空间.

原子). 此时 $L^1(\Omega)$ 与 l^1 同构, 因此只需证明 l^1 不自反即可. 考虑标准基底:

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 1}_n, 0, 0, \dots).$$

若 l^1 自反, 根据定理 3.5 知存在子列 $\{e_{n_k}\}$ 与 $x \in l^1$ 使得 $e_{n_k} \rightharpoonup x$ 在弱拓扑 $\sigma(l^1, l^\infty)$ 下成立, 即

$$\langle \varphi, e_{n_k} \rangle \rightarrow \langle \varphi, x \rangle (k \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in l^\infty.$$

现取

$$\varphi = \varphi_j = (\underbrace{0, 0, \dots, 1}_j, 1, 1, \dots)$$

知 $\langle \varphi_j, x \rangle = 1 (\forall j)$, 而由 $x \in l^1$ 知本应有 $\langle \varphi_j, x \rangle \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$, 矛盾!

4.3.3 $p = \infty$ 的情况

表示定理 4.14 已经表明 $L^\infty = (L^1)^*$. 在作为对偶空间时, L^∞ 具有一些良好性质, 例如:

- (i) 根据 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理 3.3, 闭单位球 B_{L^∞} 在弱 * 拓扑 $(\sigma(L^\infty, L^1))$ 下紧.
- (ii) 若 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中的可测集, $\{f_n\} \subset L^\infty(\Omega)$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 与 $f \in L^\infty(\Omega)$ 使得 $f_{n_k} \rightharpoonup f$ 在弱 * 拓扑 $\sigma(L^\infty, L^1)$ 下成立. (这由 L^1 可分与推论 3.8 即得.)

然而, $L^\infty(\Omega)$ 并不自反, 除非 Ω 仅包含有限个原子. 这是因为如果 $L^\infty(\Omega)$ 自反, 根据对偶对自反性的保持 3.4 可知 $L^1(\Omega)$ 也应该自反, 而前一条注已经说明了 $L^1(\Omega)$ 不自反. 从这一事实出发可知, L^∞ 的对偶空间 $(L^\infty)^*$ 包含 L^1 (因为 $L^\infty = (L^1)^*$), 且 $(L^\infty)^*$ 严格大于 L^1 . 也就是说, 存在 L^∞ 上的连续线性泛函 ϕ , 它不能表为

$$\langle \phi, f \rangle = \int u f, \quad u \in L^1, \forall f \in L^\infty.$$

下面我们给出这种泛函的一个“具体”例子. 记

$$\phi_0 : C_c(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto f(0).$$

显见 ϕ_0 是赋范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 上的连续线性泛函. 根据 Hahn-Banach 定理, 我们可以把 ϕ_0 延拓为 $L^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上的连续线性泛函 ϕ , 且

$$\langle \phi, f \rangle = f(0), \quad \forall f \in C_c(\mathbb{R}^N). \quad (4.10)$$

现在说明不存在函数 $u \in L^1(\mathbb{R}^N)$ 使得

$$\langle \phi, f \rangle = \int u f, \quad \forall f \in L^\infty(\mathbb{R}^N). \quad (4.11)$$

用反证法, 设存在这样的函数 u , 由 (4.10), (4.11) 两式可知

$$\int_u f = 0, \quad \forall f \in C_c(\mathbb{R}^N), f(0) = 0.$$

这说明只能让 $u = 0$ 在 $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ 上 a.e., 进而 $u = 0$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上 a.e. 由 (4.11) 式进而可得

$$\langle \phi, f \rangle = 0, \quad \forall f \in L^\infty(\mathbb{R}^N),$$

但在 $f(0) \neq 0$ 时这显然与 (4.10) 式矛盾!

注 4.6 除非 Ω 由有限多个原子构成, 否则空间 $L^\infty(\Omega)$ 不自反. 为说明此事, 我们先说明下述引理.

引理 4.2

设 E 是 Banach 空间, 若存在集族 $\{O_i\}_{i \in I}$ 使得

- (i) 对每个 $i \in I$, O_i 都是 E 的非空开子集,
- (ii) $i \neq j$ 时 $O_i \cap O_j = \emptyset$,
- (iii) I 不可数,

则 E 不可分.



证明 用反证法, 设 E 可分, 记 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 E 的可数稠密子集. 对每个 $i \in I$, 根据 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的稠密性知 $I_i \cap \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \neq \emptyset$, 设 $u_{n(i)} \in O_i$. 映射 $i \mapsto n(i)$ 是单射, 这是因为若 $n(i) = n(j)$, 则 $u_{n(i)} = u_{n(j)} \in O_i \cap O_j$, 由条件 (ii) 知只能有 $i = j$. 因此 I 可数, 这与条件 (iii) 矛盾! $\square$

下面说明 $L^\infty(\Omega)$ 不可分, 为此我们利用引理 4.2, 断言存在 Ω 的两两不交的不可数可测集族 $\{\omega_i\}_{i \in I}$, 此时对称和 $\omega_i \Delta \omega_j$ 在 $i \neq j$ 时有正测度. 现在在引理 4.2 中取

$$O_i = \{f \in L^\infty(\Omega) : \|f - \chi_{\omega_i}\|_\infty < 1/2\}$$

(注意到 ω, ω' 不交时 $\|\chi_\omega - \chi_{\omega'}\|_\infty = 1$) 即可. 当 Ω 为 $\mathbb{R}^N$ 中的开集时, 这样的不可数集族 $\{\omega_i\}$ 显然存在 (考虑球 $B(x_0, r), x_0 \in \Omega, r > 0$ 充分小即可).

当 Ω 是一般的测度空间时, 我们把 Ω 分成其原子部分 Ω_a 与非原子部分 Ω_d ; 下面讨论两种情况:

(i) Ω_d 不是零测集.

(ii) Ω_d 是零测集.

对于情形 (i), 对每个实数 $t \in (0, \mu(\Omega_d))$, 总能找到可测集 ω 使得 $\mu(\omega) = t$, 通过这种方法即可得到不交的不可数可测集族.

对于情形 (ii), 此时 Ω 由不交原子 $\{a_n\}$ 的可数并组成 (除非它仅包含有限多个原子). 对任意正整数族 $\mathbb{A} \subset \mathbb{N}$, 定义 $\omega_{\mathbb{A}} = \bigcup_{n \in \mathbb{A}} a_n$, 显见 $\{\omega_{\mathbb{A}}\}$ 就是我们要找的不交不可数可测集族.

下表总结了 Ω 为 $\mathbb{R}^N$ 中可测集时 $L^p(\Omega)$ 的主要性质:

	自反	可分	对偶空间
$L^p(1 < p < \infty)$	✓	✓	$L^{p'}$
L^1	×	✓	L^∞
L^∞	×	×	比 L^1 严格大

4.4 卷积与正则化

我们首先定义函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ 与函数 $g \in L^p(\mathbb{R}^N)$ 的卷积:

定理 4.15 (Young)

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^N), g \in L^p(\mathbb{R}^N) (1 \leq p \leq \infty)$, 则对 a.e. $x \in \mathbb{R}^N$ 而言函数 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上可积. 若记

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y)dy$$

则 $f * g \in L^p(\mathbb{R}^N)$, 且

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$



对 $\mathbb{R}^N$ 上给定的函数 f , 记 $\tilde{f}(x) = f(-x)$, 则:

命题 4.1

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^N), g \in L^p(\mathbb{R}^N), h \in L^{p'}(\mathbb{R}^N)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^N} (f * g)h = \int_{\mathbb{R}^N} g(\tilde{f} * h).$$



为了介绍卷积的支集, 我们回忆函数 f 的支集这一概念是在标准意义下谈的: $\text{supp } f$ 为使得 f 为零的最大开集的补集; 也就是说 $\text{supp } f$ 是集合 $\{x : f(x) \neq 0\}$ 的闭包. 这个定义在函数变为函数等价类的时候其实不再适用, 而 L^p 空间中的元素不幸的是后者. 因此我们需要一个内蕴的定义, 亦即 $\text{supp } f_1, \text{supp } f_2$ 在 $f_1 = f_2$ a.e. 时应该相同 (或相差一个零测集). 读者很容易发现之前的概念在 $f = \chi_Q$ 时其实没有意义, 因此我们通过下述命题引入一个更合适的概念:

命题 4.2

设 $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ 是任意函数, 考虑 $\mathbb{R}^N$ 中的开集族 $\{\omega_i\}_{i \in I}$, 它满足对每个 $i \in I$ 而言, $f = 0$ 都在 ω_i 上 a.e. 记 $\omega = \bigcup_{i \in I} \omega_i$, 则 $f = 0$ 在 ω 上 a.e., 记 $\text{supp } f$ 为 ω 在 $\mathbb{R}^N$ 中的补集.

**注 4.7**

- (a) 设 $f_1 = f_2$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上 a.e., 根据上述定义显见 $\text{supp } f_1 = \text{supp } f_2$, 因此我们可以直接谈论函数 $f \in L^p$ 的支集 $\text{supp } f$, 同时避开约定它所在的等价类.
- (b) 若 f 是 $\mathbb{R}^N$ 上的连续函数, 则容易验证 $\text{supp } f$ 的新定义与老定义得到的结果是相同的.

命题 4.3

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^N), g \in L^p(\mathbb{R}^N) (1 \leq p \leq \infty)$, 则

$$\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}.$$



证明 取定 $x \in \mathbb{R}^N$ 使得函数 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 可积³, 知

$$(f * g)(x) = \int f(x-y)g(y)dy = \int_{(x-\text{supp } f) \cap \text{supp } g} f(x-y)g(y)dy.$$

若 $x \notin \text{supp } f + \text{supp } g$, 则 $(x - \text{supp } f) \cap \text{supp } g = \emptyset$, 于是 $(f * g)(x) = 0$, 因此

$$(f * g)(x) = 0 \quad \text{在 } (\text{supp } f + \text{supp } g)^c \text{ 上 a.e.}$$

特别有

$$(f * g)(x) = 0 \quad \text{在 } \text{Int}[(\text{supp } f + \text{supp } g)^c] \text{ 上 a.e.}$$

因此

$$\text{supp}(f * g) \subset [\text{Int}(\text{supp } f + \text{supp } g)^c]^c = \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}.$$

注 4.8 若 f, g 均紧支, 则 $f * g$ 也紧支. 然而, 如果 f, g 只有一个紧支, $f * g$ 就未必紧支.

定义 4.4 (L^p_{loc})

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是开集, $1 \leq p \leq \infty$. 若函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对 Ω 中的每个紧集 K 均有 $f\chi_K \in L^p(\Omega)$, 就称 f 是局部 p 次可积的, 记 $f \in L^p_{loc}(\Omega)$.



显见 $f \in L^p_{loc}(\Omega) \Rightarrow f \in L^1_{loc}(\Omega)$.

命题 4.4

设 $f \in C_c(\mathbb{R}^N), g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$, 则 $(f * g)(x)$ 对每个 $x \in \mathbb{R}^N$ 均良定义, 且 $f * g \in C(\mathbb{R}^N)$.



证明 注意到对每个 $x \in \mathbb{R}^N$ 而言, 函数 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^N$ 上可积, 因此 $(f * g)(x)$ 对每个 $x \in \mathbb{R}^N$ 均有定义.

现设 $x_n \rightarrow x$, 取定 $\mathbb{R}^N$ 中的紧集 K 使得 $(x_n - \text{supp } f) \subset K (\forall n)$, 由此可知 $f(x_n - y) = 0 (\forall n, \forall y \notin K)$. 由 f 的一致连续性知

$$|f(x_n - y) - f(x - y)| \leq \varepsilon_n \chi_K(y), \quad \forall n, \forall y \in \mathbb{R}^N, \varepsilon_n \rightarrow 0.$$

由此即知

$$|(f * g)(x_n) - (f * g)(x)| \leq \varepsilon_n \int_K |g(y)|dy \rightarrow 0.$$



另外, 卷积可以提升原有函数的正则性. 为此我们先约定一些记号. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是开集, 则:

- $C(\Omega)$ 表示 Ω 上全体连续函数构成的空间.

³需要强调取定 x 是因为仅仅有 a.e. $x \in \mathbb{R}^N$ 使得 $f * g$ 可积.

- $C^k(\Omega)$ 表示 Ω 上全体 k 阶连续可微函数构成的空间, 其中 $k \geq 1$ 是整数.
 - $C^\infty(\Omega) = \bigcap_k C^k(\Omega)$.
 - $C_c(\Omega)$ 表示 Ω 上全体在 Ω 中紧支的连续函数构成的空间, 亦即该空间中的函数都能对应存在某个紧集 $K \subset \Omega$ 使得函数在 K 之外为零.
 - $C_c^k(\Omega) = C^k(\Omega) \cap C_c(\Omega)$.
 - $C_c^\infty(\Omega) = C^\infty(\Omega) \cap C_c(\Omega)$ (一些作者会把 $C_c^\infty(\Omega)$ 写成 $\mathcal{D}(\Omega)$ 或 $C_0^\infty(\Omega)$).
- 若 $f \in C^1(\Omega)$, 则其梯度定义为

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N} \right).$$

若 $f \in C^k(\Omega)$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$ 是长为 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_N \leq k$ 的多重指标, 则

$$D^\alpha f := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_N}}{\partial x_N^{\alpha_N}} f.$$

命题 4.5 (卷积对正则性的提升)

若 $f \in C_c^k(\mathbb{R}^N)$ ($k \geq 1$), $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^N)$, 则 $f * g \in C^k(\mathbb{R}^N)$, 且

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g, \quad \forall |\alpha| \leq k.$$

特别若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $g \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^N)$, 则 $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$.

4.5 磨光子

定义 4.5 (磨光子 (mollifier))

磨光子序列 $\{\rho_n\}_{n \geq 1}$ 指的是 $\mathbb{R}^N$ 上的一个函数列, 其满足

$$\rho_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \text{supp } \rho_n \subset \overline{B(0, 1/n)}, \int \rho_n = 1, \text{ 在 } \mathbb{R}^N \text{ 上 } \rho_n \geq 0.$$

之后我们统一用 $\{\rho_n\}$ 来表示磨光子序列.

从单个函数 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 出发, 只要它满足 $\text{supp } \rho \subset \overline{B(0, 1)}$, 在 $\mathbb{R}^N$ 上 $\rho \geq 0$, 且 ρ 不恒为 0, 就可以基于 ρ 构造一个磨光子序列出来. 例如取

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{1/(|x|^2-1)}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

令 $\rho_n(x) = C n^N \rho(nx)$, $C = 1/\int \rho$ 即得磨光子序列 $\{\rho_n\}$.

磨光子最重要的用途在于其逼近性质:

命题 4.6 (磨光子的一致逼近)

设 $f \in C(\mathbb{R}^N)$, 则 $(\rho_n * f) \rightarrow f$ ($n \rightarrow \infty$) 在 $\mathbb{R}^N$ 的紧集上一致成立.

证明 设 $K \subset \mathbb{R}^N$ 是取定的紧集, 给定 $\varepsilon > 0$, 根据 f 的连续性知存在 (依赖于 K 和 ε 的) $\delta > 0$ 使得

$$|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in K, \forall y \in B(0, \delta).$$

于是对 $x \in \mathbb{R}^N$ 有

$$\begin{aligned} (\rho_n * f)(x) - f(x) &= \int [f(x-y) - f(x)] \rho_n(y) dy \\ &= \int_{B(0, 1/n)} [f(x-y) - f(x)] \rho_n(y) dy. \end{aligned}$$

当 $n > 1/\delta, x \in K$ 时有

$$|(\rho_n * f)(x) - f(x)| \leq \varepsilon \int \rho_n = \varepsilon.$$

□

定理 4.16 (磨光子的 L^p 逼近)

设 $f \in L^p(\mathbb{R}^N) (1 \leq p < \infty)$, 则 $(\rho_n * f) \rightarrow f (n \rightarrow \infty)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 意义下成立.

♡

推论 4.1 ($C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中的稠密性)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是开集, 则 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega) (1 \leq p < \infty)$ 中稠密.

♡

推论 4.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是开集, $u \in L_{loc}^1(\Omega)$ 满足

$$\int u f = 0, \quad \forall f \in C_c^\infty(\Omega).$$

则 $u = 0$ 在 Ω 上 a.e.

♡

4.6 L^p 中的强紧性判别法

确定 $L^p(\Omega)$ 中怎样的函数类具有 (强拓扑下的) 紧闭包这件事非常重要. 对于 $C(K)$ (其中 K 是紧度量空间) 而言, 这个问题已经由 Ascoli-Arzelà 定理给出了解答:

定理 4.17 (Ascoli-Arzelà)

设 K 是紧度量空间, $\mathcal{H}$ 是 $C(K)$ 中的有界集. 若 $\mathcal{H}$ 是等度连续的, 即

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in \mathcal{H} (d(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon), \quad (4.12)$$

则 $\mathcal{H}$ 在 $C(K)$ 中的闭包是紧的.

♡

现在记 $(\tau_h f)(x) = f(x+h) (x \in \mathbb{R}^N, h \in \mathbb{R}^N)$ 是函数 f 的平移, Ascoli-Arzelà 定理在 L^p 空间中有下述版本:

定理 4.18 (Kolmogorov-Riesz-Frechet)

设 $\mathcal{F}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^N) (1 \leq p < \infty)$ 中的有界集, 设^a

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_p = 0 \quad \text{关于 } f \in \mathcal{F} \text{ 一致} \quad (4.13)$$

亦即对 $\forall \varepsilon > 0$ 均 $\exists \delta > 0$ 使得 $\|\tau_h f - f\|_p < \varepsilon$ 对 $\forall f \in \mathcal{F}$ 与满足 $|h| < \delta$ 的 $\forall h \in \mathbb{R}^N$ 成立, 则只要 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是任意有限测度集, $F|_\Omega$ 在 $L^p(\Omega)$ 中的闭包就是紧的. (其中 $F|_\Omega$ 表示 $\mathcal{F}$ 中函数在 Ω 上的限制构成的空间.)

^a这个条件对应(4.12)式, 它可以看成“积分的”等度连续条件.

♡

证明 证明分为下述四步.

第一步: 将 f 磨光. 我们断言

$$\|(\rho_n * f) - f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}, \forall n > \frac{1}{\delta}. \quad (4.14)$$

这是因为根据 Hölder 不等式有

$$\begin{aligned} |(\rho_n * f)(x) - f(x)| &\leq \int |f(x-y) - f(x)| \rho_n(y) dy \\ &\leq \left[\int |f(x-y) - f(x)|^p \rho_n(y) dy \right]^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

于是只要 $1/n < \delta$, 就有

$$\begin{aligned} \int |(\rho_n * f)(x) - f(x)|^p dx &\leq \int \int |f(x-y) - f(x)|^p \rho_n(y) dx dy \\ &= \int_{B(0,1/n)} \rho_n(y) dy \int |f(x-y) - f(x)|^p dx \leq \varepsilon^p. \end{aligned}$$

第二步: f 磨光后所得函数的一致有界与等度连续性 我们断言

$$\|\rho_n * f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq C_n \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}, \quad \forall f \in \mathcal{F} \quad (4.15)$$

且

$$|(\rho_n * f)(x_1) - (\rho_n * f)(x_2)| \leq C_n \|f\|_p |x_1 - x_2|, \quad \forall f \in \mathcal{F}, \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^N, \quad (4.16)$$

其中 C_n 仅依赖于 n .

注意到 $\rho_n * f$ 本质上是一个积分, 利用 Hölder 不等式并令 $C_n = \|\rho_n\|_{p'}$ 即证(4.15)式. 对于(4.16)式, 注意到 $\nabla(\rho_n * f) = (\nabla \rho_n) * f$, 于是

$$\|\nabla(\rho_n * f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|\nabla \rho_n\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)},$$

令 $C_n = \|\nabla \rho_n\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^N)}$, 由 Lagrange 中值定理即得(4.16)式.

第三步: 取出 Ω 中适用于 Ascoli-Arzelà 定理的紧子集. 取定 $\varepsilon > 0$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 测度有限, 我们断言存在 Ω 的有界可测子集使得

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} < \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F} \quad (4.17)$$

这是因为

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} \leq \|f - (\rho_n * f)\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + \|\rho_n * f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)}.$$

上右式前一项由第一步已经得证是充分小的了. 对于上右式第二项, 由(4.15)式知只需取 ω 使得 $|\Omega \setminus \omega|$ 足够小即可.

第四步: 证明结论. $L^p(\Omega)$ 首先可度量, 因此 $\overline{\mathcal{F}}|_\Omega$ 紧当且仅当其自列紧. 因为度量空间的子集列紧当且仅当其闭包自列紧, 故要说明 $\overline{\mathcal{F}}|_\Omega$ 紧, 只需说明 $\mathcal{F}|_\Omega$ 列紧. 因为 $L^p(\Omega)$ 完备, 根据 Hausdorff 定理可知 $\mathcal{F}|_\Omega$ 列紧当且仅当它是完全有界集, 亦即对任意 $\varepsilon > 0$ 而言均可以用半径为 ε 的球有限覆盖 $\mathcal{F}|_\Omega$. 现在取定 $\varepsilon > 0$, 根据第三步知存在有界可测子集 ω 使得(4.17)式成立. 再取定 $n > 1/\delta$, 根据第二步可知函数族 $\mathcal{H} = (\rho_n * \mathcal{F})|_{\bar{\omega}}$ 满足 Ascoli-Arzelà 定理的条件, 因此 $\mathcal{H}$ 在 $C(\bar{\omega})$ 中有紧闭包. 因为 $C(\bar{\omega})$ 上自然的拓扑肯定强于 $L^p(\omega)$ 上的拓扑, 而 $C(\bar{\omega})$ 本身是 $L^p(\omega)$ 中的闭线性子空间, 故 $\mathcal{H}$ 在 $L^p(\omega)$ 中同样具有紧闭包. 根据 $\overline{\mathcal{H}}$ 在 $L^p(\omega)$ 中的自列紧性与 Hausdorff 定理, 知 $\overline{\mathcal{H}}$ 应在 $L^p(\omega)$ 中完全有界, 于是存在半径为 ε 的有限个球 $B(g_i, \varepsilon)$ 覆盖 $\overline{\mathcal{H}}$. 特别这些球也覆盖 $\mathcal{H}$, 即

$$\mathcal{H} \subset \bigcup_i B(g_i, \varepsilon), \quad g_i \in L^p(\omega).$$

现在定义

$$\overline{g}_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} g_i(x), & x \in \omega \\ 0, & x \in \Omega \setminus \omega \end{cases}$$

考虑 $L^p(\Omega)$ 中的球 $B(\overline{g}_i, 3\varepsilon)$. 我们接下来就说明这族球覆盖 $\mathcal{F}|_\Omega$. 事实上, 任取 $f \in \mathcal{F}$, 根据 $\{B(g_i, \varepsilon)\}$ 覆盖 $\mathcal{H}$ 知存在 i 使得

$$\|(\rho_n * f) - g_i\|_{L^p(\omega)} < \varepsilon.$$

因为

$$\|f - \overline{g}_i\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega \setminus \omega} |f|^p + \int_{\omega} |f - g_i|^p$$

由(4.17)式知

$$\begin{aligned}\|f - \bar{g}_i\|_{L^p(\Omega)} &\leq \varepsilon + \|f - g_i\|_{L^p(\omega)} \\ &\leq \varepsilon + \|f - (\rho_n * f)\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} + \|(\rho_n * f) - g_i\|_{L^p(\omega)} < 3\varepsilon\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{F}|_\Omega$ 被 $\{B(\bar{g}_i, 3\varepsilon)\}$ 覆盖, 故 $\mathcal{F}|_\Omega$ 在 $L^p(\Omega)$ 中具有紧闭包. $\square$

如果只有定理4.18的条件, 我们一般没法断言 $\mathcal{F}$ 自身在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中有紧闭包. 要说明这件事, 我们需要添一个条件, 此即下述推论:

推论 4.3

设 $\mathcal{F}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^N)$ ($1 \leq p < \infty$) 中的有界集, (4.13)式成立, 且

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Omega \subset \mathbb{R}^N (\Omega \text{ 有界, 可测, 且 } \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N \setminus \Omega)} < \varepsilon (\forall f \in \mathcal{F})), \quad (4.18)$$

则 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中有紧闭包. 

证明 取定 $\varepsilon > 0$, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是满足(4.18)式的有界可测集. 根据 Kolmogorov-Riesz-Frechet 定理4.18已知 $\mathcal{F}|_\Omega$ 在 $L^p(\Omega)$ 中有紧闭包, 因此我们可以在 $L^p(\Omega)$ 中用有限个半径为 ε 的球覆盖 $\mathcal{F}|_\Omega$. 比方说

$$\mathcal{F}|_\Omega \subset \bigcup_i B(g_i, \varepsilon), \quad g_i \in L^p(\Omega).$$

记

$$\bar{g}_i(x) = \begin{cases} g_i(x), & x \in \Omega \\ 0, & x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega \end{cases}$$

则可以证明 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中被 $\{B(\bar{g}_i, 2\varepsilon)\}$ 覆盖. $\square$

注 4.9 上述推论的逆命题也成立, 因此上述推论实际上给出了 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中紧集的一个完全刻画.

下面给出 Kolmogorov-Riesz-Frechet 定理的一个有用应用:

推论 4.4

设 G 是 $L^1(\mathbb{R}^N)$ 中取定的函数, 记

$$\mathcal{F} = G * \mathcal{B},$$

其中 $\mathcal{B}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^N)$ ($1 \leq p < \infty$) 中的有界集, 则对任意有限测度集 Ω 而言, $\mathcal{F}|_\Omega$ 在 $L^p(\Omega)$ 中均有紧闭包. 

证明 显见 $\mathcal{F}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^N)$ 中有界. 另一方面, 若记 $f = G * u$ ($u \in \mathcal{B}$), 根据 $\mathcal{B}$ 的有界性知

$$\|\tau_h f - f\|_p = \|(\tau_h G - G) * u\|_p \leq C \|\tau_h G - G\|_1,$$

现在只要能证明下述引理:

引理 4.3

若 $G \in L^q(\mathbb{R}^N)$ ($1 \leq q < \infty$), 则 $\lim_{j \rightarrow \infty} \|\tau_h G - G\|_q = 0$. 

根据 Kolmogorov-Riesz-Frechet 定理4.18就立得结论. 下面说明上述引理. 取定 $\varepsilon > 0$, 根据 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^q(\mathbb{R}^N)$ 中的稠密性4.3知存在 $G_1 \in C_c(\mathbb{R}^N)$ 使得 $\|G - G_1\|_q < \varepsilon$. 于是

$$\begin{aligned}\|\tau_h G - G\|_q &\leq \|\tau_h G - \tau_h G_1\|_q + \|\tau_h G_1 - G_1\|_q + \|G_1 - G\|_q \\ &\leq 2\varepsilon + \|\tau_h G_1 - G_1\|_q.\end{aligned}$$

因为 $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G_1 - G_1\|_q = 0$, 故

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \|\tau_h G - G\|_q \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

引理至此即证. $\square$

第五章 Hilbert 空间

本章选自 [2].

5.1 定义, 初等性质, 到闭凸集上的投影

定义 5.1 (内积 (scalar product))

设 H 是线性空间, 则内积 (u, v) 是 $H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ 的双线性型 (即关于两个变量都线性的映射), 它满足

$$\text{对称性: } (u, v) = (v, u), \forall u, v \in H$$

$$\text{非负性: } (u, u) \geq 0, \forall u \in H$$

$$\text{正定性: } (u, u) \neq 0, \forall u \neq 0$$

回忆内积满足 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$|(u, v)| \leq (u, u)^{\frac{1}{2}}(v, v)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall u, v \in H.$$

(注意 Cauchy-Schwarz 不等式的证明不需要用到 $(u, u) \neq 0 (\forall u \neq 0)$.) 由 Cauchy-Schwarz 不等式立得

$$|u| = (u, u)^{\frac{1}{2}}$$

是一个范数. 一般用 $|\cdot|$ (而非 $\|\cdot\|$) 来记内积诱导的范数.

回忆经典的平行四边形法则:

$$\left| \frac{a+b}{2} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{2} \right|^2 = \frac{1}{2}(|a|^2 + |b|^2), \quad \forall a, b \in H. \quad (5.1)$$

定义 5.2 (Hilbert 空间 (Hilbert space))

Hilbert 空间指的是装备了内积的线性空间 H , 且 H 关于范数 $|\cdot|$ 完备.

之后统一用 H 表示 Hilbert 空间.

例 5.1 在 $L^2(\Omega)$ 上装备内积

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x)d\mu$$

后, $L^2(\omega)$ 成为 Hilbert 空间. 特别地, l^2 也是 Hilbert 空间. 之后研究的 Sobolev 空间 H^1 也是 Hilbert 空间.

命题 5.1

H 是一致凸的, 因此它自反.

证明 取 $\varepsilon > 0, u, v \in H$ 满足 $|u| \leq 1, |v| \leq 1, |u - v| > \varepsilon$, 根据平行四边形法则可知

$$\left| \frac{u+v}{2} \right|^2 < 1 - \frac{\varepsilon^2}{4} \Rightarrow \left| \frac{u+v}{2} \right| < 1 - \delta, \delta = 1 - \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}} > 0.$$

□

定理 5.1 (到闭凸集上的投影)

设 $K \subset H$ 是非空闭凸集, 则对每个 $f \in H$ 而言均存在唯一 $u \in K$ 使得

$$|f - u| = \min_{v \in K} |f - v| = \text{dist}(f, K). \quad (5.2)$$

且 u 由下述性质刻画:

$$u \in K, \quad (f - u, v - u) \leq 0, \forall v \in K. \quad (5.3)$$

注 5.1 上述定理中断言存在的 u 称为 f 到 K 上的**投影 (projection)**, 记之为

$$u = P_K f.$$

不等式(5.3)表明向量 $\overrightarrow{uf}$ (以 u 为起点, 以 f 为终点) 与任意向量 $\overrightarrow{uv} (v \in K)$ 之间的内积均 ≤ 0 , 也就是说这两个向量之间的夹角 $\theta \geq \pi/2$ (见图5.1).




图 5.1

证明 存在性. 我们对存在性给出下述两种证明:

1. 函数 $\varphi(v) = |f - v|$ 是凸函数, φ 连续, 且 $\lim_{|v| \rightarrow \infty} \varphi(v) = +\infty$. 因此由 H 的自反性与自反空间下半连续凸函数的最小值3.6知 φ 在 K 上可以达到最小值.
2. 第二种证明不依赖于自反理论与一致凸空间, 该证明是直接进行的. 设 $\{v_n\}$ 是(5.2)式的最小化序列, 即 $v_n \in K$ 且

$$d_n = |f - v_n| \rightarrow d = \inf_{v \in K} |f - v|.$$

下面说明 $\{v_n\}$ 是基本列. 事实上, 对 $a = f - v_n, b = f - v_m$ 应用平行四边形法则可得

$$\left| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right|^2 + \left| \frac{v_n - v_m}{2} \right|^2 = \frac{1}{2}(d_n^2 + d_m^2).$$

因为 K 是凸的, 故 $(v_n + v_m)/2 \in K$, 因此 $|f - (v_n + v_m)/2| \geq d$, 于是

$$\left| \frac{v_n - v_m}{2} \right|^2 \leq \frac{1}{2}(d_n^2 + d_m^2) - d^2 \Rightarrow \lim_{m, n \rightarrow \infty} |v_n - v_m| = 0.$$

因此序列 $\{v_n\}$ 收敛到 $u \in K$, 且 $d = |f - u|$.

(5.2), (5.3)的等价. 设 $u \in K$ 满足(5.2)式, 记 $w \in K$, 根据 K 的凸性知

$$v = (1 - t)u + tw \in K, \quad \forall t \in [0, 1]$$

因此

$$|f - u| \leq |f - [(1 - t)u + tw]| = |(f - u) - t(w - u)|.$$

于是

$$|f - u|^2 \leq |f - u|^2 - 2t(f - u, w - u) + t^2|w - u|^2,$$

这说明 $2(f - u, w - u) \leq t|w - u|^2 (\forall t \in (0, 1])$, 令 $t \rightarrow 0$ 即得(5.3)式.

反之, 设 u 满足(5.3)式, 知

$$|u - f|^2 - |v - f|^2 = 2(f - u, v - u) - |u - v|^2 \leq 0, \quad \forall v \in K$$

此即(5.2)式.

唯一性. 设 u_1, u_2 满足(5.3)式, 则

$$(f - u_1, v - u_1) \leq 0, \quad \forall v \in K \quad (5.4)$$

$$(f - u_2, v - u_2) \leq 0, \quad \forall v \in K \quad (5.5)$$

在(5.4)式中取 $v = u_2$, 在(5.5)式中取 $v = u_1$ 并将得到的不等式相加即得 $|u_1 - u_2|^2 \leq 0$. $\square$

注 5.2 不难发现最小化问题总是会和不等式组联系起来. 这里回忆一个广为人知的例子. 设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, $u \in [0, 1]$ 是 F 在 $[0, 1]$ 上的最小值点, 则要么 $u \in (0, 1)$ 且 $F'(u) = 0$, 要么 $u = 0, F'(u) \geq 0$, 要么 $u = 1, F'(u) \leq 0$, 这三种情况都能划归为 $u \in [0, 1]$ 满足 $F'(u)(v - u) \geq 0 (\forall v \in [0, 1])$.

注 5.3 定理5.1的结论对一致凸 Banach 空间也成立. 也就是说, 设 $K \subset E$ 是非空闭凸集, 其中 E 是一致凸 Banach 空间, 则对每个 $f \in E$ 而言存在唯一 $u \in E$ 使得

$$\|f - u\| = \min_{v \in K} \|f - v\| = \text{dist}(f, K).$$

命题 5.2

设 $K \subset H$ 是非空闭凸集, 则 P_K 不可能增加距离, 即

$$|P_K f_1 - P_K f_2| \leq |f_1 - f_2|, \quad \forall f_1, f_2 \in H.$$

证明 设 $u_1 = P_K f_1, u_2 = P_K f_2$, 则

$$(f_1 - u_1, v - u_1) \leq 0, \quad \forall v \in K \quad (5.6)$$

$$(f_2 - u_2, v - u_2) \leq 0, \quad \forall v \in K \quad (5.7)$$

在(5.6)式中代入 $v = u_2$, 在(5.7)式中代入 $v = u_1$, 将得到的不等式相加可知

$$|u_1 - u_2|^2 \leq (f_1 - f_2, u_1 - u_2).$$

故 $|u_1 - u_2| \leq |f_1 - f_2|$. $\square$

推论 5.1 (正交投影定理)

设 $M \subset H$ 是闭线性子空间, 若 $f \in H$, 则 $u = P_M f$ 能被刻画为

$$u \in M, \quad (f - u, v) = 0, \quad \forall v \in M. \quad (5.8)$$

进一步, P_M 是线性算子, 称之为正交投影.

证明 由(5.3)式知

$$(f - u, v - u) \leq 0, \quad \forall v \in M$$

因此

$$(f - u, tv - u) \leq 0, \quad \forall v \in M, \forall t \in \mathbb{R}$$

由此即得(5.8)式.

反之, 若 u 满足(5.8)式, 则

$$(f - u, v - u) = 0, \quad \forall v \in M$$

由(5.3)式即知 $u = P_M f$, 另外由此显见 P_M 是线性的. $\square$

5.2 Hilbert 空间的对偶空间

在 Hilbert 空间中, 连续线性泛函的形式非常简单. 任取 $f \in H$, 则映射 $u \mapsto (f, u)$ 就是 H 上的连续线性泛函. Hilbert 空间中的一个重要结论就在于其上的全体连续线性泛函都是这种形式:

定理 5.2 (Riesz-Frechet 表示定理)

对任意给定的 $\varphi \in H^*$, 总存在唯一 $f \in H$ 使得

$$\langle \varphi, u \rangle = (f, u), \quad \forall u \in H$$

且

$$|f| = \|\varphi\|_{H^*}.$$



证明 我们给出两种证明:

1. 第一个证明和 Riesz 表示定理 4.11 的证明基本完全一样. 考虑依照下述方法定义的映射 $T: H \rightarrow H^*$: 对任意给定的 $f \in H$, 映射 $u \mapsto (f, u)$ 是 H 上的连续线性泛函, 因此该映射是 H^* 中的元素, 记之为 Tf , 即

$$\langle Tf, u \rangle = (f, u), \quad \forall u \in H.$$

显见 $\|Tf\|_{H^*} = |f|$, 故 T 是 H 到 $T(H)$ 上的线性等距同构, 且 $T(H)$ 是 H^* 的一个闭子空间. 为说明 $T(H) = H^*$, 只需说明 $T(H)$ 在 H^* 中稠密, 为此考虑推论 2.4, 设 h 是 H^* 上的连续线性泛函, 且 h 在 $T(H)$ 上为零. 因为 H 自反, 故 $h \in H$, 于是 $\langle h, Tf \rangle = \langle Tf, h \rangle = 0 (\forall f \in H)$. 这说明 $(f, h) = 0 (\forall f \in H)$, 因此只能有 $h = 0$.

2. 第二个证明更直接, 它绕开了 H 的自反性. 设 $M = \varphi^{-1}(\{0\})$, 则 M 是 H 的闭子空间, 不妨设 $M \neq H$ (否则 $\varphi \equiv 0$, 定理 5.2 的结论此时显然成立). 我们断言存在 $g \in H$ 使得

$$|g| = 1, \quad (g, v) = 0, \quad \forall v \in M \text{ (因此 } g \notin M).$$

事实上, 取 $g_0 \in H$ 满足 $g_0 \notin M$, 令 $g_1 = P_M g_0$, 则

$$g = \frac{g_0 - g_1}{|g_0 - g_1|}$$

就满足我们需要的性质.

现在任意取定 $u \in H$, 记

$$v = u - \lambda g, \quad \lambda = \frac{\langle \varphi, u \rangle}{\langle \varphi, g \rangle}.$$

因为 $g \notin M$, 故 $\langle \varphi, g \rangle \neq 0$, 因此 v 良定义. 又因为 $\langle \varphi, v \rangle = 0$, 故 $v \in M$, 从而 $(g, v) = 0$, 亦即

$$\langle \varphi, u \rangle = \langle \varphi, g \rangle (g, u), \quad \forall u \in H$$

取 $f = \langle \varphi, g \rangle g$ 即可. □

注 5.4 H 与 H^* 是否可以等同? Riesz-Frechet 表示定理 5.2 断言存在 H 到 H^* 上的典则等距同构, 因此把 H 和 H^* 等同的这个想法看似是“符合逻辑”的. 我们经常会这么干, 但不总是如此. 下面我们给出一个典型例子. 设 H 是赋内积 $(\cdot, \cdot)$ 与对应范数 $|\cdot|$ 的 Hilbert 空间, $V \subset H$ 是在 H 中稠密的线性子空间. 设 V 自身有范数 $\|\cdot\|$, 且 V 关于范数 $\|\cdot\|$ 成为 Banach 空间. 设包含映射 $V \subset H$ 是连续的, 即

$$|v| \leq C\|v\|, \quad \forall v \in V.$$

(例如取 $H = L^2(0, 1)$, $V = L^p(0, 1) (p > 2)$ 或 $V = C[0, 1]$.)

通过把 H 上的连续线性泛函 φ 限制在 V 上即可得到典则映射 $T: H^* \rightarrow V^*$, 即

$$\langle T\varphi, v \rangle_{V^*, V} = \langle \varphi, v \rangle_{H^*, H}.$$

显见 T 有下述性质:

- (i) $\|T\varphi\|_{V^*} \leq C|\varphi|_{H^*} (\forall \varphi \in H^*)$,
- (ii) T 是单射,
- (iii) 若 V 自反, 则 $R(T)$ 在 V^* 中稠密¹.

现在如果把 H^* 和 H 等同, 把 T 看成 H^* 到 V^* 的典则嵌入, 则

$$V \subset H \simeq H^* \subset V^*, \quad (5.9)$$

其中出现的所有包含映射都连续, 且若 V 自反, 则这些包含映射还稠密. 此时称 H 为**基准空间 (pivot space)**. 注意

¹不过 T 一般不是满射.

到此时只要序偶 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{V^*, V}$ 与内积 $(\cdot, \cdot)$ 均有意义, 那它们就是相同的, 即

$$\langle f, v \rangle_{V^*, V} = (f, v), \quad \forall f \in H, \forall v \in V.$$

然而, 当 V 成为 Hilbert 空间, 其上赋有它本身的内积 $((\cdot, \cdot))$ 与该内积诱导的范数 $\|\cdot\|$ 时, 情况就更复杂了. 此时我们当然可以通过 $((\cdot, \cdot))$ 把 V 和 V^* 等同起来, 但因为一般来说 $V \neq H$, 故此时(5.9)式不能再成立了. 这说明我们不能同时把 V, H 与它们的对偶空间等同: 我们必须做一个取舍. 通常的习惯是等同 H^* 与 H , 让(5.9)式成立, 而不把 V^* 和 V 等同起来. (此时从 V 到 V^* 上当然依旧还有等距映射, 但此时我们不把它看成恒同映射.) 参见下例:

记

$$H = l^2 = \left\{ u = \{u_n\}_{n \geq 1} : \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 < \infty \right\}$$

其上赋内积 $(u, v) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$. 记

$$V = \left\{ u = \{u_n\}_{n \geq 1} : \sum_{n=1}^{\infty} n^2 u_n^2 < \infty \right\}$$

其上赋内积 $((u, v)) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 u_n v_n$.

显见包含映射 $V \subset H$ 是连续单射, 且 V 在 H 中稠密. 当我们等同 H^* 和 H 时, V^* 就等同于下述空间

$$V^* = \left\{ f = \{f_n\}_{n \geq 1} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} f_n^2 < \infty \right\},$$

该空间严格大于 H . 序偶 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{V^*, V}$ 此时为

$$\langle f, v \rangle_{V^*, V} = \sum_{n=1}^{\infty} f_n v_n,$$

而 Riesz-Frechet 同构 $T: V \rightarrow V^*$ 此时为

$$u = \{u_n\}_{n \geq 1} \mapsto Tu = \{n^2 u_n\}_{n \geq 1}.$$

这显然不再是恒同算子.

注 5.5 绕过一致凸空间理论也可以很容易地说明 Hilbert 空间自反, 用两次 Riesz-Frechet 同构即可 (从 H 到 H^* 上, 再从 H^* 到 H^{**} 上).

注 5.6 设 H 是与其对偶空间 H^* 等同的 Hilbert 空间, M 是 H 的子空间. 前面我们定义过作为 H^* 子空间的空间 $M^\perp$. 因为 H^* 和 H 恒同, 故此时 $M^\perp$ 可以看成 H 的子空间, 即

$$M^\perp = \{u \in H : (u, v) = 0, \forall v \in M\}.$$

显见 $M \cap M^\perp = \{0\}$. 另若 M 是闭子空间, 则 $M + M^\perp = H$. 这是因为每个 $f \in H$ 都能写成

$$f = (P_M f) + (f - P_M f)$$

可以验证 $f - P_M f \in M^\perp$, 且 $f - P_M f = P_{M^\perp} f$. 由此可知 Hilbert 空间中的任何闭子空间都有余子空间.

5.3 Stampacchia 定理与 Lax-Milgram 定理

定义 5.3

对双线性型 $a: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ 而言:

(i) 若存在常数 C 使得

$$|a(u, v)| \leq C|u||v|, \quad \forall u, v \in H$$

就称 a 连续.

(ii) 若存在常数 $\alpha > 0$ 使得

$$a(v, v) \geq \alpha|v|^2, \quad \forall v \in H$$

就称 a 强正 (coercive).



定理 5.3 (Stampacchia)

设 $a(u, v)$ 是 H 上的连续强正双线性型, $K \subset H$ 是非空闭凸子集, 则对任意给定的 $\varphi \in H^*$, 均存在唯一 $u \in K$ 使得

$$a(u, v - u) \geq \langle \varphi, v - u \rangle, \quad \forall v \in K. \quad (5.10)$$

另若 a 对称, 则 u 能被下述性质刻画:

$$u \in K, \text{ 且 } \frac{1}{2}a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \min_{v \in K} \left\{ \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\}. \quad (5.11)$$



Stampacchia 定理的证明依赖于下述非常经典的结果:

定理 5.4 (Banach 不动点定理-压缩映射原理)

设 X 是非空完备度量空间, $S: X \rightarrow X$ 是严格压缩映射, 即

$$d(Sv_1, Sv_2) \leq kd(v_1, v_2), \quad k < 1, \forall v_1, v_2 \in X$$

则 S 有唯一不动点 u (即 $u = Su$).



下面证明 Stampacchia 定理.

证明 对于(5.10)右式而言, 根据 Riesz-Frechet 表示定理 5.2 知存在唯一 $f \in H$ 使得

$$\langle \varphi, v \rangle = (f, v), \quad \forall v \in H.$$

对于(5.10)左式, 如果固定 $u \in H$, 则映射 $v \mapsto a(u, v)$ 是 H 上的连续线性泛函, 再次应用 Riesz-Frechet 表示定理知在 H 中存在唯一元素 (记之为 Au) 满足 $a(u, v) = (Au, v) (\forall v \in H)$. 显见 A 是 $H \rightarrow H$ 的线性算子, 且其满足:

$$|Au| \leq C|u|, \quad \forall u \in H, \quad (5.12)$$

$$(Au, u) \geq \alpha|u|^2, \quad \forall u \in H. \quad (5.13)$$

因此(5.10)式归结为找到 $u \in K$ 使得

$$(Au, v - u) \geq (f, v - u), \quad \forall v \in K. \quad (5.14)$$

设 $\rho > 0$ 是待定常数, 注意到(5.14)式等价于

$$(\rho f - \rho Au + u - u, v - u) \leq 0, \quad \forall v \in K, \quad (5.15)$$

这说明

$$u = P_K(\rho f - \rho Au + u).$$

现对每个 $v \in K$, 记 $Sv = P_K(\rho f - \rho Au + v)$. 我们下面说明当 $\rho > 0$ 取合适值时 S 是严格压缩映射. 事实上, 因为 P_K 不增加距离 (命题 5.2), 故

$$|Sv_1 - Sv_2| \leq |(v_1 - v_2) - \rho(Av_1 - Av_2)|$$

因此

$$\begin{aligned} |Sv_1 - Sv_2|^2 &= |v_1 - v_2|^2 - 2\rho(Av_1 - Av_2, v_1 - v_2) + \rho^2|Av_1 - Av_2|^2 \\ &\leq |v_1 - v_2|^2(1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2). \end{aligned}$$

取 $\rho > 0$ 满足 $k^2 = 1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2 < 1$ (即 $0 < \rho < 2\alpha/C^2$) 即知 S 有唯一不动点.

现设 $a(u, v)$ 对称, 则 $a(u, v)$ 定义了 H 上的一个新内积, 由其连续性与强正性知该内积对应的范数 $a(u, u)^{\frac{1}{2}}$ 与原来的范数 $|u|$ 等价, 因此 H 在这个新内积下依旧是 Hilbert 空间. 根据 Riesz-Frechet 表示定理, 我们可以在新

内积下表示泛函 φ , 即存在唯一 $g \in H$ 使得

$$\langle \varphi, v \rangle = a(g, v), \quad \forall v \in H.$$

此时(5.10)式归结为找到 $u \in K$ 使得

$$a(g - u, v - u) \leq 0, \quad \forall v \in K. \quad (5.16)$$

然而(5.16)式的解已经是个老朋友了: u 就是 g 在新内积 a 下到 K 上的投影. 根据定理5.1, u 是 K 中唯一一个让 $a(g - v, g - v)^{\frac{1}{2}} (v \in K)$ 达到最小值的元素. 也就是说, 它是函数

$$v \mapsto a(g - v, g - v) = a(v, v) - 2a(g, v) + a(g, g) = a(v, v) - 2\langle \varphi, v \rangle + a(g, g)$$

在 K 上的最小值点, 该最小值点等价于函数

$$v \mapsto \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle$$

的最小值点. □

注 5.7 容易说明若 $a(u, v)$ 作为双线性型同时还满足

$$a(v, v) \geq 0, \quad \forall v \in H$$

那么函数 $v \mapsto a(v, v)$ 就是凸的.

推论 5.2 (Lax-Milgram)

设 $a(u, v)$ 是 H 上的连续强正双线性型, 则对任意给定的 $\varphi \in H^*$, 均存在唯一 $u \in H$ 使得

$$a(u, v) = \langle \varphi, v \rangle, \quad \forall v \in H. \quad (5.17)$$

另若 a 对称, 则 u 能被下述性质刻画:

$$u \in H, \text{ 且 } \frac{1}{2}a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \min_{v \in H} \left\{ \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\}. \quad (5.18)$$

证明 在 Stampacchia 定理5.3中代入 $K = H$ 并用与正交投影定理5.1相同的证明方法即可. □

注 5.8 Lax-Milgram 定理是一个解线性椭圆 PDEs 的非常简单且有效的方法. 特别注意方程(5.17)与最小化问题(5.18)之间的联系. 当这类问题出现在力学或物理学中时, 它们通常都有一个自然的对应量: 最小作用量, 能量最小化等等. 在变分法中, 我们通常称(5.17)式是与最小化问题(5.18)关联的 Euler 方程. 简单来说, (5.17)式表明“ $F'(u) = 0$ ”, 其中 F 是函数 $F(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle$.

注 5.9 方程(5.17)解的存在唯一性有一个直接的初等证法. 此即说明

$$\forall f \in H \exists! u \in H (Au = f). \quad (5.19)$$

也就是说 A 是 H 到 H 上的双射. 这通过下述步骤即可实现:

- (a) A 是单射 (因为 A 强正),
- (b) $R(A)$ 是闭集, 因为 $\alpha|v| \leq |Av| (\forall v \in H)$ (这是强正性的一个结论),
- (c) $R(A)$ 在 H 中稠密, 这是因为若 $v \in H$ 满足

$$(Au, v) = 0, \quad \forall u \in H$$

则 $v = 0$.

5.4 Hilbert 和, 正交基

定义 5.4 (Hilbert 和 (Hilbert sum))

设 $\{E_n\}_{n \geq 1}$ 是 H 中的闭子空间列. 若 E_n 满足

(i) E_n 两两正交, 即

$$(u, v) = 0, \quad \forall u \in E_n, \forall v \in E_m, m \neq n,$$

(ii) $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 张成的线性空间^a在 H 中稠密,

则称 H 是 E_n 的 Hilbert 和, 记之为 $H = \bigoplus_n E_n$.

^a这里“张成”理解成代数意义下的, 即由 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 中元素的有限线性组合构成的空间.



定理 5.5

设 H 是 E_n 的 Hilbert 和, 给定 $u \in H$, 记

$$u_n = P_{E_n} u, \quad S_n = \sum_{k=1}^n u_k,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = u, \quad (5.20)$$

且有 Bessel-Parseval 等式成立:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|^2 = |u|^2. \quad (5.21)$$



为证上述定理, 我们首先需要下述引理:

引理 5.1

设 $\{v_n\} \subset H$ 满足

$$(v_m, v_n) = 0, \quad \forall m \neq n \quad (5.22)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_k|^2 < \infty. \quad (5.23)$$

记

$$S_n = \sum_{k=1}^n v_k,$$

则

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ 存在}$$

且

$$|S|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |v_k|^2. \quad (5.24)$$



下面证明引理 5.1.

证明 当 $m > n$ 时有

$$|S_m - S_n|^2 = \sum_{k=n+1}^m |v_k|^2.$$

由 (5.23) 式知 S_n 是基本列, 因此 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在. 进一步, 根据 (5.22) 式知

$$|S_n|^2 = \sum_{k=1}^n |v_k|^2$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得(5.24)式. □

下面证明定理5.5.

证明 因为 $u_n = P_{E_n}u$, 由正交投影定理5.1可知

$$(u - u_n, v) = 0, \quad \forall v \in E_n \quad (5.25)$$

特别有

$$(u, u_n) = |u_n|^2.$$

将上式对 n 求和可得

$$(u, S_n) = \sum_{k=1}^n |u_k|^2.$$

但另一方面有

$$\sum_{k=1}^n |u_k|^2 = |S_n|^2, \quad (5.26)$$

因此

$$(u, S_n) = |S_n|^2.$$

故 $|S_n| \leq |u|$, 从而 $\sum_{k=1}^n |u_k|^2 \leq |u|^2$.

现在应用引理5.1即知 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在. 实际上, 就算我们没有 Hilbert 和的条件 (ii), 在这里也可以确定 S . 如果设 F 是 $\{E_n\}$ 张成的线性空间, 我们断言

$$S = P_{\overline{F}}u. \quad (5.27)$$

事实上, 根据正交性条件 (i) 与正交投影定理知

$$(u - S_n, v) = 0, \quad \forall v \in E_m, m \leq n$$

令 $n \rightarrow \infty$ 知

$$(u - S, v) = 0, \quad \forall v \in E_m, \forall m$$

因此

$$(u - S, v) = 0, \quad \forall v \in F,$$

根据内积的连续性知

$$(u - S, v) = 0, \quad \forall v \in \overline{F}.$$

另一方面显见 $S_n \in F(\forall n)$, 因此 $S \in \overline{F}$, 利用正交投影定理即得(5.27)式. 当然, 如果加上条件 (ii), 则 $\overline{F} = H$, 因此 $S = u$, 在(5.26)式中令 $n \rightarrow \infty$ 即得(5.21)式. □

定义 5.5 (标准正交基 (orthonormal basis))

若 H 中的序列 $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 满足:

(i) $|e_n| = 1(\forall n)$ 且 $(e_m, e_n) = 0(\forall m \neq n)$,

(ii) $\{e_n\}$ 张成的线性空间在 H 中稠密,

就称 $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 是 H 中的一组标准正交基 (或 Hilbert 基^a, 在无歧义时简称为基)^b.

^a注意不要把这个概念和代数基 (即 Hamel 基) 弄混了, 后者指的是 H 中的元素族 $\{e_i\}_{i \in I}$, 其中每个 $u \in H$ 都能唯一表成 e_i 的有限线性组合.

^b有的作者会把 $\{e_n\}$ 称为完备正交基.



推论 5.3

设 $\{e_n\}$ 是标准正交基, 则对每个 $u \in H$ 有

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} (u, e_k) e_k, \text{ 即 } u = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (u, e_k) e_k$$

且

$$|u|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(u, e_k)|^2.$$

反之, 对任意给定的 $\{\alpha_n\} \in l^2$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k$ 总能收敛到 H 中的某元素 u , 使得 $(u, e_k) = \alpha_k (\forall k)$, 且 $|u|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2$.



证明 注意到 H 是空间 $E_n = \mathbb{R}e_n$ 的 Hilbert 和, $P_{E_n} u = (u, e_n) e_n$, 由定理 5.5 与引理 5.1 即得结论. $\square$

注 5.10 一般来说, 定理 5.5 中的级数 $\sum u_k$ 与推论 5.3 中的级数 $\sum (u, e_k) e_k$ 并不绝对收敛. 也就是说, 可能出现 $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k| = \infty$ 或 $\sum_{k=1}^{\infty} |(u, e_k)| = \infty$ 的情况.

定理 5.6 (标准正交基的存在性)

每个可分 Hilbert 空间都有标准正交基.



证明 设 $\{v_n\}$ 是 H 的可数稠密子集, 记 F_k 为 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 张成的线性空间, 则集列 $\{F_k\}$ 是有限维空间的不降列, 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ 在 H 中稠密. 任取 F_1 中的单位向量 e_1 , 若 $F_2 \neq F_1$, 则在 F_2 中存在向量 e_2 使得 $\{e_1, e_2\}$ 是 F_2 的标准正交基. 重复这一构造即得 H 上的标准正交基. $\square$

注 5.11 将定理 5.6 与推论 5.3 结合可知每个可分 Hilbert 空间都与 l^2 等距同构. 尽管这一结果非常惊人, 其它 Hilbert 空间 (比如 $L^2(\Omega)$, Sobolev 空间 $H^1(\Omega)$ 等等) 也是很重要的. 这是因为很多漂亮的线性 (或非线性) 算子在用基表示的时候可能看起来很恐怖.

注 5.12 如果 H 是不可分 Hilbert 空间 (这个情况不那么常见), 则可以 (用 Zorn 引理) 证明其上存在不可数标准正交基 $\{e_i\}_{i \in I}$.

第二部分

算子谱论

第六章 紧算子的谱理论

本章选自 [19], 作为杨大春老师开设的研究生课程泛函分析的课程笔记.

课堂笔记 (2024.9.10)

泛函分析就是无穷维空间上的分析 (或称为无穷维空间上的数学分析与高等代数).

- (i) 起源 (背景): 数学与物理中的具体分析问题.
- (ii) 研究方法: 具体的分析问题 $\xrightarrow{\text{抽象}}$ (具有拓扑 (度量) 和代数结构的) 空间上的分析问题.
- (iii) 现状: 内容丰富, 应用广泛, 数学工作者必须的.

6.1 有界线性算子的谱

约定 $\mathbb{N}_+ = \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{C}$ 表示全体复数. 设 X, Y 为赋范线性空间, 用 $L(X, Y)$ 表示 $X \rightarrow Y$ 的有界线性算子全体. 另对每个 $T \in L(X, Y)$, 用 $\|T\|_{X \rightarrow Y}$ 表示 T 在 $L(X, Y)$ 中的范数 (亦即 T 的算子范数). 特别地, 若 $X = Y$, 则记 $L(X) := L(X, X)$, 用 $\|T\|_{X \rightarrow X}$ 表示 $T \in L(X)$ 的算子范数.

定义 6.1 (闭算子 (closed operator))

设 $A: D(A) \subset X \rightarrow Y$ 是线性算子, $D(A) \subset X$ 是 A 的定义域. 称 A 是闭算子, 如果

$$\begin{cases} \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A) \\ n \rightarrow \infty \text{ 时有 } x_n \rightarrow x, Ax_n \rightarrow y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in D(A) \\ y = Ax \end{cases}$$

由闭算子的定义易知, 若算子 $A: D(A) \subset X \rightarrow X$ 是闭算子, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 而言, 算子 $\lambda I - A$ 依旧是闭算子, 其中 I 是恒同算子. 另外若¹ $A \in L(X)$, 那么 A 是闭算子². 这是因为任取 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_+} \subset X$ 与 $x, y \in X$, 设 $x_n \rightarrow x, Ax_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 因为 $D(A) = X$ 且 A 连续, 故 $x \in X = D(A), Ax = y$, 因此 A 是闭算子.

关于闭算子, 需要回忆一下闭图像定理:

定理 6.1 (闭图像定理)

设 X, Y 为 Banach 空间, 若 $A: D(A) \subset X \rightarrow Y$ 是闭线性算子, 且 $D(A)$ 是 X 中的闭集, 那么 A 是有界线性算子.

注 6.1 关于闭算子还需要强调下述注记:

- (i) 若 X, Y 是 Banach 空间, $A: D(A) \subset X \rightarrow Y$ 是线性算子, 则在 $D(A)$ 闭的时候由闭图像定理可知 A 是闭算子 $\Leftrightarrow A$ 是 $D(A) \rightarrow Y$ 的有界算子³. 具体来说, 若 A 是闭算子, 由闭图像定理知 A 是有界算子. 若 A 是有界算子, 设 $x, y \in X, \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_+} \subset D(A)$ 满足 $x_n \rightarrow x, Ax_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 根据闭性知 $x \in D(A)$, 于是由有界性所等价的连续性知 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = A(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = Ax$, 因此 A 是闭算子.
- (ii) 令⁴ $X = C[0, 1]$, 且对任意 $u \in C[0, 1]$ 令

$$\|u\|_{C[0,1]} := \max_{t \in [0,1]} |u(t)|.$$

再令 $A: D(A) \subset X \rightarrow X, u \mapsto \frac{du}{dt}$, 其中 $D(A) = C^1[0, 1]$, 则 A 是闭算子, 但 A 不是有界算子. 对于 A 是闭算子, 任取 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}_+} \in C^1[0, 1]$ 与 $x, y \in C[0, 1]$ 满足 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 在 $C[0, 1]$ 意义下成立,

¹注意: $A \in L(X, Y)$ 这句话默认了 $D(A) = X$.

²注意这里其实不需要 X 是 Banach 空间, 这是因为在取点的时候只能在 X 内取, 而 $D(A) = X$, 故 $x \in D(A)$ 这一条其实是自动成立了.

³也就是说闭线性算子之所以没法直接成为连续线性算子, 是因为其定义域未必闭. 这句话同时暗示了连续线性算子的定义域必定闭, 实际上从定义出发没法看出这件事, 只是因为连续线性算子的定义域总能延拓为其闭包, 故之后就这么默认了.

⁴注意这里背景空间是 $[0, 1]$, 实际上想要顺利地定义一致范数, 必须要背景空间是紧集.

$Ax_n \rightarrow y(n \rightarrow \infty)$ 在 $C[0, 1]$ 意义下成立, 则 $n \rightarrow \infty$ 时对任意 $t \in [0, 1]$ 有

$$x_n(t) - x_n(0) = \int_0^t x'_n(\tau) d\tau \rightarrow \int_0^t y(\tau) d\tau,$$

且 $x_n(t) - x_n(0) \rightarrow x(t) - x(0)$. 故对任意 $t \in [0, 1]$ 有

$$x(t) - x(0) = \int_0^t y(\tau) d\tau.$$

因此 $x \in C^1[0, 1]$, $x' = y$, 即 $x \in D(A)$, $Ax = y$, 故 A 是闭算子.

下面说明 A 不是有界算子, 为此对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$ 与 $\forall t \in [0, 1]$, 令 $u_n(t) = \sin(n\pi t)$, 则 $u_n \in C^1[0, 1]$, $\|u_n\|_{C[0, 1]} = 1$. 但

$$\|Au_n\|_{C[0, 1]} = \max_{t \in [0, 1]} |n\pi \cos(n\pi t)| = n\pi.$$

因此

$$\begin{aligned} \|A\|_{C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1]} &= \sup_{\|u\|_{C[0, 1]}=1} \|Au\|_{C[0, 1]} \geq \sup_{n \in \mathbb{N}_+} \|Au_n\|_{C[0, 1]} \\ &= \sup_{n \in \mathbb{N}_+} (n\pi) = \infty. \end{aligned}$$

故 A 不是有界算子. □

注 6.2 需要注意: 上面证明了存在不是有界算子的闭算子, 但不会与闭图像定理矛盾, 这是因为上面提到的 $D(A) = C^1[0, 1]$ 并非 $C[0, 1]$ 的闭子集. 事实上, $\overline{D(A)}^{C[0, 1]} = C[0, 1]$, 为此显见 $\overline{D(A)}^{C[0, 1]} \subset C[0, 1]$, 下证 $\overline{D(A)}^{C[0, 1]} \supset C[0, 1]$. 任取 $f \in C[0, 1]$, 由 Weierstrass 逼近定理知存在 $\mathbb{R}$ 上的多项式列 $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}_+}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛到 f , 即 $\max_{t \in [0, 1]} |P_n(t) - f(t)| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 此即 $\|P_n - f\|_{C[0, 1]} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 又 $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}_+} \subset D(A)$, 故 $f \in \overline{D(A)}^{C[0, 1]}$, 即 $\overline{D(A)}^{C[0, 1]} \supset C[0, 1]$.

- (iii) 如果把 (ii) 的设置稍作改动, 对 $\forall u \in C^1[0, 1]$ 令 $\|u\|_{C^1[0, 1]} := \max\{\|u\|_{C[0, 1]}, \|u'\|_{C[0, 1]}\}$. 若视 $T := \frac{d}{dt} : C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, 则 T 成为有界算子. 这是因为此时对 $\forall u \in C^1[0, 1]$ 有 $\|Tu\|_{C[0, 1]} = \|u'\|_{C[0, 1]} \leq \|u\|_{C^1[0, 1]}$.

注 6.3 前注 (ii) 中的例子实际上就是靠闭线性算子定义域未必闭做出来的. 特别在该例中正是因为 $A := d/dt$ 定义域的 $C^1[0, 1]$ 仅在 $C[0, 1]$ 中稠而不闭, 故只要 $C^1[0, 1]$ 中的序列 $\{f_n\}$ 满足 $\|f_n\|_{C[0, 1]}$ 一致有界, 且 $\|f_n\|_{C^1[0, 1]} \rightarrow \infty$, 就能依 $C^1[0, 1]$ 范数的定义直接说明 $\|Af_n\|_{C[0, 1]} \rightarrow \infty$. 仿照这个思路, 如果取⁵ $u_n = -1/(n(x-1)-1) + 2$, 同样可以说明 $\|Au_n\|_{C[0, 1]} \rightarrow \infty$.

现在考虑非平凡⁶复 Banach 空间 X 与闭线性算子 $A : D(A) \subset X \rightarrow X$. 若存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 和 $x_0 \in D(A) \setminus \{0_X\}$ 使得

$$Ax_0 = \lambda x_0,$$

则称 λ 为 A 的本征值 (eigenvalue), 称 x_0 为 λ 的本征元 (eigenvector).

定义 6.2 (预解集, 正则值 (resolvent set, regular value))

设 X 是复 Banach 空间, $A : D(A) \subset X \rightarrow X$ 是闭线性算子, I 是 X 上的恒同算子. 称集合

$$\rho(A) := \{\lambda \in \mathbb{C} : (\lambda I - A)^{-1} \in L(X)\}$$

为 A 的预解集, $\rho(A)$ 中的元素 λ 称为 A 的正则值.



当 $\dim X < \infty$ ($\dim X$ 表示 X 的维数) 时, $A \in L(X)$ 必是矩阵, 因而由线性代数理论知 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的选取只有下述两种可能:

⁵这个函数的构造思路在于首先需要 $[0, 1]$ 上一致有界的函数族 $\{f_n\}$ (以保证 $\|f_n\|_{C[0, 1]}$ 一致有界), 且希望 $\{f'_n\}$ 在 $x = 1$ 处爆掉. 一个自然的想法是考虑从 $x = 1$ 右侧逐渐靠近 1 的铅直渐近线, 于是可以考虑形如 $f_n(x) = a/(x-1-1/n) + c$ 的函数, 设置一下 $f_n(1)$ 的值即可.

⁶这里的非平凡指的是 $X \supsetneq \{0_X\}$, 其中 0_X 是 X 的零元.

- (i) 要么 λ 是 A 的本征值;
(ii) 要么 $(\lambda I - A)^{-1}$ 是一个矩阵, 亦即 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$, 此时 λ 是 A 的正则值.

课堂笔记 (2024.9.10)

- 只会存在两种可能是因为在 $\dim X < \infty, \lambda \in \mathbb{C}$ 时, 要么 $|\lambda I - A| = 0$, 要么 $|\lambda I - A| \neq 0$. 若 $|\lambda I - A| = 0$, 则 $\exists x_0 \in X \setminus \{0_X\}$ s.t. $(\lambda I - A)x_0 = 0_X$, 因此 λ 是本征值. 而若 $|\lambda I - A| \neq 0$, 则 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 因此 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$, 故 λ 是正则值.
- 有限维线性赋范空间上的线性算子完全由一个矩阵确定且必有界. 简便起见, 设 X 是 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 上的线性赋范空间, $\dim X = 2, \{e_1, e_2\}$ 为 X 的基. 设 $A: X \rightarrow X$ 是线性算子, 则 $Ae_1 \in X, Ae_2 \in X$, 因此存在 $\{a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}\} \subset \mathbb{K}$ 使得

$$\begin{cases} Ae_1 = a_{11}e_1 + a_{12}e_2 \\ Ae_2 = a_{21}e_1 + a_{22}e_2. \end{cases}$$

现任取 $x \in X$, 则存在 $\{x_1, x_2\} \subset \mathbb{K}$ 使得 $x = x_1e_1 + x_2e_2$, 因此由 A 的线性性知

$$\begin{aligned} Ax &= x_1Ae_1 + x_2Ae_2 \\ &= x_1a_{11}e_1 + x_1a_{12}e_2 + x_2a_{21}e_1 + x_2a_{22}e_2 \\ &= (x_1a_{11} + x_2a_{21})e_1 + (x_1a_{12} + x_2a_{22})e_2 \\ &= (x_1a_{11} + x_2a_{21}, x_1a_{12} + x_2a_{22}) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, A 完全由矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

确定.

下面说明 A 有界. 为此, 利用范数等价定理 2.9 知对 $\forall x \in X$ 有

$$\|x\| \sim \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2}.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式可知对 $\forall x \in X$ 有

$$\begin{aligned} \|Ax\| &\sim \sqrt{|x_1a_{11} + x_2a_{21}|^2 + |x_1a_{12} + x_2a_{22}|^2} \\ &\leq \sqrt{(|x_1|^2 + |x_2|^2)(|a_{11}|^2 + |a_{21}|^2 + |a_{12}|^2 + |a_{22}|^2)} \end{aligned}$$

由此, 进一步有

$$\begin{aligned} \|A\|_{X \rightarrow X} &:= \sup_{x \neq 0_X} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \\ &\sim \sup_{x \neq 0_X} \frac{\sqrt{|x_1a_{11} + x_2a_{21}|^2 + |x_1a_{12} + x_2a_{22}|^2}}{\sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2}} \\ &\leq \sqrt{|a_{11}|^2 + |a_{21}|^2 + |a_{12}|^2 + |a_{22}|^2} < \infty. \end{aligned}$$

故 A 有界.

- 特别地, 若 A 为 $\mathbb{R}$ 上的线性算子, 则对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有

$$Ax = A(x1) = xA(1).$$

因此 A 完全由 $A(1)$ (这是一个 1×1 方阵) 决定, 且

$$\|A\|_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}} := \sup_{x \neq 0} \frac{|Ax|}{|x|} = |A(1)| < \infty.$$

故 A 有界. 注意 A 为 $\mathbb{R}$ 上的有界线性算子不等价于 A 为 $\mathbb{R}$ 上的有界函数. 事实上, 设 A 为 $\mathbb{R}$ 上的有界线性算子, 则 A 为 $\mathbb{R}$ 上的有界函数 $\Leftrightarrow A = 0_{L(\mathbb{R})}$.

对 $\dim X = \infty$ 的情况, $\lambda \in \mathbb{C}$ 的选取会且仅会导致下述四个结果其一:

- (i) $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在, 亦即 λ 是 A 的本征值. 记这样的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 构成的全体为⁷ $\sigma_p(A)$, 称这样的 λ 为 A 的点谱 (point spectrum);
- (ii) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 且 $\lambda I - A$ 的值域

$$R(\lambda I - A) := (\lambda I - A)(D(A)) = X,$$

此时 λ 是 A 的正则值;

- (iii) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $R(\lambda I - A) \neq X$, 但 $\overline{R(\lambda I - A)} = X$. 此时称 λ 为 A 的连续谱 (continuous spectrum), 记这样的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 构成的全体为 $\sigma_c(A)$;
- (iv) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 且 $\overline{R(\lambda I - A)} \neq X$. 此时称 λ 为 A 的剩余谱 (residual spectrum), 记这样的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 构成的全体为 $\sigma_r(A)$.

注 6.4 设 X 为非平凡复 Banach 空间, $A : D(A) \subset X \rightarrow X$ 为闭算子, 则

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)^{-1} \text{不存在} &\Leftrightarrow \lambda I - A \text{不是单射} \\ &\Leftrightarrow \exists x_0 \in D(A) \setminus \{0_X\} ((\lambda I - A)x_0 = 0_X) \\ &\Leftrightarrow \lambda \text{为 } A \text{的本征值.} \end{aligned}$$

现称 $\sigma(A) := \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ 为 A 的谱集 (spectrum set), $\lambda \in \sigma(A)$ 称为 A 的谱点 (spectrum). 可知

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A).$$

根据定义可知, $\rho(A), \sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$ 互不相交.

下述命题表明 $\lambda \in \rho(A)$ 当且仅当 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在且 $R(\lambda I - A) = X$, 即前述正则值的定义合理.

命题 6.1

设 X 为 Banach 空间, $A : D(A) \subset X \rightarrow X$ 为闭线性算子. 若 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 且 $\lambda I - A$ 的值域

$$R(\lambda I - A) := (\lambda I - A)(D(A)) = X,$$

则 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$.

证明 因为 $D((\lambda I - A)^{-1}) = R(\lambda I - A) = X$ 是 X 中的闭集, 故根据闭图像定理 6.1, 要想说明 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$, 只需说明 $(\lambda I - A)^{-1}$ 是闭算子.

首先说明 $\lambda I - A$ 是闭算子. 设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ 满足

$$x_n \rightarrow x \text{ 且 } (\lambda I - A)x_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty), \quad (6.1)$$

往证 $x \in D(A), y = (\lambda I - A)x$. 注意到 (6.1) 第二式等价于 $\lambda x - \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = y$, 因而 (6.1) 式即

$$Ax_n \rightarrow \lambda x - y \text{ 且 } x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$$

现由 A 是闭算子知 $x \in D(A), Ax = \lambda x - y$, 于是 $(\lambda I - A)x = y$, 这说明 $\lambda I - A$ 是闭算子.

下证 $(\lambda I - A)^{-1}$ 是闭算子. 设 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D((\lambda I - A)^{-1}) = X$ 满足

$$y_n \rightarrow y \text{ 且 } x_n := (\lambda I - A)^{-1}y_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty), \quad (6.2)$$

往证 $y \in D((\lambda I - A)^{-1}), x = (\lambda I - A)^{-1}y$. 由 (6.2) 式知

$$(\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y \text{ 且 } x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty).$$

⁷其中角标 p 意为 proper value.

现由 $\lambda I - A$ 是闭算子与 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D(\lambda I - A)$ 知 $x \in D(\lambda I - A) = D(A)$, $(\lambda I - A)x = y$, 于是

$$y \in R(\lambda I - A) = D((\lambda I - A)^{-1})$$

且 $(\lambda I - A)^{-1}y = x$, 这说明 $(\lambda I - A)^{-1}$ 为闭算子, 命题因而得证. $\square$

下面的一些例子表明当 $\dim X = \infty$ 时, 点谱、连续谱与剩余谱都是有可能出现的.

例 6.1 设 $X = C[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto -\frac{d^2}{dt^2}u(t)$, 其定义域为

$$D(A) := \{u \in C^2[0, 1] : u(0) = u(1), u'(0) = u'(1)\}.$$

则 A 为 $D(A) \subset C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 的闭线性算子, $\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{(2n\pi)^2 : n \in \mathbb{N}\}$, 且 $\rho(A) = \mathbb{C} \setminus \{(2n\pi)^2 : n \in \mathbb{N}\}$.

证明 首先说明 A 是闭算子, 亦即说明当 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ 且

$$\begin{cases} u_n \rightarrow u, & n \rightarrow \infty, \\ -u_n'' \rightarrow v, & n \rightarrow \infty \end{cases}$$

在 $C[0, 1]$ 意义下成立时, 有 $u \in D(A)$ 且 $-u'' = v$. 为此, 对 $\forall t \in [0, 1]$ 令⁸

$$y(t) := -\int_0^t v(s)ds.$$

注意到对 $\forall t \in [0, 1]$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$|u_n'(t) - u_n'(0) - y(t)| = \left| \int_0^t [u_n''(s) + v(s)]ds \right| \leq \|v - (-u_n'')\|_{C[0,1]} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty, \quad (6.3)$$

从而

$$\|u_n' - u_n'(0) - y\|_{C[0,1]} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

特别在(6.3)式中令 $t = 1$ 有

$$\int_0^1 v(s)ds = 0.$$

这说明 $y(0) = y(1) = 0$.

下面证明存在 $\alpha \in \mathbb{C}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n'(0) = \alpha$, 由此与前述已证结论知

$$\begin{aligned} \|u_n' - \alpha - y\|_{C[0,1]} &= \|u_n' - u_n'(0) - y + u_n'(0) - \alpha\|_{C[0,1]} \\ &\leq \|u_n' - u_n'(0) - y\|_{C[0,1]} + \|u_n'(0) - \alpha\|_{C[0,1]} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

故

$$u_n' \rightarrow \alpha + y, \quad n \rightarrow \infty$$

在 $C[0, 1]$ 意义下成立. 现在为证 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n'(0) = \alpha$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 由 $u_n(0) = u_n(1)$ 知

$$\int_0^1 u_n'(t)dt = 0.$$

从而当 $n, m \rightarrow \infty$ 时

$$\begin{aligned} |u_n'(0) - u_m'(0)| &= \left| \int_0^1 [-u_n'(t) + u_n'(0) + u_m'(t) - u_m'(0)]dt \right| \\ &\leq \|[u_m' - u_m'(0)] - [u_n' - u_n'(0)]\|_{C[0,1]} \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

由此可知 $\{u_n'(0)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的 Cauchy 列, 因而存在 $\alpha \in \mathbb{C}$ 使得 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$u_n'(0) \rightarrow \alpha.$$

⁸整个证明的思路在于把 u 用 v 的二重积分表示出来, 因此先说明 u_n' 的极限能用 v 的一重积分表示, 再说明 u_n 的极限能用 v 的二重积分表示.

对 $\forall t \in [0, 1]$, 定义

$$\Omega(t) := \int_0^t [\alpha + y(s)] ds,$$

则 $\Omega(0) = 0$ 显然成立. 下面说明 $\{u_n - u_n(0)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $C[0, 1]$ 意义下收敛到 Ω . 事实上, 注意到对 $\forall t \in [0, 1]$ 与 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$u_n(t) - u_n(0) = \int_0^t u'_n(s) ds,$$

故对 $\forall t \in [0, 1]$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\left| u_n(t) - u_n(0) - \int_0^t [\alpha + y(s)] ds \right| = \left| \int_0^t [u'_n(s) - \alpha - y(s)] ds \right| \leq \|u'_n - (\alpha + y)\|_{C[0,1]} \rightarrow 0.$$

因此由 $u_n(1) - u_n(0) = 0 (\forall n \in \mathbb{N})$ 知 $\Omega(1) = 0$, 且 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\|u_n - u_n(0) - \Omega\|_{C[0,1]} \leq \|u'_n - (\alpha + y)\|_{C[0,1]} \rightarrow 0.$$

又由 $u_n \rightarrow u (n \rightarrow \infty)$ 在 $C[0, 1]$ 意义下成立知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(0) = u(0).$$

令 $\beta := u(0)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$u_n \rightarrow \beta + \Omega$$

在 $C[0, 1]$ 意义下成立. 注意到对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|u - (\beta + \Omega)\|_{C[0,1]} \leq \|u - u_n\|_{C[0,1]} + \|u_n - (\beta + \Omega)\|_{C[0,1]},$$

令 $n \rightarrow \infty$ 易得

$$\|u - (\beta + \Omega)\|_{C[0,1]} = 0.$$

由此知对 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$u(t) = \beta + \Omega(t) = \beta + \alpha t - \int_0^t \int_0^s v(\tau) d\tau ds.$$

显见 $u \in C^2[0, 1]$ 且 $u'' = -v$. 由 $\Omega(1) = \Omega(0) = 0$ 知 $u(0) = \beta = u(1)$. 又因为对 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$u'(t) = \alpha - \int_0^t v(\tau) d\tau,$$

故 $u'(0) = \alpha$ 且

$$u'(1) = \alpha - \int_0^1 v(\tau) d\tau = \alpha = u'(0).$$

故 $u \in D(A)$, 从而 A 为闭算子.

但 A 不是有界算子. 为证此事, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 与 $\forall t \in [0, 1]$ 令

$$f_n(t) := \sin(2n\pi t),$$

则 $f_n \in D(A)$ 且 $\|f_n\|_{C[0,1]} = 1$. 又对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 及 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$Af_n(t) = (2n\pi)^2 \sin(2n\pi t),$$

故 $\|Af_n\|_{C[0,1]} = (2n\pi)^2$. 因此对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\|A\|_{C[0,1] \rightarrow C[0,1]} \geq (2n\pi)^2.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即知 A 无界.

下面证明 $\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{(2n\pi)^2 : n \in \mathbb{N}\}$. 注意到对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$A \sin(2n\pi t) = (2n\pi)^2 \sin(2n\pi t), \quad A \cos(2n\pi t) = (2n\pi)^2 \cos(2n\pi t).$$

因此 $(2n\pi)^2 \in \sigma_p(A)$. 若令

$$E := \{(2n\pi)^2 : n \in \mathbb{N}\},$$

则 $E \subset \sigma_p(A)$. 下面说明 $\sigma_p(A) \subset E$, 为此只需说明 $(\mathbb{C} \setminus E) \subset \rho(A)$, 这是因为若该事实成立, 则有

$$\mathbb{C} = E \cup (\mathbb{C} \setminus E) \subset \sigma_p(A) \cup \rho(A) \subset \mathbb{C}.$$

因而 $\mathbb{C} = \sigma_p(A) \cup \rho(A)$, 故 $\sigma_p(A) = \rho(A)^c \subset E$, 结论进而成立.

现在说明 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus E$ 时, $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 这只需说明 $\lambda I - A$ 是单射. 设 $u_1, u_2 \in D(A)$ 满足 $u_1 \neq u_2$, 若 $(\lambda I - A)u_1 = (\lambda I - A)u_2$, 代入 $A = -\frac{d^2}{dt^2}$ 知

$$-\frac{d^2}{dt^2}(u_1 - u_2) = \lambda(u_1 - u_2),$$

由 ODE 理论解得

$$u_1 - u_2 = C_1 e^{\gamma_0 t} + C_2 e^{-\gamma_0 t}, \quad (6.4)$$

其中 $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$, γ_0 满足 $\lambda + \gamma_0^2 = 0$ 且 $\gamma_0 = i\sqrt{|\lambda|}e^{i\frac{\arg \lambda}{2}}$. 因为 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus E, 0 \in E$, 故 $\lambda \neq 0$, 从而 $\gamma_0 \neq 0$. 下面断言当 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus E$ 时有

$$e^{\pm \gamma_0} \neq 1. \quad (6.5)$$

这是因为 $e^{-\gamma_0} = 1 \Leftrightarrow e^{\gamma_0} = 1$, 而

$$\begin{aligned} e^{\gamma_0} = 1 &\Leftrightarrow e^{i\sqrt{|\lambda|}e^{i\frac{\arg \lambda}{2}}} = 1 \\ &\Leftrightarrow 1 = e^{i\sqrt{|\lambda|}[\cos \frac{\arg \lambda}{2} + i \sin \frac{\arg \lambda}{2}]} = e^{-\sqrt{|\lambda|} \sin \frac{\arg \lambda}{2}} e^{i\sqrt{|\lambda|} \cos \frac{\arg \lambda}{2}} \\ &\Leftrightarrow e^{-\sqrt{|\lambda|} \sin \frac{\arg \lambda}{2}} = 1 \text{ 且 } e^{i\sqrt{|\lambda|} \cos \frac{\arg \lambda}{2}} = 1 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{|\lambda|} \sin \frac{\arg \lambda}{2} = 0, \cos\left(\sqrt{|\lambda|} \cos \frac{\arg \lambda}{2}\right) = 1, \sin\left(\sqrt{|\lambda|} \cos \frac{\arg \lambda}{2}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin \frac{\arg \lambda}{2} = 0, \\ \sqrt{|\lambda|} \cos \frac{\arg \lambda}{2} = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\arg \lambda}{2} = n\pi, & n \in \mathbb{Z} \\ \sqrt{|\lambda|} = 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \arg \lambda = 2n\pi, & n \in \mathbb{Z} \\ |\lambda| = (2k\pi)^2, & k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \lambda = (2k\pi)^2, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

注意到

$$\{(2k\pi)^2 : k \in \mathbb{Z}\} = \{(2k\pi)^2 : k \in \mathbb{N}\},$$

且 $\lambda = 0$ 时 $\gamma_0 = 0$, 因此 $e^{\gamma_0} = 1$. 故 $e^{\gamma_0} = 1 \Leftrightarrow \lambda \in E$, 从而 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus E$ 时 $e^{\pm \gamma_0} \neq 1$. 所证断言因而成立.

又因为对 $\forall i \in \{1, 2\}$ 有

$$u_i(0) = u_i(1), u_i'(0) = u_i'(1),$$

代入(6.4)式可得

$$C_1 = C_2 = 0.$$

因此 $u_1 = u_2$, 矛盾! 故 $(\lambda I - A)u_1 \neq (\lambda I - A)u_2$, 从而 $\lambda I - A$ 为单射, 亦即 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在.

下面还需证明 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus E$ 时有

$$R(\lambda I - A) = C[0, 1].$$

亦即对任意 $v \in C[0, 1]$, 需证明存在 $u \in D(A)$ 使得 $v = (\lambda I - A)u$. 这等价于

$$\frac{d^2}{dt^2}u + \lambda u = \left(\frac{d}{dt} + \gamma_0\right)\left(\frac{d}{dt} - \gamma_0\right)u = v, \quad (6.6)$$

其中 $\gamma_0 = i\sqrt{|\lambda|}e^{i\frac{\arg \lambda}{2}}, v \in C[0, 1]$. 令

$$\tilde{u} := \left(\frac{d}{dt} - \gamma_0 \right) u, \quad (6.7)$$

则(6.6)式即

$$\left(\frac{d}{dt} + \gamma_0 \right) \tilde{u} = v. \quad (6.8)$$

在(6.7)式两端同乘 $e^{-\gamma_0 \tau}$ 并对 τ 在 $[0, t]$ 上积分, 则对 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-\gamma_0 \tau} u(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-\gamma_0 \tau} \tilde{u}(\tau) d\tau.$$

因此对 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$u(t) = e^{\gamma_0 t} \left[\int_0^t e^{-\gamma_0 \tau} \tilde{u}(\tau) d\tau + u(0) \right]. \quad (6.9)$$

类似地, 在(6.8)式两端同乘 $e^{\gamma_0 \tau}$ 并重复上述步骤可得对 $\forall t \in [0, 1]$ 有

$$\tilde{u}(t) = e^{-\gamma_0 t} \left[\int_0^t e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right]. \quad (6.10)$$

下面求解 $u(0)$ 与 $\tilde{u}(0)$. 结合(6.9), (6.10)两式知

$$u(t) = e^{\gamma_0 t} \int_0^t e^{-2\gamma_0 \tau} \left[\int_0^s e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right] ds + e^{\gamma_0 t} u(0)$$

且

$$u'(t) = \gamma_0 e^{\gamma_0 t} \int_0^t e^{-2\gamma_0 \tau} \left[\int_0^s e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right] ds + e^{-\gamma_0 t} \left[\int_0^t e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right] + \gamma_0 e^{\gamma_0 t} u(0).$$

显见 $u'(0) = \gamma_0 u(0) + \tilde{u}(0)$, 由此及 $u(0) = u(1), u'(0) = u'(1)$ 知

$$\begin{cases} u(0) = e^{\gamma_0} \int_0^1 e^{-2\gamma_0 \tau} \left[\int_0^s e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right] ds + e^{\gamma_0} u(0), \\ \gamma_0 u(0) + \tilde{u}(0) = \gamma_0 e^{\gamma_0} \int_0^1 e^{-2\gamma_0 \tau} \left[\int_0^s e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right] ds + e^{-\gamma_0} \left[\int_0^1 e^{\gamma_0 \tau} v(\tau) d\tau + \tilde{u}(0) \right] + \gamma_0 e^{\gamma_0} u(0). \end{cases}$$

可以验证上述方程组有唯一解 $u(0), \tilde{u}(0)$, 因此存在 $u \in D(A)$ 使得 $v = (\lambda I - A)u$, 故 $R(\lambda I - A) = C[0, 1]$, 从而 $\lambda \in \rho(A)$, 即 $(\mathbb{C} \setminus E) \subset \rho(A)$. $\square$

例 6.2 设 $X = C[0, 1]$, 则 $A : u(t) \mapsto tu(t)$ 是 X 上的有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0, 1].$$

证明 首先说明 A 是有界线性算子. 对任意 $u \in C[0, 1]$, 注意到 $\|u\|_X := \max_{t \in [0, 1]} |u(t)|$, 因而

$$\|Au\|_X = \max_{t \in [0, 1]} |tu(t)| \leq \max_{t \in [0, 1]} |u(t)| = \|u\|_X,$$

故 $\|A\|_{L(X)} \leq 1$. 进一步取 $u \equiv 1$ 可知 $\|A\|_{L(X)} = 1$, 这说明 $A \in L(X)$, 又因为 $D(A) = X = C[0, 1]$ 是 X 中的闭集, 故 A 是闭算子.

下面计算 $\sigma(A)$. 根据 A 的构造, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $u \in C[0, 1]$ 有

$$(\lambda I - A)u = (\lambda - t)u(t),$$

于是 $(\lambda I - A)u = 0$ 意味着对任意 $t \in [0, 1]$ 均有 $(\lambda - t)u(t) = 0$. 当 $\lambda \neq t$ 时, 显见 $u(t) = 0$; 当 $\lambda = t$ 时, 由 u 的连续性可知 $u(\lambda) = 0$, 因此 $u \equiv 0$, 这说明 $\lambda I - A$ 是单射, 故 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在.

下面说明 $\lambda \notin [0, 1] \Rightarrow \lambda \in \rho(A)$. 事实上, 若 $\lambda \notin [0, 1]$, 则 $\min_{t \in [0, 1]} |\lambda - t| > 0$, 于是对 $v \in C[0, 1]$ 与 $t \in [0, 1]$, 令 $u(t) := (\lambda - t)^{-1}v(t)$ 可得

$$\|u\|_X = \max_{t \in [0, 1]} \frac{|v(t)|}{|\lambda - t|} \leq \|v\|_X \frac{1}{\min_{t \in [0, 1]} |\lambda - t|} < \infty.$$

故 $u \in C[0, 1]$ 且 $(\lambda I - A)u = v$, 由此可知 $R(\lambda I - A) = C[0, 1]$, 故 $\lambda \in \rho(A)$.

再说明 $\lambda \in [0, 1] \Rightarrow \lambda \in \sigma_r(A)$, 由剩余谱的定义知只需证明 $\overline{R(\lambda I - A)} \subsetneq C[0, 1]$. 事实上, 对任意 $v \in$

$R(\lambda I - A)$, 根据值域的定义知存在 $u \in C[0, 1]$ 使得

$$v(t) = (\lambda I - A)u(t) = (\lambda - t)u(t).$$

故 $v(\lambda) = 0$, 这说明 $v \in R(\lambda I - A) \rightarrow v(\lambda) = 0$. 现注意到 $1 \in C[0, 1]$, 但 $1 \notin \overline{R(\lambda I - A)}$. 若不然, 设 $1 \in \overline{R(\lambda I - A)}$, 根据闭包的定义知存在 $\{v_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset R(\lambda I - A)$ 使得

$$\|v_n - 1\|_X = \max_{t \in [0, 1]} |v_n(t) - 1| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

故对任意 $t \in [0, 1]$ 均有 $|v_n(t) - 1| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 但另一方面, 根据前述推导可知对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $v_n(\lambda) = 0$, 矛盾! 故 $1 \notin \overline{R(\lambda I - A)}$, 从而 $\overline{R(\lambda I - A)} \subsetneq C[0, 1]$, 亦即 $\lambda \in \sigma_r(A)$. $\square$

例 6.3 设 $X = L^2[0, 1]$, 则 $A: u(t) \mapsto tu(t)$ 是 X 上的有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_e(A) = [0, 1].$$

证明 首先说明 A 是有界线性算子. 对任意 $u \in L^2[0, 1]$, 因为

$$\|Au\|_{L^2[0, 1]} := \left(\int_0^1 t^2 |u(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 |u(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} = \|u\|_{L^2[0, 1]},$$

故 $\|A\|_{L(L^2[0, 1])} \leq 1$, 因此 A 为 $L^2[0, 1]$ 上的有界线性算子. 另因 $D(A) = L^2[0, 1]$ 在 X 中闭, 故 A 是 X 上的闭算子.

再说明 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 为此只需说明 $\lambda I - A$ 是单射. 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $u \in L^2[0, 1]$, 若

$$(\lambda I - A)u(t) = (\lambda - t)u(t) = 0_{L^2[0, 1]},$$

在 $L^2[0, 1]$ 意义下成立, 则对几乎处处 $t \in [0, 1]$ 有 $(\lambda - t)u(t) = 0$, 进而对几乎处处 $t \in [0, 1]$ 有 $u(t) = 0$, 亦即 $u = 0_{L^2[0, 1]}$, 这便说明了 $\lambda I - A$ 是单射.

下证 $\lambda \notin [0, 1] \Rightarrow \lambda \in \rho(A)$, 这只需证明 $R(\lambda I - A) = L^2[0, 1]$. 注意到 $\lambda \notin [0, 1]$ 时有

$$\frac{1}{\min_{t \in [0, 1]} |\lambda - t|} < \infty,$$

故对任意 $v \in L^2[0, 1]$, 令

$$u(t) := \frac{v(t)}{\lambda - t}, \quad t \in [0, 1],$$

则

$$\|u\|_{L^2[0, 1]} \leq \frac{1}{\min_{t \in [0, 1]} |\lambda - t|} \|v\|_{L^2[0, 1]} < \infty,$$

故 $u \in L^2[0, 1]$ 且 $(\lambda I - A)u = v$, 因此 $R(\lambda I - A) = L^2[0, 1]$. 由此可知 $\lambda \in \rho(A)$.

下证 $\lambda \in [0, 1] \Rightarrow \sigma_e(A)$, 根据连续谱的定义知只需证明 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2[0, 1]$ 且 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2[0, 1]$. 首先由

$$\int_0^1 \frac{dt}{(\lambda - t)^2} \geq \max \left(\int_\lambda^1 \frac{dt}{(\lambda - t)^2}, \int_0^\lambda \frac{dt}{(\lambda - t)^2} \right) = \max \left(\int_0^{1-\lambda} \frac{dt}{t^2}, \int_0^\lambda \frac{dt}{t^2} \right) = \infty$$

可知 $(\lambda - t)^{-1} \notin L^2[0, 1]$, 因而 $1 \notin R(\lambda I - A)$. 又因为 $1 \in L^2[0, 1]$, 故 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2[0, 1]$.

再说明 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2[0, 1]$, 为此设 $v \in L^2[0, 1]$, $\lambda \in [0, 1]$, 定义

$$v_n := \begin{cases} v(t), & |t - \lambda| \geq \frac{1}{n}, t \in [0, 1], \\ 0, & |t - \lambda| < \frac{1}{n}, t \in [0, 1], \end{cases}$$

则 $\|v_n\|_{L^2[0, 1]} \leq \|v\|_{L^2[0, 1]} < \infty$, 且

$$\|v_n - v\|_{L^2[0, 1]} = \left(\int_{\{t \in [0, 1]: |t - \lambda| < \frac{1}{n}\}} |v(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

现定义

$$u_n(t) := \begin{cases} \frac{v_n}{\lambda - t}, & |t - \lambda| \geq \frac{1}{n}, t \in [0, 1], \\ 0, & |t - \lambda| < \frac{1}{n}, t \in [0, 1], \end{cases}$$

则

$$\|u_n\|_{L^2[0,1]} \leq n\|v\|_{L^2[0,1]} < \infty,$$

即 $u_n \in L^2[0, 1]$, 且 $(\lambda I - A)u_n = v_n$. 这说明 $v_n \in R(\lambda I - A)$, $v \in \overline{R(\lambda I - A)}$, 结论即证. $\square$

在说明清楚谱集 $\sigma(A)$ 所蕴含的三种可能性后, 下面来研究 $\sigma(A)$ 的性质. 在 $\dim X < \infty$ 时, 由线性代数理论可知对任意 $A \in L(X)$ 均有 $\sigma(A) \neq \emptyset$, 这是因为特征多项式 $|\lambda I - A| = 0$ 根据代数基本定理是必定存在根的. 但在 $\dim X = \infty$ 时, 我们并没有类似于代数基本定理的结论, 故这套方法在无穷维时行不通了. 这个问题由 Gelfand 利用算子值函数的解析性得以解决, 下面介绍其方法.

定义 6.3 (预解式 (resolvent))

算子值函数 $R_\lambda(A) : \rho(A) \rightarrow L(X)$ 定义为

$$\lambda \mapsto (\lambda I - A)^{-1}, \lambda \in \rho(A),$$

称 $R_\lambda(A)$ 为 A 的预解式.

首先, 说明 $\rho(A)$ 是开集, 为此需要下述引理⁹:

引理 6.1 (von Neumann)

设 $A \in L(X)$ 满足 $\|A\|_{L(X)} < 1$, 则 $(I - A)^{-1} \in L(X)$, 且

$$\|(I - A)^{-1}\|_{L(X)} \leq \frac{1}{1 - \|A\|_{L(X)}}.$$

证明 首先证明 $I - A$ 是双射, 为此只需证明对任意 $y \in X$, 存在唯一 $x_y \in X$ 使得 $(I - A)x_y = y$. 任取 $x \in X$, 定义算子 $Sx := y + Ax$, 注意到对任意 $x_1, x_2 \in X$ 有

$$\|Sx_1 - Sx_2\|_X = \|Ax_1 - Ax_2\|_X \leq \|A\|_{L(X)}\|x_1 - x_2\|_X,$$

由 $\|A\|_{L(X)} < 1$ 知 S 为一个压缩映射, 故由压缩映射原理知存在唯一 $x_y \in X$ 使得 $Sx_y = x_y$, 即 $y + Ax_y = x_y$, 亦即 $y = (I - A)x_y$. 至此可知 $I - A$ 是双射, 从而 $(I - A)^{-1}$ 存在.

再说明 $(I - A)^{-1} \in L(X)$. 由 $\|A\|_{L(X)} < 1$ 知对 $\forall N, p \in \mathbb{N}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| \sum_{n=N+1}^{N+p} A^n \right\|_{L(X)} \leq \sum_{n=N+1}^{N+p} \|A\|_{L(X)}^n \rightarrow 0.$$

因此 $\{\sum_{n=0}^N A^n\}_{N \in \mathbb{N}}$ 是基本列. 因为 $L(X)$ 完备, 故 $\{\sum_{n=0}^N A^n\}_{N \in \mathbb{N}}$ 在 $L(X)$ 中收敛, 记 $\sum_{n=0}^N A^n \rightarrow \sum_{n=0}^\infty A^n$, 由此可知

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{n=0}^\infty A^n \right\|_{L(X)} &\leq \left\| \sum_{n=0}^\infty A^n - \sum_{n=0}^N A^n \right\|_{L(X)} + \left\| \sum_{n=0}^N A^n \right\|_{L(X)} \\ &\leq \left\| \sum_{n=0}^\infty A^n - \sum_{n=0}^N A^n \right\|_{L(X)} + \sum_{n=0}^N \|A\|_{L(X)}^n. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得

$$\left\| \sum_{n=0}^\infty A^n \right\|_{L(X)} \leq \sum_{n=0}^\infty \|A\|_{L(X)}^n < \infty. \quad (6.11)$$

⁹这个引理相当不凡, 整个算子谱论与算子代数都会反复地提 von Neumann 引理与 von Neumann 级数. 它的余响传达到了 Kato, Kato 正是用 von Neumann 级数克服了正规算子的伪谱问题, 进而发展了算子微扰论, 后者成为流体方程稳定性理论的核心技术之一.

下面说明

$$(I - A) \left(\sum_{n=0}^{\infty} A^n \right) = I = \left(\sum_{n=0}^{\infty} A^n \right) (I - A).$$

为此, 设 $x \in X$, 由 $\sum_{n=0}^{\infty} A^n \in L(X)$ 可知 $k \rightarrow \infty$ 时:

$$\left\| \sum_{n=0}^{\infty} A^n x - \sum_{n=0}^k A^n x \right\|_X \leq \left\| \sum_{n=0}^{\infty} A^n - \sum_{n=0}^k A^n \right\|_{L(X)} \|x\|_X \rightarrow 0.$$

从而 $k \rightarrow \infty$ 时有

$$\sum_{n=0}^k A^n x =: y_k \rightarrow y := \sum_{n=0}^{\infty} A^n x, \quad k \rightarrow \infty. \quad (6.12)$$

又由 $\|A\|_{L(X)} < 1$ 知当 $k \rightarrow \infty$ 时

$$\|A^{k+1}x\|_X \leq \|A\|_{L(X)}^{k+1} \|x\|_X \rightarrow 0,$$

由此及(6.12)式知 $k \rightarrow \infty$ 时有

$$(I - A)y_k = (I - A) \left(\sum_{n=0}^k A^n \right) x = x - A^{k+1}x \rightarrow x, \quad k \rightarrow \infty.$$

又由 $I - A \in L(X)$ 知 $(I - A)y = x$, 亦即 $(I - A)(\sum_{n=0}^{\infty} A^n) = I$. 类似可证

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} A^n \right) (I - A) = I.$$

因此

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n. \quad (6.13)$$

从而

$$\|(I - A)^{-1}\|_{L(X)} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|A\|_{L(X)}^n = \frac{1}{1 - \|A\|_{L(X)}}.$$

至此引理即证. □

注 6.5

(i) 设 $A \in L(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ 且 $|\lambda| > \|A\|_{L(X)}$. 由引理6.1知 $(I - \lambda^{-1}A)^{-1} \in L(X)$, 且

$$\|(I - \lambda^{-1}A)^{-1}\|_{L(X)} \leq \frac{1}{1 - |\lambda|^{-1}\|A\|_{L(X)}},$$

此即 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(X)$, 且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L(X)} \leq \frac{1}{|\lambda| - \|A\|_{L(X)}}.$$

由此可知 $\lambda \in \rho(A)$, 即

$$\mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|A\|_{L(X)})} \subset \rho(A),$$

故 $\sigma(A) = \rho(A)^c \subset \overline{B(0, \|A\|_{L(X)})}$.

(ii) 在引理6.1的证明中, 因为 $Sx = y + Ax (\forall x \in X)$, 故 $Sy = y + Ay$, 进而

$$S^2y = S(Sy) = y + A(Sy) = y + Ay + A^2y.$$

更一般地, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$S^n y = \sum_{k=0}^n A^k y.$$

由此与压缩映射原理可知

$$x_y = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n y = \sum_{k=0}^{\infty} A^k y,$$

这说明当 $\|A\|_{L(X)} < 1$ 时总有(6.13)式成立. 级数(6.13)称为 Neumann 级数.

(iii) Neumann 级数的形式非常像 $(1-x)^{-1}$ 的 Taylor 展开, 实际上后者就是前者的特殊形式. 令 $X := \mathbb{R}$, 对任意取定的 $x \in \mathbb{R}$, 令

$$T_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto xy.$$

显见 $\|T_x\|_{L(\mathbb{R})} = |x|$. 现在当 $\|T_x\|_{L(\mathbb{R})} = |x| < 1$ 时, 对 $\forall y \in \mathbb{R}$, 知 $(I - T_x)y = (1-x)y$, 从而

$$(I - T_x)^{-1}y = \frac{1}{1-x}y, \|(I - T_x)^{-1}\|_{L(\mathbb{R})} = \frac{1}{1-x}.$$

此时 Neumann 级数(6.13)成为

$$\frac{1}{1-x} = (I - T_x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T_x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1.$$

这正是 $(1-x)^{-1}$ 的 Taylor 展开.

推论 6.1 (预解集的开性)

设 X 是 Banach 空间, A 是闭线性算子, 则 $\rho(A)$ 是开集.

证明 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 注意到对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 均有

$$\begin{aligned} \lambda I - A &= (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) \\ &= (\lambda_0 I - A)[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]. \end{aligned} \quad (6.14)$$

又因为对任何具有有界逆的线性算子而言, 其自身与其逆的算子范数均不为零¹⁰, 故当 $|\lambda - \lambda_0| < \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|_{L(X)}^{-1}$ 时, 有

$$\|(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\|_{L(X)} < 1,$$

进而由引理 6.1 知

$$B := [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} \in L(X).$$

由此可得

$$(\lambda I - A)^{-1} = B(\lambda_0 I - A)^{-1} \in L(X),$$

故 $\lambda \in \rho(A)$, 即 $B(\lambda_0, \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|_{L(X)}^{-1}) \subset \rho(A)$, 推论得证. □

接下来说明 $R_\lambda(A)$ 是算子值解析函数¹¹, 为此首先考虑对 $R_\lambda(A)$ 求导, 引入下述第一预解公式:

引理 6.2 (第一预解公式)

设 $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A).$$

进一步有

$$R_\lambda(A)R_\mu(A) = R_\mu(A)R_\lambda(A).$$

¹⁰这是因为若 $\|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|_{L(X)} = 0$, 则 $(\lambda_0 I - A)^{-1} = 0_{L(X)}$, 从而 $I = (\lambda_0 I - A)^{-1}(\lambda_0 I - A) = 0_{L(X)}$, 这与 X 的非平凡性 (即 $I \neq 0_{L(X)}$) 矛盾.

¹¹设 X 是 Banach 空间, $G \subset \mathbb{C}$, 称抽象函数 $x(z) : G \rightarrow X$ 解析, 如果对任意 $z_0 \in G$, 在 X 中均存在极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{x(z) - x(z_0)}{z - z_0}$.

证明 注意到对 $\lambda, \mu \in \rho(A)$ 有:

$$\begin{aligned}
 R_\lambda(A) &= (\lambda I - A)^{-1} \\
 &= (\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)(\mu I - A)^{-1} \\
 &= (\lambda I - A)^{-1}[(\mu - \lambda)I + \lambda I - A](\mu I - A)^{-1} \\
 &= (\mu - \lambda)(\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)^{-1} + (\mu I - A)^{-1} \\
 &= (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A) + R_\mu(A).
 \end{aligned}$$

引理第一式即证. 将上式中的 λ, μ 互换并将两式相加即得引理的第二式. $\square$

定理 6.2 (预解式的解析性)

若 X 是 Banach 空间, A 是闭线性算子, 则 A 的预解式 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内是算子值解析函数^a.

^a注意解析性总是和 Taylor 展式与 Liouville 定理挂钩的, 后面用到这个结论也是用的 Taylor 展式或者 Liouville 定理. 

证明 首先说明 $R_\lambda(A)$ 关于 $\lambda \in \rho(A)$ 连续. 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则当

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{2\|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)}}$$

时, 有

$$\|(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\|_{L(X)} < \frac{1}{2} < 1.$$

此时由(6.14)式知

$$R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1} = [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1}R_{\lambda_0}(A),$$

进而由引理 6.1 知

$$\begin{aligned}
 \|R_\lambda(A)\|_{L(X)} &\leq \|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)}\|[I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1}\|_{L(X)} \\
 &\leq \frac{\|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)}}{1 - \|(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\|_{L(X)}} \\
 &< 2\|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)} < \infty.
 \end{aligned}$$

于是由第一预解公式 6.2 知, 当 $\lambda \rightarrow \lambda_0$ 时有:

$$\begin{aligned}
 \|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)} &\leq |\lambda - \lambda_0|\|R_\lambda(A)\|_{L(X)}\|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)} \\
 &\leq 2|\lambda - \lambda_0|\|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)}^2 \rightarrow 0,
 \end{aligned}$$

因此 $R_\lambda(A)$ 关于 $\lambda \in \rho(A)$ 连续.

再说明 $R_\lambda(A)$ 的可微性. 由第一预解公式 6.2 可得

$$\frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} = -R_\lambda(A)R_{\lambda_0}(A),$$

在等式两边令 $\lambda \rightarrow \lambda_0$ 可得

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} = -\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} R_\lambda(A)R_{\lambda_0}(A) = -R_{\lambda_0}(A)^2 \in L(X),$$

定理即证. $\square$

下面考虑谱点的存在性定理:

定理 6.3 (Gelfand-Mazur)

若 X 是 Banach 空间, $A \in L(X)$, 则 $\sigma(A) \neq \emptyset$. 

证明 用反证法. 若 $\rho(A) = \mathbb{C}$, 则由预解式的解析性 6.2 知 $R_\lambda(A)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析. 回忆如果复值函数在全空间上解析, 就能用 Liouville 定理说明该函数为常值函数. 虽说算子值函数没有对应的 Liouville 定理, 但只要我们能说明 $R_\lambda(A)$ 关于 λ 不是单射, 就能导出 $I = 0_{X \rightarrow X}$ 的矛盾. 因此下面的思路就是证明 $R_\lambda(A)$ 与 λ 无关. 如果

想把 $R_\lambda(A)$ 的算子值解析性转化成复值函数的解析性, 一个源自 Hahn-Banach 定理的想法就是找测试泛函¹² $f \in (L(X))^*$, 研究 $\langle f, R_\lambda(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}$ 的解析性. 因为最后落脚点是对 $\langle f, R_\lambda(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}$ 用 Liouville 定理, 故我们需要证明该复值函数在全空间上有界, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式知这只需要证明 $\{\|R_\lambda(A)\|_{L(X)} : \lambda \in \mathbb{C}\}$ 有界即可, 因此下面我们首先证这件事. 为利用引理 6.1, 可以考虑把 λ 的取值分成近远处两部分. 具体来说, 当 $|\lambda| \leq 2\|A\|_{L(X)}$ 时, 由 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 中的连续性与

$$|\|R_\lambda(A)\|_{L(X)} - \|R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)}| \leq \|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\|_{L(X)}$$

可知 $\|R_\lambda(A)\|_{L(X)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 进而它必在 $\overline{B(0, 2\|A\|_{L(X)})}$ 上连续. 又因为 $\overline{B(0, 2\|A\|_{L(X)})}$ 是欧氏空间中的紧集, 故 $\|R_\lambda(A)\|_{L(X)}$ 在 $\overline{B(0, 2\|A\|_{L(X)})}$ 上有界. 当 $|\lambda| > 2\|A\|_{L(X)}$ 时, 由引理 6.1 的注 (i) 知

$$\|R_\lambda(A)\|_{L(X)} \leq \frac{1}{|\lambda| - \|A\|_{L(X)}} < \frac{1}{\|A\|_{L(X)}},$$

故 $\|R_\lambda(A)\|_{L(X)}$ 在复平面上有上界, 记之为 M .

沿用前述思路, 对任意 $f \in (L(X))^*$, 定义

$$u_f(\lambda) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \lambda \mapsto \langle f, R_\lambda(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)},$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}$ 表示 $((L(X))^*, L(X))$ 上的序偶. 下面说明 u_f 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 为此, 任取 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 在 $\lambda \neq \lambda_0$ 时有:

$$\frac{u_f(\lambda) - u_f(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} = \frac{\langle f, R_\lambda(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)} - \langle f, R_{\lambda_0}(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}}{\lambda - \lambda_0} = \left\langle f, \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} \right\rangle_{(L(X))^* \times L(X)}.$$

根据 $f \in (L(X))^*$ 所蕴含的 f 的连续性, 可知

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{u_f(\lambda) - u_f(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} = \left\langle f, \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} \right\rangle_{(L(X))^* \times L(X)}.$$

再由预解式的解析性 6.2 即知 u_f 在 $\mathbb{C}$ 上解析. 现在有

$$|u_f(\lambda)| \leq \|f\|_{(L(X))^*} \|R_\lambda(A)\|_{L(X)} \leq M \|f\|_{(L(X))^*},$$

于是 u_f 是 $\mathbb{C}$ 上的整函数, 根据 Liouville 定理可知存在与 λ 无关的常数 $C_f \in \mathbb{C}$ 使得

$$u_f(\lambda) = \langle f, R_\lambda(A) \rangle \equiv C_f.$$

上式表明 $R_\lambda(A)$ 是与 λ 无关的算子, 这是因为若设 $R_{\lambda_1}(A) \neq R_{\lambda_2}(A)$, 则由 Hahn-Banach 定理的推论知存在 $f \in (L(X))^*$ 使得 $\|f\|_{(L(X))^*} = 1$, 且

$$0 = u_f(\lambda_1) - u_f(\lambda_2) = \langle f, R_{\lambda_1}(A) - R_{\lambda_2}(A) \rangle \leq \|R_{\lambda_1}(A) - R_{\lambda_2}(A)\|_{L(X)},$$

因而 $R_{\lambda_1}(A) = R_{\lambda_2}(A)$, 矛盾! 因此 $R_\lambda(A)$ 是与 λ 无关的算子. 由此与第一预解公式 6.2 知当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时有

$$(\lambda_2 - \lambda_1)R_{\lambda_1}(A)R_{\lambda_2}(A) = R_{\lambda_1}(A) - R_{\lambda_2}(A) = 0_{L(X)},$$

于是

$$I = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}(\lambda_2 I - A)(\lambda_1 I - A)(\lambda_2 - \lambda_1)R_{\lambda_1}(A)R_{\lambda_2}(A) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}(\lambda_2 I - A)(\lambda_1 I - A)0_{L(X)} = 0_{L(X)},$$

矛盾! 因此 $\sigma(A) \neq \emptyset$, 定理得证. $\square$

下面考虑有界线性算子谱集的范围. 由引理 6.1 的注 (i) 已经知道 $\sigma(A) \subset \overline{B(0, \|A\|_{L(X)})}$, 另由预解集的开性 6.1 与 Gelfand-Mazur 定理 6.3 知 $\sigma(A)$ 是非空紧集.

定义 6.4 (谱半径 (spectrum radius))

设 X 是 Banach 空间, A 是 X 上的有界线性算子, 称

$$r_\sigma(A) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}$$

为 A 的谱半径.



¹²调和与分析也很喜欢谈这件事, 也就是借测试函数之手定义各种泛函的性质.

注 6.6 从谱半径的定义立即可以得到下述结论:

(i) $\sigma(A) \subset \overline{B(0, r_\sigma(A))}$;

(ii) $r_\sigma(A) \leq \|A\|_{L(X)}$.

其中 (ii) 是因为 $\sigma(A) \subset \overline{B(0, \|A\|_{L(X)})}$.

Gelfand 对谱半径给出了下述更精确的结论:

定理 6.4 (Gelfand)

设 X 是 Banach 空间, A 是 X 上的有界线性算子, 则

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}.$$

证明 首先说明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}$ 存在. 令

$$a := \inf_{n \in \mathbb{N}} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}},$$

由 $\|A\|_{L(X)} < \infty$ 知首先有 $a < \infty$, 进一步知

$$a \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}. \quad (6.15)$$

由下确界的定义知对任意 $\varepsilon \in (0, \infty)$, 总存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$a \leq \|A^{n_0}\|_{L(X)}^{\frac{1}{n_0}} < a + \varepsilon.$$

因为对任意 $n \geq n_0$ 总存在 $k \in \mathbb{N}^+$ 使得 $n = kn_0 + s$, 其中 $s \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leq s < n_0$, 故

$$\|A^n\|_{L(X)} = \|A^{kn_0+s}\|_{L(X)} \leq \|A^{n_0}\|_{L(X)}^k \|A\|_{L(X)}^s.$$

因此

$$\|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} \leq \|A^{n_0}\|_{L(X)}^{\frac{k}{kn_0+s}} \|A\|_{L(X)}^{\frac{s}{kn_0+s}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 此时 $k \rightarrow \infty$, 于是

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|A^{n_0}\|_{L(X)}^{\frac{k}{kn_0+s}} \|A\|_{L(X)}^{\frac{s}{kn_0+s}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^{n_0}\|_{L(X)}^{\frac{k}{kn_0+s}} \|A\|_{L(X)}^{\frac{s}{kn_0+s}} \\ &= \|A^{n_0}\|_{L(X)}^{\frac{1}{n_0}} < a + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} \leq a.$$

结合上式与(6.15)式即知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} = a.$$

下面说明 $r_\sigma(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}$. 首先从形式上进行分析. 回忆 $r_\sigma(A)$ 刻画的是使得 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不再有界线性的那些 λ 的最大范围. 回到级数(6.13), 如果有

$$(\lambda I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}, \quad (6.16)$$

则只要存在 $r > 0$ 使得 $|\lambda| > r$ 时上右式的算子级数收敛为有界线性算子, $r_\sigma(A)$ 就不能超过 r . 如果把 A^n 换成实数 $\|A^n\|_{X \rightarrow X}$, 讨论上右式级数的收敛用的就是 Cauchy-Hadamard 公式: 对于函数项级数

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

令

$$R := \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}},$$

则当 $|x| < R$ 时 $f(x)$ 绝对收敛, $|x| > R$ 时 $f(x)$ 发散. 套到这里的情况也就是

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\lambda|} &< \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}} \Rightarrow \text{级数收敛}, \\ \frac{1}{|\lambda|} &> \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}} \Rightarrow \text{级数发散}. \end{aligned}$$

也就是说 $|\lambda| > \limsup_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 时级数收敛, 进一步用算子范数的三角不等式即知原算子级数此时确实有界.

现在从严格意义上说明这件事, 首先确定 $|\lambda| > \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}$ 时(6.16)确实成立. 知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|A^n\|_{L(X)}}{|\lambda|^n} < \infty \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|A^n\|_{L(X)}}{|\lambda|^{n+1}} < \infty,$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \in L(X).$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^{n+1}}{\lambda^{n+1}} = \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^l \frac{A^{n+1}}{\lambda^{n+1}} = \lim_{l \rightarrow \infty} A \sum_{n=0}^l \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}. \quad (6.17)$$

由 A 的连续性知当 $l \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| A \sum_{n=0}^l \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} - A \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \right\|_{L(X)} \leq \|A\|_{L(X)} \left\| \sum_{n=0}^l \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} - \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \right\|_{L(X)} \rightarrow 0.$$

由上式与(6.17)式即知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^{n+1}}{\lambda^{n+1}} = A \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} = A \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \in L(X),$$

从而

$$\begin{aligned} (\lambda I - A) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} &= \lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} - A \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \\ &= \lambda \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} - A \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{A^n}{\lambda^n} - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{A^{n+1}}{\lambda^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^{n+1}}{\lambda^{n+1}} = I, \end{aligned}$$

其中 I 表示 X 上的恒同算子. 类似可证

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} (\lambda I - A) = I,$$

因此

$$R_\lambda(A) := (\lambda I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \in L(X).$$

故 $\lambda \in \rho(A)$, 于是

$$r_\sigma(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}. \quad (6.18)$$

接下来证明

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}.$$

这里的整个思路是考虑算子级数收敛边界和 $r_\sigma(A)$ 之间的关系. 前面已经提过只要 A 是闭线性算子, 其预解式在 $\rho(A)$ 内就解析. 现在从定义出发显见 $\overline{B}(0, r_\sigma(A))^c \subset \rho(A)$, 故 $R_\lambda(A)$ 在 $\overline{B}(0, r_\sigma(A))^c$ 上解析, 这等价于 $R_\lambda(A)$

在该区域各点均能 Taylor 展开. 但为了和(6.16)相容, 我们先不直接对 $R_\lambda(A)$ 作 Taylor 展开, 而是换元 $1/\lambda \mapsto \omega$ 后再展开, 此时 $\overline{B}(0, r_\sigma(A))^c$ 变为 $B(0, r_\sigma(A)^{-1}) \setminus \{0\}$. 为顺利展开我们需要说明换元后的算子值函数在 $\omega = 0$ 处解析, 这也就是说明原算子在 $\lambda = \infty$ 处解析. 注意 Cauchy-Hadamard 公式断言的是发散与收敛的界 (而不仅仅是收敛界), 故如果 $r_\sigma(A)$ 变小导致 $R_\lambda(A)$ 解析域变大, 进一步导致换元后算子展开的收敛域变小, 还原后的 Taylor 级数收敛于就会变大, 也就是说级数(6.16)经由 Cauchy-Hadamard 公式得到的收敛界 R 就也应该变大, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{X \rightarrow X}^{\frac{1}{n}}$ 应该变小. 这暗示了 $r_\sigma(A)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{X \rightarrow X}^{\frac{1}{n}}$ 其实是同步变化的, 我们就有理由相信它们其实相等.

下面严格实现前述思路. 根据 $r_\sigma(A)$ 的定义, 当 $|\lambda| > r_\sigma(A)$ 时必有 $\lambda \in \rho(A)$, 此时 $R_\lambda(A) \in L(X)$. 根据预解式的解析性 6.2 即知 $R_\lambda(A)$ 在 $|\lambda| > r_\sigma(A)$ 时解析. 下面证明 $R_\lambda(A)$ 在 $\lambda = \infty$ 处解析. 事实上, 若令 $\omega := \frac{1}{\lambda}$, 则

$$\begin{aligned} R_\lambda(A) &= (\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \\ &= \omega(I - \omega A)^{-1} =: \tilde{R}_\omega(A). \end{aligned}$$

因为解析性就是处处可微性, 故只需说明 $R_\lambda(A)$ 在 $\lambda = \infty$ 处可微, 这也就是说明 $\tilde{R}_\omega(A)$ 在 $\omega = 0$ 处可微. 显见 $\tilde{R}_0(A) = 0_{L(X)}$, 故

$$\frac{\tilde{R}_\omega(A) - \tilde{R}_0(A)}{\omega - 0} = (I - \omega A)^{-1}.$$

当 $|\omega| \|A\|_{L(X)} < \frac{1}{2}$ 时, 由引理 6.1 与级数(6.13)知

$$(I - \omega A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\omega A)^n = I + \omega A \sum_{n=0}^{\infty} (\omega A)^n,$$

而

$$\left\| \sum_{n=0}^{\infty} (\omega A)^n \right\|_{L(X)} \leq \frac{1}{1 - |\omega| \|A\|_{L(X)}} < 2,$$

故当 $\omega \rightarrow 0$ 时

$$0 \leq \|(I - \omega A)^{-1} - I\|_{L(X)} \leq 2|\omega| \|A\|_{L(X)} \rightarrow 0.$$

这说明 $\omega \rightarrow 0$ 时有

$$\frac{\tilde{R}_\omega(A) - \tilde{R}_0(A)}{\omega - 0} \rightarrow I(L(X)).$$

因此

$$\left. \frac{dR_\lambda(A)}{d\lambda} \right|_{\lambda=\infty} = \left. \frac{d\tilde{R}_\omega(A)}{d\omega} \right|_{\omega=0} = I,$$

由此即知 $R_\lambda(A)$ 在 $\lambda = \infty$ 处解析. 又因为先前说明了 $R_\lambda(A)$ 在 $\infty > |\lambda| > r_\sigma(A)$ 时均解析, 故 $\tilde{R}_\omega(A)$ 在 $|\omega| < \frac{1}{r_\sigma(A)}$ 时关于 ω 解析.

现在把算子值解析性提回经典的复分析能使用的复值函数解析性. 任取 $f \in (L(X))^*$, 记

$$u_f(\lambda) = \langle f, R_\lambda(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)},$$

则由前述结论知

$$u_f(\lambda) = \langle f, R_\lambda(A) \rangle_{(L(X))^* \times L(X)} = \langle f, \omega(I - \omega A)^{-1} \rangle_{(L(X))^* \times L(X)} =: \tilde{u}_f(\omega)$$

是开圆盘 $\{\omega \in \mathbb{C} : |\omega| < \frac{1}{r_\sigma(A)}\}$ 内关于 ω 的解析函数. 根据解析函数的 Taylor 定理可知存在唯一展式

$$\tilde{u}_f(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \omega^n,$$

其中

$$c_n := \frac{\tilde{u}_f^{(n)}(0)}{n!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$c_0 = \tilde{u}_f^{(0)}(0) = \tilde{u}_f(0) = 0,$$

故

$$\tilde{u}_f(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \omega^n.$$

这说明当 $|\lambda| > r_\sigma(A)$ 时有

$$\begin{aligned} u_f(\lambda) &= \tilde{u}_f(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \omega^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{1}{\lambda^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_{n+1}}{\lambda^{n+1}} =: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{\lambda^{n+1}}. \end{aligned}$$

因为已知 $|\lambda| > \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} \geq r_\sigma(A)$ 时有

$$R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}} \in L(X),$$

故由 $f \in (L(X))^*$ 蕴含的连续性可知

$$u_f(\lambda) = \langle f, R_\lambda(A) \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle f, A^n \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}}{\lambda^{n+1}}.$$

由 Laurent 展式的唯一性知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有 $a_n = \langle f, A^n \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}$, 因此当 $|\lambda| > r_\sigma(A)$ 时也应该有

$$u_f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle f, A^n \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}}{\lambda^{n+1}}.$$

因为 Laurent 展式在其收敛区域内必绝对收敛, 故对任意 $\varepsilon \in (0, \infty)$ 与任意 $f \in (L(X))^*$, 由 $r_\sigma(A) + \varepsilon > r_\sigma(A)$ 知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\langle f, A^n \rangle_{(L(X))^* \times L(X)}|}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left| \left\langle f, \frac{A^n}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} \right\rangle_{(L(X))^* \times L(X)} \right| < \infty.$$

现在对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 把 $\frac{A^n}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}}$ 看成 $(L(X))^{**}$ 中的元素, 则对 $\forall f \in (L(X))^*$ 有

$$\left| \left\langle f, \frac{A^n}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} \right\rangle_{(L(X))^* \times (L(X))^{**}} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \left| \left\langle f, \frac{A^n}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} \right\rangle_{(L(X))^* \times (L(X))^{**}} \right| < \infty,$$

这说明 $\left\langle f, \frac{A^n}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} \right\rangle_{(L(X))^* \times (L(X))^{**}}$ 关于 $n \in \mathbb{N}$ 一致有界, 根据典则嵌入的等距性与一致有界原理即知存在 $M > 0$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\frac{\|A^n\|_{L(X)}}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} = \left\| \frac{A^n}{(r_\sigma(A) + \varepsilon)^{n+1}} \right\|_{(L(X))^{**}} \leq M.$$

因此对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} \leq M^{\frac{1}{n}} (r_\sigma(A) + \varepsilon)^{\frac{n+1}{n}},$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} \leq r_\sigma(A) + \varepsilon,$$

由 ε 的任意性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}} \leq r_\sigma(A).$$

结合(6.18)式, 这便得到了

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|_{L(X)}^{\frac{1}{n}}.$$

此即欲证. □

最后我们具体来研究一下右推移算子的谱.

例 6.4 设

$$X = l^2 := \left\{ \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C} : \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^2 < \infty \right\}, \quad \|\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}\|_{l^2} := \left[\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

记

$$A : l^2 \rightarrow l^2, \quad x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots),$$

则

$$\sigma_p(A) = \emptyset, \quad \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}, \quad \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\}.$$

证明 首先由 $\|A\|_{l^2 \rightarrow l^2} = \sup_{\|x\|_{l^2} \leq 1} \|Ax\|_{l^2} = 1$ 知 $A \in L(l^2)$. 又由 $\sigma(A) \subset \overline{B(0, \|A\|_{l^2})}$ 知 $\sigma(A) \subset \overline{B(0, 1)}$. 现在先证明只要 $|\lambda| \leq 1$, 就有 $\lambda \notin \sigma_p(A)$, 为此只需说明 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在. 若 $\lambda = 0$, 注意到 $Ax = 0_{l^2} \Rightarrow x = 0_{l^2}$, 故 A 为单射, 从而 A^{-1} 存在且 $0 \notin \sigma_p(A)$. 若 $\lambda \neq 0$ 且 $Ax = \lambda x$, 依 A 的定义知

$$(0, x_1, x_2, \dots) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \dots),$$

于是 $x = 0_{l^2}$, 这说明 $\lambda I - A$ 是单射, 故 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 因此 $\lambda \notin \sigma_p(A)$, 从而 $\sigma_p(A) = \emptyset$.

再说明 $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \subset \sigma_r(A)$, 为此只需说明 $|\lambda| < 1$ 时有 $\overline{R(\lambda I - A)} \subsetneq l^2$. 现令

$$z := (1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots),$$

知

$$\|z\|_{l^2} = \left(1 + \sum_{n \in \mathbb{N}} |\lambda|^{2n} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{1 - |\lambda|^2} \right)^{\frac{1}{2}} < \infty.$$

下证 $R(\lambda I - A) = \{z\}^\perp$, 其中

$$\{z\}^\perp := \{y \in l^2 : (y|z)_{l^2} = 0\}, \quad (y|z)_{l^2} := \sum_{n \in \mathbb{N}} y_n \bar{z}_n.$$

由内积连续知 $\{z\}^\perp$ 闭, 故只要 $R(\lambda I - A) \subset \{z\}^\perp$, 就有

$$\overline{R(\lambda I - A)} \subset \{z\}^\perp \subsetneq l^2,$$

这便得到了 $\lambda \in \sigma_r(A)$. 因此下面证明 $R(\lambda I - A) \subset \{z\}^\perp$.

设 $y \in R(\lambda I - A)$, 则存在 $x \in l^2$ 使得 $y = (\lambda I - A)x$, 依 A 定义知此即对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有 $y_k = \lambda x_k - x_{k-1}$, 其中 $x_0 := 0$. 于是 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\sum_{k=1}^n \lambda^{k-1} y_k = \lambda^n x_n \rightarrow 0,$$

这说明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lambda^{k-1} y_k = 0,$$

此即 $(y|z)_{l^2} = 0$, 故 $y \in \{z\}^\perp$, 由此即知 $R(\lambda I - A) \subset \{z\}^\perp$.

最后说明 $|\lambda| = 1$ 时 $\lambda \in \sigma_c(A)$, 为此只需证明

$$R(\lambda I - A) \subsetneq l^2, \quad \overline{R(\lambda I - A)} = l^2.$$

针对 $\lambda = 1$, 若记 $x_0 := 0$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有

$$\begin{aligned} l^2 \ni y = (I - A)x &\Leftrightarrow y_k = x_k - x_{k-1}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \\ &\Leftrightarrow x_k = \sum_{j=1}^k y_j, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

于是

$$R(I - A) = \left\{ y \in l^2 : \sum_{k=1}^{\infty} \left| \sum_{j=1}^k y_j \right|^2 < \infty \right\}.$$

注意若 $y^* = (y_1, y_2, \dots) = e_1 = (1, 0, \dots)$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有

$$\sum_{j=1}^k y_j = 1,$$

故 $y^* \notin R(I - A)$, 但显见 $y^* \in l^2$, 故 $R(I - A) \subsetneq l^2$.

再说明 $\overline{R(I - A)} = l^2$, 为此设 $\xi = \{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} |\xi_k|^2 < \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

记 $c := \sum_{k=1}^N \xi_k$, 取 $m \in \mathbb{N}$ 满足 $|c|^2/m < \varepsilon^2/4$, 定义

$$y_j := \begin{cases} \xi_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, N\}, \\ -\frac{c}{m}, & \forall j \in \{N+1, N+2, \dots, N+m\}, \\ 0, & \forall j \in \{N+m+1, N+m+2, \dots\}, \end{cases}$$

则对任意 $k \in \{N+m, N+m+1, \dots\}$ 有

$$\sum_{j=1}^k y_j = \sum_{j=1}^{N+m} y_j = \sum_{j=1}^N \xi_j + \sum_{j=N+1}^{N+m} \left(-\frac{c}{m}\right) = \sum_{j=1}^N \xi_j - c = 0.$$

故 $y = (I - A)x$, 其中

$$x := \left\{ y_1, y_1 + y_2, \dots, \sum_{j=1}^{N+m+1} y_j, 0, \dots \right\} \in l^2,$$

此即 $y \in R(I - A)$. 另一方面

$$\begin{aligned} \|y - \xi\|_{l^2} &= \|\{y_j - \xi_j\}_{j=N+1}^{\infty}\|_{l^2} \\ &\leq \left[\sum_{j=N+1}^{N+m} |y_j|^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\sum_{j=N+1}^{\infty} |\xi_j|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &< \frac{|c|}{\sqrt{m}} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \end{aligned}$$

故 $\overline{R(I - A)} = l^2$, 因此 $1 \in \sigma_c(A)$.

对于一般的 $|\lambda| = 1 (\lambda \neq 1)$, 注意到

$$\begin{aligned} y = (\lambda I - A)x &\Leftrightarrow y_k = \lambda x_k - x_{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad x_0 := 0, \\ &\Leftrightarrow \lambda^{k-1} y_k = \lambda^k x_k - \lambda^{k-1} x_{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad x_0 := 0, \\ &\Leftrightarrow \eta_k = \xi_k - \xi_{k-1}, \quad \eta_k := \lambda^{k-1} y_k, \quad \xi_k := \lambda^k x_k, \quad k \in \mathbb{N}, \quad \xi_0 := 0, \\ &\Leftrightarrow \eta := \{\eta_k\}_{k \in \mathbb{N}} = (I - A)\xi, \end{aligned}$$

于是

$$\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(\lambda I - A) \Leftrightarrow \{\lambda^{k-1} y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(I - A). \quad (6.19)$$

下面说明 $R(\lambda I - A) \subsetneq l^2$, 考虑反证法, 设 $R(\lambda I - A) = l^2$, 则对任意 $y := \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$ 均有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda^{-(k-1)} y_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^2,$$

于是

$$\{\lambda^{-(k-1)} y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2 = R(\lambda I - A).$$

故由(6.19)知 $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(I - A)$, 因此 $l^2 = R(I - A)$, 这与前述结论矛盾! 故 $R(\lambda I - A) \subsetneq l^2$.

再证明 $\overline{R(\lambda I - A)} = l^2$. 任取 $y := \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$, 记 $\eta_k := \lambda^{k-1} y_k (k \in \mathbb{N})$, 知

$$\|\{\eta_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} = \|\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} < \infty,$$

故 $\{\eta_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$. 因为 $\overline{R(I-A)} = l^2$, 故对任意 $\varepsilon \in (0, \infty)$ 均存在 $\xi \in R(I-A)$ 使得

$$\|\eta - \xi\|_{l^2} < \varepsilon,$$

于是

$$\|y - \{\lambda^{-(k-1)}\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} < \varepsilon.$$

又由 $\xi \in R(I-A)$ 与 (6.19) 知

$$\{\lambda^{-(k-1)}\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(\lambda I - A).$$

故 $\overline{R(\lambda I - A)} = l^2$.

至此已知 $\sigma(A) \subset \overline{B(0,1)}$, $\sigma_p(A) = \emptyset$, $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \subset \sigma_r(A)$, $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\} \subset \sigma_c(A)$, 于是

$$\begin{aligned} \overline{B(0,1)} &= \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\} \cup \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \\ &\subset \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A) \subset \sigma(A) \subset \overline{B(0,1)}, \end{aligned}$$

因此上述所有包含关系均为等号, 故

$$\sigma_p(A) = \emptyset, \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}, \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\}.$$

□

[19]1.1, 1.2 习题

习题 1.1

练习 6.1

设 X, Y 均为线性赋范空间且 $T : X \rightarrow Y$ 为线性算子, 若存在正常数 b 使得 $TB_X(0_X, 1) \subset B_Y(0_Y, b)$, 证明: 对任意 $x \in X$ 均有

$$\|Tx\|_Y \leq b\|x\|_X.$$

♠

证明 任取 $x \in X$, 取 $n \in \mathbb{N}$, 知 $\frac{nx}{(n+1)\|x\|_X} \in B_X(0_X, 1)$, 于是

$$\left\| T\left(\frac{nx}{(n+1)\|x\|_X}\right) \right\|_Y < b$$

此即

$$\|Tx\|_Y < \frac{n+1}{n}b\|x\|_X, \forall n \in \mathbb{N},$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即知 $\|Tx\|_Y \leq b\|x\|_X$.

□

练习 6.2

设 X, Y 均为线性赋范空间且 $T \in L(X, Y)$, 证明对任意 $x \in X$ 均有

$$\|Tx\|_Y \leq \|T\|_{X \rightarrow Y} \|x\|_X.$$

♠

证明 显见 $\|x/\|x\|_X\|_X = 1$, 于是

$$\left\| T\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right) \right\|_Y \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y = \|T\|_{X \rightarrow Y}.$$

由 T 是线性算子即知

$$\|Tx\|_Y \leq \|T\|_{X \rightarrow Y} \|x\|_X.$$

□

练习 6.3

设 X, Y 均为线性赋范空间, T 是 $D(T) \subset X \rightarrow Y$ 的线性算子, 则 T 在 $D(T)$ 内处处连续当且仅当 T 在 $x = 0_X$ 处连续.

证明 $\Rightarrow$ 是显然的, 往证 $\Leftarrow$. 任取 $x \in D(T)$, 设 $D(T) \ni x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则 $x_n - x \rightarrow 0_X (n \rightarrow \infty)$, 由 T 在 0_X 处连续可知

$$T(x_n - x) \rightarrow T0_X = 0_Y, \quad n \rightarrow \infty.$$

故 $Tx_n \rightarrow Tx (n \rightarrow \infty)$, 此即 T 在 x 处连续. □

练习 6.4

举例说明存在度量空间 (X, ρ) 及其中的球 $B(x_0, r) \subset B(y_0, R)$ (其中 $x_0, y_0 \in X, r, R \in (0, \infty)$), 使得 $r > R$.

证明 记 $X = ((-2, 2), |\cdot|)$, $x_0 = 3/2, r = 5/4, y_0 = R = 1$, 则 $r > R$ 的同时有 $B(x_0, r) = (1/4, 2) \subset B(y_0, R) = (0, 2)$. □

注 6.7 该题提示了度量空间未必是线性空间. 实际上任意赋范线性空间都没法做出满足题目的例子.

练习 6.5

设 A 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的线性算子, 证明

- (i) A 一定有界, 但 A 不一定是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数.
- (ii) 当且仅当 $A = 0_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}}$ 时, A 为 $\mathbb{R}$ 上的有界函数.

证明 (i) 由 A 的定义知对任意 $a, x \in \mathbb{R}$ 均有

$$A(ax) = aAx,$$

取 $x = 1$ 知

$$A(a) = aA(1),$$

于是对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有

$$A(x) = A(1)x.$$

故显见 $\|A\|_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}} \leq A(1)$, 因此 A 有界. 但只要 $A(1) \neq 0$, A 就不是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数.

(ii) $\Rightarrow$ 显见, 往证 $\Leftarrow$. 设存在 $M > 0$ 使得 $|Ax| = |A(1)x| \leq M$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均成立. 若 $A(1) \neq 0$, 则取 $x = 2M/A(1)$ 即得矛盾, 故 $A(1) = 0$, 此即 $Ax \equiv 0$, 亦即 $A = 0_{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}}$. □

练习 6.6

设 X, Y 都是 B^* 空间, $T \in L(X, Y)$, 从 $\|T\|_{X \rightarrow Y} := \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y$ 出发证明

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_Y.$$

证明 $\|T\|_{X \rightarrow Y} \leq \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_Y$ 显然成立, 同时显见 $T = 0_{X \rightarrow Y}$ 时结论成立, 故往证 $\|T\|_{X \rightarrow Y}$ 时 $\|T\|_{X \rightarrow Y} \geq \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_Y$, 为此又只需证明 $\|T\|_{X \rightarrow Y} \geq \sup_{0 < \|x\|_X < 1} \|Tx\|_Y$. 现任取 $x \in X$ 满足 $0 < \|x\|_X < 1$, 记

$$x_n = \left(\frac{1}{n+1} + \frac{n}{(n+1)\|x\|_X} \right) x,$$

显见 $x_n \rightarrow x/\|x\|_X (n \rightarrow \infty)$. 既然 $T \in L(X, Y)$, 故 $Tx_n \rightarrow T(x/\|x\|_X) (n \rightarrow \infty)$, 依定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N (\|T(x/\|x\|_X)\|_Y > \|Tx_n\|_Y - \varepsilon).$$

显见

$$\frac{1}{n+1} + \frac{n}{(n+1)\|x\|_X} > 1$$

于是

$$\|Tx_n\|_Y = \left(\frac{1}{n+1} + \frac{n}{(n+1)\|x\|_X} \right) \|Tx\|_Y > \|Tx\|_Y,$$

这说明对任意 $\varepsilon > 0$ 均有

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} \geq \|T(x/\|x\|_X)\|_Y > \|Tx\|_Y - \varepsilon,$$

由 ε 的任意性即知对全体 $0 < \|x\|_X < 1$ 均有

$$\|Tx\|_Y \leq \|T\|_{X \rightarrow Y},$$

对上式两端在 $\{x \in X : 0 < \|x\|_X < 1\}$ 中取上确界即得

$$\sup_{0 < \|x\|_X < 1} \|Tx\|_Y \leq \|T\|_{X \rightarrow Y}.$$

□

注 6.8 对于 $\|T\|_{X \rightarrow Y} \geq \sup_{0 < \|x\|_X < 1} \|Tx\|_Y$ 有更简单的证法. 事实上任取 $x \in B(0_X, 1) \setminus \{0_X\}$, 知

$$\|Tx\|_Y = \|x\|_X \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|_X} \right) \right\|_Y \leq \|x\|_X \|T\|_{X \rightarrow Y} \leq \|T\|_{X \rightarrow Y},$$

两端对 x 取上确界即得结论.

□

练习 6.7

令 $X := (0, \infty)$, 且对任意 $x, y \in X$ 令

$$\rho(x, y) := |x - y|.$$

证明 $(0, 1)$ 为 X 的开集, $(0, 1]$ 为 X 的闭集.

♠

证明 任取 $x \in (0, 1)$, 显见 $B(x, \min(|x|, |1-x|)/2) \subset (0, 1)$, 故 $(0, 1)$ 为开集. 为证 $(0, 1]$ 为 X 的闭集, 只需证 $(0, 1] = (1, \infty)^c$ 为 X 的开集. 任取 $x \in (1, \infty)$, 显见 $B(x, |1-x|/2) \subset (1, \infty)$, 故 $(1, \infty)$ 为 X 的开集. □

练习 6.8

设 X 为 B^* 空间, 证明 $E \subset X$ 有界当且仅当存在 $x_0 \in X$ 及 $R \in (0, \infty)$ 使得 $E \subset B(x_0, R)$.

♠

证明 $\Rightarrow$ 依有界定义立得, 往证 $\Leftarrow$. 任取 $x \in E$, 知 $\|x - x_0\|_X < R$, 于是 $\|x\|_X < \|x_0\|_X + R$, 这说明 $E \subset B(0_X, \|x_0\|_X + R)$, 故 E 有界. □

练习 6.9

设 X, Y 均为线性赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 为线性算子, 令

$$N(T) := \{x \in X : Tx = 0_Y\}.$$

证明:

- (i) 若 $T \in L(X, Y)$, 则 $N(T)$ 是 X 的闭线性子空间.
- (ii) 若 $Y = \mathbb{K}$, 则 $T \in X^* = L(X, \mathbb{K}) \Leftrightarrow N(T)$ 是 X 的闭线性子空间.
- (iii) 举例说明对一般的 Y , (ii) 未必成立.

♠

证明 (i) $N(T)$ 的线性性由 T 的线性性立得, 往证闭性, 为此设 $N(T) \ni x_n \rightarrow x \in X$, 则 $Tx_n \equiv 0_Y$, 由 T 的连续性即知 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = 0$, 故 $x \in N(T)$.

(ii) $\Rightarrow$ 即为 (i), 往证 $\Leftarrow$, 为此考虑反证法. 设 $T: X \rightarrow \mathbb{K}$ 是无界线性算子, 则存在有界集 $\{x_n\} \subset X$ 使得 $|Tx_n| \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, 进而必存在 $N > 0$ 使得只要 $n > N$, 就有 $|Tx_n| > 0$. 不妨设 $\|x_n\|_X \leq M (\forall n)$, 现记

$y_n := x_n/Tx_n (n > N)$, 则由线性性知 $T(y_n) \equiv 1$, 另一方面知 $T(x_{N+1}/Tx_{N+1}) = 1$, 于是

$$T(y_n - x_{N+1}/Tx_{N+1}) = 0, \forall n > N,$$

这说明 $\{y_n - x_{N+1}/Tx_{N+1}\}_{n>N} \subset N(T)$. 另一方面由 $|Tx_n| \rightarrow \infty$ 知

$$\|y_n\|_X = \left\| \frac{x_n}{Tx_n} \right\|_X \leq \frac{M}{|Tx_n|} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

故在 X 的意义下有 $y_n - x_{N+1}/Tx_{N+1} \rightarrow -x_{N+1}/Tx_{N+1}$, 由 $N(T)$ 闭知 $x_{N+1}/Tx_{N+1} \in N(T)$, 但 $Tx_{N+1} \neq 0$, 矛盾! 故只能有 $T \in X^*$.

(iii) 取

$$T: l^2 \rightarrow l^2, (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, 2x_2, \dots, nx_n, \dots),$$

则 $N(T) = \{0_{l^2}\}$ 是 l^2 的闭线性子空间, 但取 e_n 为第 n 个单位向量立知 $\|e_n\|_{l^2} = 1 (\forall n)$ 的同时 $\|Te_n\|_{l^2} \rightarrow \infty$, 故 $T \notin L(l^2)$. $\square$

习题 1.2

练习 6.10

设 X 是有限维 Banach 空间, $A: X \rightarrow X$ 是有界线性算子, 则对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, λ 要么是 A 的正则值, 要么是 A 的特征值.

证明 若 $\dim X < \infty$, $A \in L(X)$, 则 A 完全由一个矩阵确定. 现在对于 $\lambda \in \mathbb{C}$, 要么 $|\lambda I - A| = 0$, 要么 $|\lambda I - A| \neq 0$, 其中 $|\cdot|$ 是行列式函数, I 是单位矩阵. 对于 $|\lambda I - A| = 0$ 的情况, 知存在 $x_0 \in X \setminus \{0_X\}$ 使得 $(\lambda I - A)x_0 = 0_X$, 因此 λ 是 A 的特征值. 对于 $|\lambda I - A| \neq 0$ 的情况, 知此时 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 故 λ 是 A 的正则值. $\square$

练习 6.11

设 X 为 Banach 空间.

(i) 令 $G := \{A \in L(X) : A^{-1} \in L(X)\}$, 证明 G 为开集.

(ii) 设 T 为 G 的边界点, 设 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset G$ 且在 $L(X)$ 中, 有 $T_n \rightarrow T (n \rightarrow \infty)$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} = \infty.$$

证明 (i) 任取 $A \in G$, 往证存在 $\delta = \delta(A) > 0$ 使得只要 $T \in L(X)$ 满足 $\|T\|_{X \rightarrow X} < \delta(A)$, 就有 $T + A \in G$. 现在先待定 δ , 注意到 $T + A \in L(X)$ 是显然的, 下面证明 $(T + A)^{-1} \in L(X)$. 注意到

$$(T + A)^{-1} = A^{-1}(I + A^{-1}T)^{-1},$$

因为已知 $A^{-1} \in L(X)$, 故只需证明 $(I + A^{-1}T)^{-1} \in L(X)$, 而引理 6.1 表明这又只需说明 $\|A^{-1}T\|_{X \rightarrow X} < 1$. 为此取 $\delta = \|A^{-1}\|_{X \rightarrow X}^{-1}/2$ 即可.

(ii) 因为 G 是开集, 故 $T \in \partial G$ 表明 $T \notin G$, 进而 $T^{-1} \notin L(X)$, 这可以分为两种情况: 要么 T 不是单射, 要么 T^{-1} 存在但 $\|T^{-1}\|_{X \rightarrow X} = \infty$. 下面分别进行讨论.

若 T 不是单射, 设 $0_X \neq x \in X$ 满足 $Tx = 0_X$, 则由 $T_n \rightarrow T (L(X))$ 知在 X 的意义下有:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N (\|T_n x - Tx\|_X = \|T_n x\|_X < \varepsilon \|x\|_X).$$

因为对每个取定的 n 均有 $T_n^{-1} \in L(X)$, 故

$$\|x\|_X = \|T_n^{-1} T_n x\|_X \leq \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} \|T_n x\|_X,$$

进而

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N (\|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} > \varepsilon^{-1}),$$

这正是 $\|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 的定义.

若 T^{-1} 存在但 $\|T^{-1}\|_{X \rightarrow X} = \infty$, 则由定义知

$$\forall K \in \mathbb{N} \exists x_K \in \partial B(0_X, 1) (\|T^{-1}x_K\|_X > K).$$

记 $y_K = T^{-1}x_K$, 则 $x_K = Ty_K$. 因为 $n \rightarrow \infty$ 时 $T_n \rightarrow T(L(X))$, 故在 X 的意义下有 $T_n y_K \rightarrow Ty_K = x_K (n \rightarrow \infty)$, 依定义知

$$\exists N > 0 \forall n > N (\|x_K - T_n y_K\|_X < K^{-2}).$$

现在考察 $T_n^{-1}(x_K - T_n y_K) (n > N)$, 一方面有

$$\|T_n^{-1}(x_K - T_n y_K)\|_X \leq \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} \|x_K - T_n y_K\|_X < K^{-2} \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X},$$

另一方面有

$$\|T_n^{-1}(x_K - T_n y_K)\|_X \geq \|y_K\|_X - \|T_n^{-1}x_K\|_X > K - \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} \|x_K\|_X = K - \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X}.$$

于是综合有

$$\|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} \geq \frac{K}{K^{-2} + 1} = \frac{K^3}{1 + K^2}, \quad n > N = N(K).$$

令 $K \rightarrow \infty$ 即得待证式. □

注 6.9 (ii) 也可以用反证法写. 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} < \infty$, 则由定义知存在 $K \in (0, \infty)$ 与子列 $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ 使得 $\|T_{n_k}^{-1}\|_{X \rightarrow X} < K$, 由此与 $T_{n_k} \rightarrow T(L(X))$ 知存在 $N > \mathbb{N}$ 使得

$$\|T_N^{-1}\|_{X \rightarrow X} < K, \quad \|T_N - T\|_{X \rightarrow X} < \frac{1}{K},$$

此时

$$\|I - T_N^{-1}T\|_{X \rightarrow X} = \|T_N^{-1}(T_N - T)\|_{X \rightarrow X} \leq \|T_N^{-1}\|_{X \rightarrow X} \|T_N - T\|_{X \rightarrow X} < 1,$$

于是 von Neumann 引理表明 $T_N^{-1}T$ 有有界逆, 这也就是 T 有有界逆, 这与 $T \notin G$ 矛盾! 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n^{-1}\|_{X \rightarrow X} = \infty$. □

练习 6.12

考虑 l^2 上的左推移算子

$$A := (\xi_1, \xi_2, \dots) \mapsto (\xi_2, \xi_3, \dots),$$

证明 $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$, $\sigma_r(A) = \emptyset$. ♠

证明 显见 $A \in L(l^2)$ 且 $\|A\|_{l^2 \rightarrow l^2} = 1$, 于是 $\sigma(A) \subset \overline{B(0, 1)}$. 若 $|\lambda| < 1$, 则取 $0_{l^2} \neq \xi = (1, \lambda, \dots, \lambda^n, \dots) \in l^2$ 知

$$A\xi = (\lambda, \dots, \lambda^n, \dots) = \lambda\xi,$$

故 $\lambda I - A$ 并非单射, 此时 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在, 故 $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \subset \sigma_p(A)$.

若 $|\lambda| = 1$, 首先说明 $\lambda = 1$ 的情形, 往证 $R(I - A) \subsetneq l^2$, $\overline{R(I - A)} = l^2$. 为此设 $(y_1, \dots, y_k, \dots) = (1, \dots, 1/k, \dots) \in l^2$, 若存在 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k, \dots) \in l^2$ 使得 $y = (I - A)\xi$, 则

$$\begin{cases} y_0 := -\xi_1 \\ y_1 = \xi_1 - \xi_2, \\ y_2 = \xi_2 - \xi_3, \\ \vdots \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi_1 = -y_0, \\ \xi_2 = -y_0 - y_1, \\ \xi_3 = -y_0 - y_1 - y_2, \\ \vdots \end{cases}$$

根据 $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的构造显见 $\xi_k = -y_0 - \sum_{n=1}^{k-1} y_n$. 现在一方面 $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$, 另一方面由 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 发散知无论怎样取定 y_0 , 总会存在 $K > 0$ 使得 $k > K$ 时 $|\xi_k| > 1$, 于是 $\{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \notin l^2$, 矛盾! 故实际上 $(1, \dots, 1/k, \dots) \notin R(I - A)$.

再说明 $\overline{R(I - A)} = l^2$. 任取 $(y_1, \dots, y_k, \dots) \in l^2$, 知对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $N > 0$ 使得

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |y_n|^2 < \varepsilon.$$

记 $y_N^* = (y_1, \dots, y_N, 0, \dots)$, 求解 $y_N^* = (I - A)\xi_N^*$ 并令 $y_0 = -\sum_{n=1}^N y_n$ 知

$$\xi_N^* = \left(\sum_{n=1}^N y_n, \sum_{n=2}^N y_n, \dots, y_N, 0, \dots \right) \in l^2,$$

于是 $y_N^* \in R(I - A)$, 且

$$\|\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} - y_N^*\|_{l^2} = \|\{y_k\}_{k \geq N+1}\|_{l^2} < \varepsilon,$$

故 $\overline{R(I - A)} = l^2$, 至此已知 $1 \in \sigma_c(A)$.

对于 $|\lambda| = 1 (\lambda \neq 1)$, 注意到

$$\begin{aligned} y = (\lambda I - A)\xi &\Leftrightarrow y_k = \lambda \xi_k - \xi_{k+1}, \quad k \in \mathbb{N}, \\ &\Leftrightarrow \lambda^{-k} y_k = \lambda^{-(k-1)} \xi_k - \lambda^{-k} \xi_{k+1}, \quad k \in \mathbb{N}, \\ &\Leftrightarrow \eta_k = \gamma_k - \gamma_{k+1}, \quad \eta_k := \lambda^{-k} y_k, \quad \gamma_k = \lambda^{-(k-1)} \xi_k, \quad k \in \mathbb{N}, \\ &\Leftrightarrow \eta := \{\eta_k\}_{k \in \mathbb{N}} = (I - A)\gamma, \end{aligned}$$

这说明

$$\{\eta_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(\lambda I - A) \Leftrightarrow \{\lambda^{-k} y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(I - A). \quad (6.20)$$

下面说明 $R(\lambda I - A) \subsetneq l^2$. 为此设 $R(\lambda I - A) = l^2$, 则对任意 $y := \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$ 知

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda^k y_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^2,$$

于是

$$\{\lambda^k y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2 = R(\lambda I - A),$$

这表明 $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(I - A)$, 于是 $l^2 = R(I - A)$, 这与前述结论矛盾! 故 $R(\lambda I - A) \subsetneq l^2$.

再证明 $\overline{R(\lambda I - A)} = l^2$. 任取 $y := \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$, 记 $\gamma_k := \lambda^{-k} y_k (k \in \mathbb{N})$, 知

$$\|\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} = \|\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} < \infty,$$

故 $\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2$. 因为 $\overline{R(I - A)} = l^2$, 故对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $\xi \in R(I - A)$ 使得

$$\|\{\gamma_k\}_{k \in \mathbb{N}} - \xi\|_{l^2} < \varepsilon,$$

于是

$$\|y - \{\lambda^k \xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} < \varepsilon,$$

又由 $\xi \in R(I - A)$ 与 (6.20) 知 $\{\lambda^k \xi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(\lambda I - A)$, 故 $\overline{R(\lambda I - A)} = l^2$, 因此 $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\} \subset \sigma_c(A)$.

最后, 知

$$\begin{aligned} \overline{B(0, 1)} &\supset \sigma(A) \supset \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \\ &\supset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \cup \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\} = \overline{B(0, 1)}, \end{aligned}$$

故上述全体包含关系均为相等, 至此即得待证结论. □

练习 6.13

利用 $S^n y = \sum_{k=0}^n A^k y$ 证明下述命题: 设 X 为 Banach 空间, $A \in L(X)$ 满足 $\|A\|_{X \rightarrow X} < 1$, 则 $(I - A)^{-1} \in L(X)$, 且

$$\|(I - A)^{-1}\|_{X \rightarrow X} \leq \frac{1}{1 - \|A\|_{X \rightarrow X}}.$$



证明 任取 $y \in X$, 首先证明 $S^n y$ 存在极限, 由 $\|A\|_{X \rightarrow X} < 1$ 知

$$\begin{aligned}\|S^{n+m}y - S^n y\|_X &\leq \|S^{n+m}y - S^{n+m-1}y\|_X + \cdots + \|S^{n+1}y - S^n y\|_X \\ &\leq (\|A^{m-1}\|_{X \rightarrow X} + \cdots + \|A\|_{X \rightarrow X} + 1)\|S^{n+1}y - S^n y\|_X \\ &\leq \frac{1 - \|A\|_{X \rightarrow X}^m}{1 - \|A\|_{X \rightarrow X}} \|A\|_{X \rightarrow X}^n \|y\|_X \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

故 $\{S^n y\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 由 X 完备知存在 $x_y \in X$ 使得

$$x_y = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n y = \sum_{k=0}^{\infty} A^k y.$$

由极限的线性性知 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 是线性算子, 又因为

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} A^k \right\|_{X \rightarrow X} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|_{X \rightarrow X}^k = \frac{1}{1 - \|A\|_{X \rightarrow X}} < \infty,$$

故 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k \in L(X)$. 另一方面知

$$(I - A)x_y = \sum_{k=0}^{\infty} A^k y - \sum_{k=1}^{\infty} A^k y = y,$$

故 $x_y = (I - A)^{-1}y$. 由 y 的任意性即知

$$(I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k.$$

因此一方面有 $(I - A)^{-1} \in L(X)$, 另一方面有

$$\|(I - A)^{-1}\|_{X \rightarrow X} = \left\| \sum_{k=0}^{\infty} A^k \right\|_{X \rightarrow X} \leq \frac{1}{1 - \|A\|_{X \rightarrow X}}.$$

□

练习 6.14

设 X 是 Banach 空间, $A, A^{-1} \in L(X)$, 证明

$$\sigma(A^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(A)\}.$$

♠

证明 既然 $A, A^{-1} \in L(X)$, 故 $0 \in \rho(A^{-1})$. 注意到在形式上有

$$\lambda I - A^{-1} = (\lambda A - I)A^{-1} = -\lambda(\lambda^{-1}I - A)A^{-1}.$$

现设 $\lambda \in \sigma(A^{-1})$, 下面分三种情况进行讨论.

若 $\lambda \in \sigma_p(A^{-1})$, 则 $\lambda I - A^{-1}$ 不是单射, 亦即存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $(\lambda I - A^{-1})x_1 = (\lambda I - A^{-1})x_2$. 依照前述计算知

$$\lambda^{-1}I - A = -\lambda^{-1}A(\lambda I - A^{-1}),$$

于是 $(\lambda^{-1}I - A)x_1 = (\lambda^{-1}I - A)x_2$, 故 $\lambda^{-1}I - A$ 同样不是单射, 因此 $\lambda^{-1} \in \sigma_p(A)$.

若 $\lambda \in \sigma_c(A^{-1})$, 则 $R(\lambda I - A^{-1}) \subsetneq X, \overline{R(\lambda I - A^{-1})} = X$. 既然 $A = (A^{-1})^{-1}$, 故 $R(A^{-1}) = X$, 另由前述计算知 $R(\lambda I - A^{-1}) = R((\lambda^{-1}I - A)A^{-1}) \subsetneq X$, 故只能有 $R(\lambda^{-1}I - A) \subsetneq X$, 同理知 $\overline{R(\lambda^{-1}I - A)} = X$, 故 $\lambda^{-1} \in \sigma_c(A)$.

最后若 $\lambda \in \sigma_r(A^{-1})$, 则 $\overline{R(\lambda I - A^{-1})} \subsetneq X$. 与前一情形同理, 由 $R(A^{-1}) = X$ 与前述计算即知 $\overline{R(\lambda^{-1}I - A)} \subsetneq X$, 故 $\lambda^{-1} \in \sigma_r(A)$. 至此即证 $\sigma(A^{-1}) \subset \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(A)\}$. 因为 $A = (A^{-1})^{-1}$, 故重复前述过程可知 $\sigma(A) \subset \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(A^{-1})\}$, 故 $\{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(A)\} \subset \sigma(A^{-1})$, 至此即证待证式. □

练习 6.15

设 X 是 Banach 空间, $T \in L(X)$, 证明:

(i) 若 $\lambda \in \rho(T)$, 则

$$B(\lambda, \|(\lambda I - T)^{-1}\|_{X \rightarrow X}^{-1}) \subset \rho(T);$$

(ii) 若 $\lambda \in \partial\rho(T)$, 其中 $\partial\rho(T)$ 表示 $\rho(T)$ 的边界, 则存在一列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $\|x_n\|_X = 1$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n - \lambda x_n\|_X = 0.$$

证明 (i) 任取 $\eta \in B(\lambda, \|(\lambda I - T)^{-1}\|_{X \rightarrow X}^{-1})$, 知

$$\begin{aligned} \eta I - T &= (\eta - \lambda)I + (\lambda I - T) \\ &= (\lambda I - T)(I + (\eta - \lambda)(\lambda I - T)^{-1}). \end{aligned}$$

由 B 的定义知

$$\|(\lambda - \eta)(\lambda I - T)^{-1}\|_{X \rightarrow X} < 1,$$

于是由引理 6.1 知 $(I + (\eta - \lambda)(\lambda I - T)^{-1})^{-1} \in L(X)$, 故

$$(\eta I - T)^{-1} = (I + (\eta - \lambda)(\lambda I - T)^{-1})^{-1}(\lambda I - T)^{-1} \in L(X),$$

此即待证结论.

(ii) 考虑反证法, 设存在常数 $M > 0$ 使得对任意 $x \in \partial B(0_X, 1)$ 均有 $\|Tx - \lambda x\|_X \geq M$, 这说明 $T - \lambda I$ 是单射, 于是 $(T - \lambda I)^{-1}$ 首先存在. 任取 $0_X \neq x \in X$, 记 $y = (T - \lambda I)^{-1}x$, 则 $x = (T - \lambda I)y$, 于是

$$\|x\|_X = \|(T - \lambda I)y\|_X \geq \|(T - \lambda I)(y/\|y\|_X)\|_X \|y\|_X \geq M\|y\|_X,$$

这说明

$$\|(T - \lambda I)^{-1}x\|_X \leq \frac{1}{M}\|x\|_X \Rightarrow \|(T - \lambda I)^{-1}\|_{X \rightarrow X} \leq \frac{1}{M},$$

故 $(T - \lambda I)^{-1} \in L(X)$, 亦即 $\lambda \in \rho(T)$. 但 $\rho(T)$ 是开集, 故此时不再有 $\lambda \in \partial\rho(T)$, 矛盾! $\square$

下面的习题旨在研究微分算子的谱. 我们首先回忆弱导数与 Sobolev 空间的相关概念. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是连通开集. 对于定义在 Ω 上的函数 u 而言, 若对任意 $x \in \Omega$ 均存在 $r \in (0, \infty)$ 使得 $u\chi_{B(x,r)} \in L^1(\Omega)$, 就称 u 在 Ω 上局部可积, 记 Ω 上的全体局部可积函数构成的集合为 $L^1_{loc}(\Omega)$. 对于 $L^1_{loc}(\Omega)$ 中的元素, 我们可以定义弱导数: 对于 $u \in L^1_{loc}(\Omega)$ 与多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$, 若存在 $g \in L^1_{loc}(\Omega)$ 满足对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 有

$$\int_{\Omega} g(x)\varphi(x)dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} u(x)D^\alpha \varphi(x)dx,$$

就称 g 是 u 的 α 阶弱导数, 记作 $g = \tilde{D}^\alpha u$, 其中

$$D^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n}.$$

对任意 $m \in \mathbb{N}$, 令

$$H^m(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \tilde{D}^\alpha u \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq m\}.$$

称 $H^m(\Omega)$ 为 Sobolev 空间. 对 $u \in H^m(\Omega)$, 记

$$\|u\|_{H^m(\Omega)} = \left[\sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{D}^\alpha u\|_{L^2(\Omega)}^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

方便起见, 我们再回忆一下 Fourier 变换及其性质. 任取 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, 记

$$\mathcal{F}[f](\xi) = \hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-i2\pi x \cdot \xi} dx$$

称 $\hat{f}$ 为 f 的 Fourier 变换. 通过 Hahn-Banach 定理可以说明 $\mathcal{F}$ 可以延拓为 $L^2 \rightarrow L^2$ 的有界线性算子, 且有

Plancherel 公式成立:

$$\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

练习 6.16

本题说明 Fourier 变换的乘法公式与 Sobolev 空间的 Fourier 刻画.

(i) 对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\widehat{g}(x)dx.$$

(ii) 设 $m \in \mathbb{N}^*$, 则 $f \in H^m(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $(1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 另外, 存在正常数 C_1, C_2 使得

$$C_1 \|f\|_{H^m(\mathbb{R}^n)} \leq \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C_2 \|f\|_{H^m(\mathbb{R}^n)}.$$

证明 (i) 首先设 $f, g \in L^1 \cap L^2$, 根据 Fubini 定理知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)g(x)dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(y)e^{-i2\pi y \cdot x} dy \right] g(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} g(x)e^{-i2\pi y \cdot x} dx \right] f(y)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\widehat{g}(x)dx. \end{aligned}$$

对于 $f, g \in L^2$, 因为 $L^1 \cap L^2$ 在 L^2 中稠密, 故存在 $\{f_n\}, \{g_n\} \subset L^1 \cap L^2$ 使得 $n \rightarrow \infty$ 时 $f_n \rightarrow f(L^2), g_n \rightarrow g(L^2)$, 由 Plancherel 定理即知 $\widehat{f}_n \rightarrow \widehat{f}(L^2), \widehat{g}_n \rightarrow \widehat{g}(L^2)$, 进而由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \|\widehat{f}_n g_n - \widehat{f} g\|_{L^1} &\leq \|\widehat{f}_n g_n - \widehat{f}_n g\|_{L^1} + \|\widehat{f}_n g - \widehat{f} g\|_{L^1} \\ &\leq \|\widehat{f}_n\|_{L^2} \|g_n - g\|_{L^2} + \|g\|_{L^2} \|\widehat{f}_n - \widehat{f}\|_{L^2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故 $\widehat{f}_n g_n \rightarrow \widehat{f} g(L^1)$, 同理可证 $\widehat{g}_n f_n \rightarrow \widehat{g} f(L^1)$, 于是由控制收敛定理知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)g(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}_n(x)g_n(x)dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}_n(x)f_n(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(x)f(x)dx. \end{aligned}$$

(ii) 若 $f \in H^m(\mathbb{R}^n)$, 则显然 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且由 Plancherel 定理知

$$\|\widetilde{D}^\alpha f\|_{L^2} = C_\alpha \|(\cdot)^\alpha \widehat{f}\|_{L^2} < \infty, \quad \forall |\alpha| \leq m,$$

于是

$$\begin{aligned} \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \widehat{f}\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m \widehat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &\leq C \sum_{k=0}^m \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2k} \widehat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &= C \sum_{k=0}^m \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{l=1}^n \xi_l^2 \right)^k \widehat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (\xi^\alpha)^2 \widehat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &= C \sum_{|\alpha| \leq m} \|(\cdot)^\alpha \widehat{f}\|_{L^2}^2 = C \sum_{|\alpha| \leq m} \|\widetilde{D}^\alpha f\|_{L^2}^2 \\ &= C \|f\|_{H^m}^2 < \infty, \end{aligned}$$

故 $(1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \widehat{f} \in L^2$, 且 $\|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \widehat{f}\|_{L^2} \leq C \|f\|_{H^m}$.

另一方面, 若 $f \in L^2, (1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \hat{f} \in L^2$, 则

$$\begin{aligned}\|f\|_{H^m}^2 &= \sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{D}^\alpha f\|_{L^2}^2 \\ &= C \sum_{|\alpha| \leq m} \|(\cdot)^\alpha \hat{f}\|_{L^2}^2 \\ &\leq C_m \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (\xi^\alpha)^2 \hat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &\leq C_m \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m \hat{f}(\xi)^2 d\xi \\ &= C_m \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{m}{2}} \hat{f}\|_{L^2}^2 < \infty,\end{aligned}$$

故 $f \in H^m$, 结合前两条估计即得待证估计. $\square$

练习 6.17

考虑 $L^2(0, \infty)$ 上的微分算子

$$A : x(t) \mapsto x'(t), \quad D(A) := H^1(0, \infty).$$

则 $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda < 0\}, \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\}, \sigma_r(A) = \emptyset$.

证明 首先说明 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > 0\} \subset \rho(A)$. 任取 $\lambda \in \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > 0\}$, 首先说明 $\lambda I - A$ 为单射. 事实上, 若 $x \in L^2(0, \infty)$ 满足 $(\lambda I - A)x = 0$, 则

$$x' = \lambda x \Rightarrow x(t) = x(0)e^{\lambda t},$$

因为 $x \in L^2(0, \infty)$, 由 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ 知只能有 $x(0) = 0$, 因此 $x(t) \equiv 0$, 由此可知 $(\lambda I - A)^{-1} : L^2(0, \infty) \rightarrow D(A) \subset L^2(0, \infty)$ 首先存在.

再证明 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(L^2(0, \infty))$, 任取 $x \in L^2(0, \infty)$, 记 $y = (\lambda I - A)^{-1}x$, 则

$$x = (\lambda I - A)y = \lambda y - y' \Rightarrow y = e^{\lambda t} \left[y(0) - \int_0^t e^{-\lambda \tau} x(\tau) d\tau \right].$$

既然 $y \in L^2(0, \infty)$, 故不妨令 $y(0) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} x(t) dt$, 此时 $y = e^{\lambda(\cdot)} \mathbf{1}_{\{\cdot \leq 0\}} * x$, 于是由 Young 卷积不等式知

$$\|y\|_{L^2} \leq \|e^{\lambda(\cdot)} \mathbf{1}_{\{\cdot \leq 0\}}\|_{L^1} \|x\|_{L^2} \leq C \|x\|_{L^2},$$

由 x 的任意性即知 $\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L^2(0, \infty) \rightarrow D(A)} < \infty$, 故 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > 0\} \subset \rho(A)$.

下面说明 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda < 0\} \subset \sigma_p(A)$. 当 $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 时, 取 $x(t) = e^{\lambda t}$, 显见 $x \in L^2(0, \infty)$, 且

$$(\lambda I - A)x(t) = \lambda e^{\lambda t} - \lambda e^{\lambda t} = 0,$$

故 $\lambda I - A$ 不是单射, 即 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在, 因此 $\lambda \in \sigma_p(A)$.

最后说明 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\} \subset \sigma_c(A)$, 为此只需说明 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2(0, \infty), \overline{R(\lambda I - A)} = L^2(0, \infty)$. 为证 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2(0, \infty)$, 取 $g(x) = \mathbf{1}_{(1, \infty)} |x|^{-\frac{1}{2}-\alpha}$ ($0 < \alpha < 1/2$), 显见 $g \in L^2(0, \infty)$. 现设 $\lambda = ih$ ($h \neq 0$) (注意 $h = 0$ 时一方面取 $f(x) = x \mathbf{1}_{\{0 < x \leq 1\}} + 2 \mathbf{1}_{\{1 < x \leq 2\}}$ 即知 $f \in L^2 \setminus H^1$, 另一方面用 L^p 函数的光滑函数逼近立得 $\overline{H^1(0, \infty)}^{L^2(0, \infty)} = L^2(0, \infty)$, 因此 $0 \in \sigma_c(A)$), 若存在 $f \in L^2(0, \infty)$ 使得 $(ihI - A)f = g$, 则当 x 足够大时有

$$(e^{-ihx} f)' = -x^{-\frac{1}{2}-\alpha},$$

取足够大的 $M > 0$, 将上式两端在 (x, M) 上积分知

$$e^{-ihM} f(M) - e^{-ihx} f(x) = -\left(\frac{1}{2} - \alpha\right) (M^{\frac{1}{2}-\alpha} - x^{\frac{1}{2}-\alpha}).$$

此即

$$f(x) = e^{ihx} \left(\frac{1}{2} - \alpha\right) (M^{\frac{1}{2}-\alpha} - x^{\frac{1}{2}-\alpha}) + e^{ihM - ihx} f(M).$$

因为 M 是任取的, 故在上式中令 $M \rightarrow \infty$ 可知 x 足够大时 $|f(x)| = \infty$, 矛盾! 故 $g \notin R(\lambda I - A)$.

再说明 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(0, \infty)$. 因为 $L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty)$ 在 $L^2(0, \infty)$ 中稠密, 故只需证明 $L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty) \subset \overline{R(\lambda I - A)}$ 即可. 进一步定义

$$X := \left\{ f \in L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty) : \exists M > 0 \forall t > M \left(\int_0^t e^{-ihx} f dx = 0 \right) \right\},$$

下面首先说明 X 在 $L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty)$ 中依 L^2 范数稠密. 任取 $f \in L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty)$, 记

$$f_k(x) := \begin{cases} f(x), & x \in (0, k], \\ -\operatorname{sgn} \left(\int_0^k e^{-ihx} f dx \right) \frac{e^{ihx}}{x}, & x \in (k, ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}], \\ 0, & x > ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}, \end{cases}$$

一方面由 $\operatorname{supp} f_k \subset (0, ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}]$ 知必有 $f_k \in L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty)$, 另一方面取 $M = ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}$ 即知 $t > M$ 时 $\int_0^t e^{-ihx} f_k dx = 0$, 故 $\{f_k\} \subset X$. 下面说明 $f_k \rightarrow f$ (L^2). 事实上

$$\begin{aligned} \|f_k - f\|_{L^2}^2 &= \int_k^{ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}} \left| f + \operatorname{sgn} \left(\int_0^k e^{-ihx} f dx \right) \frac{e^{ihx}}{x} \right|^2 dx + \int_{ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}}^\infty |f|^2 dx \\ &\leq 2C \left(\int_k^\infty |f|^2 dx + \int_k^\infty \frac{dx}{x^2} \right) + \int_{ke^{|\int_0^k e^{-ihx} f dx|}}^\infty |f|^2 dx \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

下面说明 $X \subset R(\lambda I - A)$. 任取 $g \in X$, 设 $\lambda = ih$ ($h \neq 0$), 考虑下述弱导数意义下的微分方程:

$$\begin{cases} (ihI - A)f = g, \\ f(0) = 0, \end{cases}$$

解得

$$f(x) = e^{ihx} \int_0^x e^{-ih\tau} g(\tau) d\tau.$$

由 $g \in X$ 知 f 在 $(0, \infty)$ 上紧支, 故 $f \in L^2(0, \infty)$, 进一步由 Lebesgue 积分的微积分基本定理知 $f' \in L^2(0, \infty)$, 故 $f \in D(A)$, 进而 $g \in R(\lambda I - A)$.

最后因为 X 在 $L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty)$ 中依 L^2 范数稠密, 故 $R(\lambda I - A)$ 在 $L^1(0, \infty) \cap L^2(0, \infty)$ 中依 L^2 范数稠密. 又因为后者在 $L^2(0, \infty)$ 中稠密, 利用对角线论证立得 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(0, \infty)$. 故 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\} \subset \sigma_c(A)$. 现在因为

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &= \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > 0\} \cup \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\} \cup \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda < 0\} \\ &\subset \rho(A) \cup \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \subset \mathbb{C}, \end{aligned}$$

故上述包含关系均为相等, 至此即得待证结论. $\square$

练习 6.18

考虑 $L^2(\mathbb{R})$ 上的微分算子

$$A : x(t) \mapsto x'(t), \quad D(A) := H^1(\mathbb{R}).$$

证明 $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\}$ 且 $\sigma_p(A) = \sigma_r(A) = \emptyset$.

证明 ¹³ 首先说明 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda \neq 0\} \subset \rho(A)$, 为此任取 $\lambda \in \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda \neq 0\}$, 首先说明 $\lambda I - A$ 是单射. 设 $x \in H^1(\mathbb{R})$ 满足 $(\lambda I - A)x = 0$, 则

$$\lambda x = x' \Rightarrow x(t) = x(0)e^{\lambda t}.$$

既然 $\operatorname{Re} \lambda \neq 0$, 故 $e^{\lambda t} \neq 0$. 现在要使形如上式的 $x \in H^1(\mathbb{R})$, 只能有 $x \equiv 0$, 故 $\lambda I - A$ 是单射, 即 $(\lambda I - A)^{-1} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow H^1(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$ 首先存在.

¹³ 可以思考一下: 有没有算子角度出发的解法? 根据前一题可以猜想 $B : x(t) \mapsto x'(t)$, $D(B) := H^1(-\infty, 0)$ 满足 $\sigma_p(B) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > 0\}$, $\sigma_c(B) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\}$, $\sigma_r(B) = \emptyset$, 如果用合适的方法整合前一题的 A (记为 A_1) 与前述 B 为该题的 A (记为 A_2), 能否有 $\sigma_p(A_1) \cap \sigma_p(B) = \emptyset = \sigma_p(A_2)$, $\rho(A_1) \cup \rho(B) = \rho(A_2)$?

再说明 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(L^2(\mathbb{R}))$, 为此任取 $x \in L^2(\mathbb{R})$, 记 $y = (\lambda I - A)^{-1}x \in H^1(\mathbb{R})$, 则

$$x = (\lambda I - A)y = \lambda y - y'.$$

两端同取 Fourier 变换并整理知

$$\widehat{y} = \frac{1}{\lambda + it} \widehat{x}.$$

因为 $\operatorname{Re} \lambda \neq 0$, 故 $|\lambda + it| \geq |\operatorname{Re} \lambda| > 0$, 于是由 Plancherel 定理知

$$\|y\|_{L^2} = \|\widehat{y}\|_{L^2} \leq \frac{1}{|\operatorname{Re} \lambda|} \|\widehat{x}\|_{L^2} = \frac{1}{|\operatorname{Re} \lambda|} \|x\|_{L^2}.$$

这说明 $\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L^2 \rightarrow L^2} \leq |\operatorname{Re} \lambda|^{-1}$, 故 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(L^2(\mathbb{R}))$.

最后说明 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\} \subset \sigma_c(A)$, 为此只需说明 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2(\mathbb{R})$, $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(\mathbb{R})$. 为证 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2(\mathbb{R})$, 不妨设 $\lambda = ih (h \neq 0)$ (理由同前题), 取 $g(x) = \mathbf{1}_{(1, \infty)} e^{ihx} |x|^{-\frac{1}{2}-\alpha} (0 < \alpha < 1/2)$, 显见 $g \in L^2(\mathbb{R})$. 若存在 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 使得 $(ihI - A)f = g$, 则在 x 足够大时有

$$(e^{-ihx} f)' = -x^{-\frac{1}{2}-\alpha}.$$

取足够大的 $M > 0$, 将上式两端在 (x, M) 上积分知

$$e^{-ihM} f(M) - e^{-ihx} f(x) = -\left(\frac{1}{2} - \alpha\right) (M^{\frac{1}{2}-\alpha} - x^{\frac{1}{2}-\alpha}).$$

此即

$$f(x) = e^{ihx} \left(\frac{1}{2} - \alpha\right) (M^{\frac{1}{2}-\alpha} - x^{\frac{1}{2}-\alpha}) + e^{ihM - ihx} f(M).$$

因为 M 是任取的, 故在上式中令 $M \rightarrow \infty$ 可知 x 足够大时 $|f(x)| = \infty$, 矛盾! 故只能有 $g \notin R(\lambda I - A)$.

再说明 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(\mathbb{R})$. 和前一题思路相同, 定义

$$X := \left\{ f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}) : \exists M > 0 \forall t_1, t_2 > M \left(\int_{-t_1}^{t_2} e^{-ihx} f dx = 0 \right) \right\},$$

往证 X 在 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 中依 L^2 范数稠密. 现任取 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 记

$$f_k(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [-k, k], \\ -\operatorname{sgn}\left(\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx\right) \frac{e^{ihx}}{x}, & x \in (k, k e^{|\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx|}], \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

一方面由 $\operatorname{supp} f_k \subset [-k, k e^{|\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx|}]$ 知必有 $f_k \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 另一方面取 $M = k e^{|\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx|}$ 即知 $t_1, t_2 > M$ 时 $\int_{-t_1}^{t_2} e^{-ihx} f_k dx = 0$, 故 $\{f_k\} \subset X$. 下面说明 $f_k \rightarrow f$ (L^2). 事实上

$$\begin{aligned} \|f_k - f\|_{L^2}^2 &= \int_k^{k e^{|\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx|}} \left| f + \operatorname{sgn}\left(\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx\right) \frac{e^{ihx}}{x} \right|^2 dx \\ &\quad + \int_{k e^{|\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx|}}^\infty |f|^2 dx + \int_{-\infty}^{-k} |f|^2 dx \\ &\leq 2C \left(\int_k^\infty |f|^2 dx + \int_k^\infty \frac{dx}{x^2} \right) + \int_{k e^{|\int_{-k}^k e^{-ihx} f dx|}}^\infty |f|^2 dx + \int_{-\infty}^{-k} |f|^2 dx \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

下面说明 $X \subset R(\lambda I - A)$. 任取 $g \in X$, 设 $\lambda = ih (h \neq 0)$, 考虑下述弱导数意义下的微分方程:

$$\begin{cases} (ihI - A)f = g, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \end{cases}$$

解得

$$f(x) = e^{ihx} \int_{-\infty}^x e^{-ih\tau} g(\tau) d\tau.$$

由 $g \in X$ 知 f 在 $\mathbb{R}$ 上紧支, 故 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 进一步由 Lebesgue 积分的微积分基本定理知 $f' \in L^2(\mathbb{R})$, 故 $f \in D(A)$,

因此 $g \in R(\lambda I - A)$. 仿照前一习题的稠密性论证即知 $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\} \subset \sigma_c(A)$. 最后因为

$$\begin{aligned}\mathbb{C} &= \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda \neq 0\} \cup \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda = 0\} \\ &\subset \rho(A) \cup \sigma_c(A) \subset \mathbb{C},\end{aligned}$$

故上述包含关系均为相等, 至此即得待证结论. $\square$

注 6.10 从练习6.17出发是可以直接推练习6.18的点谱的. 为此设

$$\tilde{A} : H^1(-\infty, 0) \rightarrow L^2(-\infty, 0), x(t) \mapsto x'(t).$$

记练习6.17对应的算子为 A_1 , 练习6.18对应的算子为 A_2 . 现在任取 $x \in H^1(\mathbb{R})$, 知 x 在 $t = 0$ 处的单点值其实可以任意定义, 于是 x 在 a.e. 意义下能分解为

$$x(t) = (x\mathbf{1}_{(0,\infty)})(t) + (x\mathbf{1}_{(-\infty,0)})(t) =: x_+(t) + x_-(t).$$

两边作用 A_2 知对 a.e. t 有

$$A_2 x(t) = \begin{cases} A_1 x_+(t), & t > 0, \\ \tilde{A} x_-(t), & t < 0. \end{cases}$$

现在根据练习6.17已知 $\sigma_p(A_1) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda < 0\}$, 依定义知对任意取定的 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 下述方程均存在非平凡解:

$$\lambda x(t) = Ax(t) = x'(t), \quad t \in (0, \infty).$$

两端同时取反射知

$$\lambda x(-t) = x'(-t), \quad t \in (0, \infty).$$

这说明

$$\lambda \tilde{x}(t) = -\frac{d}{dt}(\tilde{x}(t)) = -\tilde{A}\tilde{x}(t), \quad t \in (-\infty, 0).$$

故 $-\lambda \in \sigma_p(\tilde{A})$, 由此可知 $\sigma_p(\tilde{A}) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda > 0\}$.

下面说明 $\sigma_p(A_2) = \emptyset$, 这也就是说明任取 $\lambda \in \mathbb{C}$, 下述方程均不存在非平凡解:

$$\lambda x = A_2 x, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6.21)$$

注意只要上述方程存在解 x , 则对方程两端在 $(0, \infty)$ 上截断知

$$\lambda x\mathbf{1}_{(0,\infty)} = A_1(x\mathbf{1}_{(0,\infty)}), \quad (6.22)$$

这说明 $x\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 就是上述方程在 $(0, \infty)$ 上的解, 同理知 $x\mathbf{1}_{(-\infty,0)}$ 是下述方程在 $(-\infty, 0)$ 上的解:

$$\lambda x\mathbf{1}_{(-\infty,0)} = \tilde{A}(x\mathbf{1}_{(-\infty,0)}). \quad (6.23)$$

若 $\operatorname{Re} \lambda = 0$, 设 x 是(6.21)的非平凡解, 则 $x\mathbf{1}_{(0,\infty)}, x\mathbf{1}_{(-\infty,0)}$ 只要非零就会是(6.22)或(6.23)的非平凡解. 不妨设 $x\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 是非平凡解, 则由(6.22)存在非平凡解知 $\lambda \in \sigma_p(A_1)$, 矛盾! 故 $\operatorname{Re} \lambda = 0$ 时(6.21)不存在非平凡解.

若 $\operatorname{Re} \lambda < 0$, 则此时 $\lambda \in \sigma_p(A_1)$. 若(6.21)存在非平凡解 x , 则同样知 $x\mathbf{1}_{(0,\infty)}, x\mathbf{1}_{(-\infty,0)}$ 只要非零就会是(6.22)或(6.23)的非平凡解. 因为此时(6.23)不存在非平凡解, 故只能是 $x\mathbf{1}_{(-\infty,0)} = 0$, 且 $x\mathbf{1}_{(0,\infty)} =: x_+$ 成为(6.22)的非平凡解, 这也就是说

$$\lambda x_+(t) = A_1 x_+(t) = x'_+(t), \quad t \in (0, \infty).$$

为使 $x \in H^1(\mathbb{R})$, 我们需要 $\lim_{t \rightarrow 0^+} x_+ = \lim_{t \rightarrow 0^-} x_- = 0$, 于是上式表明 $x'_+(t) \rightarrow 0(t \rightarrow 0^+)$. 又因为 $x_+ \in L^2(0, \infty) \Rightarrow x_+ \rightarrow 0(t \rightarrow \infty)$, 故微积分基本定理表明

$$\lambda \int_0^\infty x_+(t) dt = x_+(\infty) - x_-(0) = 0.$$

另外利用中值定理可知 x_+ 符号不变, 因此只能有 $x_+ \equiv 0$, 这与 x_+ 非平凡矛盾! 故 $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 时(6.21)不存在非平凡解. 同理可证 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ 时(6.21)也不存在非平凡解, 至此即知 $\sigma_p(A_2) = \emptyset$. $\square$

虽说上述过程相较于原始过程反而像是更复杂了, 不过这里想强调的其实是下一句话: 这种方法没法用来从

练习6.17的正则值推知练习6.18的正则值. 这是因为正则值谈的是 $(\lambda I - A)^{-1}$ 的有界性, 此时目标算子关于 λ 是没有线性性的. 而之所以点谱能这么推是因为点谱谈的是方程 $\lambda x = Ax$ 的非平凡解, 后者作为线性方程当然关于 λ 是线性的. 因为我们从半空间算子组合成全空间算子的时候是线性组合, 所以这种组合天生地适配点谱对应的线性方程, 而不适配正则值对应的关于 λ 非线性的算子. 残念ながら, 练习6.18证明开头注的猜测恐怕只能是一种巧合而不能作很一般的推广.

练习 6.19

考虑 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Laplace 算子

$$A: f \mapsto \Delta f := - \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}, \quad D(A) := H^2(\mathbb{R}^n).$$

证明 $\sigma_c(A) = [0, \infty)$ 且 $\sigma_p(A) = \sigma_r(A) = \emptyset$.

证明 首先说明 $\mathbb{C} \setminus [0, \infty) \subset \rho(A)$. 任取 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$, 若 $x \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 满足 $(\lambda I - A)x = 0_{L^2}$, 则

$$\lambda x = \Delta x \Rightarrow \lambda \hat{x} = |\xi|^2 \hat{x} \Rightarrow (\lambda - |\xi|^2) \hat{x} = 0.$$

根据 λ 的取值知对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有 $\lambda - |\xi|^2 \neq 0$, 故只能有 $\hat{x} \equiv 0_{L^2}$, 从而 $x \equiv 0_{L^2}$, 这说明 $\lambda I - A$ 是单射, 故 $(\lambda I - A)^{-1}: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^2(\mathbb{R}^n) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$ 首先存在.

再说明 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(L^2(\mathbb{R}^n))$, 为此任取 $x \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 记 $y = (\lambda I - A)^{-1}x$, 则

$$x = (\lambda I - A)y \Rightarrow \hat{x} = \lambda \hat{y} - |\xi|^2 \hat{y} \Rightarrow \hat{y} = \frac{\hat{x}}{\lambda - |\xi|^2}.$$

因为 $\lambda \notin [0, \infty)$, 故 $|\lambda - |\xi|^2| \geq \max\{-\operatorname{Re} \lambda, \operatorname{Im} \lambda\} > 0$, 故由 Plancherel 定理与 Hölder 不等式知

$$\|y\|_{L^2} = \|\hat{y}\|_{L^2} \leq \|\hat{x}\|_{L^2} \|(\lambda - |\xi|^2)^{-1}\|_{L^\infty} \leq \max\{-\operatorname{Re} \lambda, \operatorname{Im} \lambda\}^{-1} \|\hat{x}\|_{L^2},$$

这表明 $\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L^2 \rightarrow L^2} \leq \max\{-\operatorname{Re} \lambda, \operatorname{Im} \lambda\}^{-1}$, 故 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(L^2(\mathbb{R}^n))$.

再说明 $[0, \infty) \subset \sigma_c(A)$, 为此只需证明 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(\mathbb{R}^n)$. 为证 $R(\lambda I - A) \subsetneq L^2(\mathbb{R}^n)$, 易证若 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$, 且 $g, \hat{g} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $g \in R(\lambda I - A)$, 则存在 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$g = \lambda f - \Delta f \Rightarrow \hat{g} = (\lambda - |\xi|^2) \hat{f} \Rightarrow \hat{f} = \frac{\hat{g}}{\lambda - |\xi|^2} = \frac{e^{-\pi|\xi|^2}}{\lambda - |\xi|^2}.$$

若 $\lambda = 0$, 则显见 $\hat{f} \notin L^2$, 矛盾! 若 $\lambda > 0$, 则 $|\xi|^2 \rightarrow \lambda$ 时 $\hat{f} \sim C(\lambda^{\frac{1}{2}} - |\xi|)^{-1}$, 而 $(\lambda^{\frac{1}{2}} - |\xi|)^{-1} \notin L^2(\mathbb{R}^n)$, 故依旧有 $\hat{f} \notin L^2(\mathbb{R}^n)$, 矛盾! 故只能有 $g \notin R(\lambda I - A)$.

最后说明 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(\mathbb{R}^n)$, 首先考虑 $\lambda \neq 0$ 的情形. 任取 $f \in L^2$, 记

$$f_n := \mathcal{F}^{-1} \left[\hat{f} \mathbf{1}_{\{(1-\frac{1}{n})\sqrt{\lambda} < |\xi| < (1+\frac{1}{n})\sqrt{\lambda}\}^c} \right],$$

由 Plancherel 定理知

$$\|f_n\|_{L^2} = \|\hat{f}_n\|_{L^2} \leq \|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2},$$

故 $\{f_n\} \subset L^2(\mathbb{R}^n)$, 且由 Lebesgue 积分的绝对连续性知

$$\|f_n - f\|_{L^2} = \|\hat{f}_n - \hat{f}\|_{L^2} = \left[\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{(1-\frac{1}{n})\sqrt{\lambda} < |\xi| < (1+\frac{1}{n})\sqrt{\lambda}\}} |\hat{f}|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

这说明 $f_n \rightarrow f$ (L^2). 下面说明 $\{f_n\} \subset R(\lambda I - A)$. 设 $f_n = (\lambda I - A)x_n$, 则

$$\hat{f}_n = (\lambda - |\xi|^2) \hat{x}_n \Rightarrow x_n = \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{\hat{f}_n}{\lambda - |\xi|^2} \right].$$

由 Plancherel 定理知

$$\|x_n\|_{L^2} = \|\hat{x}_n\|_{L^2} = \left\| \frac{\hat{f}_n}{\lambda - |\cdot|^2} \right\|_{L^2} \leq \frac{n}{\lambda} \|\hat{f}_n\|_{L^2} = \frac{n}{\lambda} \|f_n\|_{L^2} < \infty,$$

故 $\{x_n\} \subset L^2(\mathbb{R}^n)$, 这说明 $\{f_n\} \subset R(\lambda I - A)$, 故 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2(\mathbb{R}^n)$.

再考虑 $\lambda = 0$ 的情形. 任取 $f \in L^2$, 记

$$f_n := \mathcal{F}^{-1} \left[\widehat{f} \mathbf{1}_{\{|\xi| > \frac{1}{n}\}}^c \right],$$

由 Plancherel 定理知

$$\|f_n\|_{L^2} = \|\widehat{f_n}\|_{L^2} \leq \|\widehat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2},$$

故 $\{f_n\} \subset L^2(\mathbb{R}^n)$, 且由 Lebesgue 积分的绝对连续性知

$$\|f_n - f\|_{L^2} = \|\widehat{f_n} - \widehat{f}\|_{L^2} = \left[\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{|\xi| > \frac{1}{n}\}} |\widehat{f}|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

这说明 $f_n \rightarrow f (L^2)$. 下面说明 $\{f_n\} \subset R(\lambda I - A) = R(-A)$. 设 $f_n = -Ax_n$, 则

$$\widehat{f_n} = -|\xi|^2 \widehat{x_n} \Rightarrow x_n = -\mathcal{F}^{-1} \left[\frac{\widehat{f_n}}{|\xi|^2} \right].$$

由 Plancherel 定理知

$$\|x_n\|_{L^2} = \|\widehat{x_n}\|_{L^2} = \left\| \frac{\widehat{f_n}}{|\cdot|^2} \right\|_{L^2} \leq n^2 \|\widehat{f_n}\|_{L^2} < \infty,$$

故 $\{x_n\} \subset L^2(\mathbb{R}^n)$, 这说明 $\{f_n\} \subset R(-A)$, 故 $\overline{R(-A)} = L^2(\mathbb{R}^n)$. 至此即知 $[0, \infty) \subset \sigma_c(A)$.

最后因为

$$\mathbb{C} = (\mathbb{C} \setminus [0, \infty)) \cup [0, \infty) \subset \rho(A) \cup \sigma_c(A) \subset \mathbb{C},$$

故上述包含关系均为相等, 至此即得待证结论. □

6.2 紧算子

定义 6.5 (紧算子 (compact operator))

设 X, Y 是赋范线性空间, 称线性算子 $A: X \rightarrow Y$ 为紧算子, 如果下述条件之一成立:

- (i) $\overline{A(B_1)}$ 是 Y 中 (强拓扑下) 的紧集, 其中 $B_1 := \{x \in X : \|x\|_X < 1\}$ 为 X 中的单位球.
 - (ii) 对 X 中任意有界集 B 而言, $\overline{A(B)}$ 是 Y 中 (强拓扑下) 的紧集.
 - (iii) 对 X 中任意有界点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 而言, $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中 (强拓扑意义下) 有收敛子列.
- 记 $X \rightarrow Y$ 的紧算子全体为 $\mathfrak{C}(X, Y)$, 特别当 $X = Y$ 时记之为 $\mathfrak{C}(X)$. ♣

下面说明上述定义中的 (i),(ii),(iii) 彼此等价, 为此我们回忆度量空间中的下述结论:

引理 6.3

度量空间 X 的子集 M 是紧集当且仅当它是自列紧集, 亦即 M 中的任意点列在 X 中都有一个收敛子列, 且该子列收敛到 M 中的某点. ♡

引理 6.4

若度量空间 X 的子集 M 是列紧集, 则 $\overline{M}$ 是自列紧集. ♡

证明 记 X 的度量为 d . 设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{M}$, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 而言存在 $y_n \in M$ 使得

$$d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}. \quad (6.24)$$

因为 M 是列紧集且 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset M$, 故 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有收敛子列, 记之为 $\{y_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$. 不妨设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y_0 \in X.$$

根据极限定义可知

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists k_0 \in \mathbb{N} \forall k > k_0 \left(d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

取 $k_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $k > k_1$ 时 $\frac{1}{n_k} < \frac{\varepsilon}{2}$, 则当 $k > \max\{k_0, k_1\}$ 时由(6.24)式知

$$d(x_{n_k}, y_0) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y_0) < \frac{1}{n_k} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = y_0$. 又因为 $\overline{M}$ 是闭集, 故 $y_0 \in \overline{M}$, 这说明 $\overline{M}$ 是自列紧集. □

另外, 还需回忆定理1.14:

引理 6.5

紧 Hausdorff 空间 X 中子集的闭性与紧性等价.

现在开始正式说明定义6.5中的 (i),(ii),(iii) 彼此等价.

(i) $\Rightarrow$ (ii): 对 X 中的任意有界集 B , 根据有界的定义知存在 $M > 0$ 使得

$$B \subset MB_1 := \{Mx : x \in B_1\},$$

其中 B_1 表示 X 中的单位球. 由 A 的线性性可知

$$\begin{aligned} x \in \overline{MA(B_1)} &\Leftrightarrow \exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset MA(B_1), x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \\ &\Leftrightarrow \exists \left\{ \frac{x_n}{M} \right\}_{n \in \mathbb{N}} \subset A(B_1), \frac{x_n}{M} \rightarrow \frac{x}{M} (n \rightarrow \infty) \\ &\Leftrightarrow \frac{x}{M} \in \overline{A(B_1)} \Leftrightarrow x \in \overline{MA(B_1)}, \end{aligned}$$

这说明 $\overline{A(MB_1)} = \overline{MA(B_1)}$, 从而由 $\overline{A(B_1)}$ 紧与引理6.3知 $\overline{A(MB_1)}$ 紧. 又因为

$$A(B) \subset A(MB_1) \Rightarrow \overline{A(B)} \subset \overline{A(MB_1)},$$

故由引理6.5知 $\overline{A(B)}$ 紧, 此即定义6.5(ii).

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X 中的有界点列, 由 (ii) 知 $\overline{\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$ 是 Y 中的紧集, 从而由引理6.3知 $\overline{\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$ 是自列紧集, 因此 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中有收敛子列.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 根据引理6.3, 要说明 $\overline{A(B_1)}$ 是 Y 中的紧集, 只需说明 $\overline{A(B_1)}$ 是自列紧集. 现任取 $A(B_1)$ 中的点列 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 根据 $A(B_1)$ 的定义知存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B_1$ 使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$y_n = Ax_n.$$

因为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B_1$, 故 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 至少是有界集, 进而由 (iii) 知 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有收敛子列, 因此 $A(B_1)$ 是列紧的, 进一步由引理6.4知 $\overline{A(B_1)}$ 自列紧.

至此即知定义6.5的 (i),(ii),(iii) 彼此等价. □

注 6.11 对 B^* 空间 Y 而言, 若集合 $E \subset Y$ 满足 $\overline{E}$ 是 Y 中的紧集, 就称 E 在 Y 中预紧. 回忆

线性算子 T 是有界算子 $\Leftrightarrow T$ 把有界集映成有界集¹⁴,

而定义6.5表明

线性算子 T 为紧算子 $\Leftrightarrow T$ 把有界集映成预紧集

$\Leftrightarrow T$ 把有界集映成列紧集.

在范数诱导的拓扑下, 显见预紧集首先是有界集, 因此紧算子必为有界算子. 下面说明有界线性算子成为紧算子的一个充分条件.

命题 6.2

设 X, Y 是赋范线性空间, 若 $A \in L(X, Y)$ 且 $\dim Y < \infty$, 则 $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

证明 设 B_1 是 X 中的开单位球, 由 $A \in L(X, Y)$ 知 $\overline{A(B_1)}$ 是 Y 中的有界闭集. 因为 $\dim Y < \infty$, 而有限维空间中的有界闭集就是紧集, 故 $\overline{A(B_1)}$ 是 Y 中的紧集, 由定义6.5(i)即得欲证. □

另外, 紧算子定义中的开单位球可以改为单位球面, 此即下述命题:

¹⁴ $\Rightarrow$ 显然, 对于 $\Leftarrow$, 记 $T : X \rightarrow Y$, 且存在 $b > 0$ 使得 $TB_X(0_X, 1) \subset B_Y(0_Y, b)$, 则任取 $0_X \neq x \in X$, 由 $x/2\|x\|_X \in B_X(0_X, 1)$ 即得 $\|Tx\|_Y \leq 2b\|x\|_X$.

命题 6.3 (紧算子的等价定义)

设 X, Y 是赋范线性空间, 则 $A: X \rightarrow Y$ 为紧算子等价于下述任一命题:

- (i) $\overline{A(S_1)}$ 是 Y 中的紧集, 其中 $S_1 := \{x \in X : \|x\|_X = 1\}$ 是 X 中的单位球面;
- (ii) 对 X 中单位球面 S_1 中的任意点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 而言, $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中均有收敛子列.

证明 我们用 A 是紧算子 $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow A$ 是紧算子这一思路进行证明.

当 A 是紧算子时, 因为 S_1 是有界集, 根据定义 6.5(ii) 即知 $\overline{A(S_1)}$ 是紧集, 此即 (i).

当 (i) 成立时, 任取 S_1 中的点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. 因为 $\overline{A(S_1)}$ 是紧集, 由引理 6.3 可知 $\overline{A(S_1)}$ 是自列紧集, 因此 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中有收敛子列, 此即 (ii).

当 (ii) 成立时, 任取 X 中的有界点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 考虑用定义 6.5(iii) 证明 A 是紧算子, 这就希望把 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 拉到 S_1 上. 为此首先排除 $x_n = 0_X$ 的情况. 若存在 $\mathbb{N}$ 的子列 $\{n_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 使得对 $\forall i \in \mathbb{N}$ 有 $x_{n_i} = 0_X$, 则由 A 的线性性知

$$Ax_{n_i} = 0_Y, \forall i \in \mathbb{N}.$$

此时 $\{Ax_{n_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 正是 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的收敛子列. 现设对每个 $n \in \mathbb{N}$ 而言均有 $x_n \neq 0_X$, 因为 $\{\|x_n\|_X\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $(0, \infty)$ 中的有界点列, 根据实数的极限点引理知该序列必有收敛子列, 不妨设 $\{\|x_n\|_X\}_{n \in \mathbb{N}}$ 自身收敛到 $a \in [0, \infty)$. 因为 $\{x_n/\|x_n\|_X\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 S_1 中的点列, 故根据假设知 $\{A(x_n/\|x_n\|_X)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中有收敛子列 $\{A(x_{n_i}/\|x_{n_i}\|_X)\}_{i \in \mathbb{N}}$, 不妨设

$$A\left(\frac{x_{n_i}}{\|x_{n_i}\|_X}\right) \rightarrow y, i \rightarrow \infty.$$

注意到

$$Ax_{n_i} - ay = \|x_{n_i}\|_X \left[A\left(\frac{x_{n_i}}{\|x_{n_i}\|_X}\right) - y \right] + (\|x_{n_i}\|_X - a)y$$

因为 $\{\|x_{n_i}\|_X\}_{i \in \mathbb{N}}$ 有界, 且 $\|x_{n_i}\|_X \rightarrow a (i \rightarrow \infty)$, 故 $Ax_{n_i} \rightarrow ay (i \rightarrow \infty)$, 这说明 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 此时也有收敛子列, 根据定义 6.5 即知 A 是紧算子. $\square$

紧算子有下述基本性质 (其中空间上的拓扑默认为强拓扑):

命题 6.4 (紧算子的基本性质)

若 X, Y, Z 为赋范线性空间, 则下述命题成立:

- (i) $\mathfrak{C}(X, Y) \subset L(X, Y)$.
- (ii) 设 $A, B \in \mathfrak{C}(X, Y), \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则 $\alpha A + \beta B \in \mathfrak{C}(X, Y)$.
- (iii) 若 Y 是 Banach 空间, 则 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 是 $L(X, Y)$ 的闭线性子空间.
- (iv) 设 $A \in \mathfrak{C}(X, Y), X_0$ 是 X 的一个线性子空间, 则 $A|_{X_0} \in \mathfrak{C}(X_0, Y)$.
- (v) 若 $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 则 $R(A) := \{Ax : x \in X\}$ 可分.
- (vi) 若 $A \in L(X, Y), B \in L(Y, Z)$ 其中之一是紧算子, 则

$$B \circ A \in \mathfrak{C}(X, Z).$$

下面逐条进行证明.

证明 (i) 要证明 $\mathfrak{C}(X, Y) \subset L(X, Y)$, 设 $A \in \mathfrak{C}(X, Y), B_1$ 为 X 中的单位球, 则

$$\|A\|_{L(X, Y)} = \sup_{x \in B_1} \|Ax\|_Y = \sup_{y \in A(B_1)} \|y\|_Y.$$

下面断言

$$\sup_{y \in A(B_1)} \|y\|_Y = \sup_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|_Y. \quad (6.25)$$

事实上, 显见 $\sup_{y \in A(B_1)} \|y\|_Y \leq \sup_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|_Y$. 现在任取 $y \in \overline{A(B_1)}$, 根据闭包的定义知存在 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset$

$A(B_1)$ 使得 $n \rightarrow \infty$ 时 $\|y_n - y\|_Y \rightarrow 0$. 故当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$|\|y_n\|_Y - \|y\|_Y| \leq \|y_n - y\|_Y \rightarrow 0.$$

因此

$$\|y\|_Y = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n\|_Y \leq \sup_{y \in A(B_1)} \|y\|_Y.$$

这说明

$$\sup_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|_Y \leq \sup_{y \in A(B_1)} \|y\|_Y.$$

此即(6.25)式. 因为 $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 根据定义6.3(i)知 $\overline{A(B_1)}$ 是 Y 中的紧集, 而 $y \mapsto \|y\|_Y$ 是 Y 上的连续函数, 故该函数必在 $\overline{A(B_1)}$ 上至少有界, 亦即

$$\|A\|_{L(X, Y)} = \sup_{y \in A(B_1)} \|y\|_Y = \sup_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|_Y < \infty.$$

此即 (i). 这条结论说明 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 上可赋 $L(X, Y)$ 的子空间拓扑, (iii) 提到的闭性是该拓扑下的.

(ii) 因为收敛列的线性组合依旧收敛, 故由定义6.3(iii)立得 (ii).

注 6.12 由命题6.2与基本性质6.4(i)的证明知, 若 X 为线性赋范空间, Y 为有限维线性赋范空间, 则

$$A \in L(X, Y) \Leftrightarrow A \in \mathfrak{C}(X, Y).$$

为证明 (iii), 我们先回忆下述概念与引理:

定义 6.6 (ε 网, 完全有界 (ε net, totally bounded))

设 M 是度量空间 X 的子集.

- (a) 设 $\varepsilon \in (0, \infty)$, $N \subset M$. 若对 $\forall x \in M$ 均 $\exists y \in N$ 使得 $d(x, y) < \varepsilon$, 就称 N 是 M 的一个 ε 网. 等价地, N 为 M 的一个 ε 网 $\Leftrightarrow N \subset M \subset \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$.
- (b) 若对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$, 均存在 M 的有限 ε 网, 就称 M 完全有界.

引理 6.6 (Hausdorff)

设 X 是度量空间, $M \subset X$. 若 M 列紧, 则 M 完全有界. 另若 X 完备, 则 M 列紧 $\Leftrightarrow M$ 完全有界.

下面证明 (iii). 因为 $L(X, Y)$ 完备, 故由 (i) 知

$$\overline{\mathfrak{C}(X, Y)} \subset L(X, Y).$$

现设 $T \in \overline{\mathfrak{C}(X, Y)}$, 往证 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 由定义6.5(iii)知只需证 $\overline{T(B_1)}$ 在 Y 中紧, 根据引理6.3知这等价于说明 $\overline{T(B_1)}$ 在 Y 中自列紧. 注意 $\overline{T(B_1)}$ 显然是 Y 中 (在强拓扑意义下) 的闭集, 故只需说明 $\overline{T(B_1)}$ 列紧, 根据 Hausdorff 定理 (引理6.6) 与 Y 的完备性知这等价于说明 $\overline{T(B_1)}$ 完全有界. 为说明 $\overline{T(B_1)}$ 完全有界, 对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 我们就需要找到 $\overline{T(B_1)}$ 的一个有限 ε 网. 根据闭包的定义, 知存在紧算子列 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathfrak{C}(X, Y)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n - T\|_{L(X, Y)} = 0. \quad (6.26)$$

由此进一步知对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 均 $\exists n \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|T_n - T\|_{L(X, Y)} < \frac{\varepsilon}{8}. \quad (6.27)$$

因为 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathfrak{C}(X, Y)$, 故 $\overline{T_n(B_1)}$ 在 Y 中紧 (其中 B_1 为 X 中的单位球), 根据引理6.3知 $\overline{T_n(B_1)}$ 自列紧, 进而由 Hausdorff 定理6.6知 $\overline{T_n(B_1)}$ 完全有界. 现在考虑 $\overline{T_n(B_1)}$ 的 $\varepsilon/8$ 网, 知存在

$$\{y_1, \dots, y_m\} \subset \overline{T_n(B_1)}$$

使得

$$\overline{T_n(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{8}\right). \quad (6.28)$$

注意到对 $\forall y \in \overline{T(B_1)}$, 总 $\exists x \in B_1$ 使得 $\|y - Tx\|_Y < \frac{\varepsilon}{8}$, 于是由(6.27)式知

$$\|y - T_n x\|_Y \leq \|y - Tx\|_Y + \|Tx - T_n x\|_Y < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又由(6.28)式知 $\exists i \in \{1, \dots, m\}$ 使得

$$\|T_n x - y_i\|_Y < \frac{\varepsilon}{8},$$

因此

$$\|y - y_i\|_Y \leq \|y - T_n x\|_Y + \|T_n x - y_i\|_Y < \frac{\varepsilon}{2},$$

这说明

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

但这还不能导出 $y_i \in \overline{T(B_1)}$, 下面分两种情况进行讨论:

(a) 若 $B(y_i, \frac{\varepsilon}{2}) \cap \overline{T(B_1)} = \emptyset$, 就在 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 中去掉 y_i .

(b) 若 $B(y_i, \frac{\varepsilon}{2}) \cap \overline{T(B_1)} \neq \emptyset$, 则取 $z_i \in B(y_i, \frac{\varepsilon}{2}) \cap \overline{T(B_1)}$. 现对任意 $z \in B(y_i, \frac{\varepsilon}{2}) \cap \overline{T(B_1)}$ 知总有 $z \in B(z_i, \varepsilon)$.

此时用 z_i 替代 y_i 可得

$$\{z_1, \dots, z_l\} \subset \overline{T(B_1)}$$

其中 $1 \leq l \leq m$ 满足

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^l B(z_i, \varepsilon).$$

根据上述讨论知 $\overline{T(B_1)}$ 有有限 ε 网, 这便完成了 (iii) 的证明.

对于 (iv), 因为 X_0 中的有界点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 同时是 X 中的有界点列, 且对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$A|_{X_0} x_n = Ax_n,$$

故根据定义 6.5(iii) 知 $\{A|_{X_0} x_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有收敛子列, 由 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的任意性即知

$$A|_{X_0} \in \mathfrak{C}(X_0, Y).$$

此即 (iv).

对于 (v), 证明的思路在于用 $\overline{A(B_1)}$ 的 ε 网构造 $R(A)$ 的可数稠密子集. 注意到 $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nB_1$ (其中 B_1 为 X 中的单位球), 由 A 的线性性知

$$R(A) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nA(B_1). \quad (6.29)$$

根据定义 6.5(i) 与引理 6.3 知 $\overline{A(B_1)}$ 自列紧, 因而 $A(B_1)$ 列紧, 由 Hausdorff 定理知 $A(B_1)$ 完全有界, 故对任意 $k \in \mathbb{N}$ 而言, 存在 $A(B_1)$ 的有限 $\frac{1}{k}$ 网 $N_k \subset A(B_1)$ 使得

$$A(B_1) \subset \bigcup_{y \in N_k} B\left(y, \frac{1}{k}\right).$$

现在令

$$N := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} N_k.$$

注意到对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 有

$$N_k \subset A(B_1) \subset \bigcup_{y \in N_k} B\left(y, \frac{1}{k}\right)$$

故

$$N \subset A(B_1) \subset \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{y \in N_k} B\left(y, \frac{1}{k}\right).$$

对上述集合同时缩放知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$nN \subset nA(B_1) \subset n \left\{ \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{y \in N_k} B\left(y, \frac{1}{k}\right) \right\}.$$

显见 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} nN$ 可数, 下面验证 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} nN$ 在 $R(A)$ 中稠密. 任取 $z \in R(A)$, 根据上式与分解(6.29)知存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$z \in n_0 A(B_1) \subset n_0 \left\{ \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{y \in N_k} B\left(y, \frac{1}{k}\right) \right\}.$$

对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$, 取 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\frac{n_0}{k_0} < \varepsilon$. 现在因为 $\frac{z}{n_0} \in \bigcup_{y \in N_{k_0}} B(y, \frac{1}{k_0})$, 故存在 $y_0 \in N_{k_0}$ 使得

$$\frac{z}{n_0} \in B\left(y_0, \frac{1}{k_0}\right).$$

此即 $\|\frac{z}{n_0} - y_0\|_Y < \frac{1}{k_0}$, 于是

$$\|z - n_0 y_0\|_Y < \frac{n_0}{k_0} < \varepsilon.$$

又因为 $n_0 y_0 \in n_0 N \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nN$, 故 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} nN$ 在 $R(A)$ 中稠密, 因此 $R(A)$ 可分, 此即 (v).

对于 (vi), 若 A 是紧算子, 由定义 6.5(iii) 知对 X 中的任意有界点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 而言, 序列 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 均有收敛子列 $\{Ax_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$. 又因为 B 有界, 故 $\{(B \circ A)x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛, 因此 $B \circ A \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

若 B 是紧算子, 对 X 中的任意有界点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 而言, 由 A 有界知 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是有界点列, 因此由 $B \in \mathfrak{C}(X, Y)$ 与定义 6.5 知 $\{(B \circ A)x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有收敛子列, 故 $B \circ A \in \mathfrak{C}(X, Y)$. 此即 (vi).

注 6.13

- 关于有界集与完全有界集我们需要特别回忆一下下述事实:

- (i) M 有界 $\Leftrightarrow$ 存在 $\varepsilon_0 \in (0, \infty)$ 使得 M 有有限 ε_0 网. 事实上, 若 M 有界, 则存在 $x_0 \in M$ 与 $\varepsilon_0 \in (0, \infty)$ 使得 $M \subset B(x_0, \varepsilon_0)$, 这说明 M 有一个有限 ε_0 网. 反之, 若存在 $\varepsilon_0 \in (0, \infty)$ 使得 M 有有限 ε_0 网 $\{y_i\}_{i=1}^m$, 设背景空间 X 上的度量为 d , 并记

$$r_0 := \varepsilon_0 + \max\{d(y_i, y_1) : i \in \{2, 3, \dots, m\}\},$$

则 $M \subset B(y_1, r_0)$, 这是因为对 $\forall x \in M$, 根据 ε_0 网的定义知存在 $i_0 \in \{1, \dots, m\}$ 使得 $x \in B(y_{i_0}, \varepsilon_0)$, 于是

$$d(x, y_1) \leq d(x, y_{i_0}) + d(y_{i_0}, y_1) < \varepsilon_0 + d(y_{i_0}, y_1) \leq r_0.$$

此即 $M \subset B(y_1, r_0)$, 因此 M 有界.

- (ii) 完全有界集必有界, 但反之未必. 例如在 l^2 中对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 记

$$e_n := \underbrace{\{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}}_n$$

知 $n \neq m \in \mathbb{N}$ 时有 $\|e_n - e_m\|_{l^2} = \sqrt{2}$, 且对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 而言 $\|e_n\|_{l^2} = 1$. 下面说明 $\varepsilon \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 时 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 没有有限 ε 网. 考虑反证法, 设 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有有限 ε 网 $\{B(e_{i_k}, \varepsilon)\}_{k=1}^N$, 根据鸽笼原理知必有一个球 (设之为 $B(e_{i_{k_0}}, \varepsilon)$) 含有不同的 $e_n \neq e_m$. 但

$$\sqrt{2} = \|e_n - e_m\|_{l^2} \leq \|e_n - e_{i_{k_0}}\|_{l^2} + \|e_{i_{k_0}} - e_m\|_{l^2},$$

这与

$$\|e_n - e_{i_{k_0}}\|_{l^2} + \|e_{i_{k_0}} - e_m\|_{l^2} < 2\varepsilon \leq \sqrt{2}$$

矛盾! 故 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 没有有限 ε 网, 亦即 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 作为有界集并不完全有界.

- (iii) M (完全) 有界 $\Leftrightarrow \overline{M}$ (完全) 有界. 这里我们只说明完全有界集的情形. 当 $\overline{M}$ 是完全有界集时, 根据定义知对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 而言, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 与 $\{\tilde{x}_n\}_{n=1}^N \subset \overline{M}$ 使得 $\overline{M} \subset \bigcup_{n=1}^N B(\tilde{x}_n, \frac{\varepsilon}{2})$. 现对 $\forall n \in \{1, \dots, N\}$, 取 $x_n \in M$ 使得 $d(\tilde{x}_n, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$, 则

$$M \subset \overline{M} \subset \bigcup_{n=1}^N B(x_n, \varepsilon).$$

故 M 完全有界. 反之, 若 M 完全有界, 则对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 与 $\{x_n\}_{n=1}^N \subset M$ 使得 $M \subset \bigcup_{n=1}^N B(x_n, \frac{\varepsilon}{2})$. 任取 $x \in \overline{M}$, 知必存在 $y \in M$ 使得 $d(x, y) < \frac{\varepsilon}{2}$. 又因为 $y \in M \subset \bigcup_{n=1}^N B(x_n, \frac{\varepsilon}{2})$, 故必存在 $n_0 \in \{1, \dots, N\}$ 使得 $d(y, x_{n_0}) < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$d(x, x_{n_0}) \leq d(x, y) + d(y, x_{n_0}) < \varepsilon,$$

这说明 $\overline{M} \subset \bigcup_{n=1}^N B(x_n, \varepsilon)$, 故 $\overline{M}$ 完全有界.

- 紧算子的基本性质 6.4(iii) 还有另一种 (更直接的) 证法. 和原先的证明一样, 设 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是紧算子列, $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$. 我们从定义 6.5(iii) 入手证明 T 是紧算子. 任取 X 中的有界集 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 记其界为 M . 由 (6.26) 式知对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 而言存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|T_N - T\|_{L(X, Y)} < \frac{\varepsilon}{4(M+1)}.$$

因为 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是紧算子列, 故通过定义 6.5(iii) 与对角线法则可以找到 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 而言, 序列 $\{T_n x_{n_k}\}$ 在 Y 中均收敛, 故存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $k > K$ 时对 $\forall l \in \mathbb{N}$ 有

$$\|T_N x_{n_{k+l}} - T_N x_{n_k}\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \|T x_{n_{k+l}} - T x_{n_k}\|_Y &\leq \|T x_{n_{k+l}} - T_N x_{n_{k+l}}\|_Y + \|T_N x_{n_{k+l}} - T_N x_{n_k}\|_Y + \|T_N x_{n_k} - T x_{n_k}\|_Y \\ &\leq 2M \|T_N - T\|_{L(X, Y)} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这说明 $\{T x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是 Y 中的基本列, 又因为 Y 完备, 故 $\{T x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中收敛, 这说明 T 是紧算子, 此即 (iii).

- 若 Y 不是 Banach 空间, 则紧算子的基本性质 6.4(iii) 未必成立, 亦即 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 未必在 $L(X, Y)$ 中闭, 参看下例.

例 6.5 设

$$X = c_0 := \{\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C} : \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0\},$$

对 $a := \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 定义其范数为

$$\|a\|_{c_0} := \sup_{k \in \mathbb{N}} |a_k|.$$

定义

$$T_0 : c_0 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \left\{ \frac{a_k}{k} \right\}_{k \in \mathbb{N}}.$$

记 $Y = R(T_0)$, 在 Y 上赋 l^2 范数, 记

$$T : c_0 \rightarrow R(T_0), a \mapsto Ta := T_0 a.$$

下面说明 $T \in L(c_0, R(T_0))$, 且

$$\|T\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} = \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

事实上任取 $a := \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in c_0$, 有

$$\begin{aligned} \|Ta\|_{l^2} &= \|T_0 a\|_{l^2} = \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{|a_k|^2}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |a_k| \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \|a\|_{c_0} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

因此 $T \in L(c_0, R(T_0))$, 且

$$\|T\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} \leq \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} < \infty.$$

下面证明反向不等式, 为此只需对任意 $n \in \mathbb{N}$ 取

$$\tilde{x}^{(n)} := (\underbrace{1, \dots, 1}_n, 0, \dots),$$

知 $\|\tilde{x}^{(n)}\|_{c_0} = 1$, 且

$$\|T\tilde{x}^{(n)}\|_{l^2} = \|T_0\tilde{x}^{(n)}\|_{l^2} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

因此对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\|T\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} \geq \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即知

$$\|T\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} \geq \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}},$$

故

$$\|T\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

现在对任取的 $k \in \mathbb{N}$ 记

$$a^{(k)} := \left\{1, \dots, \frac{1}{k}, 0, \dots\right\} \in R(T_0), \quad (6.30)$$

则一方面 $k, m \rightarrow \infty$ 时显见

$$\|a^{(k)} - a^{(m)}\|_{l^2} \rightarrow 0,$$

另一方面 $a^{(k)}$ 的极限为¹⁵ $\{1/k\}_{k \in \mathbb{N}} \notin R(T_0)$, 故 $R(T_0)$ 不是 l^2 拓扑下的闭集.

接下来需要说明 T 能被紧算子列 T_n 逼近, 但 T 本身不是紧算子. 受后面将要介绍的紧算子的有穷秩算子逼近的启发, 很自然地会猜断算子列作为有穷秩算子列能不能成为这里要用的紧算子逼近列? 现在对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与 $a := \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in c_0$ 记

$$(T_n a)_k := \begin{cases} \frac{a_k}{k}, & k \in \{1, \dots, n\}, \\ 0, & k \in \{n+1, n+2, \dots\}. \end{cases}$$

下面说明 $T_n \in \mathfrak{C}(c_0, R(T_0))$, 进一步由命题 6.2 知只需说明 $T_n \in L(c_0, R(T_0))$. 事实上对任取的 $a := \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in c_0$ 有

$$\begin{aligned} \|T_n a\|_{l^2} &= \left(\sum_{k=1}^n \frac{|a_k|^2}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}} \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |a_k| \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \|a\|_{c_0} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

故

$$\|T_n\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} \leq \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

进一步若取 $\tilde{a} := (1, \dots, 1, 0, \dots)$ (其中前 n 项为 1), 则 $\|\tilde{a}\|_{c_0} = 1$, 且

$$\|T_n \tilde{a}\|_{l^2} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}},$$

¹⁵如果 $\{1/k\}_{k \in \mathbb{N}} \in R(T_0)$, 设 $T_0(\{a_k\}) = \{1/k\}$, 则 $a_k = 1(\forall k \in \mathbb{N})$, 而 $(1, \dots, 1, \dots) \notin c_0$, 矛盾!

于是

$$\|T_n\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} \geq \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}},$$

故

$$\|T_n\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}},$$

进而 $T_n \in L(c_0, R(T_0))$, 亦即 $T_n \in \mathfrak{L}(c_0, R(T_0))$.

下面说明 $T_n \rightarrow T(L(c_0, R(T_0)))$. 取 $a \in c_0$ 满足 $\|a\|_{c_0} \leq 1$ (即 $\sup_{k \in \mathbb{N}} |a_k| \leq 1$). 注意到对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 满足

$$\left(\sum_{k>n_0} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon.$$

于是 $n \geq n_0$ 时有

$$\|T_n a - T a\|_{l^2} = \left(\sum_{k>n} \frac{|a_k|^2}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|a\|_{c_0} \left(\sum_{k>n} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

这说明

$$\|T_n - T\|_{c_0 \rightarrow R(T_0)} \leq \left(\sum_{k>n_0} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon,$$

此即 $T_n \rightarrow T(L(c_0, R(T_0)))$.

最后说明 $T \notin \mathfrak{L}(c_0, R(T_0))$. 取(6.30)设置的 $\{a^{(k)}\}_{k \in \mathbb{N}}$, 进一步取

$$x^{(k)} := \underbrace{\{1, \dots, 1\}}_{n \uparrow}, 0, \dots\}, \quad b := \left\{ \frac{1}{k} \right\}_{k \in \mathbb{N}},$$

则 $Tx^{(k)} = a^{(k)}$, $\|x^{(k)}\|_{c_0} = 1$, 且

$$\|Tx^{(k)} - b\|_{l^2} = \|a^{(k)} - b\|_{l^k} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

因为先前已经说过 $b \notin R(T_0)$, 故 $\{Tx^{(k)}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $R(T_0)$ 中没有收敛子列, 因此 T 不是 $c_0 \rightarrow R(T_0)$ 的紧算子. $\square$

根据紧算子的定义即知, 紧算子大多是在强拓扑下谈的. 对于弱拓扑而言, 我们同样能给出与紧算子类似定义的算子, 此即全连续算子:

定义 6.7 (全连续算子 (completely continuous operator))

设 X, Y 均为 B^* 空间. 若线性算子 $A: X \rightarrow Y$ 满足对 X 中的任意弱收敛列 $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$ 而言, 均有 $Ax_n \rightarrow Ax (n \rightarrow \infty)$, 就称 A 为全连续算子.



注 6.14 若线性算子 A 全连续, 则其必连续. 根据 A 的线性性, 只需说明 A 在 0_X 处连续. 设 $x_n \rightharpoonup 0_X (n \rightarrow \infty)$, 则 $x_n \rightharpoonup 0_X (n \rightarrow \infty)$, 由 A 的全连续性可得 $Ax_n \rightarrow A0_X = 0_Y (n \rightarrow \infty)$, 此即欲证.

全连续算子与紧算子之间的关系由下述命题给出:

命题 6.5

若 $A \in \mathfrak{L}(X, Y)$, 则 A 全连续. 反之, 若 X 自反, 则 $A \in \mathfrak{L}(X, Y) \Leftrightarrow A$ 全连续.



证明 设 $A \in \mathfrak{L}(X, Y)$, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, 记 $x_n \rightharpoonup x \in X (n \rightarrow \infty)$, 往证 $Ax_n \rightarrow Ax (n \rightarrow \infty)$. 考虑反证法, 假设存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\forall k \in \mathbb{N} (\|Ax_{n_k} - Ax\|_Y \geq \varepsilon_0). \quad (6.31)$$

因为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 弱收敛, 故它作为 X^{**} 中的元素时满足 $\forall f \in X^* (\langle x_n, f \rangle < \infty)$, 根据 Banach-Steinhaus 定理 2.7 知 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X^{**} 中的有界集, 故它同样是 X 中的有界集. 因此 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是 X 中的有界集, 根据 $A \in \mathfrak{L}(X, Y)$ 知

$\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 存在子列 (不妨仍将其记为 $\{x_{n_k}\}$) 与 $z \in Y$ 使得

$$Ax_{n_k} \rightarrow z, k \rightarrow \infty.$$

另一方面, 对任意 $y^* \in Y^*$, 由 $x_n \rightharpoonup x \in X (n \rightarrow \infty)$ 与 $A^*y^* \in X^*$ 知 $k \rightarrow \infty$ 时

$$\langle y^*, Ax_{n_k} - Ax \rangle = \langle A^*y^*, x_{n_k} - x \rangle \rightarrow 0.$$

因此

$$Ax_{n_k} \rightharpoonup Ax, k \rightarrow \infty.$$

由弱极限的唯一性知 $Ax = z$ 且 $Ax_{n_k} \rightarrow Ax (k \rightarrow \infty)$, 这与(6.31)式矛盾! 故 A 全连续.

反之, 若 X 自反且 A 全连续, 由 Eberlein-Smulian 定理 3.6 知 X 中的有界集必弱列紧, 这说明对 X 中的任意有界点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 必存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 与 $x \in X$ 使得 $x_{n_k} \rightharpoonup x (k \rightarrow \infty)$. 因为 A 全连续, 故 $Ax_{n_k} \rightarrow Ax (k \rightarrow \infty)$, 由定义 6.5(iii) 即知 $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$. $\square$

定理 6.5 (Schauder)

设 X 是 B^* 空间, Y 是 Banach 空间, 则 $A \in \mathfrak{C}(X, Y) \Leftrightarrow A^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$.

证明 $\Rightarrow$: 设 $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 往证 $A^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$, 此即证明当 $\{y_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 Y^* 中的有界点列时, $\{A^*y_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 X^* 中有收敛子列. 为此不妨设 $\|y_n^*\|_{Y^*} \leq M$ (其中 $n \in \mathbb{N}, M$ 是正常数). 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 与 $y \in \overline{A(B_1)}$, 令

$$\varphi_n(y) := \langle y_n^*, y \rangle.$$

则 φ_n 是 $\overline{A(B_1)}$ 上的连续函数. 记 $\overline{A(B_1)}$ 上连续函数的全体为 $C(\overline{A(B_1)})$, 注意到

$$\begin{aligned} \|A^*y_n^*\|_{X^*} &= \sup_{x \in B_1} |\langle A^*y_n^*, x \rangle| = \sup_{y \in A(B_1)} |\langle y_n^*, y \rangle| \\ &= \sup_{y \in \overline{A(B_1)}} |\langle y_n^*, y \rangle| = \sup_{y \in \overline{A(B_1)}} |\varphi_n(y)| \\ &=: \|\varphi_n\|_{C(\overline{A(B_1)})}, \end{aligned}$$

因此 $\{A^*y_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 X^* 中有收敛子列当且仅当 $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $C(\overline{A(B_1)})$ 中有收敛子列, 因此只需证明 $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $C(\overline{A(B_1)})$ 中的列紧集. 根据 Arzela-Ascoli 定理与 $\overline{A(B_1)}$ 的紧性, 这便只需证明 $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 一致有界且等度连续.

对于一致有界性, 任取 $y \in \overline{A(B_1)}$, 知存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B_1$ 使得

$$\|y - Ax_n\|_Y \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

于是

$$\begin{aligned} \|y\|_Y &\leq \|y - Ax_n\|_Y + \|Ax_n\|_Y \\ &\leq \|y - Ax_n\|_Y + \|A\|_{L(X, Y)} \\ &\rightarrow \|A\|_{L(X, Y)}, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

此即 $\|y\|_Y \leq \|A\|_{L(X, Y)}$, 因此对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 与 $y \in \overline{A(B_1)}$ 有

$$|\varphi_n(y)| = |\langle y_n^*, y \rangle| \leq \|y_n^*\|_{Y^*} \|y\|_Y \leq M \|A\|_{L(X, Y)}.$$

故 $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $\overline{A(B_1)}$ 上一致有界.

对于等度连续性, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 与 $y, z \in \overline{A(B_1)}$ 有

$$|\varphi_n(y) - \varphi_n(z)| = |\langle y_n^*, y - z \rangle| \leq M \|y - z\|_Y.$$

因此 $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $\overline{A(B_1)}$ 上等度连续, 至此 $\Rightarrow$ 得证.

$\Leftarrow$: 设 $A^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$, 由 $\Rightarrow$ 的结论知 $A^{**} \in \mathfrak{C}(X^{**}, Y^{**})$. 现设 $U: X \rightarrow X^{**}, V: Y \rightarrow Y^{**}$ 为典则嵌入, 可见 U, V 等距. 下面说明对 $\forall x \in X^*$ 有

$$A^{**}Ux = VAx.$$

这是因为对 $\forall y^* \in Y^*$ 有

$$\begin{aligned}\langle A^{**}Ux, y^* \rangle &= \langle Ux, A^*y^* \rangle = \langle A^*, y^*, x \rangle \\ &= \langle y^*, Ax \rangle = \langle VAx, y^* \rangle.\end{aligned}$$

现设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X 中的有界点列, 由 U 的等距性知 $\{Ux_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X^{**} 中的有界点列, 于是根据 $A^{**} \in \mathfrak{C}(X^{**}, Y^{**})$ 知 $\{A^{**}Ux_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y^{**} 中有收敛子列, 此即 $\{VAx_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y^{**} 中有收敛子列, 记该子列为 $\{VAx_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, 于是

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K > 0 \forall p, q > K (\|VAx_{n_p} - VAx_{n_q}\|_{Y^{**}} < \varepsilon)$$

根据 V 的等距性可得

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K > 0 \forall p, q > K (\|Ax_{n_p} - Ax_{n_q}\|_Y < \varepsilon)$$

由 Y 是 Banach 空间即知 $\{Ax_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 作为 Y 中的基本列在 Y 中收敛, 因此 $A \in \mathfrak{C}(X, Y)$. □

下面给出一个紧算子的例子.

例 6.6 设有闭区间 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $K \in C(\Omega \times \Omega)$, $X = Y = C(\Omega)$, 记

$$T: u \mapsto \int_{\Omega} K(\cdot, y)u(y)dy, \quad \forall u \in C(\Omega),$$

则 $T \in \mathfrak{C}(X)$.

证明 对 $\forall u \in C(\Omega)$, 首先说明 $Tu \in C(\Omega)$. 事实上, 因为 $K \in C(\Omega \times \Omega)$ 且 Ω 紧, 故 K 在 $\Omega \times \Omega$ 上一致连续, 根据一致连续的定义知

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists \delta \in (0, \infty) \forall x_1, x_2 \in \Omega \forall y \in \Omega (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |K(x_1, y) - K(x_2, y)| < \varepsilon).$$

因此

$$\begin{aligned}|Tu(x_1) - Tu(x_2)| &= \left| \int_{\Omega} [K(x_1, y) - K(x_2, y)]u(y)dy \right| \\ &< \varepsilon \int_{\Omega} |u(y)|dy \leq \varepsilon \|u\|_{C(\Omega)} |\Omega|.\end{aligned}$$

故 Tu 在 Ω 上连续, 进而 $Tu \in C(\Omega)$, 这说明 T 首先是 $X \rightarrow X$ 的.

下面说明 $T \in \mathfrak{C}(X)$, 我们从定义 6.5(iii) 入手, 任取 $C(\Omega)$ 中的有界点列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$, 往证 $\{Tu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 有收敛子列, 这也就是证明 $\{Tu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 列紧, 根据 Arzela-Ascoli 定理知只需证明 $\{Tu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 一致有界且等度连续即可. 不妨设对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 有 $\|u_m\|_{C(\Omega)} \leq L$ (其中 L 是与 m 无关的非负常数), 根据 T 的连续性与 Ω 的紧性知

$$\begin{aligned}\|Tu_m\|_{C(\Omega)} &= \max_{x \in \Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y)u_m(y)dy \right| \\ &\leq L|\Omega| \max_{(x, y) \in \Omega \times \Omega} |K(x, y)| < \infty.\end{aligned}$$

因此 $\{Tu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 Ω 上一致有界.

对于等度连续性, 由 Ω 紧与 $K \in C(\Omega \times \Omega)$ 知 K 在 $\Omega \times \Omega$ 上一致连续, 即

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists \delta \in (0, \infty) \forall x, \tilde{x} \in \Omega \forall y \in \Omega (|x - \tilde{x}| < \delta \Rightarrow |K(x, y) - K(\tilde{x}, y)| < \varepsilon).$$

于是对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$|Tu_m(x) - Tu_m(\tilde{x})| \leq \int_{\Omega} |K(x, y) - K(\tilde{x}, y)| |u_m(y)|dy < \varepsilon L |\Omega|.$$

因此 $\{Tu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 Ω 上等度连续, 至此即得 $T \in \mathfrak{C}(X)$.

定义 6.8 (有穷秩算子 (finite rank operator))

设 $T \in L(X, Y)$, 若 $\dim R(T) < \infty$, 就称 T 是有穷秩算子. 有穷秩算子的全体记作 $F(X, Y)$, 特别当 $X = Y$ 时记 $F(X, Y) = F(X)$.



注 6.15 注意特别要求 $T \in L(X, Y)$ 是因为存在有限维值域的无界线性算子. 例如取 $X := \text{span}\{e_i\}_{i=1}^{\infty} \subset l^2$, $Y = \mathbb{R}$, $f(e_i) = i (\forall i \in \mathbb{N})$. 对 f 在 X 上作线性扩张, 依旧记扩张后的算子为 f , 则现在得到的 f 就是值域为 $\mathbb{R}$ 的无界

线性泛函.

因为有限维线性空间中紧集与有界闭集等价, 故有穷秩算子必为紧算子.

定义 6.9 (秩 1 算子 (rank 1 operator))

设 $f \in X^*, y \in Y$, 定义算子 $y \otimes f$ 为

$$y \otimes f : X \rightarrow Y, x \mapsto \langle f, x \rangle_{X^* \times X} y.$$

称之为秩 1 算子.



注 6.16 我们特别提醒关于秩 1 算子的下述两点:

(i) 对秩 1 算子 $y \otimes f$ 有:

$$\dim R(y \otimes f) = \begin{cases} 1, & y \neq 0_Y \text{ 且 } f \neq 0_{X^*} \\ 0, & y = 0_Y \text{ 或 } f = 0_{X^*} \end{cases}$$

(ii) 因为

$$\begin{aligned} \|y \otimes f\|_{L(X, Y)} &= \sup_{\|x\|_X=1} \|\langle f, x \rangle y\|_Y \\ &= \sup_{\|x\|_X=1} |\langle f, x \rangle| \|y\|_Y = \|f\|_{X^*} \|y\|_Y, \end{aligned}$$

故秩 1 算子必为有界线性算子.

利用秩 1 算子可以刻画有穷秩算子, 此即下述定理:

定理 6.6

算子 $T \in F(X, Y)$ 当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得对 $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ 而言, 存在 $y_i \in Y$ 与 $f_i \in X^*$ 使得

$$T = \sum_{i=1}^m y_i \otimes f_i.$$



证明 $\Leftarrow$: 记 $\text{span}\{y_1, \dots, y_m\}$ 为 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 张成的线性子空间, 即

$$\text{span}\{y_1, \dots, y_m\} := \left\{ y \in Y : y = \sum_{i=1}^m \lambda_i y_i, \lambda_i \in \mathbb{C}, i \in \{1, \dots, m\} \right\}.$$

由 $R(T) \subset \text{span}\{y_1, \dots, y_m\}$ 即知 $T \in F(X, Y)$.

$\Rightarrow$: 若 $T \in F(X, Y)$, 则 $m := \dim R(T) < \infty$. 设 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 为 $R(T)$ 的基, 则 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 线性无关, 因此对 $\forall x \in X$ 而言存在唯一序列 $\{l_i(x)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{C}$ 使得

$$Tx = \sum_{i=1}^m l_i(x) y_i. \quad (6.32)$$

下面说明 $l_i \in X^* (\forall i \in \{1, \dots, m\})$. 为此首先说明 $\{l_i\}_{i=1}^m$ 是线性的. 事实上, 对任意 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ 与任意 $x_1, x_2 \in X$ 有

$$\begin{aligned} T(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &= \alpha_1 T x_1 + \alpha_2 T x_2 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m l_i(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) y_i &= \alpha_1 \sum_{i=1}^m l_i(x_1) y_i + \alpha_2 \sum_{i=1}^m l_i(x_2) y_i \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m [l_i(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) - \alpha_1 l_i(x_1) - \alpha_2 l_i(x_2)] y_i &= 0. \end{aligned}$$

由此与 $\{y_i\}_{i=1}^m$ 的线性无关性知对 $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ 有

$$l_i(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 l_i(x_1) + \alpha_2 l_i(x_2),$$

因此 $l_i(x)$ 是线性的.

下面说明对 $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ 而言 l_i 有界, 为此首先断言对 $\forall x \in X$ 而言, $\|Tx\|_Y$ 与 $\sum_{i=1}^m |l_i(x)|$ 均为 $R(T)$

上的范数¹⁶. 事实上, $\|Tx\|_Y$ 显然是 $R(T) \subset Y$ 上的范数. 对于 $\sum_{i=1}^m |l_i(x)|$, 首先它非负, 其次

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m |l_i(x)| = 0 &\Leftrightarrow l_i(x) = 0, \forall i \in \{1, \dots, m\} \\ &\Leftrightarrow Tx = 0_Y. \end{aligned}$$

而 $\sum_{i=1}^m |l_i(x)|$ 的齐次性与三角不等式由 $\{l_i\}_{i=1}^m$ 的线性性立得, 故 $\sum_{i=1}^m |l_i(x)|$ 也为 $R(T)$ 上的范数. 现在因为有限维空间上的诸范数互相等价, 可知存在 $M > 0$ 使得对 $\forall x \in X$ 均有

$$\sum_{i=1}^m |l_i(x)| \leq M \|Tx\|_Y \leq M \|T\|_{L(X,Y)} \|x\|_X.$$

由此可知对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 均有 $l_i \in X^*$, 因此对每个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 而言, 存在 $f_i \in X^*$ 使得对 $\forall x \in X$ 有

$$l_i(x) = \langle f_i, x \rangle.$$

由此可得

$$Tx = \sum_{i=1}^m \langle f_i, x \rangle y_i = \sum_{i=1}^m y_i \otimes f_i(x).$$

这说明

$$T = \sum_{i=1}^m y_i \otimes f_i,$$

此即欲证. □

回忆紧算子的基本性质 6.4(iii), 当 Y 是 Banach 空间时 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 本身是 $L(X, Y)$ 中 (在强拓扑下) 的闭集, 而前面已经提过 $F(X, Y) \subset \mathfrak{C}(X, Y)$, 故 $\overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)} \subset \mathfrak{C}(X, Y)$, 这也就是下述推论:

推论 6.2

设 X, Y 是 Banach 空间, $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset F(X, Y), T \in L(X, Y)$. 若 $\|T_n - T\|_{L(X, Y)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$. ♥

注 6.17 由 Banach 与 Grothendieck 提出的著名“逼近问题”实际上就是推论 6.2 的反问题: 对给定的紧算子 T 而言, 是否总存在有穷秩算子列 $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $L(X, Y)$ 范数下收敛到 T ? 这个问题公开了很久, 直到 1972 年 P. Enflo 才给出第一个反例. 最初的反例构造相当复杂, 不过之后陆续发现了更简单的反例: 比方说当 Y 是 $l^p (1 < p < \infty, p \neq 2)$ 的某些闭子空间时这件事就不成立. 读者可以在 J. Lindenstrauss-L. Tzafriri 的文章中找到对逼近问题的详尽讨论. 注意到逼近问题在某些情况下是成立的, 例如下述命题讨论的 $X = Y$ 为 Hilbert 空间的情形¹⁷:

命题 6.6

设 H 是 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(H)}^{L(H)} = \mathfrak{C}(H)$. ♠

证明 由 $\mathfrak{C}(H)$ 的闭性与 $F(H) \subset \mathfrak{C}(H)$ 已知 $\overline{F(H)}^{L(H)} \subset \mathfrak{C}(H)$, 故只需再说明 $\mathfrak{C}(H) \subset \overline{F(H)}^{L(H)}$ 即可. 设 $T \in \mathfrak{C}(H)$, 根据紧算子的定义知 $\overline{T(B_1)}$ 紧, 其中 B_1 是 H 中的单位球. 现在 H 作为 Hilbert 空间首先是赋范的, 因此它是可度量的, 而在度量空间中根据引理 6.3 知紧性和自列紧性等价, 故 $\overline{T(B_1)}$ 自列紧, 又由 Hausdorff 定理 6.6 可

¹⁶这里 $\sum_{i=1}^m |l_i(x)|$ 作为 $R(T)$ 上的范数可以理解为: 对每个 $y \in R(T)$, 总存在 $x \in X$ 使得 $y = Tx$. 根据 $R(T)$ 的基 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 的线性无关性, 这个 $x \in X$ 对应的序列 $\{l_i(x)\}_{i=1}^m$ 唯一, 因此 $\sum_{i=1}^m |l_i(x)|$ 良定义, 且它唯一对应 $R(T)$ 中的元素 y .

¹⁷其实这里 Hilbert 空间上的有穷秩逼近我觉得直觉上不是那么显然, 反而是后文提到的带 Schauder 基空间上的有穷秩逼近会更好理解一些: (至多可数的)Schauder 基天生地带了一套逼近元素的方法, 用 (至多可数的)Schauder 基构造有穷秩算子就可以了. 这个思路其实没法直接套到 Hilbert 空间上, 因为 Hilbert 空间天生带的正交规范基未必至多可数, 对于不可数基我们是没法写下有穷秩的 (至多可数) 极限的. 这套证明在技术上用了 $\overline{T(B_1)}$ 有穷 ε 网扩成的线性空间逼近, 它其实暗示了一件事情: 如果要逼近 T , 只需要用到 Hilbert 空间那些规范正交基中的至多可数个基就可以了! 这件事是相当不平凡的, 它相当于在 Hilbert 空间的 (可能不可数的) 规范正交基中提取了用于刻画 $R(T)$ 的 (至多可数的) 基, 而把其余的基丢给了 $R(T)^\perp$. 随着研究的深入可以发现, 这个故事其实就是振聋发聩的 Hilbert-Schmidt 定理在紧算子上的一个余响.

知 $\overline{T(B_1)}$ 完全有界, 因此任取 $\varepsilon \in (0, \infty)$, 总存在 $\overline{T(B_1)}$ 的有限 $\varepsilon/2$ 网 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 使得

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令 $E_\varepsilon := \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. 因为 E_ε 是有限维线性空间, 故它是 H 的闭子空间¹⁸, 根据 Hilbert 空间的正交分解定理知对 $\forall x \in H$ 均存在唯一正交分解 $x = y + z$, 其中 $y \in E_\varepsilon$, 而

$$z \in E_\varepsilon^\perp = \{z \in H : (z|y)_H = 0, \forall y \in E_\varepsilon\}.$$

记 $P_\varepsilon x = y$, 则 P_ε 是 H 到 E_ε 的正交投影. 由

$$\|x\|_H^2 = \|y\|_H^2 + \|z\|_H^2$$

进一步可得

$$\|P_\varepsilon\|_{L(H)} = \sup_{\|x\|_H=1} \|P_\varepsilon x\|_H = \sup_{\|x\|_H=1} \|y\|_H \leq 1,$$

因此 $\|P_\varepsilon\|_{L(H)} \leq 1$, 这说明 $P_\varepsilon \in L(H)$, 且显见 $P_\varepsilon T \in F(H)$.

下面再用 $P_\varepsilon T$ 尝试逼近 T . 回到 $\overline{T(B_1)}$, 因为 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 是 $\overline{T(B_1)}$ 的有限 $\varepsilon/2$ 网, 故对 $\forall x \in B_1$, 总存在 $y_i (i \in \{1, \dots, m\})$ 使得

$$\|Tx - y_i\|_H < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此及 $P_\varepsilon y_i = y_i$ 可知

$$\begin{aligned} \|P_\varepsilon Tx - y_i\|_H &= \|P_\varepsilon(Tx - y_i)\|_H \\ &\leq \|P_\varepsilon\|_H \|Tx - y_i\|_H < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

因此对 $\forall x \in B_1$ 有

$$\|Tx - P_\varepsilon Tx\|_H \leq \|Tx - y_i\|_H + \|y_i - P_\varepsilon Tx\|_H < \varepsilon.$$

由此可知 $\|T - P_\varepsilon T\|_{L(H)} \leq \varepsilon$, 此即 $\mathfrak{C}(H) \subset \overline{F(H)}^{L(H)}$. □

注 6.18 注意在上述证明中, 我们对定义域只用到了其上可赋范 (即可定义单位球 B_1), 而对到达域才用到了 Hilbert 空间的性质. 因此上述命题可以改进为下述版本:

命题 6.7

设 X 是 B^* 空间, H 是 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(X, H)}^{L(X, H)} = \mathfrak{C}(X, H)$.

下面我们再考察可分空间上的逼近问题, 为此我们先引入 Schauder 基的概念:

定义 6.10 (Schauder 基 (Schauder basis))

设 X 为可分 Banach 空间, 称序列 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ 为 X 的一组 Schauder 基, 如果对 $\forall x \in X$, 均存在唯一序列 $\{C_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ 使得

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n$$

在 X 中成立, 亦即

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|_X \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

注 6.19

- (i) 若 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 X 的一组 Schauder 基, 则由 $\{C_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的唯一性可知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有 $e_n \neq 0_X$, 故对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有 $\|e_n\|_X \neq 0$.

¹⁸注意只有闭了才能用正交分解定理.

(ii) 若 X 有 Schauder 基, 则 X 可分. 事实上, 设 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 X 的 Schauder 基, 记

$$M := \left\{ \sum_{j=1}^N (a_j + ib_j) e_j : N \in \mathbb{N}, a_j, b_j \in \mathbb{Q}, j \in \{1, 2, \dots, N\} \right\},$$

显见 M 可数. 要证明 X 可分, 现在就只需证明 M 在 X 中稠密. 为此取 $x \in X$, 根据 Schauder 基的定义知 $N \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|_X \rightarrow 0,$$

因此对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$, 总存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|_X < \frac{\varepsilon}{2}.$$

记 $L := \max\{\|e_n\|_X : n \in \{1, 2, \dots, N\}\}$, 由本注记 (i) 知 $L > 0$. 对 $\forall n \in \{1, 2, \dots, N\}$, 取 $a_n, b_n \in \mathbb{Q}$ 使得 $|C_n(x) - (a_n + ib_n)| < \frac{\varepsilon}{2LN}$, 则

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{n=1}^N (a_n + ib_n) e_n \right\|_X &\leq \left\| x - \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|_X + \sum_{n=1}^N |C_n(x) - (a_n + ib_n)| \|e_n\|_X \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + LN \frac{\varepsilon}{2LN} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 M 在 X 中稠密, 故 X 可分.

引理 6.7

若 X 是可分 Banach 空间, 则定义 6.10 中的 $C_n(x)$ 是 X 上的有界线性泛函.

证明 首先说明 C_n 是 X 上的线性函数. 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y \in X$ 知

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(\alpha x + \beta y) e_n &= \alpha x + \beta y \\ &= \alpha \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n + \beta \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(y) e_n \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N [\alpha C_n(x) + \beta C_n(y)] e_n, \end{aligned}$$

由 C_n 的唯一性可知

$$C_n(\alpha x + \beta y) = \alpha C_n(x) + \beta C_n(y).$$

因此 C_n 首先是 X 上的线性函数.

下面说明连续性. 为此对 $\forall x \in X$ 定义

$$|||x||| := \sup_{n \in \mathbb{N}} \|S_n(x)\|_X,$$

其中 $S_n(x) := \sum_{i=1}^n C_i(x) e_i$. 易证 $|||\cdot|||$ 是 X 上的范数, 又因为当 $N \rightarrow \infty$ 时有

$$0 \leq |||x|||_X - \|S_n(x)\|_X \leq \|x - S_n(x)\|_X \rightarrow 0,$$

故

$$\|x\|_X = \lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n(x)\|_X \leq |||x|||.$$

下面说明 $(X, |||\cdot|||)$ 完备, 为此设 $\{x_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 为 $(X, |||\cdot|||)$ 中的基本列. 因为对任意 $m \in \mathbb{N}$ 均有

$$x_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n C_i(x_m) e_i$$

在 $\|\cdot\|_X$ 范数下成立, 故对 $\forall m, k, n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \|C_n(x_m) - C_n(x_k)\|_X &= \left\| \sum_{i=1}^n [C_i(x_m) - C_i(x_k)]e_i - \sum_{i=1}^{n-1} [C_i(x_m) - C_i(x_k)]e_i \right\|_X \\ &= \|S_n(x_m - x_k) - S_{n-1}(x_m - x_k)\|_X \\ &\leq 2\|x_m - x_k\|_X, \end{aligned}$$

因此

$$\|C_n(x_m) - C_n(x_k)\|_X \leq 2\|e_n\|_X^{-1}\|x_m - x_k\|_X.$$

于是 $\{C_n(x_m)\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的基本列, 故存在 $\alpha_n \in \mathbb{C}$ 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} C_n(x_m) = \alpha_n.$$

进一步利用三角不等式可知对任意取定的 $n \in \mathbb{N}$, 当 $m \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| S_n(x_m) - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|_X \rightarrow 0. \quad (6.33)$$

下面说明 $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i \in X$, 且当 $m \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| x_m - \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i \right\|_X \rightarrow 0.$$

事实上, 因为 $\{x_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $(X, \|\cdot\|_X)$ 中的基本列, 故对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 存在 $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ 使得对 $\forall m, k \geq N_\varepsilon$ 与 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|S_n(x_m) - S_n(x_k)\|_X \leq \|x_m - x_k\|_X < \frac{\varepsilon}{3},$$

从而

$$\begin{aligned} \left\| S_n(x_m) - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|_X &\leq \|S_n(x_m) - S_n(x_k)\|_X + \left\| S_n(x_k) - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|_X \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left\| S_n(x_k) - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|_X. \end{aligned}$$

在上式中令 $k \rightarrow \infty$ 并利用(6.33)式可知

$$\left\| S_n(x_m) - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\|_X \leq \frac{\varepsilon}{3}. \quad (6.34)$$

由此知对任意的 $l \geq k \geq 2$ 有

$$\left\| \sum_{i=k}^l C_i(x_m) e_i - \sum_{i=k}^l \alpha_i e_i \right\|_X \leq \left\| S_l(x_m) - \sum_{i=1}^l \alpha_i e_i \right\|_X + \left\| S_{k-1}(x_m) - \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i e_i \right\|_X \leq \frac{2\varepsilon}{3}. \quad (6.35)$$

固定 $m \geq N_\varepsilon$, 因为 $x_m = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_m)$ 在 $\|\cdot\|_X$ 意义下成立, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对 $\forall l \geq k \geq N$ 有

$$\left\| \sum_{i=k}^l C_i(x_m) e_i \right\|_X = \|S_l(x_m) - S_{k-1}(x_m)\|_X < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由此及(6.35)式知

$$\left\| \sum_{i=k}^l \alpha_i e_i \right\|_X \leq \left\| \sum_{i=k}^l \alpha_i e_i - \sum_{i=k}^l C_i(x_m) e_i \right\|_X + \left\| \sum_{i=k}^l C_i(x_m) e_i \right\|_X < \varepsilon.$$

因此 $\{\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 $(X, \|\cdot\|_X)$ 中的基本列, 由 X 的完备性可知 $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i \in X$.

现在根据 Schauder 基分解的唯一性, 当 $m \geq N_\varepsilon$ 时, 因为

$$\begin{aligned} x &:= \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^{\infty} C_i(x) e_i, \\ S_n(x) &= \sum_{i=1}^n C_i(x) e_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \end{aligned}$$

由此及(6.34)式有

$$\begin{aligned} |||x_m - x||| &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \|S_n(x_m) - S_n(x)\|_X \\ &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \left\| S_n(x_m) - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\| \leq \frac{\varepsilon}{3}, \end{aligned}$$

这说明 x 是 $\{x_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 $|||\cdot|||$ 下的极限, 因此 $(X, |||\cdot|||)$ 完备. 根据等价范数定理2.9知存在 $M > 0$ 使得对任意 $x \in X$ 均有

$$|||x||| \leq M\|x\|_X.$$

在上式中代入 $|||\cdot|||$ 的定义即知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有 $\|S_n\|_{L(X)} \leq M$, 且对 $\forall x \in X$ 有

$$\|C_n(x)\|_X = \|S_n(x) - S_{n-1}(x)\|_X \leq 2M\|x\|_X,$$

因此

$$\|C_n\|_{X^*} = \sup_{x \in X \setminus \{0_X\}} \frac{|C_n(x)|}{\|x\|_X} \leq 2M\|e_n\|_X^{-1},$$

故 $C_n \in X^*$, 引理至此得证. □

定理 6.7

若 Banach 空间 X 上有 Schauder 基, 则 $\overline{F(X)}^{L(X)} = \mathfrak{C}(X)$.

证明 因为已经有 $\overline{F(X)}^{L(X)} \subset \mathfrak{C}(X)$, 故只需证明 $\mathfrak{C}(X) \subset \overline{F(X)}^{L(X)}$. 设 S_n 与引理6.7证明中的设置相同, 根据引理6.7的证明可知存在 $M > 0$ 使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|S_n\|_{L(X)} \leq M.$$

设 $T \in \mathfrak{C}(X)$, 则 $\overline{T(B_1)}$ 是紧集, 因此根据引理6.3知 $\overline{T(B_1)}$ 是自列紧集, 再由 Hausdorff 定理6.6知对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 均存在 $\overline{T(B_1)}$ 的有穷 $\varepsilon/3(M+1)$ 网 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 使得

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{3(M+1)}\right).$$

因此对 $\forall x \in B_1$, 总存在 y_i 使得

$$\|Tx - y_i\|_X < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}.$$

故对 $\forall N \in \mathbb{N}$ 有

$$\|S_N(Tx) - S_N(y_i)\|_X < \frac{M\varepsilon}{3(M+1)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

另由 Schauder 基的定义知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 有

$$\|S_N(y_i) - y_i\|_X < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\|Tx - S_N(Tx)\|_X \leq \|Tx - y_i\|_X + \|y_i - S_N(y_i)\|_X + \|S_N(y_i) - S_N(Tx)\|_X < \varepsilon.$$

记 $T_\varepsilon := S_N T$, 显见 $T_\varepsilon \in F(X)$, 且 $\|T - T_\varepsilon\|_{L(X)} \leq \varepsilon$. 因此 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时 T_ε 在 $L(X)$ 中收敛到 T , 至此定理即证. □

注 6.20 一个自然的问题是定理6.7能否升级为充要性断言, 即对 Banach 空间 X 而言是否有 $\overline{F(H)}^{L(X)} = \mathfrak{C}(H) \Rightarrow X$ 有 Schauder 基? 可惜的是这件事就算对 Hilbert 空间也未必成立, 也就是说就算知道 $\overline{F(X)}^{L(X)} = \mathfrak{C}(X)$, X 也未必可分, 进而 X 必没有 Schauder 基. 下面我们给出一个不可分 Hilbert 空间的例子. 设 Γ 为 $\mathbb{R}$ 的不可数子集, 记 $l^2(\Gamma)$ 为使得 $\{x \in \Gamma : f(x) \neq 0\}$ 的元素可数且 $\|f\|_{l^2(\Gamma)} := [\sum_{x \in \Gamma} |f(x)|^2]^{\frac{1}{2}} < \infty$ 的实值函数 f 全体构成的空间. 在 $l^2(\Gamma)$ 上赋内积

$$(f|g)_{l^2(\Gamma)} := \sum_{x \in \Gamma} f(x)g(x),$$

可以证明 $l^2(\Gamma)$ 是 Hilbert 空间, 下面说明 $l^2(\Gamma)$ 不可分. 对任意 $x_0 \in \Gamma$ 定义

$$f^{x_0}(x) := \begin{cases} 1, & x = x_0, \\ 0, & x \neq x_0, \end{cases}$$

则 $f^{x_0} \in l^2(\Gamma)$, 且当 $x_1 \neq x_0 \in \Gamma$ 时有

$$\|f^{x_1} - f^{x_0}\|_{l^2(\Gamma)} = \sqrt{2}.$$

这说明 $\{B(f^x, \sqrt{2}/2)\}_{x \in \Gamma}$ 作为不可数球族互不相交, 因此 $l^2(\Gamma)$ 不可能有可数稠子集, 故 $l^2(\Gamma)$ 不可分.

注 6.21 设 X, Y 均为 B^* 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子.

(i) 如果 T 把有界集映成完全有界集, 就称 T 是完全有界算子. 根据引理 6.3 与 Hausdorff 定理 6.6 进而可知

$$T \text{ 是紧算子} \Rightarrow T \text{ 是完全有界算子} \Rightarrow T \text{ 是有界算子}.$$

另若 Y 是 Banach 空间, 则由 Hausdorff 定理 6.6 进一步知

$$T \text{ 是紧算子} \Rightarrow T \text{ 是完全有界算子}.$$

(ii) 回忆紧算子必全连续 (命题 6.5), 全连续算子必有界线性, 可知当 Y 为 Banach 空间时有:

$$\begin{aligned} \overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)} &\subset \mathfrak{C}(X, Y) \\ &\subset \{X \rightarrow Y \text{ 的全体全连续算子}\} \\ &\subset L(X, Y). \end{aligned}$$

因为定理 6.7 中对定义域只要求可赋范, 而对到达域才用到了完备性与 Schauder 基的存在性, 结合命题 6.7 可知当 Y 为 Hilbert 空间或具 Schauder 基的 Banach 空间时, 上式中第一个包含关系取等; 当 X 为自反空间时, 由命题 6.5 知上式中第二个包含关系取等. 特别若 Y 为有限维 B^* 空间, 则 Y 为 Banach 空间的同时还具有 Schauder 基, 于是 $\overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)} = \mathfrak{C}(X, Y)$, 又因为 Y 本身是有限维的, 故 $\mathfrak{C}(X, Y) = L(X, Y)$, 因此

$$\overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)} = \mathfrak{C}(X, Y) = L(X, Y).$$

注 6.22 回到前面注记提起过的逼近问题, 下面介绍一个在非线性分析中用有穷秩非线性映射逼近 (线性或非线性) 连续映射的重要方法. 设 X 是拓扑空间, Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是连续映射, 其满足 $T(X)$ 在 Y 中预紧 (即 $\overline{T(X)}$ 在 Y 中紧). 下面断言存在有穷秩连续映射 $T_\varepsilon: X \rightarrow Y$ 使得

$$\|T_\varepsilon(x) - T(x)\|_Y < \varepsilon, \quad \forall x \in X. \quad (6.36)$$

事实上, 因为 $K = \overline{T(X)}$ 是 Y 中的紧集, 故存在 K 的有限覆盖 $\bigcup_{i \in I} B(f_i, \varepsilon/2)$. 记

$$T_\varepsilon(x) = \frac{\sum_{i \in I} q_i(x) f_i}{\sum_{i \in I} q_i(x)}, \quad q_i(x) = \max\{\varepsilon - \|Tx - f_i\|_Y, 0\};$$

直接验证即知 T_ε 满足 (6.36) 式.

这类逼近非常有用, 比方说它可以用在从 Brouwer 不动点定理推导 Schauder 不动点定理中. Lomonosov 另外还把上式的一个类似构造与 Schauder 不动点定理结合起来, 给出了线性算子的一个大类中非平凡不变子空间存在性的精彩证明. 通过 Schauder 不动点定理能高度简化证明的另一个线性结果为 Krein-Rutman 定理, 这个定理我们后面也会具体介绍.

注 6.23 关于 Schauder 基需要特别注意: 不可分空间一定没有 Schauder 基, 而可分空间也未必有 Schauder 基.

[19]1.3 习题

练习 6.20

设 X, Y 为 Banach 空间, $A: X \rightarrow Y$ 为线性算子, 证明下述三个命题等价:

- (i) A 为全连续算子;
- (ii) 对 X 中任意弱收敛于 0_X 的点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 均有 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中强收敛于 0_Y ;
- (iii) 存在 $x_0 \in X$ 满足对 X 中任意弱收敛于 x_0 的点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 均有 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 Y 中强收敛于 Ax_0 .

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 在全连续的定义中取 $x = 0_X$ 立得.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 取 $x_0 = 0_X$ 立得.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 任取 $x \in X$, 设 $\{x_n\} \subset X$ 满足 $x_n \rightharpoonup x$, 则 $y_n := x_0 - x + x_n \rightharpoonup x_0$, 由 (ii) 知 $Ay_n = Ax_0 - Ax + Ax_n \rightarrow Ax_0$, 此即 $Ax_n \rightarrow Ax$, 由 x 的任意性即得 (i). $\square$

练习 6.21

记 S_n 同引理 6.7 的证明, 证明 $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 一致有界当且仅当对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $C_n \in X^*$.

证明 $\Rightarrow$: 不妨设存在 $M > 0$ 使得 $\forall x \in X \forall n \in \mathbb{N} (\|S_n(x)\|_X \leq M\|x\|_X)$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 注意到 $C_n(x)e_n = S_n(x) - S_{n-1}(x)$, 于是

$$\|C_n(x)\|_X \|e_n\|_X = \|C_n(x)e_n\|_X \leq \|S_n(x)\|_X + \|S_{n-1}(x)\|_X \leq 2M\|x\|_X,$$

由 $\|e_n\|_X \neq 0 (\forall n \in \mathbb{N})$ 即知 $C_n \in X^*$.

$\Leftarrow$: 既然 $\forall n \in \mathbb{N} (C_n \in X^*)$, 故 $\forall n \in \mathbb{N} (S_n \in L(X))$. 又由 C_n 的定义知对任意 $x \in X$ 均有

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x),$$

故对任意 $x \in X$ 均有 $\sup_n \|S_n(x)\|_X < \infty$, 由一致有界原理立得 $\sup_n \|S_n\|_{X \rightarrow X} < \infty$. $\square$

练习 6.22

证明若 X 是无穷维 Banach 空间, 则 X 上的紧算子没有有界逆.

证明 考虑反证法, 设紧算子 $F: X \rightarrow X$ 存在有界逆. 任取 X 中的有界序列 $\{x_n\}$, 由 F 的紧性知 $\{Fx_n\}$ 存在收敛子列, 不妨设 $Fx_n \rightarrow y(X)$. 因为 F 具有有界逆, 故由 $Fx_n \rightarrow y$ 可知 $x_n \rightarrow F^{-1}(y) \in X$, 这说明 $\{x_n\}$ 在 X 中列紧. 由 $\{x_n\}$ 的任意性知这表明 X 中的任意有界集均列紧, 进而 Riesz 定理表明 X 是有穷维空间, 矛盾! $\square$

练习 6.23

设 X 为 Banach 空间, $A \in L(X)$ 满足对任意 $x \in X$ 均有

$$\|Ax\|_X \geq \alpha\|x\|_X,$$

其中 α 是正常数. 证明 A 紧当且仅当 X 有穷维.

证明 $\Rightarrow$: 考虑反证法, 若 X 无穷维, 令 $y = Ax$, 则 $x = A^{-1}y$, 知

$$\alpha\|A^{-1}y\|_X \leq \|y\|_X \Rightarrow \|A^{-1}\|_{X \rightarrow X} \leq \alpha^{-1},$$

这表明 A 有有界逆, 故由前一题结论知 A 不是紧算子, 矛盾!

$\Leftarrow$: 因为有穷维空间中的有界闭集必为紧集, 故有穷维空间中的单位球面是紧集, 而 $A: X \rightarrow X$ 作为连续映射保持紧性, 故 A 把单位球面映成紧集, 由命题 6.3(i) 即知 A 紧. $\square$

练习 6.24

设 $p \in [1, \infty)$, $\{w_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 0$, 证明算子

$$T: \{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \{w_n \xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

是 l^p 上的紧算子.

证明 记

$$T_k : (\xi_1, \dots, \xi_n, \dots) = \{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (w_1 \xi_1, \dots, w_k \xi_k, 0, \dots) = \{w_n \xi_n \mathbf{1}_{n \leq k}\}_{n \in \mathbb{N}},$$

显见 T, T_k 均为线性算子. 考虑利用推论 6.2 证明结论, 为此需要说明 $T_k \in F(l^p), T \in L(l^p)$, 且 $T_k \rightarrow T(L(l^p))$. 首先说明 $T_k \in F(l^p)$, 为此取单位向量 $e_i \in l^p$ 与映射 $f_i : \{\xi_n\} \mapsto w_i \xi_i \in \mathbb{C}$, 既然 $\mathbb{C} \ni w_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $\sup_n |w_n| < \infty$, 进而

$$|f(\xi)| \leq \sup_n |w_n| \cdot \|\xi\|_{l^p} \Rightarrow \|f\|_{X^*} \leq \sup_n |w_n| < \infty \Rightarrow f \in X^*.$$

显见 $T_k = \sum_{i=1}^k e_i \otimes f_i$, 故 $T_k \in F(X, Y) (k \in \mathbb{N})$. 再说明 $T \in L(l^p)$, 知

$$\|T\xi\|_{l^p} \leq \sup_n |w_n| \cdot \|\xi\|_{l^p} \Rightarrow \|T\|_{l^p \rightarrow l^p} \leq \sup_n |w_n| < \infty,$$

故 $T \in L(l^p)$. 最后说明 $T_k \rightarrow T(L(l^p))$, 任取 $\xi \in l^p$, 知

$$\begin{aligned} \|(T_k - T)\xi\|_{l^p} &= \left[\sum_{n=k+1}^{\infty} |w_n|^p |\xi_n|^p \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \sup_{n \geq k+1} |w_n| \|\xi\|_{l^p} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

其中最后一步是因为 $\limsup_{n \rightarrow \infty} w_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 0$. 至此由推论 6.2 即得待证结论. $\square$

注 6.24 如果没有想到用有穷秩逼近, 练习 6.24 也可以直接用定义写. 设 $\{\xi^k\}_k = \{(\xi_1^k, \dots, \xi_n^k, \dots)\}_k$ 满足 $\|\xi^k\|_{l^p} \equiv 1 (\forall k)$, 往证 $\{T\xi^k\}_k \subset l^p$ 有收敛子列. 因为 l^p 本身有完备性, 故只需说明 $\{T\xi_k = (w_1 \xi_1^k, \dots, w_n \xi_n^k, \dots)\}_k$ 具有作为 l^p 中 Cauchy 列的子列. 此即往证存在子列映射 ϕ 使得

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K > 0 \forall k, l > K \left(\sum_{n=1}^{\infty} |w_n (\xi_n^{\phi(k)} - \xi_n^{\phi(l)})|^p < \varepsilon \right).$$

因为 $\{\xi^k\} \subset l^p$, 故 $\xi^k - \xi^l \in l^p$, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n^k - \xi_n^l|^p \leq C_p \|\xi^k - \xi^l\|_{l^p}^p = C_p < \infty.$$

现在把待估计级数分成近远端两部分 (即小角标和大角标两部分). 对于远端, 由 $w_n \rightarrow 0$ 的定义知

$$\exists N > 0 \forall n > N (|w_n| < \varepsilon),$$

于是

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |w_n (\xi_n^k - \xi_n^l)|^p \leq \sup_{n \geq N+1} |w_n| \|\xi^k - \xi^l\|_{l^p}^p \leq C_p \varepsilon.$$

对于 $1 \leq n \leq N$, 注意对每个分量而言均有 $\|\{\xi_n^k\}_k\|_{l^\infty} \leq \|\xi^k\|_{l^p} = 1$, 故每个分量作为数列均一致有界. 现在针对分量列 $\{\xi_1^k\}_k$ 知存在子列映射 ϕ_1 使得 $\{\xi_1^{\phi_1(k)}\}_k$ 收敛, 针对 $\{\xi_2^{\phi_1(k)}\}_k$ 知存在子列映射 ϕ_2 使得 $\{\xi_2^{\phi_2 \circ \phi_1(k)}\}_k$ 收敛. 重复该操作可得子列映射

$$\phi(k) := \phi_N \circ \dots \circ \phi_1(k)$$

使得

$$\exists K > 0 \forall k, l > K \forall 1 \leq n \leq N \left(|\xi_n^{\phi(k)} - \xi_n^{\phi(l)}| < \left(\frac{\varepsilon}{N} \right)^{\frac{1}{p}} \right).$$

进一步由 $w_n \rightarrow 0$ 知首先有 $\sup_n |w_n| < \infty$, 于是只要 $k, l > K$, 就有

$$\sum_{n=1}^N |w_n (\xi_n^{\phi(k)} - \xi_n^{\phi(l)})|^p \leq \sup_n |w_n| \sum_{n=1}^N |\xi_n^{\phi(k)} - \xi_n^{\phi(l)}|^p < \varepsilon \sup_n |w_n|.$$

至此 $\{\xi^{\phi(k)}\}$ 即为待求子列. $\square$

练习 6.25

设 H 是 Hilbert 空间, A 是 H 上的紧算子, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 H 的规范正交集, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (Ae_n | e_n)_H = 0.$$

证明 首先说明 $e_n \rightarrow 0$. 因为 $\{e_n\}$ 是规范正交集, 故由正交分解定理知对任意 $x \in H$ 总存在 $x^\perp \perp \text{span}\{e_n\}$ 使得在 H 的意义下有

$$x - x^\perp = \sum_n (x | e_n)_H e_n.$$

上右式作为收敛级数进而满足 $|(x | e_n)_H| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 由 x 的任意性与 H 为 Hilbert 空间即知 $e_n \rightarrow 0$. 现由 A 是紧算子知 A 必全连续, 于是 $e_n \rightarrow 0 \Rightarrow Ae_n \rightarrow 0(H)$, 进而

$$|(Ae_n | e_n)_H| \leq \|Ae_n\|_H \|e_n\|_H = \|Ae_n\|_H \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

□

练习 6.26

证明注 6.20 中的 $l^2(\Gamma)$ 为 Hilbert 空间.

证明 首先说明 $l^2(\Gamma)$ 是线性空间. 任取 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g \in l^2(\Gamma)$, 知

$$\begin{aligned} \|\alpha f + \beta g\|_{l^2(\Gamma)} &= \left[\sum_{x \in \Gamma} |\alpha f(x) + \beta g(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\sum_{x \in \Gamma} (|\alpha|^2 |f(x)|^2 + |\beta|^2 |g(x)|^2 + 2|\alpha\beta| |f(x)g(x)|) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C \left[\sum_{x \in \Gamma} (|\alpha|^2 |f(x)|^2 + |\beta|^2 |g(x)|^2) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C|\alpha| \left[\sum_{x \in \Gamma} |f(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} + C|\beta| \left[\sum_{x \in \Gamma} |g(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < \infty, \end{aligned}$$

其中第二个不等号用到了和式是至多可数和, 故 $\alpha f + \beta g \in l^2(\Gamma)$, 因此 $l^2(\Gamma)$ 线性.

再说明 $\|\cdot\|_{l^2(\Gamma)}$ 确为范数, 正定性和齐次性显见, 令 $\alpha = \beta = 1$ 并重复上述步骤即得三角不等式, 另由 $(\cdot | \cdot)_{l^2(\Gamma)}$ 的定义立知 $\|f\|_{l^2(\Gamma)} = (f | f)_{l^2(\Gamma)}^{\frac{1}{2}}$, 故 $\|\cdot\|_{l^2(\Gamma)}$ 与 $(\cdot | \cdot)_{l^2(\Gamma)}$ 相容.

最后说明 $l^2(\Gamma)$ 完备. 设 $\{f_n\}$ 为 $l^2(\Gamma)$ 中的 Cauchy 列, 记 $S = \bigcup_n \text{supp } f_n$, 知 S 至多可数, 进而 S 与 $\mathbb{Z}$ 的某子集 I 存在双射 $\phi: S \rightarrow I$, 进而对任意 n 均有

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{l^2(\Gamma)} &= \left[\sum_{x \in S} |f_n(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\sum_{k \in I} |f_n(\phi^{-1}(k))|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \|\{f_n(\phi^{-1}(k))\}_{k \in I}\|_{l^2(\mathbb{Z})}, \end{aligned}$$

这表明

$$f_n \in l^2(\Gamma) \Leftrightarrow \{f_n(\phi^{-1}(k))\}_{k \in I} \in l^2(\mathbb{Z}).$$

依照 Cauchy 列的定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > m > N \left(\|f_n - f_m\|_{l^2(\Gamma)} = \left[\sum_{x \in S} |f_n(x) - f_m(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \|\{(f_n - f_m)(\phi^{-1}(k))\}_{k \in I}\|_{l^2(\mathbb{Z})} < \varepsilon \right),$$

这说明 $\{\{f_n(\phi^{-1}(k))\}_{k \in I}\}_n$ 是 $l^2(\mathbb{Z})$ 中的 Cauchy 列, 由 $l^2(\mathbb{Z})$ 完备知存在 $\{\xi_k\}_{k \in I} \in l^2(\mathbb{Z})$ 使得 $\{f_n(\phi^{-1}(k))\}_{k \in I} \rightarrow$

$\{\xi_k\}_{k \in I} (l^2)$, 依定义此即

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N \left(\left[\sum_{k \in I} |f_n(\phi^{-1}(k)) - \xi_k|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < \varepsilon \right).$$

记 $f(x) = \sum_{k \in I} \mathbf{1}_{\{\phi^{-1}(k)\}} \xi_k$, 由 I 至多可数知 f 良定义, 进一步由 $\text{supp } f \subset S$ 知 $f \in l^2(I)$. 现在上式可进一步写为

$$\left[\sum_{x \in S} |f_n(x) - f(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < \varepsilon,$$

这说明 $f_n \rightarrow f (l^2(I))$, 至此完备性得证, 待证结论进而成立. $\square$

练习 6.27

设 X 为线性赋范空间, H 为 Hilbert 空间, 证明

$$\overline{F(X, H)}^{L(X, H)} = \mathfrak{C}(X, H).$$

证明 已知 $\overline{F(X, H)}^{L(X, H)} \subset \mathfrak{C}(X, H)$, 往证 $\mathfrak{C}(X, H) \subset \overline{F(X, H)}^{L(X, H)}$. 任取 $T \in \mathfrak{C}(X, H)$, 由定义知 $\overline{T(B_1)}$ 紧, 其中 B_1 是 X 中的单位球. 由 H 可度量知 $\overline{T(B_1)}$ 自列紧, 又由 Hausdorff 定理知 $\overline{T(B_1)}$ 完全有界, 故任取 $\varepsilon \in (0, \infty)$ 总存在 $\overline{T(B_1)}$ 的有限 $\varepsilon/2$ 网 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ 使得

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

令 $E_\varepsilon := \text{span}\{y_1, \dots, y_m\}$, 知 E_ε 是 H 的闭子空间, 进而由正交分解定理知对 $\forall x \in H$ 总存在唯一正交分解 $x = y + z$ 使得

$$y \in E_\varepsilon, z \in E_\varepsilon^\perp = \{z \in H : (z|y)_H = 0, \forall y \in E_\varepsilon\}.$$

记 $P_\varepsilon x = y$, 则 P_ε 是 $H \rightarrow E_\varepsilon$ 的正交投影. 由

$$\|x\|_H^2 = \|y\|_H^2 + \|z\|_H^2$$

知

$$\|P_\varepsilon\|_{H \rightarrow H} = \sup_{\|x\|_H=1} \|P_\varepsilon x\|_H = \sup_{\|x\|_H=1} \|y\|_H \leq 1,$$

故 $\|P_\varepsilon\|_{H \rightarrow H} \leq 1$, 这说明 $P_\varepsilon \in L(H)$, 且显见 $P_\varepsilon T \in F(X, H)$.

接下来用 $P_\varepsilon T$ 逼近 T . 由 $\varepsilon/2$ 网的定义知

$$\forall x \in B_1 \exists i \in \{1, \dots, m\} \left(\|Tx - y_i\|_H < \frac{\varepsilon}{2} \right),$$

由此及 $P_\varepsilon y_i = y_i$ 知

$$\|P_\varepsilon Tx - y_i\|_H = \|P_\varepsilon(Tx - y_i)\|_H \leq \|P_\varepsilon\|_{H \rightarrow H} \|Tx - y_i\|_H < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此对 $\forall x \in B_1$ 有

$$\|Tx - P_\varepsilon Tx\|_H \leq \|Tx - y_i\|_H + \|y_i - P_\varepsilon Tx\|_H < \varepsilon.$$

故 $\|T - P_\varepsilon T\|_{X \rightarrow H} \leq \varepsilon$, 此即 $\mathfrak{C}(X, H) \subset \overline{F(X, H)}^{L(X, H)}$. $\square$

练习 6.28

设 X 为线性赋范空间, Y 是有 Schauder 基的 Banach 空间, 证明

$$\overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)} = \mathfrak{C}(X, Y).$$

证明 已知 $\overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)} \subset \mathfrak{C}(X, Y)$, 往证 $\mathfrak{C}(X, Y) \subset \overline{F(X, Y)}^{L(X, Y)}$. 在 Y 上设 S_n 与引理 6.7 证明的设置相同, 由引理 6.7 的证明知存在 $M > 0$ 使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\|S_n\|_{Y \rightarrow Y} \leq M.$$

设 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 则 $\overline{T(B_1)}$ 是紧集 (其中 B_1 是 X 上的单位球), 于是由 X 可度量知 $\overline{T(B_1)}$ 自列紧, 再由 Hausdorff 定理知任取 $\varepsilon > 0$ 总存在 $\overline{T(B_1)}$ 的有穷 $\varepsilon/3(M+1)$ 网 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 使得

$$\overline{T(B_1)} \subset \bigcup_{i=1}^m B\left(y_i, \frac{\varepsilon}{3(M+1)}\right).$$

因此对 $\forall x \in B_1$ 总存在 y_i 使得

$$\|Tx - y_i\|_Y < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}.$$

故对任意 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$\|S_N(Tx) - S_N(y_i)\|_Y < \frac{M\varepsilon}{3(M+1)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由 Schauder 基的定义知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 均有

$$\|S_N(y_i) - y_i\|_Y < \frac{\varepsilon}{3},$$

故

$$\|Tx - S_N(Tx)\|_Y \leq \|Tx - y_i\|_Y + \|y_i - S_N(y_i)\|_Y + \|S_N(y_i) - S_N(Tx)\|_Y < \varepsilon.$$

记 $T_\varepsilon := S_N T$, 显见 $T_\varepsilon \in F(X, Y)$, 且 $\|T - T_\varepsilon\|_{X \rightarrow Y} \leq \varepsilon$, 故 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时 $T_\varepsilon \rightarrow T(L(X, Y))$, 至此即得待证结论. $\square$

练习 6.29

在 l^2 中定义下述算子:

$$T: l^2 \rightarrow l^2, \{\xi_j\}_{j \in \mathbb{N}} \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \xi_j \right\}_{i \in \mathbb{N}},$$

其中 $\{a_{ij}\}_{i,j \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$.

(i) 若 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}| < \infty$, 证明 T 是 $l^2 \rightarrow l^2$ 的紧算子.

(ii) 举例说明存在无穷矩阵 $\{a_{ij}\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 = \infty,$$

但依前述定义的 T 依旧是紧算子.

(iii) 若 $\forall i \neq j \in \mathbb{N} (a_{ij} = 0)$, 证明 T 是 l^2 上的紧算子当且仅当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nn} = 0.$$

证明 (i) 记

$$T_N: l^2 \rightarrow l^2, \{\xi_j\}_{j \in \mathbb{N}} \mapsto \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{1j} \xi_j, \dots, \sum_{j=1}^{\infty} a_{Nj} \xi_j, 0, \dots \right),$$

显见 $T_N \in F(l^2)$, 往证 $T \in L(l^2)$ 且 $T_N \rightarrow T(L(l^2))$. 针对前者, 任取 $\xi = \{\xi_j\}_{j \in \mathbb{N}}$, 由 Minkowski 不等式知

$$\begin{aligned} \|T\xi\|_{l^2} &= \left[\sum_{i=1}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \xi_j \right]^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \left[\sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij} \xi_j|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|\xi\|_{l^\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \left[\sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right]^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

因为 $l^2 \hookrightarrow l^\infty$, 故 $\|\xi\|_{l^\infty} \leq \|\xi\|_{l^2}$. 又由 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}| < \infty$ 与 Tonelli 定理知 $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}| < \infty$, 于是至少对

每个 j 均有 $\{a_{ij}\}_i \in l^1$. 因为 $l^1 \hookrightarrow l^2$, 故 $\|\{a_{ij}\}_i\|_{l^2} \leq \|\{a_{ij}\}_i\|_{l^1}$, 这说明

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left[\sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}| < \infty,$$

因此 $\|T\|_{l^2 \rightarrow l^2} < \infty$, 故 $T \in L(l^2)$. 接下来说明 $T_N \rightarrow T(L(l^2))$. 任取 $\xi = \{\xi_j\}_{j \in \mathbb{N}} \in l^2$, 知

$$\begin{aligned} \|(T - T_N)\xi\|_{l^2} &= \left[\sum_{n=N+1}^{\infty} \left[\xi_n - \sum_{j=1}^{\infty} a_{nj}\xi_j \right]^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left[\sum_{n=N+1}^{\infty} |\xi_n|^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\sum_{n=N+1}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^{\infty} a_{nj}\xi_j \right]^2 \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

一方面由 $\xi \in l^2$ 知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 > 0 \forall n > N_1 \left(\left[\sum_{k=n}^{\infty} |\xi_k|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < \varepsilon \right).$$

另一方面仿照前述过程可证 $\sum_{i=1}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < \infty$, 进而

$$\exists N_2 > 0 \forall n > N_2 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^{\infty} |a_{kj}|^2 \right]^{\frac{1}{2}} < \varepsilon \right),$$

同时由 Minkowski 不等式与 $l^2 \hookrightarrow l^\infty$ 知

$$\left[\sum_{n=N+1}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^{\infty} a_{nj}\xi_j \right]^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \|\xi\|_{l^\infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left[\sum_{j=1}^{\infty} |a_{nj}|^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

结合前述估计, 取 $N > \max\{N_1, N_2\}$ 即知

$$\|(T - T_N)\xi\|_{l^2} \leq \varepsilon + \|\xi\|_{l^\infty} \varepsilon,$$

由 ε 的任意性即知 $T_N \rightarrow T(L(l^2))$, 最后由 $\overline{F(l^2)}^{L(l^2)} = \mathfrak{C}(l^2)$ 即得 $T \in \mathfrak{C}(l^2)$.

(ii) 取 $a_{ij} = \delta_{ii}/\sqrt{i}$, 其中 δ_{ii} 是 Kronecker 记号, 则

$$T\xi = \left(\xi_1, \frac{1}{\sqrt{2}}\xi_2, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}\xi_n, \dots \right).$$

由练习 6.24 的结论立知 T 是紧算子.

(iii) $\Leftarrow$ 由练习 6.24 立得, 下面证明 $\Rightarrow$. 因为 $T \in \mathfrak{C}(l^2)$, 故 T 必全连续. 仿照练习 6.25 的过程可以说明 l^2 中的单位向量列 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $e_n \rightarrow 0(l^2)$, 于是 $Te_n \rightarrow 0(l^2)$, 此即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{nn}|^{2 \cdot \frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{nn}| = 0.$$

□

练习 6.30

令 $p \in [1, \infty]$, 考虑映射

$$T_p : L^p[0, 1] \rightarrow C[0, 1], f \mapsto T_p f(t) := \int_0^t f(s) ds.$$

(i) 证明当 $p \in (1, \infty]$ 时 T_p 是紧算子.

(ii) 当 $p = 1$ 时 T_1 是否为紧算子? 请说明理由.

♠

证明 (i) 设 $\{f_j\} \subset L^p[0, 1]$ 满足 $\|f_j\|_{L^p} = 1$, 往证 $\{T_p f_j\}$ 在 $C[0, 1]$ 中有收敛子列, 为此考虑 Arzela-Ascoli 定理. 一方面知

$$\|T_p f_j\|_{C[0, 1]} \leq \int_0^1 |f_j(s)| ds \leq \|f_j\|_{L^p} = 1,$$

故 $\{T_p f_j\}$ 一致有界. 另一方面任取 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^{p'}/2$ 即知对任意的 $0 \leq t_1 < t_2 \leq 1$, 只要 $t_2 - t_1 < \delta$, 就有

$$|T_p f_j(t_1) - T_p f_j(t_2)| \leq \int_{t_1}^{t_2} |f_j(s)| ds \leq \|f_j\|_{L^p} (t_2 - t_1)^{1/p'} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

故 $\{T_p f_j\}$ 等度连续, 从而 $\{T_p f_j\}$ 在 $C[0, 1]$ 中有收敛子列.

(ii) $p = 1$ 时 T_1 并非紧算子, 为此考虑

$$\begin{aligned} f_0(x) &= \left(1 - 2 \left|x - \frac{1}{2}\right|\right)^+, \\ f_1(x) &= \left(2^1 - 2^3 \left|x - \frac{1}{4}\right|\right)^+, \\ f_2(x) &= \left(2^1 - 2^3 \left|x - \frac{1}{2}\right|\right)^+, \\ f_3(x) &= \left(2^1 - 2^3 \left|x - \frac{3}{4}\right|\right)^+, \\ f_3(x) &= \left(2^2 - 2^5 \left|x - \frac{1}{8}\right|\right)^+, \\ &\vdots \end{aligned}$$

容易验证 $\|f_n\|_{L^1} \equiv 1/2$, 下面说明 $\{T_1 f_n\}$ 不存在 $C[0, 1]$ 中的收敛子列, 为此只需说明 $\{T_1 f_n\}$ 并不等度连续即可, 这也就是说明

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists t_1, t_2 \exists k (|t_1 - t_2| < \delta \wedge |T_1 f_k(t_1) - T_1 f_k(t_2)| = \varepsilon).$$

取 $\varepsilon = 1/2$, 对任意的 δ 取 k 满足 $|\text{supp } f_k| < \delta/2$ (根据构造显见 $|\text{supp } f_n| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故这样的 k 总能取到), 设 $\text{supp } f_k = [T_2, T_1]$, 取 $t_1 = T_1, t_2 = T_2$, 则

$$|T_1 f_k(t_1) - T_1 f_k(t_2)| = \int_0^{T_1} f_k(s) ds - \int_0^{T_2} f_k(s) ds = \int_{T_2}^{T_1} f_k(s) ds = \int_0^1 f_k(s) ds = 1/2.$$

故 $\{T_1 f_n\}$ 并不等度连续, 从而 $\{T_1 f_n\}$ 不是列紧集. 对 $\{T_1 f_n\}$ 的任意子列均可重复上述过程, 因此 $\{T_1 f_n\}$ 不存在收敛子列. $\square$

6.3 Riesz-Fredholm 定理

我们首先预备一个引理:

引理 6.8 (Riesz)

设 X 是 B^* 空间, $M \subset X$ 是真闭线性子空间, 则

$$\forall \varepsilon \in (0, 1) \exists u \in X (\|u\|_X = 1 \text{ 且 } \text{dist}(u, M) \geq 1 - \varepsilon).$$



证明 取 $v \in X, v \notin M$. 因为 M 是闭的, 故

$$d = \text{dist}(v, M) > 0.$$

任取 $m_0 \in M$ 使得

$$d \leq \|v - m_0\| \leq \frac{d}{1 - \varepsilon}.$$

则

$$u = \frac{v - m_0}{\|v - m_0\|_X}$$

即为欲求. $\square$

根据 Riesz 引理可以得到下述重要结果:

定理 6.8 (Riesz)

若 E 是 B^* 空间, B_E 作为 E 中的闭单位球是紧集, 则 E 是有限维的.



证明 用反证法, 设 E 无穷维, 则存在 E 的有限维子空间列 $\{E_n\}$ 使得 $E_{n-1} \subsetneq E_n$. 根据 Riesz 引理 6.8, 存在序列

$\{u_n\}$ 满足 $u_n \in E_n, \|u_n\|_X = 1, \text{dist}(u_n, E_{n-1}) \geq 1/2$. 特别地, 这说明 $\|u_n - u_m\|_X \geq 1/2$ 对 $m < n$ 均成立, 因此 $\{u_n\}$ 不收敛 (它的任意子列也不收敛). 但因为 B_E 是紧集且 E 赋范, 故 B_E 是自列紧集, 矛盾! 此即欲证. $\square$

定理 6.9 (Fredholm 二择一定理)

设 E 是 B^* 空间, 若 $T \in \mathfrak{C}(E)$, 则

- (i) $N(I - T)$ 是有限维的,
- (ii) $R(I - T)$ 是闭集, 且 $R(I - T) = N(I - T^*)^\perp$,
- (iii) $N(I - T) = \{0_E\} \Leftrightarrow R(I - T) = E$,
- (iv) $\dim N(I - T) = \dim N(I - T^*)$.



注 6.25 之所以称定理 6.9 为二择一定理, 是因为它解决了方程 $u - Tu = f$ 的可解性. 该定理表明:

- 要么对每个 $f \in E$ 而言, 方程 $u - Tu = f$ 都存在唯一解 (这对应着结论 (iii)),
- 要么齐次方程 $u - Tu = 0$ 具有 n 个线性独立解, 此时非齐次方程 $u - Tu = f$ 有解当且仅当 f 满足 n -正交条件, 即

$$f \in N(I - T^*)^\perp.$$

(这对应着结论 (i), (ii), (iv).)

注 6.26 注意二择一定理 6.9 的结论 (iii) 在有限维空间中其实是老朋友了. 当 $\dim E < \infty$ 时, E 到它自身的线性算子是单射当且仅当它是满射. 然而, 无穷维空间中有界算子成为单射时不必为满射, 反之亦然, 例如 l^2 中的右推移算子是不满的单射, 而左推移算子是不单满射. 因此结论 (iii) 实际上是形如 $I - T (T \in \mathfrak{C}(E))$ 的算子的一个惊人结论.

证明 (i) 设 $E_1 = N(I - T)$, 则 E_1 中的每个元素 x 均满足 $x = Tx$, 因此 $\|x\|_E \leq 1 \Rightarrow \|Tx\|_E \leq 1$, 故 $B_{E_1} \subset T(B_E) \subset \overline{T(B_E)}$. 又因为 $\overline{T(B_E)}$ 是紧集, 故 B_{E_1} 作为紧空间的闭子集也应该是紧集. 根据 Riesz 定理 6.8, E_1 只能是有限维的.

(ii) 设 $f_n = u_n - Tu_n \rightarrow f$, 往证 $f \in R(I - T)$. 记 $d_n = \text{dist}(u_n, N(I - T))$, 因为 $N(I - T)$ 是有限维的, 故对每个 u_n 都存在 $v_n \in N(I - T)$ 使得 $d_n = \|u_n - v_n\|_E$. 于是

$$f_n = (u_n - v_n) - T(u_n - v_n). \quad (6.37)$$

下面说明 $\|u_n - v_n\|_E$ 关于 n 一致有界. 若不然, 则存在子列使得 $\|u_{n_k} - v_{n_k}\|_E \rightarrow \infty$. 取

$$w_n = \frac{u_n - v_n}{\|u_n - v_n\|_E}.$$

因为 f_n 本身是强拓扑下的收敛列, 故 $\|f_n\|_E$ 必关于 n 一致有界, 进而由 (6.37) 式可知 $w_{n_k} - Tw_{n_k} \rightarrow 0$. 因为 $w_n \in B_E$, 由 $T \in \mathfrak{C}(E)$ 与引理 6.3 知 $\{Tw_{n_k}\}_k$ 列紧, 取其收敛子列 (不妨仍记为 w_{n_k}) 并设 $Tw_{n_k} \rightarrow z$. 根据极限的唯一性知 $w_{n_k} \rightarrow z$, 从而 $z - Tz = 0$, 亦即 $z \in N(I - T)$. 这说明 $\text{dist}(w_{n_k}, N(I - T)) \rightarrow 0$. 另一方面, 因为 $v_n \in N(I - T)$, 故由 w_n 本身的构造知:

$$\text{dist}(w_n, N(I - T)) = \frac{\text{dist}(u_n, N(I - T))}{\|u_n - v_n\|_E} = 1$$

矛盾! 因此 $\|u_n - v_n\|_E$ 关于 n 一致有界, 从而由 $T \in \mathfrak{C}(E)$ 知存在子列使得 $T(u_{n_k} - v_{n_k})$ 收敛到某个极限 l , 进而由 (6.37) 式知 $u_{n_k} - v_{n_k} \rightarrow f + l$. 记 $g = f + l$, 则 $g - Tg = f$, 此即 $f \in R(I - T)$, 因此 $R(I - T)$ 是闭集.

现在对 $I - T$ 应用闭像集算子的刻画 2.14 立得

$$\begin{aligned} R(I - T) &= N(I^* - T^*)^\perp = N(I - T)^\perp, \\ R(I - T^*) &= N(I - T)^\perp. \end{aligned}$$

(iii) 首先证明 $\Rightarrow$. 考虑用反证法, 下面首先说明一下思路. 要用反证法就是设 $R(I - T) \subsetneq E$, 往证 $T \notin \mathfrak{C}(E)$, 后者依定义即为存在 $\{u_n\} \subset E$ 使得

$$\|u_n\|_E = 1 (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } \forall n, m \in \mathbb{N} \left(\|Tu_n - Tu_m\|_E \geq \frac{1}{2} \right).$$

为了把待证式往 $R(I-T) \subsetneq E$ 上靠, 考虑把上式写成 $I-T$ 的形式, 即:

$$\|Tu_n - Tu_m\|_E = \|u_n - (I-T)u_n - (I-T)u_m - u_{n+m}\|_E \geq \frac{1}{2}.$$

上右式范数内的前三项是很自然可以希望用上 $R(I-T) \subsetneq E$ 的, 但 u_{n+m} 需要一点特殊设置. 特别这里当然希望 u_{n+m} 也能在 $R(I-T)$ 内, 因此 $\{u_n\}$ 的设置可以考虑成 $u_n \in (I-T)^n(E)$. 现在上右式范数内后三项都在 $R(I-T)$ 内, 而 (ii) 已经说明过 $R(I-T)$ 是闭的, 且假设表明 $R(I-T)$ 是 E 的真子集, 自然用 Riesz 引理 6.8 就有希望得到待证结论了.

现在开始严格证明. 设

$$E_1 = R(I-T) \neq E.$$

根据 $R(I-T)$ 的闭性知 E_1 是 Banach 空间, 又因为显见 $T(E) \subset E$, 故 $T(E_1) \subset E_1$. 由紧算子的基本性质 6.4(iii) 可知 $T|_{E_1} \in \mathfrak{C}(E_1)$, 重复上述步骤可知 $E_2 = (I-T)(E_1)$ 是 E_1 的一个闭子空间. 因为 $N(I-T) = \{0_E\}$, 故 $I-T$ 是单射, 从而由反证的假设知依旧有¹⁹ $E_2 \neq E_1$. 现设 $E_n = (I-T)^n(E)$, 我们便得到了一个 (严格) 递减的闭子空间列. 对其中的每个闭子空间 E_n , 根据 Riesz 引理 6.8 我们都可以对应得到 $u_n \in E_n$ 使得 $\|u_n\| = 1$, $\text{dist}(u_n, E_{n+1}) \geq 1/2$. 现有

$$Tu_n - Tu_m = -(u_n - Tu_n) + (u_m - Tu_m) + (u_n - u_m).$$

注意到若 $n > m$, 则 $E_{n+1} \subset E_n \subset E_{m+1} \subset E_m$, 而 $u_n - Tu_n \in E_{n+1}$, $u_m - Tu_m \in E_{m+1}$, $u_n \in E_n$, $u_m \in E_m$, 因此

$$-(u_n - Tu_n) + (u_m - Tu_m) + (u_n - u_m) \in E_{m+1}.$$

故

$$\|Tu_n - Tu_m\| \geq \text{dist}(u_m, E_{m+1}) \geq \frac{1}{2}, \forall n > m$$

但这说明 $\{Tu_n\}$ 作为 $T(B_{E_{m+1}})$ 中的序列不存在任何收敛子列, 这与 $T \in \mathfrak{C}(E_{m+1})$ 矛盾! 故只能有 $R(I-T) = E$.

反之, 设 $R(I-T) = E$, 根据满射算子的刻画 2.15 与推论 2.12 知 $N(I-T^*) = R(I-T)^\perp = \{0_{E^*}\}$. 因为 $T \in \mathfrak{C}(E) \Rightarrow T^* \in \mathfrak{C}(E^*)$, 利用 $\Rightarrow$ 的结论可知 $R(I-T^*) = E^*$, 再用一次满射算子的刻画 2.15 与推论 2.12 即知 $N(I-T) = R(I-T^*)^\perp = \{0_E\}$.

(iv) 记 $d = \dim N(I-T)$, $d^* = \dim N(I-T^*)$, 我们首先证明 $d^* \leq d$. 如若不然, 设 $d < d^*$, 因为 $N(I-T)$ 是有限维的, 故由例 2.5 可知 $N(I-T)$ 在 E 中有余子空间, 因此存在从 E 到 $N(I-T)$ 上的连续投影 P . 另一方面, 由例 2.6 可知 $R(I-T) = N(I-T^*)^\perp$ 余维为 d^* , 因此它作为余维有限的闭子空间同样有余子空间, 记它的余子空间为 F , 显见 $\dim F = d^*$. 因为 $d < d^*$, 故存在单但不满的线性映射 $\Lambda: N(I-T) \rightarrow F$. 取 $S = T + \Lambda \circ P$, 因为 $\Lambda \circ P$ 是有穷秩算子, 故 $\Lambda \circ P \in \mathfrak{C}(E)$, 因此 $S \in \mathfrak{C}(E)$. 下面说明 $N(I-S) = \{0_E\}$, 这是因为若

$$0_E = u - Su = (u - Tu) - (\Lambda \circ Pu),$$

因为 $u - Tu, \Lambda \circ Pu$ 活在两个互为余子空间的子空间中, 故只能有

$$u - Tu = 0_E, \Lambda \circ Pu = 0_E$$

也就是说 $u \in N(I-T)$, $\Lambda u = 0$, 故只能有 $u = 0_E$.

现在把结论 (iii) 应用到 S 上, 可知 $R(I-S) = E$, 但这并不可能! 因为 Λ 不是满射, 故总会存在 $f \in F$ 使得 $f \notin R(\Lambda)$, 此时对于方程 $u - Su = f$, 注意到 $u - Tu \in R(I-T)$, 而 $F \ni f$ 是 $R(I-T)$ 的余子空间, 因此等式成立仅当 $u - Tu = 0_E$, 也就是说方程其实是 $-\Lambda \circ Pu = f$, 但后者不在前者的值域内, 因此方程无解.

至此我们已经说明了 $d^* \leq d$, 把这一结论再应用到 T^* 上可知

$$\dim N(I-T^{**}) \leq \dim N(I-T^*) \leq \dim N(I-T)$$

又因为 $N(I-T^{**}) \supset N(I-T)$, 故只能有 $d = d^*$. □

注 6.27 如果二择一定理 6.9 的条件强化为 E 为 Banach 空间, 则 (ii) 中 $R(I-T)$ 的闭性还能用商空间来证. 从思

¹⁹ 具体来说, 若 $E_2 = (I-T)^2(E) = (I-T)(E_1)$, 则任取 $x \in E$ 总存在 $x' \in E$ 使得 $(I-T)^2 x' = (I-T)x$, 此即 $(I-T)(x - (I-T)x') = 0_E$, 进而只能有 $x = (I-T)x'$, 这说明 $E \subset R(I-T)$, 与反证假设矛盾!

路上看, 如果 $I - T : E \rightarrow R(I - T)$ 能成为单射, 那只要 $(I - T)^{-1} : R(I - T) \rightarrow E$ 连续, $R(I - T)$ 作为闭空间 E 在 $(I - T)^{-1}$ 下的原像就必是闭的. 严格来说, 为了获得这种单射性, 我们就可以考虑引入商空间. 简便起见设 $A := I - T$, 由 A 的连续线性性可知 $N(A)$ 是 E 的闭子空间, 现在定义

$$\tilde{A} : E/N(A) \rightarrow E, [x] \mapsto Tx.$$

现对任意 $x_1, x_2 \in [x]$ 有 $x_1 - x_2 \in N(A)$, 故

$$A(x_1 - x_2) = 0_E.$$

这说明 $Ax_1 = Ax_2$, $R(\tilde{A}) = R(A)$, 且

$$\begin{aligned} N(\tilde{A}) &= \{[x] \in E/N(A) : Ax = 0_E\} \\ &= \{[x] \in E/N(A) : x \in N(A)\} = \{[0_E]\}. \end{aligned}$$

因此 $\tilde{A}^{-1}$ 首先存在.

下面说明 $\tilde{A}$ 是有界算子. 任取 $[x] \in E/N(A)$, 设 $[x]$ 在 $E/N(A)$ 中的范数为²⁰ $\|[x]\|_{E/N(A)}$, 则

$$\|[x]\|_{E/N(A)} := \inf_{y \in [x]} \|y\|_E.$$

现任取 $y \in [x]$ 知

$$\|\tilde{A}([x])\|_E = \|Ay\|_E \leq \|A\|_{E \rightarrow E} \|y\|_E,$$

上式两端关于 y 在 $[x]$ 内取下确界即得

$$\|\tilde{A}([x])\|_E \leq \|A\|_{E \rightarrow E} \|[x]\|_{E/N(A)},$$

故

$$\|\tilde{A}\|_{E/N(A) \rightarrow E} \leq \|A\|_{E \rightarrow E}.$$

回忆先前的思路, 现在要证明 $R(A)$ 的闭性, 只需证明 $\tilde{A}^{-1}$ 连续. 这是因为 E 本身完备, 故 $E/N(A)$ 依 $\|[\cdot]\|_{E/N(A)}$ 完备. 任取 $y \in \overline{R(\tilde{A})}$, 则存在 $\{y_n\} \subset R(\tilde{A})$ 满足 $y_n \rightarrow y(E)$. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 记 $[x_n] = \tilde{T}^{-1}y_n$, 只要 $\tilde{T}^{-1}$ 连续, 当 $m, n \rightarrow \infty$ 时就有

$$\|[x_n] - [x_m]\|_{E/N(A)} = \|\tilde{T}^{-1}y_n - \tilde{T}^{-1}y_m\|_{E/N(A)} \leq \|\tilde{T}^{-1}\|_{E/N(A) \rightarrow E} \|y_n - y_m\|_E \rightarrow 0,$$

这说明 $\{[x_n]\}$ 是 $E/N(A)$ 中的 Cauchy 列, 进而存在 $[x] \in E/N(A)$ 使得 $[x_n] \rightarrow [x](E/N(A))$, 由 $\tilde{A}$ 的连续性进一步知 $A[x_n] = y_n \rightarrow \tilde{A}[x]$, 由极限唯一性即知 $y = \tilde{A}[x] = Ax$, 故 $y \in R(A)$, 至此即得 $R(A)$ 的闭性.

现在着手证明 $\tilde{A}^{-1}$ 连续. 考虑反证, 若存在 $\{y_n\} \subset R(\tilde{A}) = R(A)$ 满足 $\|y_n\|_E \equiv 1$ 的同时有 $\|\tilde{A}^{-1}y_n\|_{E/N(A)} \rightarrow \infty$, 不妨设

$$\|\tilde{A}^{-1}y_n\|_{E/N(A)} \neq 0, \forall n \in \mathbb{N},$$

对 $\{\tilde{A}^{-1}y_n\}$ 规范化, 令

$$[x_n] := \frac{\tilde{A}^{-1}y_n}{\|\tilde{A}^{-1}y_n\|_{E/N(A)}},$$

则 $\|[x_n]\|_{E/N(A)} = 1$, 且 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\tilde{A}[x_n] = \frac{y_n}{\|\tilde{A}^{-1}y_n\|_{E/N(A)}} \rightarrow 0_E. \quad (6.38)$$

下面考虑证明 $[x_n] \rightarrow 0_{E/N(A)}$. 因为 $\|[x_n]\|_{E/N(A)} = 1$, 故对任意 $n \in \mathbb{N}$ 总存在 $x_n \in [x_n]$ 满足 $\|x_n\|_E \leq 2$, 且

$$(I - T)x_n = Ax_n = \tilde{A}[x_n] \rightarrow 0_E. \quad (6.39)$$

因为 T 是紧算子, 故对有界的 $\{x_n\}$ 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $Tx_{n_k} \rightarrow z(k \rightarrow \infty)$, 于是 $k \rightarrow \infty$ 时有

$$x_{n_k} = Tx_{n_k} + (I - T)x_{n_k} \rightarrow z,$$

²⁰这里为了说明 $\|[x]\|_{E/N(A)} = 0 \Rightarrow [x] = [0_M]$ 需要 $N(A)$ 的闭性.

进而由 A 连续知

$$\tilde{A}[x_{n_k}] = Ax_{n_k} \rightarrow Az.$$

于是(6.38)表明 $Az = 0_E$, 这说明 $z \in N(A)$, 故

$$\| [x_{n_k}] \|_{E/N(A)} = \| [x_{n_k} - z] \|_{E/N(A)} \leq \| x_{n_k} - z \|_E \rightarrow 0,$$

这与 $\| [x_{n_k}] \|_{E/N(A)} \equiv 1$ 矛盾! 故只能有 $\tilde{T}^{-1}$ 连续. $\square$

6.4 紧算子的谱理论

6.4.1 紧算子的谱

对紧算子的谱, 我们有下述结论:

定理 6.10 (紧算子的谱性质)

设 X 是 Banach 空间, 若 $A \in \mathfrak{C}(X)$, 则:

- (i) 若 $\dim X = \infty$, 则 $0 \in \sigma(A)$;
- (ii) $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$;
- (iii) $\sigma_p(A)$ 至多以 0 为聚点.

证明 (i) 设 $\dim X = \infty$, 用反证法. 若 $0 \notin \sigma(A)$, 则 $0 \in \rho(A)$, 这意味着

$$A^{-1} \in L(X).$$

根据紧算子的基本性质 6.4(vi) 与 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 知 $I = A \circ A^{-1} \in \mathfrak{C}(X)$, 因此对 X 中的任意有界集 M 而言, 其闭包 $\overline{M}$ 均为 X 中的紧集, 特别 X 的闭单位球也是紧集, 因此根据 Riesz 定理 6.8 知 X 有限维, 矛盾!

(ii) 设 $\lambda \in \sigma(A)$, $\lambda \neq 0$, 往证 λ 必为本征值. 用反证法, 若 λ 不是本征值, 则 $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, 因此必须有 $N(\lambda I - A) = \{0_X\}$. 根据二择一定理 6.9(iii), 这表明 $R(\lambda I - A) = X$, 因此 λ 也不可能是连续谱或剩余谱, 这说明 λ 只能在 $\rho(A)$ 内, 矛盾!

(iii) 考虑反证法, 设存在两两不等的序列 $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \sigma_p(A) \setminus \{0_X\}$ 使得 $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0 (n \rightarrow \infty)$. 由 $\lambda_n \in \sigma_p(A)$ 知 $N(\lambda_n I - A) \supsetneq \{0_X\}$. 现对任意 $n \in \mathbb{N}$ 取 $x_n \in N(\lambda_n I - A) \setminus \{0_X\}$, 下证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 而言, $\{x_1, \dots, x_n\}$ 均线性无关.

利用归纳法, 设 $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ 线性无关. 若存在 $\{\alpha_j\}_{j=1}^{n-1} \subset \mathbb{C}$ 使得 $x_n = \sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j x_j$, 则

$$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_n \alpha_j x_j = \lambda_n x_n = Ax_n = A \left(\sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j x_j \right) = \sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j \lambda_j x_j.$$

因此

$$\sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j (\lambda_n - \lambda_j) x_j = 0_X.$$

由 $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ 线性无关及 $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 两两不等知对任意 $j \in \{1, \dots, n-1\}$ 均有 $\alpha_j = 0$, 故 $x_n = 0_X$, 但这与 x_n 的构造矛盾! 现若存在一组不全为零的 $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{C}$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0_X,$$

若 $\alpha_n = 0$, 则由 $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ 线性无关知 $\alpha_i = 0 (\forall i \in \{1, \dots, n-1\})$, 进而所有 α_i 均为零, 这与 α_i 的取法矛盾, 故 $\alpha_n \neq 0$. 此时

$$x_n = - \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\alpha_n} x_i,$$

但这件事前面也已经说了同样不成立, 故满足上述条件的 $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ 并不存在, 故 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关.

现在对任意 $n \in \mathbb{N}$ 定义

$$E_n := \text{span}\{x_1, \dots, x_n\},$$

则 E_n 作为有限维子空间必闭, 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$E_n \subsetneq E_{n+1}.$$

由 Riesz 引理 6.8 知存在 $y_{n+1} \in E_{n+1}$ 使得 $\|y_{n+1}\|_X = 1$ 且

$$\text{dist}(y_{n+1}, E_n) \geq \frac{1}{2}.$$

对任意 $n, p \in \mathbb{N}$, 设

$$y_{n+p} = \sum_{i=1}^{n+p} \alpha_i x_i,$$

则

$$Ay_{n+p} = \sum_{i=1}^{n+p} \alpha_i Ax_i = \sum_{i=1}^{n+p} \alpha_i \lambda_i x_i \in E_{n+p},$$

且

$$y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} Ay_{n+p} = \sum_{i=1}^{n+p} \left(1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_{n+p}}\right) \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{n+p-1} \left(1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_{n+p}}\right) \alpha_i x_i \in E_{n+p-1}.$$

类似可证

$$\frac{1}{\lambda_n} Ay_n \in E_n \subset E_{n+p-1},$$

故

$$y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} Ay_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} Ay_n \in E_{n+p-1}.$$

由此可知

$$\begin{aligned} \left\| A \left(\frac{y_{n+p}}{\lambda_{n+p}} \right) - A \left(\frac{y_n}{\lambda_n} \right) \right\|_X &= \left\| y_{n+p} - \left(y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} Ay_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} Ay_n \right) \right\|_X \\ &\geq \text{dist}(y_{n+p}, E_{n+p-1}) \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

又因为

$$\left\| \frac{y_n}{\lambda_n} \right\|_X = \frac{1}{|\lambda_n|} \rightarrow \frac{1}{|\lambda|}, \quad n \rightarrow \infty,$$

故 $\{y_n/\lambda_n\}_{n \geq 2}$ 是 X 中的有界列, 但 $\{A(y_n/\lambda_n)\}_{n \geq 2}$ 无收敛子列, 这与 A 的紧性矛盾! 故 $\sigma_p(A)$ 只能以 0 为聚点.

□

注 6.28 定理 6.10 表明对于无穷维 Banach 空间上的紧算子 A , 其谱集只可能是下述三种情况:

- (i) $\sigma(A) = \{0\}$;
- (ii) $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m\}$, 其中 $\{\lambda_i\}_{i=1}^m$ 非零, 它们均为特征值, 且

$$|\lambda_1| \geq \dots \geq |\lambda_m|;$$

- (iii) $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \dots\}$, 其中 $\{\lambda_i\}_{i=1}^\infty$ 非零, 它们均为特征值, 满足模的递增关系

$$|\lambda_1| \geq \dots \geq |\lambda_m| \geq \dots$$

且当 $m \rightarrow \infty$ 时 $\lambda_m > 0$.

注 6.29 对上注 (iii) 其实还有某种意义下的逆命题成立: 任意给定趋零的序列 $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 总会存在紧算子 A 使得 $\sigma(A) = \{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{0\}$. 在 l^2 中, 只需把该算子取成乘积算子:

$$A: l^2 \rightarrow l^2, \quad u = (u_1, \dots, u_n, \dots) \mapsto (\alpha_1 u_1, \dots, \alpha_n u_n, \dots)$$

即可. 因为 T 可以视作有穷秩算子 $T_n u = (\alpha_1 u_1, \dots, \alpha_n u_n, 0, \dots)$ 的极限, 故 $T \in \mathfrak{K}(l^2)$. 通过这个例子同样可以看出, 定理 6.10 没有断定 0 是否一定在 $\sigma_p(A)$ 内. 就算 $0 \in \sigma_p(A)$, 也不能依此断定 $N(A)$ 是有限维还是无限维的.

我们下面举出几个例子以体现前述三种情况:

例 6.7 取 $X = l^2$, $A = 0_{L(l^2)}$, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 均有 $(\lambda I - A)^{-1} = \lambda^{-1}I \in L(l^2)$, 从而 $\lambda \in \rho(A)$, 因此 $\sigma(A) = \{0\} = \sigma_p(A)$.

例 6.8 取 $X = l^2$, 取定 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset \mathbb{C}$ 满足 $\lambda_i \neq 0 (i \in \{1, \dots, m\})$, 定义算子

$$A : l^2 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \{\lambda_1 a_1, \dots, \lambda_m a_m, 0, \dots\},$$

此时 $\dim R(A) < \infty$, 下面说明 $A \in L(l^2)$, 且

$$\|A\|_{L(l^2)} = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_m|\}.$$

一方面显见

$$\|A\|_{L(l^2)} = \sup_{\|\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2}=1} \left\{ \sum_{i=1}^m |\lambda_i a_i|^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \max\{|\lambda_i| : i \in \{1, \dots, m\}\}.$$

另一方面, 对任意 $i \in \{1, \dots, m\}$, 对应应 e_i 是第 i 个分量为 1, 其余分量均为 0 的向量, 则

$$\|A\|_{L(l^2)} \geq \|Ae_1\|_{l^2} = |\lambda_i|$$

因此

$$\|A\|_{L(l^2)} \geq \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_m|\}.$$

从而 $A \in L(l^2)$ 且

$$\|A\|_{L(l^2)} = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_m|\}.$$

另外 A 作为有穷秩算子显然是紧算子.

接下来考察 $\sigma(A)$. 由 $\dim l^2 = \infty$ 与谱性质 6.10(i) 知 $0 \in \sigma(A)$. 下面我们验证实际上 $0 \in \sigma_p(A)$, 且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m\}.$$

注意到对前面定义的 e_i 有

$$Ae_i = \lambda_i e_i, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

且

$$Ae_{m+1} = 0_{l^2} = 0e_{m+1},$$

因此 $\{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset \sigma_p(A)$. 现在对 $\lambda \notin \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 往证 $\lambda \in \rho(A)$. 注意要想

$$(\lambda I - A)(\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}) = 0_{l^2}$$

即

$$\{(\lambda - \lambda_1)a_1, \dots, (\lambda - \lambda_m)a_m, \lambda a_{m+1}, \dots\} = \{0, \dots, 0, 0, \dots\}$$

就只能是 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} = 0_{l^2}$, 这说明 $\lambda I - A$ 是单射, 从而 $(\lambda I - A)^{-1}$ 至少存在, 进一步可知

$$(\lambda I - A)^{-1} : l^2 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \left\{ \frac{a_1}{\lambda - \lambda_1}, \dots, \frac{a_m}{\lambda - \lambda_m}, \frac{a_{m+1}}{\lambda}, \dots \right\},$$

且

$$\begin{aligned} \|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L(l^2)} &= \sup_{\|\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2}=1} \left\{ \sum_{i=1}^m \left| \frac{a_i}{\lambda - \lambda_i} \right|^2 + \sum_{i=m+1}^{\infty} \left| \frac{a_i}{\lambda} \right|^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \max \left\{ \frac{1}{|\lambda - \lambda_1|}, \dots, \frac{1}{|\lambda - \lambda_m|}, \frac{1}{|\lambda|} \right\}. \end{aligned}$$

又因为对 $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ 有

$$\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L(l^2)} \geq \|(\lambda I - A)^{-1}e_i\|_{l^2} = \frac{1}{|\lambda - \lambda_i|}$$

且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L(l^2)} \geq \|(\lambda I - A)^{-1}e_{m+1}\|_{l^2} = \frac{1}{|\lambda|},$$

故

$$\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L(l^2)} \geq \max \left\{ \frac{1}{|\lambda - \lambda_1|}, \dots, \frac{1}{|\lambda - \lambda_m|}, \frac{1}{|\lambda|} \right\}.$$

因此 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(l^2)$, 这说明 $\lambda \in \rho(A)$, 从而

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m\}.$$

□

例 6.9 取 $X = l^2$, 设 $\{\lambda_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ 满足 $\lambda_m \neq 0 (\forall m \in \mathbb{N})$ 且 $\lambda_m \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)$. 定义算子

$$A : l^2 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \{\lambda_k a_k\}_{k \in \mathbb{N}}.$$

因为 $m \rightarrow \infty$ 时 $\lambda_m \rightarrow 0$, 故 $\{|\lambda_m|\}_{m \in \mathbb{N}}$ 有界, 于是

$$\|A\|_{L(l^2)} = \sup_{\|\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2}=1} \|\{\lambda_k a_k\}_{k \in \mathbb{N}}\|_{l^2} \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} |\lambda_m| < \infty.$$

这说明 $A \in L(l^2)$. 又因为对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 有

$$\|A\|_{L(l^2)} \geq \|Ae_m\|_{l^2} = |\lambda_m|$$

故 $\|A\|_{L(l^2)} \geq \sup_{m \in \mathbb{N}} |\lambda_m|$, 因此 $A \in L(l^2)$ 且

$$\|A\|_{L(l^2)} = \sup_{m \in \mathbb{N}} |\lambda_m|. \quad (6.40)$$

下面说明 $A \in \mathfrak{L}(l^2)$. 因为 l^2 是 Hilbert 空间, 根据命题 6.7 知只需证明存在有穷秩算子 A_m 使得

$$\|A_m - A\|_{L(l^2)} \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

即可. 为此对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 定义 A_m 为前例中的算子:

$$A_m : \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \{\lambda_1 a_1, \dots, \lambda_m a_m, 0, \dots\}$$

由 $\lambda_m \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)$ 立得 $\|A_m - A\|_{L(l^2)} \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)$, 因此 $A \in \mathfrak{L}(l^2)$.

下面研究 A 的谱. 显见对任意 $i \in \mathbb{N}$ 均有 $Ae_i = \lambda_i e_i$, 故

$$\{\lambda_1, \dots, \lambda_m, \dots\} \subset \sigma_p(A).$$

又有 $\dim l^2 = \infty$ 与谱性质 6.10(i) 知 $0 \in \sigma(A)$.

下面说明 $0 \in \sigma_c(A)$. 因为对 $\forall i \in \mathbb{N}$ 而言均有 $\lambda_i \neq 0$, 故 A 是单射, 从而 A^{-1} 至少存在, 于是 $0 \notin \sigma_p(A)$. 又因为 $0 \in \sigma(A)$, 故要么 $0 \in \sigma_c(A)$, 要么 $0 \in \sigma_r(A)$, 这两种情况均指向 $R(A) \subsetneq l^2$.

现在说明 $\overline{R(A)} = l^2$. 事实上, 任取 $b = \{b_1, \dots, b_m, \dots\} \in l^2$, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 令

$$a_m := \left\{ \frac{b_1}{\lambda_1}, \dots, \frac{b_m}{\lambda_m}, 0, \dots \right\}$$

则 $a_m \in l^2$, $Aa_m = \{b_1, \dots, b_m, 0, \dots\}$, 且当 $m \rightarrow \infty$ 时有

$$\|b - Aa_m\|_{l^2} = \left\{ \sum_{i=m+1}^{\infty} |b_i|^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0.$$

因此 $b \in \overline{R(A)}$, 从而 $\overline{R(A)} = l^2$, 故 $0 \in \sigma_c(A)$.

现在对于

$$\lambda \notin \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \dots\}$$

由 $\lambda_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ 知 $|\lambda - \lambda_k| \rightarrow |\lambda| > 0 (k \rightarrow \infty)$, 故存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $k \geq k_0$ 时 $|\lambda - \lambda_k| \geq \frac{|\lambda|}{2}$, 此时对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$|\lambda - \lambda_k| \geq \min \left\{ \frac{|\lambda|}{2}, |\lambda - \lambda_1|, \dots, |\lambda - \lambda_{k_0-1}| \right\} =: C_\lambda > 0.$$

于是

$$(\lambda I - A)^{-1} : l^2 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \left\{ \frac{a_1}{\lambda - \lambda_1}, \dots, \frac{a_m}{\lambda - \lambda_m}, \dots \right\}$$

是有界算子, 且容易说明

$$\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{L(l^2)} = \sup \left\{ \frac{1}{|\lambda - \lambda_1|}, \dots, \frac{1}{|\lambda - \lambda_m|}, \dots \right\}$$

故 $\lambda \in \rho(A)$, 因此

$$\sigma(A) = \sigma_c(A) \cup \sigma_p(A) = \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \dots\}.$$

□

例 6.10 取 $X = l^2$, $\{\lambda_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 的设置与上例相同, 定义

$$T : l^2 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \{0, \lambda_1 a_1, \dots, \lambda_m a_m, \dots\},$$

则 $T \in \mathfrak{C}(l^2)$ 且 $\sigma(T) = \sigma_r(T) = \{0\}$.

事实上, 记

$$\tilde{A} : l^2 \rightarrow l^2, \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \mapsto \{0, a_1, \dots, a_m, \dots\}$$

则 $\tilde{A}$ 作为右推移算子显然有界, 记 A 是上例中定义的算子, 由 $A \in \mathfrak{C}(l^2)$, 紧算子的基本性质 6.4(vi) 与 $T = \tilde{A}A$ 即知 $T \in \mathfrak{C}(l^2)$.

下面研究 $\sigma(T)$. 因为 $\dim l^2 = \infty$, 故 $0 \in \sigma(T)$. 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 T 的特征值, 则必存在 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in l^2 \setminus \{0_{l^2}\}$ 使得

$$(\lambda I - T)(\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}) = 0_{l^2}.$$

代入 T 的定义可知

$$(\lambda a_1, \lambda a_2 - \lambda_1 a_1, \dots, \lambda a_{k+1} - \lambda_k a_k, \dots) = 0_{l^2}.$$

这说明

$$\begin{cases} \lambda a_1 = 0, \\ \lambda a_{k+1} = \lambda_k a_k, \forall k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

若 $\lambda = 0$, 则对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 均有 $\lambda_k a_k = 0$, 又因为 $\lambda_k \neq 0 (\forall k \in \mathbb{N})$, 故只能有 $a_k = 0$, 因此

$$\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}} = 0_{l^2},$$

矛盾! 而若 $\lambda \neq 0$, 则由 $\lambda a_1 = 0$ 可知 $a_1 = 0$, 进而推知 $a_k = 0 (\forall k \in \mathbb{N})$, 同样矛盾, 故 T 没有特征值, 即 $\sigma_p(T) = \emptyset$. 又显见 $\overline{R(T)} \neq l^2$, 故 $\{0\} \in \sigma_r(T)$. 由谱性质 6.10(ii) 即知 $\sigma(T) = \{0\} = \sigma_r(T)$. □

6.4.2 不变子空间

定义 6.11 (不变子空间 (invariant subspace))

设 X 是 Banach 空间, $A \in L(X)$, $M \subset X$ 是线性子空间. 若 $A(M) \subset M$, 就称 M 为算子 A 的不变子空间. ♣

从定义出发可得下述结论:

命题 6.8 (不变子空间的基本性质)

设 X 是 Banach 空间, $A \in L(X)$, 则

- (i) $\{0_X\}$ 与 X 都是 A 的不变子空间, 称这两个不变子空间为 A 的平凡不变子空间.
- (ii) 若 M 是 A 的不变子空间, 则 $\overline{M}$ 是 A 的闭不变子空间.
- (iii) 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 则 $N(\lambda I - A)$ 是 A 的闭不变子空间.
- (iv) 对 $\forall y \in X$, 若记

$$L_y := \{P(A)y : P \text{ 是数域 } \mathbb{K} \text{ 上的任意一元多项式}\}$$

则 L_y 是 A 的不变子空间. ♠

证明 (i) 显然.

(ii) 只需说明对 $\forall x \in \overline{M}$ 均有 $Ax \in \overline{M}$. 事实上, 因为 $x \in \overline{M}$, 故存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ 使得 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 因为 $A(M) \subset M$, 故 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset M$. 又因为 $A \in L(X)$, 故当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$Ax_n \rightarrow Ax.$$

因此 $Ax \in \overline{M}$, 从而 $\overline{M}$ 是 A 的 (闭) 不变子空间.

(iii) 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 则 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在, 因此 $N(\lambda I - A) \neq \{0_X\}$, 且 $N(\lambda I - A)$ 为 X 的一个线性子空间. 现任取 $x \in N(\lambda I - A)$, 知 $(\lambda I - A)x = 0_X$, 即

$$Ax = \lambda x \in N(\lambda I - A),$$

这说明 $N(\lambda I - A)$ 是不变子空间.

下面说明 $N(\lambda I - A)$ 是闭的. 任取 $x \in \overline{N(\lambda I - A)}$, 知存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset N(\lambda I - A)$ 使得 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 又对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$x_n \in N(\lambda I - A) \Leftrightarrow (\lambda I - A)x_n = 0_X \Leftrightarrow Ax_n = \lambda x_n.$$

在上右式两端对 n 取极限, 由 A 的连续性即知

$$\lambda x = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = Ax.$$

因此 $x \in N(\lambda I - A)$, 故 $N(\lambda I - A)$ 是闭的.

(iv) 任取 $x \in L_y$, 知存在多项式 P 使得 $x = P(A)y$. 注意若 P 是 $\mathbb{K}$ 上的多项式, 则 $xP(x)$ 依旧是 $\mathbb{K}$ 上的多项式, 因此

$$Ax = AP(A)y \in L_y,$$

故 L_y 是 A 的不变子空间. □

定理 6.11 (紧算子不变子空间的存在性)

设 X 是 Banach 空间, $\dim X \geq 2$, 则对任意 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 而言, A 均有非平凡的闭不变子空间. ♡

证明 若 $A = 0_{L(X)}$, 任取 $y \in X \setminus \{0_X\}$. 因为 $\dim X \geq 2$, 故

$$\{0_X\} \subsetneq \text{span}\{y\} \subsetneq X$$

且

$$A(\text{span}\{y\}) = \{0_X\} \subset \text{span}\{y\}$$

这说明 $\text{span}\{y\}$ 就是 A 的一个非平凡闭不变子空间.

下设 $A \neq 0_{L(X)}$, $\|A\|_{L(X)} = 1$. 若 $\dim X = n < \infty$, 则 A 成为一个 $n \times n$ 矩阵. 根据代数基本定理知必存在 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $|A - \lambda_0 I| = 0$, 因此 $(A - \lambda_0 I)x = 0_X$ 必存在非零解 x . 由 $\dim X \geq 2$ 知 $\{\lambda x : \lambda \in \mathbb{C}\}$ 为 A 的一个非平凡闭不变子空间.

若 $\dim X = \infty$, 我们首先说明可设 $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \emptyset$. 这是因为当 $\sigma_p(A) \setminus \{0\} \neq \emptyset$ 时, 由 $A \in \mathfrak{C}(X) \subset L(X)$ 与不变子空间的基本性质 6.8(iii) 知, 对 $\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ 而言, $N(\lambda I - A)$ 都是 A 的闭不变子空间. 根据 $\sigma_p(A)$ 的定义显见 $\{0_X\} \subsetneq N(\lambda I - A)$. 若 $N(\lambda I - A) = X$, 则

$$X = N(\lambda I - A) = \{x \in X : Ax = \lambda x\}$$

设 S_1 是 X 的单位球面, 则对任意 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S_1 \subset X = N(\lambda I - A)$ 均有

$$Ax_n = \lambda x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{6.41}$$

又因为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 本身有界, 而 $A \in \mathfrak{C}(X)$, 故 $\{Ax_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 存在收敛子列 $\{Ax_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, 由 (6.41) 式与 $\lambda \neq 0$ 可知 $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 也收敛. 因为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是在 S_1 上任取的, 这便说明 S_1 是 X 中的列紧集. 但从 Riesz 定理 6.8 出发可以说明此时 X 是有限维空间, 矛盾! 故必有 $N(\lambda I - A) \subsetneq X$, 因此 $N(\lambda I - A)$ 为 A 的非平凡闭不变子空间. 至此我们只需要讨论 $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \emptyset$ 的情况就可以了.

根据紧算子的谱性质 6.10(i),(ii), 此时只能有 $\sigma(A) = \{0\}$, 因此 $r_\sigma(A) = 0$.

下面用反证法证明 A 有非平凡闭不变子空间. 若 A 不存在非平凡闭不变子空间, 则由基本性质 6.8(ii),(iv) 知对任意 $y \in X \setminus \{0_X\}$ 而言均有 $\overline{Ly} = X$. 因为 $\|A\|_{L(X)} = 1$, 故存在 $\tilde{x}_0 \in X$ 使得 $\|A\tilde{x}_0\|_X \neq 0$, 从而当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\|A(n\tilde{x}_0)\|_X = n\|A\tilde{x}_0\|_X \rightarrow \infty.$$

由此可知必存在 $x_0 \in X$ 使得 $\|Ax_0\|_X > 1$, 进而必有 $\|x_0\|_X > 1$, 否则

$$\|Ax_0\|_X \leq \|A\|_{L(X)}\|x_0\|_X \leq 1,$$

这与 $\|Ax_0\|_X > 1$ 矛盾. 现令 $C := \overline{A(B(x_0, 1))}$, 根据 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 知 C 是紧集. 下面说明 $0_X \notin C$. 如若不然, 则存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得 $Ax_n \rightarrow 0_X (n \rightarrow \infty)$, 但另一方面

$$\|Ax_n - Ax_0\|_X \leq \|A\|_{L(X)}\|x_n - x_0\|_X < 1$$

而 $\|Ax_0\|_X > 1$, 故必有 $\|Ax_n\|_X > 0 (\forall n \in \mathbb{N})$, 矛盾! 故 $0_X \notin C$.

现在对 $\forall y_0 \in C$, 因为 $y_0 \neq 0_X$, 根据反证法的假设知 $\overline{Ly_0} = X$, 因此 $L_{y_0} \cap B(x_0, 1) \neq \emptyset$. 设 L_{y_0} 中的元素 $T_{y_0}y_0$ 满足 $\|T_{y_0}y_0 - x_0\|_X < 1$ (其中 T_{y_0} 是关于 A 的多项式, $T_{y_0} \neq 0_{L(X)}$ (否则 $\|x_0\|_X < 1$, 矛盾!)), 记

$$\varepsilon := 1 - \|T_{y_0}y_0 - x_0\|_X, \quad \delta_{y_0} := \frac{\varepsilon}{\|T_{y_0}\|_{L(X)}}.$$

则 $\delta_{y_0} > 0$, 且当 $\|y - y_0\|_X < \delta_{y_0}$ 时有

$$\|T_{y_0}y - T_{y_0}y_0\|_X \leq \|T_{y_0}\|_{L(X)}\|y - y_0\|_X < \varepsilon.$$

于是对 $\forall y \in B(y_0, \delta_{y_0})$ 有

$$\begin{aligned} \|T_{y_0}y - x_0\|_X &\leq \|T_{y_0}y - T_{y_0}y_0\|_X + \|T_{y_0}y_0 - x_0\|_X \\ &< \varepsilon + \|T_{y_0}y_0 - x_0\|_X = 1. \end{aligned} \quad (6.42)$$

注意到

$$C \subset \bigcup_{y \in C} B(y, \delta_y),$$

由 C 的紧性知存在 $\{y_1, \dots, y_n\} \subset C$ 与 $\delta_i := \delta_{y_i} (i \in \{1, \dots, n\})$ 使得

$$C \subset \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \delta_{y_i}). \quad (6.43)$$

因此对 $\forall y \in C$, 总会存在 $i_1 \in \{1, \dots, n\}$ 使得

$$y \in B(y_{i_1}, \delta_{y_{i_1}}).$$

于是由 (6.42) 式知

$$\|T_{y_{i_1}}y - x_0\|_X < 1.$$

即 $T_{y_{i_1}}y \in B(x_0, 1)$. 又因为 $T_{y_{i_1}}$ 是 A 的多项式, 故

$$T_{y_{i_1}}Ay = AT_{y_{i_1}}y \in C,$$

又因为 $0_X \notin C$, 故 $T_{y_{i_1}} \neq 0_X$. 由此及 (6.43) 式知存在 $i_2 \in \{1, \dots, n\}$ 使得

$$T_{y_{i_1}}Ay \in B(y_{i_2}, \delta_{y_{i_2}}).$$

重复上述过程可得

$$\|T_{y_{i_2}}T_{y_{i_1}}Ay - x_0\|_X < 1,$$

此即 $T_{y_{i_2}}T_{y_{i_1}}Ay \in B(x_0, 1)$. 又因为 $T_{y_{i_2}}$ 同样是 A 的多项式, 故

$$T_{y_{i_2}}T_{y_{i_1}}A^2y = AT_{y_{i_2}}T_{y_{i_1}}Ay \in C,$$

又因为 $0_X \notin C$, 故 $T_{y_{i_2}} \neq 0_X$. 依此类推, 存在 $\{i_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{1, \dots, n\}$ 使得对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 均有

$$\left\| \prod_{j=1}^k T_{y_{i_j}} (A^{k-1}y) - x_0 \right\|_X < 1.$$

由此可得对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 有

$$\|x_0\|_X - 1 < \left\| \prod_{j=1}^k T_{y_{i_j}} (A^{k-1}y) \right\|_X. \quad (6.44)$$

定义

$$\mu := \max_{j \in \mathbb{N}} \|T_{y_{i_j}}\|_{L(X)}. \quad (6.45)$$

由 $i_j \in \{1, \dots, n\}$ 可知 $\mu < \infty$, 又因为 $0_X \notin C$, 故 $\mu > 0$. 因此对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 由(6.44)式可得

$$\|x_0\|_X - 1 < \mu^k \|A^{k-1}y\|_X \leq \mu^k \|A^{k-1}\|_{L(X)} \|y\|_X.$$

整理可得

$$\frac{1}{\mu} \left(\frac{\|x_0\|_X - 1}{\mu \|y\|_X} \right)^{\frac{1}{k-1}} < \|A^{k-1}\|_{L(X)}^{\frac{1}{k-1}}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由 Gelfand 定理 6.4 知

$$\frac{1}{\mu} \leftarrow \frac{1}{\mu} \left(\frac{\|x_0\|_X - 1}{\mu \|y\|_X} \right)^{\frac{1}{k-1}} < \|A^{k-1}\|_{L(X)}^{\frac{1}{k-1}} \rightarrow r_\sigma(A) = 0$$

这与 $\mu < \infty$ 矛盾! 故 A 有非平凡闭不变子空间. □

[19]1.4 习题

练习 6.31

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{C}(X)$, 证明 A 的非零特征值可作重排:

$$|\lambda_1| \geq \dots \geq |\lambda_n| \geq \dots$$

证明 $\sigma(A) = \{0\}$ 时命题无所可证, 故不妨设 $\sigma(A) \setminus \{0\} \neq \emptyset$, 于是 $r_\sigma(A) > 0$. 已知 $r_\sigma(A) \leq \|A\|_{X \rightarrow X}$, 记

$$C_n := \left\{ x \in \mathbb{C} : \frac{r_\sigma(A)}{n+1} \leq |x| \leq \frac{r_\sigma(A)}{n} \right\},$$

显见 $\{\lambda_k\} \subset B_{\mathbb{C}}(0, r_\sigma(A))$, $B_{\mathbb{C}}(0, r_\sigma(A)) \setminus \{0\} = \bigcup_n C_n$, 且 $C_n \cap C_m = \emptyset (\forall n \neq m)$, 下面证明每个 C_n 内仅有有限个特征值. 考虑反证, 若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得存在无穷子列 (仍记为 $\{\lambda_k\}$) 满足 $\{\lambda_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_n$, 则 $\{\lambda_k\}$ 作为有界的无穷数列必有收敛子列, 设该子列收敛到 $\lambda \in \overline{C_n}$. 显见 $\overline{C_n} \cap \{0\} = \emptyset$, 故 $\lambda \neq 0$, 这与 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 所导致的 $\{\lambda_k\}$ 仅能以 0 为聚点矛盾! 故每个 C_n 内仅可能有有限个特征值 $\{\lambda_n^k\}_{1 \leq k \leq K_n}$. 对每个 C_n 内的特征值排序, 再对不同序组关于 n 排序即得待证重排. □

练习 6.32

举例说明存在 Banach 空间 X 及 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 使得 $0 \notin \sigma(A)$. ♠

证明 取 $X = \mathbb{R}$, $A = \text{Id}$, 显见 $A^{-1} \in L(\mathbb{R})$, 故 $0 \notin \sigma(A)$. □

练习 6.33

举例说明注 6.28(i) 中连续谱, (ii) 中连续谱和剩余谱, (iii) 中剩余谱的存在性. ♠

证明 针对 (i) 的连续谱情形, 考虑使用习题 6.35 给出的算子

$$T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds.$$

在习题6.35的过程中已经证明了 $\sigma(T) = \{0\}$, 现在说明 $\{0\} \subset \sigma_c(T)$. 针对方程

$$\int_0^t x(s)ds = 0,$$

两端求导可得 $x \equiv C$, 代入上述方程即知 $C = 0$, 故 $Tx = 0_{C[0,1]} \Rightarrow x = 0_{C[0,1]}$, 这说明 T^{-1} 首先存在.

再说明 $R(T) \neq C[0,1]$, 为此取

$$y(t) = \begin{cases} t, & t \in [0, 1/2], \\ 1/2, & t \in (1/2, 1]. \end{cases}$$

显见 $y \in C[0,1]$, 而求解 $Tx = y$ 可得

$$x(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, 1/2], \\ 0, & t \in (1/2, 1]. \end{cases}$$

显见 $x \notin C[0,1]$, 故 $y \notin R(T)$.

最后说明 $\overline{R(T)}^{C[0,1]} = C[0,1]$. 根据微积分基本定理立知 $C^1[0,1] \subset R(T)$, 而 Weierstrass 定理已经表明 $\overline{P[0,1]}^{C[0,1]} \subset \overline{C^1[0,1]}^{C[0,1]} = C[0,1]$ (其中 $P[0,1]$ 是 $[0,1]$ 上的全体多项式构成的空间), 故 $\overline{R(T)}^{C[0,1]} = C[0,1]$.

针对 (ii) 的连续谱情形, 沿用上例给出的 T , 进一步记

$$T_1 : L^2[0,1] \rightarrow L^2[0,1], \quad x(t) \mapsto Tx(t) + \int_0^1 x(t)dt.$$

易证 $(\cdot|1)_{L^2[0,1]} : L^2[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 进而该算子作为有穷秩算子自动成为紧算子. 另一方面习题6.30表明 $T : L^2[0,1] \rightarrow C[0,1]$ 是紧算子, 而嵌入 $C[0,1] \hookrightarrow L^2[0,1]$ 连续, 故 $T : L^2[0,1] \rightarrow L^2[0,1]$ 是紧算子, 进而 T_1 作为紧算子之和依旧是紧算子. 下面首先说明 $\{0\} \subset \sigma_c(T_1)$. 通过与前文完全一样的过程可说明 T_1^{-1} 首先存在, 再取 $y \equiv 1$, 显见方程 $T_1x = y$ 无解, 故 $R(T_1) \subsetneq L^2[0,1]$. 最后说明 $\overline{R(T_1)}^{L^2[0,1]} = L^2[0,1]$, 为此只需说明

$$(T_1x|h)_{L^2[0,1]} = 0 (\forall x \in L^2[0,1]) \Rightarrow h = 0_{L^2[0,1]}.$$

实际上有

$$\int_0^1 \left(\int_0^t x(s)ds \right) h(t)dt + \int_0^1 x(s)ds \int_0^1 h(t)dt = 0,$$

交换积分次序得

$$\int_0^1 \left(\int_t^1 h(t)dt \right) x(s)ds + \int_0^1 x(s)ds \int_0^1 h(t)dt = 0.$$

此即

$$\int_0^1 \left(\int_t^1 h(t)dt + \int_0^1 h(t)dt \right) x(s)ds = 0.$$

因为 x 是任取的, 故只能有

$$\int_t^1 h(t)dt + \int_0^1 h(t)dt = 0,$$

两端求导并求解即得 $h = 0_{L^2[0,1]}$. 至此即知 $\{0\} \subset \sigma_c(T_1)$.

下面说明 $\sigma_p(T_1) = \{1/\ln 2\}$. 设 $\lambda \in \sigma_p(T_1)$ 满足下述方程有非平凡解:

$$\lambda x(t) = \int_0^t x(t)dt + \int_0^1 x(t)dt,$$

两边关于 t 求导得

$$\lambda x'(t) = x(t) \Rightarrow x(t) = Ce^{t/\lambda}.$$

现在方程左式为 $\lambda Ce^{t/\lambda}$, 右式为

$$\int_0^t Ce^{\frac{s}{\lambda}} ds + \int_0^1 Ce^{\frac{t}{\lambda}} dt = C\lambda(e^{\frac{t}{\lambda}} - 1) + C\lambda(e^{\frac{1}{\lambda}} - 1)$$

取 $C \neq 0$, 于是

$$\lambda C e^{t/\lambda} = C \lambda (e^{\frac{t}{\lambda}} - 1) + C \lambda (e^{\frac{1}{\lambda}} - 1) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\ln 2},$$

故 $\sigma_p(T_1) = \{1/\ln 2\}$.

针对 (ii) 的剩余谱情形, 考虑

$$T: l^2 \rightarrow l^2, (x_1, x_2, \dots) \mapsto \left(x_1, 0, x_2, \frac{x_3}{2}, \dots, \frac{x_n}{n+1}, \dots\right).$$

仿照例 6.10 的过程可以说明 $T \in \mathfrak{C}(l^2)$. 下面说明 $\sigma_p(T) \setminus \{0\} = \{1\}$. 设 $\lambda \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}$, 则下述方程有非平凡解:

$$(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \dots) = \left(x_1, 0, x_2, \frac{x_3}{2}, \dots\right),$$

因为 $\lambda \neq 0$, 故首先有 $x_2 = 0$, 因此

$$\lambda x_3 = x_2 = 0, \lambda x_4 = \frac{x_3}{2} = 0, \dots,$$

进而上述方程有非平凡解仅当 $\lambda x_1 = x_1$, 因此 $\lambda = 1$.

接下来说明 $0 \in \sigma_r(T)$, 为此首先说明 T 是单射. 若 $Tx = 0_{l^2}$, 则比对即知 $x_1 = x_2 = x_3/2 = \dots = 0$, 进而只能有 $x = 0_{l^2}$, 这说明 $0 \notin \sigma_p(T)$. 另一方面显见 $e_2 = (0, 1, 0, 0, \dots) \in l^2$ 满足 $e_2 \notin \overline{R(T)}^{l^2}$, 故 $0 \in \sigma_r(T)$.

最后说明 (iii) 的剩余谱情形. 考虑

$$T: l^2 \oplus l^2 \rightarrow l^2 \oplus l^2, ((x_1, x_2, \dots), (y_1, y_2, \dots)) \mapsto \left(\left(x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right), \left(0, y_1, \frac{y_2}{2}, \dots, \frac{y_n}{n}, \dots\right)\right),$$

其中 $l^2 \oplus l^2 \subset l^2 \times l^2$ 赋范数 $\|(x, y)\|_{l^2 \oplus l^2} := \|x\|_{l^2} + \|y\|_{l^2}$ 与内积 $((x_1, y_1)|(x_2, y_2))_{l^2 \oplus l^2} = (x_1|x_2)_{l^2} + (y_1|y_2)_{l^2}$. 易证 $(l^2 \oplus l^2, \|\cdot\|_{l^2 \oplus l^2})$ 是 Banach 空间, 下面说明 $T \in \mathfrak{C}(l^2 \oplus l^2)$, 进一步我们说明只要 $A, B \in \mathfrak{C}(l^2)$, 就有 $A \oplus B \in \mathfrak{C}(l^2 \oplus l^2)$. 为此取 $\{(x_n, y_n)\} \subset B_{l^2 \oplus l^2}(0, 1)$, 则由 $\|\cdot\|_{l^2 \oplus l^2}$ 的定义知 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset B_{l^2}(0, 1)$, 故 $\{Ax_n\}$ 在 l^2 中收敛子列 $\{Ax_{\phi_1(n)}\}$, 进一步 $\{By_{\phi_1(n)}\}$ 在 l^2 中有收敛子列 $\{By_{\phi_2 \circ \phi_1(n)}\}$, 于是 $\{(Ax_{\phi_2 \circ \phi_1(n)}, By_{\phi_2 \circ \phi_1(n)})\}$ 是 $l^2 \oplus l^2$ 中的收敛子列, 故 $A \oplus B \in \mathfrak{C}(l^2 \oplus l^2)$. 现由例 6.9, 6.10 与前述结果即知 $T \in \mathfrak{C}(l^2 \oplus l^2)$.

下面说明 $\{1/n\}_n \subset \sigma_p(T)$. 设 $\lambda = 1/n$, 取 $x = e_n = \{\delta_{in}\}_i, y = 0_{l^2}$ 知

$$((\lambda x_1, \lambda x_2, \dots), (\lambda y_1, \lambda y_2, \dots)) = (\{\delta_{in}/n\}_i, 0_{l^2}) = \left(\left(\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, \frac{1}{n}, 0, \dots\right), 0_{l^2}\right),$$

故 $\lambda \in \sigma_p(T)$, 此即 $\{1/n\}_n \subset \sigma_p(T)$, 进而由 T 是紧算子知 $\sigma_p(T) \setminus \{0\}$ 只能是无穷点列.

再说明 $0 \in \sigma_r(T)$, 为此首先说明 T 是单射. 若 $T((x, y)) = (0_{l^2}, 0_{l^2})$, 则

$$\left(\left(x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right), \left(0, y_1, \dots, \frac{y_n}{n}, \dots\right)\right) = (0_{l^2}, 0_{l^2}),$$

比对即知 $x = y = 0_{l^2}$, 故 $0 \notin \sigma_p(T)$. 另一方面显见 $(0_{l^2}, e_1) = (0_{l^2}, (1, 0, \dots)) \notin \overline{R(T)}^{l^2 \oplus l^2}$, 故 $0 \in \sigma_r(T)$. $\square$

练习 6.34

设 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, 在 l^2 上定义算子

$$A: (x_1, x_2, \dots) \mapsto (a_1 x_1, a_2 x_2, \dots).$$

(i) 证明 A 在 l^2 上有界当且仅当 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为有界数列.

(ii) 若 A 有界, 求 $\sigma(A)$.

证明 (i) $\Rightarrow$: 不妨设 $\|A\|_{l^2 \rightarrow l^2} \leq M < \infty$, 则取 $e_n = \{\delta_{ni}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 知

$$|a_k| = \|Ae_k\|_{l^2} \leq \|A\|_{l^2 \rightarrow l^2} \|e_k\|_{l^2} \leq M < \infty, \forall k \in \mathbb{N},$$

故 $|a_k|$ 关于 k 一致有界, 此即 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有界.

$\Leftarrow$: 不妨设 $|a_n| \leq M < \infty (\forall n \in \mathbb{N})$, 则 $\{a_n\} \in l^\infty$, 进而任取 $x \in l^2$ 有:

$$\|Ax\|_{l^2} = \left[\sum_{i \in \mathbb{N}} |a_i x_i|^2\right]^{\frac{1}{2}} \leq \|\{a_n\}\|_{l^\infty} \|x\|_{l^2} \leq M \|x\|_{l^2},$$

故 $\|A\|_{l^2 \rightarrow l^2} \leq M < \infty$, 此即 A 有界.

(ii) 不失一般性设 a_n 两两不同, 现在断言

$$\sigma(A) = \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}.$$

为此只需说明 $\rho(A) = \mathbb{C} \setminus \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$. 先证 $\mathbb{C} \setminus \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}} \subset \rho(A)$. 任取 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$, 知

$$(\lambda I - A)x = ((\lambda - a_1)x_1, \dots, (\lambda - a_k)x_k, \dots),$$

因为 $\lambda - a_k \neq 0 (\forall k)$, 故 $(\lambda I - A)x = 0_{l^2} \Rightarrow x = 0_{l^2}$. 这说明 $\lambda I - A$ 是单射, 故 $(\lambda I - A)^{-1}$ 首先存在. 下面说明 $R(\lambda I - A) = l^2$. 任取 $y \in l^2$, 记

$$x_y = \left(\frac{y_1}{\lambda - a_1}, \dots, \frac{y_k}{\lambda - a_k}, \dots \right),$$

因为 $\lambda \notin \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$, 故存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\inf_n (\lambda - a_n) > \varepsilon > 0$, 进而

$$\|x_y\|_{l^2} \leq \frac{1}{\varepsilon} \|y\|_{l^2} < \infty,$$

故 $x_y \in l^2$, 进一步显见 $(\lambda I - A)x_y = y$, 故确有 $R(\lambda I - A) = l^2$, 因此 $\mathbb{C} \setminus \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}} \subset \rho(A)$.

再说明 $\rho(A) \subset \mathbb{C} \setminus \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$. 任取 $\lambda \in \rho(A)$, 知 $\lambda I - A$ 首先是单射, 因此必有 $\lambda - a_k \neq 0 (\forall k)$ (否则取 $e_k \neq 0_{l^2}$ 即知 $(\lambda I - A)e_k = 0_{l^2}$), 这说明 $\lambda \notin \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$. 进一步因为 A 线性有界, 故 A 首先是闭线性算子, 从而 $\lambda \in \rho(A)$ 时必有 $(\lambda I - A)^{-1} \in L(l^2)$. 直接求解立知

$$(\lambda I - A)^{-1}x = \left(\frac{x_1}{\lambda - a_1}, \dots, \frac{x_k}{\lambda - a_k}, \dots \right).$$

取 $x = e_k$, 设 $\|(\lambda I - A)^{-1}\|_{l^2 \rightarrow l^2} \leq M < \infty$, 则

$$\|(\lambda I - A)^{-1}e_k\|_{l^2} = \frac{1}{\lambda - a_k} \leq \|(\lambda I - A)^{-1}\|_{l^2 \rightarrow l^2} \|e_k\|_{l^2} \leq M,$$

故

$$\lambda - a_k \geq \frac{1}{M}, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

这说明 $\{a_n\}_n$ 中没有收敛到 λ 的子列, 因此 $\lambda \notin \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$, 故 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}}$. 至此即得待证结论. $\square$

练习 6.35

在 $C[0, 1]$ 中考虑映射

$$T: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds.$$

(i) 证明 T 是紧算子.

(ii) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡闭不变子空间.

证明 (i) 设 $\{x_n\}_n \subset \partial B_{C[0,1]}(0, 1)$, 往证 $\{Tx_n\}_n$ 存在收敛子列, 为此考虑 Arzela-Ascoli 定理. 一方面针对一致有界性知

$$\|Tx_n\|_{C[0,1]} \leq \|x_n\|_{C[0,1]} = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

另一方面针对等度连续性, 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 即知对任意 $t_1, t_2 \in [0, 1]$ 有

$$|t_1 - t_2| < \delta \Rightarrow |Tx_n(t_1) - Tx_n(t_2)| \leq \|x_n\|_{C[0,1]} |t_1 - t_2| < \delta = \varepsilon.$$

因此 Arzela-Ascoli 定理表明 $\{Tx_n\}_n$ 是 $C[0, 1]$ 中的列紧集, 故 T 是紧算子.

(ii) 既然 T 是紧算子且 $\dim C[0, 1] = \infty$, 故 $\sigma(T)$ 只可能是 $\{0\}, \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_m\}, \{0, \lambda_1, \dots, \lambda_k, \dots\}$ 中的一种. 现若存在 $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, 则 $\lambda \in \sigma_p(T)$, 于是方程

$$(\lambda I - T)x = \lambda x - \int_0^t x(s) ds = 0$$

在 $C[0, 1]$ 上有非平凡零解. 设 $y(t) = \int_0^t x(s) ds$, 则上述方程转化为

$$\lambda y' = y, \quad y(0) = 0,$$

直接求解知 $y \equiv 0$, 但这与 x 非平凡矛盾! 故 $\sigma(T) \setminus \{0\} = \emptyset$, 因此 $\sigma(T) = \{0\}$.

针对非平凡闭不变子空间, 设 $g(t) = t - 1/2$, 考虑 $\{ag\}_{a \in \mathbb{R}}$, 显见 $\{ag\}_{a \in \mathbb{R}}$ 作为有限维空间是 $C[0, 1]$ 的闭子空间. 另一方面对任意 $a \in \mathbb{R}$ 总有 $T(ag) = 0_{C[0, 1]} \subset \{ag\}_{a \in \mathbb{R}}$, 故 $\{ag\}_{a \in \mathbb{R}}$ 是 T 的一个非平凡闭不变子空间. $\square$

练习 6.36

给定数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 定义

$$A: l^1 \rightarrow l^1, \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \{a_n x_n\}_{n \in \mathbb{N}},$$

证明

- (i) $A \in L(l^1)$ 的充要条件是 $\sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| < \infty$.
- (ii) $A^{-1} \in L(l^1)$ 的充要条件是 $\inf_{n \in \mathbb{N}} |a_n| > 0$.
- (iii) $A \in \mathfrak{C}(l^1)$ 的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明 (i) $\Rightarrow$: 设 $\|A\|_{l^1 \rightarrow l^1} \leq M < \infty$, 取 $e_n = \{\delta_{ni}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 知

$$\|Ae_n\|_{l^1} = |a_n| \leq \|A\|_{l^1 \rightarrow l^1} \|e_n\|_{l^1} \leq M < \infty, \forall n \in \mathbb{N},$$

故 $\sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \leq M < \infty$.

$\Leftarrow$: 设 $\sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \leq M < \infty$, 则任取 $x \in l^1$ 知:

$$\|Ax\|_{l^1} = \sum_{n \in \mathbb{N}} |a_n x_n| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \|x\|_{l^1} \leq M \|x\|_{l^1},$$

故 $\|A\|_{l^1 \rightarrow l^1} \leq M$, 此即 $A \in L(l^1)$.

(ii) $\Rightarrow$: 容易计算

$$A^{-1}x = \left(\frac{x_1}{a_1}, \dots, \frac{x_k}{a_k}, \dots \right),$$

设 $\|A^{-1}\|_{l^1 \rightarrow l^1} \leq M < \infty$, 取 $x = e_n$ 知

$$\|A^{-1}e_n\|_{l^1} = \frac{1}{|a_n|} \leq \|A^{-1}\|_{l^1 \rightarrow l^1} \|e_n\|_{l^1} \leq M \Rightarrow |a_n| \geq \frac{1}{M} > 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

关于 n 取下确界即得 $\inf_{n \in \mathbb{N}} |a_n| > 0$.

$\Leftarrow$: 设 $\inf_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \geq \varepsilon > 0$, 则首先 $a_n \neq 0 (\forall n \in \mathbb{N})$, 于是

$$Ax = (a_1 x_1, \dots, a_k x_k, \dots) = 0_{l^1} \Rightarrow x = 0_{l^1},$$

这说明 A^{-1} 首先存在. 容易计算

$$A^{-1}x = \left(\frac{x_1}{a_1}, \dots, \frac{x_k}{a_k}, \dots \right),$$

现由条件知 $\sup_{n \in \mathbb{N}} |1/a_n| \leq \varepsilon^{-1}$, 故对任意 $x \in l^1$ 有

$$\|A^{-1}x\|_{l^1} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \frac{1}{a_n} \right| \|x\|_{l^1} \leq \varepsilon^{-1} \|x\|_{l^1},$$

这说明 $\|A^{-1}\|_{l^1 \rightarrow l^1} \leq \varepsilon^{-1} < \infty$, 此即 $A^{-1} \in L(l^1)$.

(iii) $\Rightarrow$: 考虑说明 $\{a_n\}_n \subset \sigma_p(A)$, 为此任取 $k \in \mathbb{N}$, 知

$$(a_k I - A)x = ((a_k - a_1)x_1, \dots, (a_k - a_k)x_k, \dots) = ((a_k - a_1)x_1, \dots, (a_k - a_{k-1})x_{k-1}, 0, (a_k - a_{k+1})x_{k+1}, \dots),$$

取 $x = e_k \neq 0_{l^1}$ 知 $(a_k I - A)e_k = 0_{l^1}$, 故 $a_k I - A$ 不是单射, 因此 $a_k \in \sigma_p(A)$. 现因 A 是紧算子, 故其点谱至多以 0 为聚点. 又因为 A 首先是有界线性算子, 故由 (i) 知 $\{a_n\}_n \subset \mathbb{C}$ 首先是有界列, 从而 $\{a_n\}_n$ 存在聚点, 且 $\{a_n\}_n \subset \sigma_p(A)$ 只能以 0 为聚点.

$\Leftarrow$: 由练习 6.24 立得结论. $\square$

练习 6.37

设 X 为无穷维 Banach 空间, A 为 X 上的紧算子且 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. 证明若 $(\lambda I - A)X = X$, 则 λ 为 A 的正则值.



证明 既然 $\lambda \neq 0$ 且 A 是紧算子, 故 λ 只可能是 A 的正则值或点谱. 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 记 $T := \lambda I - A$, 则 $N(T) \neq \{0_X\}$, 亦即存在 $0_X \neq x_1 \in N(T)$. 因为 T 是满射, 故存在 $x_2 \in X$ 使得 $x_1 = Tx_2$, 于是 $T^2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 \in N(T^2) \setminus \{0_X\}$, 进一步由 $x_1 \neq 0_X$ 知 $x_2 \notin N(T)$, 于是 $N(T) \subsetneq N(T^2)$. 重复该操作可知 $N(T) \subsetneq N(T^2) \subsetneq \cdots \subsetneq N(T^n) \subsetneq \cdots$. 由 T 连续知 $N(T^n)$ 总是 $N(T^{n+1})$ 的真闭子空间, 于是由 X 无穷维与 Riesz 引理知对每个 $n \in \mathbb{N}$ 总存在 $y_n \in N(T^{n+1}) \cap \partial B(0_X, 1)$ 使得

$$\text{dist}(y_n, N(T^n)) > \frac{1}{2}.$$

下面说明 $\{Ay_n\}$ 没有收敛子列, 为此只需说明 $\{Ay_n\}$ 不是 Cauchy 列. 任取 $n, m > 0$, 知

$$\begin{aligned} \|Ay_{n+m} - Ay_n\|_X &= \|\lambda y_{n+m} - Ty_{n+m} - \lambda y_n + Ty_n\|_X \\ &= |\lambda| \|\lambda y_{n+m} - \lambda^{-1}(Ty_{n+m} + \lambda y_n - Ty_n)\|_X. \end{aligned}$$

注意 $T^{n+m+1}y_{n+m} = 0_X = T^{n+m}(Ty_{n+m})$, 故 $Ty_{n+m} \in N(T^{n+m})$, 同理可得 $y_n \in N(T^{n+m}), Ty_n \in N(T^{n+m})$, 故

$$Ty_{n+m} + \lambda y_n - Ty_n \in N(T^{n+m}),$$

因此

$$|\lambda| \|\lambda y_{n+m} - \lambda^{-1}(Ty_{n+m} + \lambda y_n - Ty_n)\|_X \geq |\lambda| \text{dist}(y_{n+m}, N(T^{n+m})) > \frac{|\lambda|}{2},$$

因此 $\{Ay_n\}$ 没有收敛子列, 这与 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 矛盾! 故 $\lambda \in \rho(A)$. □

练习 6.38

设 $A, B \in L(X)$ 且 $AB = BA$, 证明

- (i) $R(A), N(A)$ 均为 B 的不变子空间.
- (ii) 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, $R(B^n), N(B^n)$ 均为 B 的不变子空间.



证明 (i) 任取 $y \in R(A)$, 往证 $By \in R(A)$. 根据定义知存在 $x \in X$ 使得 $y = Ax$, 两端同时作用 B 即知 $By = BAx = ABx \in R(A)$.

任取 $y \in N(A)$, 往证 $By \in N(A)$. 根据定义知 $Ay = 0_X$, 两端同时作用 B 知 $BAy = AB y = 0_X$, 故 $By \in N(A)$.

(ii) 任取 $y \in R(B^n)$, 往证 $By \in R(B^n)$. 知存在 $x \in X$ 使得 $y = B^n x$, 于是 $By = B^n(Bx)$. 既然 $B \in L(X)$, 知 $Bx \in X$, 因此 $B^n(Bx) = By \in R(B^n)$.

任取 $y \in N(B^n)$, 往证 $By \in N(B^n)$. 知 $B^n y = 0_X$, 故 $B(B^n y) = B^n(By) = 0_X$, 因此 $By \in N(B^n)$. □

练习 6.39

设 X 为 Banach 空间, $A \in \mathfrak{C}(X), T := I - A$, 证明

- (i) 存在非负整数 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $N(T^k) = N(T^{k+1})$.
- (ii) 存在非负整数 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $R(T^k) = R(T^{k+1})$. 若记 p 为使得

$$N(T^k) = N(T^{k+1}), k \in \mathbb{N}$$

成立的最小整数, q 为使得

$$R(T^k) = R(T^{k+1}), k \in \mathbb{N}$$

成立的最小整数, 则 $p = q < \infty$. □



证明 (i) 若 $1 \notin \sigma_p(A)$, 则 T 至少是单射, 进而 $N(T) = \{0_X\}$. 进一步若 $TTx = 0_X$, 则 $Tx = 0_X$, 故 $x = 0_X$, 这说

明 $N(T^2) = \{0_X\} = N(T)$, 取 $k = 1$ 即可.

若 $1 \in \sigma_p(A)$, 下面首先说明对每个 $k \in \mathbb{N}$ 而言, $N(T^k)$ 必为 X 的闭子空间. 线性性显然成立, 为证闭性, 设 $\{x_n\} \subset N(T^k)$ 满足 $x_n \rightarrow x(X)$. 因为 $A \in \mathfrak{C}(X) \subset L(X)$, 故

$$\|(I - A)^k\|_{X \rightarrow X} \leq (\|I - A\|_{X \rightarrow X})^k \leq (\|I\|_{X \rightarrow X} + \|A\|_{X \rightarrow X})^k < \infty,$$

这说明 $(I - A)^k = T^k \in L(X) (\forall k \in \mathbb{N})$, 于是 $(I - A)^k x_n \rightarrow (I - A)^k x (\forall k \in \mathbb{N})$, 这特别表明 $0_X = T^k x_n \rightarrow T^k x$, 故 $x \in N(T^k)$. 另显见 $T^k x = 0_X \Rightarrow T^{k+1} x = 0_X$, 故对任意 $k \in \mathbb{N}$ 而言, $N(T^k)$ 都是 $N(T^{k+1})$ 的闭子空间.

现考虑反证法, 若对任意 $k \in \mathbb{N}$ 而言 $N(T^k)$ 均为 $N(T^{k+1})$ 的真闭子空间, 则由 Riesz 引理知对每个 $k \in \mathbb{N}$ 均存在 $x_k \in N(T^k)$ 使得

$$\|x_k\|_X = 1, \text{dist}(x_k, N(T^{k+1})) \geq \frac{1}{2}.$$

下面说明 $\{Ax_k\}$ 无收敛子列. 任取 $0 < n < m$, 知

$$Ax_m - Ax_n = x_m + Ax_m - x_m - x_n + x_n - Ax_n = x_m - Tx_m - x_n + Tx_n$$

根据 x_n 的取法知 $Tx_m, x_n, Tx_n \in N(T^{m-1})$, 于是

$$\|Ax_m - Ax_n\|_X \geq \text{dist}(x_m, N(T^{m-1})) \geq \frac{1}{2}.$$

这说明 $\{Ax_k\}$ 作为有界集在 A 下的像集无收敛子列, 这与 $A \in \mathfrak{C}(X)$ 矛盾! 故必存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $N(T^k) = N(T^{k+1})$.

(ii) 考虑应用 Fredholm 二择一定理 6.9. 由 Schauder 定理 6.5 知 $A \in \mathfrak{C}(X) \Rightarrow A^* \in \mathfrak{C}(X^*)$, 于是 (i) 的结论对 A^* 同样适用, 且易证 $T^* = I - A^*$. 进一步由紧算子的基本性质知只要 $P(A)$ 是关于 A 的不含零次项的多项式, 那么 $P(A)$ 就是紧算子, 故由定义知 $T^k = (I - A)^k = I - P_k(A)$, $(T^*)^k = (I - A^*)^k = I - P_k(A^*)$, 其中 P_k 是不含零次项的多项式, $k \in \mathbb{N}$. 另易证 $P_k(A^*) = (P_k(A))^*$, 故 $(T^*)^k = (T^k)^*$.

现对 $P_k(A^*) \in \mathfrak{C}(X)$ 应用结论 (i) 知存在 k_0 满足 $N((T^*)^{k_0}) = N((T^*)^{k_0+1})$, 则于是由定理 6.9(ii) 知

$$R(T^{k_0}) = N((T^{k_0})^*)^\perp = N((T^*)^{k_0})^\perp = N((T^*)^{k_0+1})^\perp = N((T^{k_0+1})^*)^\perp = R(T^{k_0+1}).$$

故 $k_0 \in \mathbb{N}$ 能使得 $R(T^{k_0}) = R(T^{k_0+1})$, 进而 p, q 首先均良定义. 显见只要 $A \in \mathfrak{C}(X)$, 那么 $T = I - A$ 就满足 $N(T^k) \subset N(T^{k+1})$, $R(T^{k+1}) \subset R(T^k)$. 现若 $N(T^p) = N(T^{p+1})$, 由定理 6.9(i), (iv) 知 $N(T^p), N(T^{p+1}), N((T^*)^p), N((T^*)^{p+1})$ 均有限维, 且

$$\dim(N(T^p)) = \dim(N(T^{p+1})) = \dim(N((T^*)^p)) = \dim(N((T^*)^{p+1})),$$

故只能有 $N((T^*)^p) = N((T^*)^{p+1})$, 于是

$$R(T^p) = N((T^p)^*)^\perp = N((T^*)^p)^\perp = N((T^*)^{p+1})^\perp = N((T^{p+1})^*)^\perp = R(T^{p+1}),$$

因此 $q \leq p$.

下面证明 $p \leq q$. 设 $R(T^q) = R(T^{q+1})$, 现断言²¹只要 T 是闭线性算子且 $R(T)$ 闭, 就有 $N(T^*) = R(T)^\perp$. 在断言成立的前提下, 由 $P_k(A), P_k(A^*) \in \mathfrak{C}(X)$ 与 $T^k = I - P_k(A)$, $(T^*)^k = I - P_k(A^*)$ 知 $T^k, (T^*)^k$ 均为连续线性算子, 进而它们首先是闭线性算子. 现有

$$N((T^*)^q) = N((T^q)^*) = R(T^q)^\perp = R(T^{q+1})^\perp = N((T^{q+1})^*) = N((T^*)^{q+1}).$$

与前文同理, 因为 $N((T^*)^q), N((T^*)^{q+1})$ 均为有限维空间, 故

$$\dim(N(T^q)) = \dim N((T^*)^q) = \dim N((T^*)^{q+1}) = \dim(N(T^{q+1})),$$

又因为 $N(T^q), N(T^{q+1})$ 均为有限维空间, 故只能有

$$N(T^q) = N(T^{q+1}),$$

这说明 $p \leq q$, 至此除断言外结论即证.

²¹这件事就是推论 2.12(ii).

下面说明断言成立. 对 $M \subset X, N \subset X^*$ 记

$$M^\perp := \{f \in X^* : \langle f, x \rangle_{X^* \times X} = 0 (\forall x \in M)\},$$

$$N^\perp := \{x \in X : \langle f, x \rangle_{X^* \times X} = 0 (\forall f \in N)\}.$$

先前已经说明过 $R(T)$ 是闭集. 现在我们分下述几步进行证明.

第一步: 设 $M \subset X, N \subset X^*$ 是线性子空间, 往证

$$(M^\perp)^\perp = \overline{M}, (N^\perp)^\perp \supset \overline{N}. \quad (6.46)$$

针对第一式, 由 $x \in X \subset X^{**}$ 作为泛函的连续性知 $(M^\perp)^\perp$ 为闭子空间. 任取 $x \in M$, 由定义知对任意 $f \in M^\perp$ 均有 $\langle f, x \rangle_{X^* \times X} = 0$, 故 $x \in (M^\perp)^\perp$, 从而 $M \subset (M^\perp)^\perp$, 进而 $\overline{M} \subset (M^\perp)^\perp$. 下面说明 $(M^\perp)^\perp \subset \overline{M}$. 若存在 $x_0 \in (M^\perp)^\perp \setminus \overline{M}$, 则由 Hahn-Banach 定理知存在闭超平面严格分离 $\{x_0\}$ 和 $\overline{M}$, 这说明

$$\exists f \in X^* \exists \alpha \in \mathbb{R} \forall x \in \overline{M} (\langle f, x \rangle_{X^* \times X} < \alpha < \langle f, x_0 \rangle_{X^* \times X}).$$

因为 M 是线性空间, 故只能有 $\langle f, x \rangle_{X^* \times X} = 0 (\forall x \in \overline{M})$, 于是由上式知 $\langle f, x_0 \rangle_{X^* \times X} > 0$. 现在一方面 $f \in M^\perp$, 另一方面由 $x_0 \in (M^\perp)^\perp$ 知 $\langle f, x_0 \rangle_{X^* \times X} = 0$, 矛盾! 针对第二式, 仿照前述过程知 $N \subset (N^\perp)^\perp$, 另由 $f \in X^*$ 的连续性知 $(N^\perp)^\perp$ 是闭集, 故 $\overline{N} \subset (N^\perp)^\perp$.

第二步: 证明若 G, L 是 X 的闭子空间, 则

$$G^\perp \cap L^\perp = (G + L)^\perp. \quad (6.47)$$

一方面设 $f \in G^\perp \cap L^\perp$, 对任意 $x \in G + L$ 设 $x = x_1 + x_2, x_1 \in G, x_2 \in L$, 则

$$\langle f, x \rangle_{X^* \times X} = \langle f, x_1 \rangle_{X^* \times X} + \langle f, x_2 \rangle_{X^* \times X} = 0,$$

故 $f \in (G + L)^\perp$, 故 $G^\perp \cap L^\perp \subset (G + L)^\perp$. 另一方面由 $G \subset G + L$ 知 $(G + L)^\perp \subset G^\perp$, 同理 $(G + L)^\perp \subset L^\perp$, 故 $(G + L)^\perp \subset G^\perp \cap L^\perp$.

第三步: 记 $G(T)$ 为 $T : X \rightarrow X$ 的图, $L = X \times \{0_X\}$, 往证

$$X \times R(T) = G(T) + L. \quad (6.48)$$

(i) 的过程已经说明了 T 总是连续线性的, 因此 T 至少是 $X \rightarrow X$ 的闭算子. 取定 $(x, y) \in X \times R(T)$, 知存在 $z \in X$ 使得 $y = Tz$, 取 $x_1 = (z, Tz) \in G(T), x_2 = (-z, 0_X) \in L$ 即知 $(x, y) = x_1 + x_2 \in G(T) + L$, 故 $X \times R(T) \subset G(T) + L$. 另取定 $x_1 + x_2 \in G(T) + L$ 满足 $x_1 \in G(T), x_2 \in L$, 设 $x_1 = (x, Tx), x_2 = (y, 0_X)$, 则显见 $x + y \in X, Tx + 0_X \in R(T)$, 故 $G(T) + L \subset X \times R(T)$, 至此(6.48)得证.

第四步: 记

$$I : X^* \times X^* \rightarrow X^* \times X^*, (x, y) \mapsto I((x, y)) = (-y, x),$$

记 T^* 为 T 的转置算子(即 $\langle T^*f, x \rangle_{X^* \times X} := \langle f, Tx \rangle_{X^* \times X}$), 往证 $I(G(T^*)) = G(T)^\perp$. 为此任取 $(f, g) \in X^* \times X^*$, 知:

$$\begin{aligned} (f, g) \in G(T^*) &= \{(h, T^*h) : h \in X^*\} \Leftrightarrow \exists h \in X^* (f = h, g = T^*h) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in X^* (\langle g, x \rangle_{X^* \times X} = \langle f, Tx \rangle_{X^* \times X}) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in X^* (\langle -g, x \rangle_{X^* \times X} + \langle f, Tx \rangle_{X^* \times X} = 0) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in X^* (\langle (-g, f), (x, Tx) \rangle_{(X^* \times X^*) \times (X \times X)} = 0) \\ &\Leftrightarrow (-g, f) = I((f, g)) \in G(T)^\perp. \end{aligned}$$

第五步: 往证

$$\{0_{X^*}\} \times N(T^*) = G(T)^\perp \cap L^\perp. \quad (6.49)$$

为此首先说明 $L^\perp = \{0_{X^*}\} \times X^*$, 这是因为

$$\begin{aligned} (f, g) \in L^\perp &\Leftrightarrow \forall (x, y) \in X \times \{0_X\} \langle (f, g), (x, y) \rangle_{(X^* \times X^*) \times (X \times X)} = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall (x, y) \in X \times \{0_X\} \langle \langle f, x \rangle_{X^* \times X} + \langle g, 0_X \rangle_{X^* \times X}, 0 \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow (f, g) \in \{0_{X^*}\} \times X^*. \end{aligned}$$

现在取定 $(f, g) \in \{0_{X^*}\} \times N(T^*)$, 任取 $(x, y) \in G(T)$, 知存在 $z \in X$ 使得 $(x, y) = (z, Tz)$, 于是

$$\langle (f, g), (x, y) \rangle_{(X^* \times X^*) \times (X \times X)} = \langle 0_{X^*}, z \rangle_{X^* \times X} + \langle T^*g, z \rangle_{X^* \times X} = 0,$$

故 $\{0_{X^*}\} \times N(T^*) \subset (G(T))^\perp$. 另任取 $(x, y) \in L$, 知

$$\langle (f, g), (x, y) \rangle_{(X^* \times X^*) \times (X \times X)} = \langle 0_{X^*}, z \rangle_{X^* \times X} + \langle g, 0_X \rangle_{X^* \times X} = 0,$$

故 $\{0_{X^*}\} \times N(T^*) \subset L^\perp$, 从而 $\{0_{X^*}\} \times N(T^*) \subset G(T)^\perp \cap L^\perp$.

另一方面取定 $(f, g) \in G(T)^\perp \cap L^\perp$. 第四步表明 $G(T)^\perp = I(G(T^*))$, 于是可设存在 $h \in X^*$ 使得 $(f, g) = (-T^*h, h)$. 由 $(f, g) \in L^\perp$ 知对任意 $(x, y) \in L$ 均有

$$\langle (f, g), (x, y) \rangle_{(X^* \times X^*) \times (X \times X)} = \langle -T^*h, x \rangle_{X^* \times X} + \langle h, 0_X \rangle_{X^* \times X} = 0.$$

上右式要求

$$\langle T^*h, x \rangle_{X^* \times X} = 0 (\forall x \in X) \Rightarrow h \in N(T^*),$$

故 $(f, g) \in \{0_{X^*}\} \times N(T^*)$, 至此即证(6.49).

第六步: 结束断言证明, 往证

$$N(T^*) = R(T)^\perp. \quad (6.50)$$

容易证明 $(X \times R(T))^\perp = \{0_{X^*}\} \times R(T)^\perp$, 于是由(6.48)知

$$\{0_{X^*}\} \times R(T)^\perp = (G(T) + L)^\perp = G(T)^\perp \cap L^\perp = \{0_{X^*}\} \times N(T^*).$$

其中第一个等号源自(6.48), 第二个等号源自(6.47), 第三个等号源自(6.49). 比对立得(6.50). 至此断言得证. $\square$

注 6.30 显然上面这个用二择一的方法不适合考试用. 这里收录适合考试的 Riesz 引理的解法.

(i) 已知 $N(T^k) \subset N(T^{k+1})$, 往证存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $N(T^{k+1}) \subsetneq N(T^k)$, 考虑反证. 若 (i) 不成立, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有 $N(T^k) \subsetneq N(T^{k+1})$. 因为 $A \in \mathfrak{C}(X) \subset L(X)$, 故 $T^k \in L(X) (\forall k)$, 从而 $N(T^k)$ 在 X 中闭, 进而 Riesz 引理²²表明对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均存在 $y_k \in N(T^{k+1}) \cap \partial B(0_X, 1)$ 使得 $\text{dist}(y_k, N(T^k)) \geq 1/2$. 和前面的题思路相同, 注意对任意 $k, m \in \mathbb{N}$ 均有

$$T^{k+m}(y_k - Ty_k + Ty_{k+m}) = 0_X,$$

于是

$$\|Ay_{k+m} - Ay_k\|_X = \|y_{k+m} - (y_k - Ty_k + Ty_{k+m})\|_X \geq \frac{1}{2},$$

这与 A 紧矛盾.

(ii) 由 (i) 知 $p < \infty$, 下证 $q < \infty$. 显见 $R(T^{k+1}) \subset R(T^k)$, 往证存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $R(T^k) \subsetneq R(T^{k+1})$, 考虑反证. 若对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有 $R(T^{k+1}) \subsetneq R(T^k)$, 为使用 Riesz 引理, 下证 $R(T^k)$ 闭 $(\forall k)$. 因为 A 紧, 故已知 $R(T) = R(I - A)$ 闭, 于是 $A|_{R(T)}$ 紧, 这说明 $T' := I|_{R(T)} - A|_{R(T)} = T|_{R(T)}$ 也满足 $R(T')$ 闭, 从而 $R(T^2) = T(R(T)) = T'(R(T)) = R(T')$ 闭, 归纳即知 $R(T^k)$ 闭 $(\forall k)$. 现由 Riesz 引理知对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均存在 $y_k \in R(T^k) \cap \partial B(0_X, 1)$ 使得

$$\text{dist}(y_k, R(T^{k+1})) \geq \frac{1}{2}.$$

²²注意真闭子空间递增列这个反证条件自动表明 X 无穷维!

现在考察 $\{Ay_k\}$, 知

$$\begin{aligned}\|Ay_k - Ay_{k+m}\|_X &= \|\lambda y_k - Ty_k - \lambda y_{k+m} + Ty_{k+m}\|_X \\ &= |\lambda|^{-1} \|y_k - \lambda^{-1}(Ty_k + \lambda y_{k+m} - Ty_{k+m})\|_X.\end{aligned}$$

往证 $Ty_k + \lambda y_{k+m} - Ty_{k+m} \in R(T^{k+1})$. 因为 $y_k \in R(T^k)(\forall k)$, 故已知存在 x_k, x_λ, x_{k+m} 使得

$$y_k = T^k x_k, \lambda y_{k+m} = T^{k+m} x_\lambda, y_{k+m} = T^{k+m} x_{k+m},$$

进而

$$Ty_k + \lambda y_{k+m} - Ty_{k+m} = T^{k+1} x_k + T^{k+1}(T^{m-1} x_\lambda) - T^{k+1}(T^m x_{k+m}) = T^{k+1}(x_k + T^{m-1} x_\lambda - T^m x_{k+m}) \in R(T^{k+1}),$$

因此

$$\|Ay_k - Ay_{k+m}\|_X \geq |\lambda|^{-1} \text{dist}(y_k, R(T^{k+1})) \geq \frac{|\lambda|^{-1}}{2},$$

这与 A 紧矛盾! 故 $q < \infty$.

再说明 $p = q$. 先证 $p \leq q$, 根据定义这也就是证 $N(T^q) = N(T^{q+1})$, 进一步只需证 $N(T^{q+1}) \subset N(T^q)$. 考虑反证, 若 $N(T^q) \subsetneq N(T^{q+1})$, 设 $x_0 \in N(T^{q+1}) \setminus N(T^q)$, 则 $T^{q+1}x_0 = 0_X, T^q x_0 \neq 0_X$. 因为 $T^q x_0 \in R(T^q) = R(T^{q+1})$, 故存在 $x_1 \in X$ 使得 $T^q x_0 = T^{q+1}x_1$. 类似由 $T^q x_1 \in R(T^q) = R(T^{q+1})$ 知存在 $x_2 \in X$ 使得 $T^q x_1 = T^{q+1}x_2$, 重复该过程可得 $x_p \in X$ 使得 $T^q x_0 = T^{q+p}x_p$. 现在

$$\begin{aligned}T^{q+p}(x_p) &= T^q x_0 = T^p(T^q x_p) \neq 0_X, \\ T^{q+p+1}(x_p) &= T^{q+1}x_0 = T^{p+1}(T^q x_p) = 0_X,\end{aligned}$$

这说明 $N(T^{p+1}) \neq N(T^p)$, 矛盾!

再证 $q \leq p$, 根据定义这也就是证 $R(T^p) = R(T^{p+1})$, 进一步只需证 $R(T^p) \subset R(T^{p+1})$. 考虑反证, 若 $R(T^{p+1}) \subsetneq R(T^p)$, 设 $x \in R(T^p) \setminus R(T^{p+1})$, 则存在 $y \in X$ 使得 $x = T^p y$. 下证存在 $z \in X$ 使得 $x = T^{p+1}z$, 为此由 $R(T^q) = R(T^{q+1})$ 知 $T^q y \in R(T^q) = R(T^{q+1})$, 于是存在 $z \in X$ 使得 $T^q y = T^{q+1}z$, 进而

$$T^q(y - Tz) = 0_X.$$

根据反证条件知 $p < q$, 于是 $N(T^p) = N(T^{p+1}) = \dots = N(T^{q-1}) = N(T^q)$, 进而

$$y - Tz \in N(T^q) = N(T^{q-1}) = \dots = N(T^p) \Rightarrow T^p(y - Tz) = 0_X,$$

于是 $x = T^p y = T^{p+1}z$, 矛盾! 至此即得 $p = q$. □

练习 6.40

设 X, Y 均为 Banach 空间, $X \subset Y$, 映射

$$\tau: X \rightarrow Y, x \mapsto x$$

是紧算子. 设 $T \in L(X, Y)$ 满足存在正常数 C 使得对任意 $x \in X$ 均有

$$\|x\|_X \leq C(\|x\|_Y + \|Tx\|_Y),$$

证明:

- (i) $\dim N(T) < \infty$,
- (ii) $R(T)$ 是 Y 的闭子空间.

证明 (i) 由 T 的连续性立得 $N(T)$ 是 X 的闭子空间. 取 $\{x_n\} \subset B_X(0_X, 1) \cap N(T)$, 则由 τ 的紧性知 $\{x_n\}$ 在 Y 中有收敛子列 (仍记之为 $\{x_n\}$), 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > m > N (\|x_n - x_m\|_Y < \varepsilon),$$

于是

$$\|x_n - x_m\|_X \leq C(\|x_n - x_m\|_Y + \|T(x_n - x_m)\|_Y) \leq C\|x_n - x_m\|_Y < C\varepsilon,$$

这说明 $\{x_n\}$ 是 $N(T)$ 中的 **Cauchy** 列, 故由 X 的完备性知 $\{x_n\}$ 在 $N(T)$ 中收敛, 这说明 $N(T)$ 中的有界集列紧, 进而由 **Riesz** 引理知 $\dim N(T) < \infty$.

(ii) 由 T 线性显见 $R(T)$ 是 Y 的线性子空间, 往证 $R(T)$ 在 Y 中闭. 设 $\{y_n\} \subset R(T)$ 满足

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > m > N (\|y_n - y_m\|_Y < \varepsilon),$$

由 $R(T)$ 的定义知存在 $\{x_n\} \subset X$ 使得 $y_n = Tx_n$, 于是

$$n > m > N \Rightarrow \|T(x_n - x_m)\|_Y < \varepsilon.$$

下面说明 $\{x_n\}$ 在 X 中有界. 考虑反证, 若存在子列 (仍记为 $\{x_n\}$) 使得 $\|x_n\|_X \rightarrow \infty$, 记

$$z_n = \frac{x_n}{2C\|x_n\|_X},$$

显见 $\{z_n\} \subset B_X(0_X, 1/2C)$, 于是由 τ 的紧性知存在 $z \in Y$ 使得 $z_n \rightarrow z(Y)$. 另知.

$$1 = \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|_X} \right\|_X = \|z_n\|_X \leq C(\|z_n\|_Y + \|Tz_n\|_Y)$$

现在因为 $y_n = Tx_n$ 是 $R(T)$ 中的 **Cauchy** 列, 故 Tx_n 至少在 Y 中有界, 不妨设 $\|Tx_n\|_Y \leq M < \infty (\forall n)$, 因此

$$\|Tz_n\|_Y = \left\| \frac{Tx_n}{2C\|x_n\|_X} \right\|_Y \leq \frac{M}{2C\|x_n\|_X} \rightarrow 0,$$

这说明

$$1 \leq C(\|z_n\|_Y + \|Tz_n\|_Y) \rightarrow 1/2,$$

矛盾! 故 $\{x_n\}$ 在 X 中有界, 从而由 τ 的紧性知 $\{x_n\}$ 在 Y 中存在收敛子列 (仍记为 $\{x_n\}$), 此即

$$\exists N' > 0 \forall n > m > N' (\|x_n - x_m\|_Y < \varepsilon)$$

于是 $n > m > \max\{N, N'\}$ 时有

$$\|x_n - x_m\|_X \leq C(\|x_n - x_m\|_Y + \|T(x_n - x_m)\|_Y) \leq 2C\varepsilon,$$

这说明 $\{x_n\}$ 是 X 中的 **Cauchy** 列, 故存在 $x \in X$ 使得 $x_n \rightarrow x(X)$. 由 T 的连续性蕴含的闭性立知在 Y 的意义下有 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = Tx \in R(T)$, 至此 $R(T)$ 的闭性得证. $\square$

注 6.31 这题的 (ii) 当然也可以用商空间写. 想证闭子就是想证 T^{-1} 连续, 因此需要用商空间造出连续线性单射 $\tilde{T}$, 再证 $\tilde{T}^{-1}$ 连续. 因为 X 完备且 $N(T)$, 故 $X/N(T)$ 完备, 进而可定义

$$\tilde{T}: X/N(T) \rightarrow Y, [x] \mapsto Tx.$$

显见 $\tilde{T}$ 线性. 先证 $\tilde{T}$ 连续. 任取 $z \in [x]$, 知

$$\|\tilde{T}[x]\|_Y = \|Tz\|_Y \leq \|T\|_{X \rightarrow Y} \|z\|_X,$$

两边关于 z 取下确界即得

$$\|\tilde{T}[x]\|_Y \leq \|T\|_{X \rightarrow Y} \|[x]\|_{X/N(T)},$$

故 $\tilde{T}$ 连续. 再证 $\tilde{T}$ 单, 知

$$\tilde{T}[x] = 0_Y \Rightarrow \forall z \in [x] (Tz = 0_Y) \Rightarrow \forall z \in [x] (z \in N(T)) \Rightarrow [x] = [0_X].$$

故 $\tilde{T}$ 单.

下面证明 $\tilde{T}^{-1}$ 有界, 考虑反证, 若存在 $\{y_n\} \subset Y \cap \partial B(0_Y, 1)$ 使得 $\tilde{T}^{-1}y_n := [x_n]$ 满足

$$\|[x_n]\|_{X/N(T)} \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty.$$

不妨设 $[x_n] \neq [0_X] (\forall n)$, 取

$$[z_n] = \frac{[x_n]}{\|[x_n]\|_{X/N(T)}},$$

则 $\|[z_n]\|_{X/N(T)} \subset \partial B(0_{X/N(T)}, 1)$, 进一步由商范数定义知对每个 n 均存在 $z_n \in [z_n]$ 使得 $\|z_n\|_X < 2$. 因为

$\tau : X \rightarrow Y$ 是紧算子, 所以 $\{\tau z_n\} = \{z_n\}$ 在 Y 中有收敛子列, 不妨就设 $z_n \rightarrow y_0(Y)$, 则

$$Tz_n = \tilde{T}[z_n] = \frac{y_n}{\|[x_n]\|_{X/N(T)}} \rightarrow 0_Y,$$

现在 $\{z_n\}$ 与 $\{Tz_n\}$ 均在 Y 意义下收敛, 故由条件知 $\{z_n\}$ 在 X 意义下收敛, 设 $z_n \rightarrow z_0 \in X$, 则

$$Tz_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} Tz_n = 0_Y,$$

这说明 $z_0 \in N(T)$, 于是 $[z_0] = [0_X]$, 进而

$$\|[z_n]\|_{X/N(T)} = \|[z_n - z_0]\|_{X/N(T)} \leq \|z_n - z_0\|_X \rightarrow 0,$$

这与 $\{[z_n]\} \subset \partial B(0_{X/N(T)}, 1)$ 矛盾! □

6.5 Hilbert-Schmidt 定理

本节主要讨论对称紧算子的特征值表现. 首先我们给出对称算子的定义:

定义 6.12 (对称算子 (symmetric operator))

设 H 是 Hilbert 空间, $A \in L(H)$. 若

$$(Ax|y)_H = (x|Ay)_H, \quad \forall x, y \in H,$$

则称 A 是对称算子. ♣

注 6.32

(i) 回忆伴随算子 $A^* : H \rightarrow H$ 指的是对任意 $x, y \in H$ 均有

$$(Ax|y)_H = (x|A^*y)_H,$$

因此 Hilbert 空间上的有界线性算子 A 对称当且仅当 $A = A^*$, 因此又称 A 为自共轭算子 (self-conjugate operator) 或自伴算子 (self-adjoint operator).

(ii) 在谈复 Hilbert 空间时, 其上内积 $(\cdot|\cdot)_H$ 是共轭双线性算子 (而非双线性算子), 这便会使 A^* 多一个共轭出来 (所以也把 A^* 叫成共轭算子). 另外在谈对偶空间的时候定义过 $A : H \rightarrow H$ 的转置算子 (transpose operator) A^t 为:

$$A^t : H^* \rightarrow H^*, \quad f \mapsto A^t f \text{ s.t. } \langle A^t f, x \rangle_{H^* \times H} := \langle f, Ax \rangle_{H^* \times H}.$$

伴随算子和转置算子在 Hilbert 空间上其实会有一些区别, 这是因为设 Riesz 表示定理断言存在的等距同构 J_H 为

$$J_H : H^* \rightarrow H, \quad l \mapsto y_l \text{ s.t. } (x|y_l)_H := \langle l, x \rangle_{H^* \times H}.$$

进一步记

$$J_H^{-1} : H \rightarrow H^*, \quad y \mapsto l_y \text{ s.t. } \langle l_y, x \rangle_{H^* \times H} := (x|y)_H,$$

则

$$\langle A^t x, y \rangle_{H^* \times H} = \langle x, Ay \rangle_{H^* \times H} = (Ay|J_H x)_H = (y|A^* J_H x)_H = \langle J_H^{-1} A^* J_H x, y \rangle_{H^* \times H}, \quad \forall x \in H^*,$$

这说明 $A^t = J_H^{-1} A^* J_H$, 同理可证 $A^* = J_H A^t J_H^{-1}$. 因为复 Hilbert 空间上的内积关于第二个变量共轭线性, 所以对取定的 $l \in H^*, x \in H$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}$ 知 $J_H(\lambda l)$ 满足:

$$(y|J_H(\lambda l))_H = \langle \lambda l, y \rangle_{H^* \times H} = \lambda \langle l, y \rangle_{H^* \times H} = \lambda (y|J_H(l))_H,$$

与此同时 $J_H^{-1}(\lambda x)$ 满足:

$$\langle J_H^{-1}(\lambda x), y \rangle_{H^* \times H} = (y|\lambda x)_H = \overline{\lambda} (y|x)_H = \overline{\lambda} \langle J_H^{-1} x, y \rangle_{H^* \times H}.$$

这说明只要算子的数乘经过了 J_H^{-1} , 对应的系数就会多一个共轭出来. 从定义出发也可以直接验证对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有 $(\lambda A)^* = \overline{\lambda} A^*$, $(\lambda A)^t = \lambda A^t$. 虽说差不多共轭这件事看起来很鸡肋, 但是它在 Lebesgue 空间的乘

子理论中是一个隐藏较深的陷阱, 这是因为如果设 m 是性质足够好的函数, 定义

$$T : L^2 \rightarrow L^2, f \mapsto (\widehat{f}m)^\vee,$$

则可以验证 $T^*f = (\widehat{f}m)^\vee, T^t f = (\widehat{f}m(\cdot))^\vee$, 可见这两种算子变换对应的乘子变换 $m \mapsto \overline{m}$ 和 $m \mapsto m(\cdot)$ 并不一样. 这件事在 [8] pg.150 中有提, 共轭不共轭导致的混淆其实也就是在 L^p 理论中有, 这是因为一方面 Riesz 表示定理用的是 Hilbert 空间 L^2 的 (复) 内积表示的泛函, 另一方面 [7] 说针对复 L^p 空间, 其上泛函也可以定义为实内积 $f \mapsto \int fg$, 所以针对 L^2 空间而言典则同构 $L^2 \rightarrow (L^2)^*$ 有基于复内积和实内积的两种定义. 当然在 PDE 的估计中 (特别是在全空间估计中) 因为 L^p 估计和 Sobolev 估计都是套着范数进行的, 共轭不共轭或者反不反射的信息在范数下全都丢了, 所以一般不是很需要担心这两种定义会导致估计上的什么麻烦.

例 6.11 设 $X = L^2(\Omega, \mu)$ 以 $\mathbb{R}$ 为背景数域, $K \in L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)$ 满足对 $\forall x, y \in \Omega$ 均有 $K(x, y) = K(y, x)$, 则算子

$$A : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y)$$

是 $L^2(\Omega, \mu)$ 上的对称算子. 这是因为对任取 $u \in L^2(\Omega, \mu)$ 满足 $\|u\|_{L^2(\Omega, \mu)} \leq 1$, 由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \|Au\|_{L^2(\Omega, \mu)} &= \left[\int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y) \right|^2 d\mu(x) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left[\int_{\Omega} \int_{\Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(y)d\mu(x) \right]^{\frac{1}{2}} \|u\|_{L^2(\Omega, \mu)} \\ &\leq \|K\|_{L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)} < \infty. \end{aligned}$$

这便说明了 $A \in L^2(\Omega, \mu)$.

下面说明 A 对称. 为此任取 $u, v \in L^2(\Omega, \mu)$, 首先说明 $K(x, y)u(y)v(x)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 上可测, 这只需说明 $u(y)v(x)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 上可测即可. 注意到对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 有

$$\{(x, y) \in \Omega \times \Omega : u(y) > \lambda\} = \Omega \times \{y \in \Omega : u(y) > \lambda\}$$

而上右式可测, 故 $u(y)$ 是 $\Omega \times \Omega$ 上的可测函数, 同理 $v(x)$ 也是 $\Omega \times \Omega$ 上的可测函数, 因此 $u(y)v(x)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 上可测. 现在根据 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)u(y)v(x)|d\mu(x)d\mu(y) &\leq \left[\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x)d\mu(y) \right]^{\frac{1}{2}} \left[\iint_{\Omega \times \Omega} |u(y)v(x)|^2 d\mu(x)d\mu(y) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \|K\|_{L^2(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)} \|u\|_{L^2(\Omega, \mu)} \|v\|_{L^2(\Omega, \mu)} < \infty. \end{aligned}$$

因此 $K(x, y)u(y)v(x) \in L^1(\Omega \times \Omega, \mu \otimes \mu)$, 由此可知对 $\forall u, v \in L^2(\Omega, \mu)$, 根据 Fubini 定理有

$$\begin{aligned} \langle Au, v \rangle &= \int_{\Omega} \left[\int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y) \right] v(x)d\mu(x) \\ &= \int_{\Omega} u(y) \left[\int_{\Omega} K(x, y)v(x)d\mu(x) \right] d\mu(y) \\ &= \langle u, Av \rangle. \end{aligned}$$

由此可知 A 对称. □

例 6.12 设 H 是 Hilbert 空间, M 是 H 的闭线性子空间, 则 $H \rightarrow M$ 的投影算子 P_M 是对称的. 这是因为根据正交投影定理 5.1 知对 $\forall x, y \in H$ 存在唯一正交分解:

$$\begin{aligned} x &= x_M + x_{M^\perp}, \quad x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp, \\ y &= y_M + y_{M^\perp}, \quad y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp, \end{aligned}$$

其中 $M^\perp$ 表示 M 的正交补:

$$M^\perp = \{x \in X : (x, y) = 0, \forall y \in M\}.$$

现在 $P_M : H \rightarrow M, x \mapsto x_M$, 故 $x_M = P_M x, y_M = P_M y$, 从而

$$\begin{aligned}(P_M x|y)_H &= (x_M|y)_H = (x_M|y_M + y_{M^\perp})_H \\ &= (x_M|y_M)_H = (x_M + x_{M^\perp}|y_M)_H \\ &= (x|P_M y)_H,\end{aligned}$$

此即 P_M 是对称算子. □

命题 6.9 (对称算子的基本性质)

设 H 是 Hilbert 空间, $A \in L(H)$, 则:

(i) A 对称当且仅当对任意 $x \in H$ 有 $(Ax|x)_H \in \mathbb{R}$.

(ii) 若 A 对称, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$, 且对任意 $x \in H$ 与满足 $\operatorname{Im} \lambda \neq 0$ 的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\|_X \leq \frac{1}{|\operatorname{Im} \lambda|} \|x\|_X.$$

(iii) 设 A 是 H 上的对称算子, H_1 是 A 的一个闭不变线性子空间, 则 $A|_{H_1}$ 也是 H_1 上的对称算子.

(iv) 若 A 对称, $\lambda, \tilde{\lambda} \in \sigma_p(A)$ 且 $\lambda \neq \tilde{\lambda}$, 则

$$N(\lambda I - A) \perp N(\tilde{\lambda} I - A).$$

(v) 若 A 对称, 则

$$\|A\|_{L(H)} = \sup_{\|x\|_H=1} |(Ax|x)_H|.$$

证明 (i) 任取 $x, y \in H$, 令

$$a(x, y) := (Ax|y)_H,$$

显见 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的共轭双线性函数. 根据 a 的构造可知对任意对称算子 A 与任意 $x, y \in H$ 有

$$\begin{aligned}(Ax|y)_H &= (x|Ay)_H \\ \Leftrightarrow a(x, y) &= (Ax|y)_H = (x|Ay)_H = \overline{(Ay|x)_H} = \overline{a(y, x)}.\end{aligned}$$

令 $x = y$ 知

$$a(x, x) = (Ax|x)_H = \overline{(Ax|x)_H} = \overline{a(x, x)},$$

这说明 $(Ax|x)_H \in \mathbb{R}$.

反之, 因为 H 是 Hilbert 空间, 故 $(Ax|x)_H \in \mathbb{R}$ 意味着对任意 $x, y \in H$ 有

$$(A(x+y)|x+y)_H = \overline{(A(x+y)|x+y)_H},$$

且

$$(A(x+iy)|x+iy)_H = \overline{(A(x+iy)|x+iy)_H},$$

将上述两式展开有

$$\begin{aligned}a(x, y) + a(y, x) &= \overline{a(x, y)} + \overline{a(y, x)} \\ -a(x, y) + a(y, x) &= \overline{a(x, y)} - \overline{a(y, x)}\end{aligned}$$

两式相减可知对任意 $x, y \in H$ 有

$$a(x, y) = \overline{a(y, x)},$$

此即 A 对称.

(ii) 设 $\lambda = \mu + i\nu, \nu \neq 0, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, 下面证明 $\lambda \in \rho(A)$, 为此首先说明 $\lambda I - A$ 是单射, 事实上:

$$\begin{aligned} \|(\lambda I - A)x\|_H^2 &= ((\lambda I - A)x | (\lambda I - A)x)_H \\ &= ((\mu I - A)x + i\nu x | (\mu I - A)x + i\nu x)_H \\ &= \|(\mu I - A)x\|_H^2 + ((\mu I - A)x | i\nu x)_H + (i\nu x | (\mu I - A)x)_H + |\nu|^2 \|x\|_H^2 \\ &= \|(\mu I - A)x\|_H^2 + |\nu|^2 \|x\|_H^2 \geq |\nu|^2 \|x\|_H^2. \end{aligned}$$

亦即

$$\|(\lambda I - A)x\|_H \geq |\nu| \|x\|_H. \quad (6.51)$$

因此 $\lambda I - A$ 是单射, 从而 $(\lambda I - A)^{-1}$ 至少存在.

通过(6.51)式还可得到 $R(\lambda I - A)$ 闭. 这是因为设 $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $R(\lambda I - A)$ 中的基本列, 则存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset H$ 使得

$$y_n = (\lambda I - A)x_n,$$

由(6.51)式知 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 H 中的基本列, 由 H 的完备性可知存在 $x \in H$ 使得 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 进一步由 $\lambda I - A \in L(H)$ 可知

$$y_n \rightarrow (\lambda I - A)x \in R(\lambda I - A), \quad n \rightarrow \infty.$$

因此 $R(\lambda I - A)$ 是 H 中的闭集.

下面说明 $R(\lambda I - A) = H$, 为此考虑说明 $(R(\lambda I - A))^\perp = \{0_H\}$. 根据 A 的对称性知

$$\begin{aligned} y \in (R(\lambda I - A))^\perp &\Leftrightarrow ((\lambda I - A)x | y)_H = 0, \quad \forall x \in H \\ &\Leftrightarrow \lambda(x | y)_H = (Ax | y)_H, \quad \forall x \in H \\ &\Leftrightarrow \lambda(x | y)_H = (x | Ay)_H, \quad \forall x \in H \\ &\Leftrightarrow (x | (\bar{\lambda} I - A)y)_H = 0, \quad \forall x \in H \\ &\Leftrightarrow (\bar{\lambda} I - A)y = 0_H. \end{aligned}$$

这说明 $y \in N(\bar{\lambda} I - A)$. 又由(6.51)式知对任意 $y \in H$ 均有

$$\|(\bar{\lambda} I - A)y\|_H \geq |\nu| \|y\|_H$$

由 $\Im \lambda = \nu \neq 0$ 可知 $y \in N(\bar{\lambda} I - A) \Leftrightarrow y = 0_H$, 故

$$(R(\lambda I - A))^\perp = \{0_H\}. \quad (6.52)$$

现在通过(6.52)式说明 $R(\lambda I - A) = H$. 事实上若 $R(\lambda I - A) \subsetneq H$, 则存在 $x \in H$ 满足 $x \notin R(\lambda I - A)$. 因为 $R(\lambda I - A)$ 是 H 的闭线性子空间, 故 x 关于 $R(\lambda I - A)$ 的正交分解投影 $x_{(R(\lambda I - A))^\perp}$ 不能是 0_H , 否则 $x \in R(\lambda I - A)$. 但另一方面, 这说明

$$(R(\lambda I - A))^\perp \neq \{0_H\}$$

矛盾! 故 $R(\lambda I - A) = H$. 由此可得 $\lambda \in \rho(A)$, 这说明 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. 由(6.51)式即知对任意满足 $\Im \lambda \neq 0$ 的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $x \in H$ 有

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\|_H \leq \frac{1}{|\Im \lambda|} \|x\|_H.$$

注 6.33 本注给出(6.51),(6.52)两式的另外一种证法.

对于(6.51)式, 根据 A 的对称性与 (i) 知 $(Ax, x) \in \mathbb{R}$, 于是

$$|((\lambda I - A)x | x)_H| = |\mu(x | x)_H - (Ax | x)_H + i\nu(x | x)_H| \geq |\nu| \|x\|_H^2. \quad (6.53)$$

又由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$|((\lambda I - A)x|x)_H| \leq \|(\lambda I - A)x\|_H \|x\|_H,$$

于是

$$|\nu| \|x\|_H^2 \leq \|(\lambda I - A)x\|_H \|x\|_H.$$

此即(6.51)式.

对于(6.52)式, 任取 $x \in (R(\lambda I - A))^\perp$, 根据定义知

$$((\lambda I - A)x|x)_H = 0.$$

由上式与(6.53)式知只能有 $x = 0_H$, 于是

$$(R(\lambda I - A))^\perp \subset \{0_H\}.$$

又显见 $0_H \in (R(\lambda I - A))^\perp$, 故 $(R(\lambda I - A))^\perp = \{0_H\}$.

(iii) 因为 H_1 是 A 的不变子空间, 故对任意 $x, y \in H_1$ 知 $Ax, Ay \in H_1$, 又由 A 的对称性可得 $A|_{H_1}$ 的对称性.

(iv) 由 (ii) 知 $\lambda, \tilde{\lambda} \in \mathbb{R}$. 现若 $x \in N(\lambda I - A), \tilde{x} \in N(\tilde{\lambda} I - A)$, 则

$$\lambda(x|\tilde{x})_H = (Ax|\tilde{x})_H = (x|A\tilde{x})_H = \tilde{\lambda}(x|\tilde{x})_H,$$

由 $\lambda \neq \tilde{\lambda}$ 知只能有 $(x|\tilde{x})_H = 0$, 因此 $N(\lambda I - A) \perp N(\tilde{\lambda} I - A)$.

(v) 记

$$\widetilde{C} := \sup_{\|x\|_H=1} |(Ax|x)_H|.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式知 $\widetilde{C} \leq \|A\|_{L(H)}$, 下面说明 $\|A\|_{L(H)} \leq \widetilde{C}$. 因为 A 对称, 故对 $\forall x, y \in H$ 有

$$\begin{aligned} (A(x+y)|x+y)_H - (A(x-y)|x-y)_H &= 2[(Ax|y)_H + (Ay|x)_H] \\ &= 2[(Ax|y)_H + \overline{(Ax|y)_H}] \\ &= 4 \operatorname{Re}(Ax|y)_H. \end{aligned}$$

由上式与平行四边形法则知对任意 $x, y \in H$, 若 $\|x\|_H = \|y\|_H = 1$ 且 $x \neq \pm y$, 则

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(Ax|y)_H &= \frac{1}{4} [(A(x+y)|x+y)_H - (A(x-y)|x-y)_H] \\ &= \frac{1}{4} \left[\|x+y\|_H^2 \left(A \left(\frac{x+y}{\|x+y\|_H} \right) \middle| \frac{x+y}{\|x+y\|_H} \right)_H - \|x-y\|_H^2 \left(A \left(\frac{x-y}{\|x-y\|_H} \right) \middle| \frac{x-y}{\|x-y\|_H} \right)_H \right] \\ &\leq \frac{\widetilde{C}}{4} [\|x+y\|_H^2 + \|x-y\|_H^2] \\ &= \frac{\widetilde{C}}{2} [\|x\|_H^2 + \|y\|_H^2] = \widetilde{C}. \end{aligned}$$

而若 $x = \pm y$, 则上式显然成立. 现取 $\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1$ 使得

$$\alpha(Ax, y) = |(Ax|y)_H|,$$

则

$$|(Ax|y)_H| = \alpha(Ax|y)_H = (Ax|\bar{\alpha}y)_H = \operatorname{Re}(Ax|\bar{\alpha}y)_H \leq \widetilde{C}.$$

因此

$$\|A\|_{L(H)} = \sup_{\|x\|_H=\|y\|_H=1} |(Ax|y)_H| \leq \widetilde{C},$$

故 $\|A\|_{L(H)} = \widetilde{C}$, 由此即得

$$\|A\|_{L(H)} = \sup_{\|x\|_H=1} |(Ax|x)_H|.$$

□

对有限维空间的情形, 基本性质 6.9(v) 其实就是对称阵对角化的一个自然推论. 设 $\mathbf{A}$ 是 $n \times n$ 实对称阵, 通过代数上的处理可知存在正交阵 $\mathbf{U}$ 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \mathbf{U},$$

其中 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 现设 $\mathbf{U}^T = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 则

$$\mathbf{A}\mathbf{U}^T = \mathbf{U}^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

也就是说对 $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ 有

$$\mathbf{A}\xi_i = \lambda_i \xi_i.$$

下面说明特征值 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ 实际上是 $\mathbf{A}$ 所对应的二次型 $(\mathbf{A}x, x)$ 在单位球面 $\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1$ 上的各临界值. 为此不妨设

$$|\lambda_1| \geq \cdots \geq |\lambda_n|,$$

根据正交阵的定义, 对 $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ 而言均有 $\|\xi_i\|_{\mathbb{R}^n} = 1$, 且 $\{\xi_i\}_{i=1}^n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组规范正交基. 因此对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1$, 均存在 $\{a_i\}_{i=1}^n \subset [-1, 1]$ 使得

$$\left[\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 1, \quad x = \sum_{i=1}^n a_i \xi_i. \quad (6.54)$$

因此

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}x|x) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{A}\xi_i \mid \sum_{i=1}^n a_i \xi_i \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \lambda_i \xi_i \mid \sum_{i=1}^n a_i \xi_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i^2. \end{aligned}$$

接下来我们说明 $x = \xi_i (i \in \{1, \dots, n\})$ 是 $(\mathbf{A}x|x)$ 的临界点, 为此需要说明

$$\nabla(\mathbf{A}x|x) = (2\lambda_1 a_1, \dots, 2\lambda_n a_n)$$

在 ξ_i 处退化. 现在已知

$$(\mathbf{A} \cdot |\cdot|) : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$$

显然是流形间的光滑映射, 于是考虑该映射在 x 点的切映射有

$$T_x(\mathbf{A} \cdot |\cdot|) : T_x \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R},$$

其中 $T_x \mathbb{S}^{n-1}$ 表示 $\mathbb{S}^{n-1}$ 在 x 处的切平面. 几何上不难发现 $T_x \mathbb{S}^{n-1} = (\text{span}\{x\})^\perp$, 于是对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$ 有

$$y \in T_{\xi_i} \mathbb{S}^{n-1} = (\text{span}\{\xi_i\})^\perp \Leftrightarrow y = \sum_{j \neq i} b_j \xi_j.$$

从而

$$[\nabla(\mathbf{A}\xi_i|\xi_i)] \cdot y = (0, \dots, 0, 2\lambda_i, 0, \dots, 0) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{i-1} \\ 0 \\ b_{i+1} \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = 0$$

因此 $\nabla(\mathbf{A}x|x)$ 在 ξ_i 处退化, 类似可证 $\nabla(\mathbf{A}x|x)$ 在 $-\xi_i$ 处也退化, 故 $x = \xi_i$ 确为 $(\mathbf{A}x, x)$ 的临界点. 下面说明对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$ 均有

$$|\lambda_i| = \sup\{ |(\mathbf{A}x|x)| : \|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1, x \perp \text{span}\{\xi_1, \dots, \xi_{i-1}\} \}. \quad (6.55)$$

记(6.55)右式为 d , 取 $x = \xi_i$ 知

$$d \geq |(\mathbf{A}\xi_i|\xi_i)| = |\lambda_i|.$$

另一方面, 对任意满足 $\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1$ 的 $x \perp \text{span}\{\xi_1, \dots, \xi_{i-1}\}$, 由(6.54)式与 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\begin{aligned} |(\mathbf{A}x|x)| &= \left| \left(\sum_{j=1}^n a_j \mathbf{A}\xi_j \middle| x \right) \right| = \left| \left(\sum_{j=1}^n a_j \lambda_j \xi_j \middle| x \right) \right| \\ &= \left| \left(\sum_{j=i}^n a_j \lambda_j \xi_j \middle| x \right) \right| \leq \left| \sum_{j=i}^n a_j \lambda_j \xi_j \right| \\ &= \left(\sum_{j=i}^n a_j^2 |\lambda_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |\lambda_i| \end{aligned}$$

因此 $d \leq |\lambda_i|$, 故 $\lambda = d$. □

下面的定理表明对于对称紧算子而言, 基本性质6.9(v) 中的上确界是可以达到的.

定理 6.12

若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则存在 $x_0 \in H$ 满足 $\|x_0\|_H = 1$, 且

$$|(Ax_0|x_0)_H| = \sup_{\|x\|_H=1} |(Ax|x)_H| = \|A\|_{L(H)},$$

另有

$$Ax_0 = (Ax_0|x_0)_H x_0.$$



证明 当 $A = 0_{L(H)}$ 时, 定理结论自动成立, 下设 $A \neq 0_{L(H)}$. 记 S_1 为 H 的单位球面, 因为 A 对称, 故由基本性质6.9(i) 知对任意 $x \in S_1$ 有 $(Ax, x) \in \mathbb{R}$, 因此可设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax|x)_H| = \sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H.$$

(否则在上右式中用 $-A$ 代替 A 即可.) 令

$$\lambda := \sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H, \quad f(x) := (Ax|x)_H (\forall x \in S_1).$$

根据上确界的定义知存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S_1$ 使得 $f(x_n) \rightarrow \lambda (n \rightarrow \infty)$. 又因为 Hilbert 自反, 而 Eberlein-Smulian 定理3.6表明自反空间的单位闭球弱自列紧, 故 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 自身存在弱收敛子列, 不妨依旧记该子列为 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 并设 $x_0 \in H$ 满足 $\|x_0\|_H \leq 1, x_n \rightharpoonup x_0 (n \rightarrow \infty)$. 因为 A 是紧算子, 故由命题6.5知 A 全连续, 进而 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$Ax_n \rightarrow Ax_0.$$

于是 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\begin{aligned}
 |f(x_n) - (Ax_0|x_0)_H| &= |(Ax_n|x_n)_H - (Ax_0|x_0)_H| \\
 &\leq |(Ax_n - Ax_0|x_n)_H| + |(Ax_0|x_n - x_0)_H| \\
 &\leq \|Ax_n - Ax_0\|_H \|x_n\|_H + |(Ax_0|x_n - x_0)_H| \\
 &\leq \|Ax_0 - Ax_0\|_H + |(Ax_0|x_n - x_0)_H| \rightarrow 0,
 \end{aligned}$$

因此 $\lambda = (Ax_0|x_0)_H$.

下面说明 $\|x_0\|_H = 1$. 用反证法, 若 $\|x_0\|_H < 1$, 注意到本身根据基本性质 6.9(v) 有

$$\lambda = \sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H = \sup_{x \in S_1} |(Ax|x)_H| = \|A\|_{L(H)} > 0,$$

另一方面根据 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\begin{aligned}
 \lambda &= (Ax_0, x_0) \leq \|A\|_{L(H)} \|x_0\|_H^2 \\
 &= \sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H \|x_0\|_H^2 < \sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H,
 \end{aligned}$$

这与 $\sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H = \lambda$ 矛盾! 故 $\|x_0\|_H = 1$, 且

$$(Ax_0|x_0)_H = \sup_{x \in S_1} (Ax|x)_H.$$

下面说明 $Ax_0 = \lambda x_0$. 为此任取 $y \in H$ 与 $y \in \mathbb{R}$ 满足 $|t|$ 充分小, 且

$$\|x_0 + ty\|_H > 0,$$

对 y, t 定义:

$$\varphi_y(t) := \frac{(A(x_0 + ty)|x_0 + ty)_H}{(x_0 + ty|x_0 + ty)_H} = \left(A \left(\frac{x_0 + ty}{\|x_0 + ty\|_H} \right) \middle| \frac{x_0 + ty}{\|x_0 + ty\|_H} \right)_H.$$

因为 $(x_0 + ty)/\|x_0 + ty\|_H \in S_1$, 故 $\varphi_y(t)$ 在 $t = 0$ 时达到极大值, 这说明 $\varphi'_y(0) = 0$. 又因为

$$\varphi'_y(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_y(t) - \varphi_y(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_y(t) - \lambda}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(A(x_0 + ty)|x_0 + ty)_H - \lambda \|x_0 + ty\|_H^2}{t \|x_0 + ty\|_H^2}, \quad (6.56)$$

而对 $\forall t \in \mathbb{R}$ 与 $\forall y \in H$ 有

$$\begin{aligned}
 (A(x_0 + ty)|x_0 + ty)_H - \lambda \|x_0 + ty\|_H^2 &= (Ax_0|x_0)_H + t(Ax_0|y)_H + t(Ay|x_0)_H + t^2(Ay|y)_H \\
 &\quad - \lambda[(x_0|x_0)_H + t(x_0|y)_H + t(y|x_0)_H + t^2(y|y)_H] \\
 &= t[(Ax_0|x_0)_H + (Ay|x_0)_H + t(Ay|y)_H - \lambda[(x_0|y)_H + (y|x_0)_H + t(y|y)_H]]
 \end{aligned}$$

将上式代入(6.56)式知

$$\begin{aligned}
 \varphi'_y(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(Ax_0|y)_H + (Ay|x_0)_H + t(Ay|y)_H - \lambda[(x_0|y)_H + (y|x_0)_H + t(y|y)_H]}{\|x_0 + ty\|_H^2} \\
 &= (Ax_0|y)_H + (Ay|x_0)_H - \lambda(x_0|y)_H - \lambda(y|x_0)_H,
 \end{aligned}$$

由 A 对称可知对 $\forall y \in H$ 有

$$(Ax_0|y)_H + (Ay|x_0)_H - \lambda(x_0|y)_H - \lambda(y|x_0)_H = (Ax_0 - \lambda x_0|y)_H + (y|Ax_0 - \lambda x_0)_H = 2 \operatorname{Re}(Ax_0 - \lambda x_0|y)_H = 0.$$

将 y 换成 iy 即得 $\operatorname{Im}(Ax_0 - \lambda x_0|y)_H = 0$, 因此 $(Ax_0 - \lambda x_0|y)_H = 0$, 又由 y 的任意性可知 $Ax_0 = \lambda x_0$, 此即欲证. $\square$

注 6.34 本注给出 $Ax_0 = \lambda x_0$ 的另一种证法. 根据 $\lambda = (Ax_0|x_0)_H$ 与 $\|x_0\|_H = 1$ 可知

$$\begin{aligned}
 \|Ax_0 - \lambda x_0\|_H^2 &= (Ax_0 - \lambda x_0|Ax_0 - \lambda x_0)_H \\
 &= (Ax_0|Ax_0)_H - \lambda^2 = \|Ax_0\|_H^2 - \lambda^2 \\
 &\leq \|A\|_{L(H)}^2 - \lambda^2 = 0,
 \end{aligned}$$

因此 $Ax_0 = \lambda x_0$.

注 6.35 现在整理一下关于对称紧算子我们已经知道的事: 若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则:

- (i) A 必有实特征值, 因为定理 6.12 表明 $(Ax_0|x_0)_H$ 是 A 的特征值, 而基本性质 6.9(i) 表明 $(Ax_0|x_0)_H \in \mathbb{R}$. 另若 A 非零, 则它必有非零实特征值.
- (ii) 若 x_0 是定理 6.12 给出的, 且 $\tilde{\lambda}$ 是 A 的任意实特征值, 则 $|\tilde{\lambda}| \leq |(Ax_0|x_0)_H|$.
- (iii) 根据 (ii), A 的紧性与谱性质 6.10 可知 A 的算子范数是其特征值绝对值的最大值, 也是其所有谱的绝对值的最大值, 即 $\|A\|_{L(H)} = r_\sigma(A)$. 事实上, 因为 $(Ax_0|x_0)_H$ 是 A 的一个特征值, 故

$$|(Ax_0|x_0)_H| \leq \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_p(A)\}.$$

根据谱性质 6.10(ii) 可知

$$\sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_p(A)\} = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\} = r_\sigma(A).$$

根据谱性质 6.10 的注, 可知集合 $\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}$ 能取到最大值, 于是

$$r_\sigma(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_p(A)\}.$$

但谱半径本身满足

$$r_\sigma(A) \leq \|A\|_{L(H)},$$

且由基本性质 6.9(v) 知

$$\|A\|_{L(H)} = (Ax_0|x_0)_H,$$

综合上述诸式可知

$$r_\sigma(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_p(A)\} = |(Ax_0|x_0)_H| = \|A\|_{L(H)}.$$

□

对于 H 上的紧算子 A , 我们已经根据谱性质 6.10 知道

$$\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m, \dots\}$$

若 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m, \dots\}$ 中有无穷多个 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots)$ 不相等, 则 $\lambda_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 当 A 还是自伴算子 (即对称算子) 时, 基本性质 6.9(ii) 表明 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m, \dots\} \subset \mathbb{R}$. 下面的 Hilbert-Schmidt 定理表明实际上可以通过这列实数完全刻画 A .

定理 6.13 (Hilbert-Schmidt)

若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则存在可数个非零且以 0 为聚点的实数 $\{\lambda_i\}_i$ (相同数依照重数计算), 这列实数是算子 A 的本征值, 且它们对应了一组规范正交集 $\{e_i\}_i$, 它满足对 $\forall x \in H$ 有

$$x = \sum_i (x|e_i)_H e_i + \sum_\alpha (x|e_\alpha^{(0)})_H e_\alpha^{(0)}, \quad (6.57)$$

且

$$Ax = \sum_i \lambda_i (x|e_i)_H e_i, \quad (6.58)$$

其中 $\{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha$ 是 $N(A)$ 的规范正交基 (若 0 不是 A 的本征值, 则 $\{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha = \emptyset$), 且 $\{e_i\}_i \cup \{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha$ 是 H 的规范正交基.



注 6.36

- Hilbert-Schmidt 定理暗示了对于不可分 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子 A 而言必有 $0 \in \sigma_p(A)$. 这是因为如果 $0 \notin \sigma_p(A)$, 则 H 中的任意元素都能表为 $x = \sum_i (x|e_i)_H e_i$, 因此 $H = \text{span}\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, 取 E 是 $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 的全体有理系数有限线性组合即知 E 作为可数集在 H 中稠密, 矛盾!
- 在 Hilbert-Schmidt 定理中, 规范正交基 $\{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha$ 未必可数, 但对取定的 x 而言, 只有可数个 $e_\alpha^{(0)}$ 能使得 $(x|e_\alpha^{(0)})_H \neq 0$. 这一断言实际上也出现在 Bessel 不等式的证明中. 具体来说, 因为 $\{e_\alpha^{(0)}\}_{\alpha \in I}$ 是 $N(A)$ 的基, 故对 $\forall x \in N(A)$ 均有

$$x = \sum_{\alpha \in I} (x|e_\alpha^{(0)})_H e_\alpha^{(0)}.$$

现在任取 I 的有限子集 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 根据 $\{e_{\alpha_i}^{(0)}\}_{i=1}^n$ 的正交性知

$$0 \leq \left(x - \sum_{i=1}^n (x, e_{\alpha_i}^{(0)}) e_{\alpha_i}^{(0)} \right)_H \left(x - \sum_{i=1}^n (x, e_{\alpha_i}^{(0)}) e_{\alpha_i}^{(0)} \right)_H = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i}^{(0)})_H|^2,$$

于是 $\sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i}^{(0)})_H|^2 \leq \|x\|^2$, 这说明至少对每个取定的 n 而言, 能让 $|(x, e_{\alpha_i}^{(0)})_H| > 1/n$ 的 $\alpha \in I$ 至多只能有有限个 (否则在这一无限子集中取 $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ 并令 $n \rightarrow \infty$ 可知 $\sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i}^{(0)})_H|^2$ 爆破). 现在令 n 跑遍 $\mathbb{N}$ 即知满足 $(x, e_{\alpha}^{(0)})_H \neq 0$ 的 $\alpha \in I$ 至多只有可数个.

- 本条说明(6.57),(6.57)右式级数无条件收敛, 即它们在任意重排后依旧收敛到 x 或 Ax . 因为证明都类似, 故这里只证(6.57)右式第二个级数无条件收敛. 由 Bessel 不等式知 $\sum_{\alpha} |(x, e_{\alpha}^{(0)})_H|^2 \leq \|x\|_H^2$, 故对任意的 $x \in H$ 而言, 指标集 $J = \{j : (x, e_j^{(0)})_H \neq 0\}$ 可数, 不妨设 $\{e_j^{(0)} : j \in J\} = \{e_j^{(0)}\}_{j=1}^N$, 其中 $N \in \mathbb{N}$ 或 $N = \infty$. 若 $N < \infty$, 则待证结论作为有限和换序显然成立, 下设 $N = \infty$. 记

$$\tilde{x} := \sum_j (x, e_j^{(0)})_H e_j^{(0)} = \sum_{j=1}^{\infty} (x, e_j^{(0)})_H e_j^{(0)}.$$

因为上右式依旧是闭子空间 $N(A)$ 中的收敛级数, 故 $\tilde{x} \in H$, 于是由 $\{e_j^{(0)}\}_{j=1}^{\infty}$ 规范正交知 $\tilde{x}$ 自身也可以写成依 $N(A)$ 基的级数:

$$\tilde{x} = \sum_{j=1}^{\infty} (\tilde{x}, e_j^{(0)})_H e_j^{(0)}.$$

于是 Parseval 等式表明

$$\|\tilde{x}\|_H^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(\tilde{x}, e_j^{(0)})_H|^2 < \infty. \quad (6.59)$$

因为数项级数的无条件收敛等价于绝对收敛, 故上右式作为数项级数无条件收敛, 进而设 $\{\sigma(j)\}_{j=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{N}$ 的任意重排, 知

$$\sum_{j=1}^{\infty} |(x, e_{\sigma(j)}^{(0)})_H|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(\tilde{x}, e_j^{(0)})_H|^2. \quad (6.60)$$

于是由 $\{e_{\sigma(j)}^{(0)}\}$ 作为正交规范集的勾股定理²³, (6.59)与(6.60)知

$$\begin{aligned} \left\| \tilde{x} - \sum_{j=1}^{\infty} (\tilde{x}, e_{\sigma(j)}^{(0)})_H e_{\sigma(j)}^{(0)} \right\|_H^2 &= \|\tilde{x}\|_H^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |(\tilde{x}, e_{\sigma(j)}^{(0)})_H|^2 \\ &= \|\tilde{x}\|_H^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |(\tilde{x}, e_j^{(0)})_H|^2 = 0. \end{aligned}$$

因此

$$\tilde{x} = \sum_{j=1}^{\infty} (\tilde{x}, e_{\sigma(j)}^{(0)})_H e_{\sigma(j)}^{(0)},$$

进一步在内积中代入 $\tilde{x}$ 的定义式知

$$\sum_{j=1}^{\infty} (\tilde{x}, e_{\sigma(j)}^{(0)})_H e_{\sigma(j)}^{(0)} = \sum_{j=1}^{\infty} (x, e_{\sigma(j)}^{(0)})_H e_{\sigma(j)}^{(0)},$$

至此即证 $\sum_j (x, e_j^{(0)})_H e_j^{(0)}$ 无条件收敛. □

为证明定理6.13, 我们需要下述引理.

引理 6.9

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{C}(X)$, 若

$$\sigma_p(A) \setminus \{0\} \neq \emptyset,$$

²³ 参看 [17] pg.71 (1.6.18)

则对 $\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ 均有 $\dim N(\lambda I - A) < \infty$.



证明 既然 $\lambda \neq 0$, 故 $\lambda^{-1}A \in \mathfrak{C}(X)$, 于是根据二择一定理 6.9 即知 $N(I - \lambda^{-1}A) = N(\lambda I - A)$ 是有限维空间. $\square$

下面证明定理 6.13.

证明 任取 $\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 根据引理 6.9 知

$$m(\lambda) := \dim N(\lambda I - A) < \infty,$$

回忆非退化内积空间必存在完备正交集²⁴, 而 $N(\lambda I - A)$ 显然非退化, 且作为内积空间的闭线性子空间依旧是内积空间, 故 $N(\lambda I - A)$ 中存在完备正交集, 再由 $N(\lambda I - A)$ 有限维知该正交集必定是有限集, 于是可设 $N(\lambda I - A)$ 存在规范正交基 $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$. 因为 A 是紧算子, 根据谱性质 6.10 可知 $\sigma_p(A) \setminus \{0\}$ 至多由以 0 为聚点的一列复数构成, 又因为 A 对称, 所以该复数列实际上是实数列, 记之为 $\{\lambda_i\}_i$. 现在对每个 $\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ 重复前述取基操作, 得到向量集

$$\bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}.$$

由 $\sigma_p(A) \setminus \{0\}$ 至多可数知上述集合至多可数, 因此可以把它记作 $\{\tilde{e}_i\}_i$. 根据基本性质 6.9(iv), 不同的 λ 诱导出的 $e_i^{(\lambda)}$ 彼此正交, 故 $\{\tilde{e}_i\}_i$ 是规范正交集. 另若 $0 \in \sigma_p(A)$, 则 $N(A)$ 是 H 的非退化闭子空间, 从而 $N(A)$ 存在规范正交基 $\{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha$. 注意这样得到的 $\{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha$ 未必可数. 现在令

$$\{e_\beta\}_\beta := \begin{cases} \{\tilde{e}_i\}_i, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{\tilde{e}_i\}_i \cup \{e_\alpha^{(0)}\}_\alpha, & 0 \in \sigma_p(A), \end{cases}$$

记 $M = \text{span}\{e_i\}$ (即 $\{e_i\}_i$ 中任意有限个元素的线性组合构成的集合), 下面验证在 M 上成立 (6.57), (6.58) 式. 事实上, 任取 $x \in M$, 根据 M 的构造知存在 $e_1^x, \dots, e_m^x \in \{e_i\}_i$ 使得

$$x = \sum_{i=1}^m (x|e_i^x)_H e_i^x.$$

从 e_i^x 的构造知每个 e_i^x 都能对应某个特征值, 设 e_i^x 对应的特征值为 λ_i^x , 则

$$Ax = \sum_{i=1}^m (x|e_i^x)_H A e_i^x = \sum_{i=1}^m \lambda_i^x (x|e_i^x)_H e_i^x.$$

根据 e_i 的取法, 若 $e_i \notin \{e_1^x, \dots, e_m^x\}$, 就必有 $(x|e_i)_H = 0$, 因此 (6.57), (6.58) 两式在 M 上成立.

下面再说明 $M = H$, 为此考虑说明 $\overline{M}^\perp = \{0_H\}$. 用反证法, 若 $\overline{M}^\perp \neq \{0_H\}$, 则 $\overline{M}^\perp$ 是 H 的闭子空间. 这里先解释一下接下来是用什么思路找到的矛盾. 回到 M 的构造, 可见 M 在某种意义上囊括了 A 的所有特征向量, 因此 $\overline{M}^\perp \neq \{0_H\}$ 可能导致的一个矛盾点是 $\overline{M}^\perp$ 包含了某本征元, 而 A 作为非零对称紧算子是在非平凡闭不变子空间上自动产生非零特征值与非零本征元的, 因此只需要说明 $\overline{M}^\perp$ 是不变子空间 (闭性已经成立了) 即可.

下面开始严格证明, 往证

$$A(\overline{M}^\perp) \subset \overline{M}^\perp.$$

为说明上式, 首先说明 $A(\overline{M}) \subset \overline{M}$. 任取 $x \in \overline{M}$, 知存在 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ 满足 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 由 $A \in L(H)$ 知

$$Ax = A \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n.$$

又因为对任意 $n \in \mathbb{N}$ 而言, x_n 都是 A 的特征向量的有限线性组合, 于是 Ax_n 依旧是相同特征向量的有限线性组合, 从而 $Ax_n \in M$, 故 $Ax \in \overline{M}$, 此即 $A(\overline{M}) \subset \overline{M}$. 现取 $\xi \in \overline{M}^\perp, \eta \in \overline{M}$, 由 A 对称与 $A\eta \in \overline{M}$ 知

$$(A\xi|\eta)_H = (\xi|A\eta)_H = 0,$$

因此 $A\xi \in \overline{M}^\perp$, 故 $\overline{M}^\perp$ 是 A 的闭不变子空间, 至此断言得证.

现在令 $\tilde{A} := A|_{\overline{M}^\perp}$, 下面说明 $\tilde{A}$ 无特征值. 这是因为若存在 λ 与 $0_H \neq \xi \in \overline{M}^\perp$ 使得 $\tilde{A}\xi = \lambda\xi$, 则 $A\xi = \lambda\xi$ 且

²⁴注意根据正交集完备性定理, 内积空间的规范正交集成为基当且仅当其完备, 因此在这里就可以说 $N(\lambda I - A)$ 上存在的是基了.

$\lambda \in \mathbb{R}$, 于是 ξ 作为 A 的特征向量理应在 $\overline{M}$ 中²⁵, 矛盾! 因此 $\tilde{A}$ 无特征值. 又因为 $A \in \mathfrak{C}(H)$, 根据紧算子的基本性质 6.4(iv) 知 $\tilde{A}$ 是 $\overline{M}^\perp$ 上的紧算子, 再由 A 的对称性与对称算子的基本性质 6.9(iii) 知 $\tilde{A}$ 是 $\overline{M}^\perp$ 上的对称算子, 因此定理 6.12 表明存在 $x_0 \in \overline{M}^\perp$ 满足 $\|x_0\|_H = 1$, 且

$$\tilde{A}x_0 = (\tilde{A}x_0|x_0)_H x_0.$$

这说明 $(\tilde{A}x_0|x_0)_H$ 是 $\tilde{A}$ 的特征值, 矛盾! 故只能有 $\overline{M}^\perp = \{0_H\}$, 于是 $M^\perp = \overline{M}^\perp = \{0_H\}$. 又因为

$$(\text{span}\{e_i\})^\perp = M^\perp = \{0_H\},$$

故 $\{e_i\}_i$ 是 H 中的完备集, 因此 $\{e_i\}_i$ 是 H 的一组规范正交基, 于是 (6.57) 式在 H 上成立. 又因为 A 连续, 故 (6.58) 也在 H 上成立. $\square$

注 6.37 回忆秩 1 算子引入的定义, 如果把 A 的非零特征值重排 (相同数依重数记) 为

$$|\lambda_1| \geq \cdots \geq |\lambda_m| \geq \cdots,$$

则可将 A 记为

$$A = \sum_{j \geq 1} \lambda_j e_j \otimes e_j,$$

其中对 $\forall j, \forall x \in H$ 有

$$(e_j \otimes e_j)(x) = (x|e_j)_H e_j.$$

下面说明上述等式是在 $L(H)$ 的强拓扑下成立的. 为此只需考虑计重数时 A 有无穷个非零特征值的情况即可, 往证

$$\left\| A - \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j \otimes e_j \right\|_{H \rightarrow H} \leq |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0. \quad (6.61)$$

事实上, 任取 $x \in H$ 满足 $\|x\|_H = 1$, 由 (6.57) 与引理 6.9 知

$$\|x\|_H = \left[\sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 + \sum_j |(x, e_j^{(0)})|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \geq \left[\sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

于是

$$\begin{aligned} \left\| \left(A - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \otimes e_i \right)(x) \right\|_H &= \left\| Ax - \sum_{i=1}^n \lambda_i (x|e_i)_H e_i \right\|_H \\ &= \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i (x|e_i)_H e_i \right\|_H \\ &= \left[\sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x|e_i)_H|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \left[\sum_{i=n+1}^{\infty} |(x|e_i)_H|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \|x\|_H, \end{aligned}$$

这便得到了 (6.61) 式. 该结果表明 Hilbert 空间上的对称紧算子能被其非零特征值及其特征向量显式表出. $\square$

注 6.38 本注说明 A 的特征值具有极值性质. 若 A 的非零特征值满足 (相同数依重数记)

$$|\lambda_1| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq \cdots,$$

往证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$|\lambda_n| = \sup\{ |(Ax|x)_H| : x \perp \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}, \|x\|_H = 1 \}, \quad (6.62)$$

其中 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 是分别对应 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ 的本征元.

²⁵ 这里必须是 $\xi \in \overline{M}$ 而非 $\xi \in M$, 这是因为当 $\lambda = 0$ 为 A 的特征值时, $\dim N(A)$ 是可能到达 ∞ 的, 此时 ξ 是 $\{e_i^{(0)}\}_i$ 中可数个 (而非有限个) 元素的线性组合, 从而不再有 $\xi \in M$.

事实上, 记(6.62)右式为 μ_n , 取 $x = e_n$, 则

$$x \perp \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\},$$

且 $\|x\|_H = 1$, 于是

$$|\lambda_n| = |(Ae_n|e_n)_H| \leq \mu_n.$$

反之, 任取 $x \perp \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ 满足 $\|x\|_H = 1$, 由 Parseval 等式与定理6.13知

$$\|x\|_H = \left[\sum_{i \geq 1} |(x|e_i)_H|^2 + \sum_j |(x|e_j^{(0)})_H|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \geq \left[\sum_{i \geq 1} |(x|e_i)_H|^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

且

$$|(Ax|x)_H| = \left| \left(\sum_{i \geq 1} \lambda_i (x|e_i)_H e_i \middle| x \right)_H \right| = \left| \sum_{i \geq n} \lambda_i (x|e_i)_H (e_i|x)_H \right| \leq |\lambda_n| \|x\|_H^2 = |\lambda_n|,$$

于是 $\mu_n \leq |\lambda_n|$, 因此 $|\lambda_n| = \mu_n$, 此即(6.62). □

如果 A 的特征值能进一步排成

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \dots > 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \dots < 0,$$

其中除 0 以外允许依重数重复, 则有下列极大极小刻画:

定理 6.14 (对称紧算子特征值的极大极小 (min-max) 刻画)

设 A 是对称紧算子, 其非零特征值为 $\{\lambda_i^+\}_{i \geq 1} \cup \{\lambda_i^-\}_{i \geq 1}$, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq 0_H}} \frac{(Ax|x)_H}{(x|x)_H}, \quad (6.63)$$

且

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq 0_H}} \frac{(Ax|x)_H}{(x|x)_H}, \quad (6.64)$$

其中 E_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间. ♡

证明 我们只给出(6.63)式的证明, 在(6.63)式中用 $-A$ 代替 A 即得(6.64)式. 现设 e_i^+, e_i^- 分别为 λ_i^+, λ_i^- 对应的单位特征向量, 则由 Hilbert-Schmidt 定理6.13知

$$\{e_i^+\}_{i \geq 1} \cup \{e_i^-\}_{i \geq 1} \cup \{e_j^{(0)}\}_j$$

构成 H 的一组规范正交基, 其中 $\{e_j^{(0)}\}_j$ 的设置与 Hilbert-Schmidt 定理相同. 若 $x \in H$, 则根据 Hilbert-Schmidt 定理6.13知存在 $\{a_i^+\}, \{a_i^-\}, \{a_j\}$ 满足

$$x = \sum_{i \geq 1} (a_i^+ e_i^+ + a_i^- e_i^-) + \sum_j a_j e_j^{(0)},$$

于是

$$\frac{(Ax|x)_H}{(x|x)_H} = \frac{\sum_{i \geq 1} \lambda_i^+ |a_i^+|^2 + \sum_{i \geq 1} \lambda_i^- |a_i^-|^2}{\sum_{i \geq 1} |a_i^+|^2 + \sum_{i \geq 1} |a_i^-|^2 + \sum_j |a_j|^2}. \quad (6.65)$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 记(6.63)右式为 μ_n , 下面说明 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$. 任取 E_{n-1} 为 H 的 $n-1$ 维闭线性子空间, 则 E_{n-1} 有基 $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_{n-1}\}$, 而 $\{e_1^+, \dots, e_n^+\}$ 是 n 个线性无关的向量, 故设 $\mathbf{M} := ((e_i^+|\tilde{e}_j)_H)_{i,j} (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n-1)$, 知 $\mathbf{M}$ 作为秩至多为 $n-1$ 的矩阵必能使得方程 $\mathbf{M}^t \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 有非零解 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, 令 $x_n := \sum_{i=1}^n y_i e_i^+$ 即知 $x_n \perp E_{n-1}$. 将 x_n 代入(6.65)得

$$\sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq 0_H}} \frac{(Ax|x)_H}{(x|x)_H} \geq \frac{(Ax_n|x_n)_H}{(x_n|x_n)_H} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^+ |y_i|^2}{\sum_{i=1}^n |y_i|^2} \geq \lambda_n^+.$$

上左式是只关于 E_{n-1} 的, 因此上式两端对 E_{n-1} 取下确界即得 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$.

下面说明 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$. 为此令

$$E_{n-1} := \text{span}\{e_1^+, \dots, e_{n-1}^+\},$$

则对任意 $x \in H$, 若 $x \in E_{n-1}^\perp$ 且 $x \neq 0_H$, 则由 Hilbert-Schmidt 定理可知可设

$$x = \sum_{i \geq n} a_i^+ e_i^+ + \sum_{i \geq 1} a_i^- e_i^- + \sum_j a_j e_j^{(0)},$$

于是由 (6.65) 与 $\lambda_i^- < 0$ 进一步知

$$\frac{(Ax|x)_H}{(x|x)_H} = \frac{\sum_{i \geq n} \lambda_i^+ |a_i^+|^2 + \sum_{i \geq 1} \lambda_i^- |a_i^-|^2}{\sum_{i \geq n} |a_i^+|^2 + \sum_{i \geq 1} |a_i^-|^2 + \sum_j |a_j|^2} \leq \frac{\sum_{i \geq n} \lambda_i^+ |a_i^+|^2}{\sum_{i \geq n} |a_i^+|^2} \leq \lambda_n^+ \frac{\sum_{i \geq n} |a_i^+|^2}{\sum_{i \geq n} |a_i^+|^2} = \lambda_n^+.$$

在上式两端对 x 在 $E_{n-1}^\perp$ 上取上确界, 再对得式两端关于全体 E_{n-1} 取下确界即得 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$, 因此 $\lambda_n^+ = \mu_n$, 此即 (6.63) 式. $\square$

推论 6.3

若 Hilbert 空间 H 上的两个对称紧算子 A, B 满足 $A \leq B$ (即对 $\forall x \in H$ 均有 $(Ax, x) \leq (Bx, x)$), 则对 $\forall j \in \mathbb{N}$ 有

$$0 < \lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B), \lambda_j^-(A) \leq \lambda_j^-(B) < 0.$$



[19]1.5 习题

练习 6.41

设 H 为复 Hilbert 空间, A 为 X 上的有界线性算子. 证明 $A + A^*, AA^*, A^*A$ 均为对称算子, 且

$$\|AA^*\|_{H \rightarrow H} = \|A^*A\|_{H \rightarrow H} = \|A\|_{H \rightarrow H}^2.$$



证明 由定义知

$$((A + A^*)x|y)_H = (Ax|y)_H + (A^*x|y)_H = (x|A^*y)_H + (x|Ay)_H = (x|(A + A^*)y)_H,$$

$$(AA^*x|y)_H = (A^*x|A^*y)_H = (x|AA^*y)_H,$$

$$(A^*Ax|y)_H = (Ax|Ay)_H = (x|A^*Ay)_H,$$

故 $A + A^*, AA^*, A^*A$ 均对称. 下面首先说明 $A^* \in L(H)$, 为此由定义知

$$|(A^*x|y)_H| = |(x|Ay)_H| \leq \|x\|_H \|Ay\|_H \leq \|A\|_{H \rightarrow H} \|x\|_H \|y\|_H.$$

由 Riesz 表示定理与 Hahn-Banach 定理可知可取 $y \in H$ 使得 $\|y\|_H = 1$, 且 $|(A^*x|y)_H| = \|A^*x\|_H$, 进而

$$\|A^*x\|_H \leq \|A\|_{H \rightarrow H} \|x\|_H,$$

故 $A^* \in L(H)$, 且 $\|A^*\|_{H \rightarrow H} \leq \|A\|_{H \rightarrow H}$. 因为显见 $A = (A^*)^*$, 故重复上述过程可知

$$\|A\|_{H \rightarrow H} = \|(A^*)^*\|_{H \rightarrow H} \leq \|A^*\|_{H \rightarrow H},$$

因此对任意 $A \in L(H)$ 均有 $\|A^*\|_{H \rightarrow H} = \|A\|_{H \rightarrow H}$. 现在 AA^*, A^*A 均为有界线性的对称算子, 故

$$\|A^*A\|_{H \rightarrow H} = \sup_{\|x\|_H=1} |(A^*Ax|x)_H| = \sup_{\|x\|_H=1} |(Ax|Ax)_H| = \sup_{\|x\|_H=1} \|Ax\|_H^2 = \left(\sup_{\|x\|_H=1} \|Ax\|_H \right)^2 = \|A\|_{H \rightarrow H}^2.$$

同理可得 $\|AA^*\|_{H \rightarrow H} = \|A^*\|_{H \rightarrow H}^2 = \|A\|_{H \rightarrow H}^2$. $\square$

练习 6.42

设 H 为复 Hilbert 空间, A 作为 H 上的有界线性算子满足

$$(Ax|x)_H \geq 0, \forall x \in H.$$

证明

$$\|Ax\|_H^2 \leq \|A\|_{H \rightarrow H} (Ax|x)_H, \forall x \in H.$$



证明 $\|A\|_{H \rightarrow H} = 0$ 或 $x = 0_H$ 时结论显然成立, 故下设 $\|A\|_{H \rightarrow H} > 0$ 且 $\|x\|_H > 0$. 因为 $(Ax|x)_H \geq 0$ 蕴含了 $(Ax|x) \in \mathbb{R} (\forall x \in H)$, 故 A 对称. 在条件中代入 $x + \lambda y (x, y \in H, \lambda \in \mathbb{R})$ 可得

$$(A(x + \lambda y)|x + \lambda y)_H = (Ax|x)_H + \lambda(Ay|x)_H + \lambda(Ax|y)_H + \lambda^2(Ay|y)_H \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{R},$$

令 $y = Ax$ 得

$$\lambda^2(A^2x|Ax)_H + \lambda((A^2x|x)_H + (Ax|Ax)_H) + (Ax|x)_H \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{R},$$

由 A 对称得

$$\lambda^2(A^2x|Ax)_H + 2\lambda(Ax|Ax)_H + (Ax|x)_H \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

于是要么 $(A^2x|Ax)_H = (Ax|Ax)_H = 0$, 要么上式作为二次函数的判别式非正. 前者成立时有

$$0 = \|Ax\|_H^2 \leq \|A\|_{H \rightarrow H} (Ax|x)_H.$$

后者成立时有

$$(Ax|Ax)_H^2 \leq (A^2x|Ax)_H (Ax|x)_H.$$

由 A 对称知

$$(A^2x|Ax)_H = (A(Ax)|Ax)_H \leq \|Ax\|_H^2 \sup_{\|y\|_H=1} (Ay|y)_H \leq \|A\|_{H \rightarrow H} \|Ax\|_H^2,$$

故

$$(Ax|Ax)_H^2 \leq \|Ax\|_H^2 \|A\|_{H \rightarrow H} (Ax|x)_H.$$

此即

$$\|Ax\|_H^2 \leq \|A\|_{H \rightarrow H} (Ax|x)_H.$$

□

练习 6.43

设 H 为复 Hilbert 空间, A 为 H 上的对称紧算子, 令

$$m(A) := \inf_{\|x\|_H=1} (Ax|x)_H, \quad M(A) := \sup_{\|x\|_H=1} (Ax|x)_H,$$

证明:

- (i) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;
- (ii) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.



证明 (i) 因为 $A = 0_{H \rightarrow H} \Rightarrow m(A) = 0$, 故下设 $A \neq 0_{H \rightarrow H}$, 进而 A 必有非零特征值 (这件事在下一题也会进行说明), 下分 A 有无负特征值两种情形进行讨论.

若 A 有负特征值, 设 $\sigma_p(A) \setminus [0, \infty) = \{\lambda_j^-\}$, 由 $r_\sigma(A) \leq \|A\|_{H \rightarrow H}$ 与 A 紧知 $\{\lambda_j^-\}$ 是有界的非空至多可数集, 进而不失一般性可设

$$\lambda_1^- < \lambda_2^- \leq \lambda_3^- \leq \cdots < 0.$$

下面说明 $m(A) = \lambda_1^-$. 由 λ_1^- 的极大极小刻画知

$$\lambda_1^- = \sup_{E_0} \inf_{\substack{x \in E_0^\perp \\ \|x\|_H=1}} \frac{(Ax|x)_H}{(x|x)_H} = \inf_{0_H \neq x \in H} \left(A \left(\frac{x}{\|x\|_H} \right) \middle| \frac{x}{\|x\|_H} \right)_H = m(A),$$

因此 $m(A) \in \sigma_p(A)$.

若 A 无负特征值, 由 A 对称紧与 Hilbert-Schmidt 定理知存在 A 的至多可数正特征值列 $\{\lambda_i\} \subset \mathbb{R} \setminus (-\infty, 0]$ 及

其对应规范正交集 $\{e_i\}_i$ 使得

$$Ax = \sum_i \lambda_i (x|e_i)_H e_i.$$

上式两端同时关于 x 作内积, 由 $\lambda_i > 0 (\forall i)$ 与 $|(x|e_i)_H|^2 \geq 0$ 知

$$(Ax|x)_H = \sum_i \lambda_i |(x|e_i)_H|^2 \geq 0 \Rightarrow m(A) \geq 0.$$

又因为 $m(A) \neq 0$, 故 $m(A) > 0$. 现在在上左式中代入 $x = e_i$ 得

$$(Ae_i|e_i)_H = \lambda_i \geq m(A) > 0, \forall i.$$

于是 $\{\lambda_i\}$ 至少不以 0 为聚点, 因此 $\{\lambda_i\}$ 作为有界集只能是有有限集, 不妨设

$$\lambda_n < \lambda_{n-1} \leq \cdots \leq \lambda_1,$$

同时, 因为 $m(A) > 0$, 而只要 $0_H \neq x_0 \in N(A)$, 就有

$$\left(A \left(\frac{x_0}{\|x_0\|_H} \right) \middle| \frac{x_0}{\|x_0\|_H} \right)_H = (0_H \|x_0\|_H^{-1} x_0)_H = 0 < m(A),$$

矛盾! 故只能有 $N(A) = \{0_H\}$, 于是 Hilbert-Schmidt 定理表明 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 是 H 的规范正交基. 现设 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, 则

$$(Ax|x)_H = \sum_{i=1}^n \lambda_i |x_i|^2.$$

易证 $x = \pm e_i (1 \leq i \leq n)$ 为 $(Ax|x)_H$ 在球面 $\{\|x\|_H = 1\}$ 上的全体驻点, 进一步验证即知

$$\inf_{\|x\|_H=1} (Ax|x)_H = (Ae_n|e_n)_H = \lambda_n = m(A),$$

故依旧有 $m(A) \in \sigma_p(A)$.

(ii) 与前述过程同理知不妨设 $A \neq 0_{H \rightarrow H}$, 进而 A 必有非零特征值. 因为

$$(\lambda I - A)x_0 = 0_H \Leftrightarrow (-\lambda I + A)x_0 = 0_H,$$

故对 H 上的对称紧算子 A' 而言, $m(A') \in \sigma_p(A')$ 当且仅当 $-m(A') = \sup_{\|x\|_H=1} (-A'x|x)_H \in \sigma_p(-A')$, 后者等价于 $M(-A') \in \sigma_p(-A')$, 取 $A' = -A$ 即可. $\square$

注 6.39 想用极大极小刻画来按 $m(A)$ 的构造相较于应试来说还是有点难记, 这题也可以纯粹用点谱定义写. 首先注意

$$\inf_{\|x\|_H=1} (Ax|x) = - \sup_{\|x\|_H=1} (-Ax|x),$$

因此 $m(A) \in \sigma_p(A) \Leftrightarrow m(-A) \in \sigma_p(-A) \Leftrightarrow -M(A) \in \sigma_p(A) \Leftrightarrow M(A) \in \sigma_p(A)$. 所以只需要关注 (i) 就行.

从 $m(A)$ 定义出发, 知存在 $\{x_n\} \subset H \cap \partial B(0_H, 1)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (Ax_n|x_n) = m(A),$$

既然自反空间有界集必弱自列紧 (也就是 Eberlain-Smulian 定理), 故不妨设存在 $x_0 \in H$ 使得 $x_n \rightharpoonup x_0$. 因为 A 作为紧算子在 Hilbert 空间上必全连续, 故 $Ax_n \rightarrow Ax_0$, 故

$$\begin{aligned} |(Ax_n|x_n) - (Ax_0|x_0)| &\leq |(Ax_n - Ax_0|x_n)| + |(Ax_0|x_n - x_0)| \\ &\leq \|Ax_n - Ax_0\|_H + |(Ax_0|x_n - x_0)|, \end{aligned}$$

由 $Ax_n \rightarrow Ax_0, x_n \rightharpoonup x_0$ 即知上右式趋零, 于是

$$(Ax_0|x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} (Ax_n|x_n) = m(A).$$

下面说明 $Ax_0 = m(A)x_0$, 为此根据 $m(A)$ 的构造知对任意 $x \in H$ 均有

$$(Ax - m(A)x|x) \geq 0,$$

于是利用前面习题结论可知

$$\begin{aligned}\|Ax - m(A)x\|_H^2 &\leq \|A - m(A)I\|_{H \rightarrow H}(Ax - m(A)x|x) \\ &= \|A - m(A)I\|_{H \rightarrow H}((Ax|x) - m(A)\|x\|_H^2).\end{aligned}$$

在上式中代入 $x = x_n$ 并令 $n \rightarrow \infty$ 可知 $\{Ax_n - m(A)x_n\}$ 是 Cauchy 列, 于是存在 $y \in H$ 使得

$$Ax_n - m(A)x_n \rightarrow y,$$

进一步可以说明 $y = 0_H$. 另一方面 $Ax_n \rightarrow Ax_0$, 故只能有 $m(A)x_n \rightarrow Ax_0$, 又因为 $x_n \rightarrow x_0$, 且易证 $x_0 \neq 0_H$, 故只能有 $m(A)x_0 = Ax_0$, 因此 $m(A) \in \sigma(A)$. $\square$

练习 6.44

设 H 为复 Hilbert 空间, A 为 H 上的对称紧算子, 证明:

- (i) 若 A 非零, 则 A 至少有一个非零本征值.
- (ii) 若 M 是 A 的非零闭不变子空间, 则 M 上必含有 A 的本征元.

证明 (i) 由 $A \neq 0_{H \rightarrow H}$ 知 $\|A\|_{H \rightarrow H} \neq 0$, 进一步由 A 对称紧知存在 $x_0 \in \partial B(0_H, 1)$ 使得

$$|(Ax_0|x_0)_H| = \|A\|_{H \rightarrow H} \neq 0,$$

且

$$Ax_0 = (Ax_0|x_0)_H x_0,$$

这说明 $(Ax_0|x_0)_H$ 就是 A 的一个非零特征值, 进一步 A 在 H 上必有本征元.

(ii) 由 A 对称紧与 M 是非零闭不变子空间知 $A|_M$ 是 M 上的对称紧算子. 若 $A|_M = 0_{H \rightarrow H}$, 则任取 $0_H \neq x_0 \in M$ 即知 $Ax_0 = A|_M x_0 = 0_H$, 这说明 $x_0 \in M$ 是 0 对应的本征元. 若 $A|_M \neq 0_{H \rightarrow H}$, 则将 M 视作新的复 Hilbert 空间, 对 M 上的对称紧算子 $A|_M$ 用已证结论 (i) 知 M 上必存在 $A|_M$ 对应于非零特征值 λ 的本征元 x_0 . 因为

$$(\lambda I - A|_M)x_0 = (\lambda I - A)x_0 = 0_H,$$

故 λ 同样是 A 的非零特征值, 对应 $x_0 \in M$ 同样是 A 的本征元. $\square$

练习 6.45

设 H 为复 Hilbert 空间, $P \in L(H)$, 证明

$$P \text{ 为 } H \text{ 的正交投影算子} \Leftrightarrow (Px|x)_H = \|Px\|_H^2 (\forall x \in H).$$

证明 $\Rightarrow$: 设 P 是到闭子空间 $M \subset H$ 上的正交投影, 任取 $x \in H$, 由正交分解定理知 x 存在唯一分解:

$$x = x_M + x_M^\perp, \quad x_M \in M, \quad x_M^\perp \in M^\perp,$$

于是

$$(Px|x)_H = (x_M|x_M + x_M^\perp)_H = (x_M|x_M)_H = \|x_M\|_H^2 = \|Px\|_H^2.$$

$\Leftarrow$: $P = 0_{H \rightarrow H}$ 时命题无所可证, 下设 $P \neq 0_{H \rightarrow H}$, 往证 P 是到 $N(P)^\perp$ 上的正交投影. 因为对任意 $x \in H$ 均有 $(Px|x)_H = \|Px\|_H^2 \in \mathbb{R}$, 故 P 对称. 由 $P \in L(H)$ 知 $N(P)$ 是 H 的闭子空间, 从而 $N(P)^\perp$ 也是 H 的闭子空间. 下面说明 $(N(P)^\perp)^\perp = N(P)$. 易证 $N(P) \subset (N(P)^\perp)^\perp$, 下证 $(N(P)^\perp)^\perp \subset N(P)$, 为此任取 $x \in (N(P)^\perp)^\perp$, 任取 $y \in H$, 对 y 关于 $N(P)$ 作正交分解 $y = y_{N(P)} + y_{N(P)^\perp}$ ($y_{N(P)} \in N(P)$, $y_{N(P)^\perp} \in N(P)^\perp$), 知

$$(Px|y)_H = (x|Py)_H = (x|Py_{N(P)^\perp})_H.$$

另任取 $z \in N(P)$, 知只要 $y \in N(P)^\perp$, 就有

$$(Py|z)_H = (y|Pz)_H = 0, \quad \forall y \in N(P)^\perp,$$

故 $Py_{N(P)^\perp} \in N(P)^\perp$, 因此 $(x|Py_{N(P)^\perp})_H = 0$, 由 y 的任意性即知只能有 $Px = 0_H$, 因此 $x \in N(P)$, 至此即得

$$(N(P)^\perp)^\perp = N(P).$$

下面说明 P 是到 $N(P)^\perp$ 上的正交投影. 对任取的 $x \in H$ 关于 $N(P)^\perp$ 作唯一正交分解 (这里用到了 $N(P) = (N(P)^\perp)^\perp$):

$$x = x_{N(P)} + x_{N(P)^\perp},$$

式子两端同时作用 P 可得 $Px = Px_{N(P)} + Px_{N(P)^\perp}$, 另容易验证 $Px_{N(P)} \in N(P)^\perp$, 下证 $Px_{N(P)^\perp} = x_{N(P)^\perp}$. 由条件知

$$(Px|x - Px)_H = 0 \Rightarrow Px = Px_{N(P)^\perp} \perp (x - Px_{N(P)^\perp}).$$

进一步因为

$$P(x - Px_{N(P)^\perp}) = Px_{N(P)} - Px_{N(P)^\perp} = 0_H,$$

故 $x - Px_{N(P)^\perp} \in N(P)$, 这说明 $Px_{N(P)^\perp} + (x - Px_{N(P)^\perp})$ 也是 x 关于 $N(P)^\perp$ 的正交分解, 因此由唯一性与 $Px_{N(P)^\perp} \in N(P)^\perp$ 知只能有 $Px_{N(P)^\perp} = x_{N(P)^\perp}$. 因此只要 P' 是到 $N(P)^\perp$ 上的正交投影, 对任意 $x \in H$ 就有

$$P'x = x_{N(P)^\perp} = Px_{N(P)^\perp} = Px,$$

故 $P = P'$, 此即待证结论. $\square$

注 6.40 上述过程我自己想了很久, 这个过程显然不利于备考. 主流的做法是用 P 的对称幂零性证这里的等价, 后面碰到的时候我再统一整理.

练习 6.46

在 $L^2[0, 1]$ 中考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall x \in L^2[0, 1].$$

(i) 证明 T 是 $L^2[0, 1]$ 上的紧算子.

(ii) 求 $\|T\|_{L(L^2[0, 1])}$.



证明 (i) 显见嵌入 $\iota : C[0, 1] \hookrightarrow L^2[0, 1]$ 连续, 而习题 6.30 表明 $T_2 : L^2[0, 1] \rightarrow C[0, 1], f(t) \mapsto Tf(t)$ 是紧算子, 故 $T = \iota \circ T_2$ 是紧算子.

(ii) 首先计算 T^* , 知任取 $x, y \in L^2[0, 1]$ 有:

$$\begin{aligned} (Tx|y)_{L^2[0, 1]} &= \int_0^1 \left(\int_0^t x(s) ds \right) y(t) dt = \int_0^1 \left(\int_0^t x(s) ds \right) d \left(\int_0^t y(s) ds \right) \\ &= \left(\int_0^t x(s) ds \int_0^t y(s) ds \right) \Big|_{t=0}^1 - \int_0^1 \left(\int_0^t y(s) ds \right) x(t) dt \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 y(s) ds \right) x(t) dt - \int_0^1 \left(\int_0^t y(s) ds \right) x(t) dt \\ &= \int_0^1 \left(\int_t^1 y(s) ds \right) x(t) dt, \end{aligned}$$

故

$$T^* : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1], \quad x(t) \mapsto \int_t^1 x(s) ds.$$

接下来计算 $\sigma_p(T^*T) \setminus \{0\}$. 设 $\lambda \in \sigma_p(T^*T) \setminus \{0\}$, 则下述方程在 $L^2[0, 1]$ 中存在非平凡解:

$$\lambda x = T^*Tx = \int_t^1 \int_0^s x(\tau) d\tau ds.$$

对上述方程两端关于 t 二阶微分并整理边值条件得²⁶

$$\begin{cases} \lambda x'' = -x, \\ x'(0) = 0, \\ x(1) = 0. \end{cases}$$

求解上述方程得

$$x(t) = C \cos\left(\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)t\right) \text{ 且 } C \neq 0 \Rightarrow \lambda\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 = 1.$$

因为 x 本身非平凡, 故必有 $C \neq 0$, 从而 $\lambda = (k\pi + \pi/2)^{-2}$, 这说明 $\sigma_p(T^*T) \setminus \{0\} = \{(k\pi + \pi/2)^{-2}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 因为 T^*T 对称紧, 故

$$\|T^*T\|_{H \rightarrow H} = \max \sigma_p(T^*T) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2,$$

进一步由习题 6.41 知

$$\|T\|_{H \rightarrow H} = \|T^*T\|_{H \rightarrow H}^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\pi}.$$

□

注 6.41 记得 $T: L^2[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 紧这个结果的证法 (当然也就是用用 Arzela-Ascoli) 的话当然可以这么写 (i), 不过这里也可以顺证. 既然 $L^2[0, 1]$ 是 Hilbert 空间, 故只需证明 T 全连续. 设 $\{x_n\} \subset L^2[0, 1], x \in L^2[0, 1]$ 满足 $x_n \rightharpoonup x$, 由弱收敛列必有界 (即 Banach-Steinhaus 定理) 知存在 $M \in (0, \infty)$ 使得 $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|_{L^2[0, 1]} \leq M$. 又因为显见对任意 $t \in [0, 1]$ 均有 $\mathbf{1}_{[0, t]} \in L^2[0, 1]$, 故由弱收敛的定义, 把 $Tx_n(t)$ 看成用 $\mathbf{1}_{[0, t]}$ 测 x_n 可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s) \mathbf{1}_{[0, t]}(s) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n | \mathbf{1}_{[0, t]}) = (x | \mathbf{1}_{[0, t]}) = \int_0^t x(s) ds = Tx(t).$$

这说明 $Tx_n \rightarrow Tx$ 点态成立. 要证 $Tx_n \rightarrow Tx (L^2[0, 1])$, 根据 Lebesgue 控制收敛定理只需证 $Tx_n - Tx$ 能被平方可积函数关于 n 一致控制. 事实上对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} |Tx_n(t) - Tx(t)| &= \left| \int_0^t (x_n(s) - x(s)) ds \right| \\ &\leq \int_0^1 (|x_n(s)| + |x(s)|) ds \\ &\leq \|x_n\|_{L^2[0, 1]} + \|x\|_{L^2[0, 1]} \\ &\leq (M + \|x\|_{L^2[0, 1]}) \mathbf{1}_{[0, 1]}(t) \in L^2([0, 1]). \end{aligned}$$

因此 Lebesgue 控制收敛定理表明 $Tx_n \rightarrow Tx (L^2[0, 1])$, 故 T 全连续, 因此 T 紧.

练习 6.47

设 H 是 Hilbert 空间, 求证 $P \in L(H)$ 是正交投影算子当且仅当:

- (i) P 对称, 即 $P = P^*$;
- (ii) P 幂等, 即 $P^2 = P$.



证明 $\Rightarrow$: 例 6.12 已证对称性. 针对幂等性, 设 P 是到闭子空间 $M \subset H$ 上的正交投影, 任取 $H \ni x = x_M + x_M^\perp (x_M \in M, x_M^\perp \in M^\perp)$, 知

$$P^2x = P(Px) = Px_M = x_M = Px,$$

故 $P^2 = P$.

$\Leftarrow$: 当 $P = 0_{H \rightarrow H}$ 时命题无所可证, 下设 $P \neq 0_{H \rightarrow H}$. 根据习题 6.45, 只需证明 $(Px|x)_H = \|Px\|_H^2$. 事实上有

$$(Px|x)_H = (P^2x|x)_H = (Px|Px)_H = \|Px\|_H^2,$$

²⁶如果两端直接取 Fourier 系数, 得到的是 $\lambda(2\pi k)^2 \hat{x}(k) = \hat{x}(k)$, 这和答案对不上. 实际上这是因为这个边值问题根本就不能用 Fourier 级数求解. Fourier 级数能发挥作用的是 Dirichlet 边值 (如 $x(1) = x(0) = 0$), 但这里并不是 Dirichlet 边值, 实际上这个边值条件也不周期, 因此 x 并不能视作 $L^2(\mathbb{S}^1)$ 上的函数, 从而它并不能用 Fourier 级数展开.

由习题6.45即得结论. □

注 6.42 本注介绍习题6.47 $\Rightarrow$ 习题6.45的做法. 我们首先独立证明习题6.47.

针对 $\Rightarrow$, 若 P 是到 M 上的正交投影, 默认对任意 $x \in H$ 而言 $x = x_M + x_M^\perp$ 是正交分解, 则

$$(Px|y) = (x_M|y_M + y_M^\perp) = (x_M|y_M) = (x_M + x_M^\perp|y_M) = (x|Py).$$

另知

$$P^2x = Px_M = x_M = Px,$$

故 P 对称且幂零.

针对 $\Leftarrow$, 先证 $M := R(P)$ 闭. 任取 $\{x_n\} \subset H, x_0 \in H$ 满足 $Px_n \rightarrow x_0(H)$, 则

$$\|x_0 - Px_0\| \leq \|x_0 - Px_n\| + \|Px_n - Px_0\| = \|x_0 - Px_n\| + \|Px_n - P^2x_0\| \leq (1 + \|P\|)\|x_n - Px_n\| \rightarrow 0,$$

故 $x_0 = Px_0 \in M$, 故 M 闭.

再证 P 是到 M 上的正交投影. 任取 $x \in H$, 记 $y = Px, z = x - y$, 往证 $z \in M^\perp$. 根据 M 的定义知对任意 $y_1 \in M$ 总存在 $x_1 \in H$ 使得 $y_1 = Px_1$, 于是

$$(z|y_1) = (x - Px|Px_1) = (x|Px_1) - (x|P^2x_1) = (x|Px_1) - (x|Px_1) = 0,$$

故 $z \in M^\perp$, 由正交分解唯一即知 P 是到 M 上的正交投影.

下面用习题6.47的结果证明习题6.45, 即往证

$$P \in L(H) \text{ 为 } H \text{ 上的正交投影} \Leftrightarrow (Px|x) = \|Px\|^2 (\forall x \in H).$$

$\Rightarrow$ 用幂零与对称显然, 下证 $\Leftarrow$. $(Px|x) = \|Px\|^2 \in \mathbb{R}$ 表明 P 对称, 该式同时表明

$$(Px|x) = (Px|Px) = (P^2x|x),$$

于是对任意 $x \in H$ 均有 $((P - P^2)x|x) = 0$, 已知 $P - P^2$ 对称, 故用 $\|A\| = \sup(Ax|x)$ 立得 $\|P - P^2\| = 0$, 故 $P = P^2$. □

练习 6.48

设 T 为复 Hilbert 空间 H 上的对称算子. 若存在 $m, M \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in H$, 只要 $\|x\|_H = 1$ 就有 $(Tx|x)_H \in [m, M]$, 证明 $\sigma(T) \subset [m, M]$. ♠

证明 $T = 0_{H \rightarrow H}$ 时命题无所可证, 下设 $T \neq 0_{H \rightarrow H}$. 既然 T 对称, 根据定义知首先有 $T \in L(H)$, 下面证明 $\mathbb{C} \setminus [m, M] \subset \rho(T)$. 既然 T 对称, 故 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$, 因此至少 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subset \rho(T)$, 下证 $(-\infty, m) \cup (M, \infty) \subset \rho(T)$. 任取 $\lambda \in (-\infty, m)$, 知对 $x \in \partial B(0_H, 1)$ 有

$$(m - \lambda)\|x\|_H^2 = m - \lambda(x|x)_H < (Tx|x)_H - \lambda(x|x)_H = ((T - \lambda I)x|x)_H \leq \|(T - \lambda I)x\|_H \|x\|_H,$$

于是

$$(m - \lambda)\|x\|_H \leq \|(T - \lambda I)x\|_H,$$

因此一方面 $T - \lambda I$ 是单射, 进而 $(T - \lambda I)^{-1}$ 存在. 进一步由 T 连续知 T 首先闭, 而在上式中设 $y = (T - \lambda I)x \Rightarrow x = (T - \lambda I)^{-1}y$ 得 $\|(T - \lambda I)^{-1}\|_{H \rightarrow H} \leq (m - \lambda)^{-1} < \infty$, 故 $\lambda \in \rho(T)$.

同理, 取 $\lambda > M$ 知对任意 $x \in \partial B(0_H, 1)$ 有

$$(\lambda - M)\|x\|_H^2 < \lambda(x|x)_H - M \leq \lambda(x|x)_H - (Tx|x)_H = ((\lambda I - T)x|x)_H \leq \|(\lambda I - T)x\|_H \|x\|_H,$$

于是

$$(\lambda - M)\|x\|_H \leq \|(\lambda I - T)x\|_H.$$

仿照前述过程即得 $\lambda \in \rho(T)$, 至此即知 $(-\infty, m) \cup (M, \infty) \subset \rho(T)$, 故 $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T) \subset [m, M]$. □

注 6.43 这题也可以用距离函数统一处理. 任取 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus [m, M]$, 记 $d(\lambda) := \inf\{|\lambda - t| : t \in [m, M]\} > 0$, 则对任意 $x \in \partial B(0_H, 1)$ 有

$$|((\lambda I - T)x|x)| = |\lambda - (Tx|x)| \geq d(\lambda).$$

故对任意 $x \in H$ 均有

$$d(\lambda)\|x\|_H^2 \leq |((\lambda I - T)x|x)| \leq \|(\lambda I - T)x\|_H \|x\|_H,$$

此即

$$d(\lambda)\|x\|_H \leq \|(\lambda I - T)x\|_H.$$

这说明 $\lambda I - T$ 是单射, 下证 $\lambda I - T$ 是满射, 为此考虑说明 $R(\lambda I - T)^\perp = \{0_H\}$ 且 $R(\lambda I - T)$ 闭. 一方面任取 $x \in R(\lambda I - T)^\perp$ 知

$$((\lambda I - T)x|x) = 0 \Rightarrow \|x\|_H = 0 \Rightarrow x = 0_H.$$

故 $\overline{R(\lambda I - T)} = H$. 下证 $R(\lambda I - T)$ 闭, 任取 $\{x_n\} \subset H, x \in H$ 满足 $(\lambda I - T)x_n \rightarrow x(H)$. 因为 $\|x\|$ 被 $\|(\lambda I - T)x\|$ 控制, 故 $\{x_n\}$ 也是 H 中的 Cauchy 列, 设 $x_n \rightarrow x_0$, 由 $\lambda I - T$ 连续知 $(\lambda I - T)x_0 = x$, 故 $x \in R(\lambda I - T)$, 此即 $R(\lambda I - T)$ 闭, 于是 $\lambda \in \rho(T)$, 故 $\sigma(T) \subset [m, M]$. $\square$

练习 6.49

设 H 为 Hilbert 空间, T 为 H 上的对称算子, 证明:

- (i) T 为零算子当且仅当 $\sigma(T) = \{0\}$.
- (ii) 设 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则 $T = \lambda I$ 当且仅当 $\sigma(T) = \{\lambda\}$, 其中 I 是恒等算子.
- (iii) 若存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与 H 上的正交投影算子 P 使得 $\sigma(PTP) = \{\lambda\}$, 且 $N(P)$ 为 H 的有限维子空间, 则 $\lambda I - T$ 为紧算子. 进一步若 $P \neq I$, 则 $\lambda = 0$ 且 T 为紧算子.

证明 (i) $\Rightarrow$: 因为 $\lambda I \in L(H) (\forall \lambda \neq 0)$, 故 $\sigma(T) \subset \{0\}$. 又因为 $Tx = 0_H$ 对任意 $x \in H$ 均成立, 故 $\sigma(T) = \{0\}$.

$\Leftarrow$: 为证 T 是零算子, 只需证明当 T 为 H 上的对称算子时必有 $r_\sigma(T) = \|T\|_{H \rightarrow H}$ 即可. 为此回到 Gelfand 定理, 知

$$r_\sigma(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|_{H \rightarrow H}^{\frac{1}{n}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^{2^k}\|_{H \rightarrow H}^{\frac{1}{2^k}}.$$

由习题 6.41 与 $T = T^*$ 知 $\|T^2\|_{H \rightarrow H} = \|T\|_{H \rightarrow H}^2$, 同时容易验证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 而言 T^n 均对称, 故

$$\|T^{2^k}\|_{H \rightarrow H} = \|T^{2^{k-1}}T^{2^{k-1}}\|_{H \rightarrow H} = \|T^{2^{k-1}}\|_{H \rightarrow H}^2 = \cdots = \|T\|_{H \rightarrow H}^{2^k},$$

因此

$$r_\sigma(T) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T^{2^k}\|_{H \rightarrow H}^{\frac{1}{2^k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|T\|_{H \rightarrow H} = \|T\|_{H \rightarrow H}.$$

至此断言即证. 现由 $\sigma(T) = \{0\}$ 知 $r_\sigma(T) = 0 = \|T\|_{H \rightarrow H}$, 故 T 是零算子.

(ii) 首先说明 $\sigma(T) = \{\lambda\} \Leftrightarrow \sigma(\lambda I - T) = \{0\}$. 知:

$$\begin{aligned} \sigma(T) = \{\lambda\} &\Leftrightarrow \forall \mathbb{C} \ni \eta \neq \lambda ((\eta I - T)^{-1} \in L(H)) \\ &\Leftrightarrow \forall \mathbb{C} \ni \eta \neq \lambda (((\eta - \lambda)I + \lambda I - T)^{-1} \in L(H)) \\ &\Leftrightarrow \forall \mathbb{C} \ni \eta \neq \lambda (((\lambda - \eta)I - (\lambda I - T))^{-1} \in L(H)) \\ &\Leftrightarrow \sigma(\lambda I - T) = \mathbb{C} \setminus \{\lambda - \eta : \lambda \neq \eta, \eta \in \mathbb{C}\} = \{0\}. \end{aligned}$$

于是由 (i) 与前述结论知

$$\sigma(T) = \{\lambda\} \Leftrightarrow \sigma(\lambda I - T) = \{0\} \Leftrightarrow \lambda I - T = 0_{H \rightarrow H} \Leftrightarrow T = \lambda I.$$

(iii) 分 $\lambda = 0$ 与 $\lambda \neq 0$ 两种情况进行讨论. 若 $\lambda \neq 0$, 由 (ii) 知 $PTP = \lambda I$. 设 P 对应的闭子空间为 M , 则任取 $x \in M^\perp$, 知 $PTPx = 0_H = \lambda x$, 这说明只能有 $x = 0_H$, 故 $M^\perp = \{0\} \Rightarrow M = H$, 因此 $P = I$, 此时 $PTP = T$, 于是 $\lambda I - T = PTP - PTP = 0_{H \rightarrow H}$ 显然是紧算子.

若 $\lambda = 0$, 往证 T 是紧算子. 设 P 对应的闭子空间为 M , 易证 $M = N(P)^\perp$. 由 (i) 知 $PTP = 0_{H \rightarrow H}$, 故 $R(TP) \subset N(P)$, 于是 $R(TP) = T(N(P)^\perp)$ 有限维. 下面说明 $R(T)$ 有限维. 知 $M^\perp = N(P)$ 有限维, 设 $\{e_i\}_{i=1}^n$

为 $N(P)$ 的基. 现任取 $y \in T(N(P))$, 依定义知存在 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i (x_i \in \mathbb{C})$ 使得

$$y = Tx = \sum_{i=1}^n x_i T e_i,$$

因此 $y \in \text{span}\{T e_i\}_{i=1}^n$, 这说明 $T(N(P)) \subset \text{span}\{T e_i\}_{i=1}^n$, 亦即 $\dim T(N(P)) \leq \dim \text{span}\{T e_i\}_{i=1}^n \leq n < \infty$, 故 $T(N(P)) = R(T|_{N(P)})$ 有限维. 现任取 $x \in H$, 将 x 依 M 正交分解为

$$x = x_M + x_M^\perp, \quad x_M \in M, \quad x_M^\perp \in M^\perp,$$

则

$$Tx = Tx_M + Tx_{M^\perp} \in T(N(P)^\perp) + T(N(P)) \subset T(M) + T(M^\perp) = R(TP) + R(T|_{N(P)}) \Rightarrow R(T) \subset R(TP) + R(T|_{N(P)}).$$

因为 $R(TP), R(T|_{N(P)})$ 均有限维, 故 $R(TP) + R(T|_{N(P)})$ 有限维, 因此 $R(T)$ 有限维, 从而 T 作为有限值域的连续线性算子自动成为紧算子.

最后若 $P \neq I$, 则由正交分解定理知存在 $x_0 \in H$ 使得 $Px_0 \neq x_0 = Px_0 + x^\perp$ (其中 $x^\perp \in N(P)$), 进而 $x^\perp \neq 0_H$, 故 $N(P) \neq \{0_H\}$. 现取 $0_H \neq x_0 \in N(P)^\perp$, 若 $\lambda \neq 0$, 则 $PTP = \lambda I$, 于是 $PTPx_0 = 0_H = \lambda x_0 \neq 0_H$, 矛盾! 故只能有 $\lambda = 0$, 此时结论划归为前一情形. $\square$

注 6.44 (iii) 也可以通过 P 的状态进行分类. 条件总是 $\sigma(PTP) = \{\lambda\}$, 于是 (ii) 表明 $PTP = \lambda I$. 如果 $P = I$, 则 $T = \lambda I$, 显然 $\lambda I - T = 0_{H \rightarrow H}$ 紧.

下设 $P \neq I$, 此时 P 作为投影满足 $R(P) \subsetneq H$, 于是 $R(\lambda I) = R(PTP) \subset R(P) \subsetneq I$, 这说明只能有 $\lambda = 0$, 从而只需证 $T - \lambda I = T$ 紧. 注意对任意 $x \in H$ 均有

$$Tx = T(1 - P)x + TPx,$$

已知 $P = P^2$, 故 $P(I - P)x = 0_H$, 进而 $(I - P)x \in N(P)$. 另由 $\lambda = 0 \Rightarrow PTP = 0_H \Rightarrow R(TP) \subset N(P)$ 知

$$Tx = T(1 - P)x + TPx \subset T(N(P)) + N(P),$$

上右式由 $N(P)$ 有限维与 $T \in L(H)$ 知同样为有限维子空间, 故 T 是有穷秩算子, 进而 T 紧. $\square$

练习 6.50

设 H 为 Hilbert 空间, $A \in L(H)$, 证明下述命题等价:

- (i) $A \in \mathfrak{C}(H)$;
- (ii) $\exists n_0 \in \mathbb{N}((A^*A)^{n_0} \in \mathfrak{C}(H))$;
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N}((A^*A)^n \in \mathfrak{C}(H))$.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 因为 H 是 Hilbert 空间, 故在等距同构的意义下有 $H^* = H$, 进而由 $A \in \mathfrak{C}(H)$ 与 Schauder 定理知 $A^* \in \mathfrak{C}(H^*) = \mathfrak{C}(H)$, 故 $A^*A \in \mathfrak{C}(H)$, 取 $n_0 = 1$ 即可.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 因为 $A \in L(H) \Rightarrow A^*A \in L(H)$, 故 $(A^*A)^{n_0} \in \mathfrak{C}(H) \Rightarrow (A^*A)^n \in \mathfrak{C}(H) (\forall n \geq n_0)$, 下证 $(A^*A)^n \in \mathfrak{C}(H) (\forall 1 \leq n < n_0)$, 为此只需证 $A^*A \in \mathfrak{C}(H)$, 故不妨设 $n_0 \geq 2$, 约定 $(A^*A)^0 = I$, 下证 $(A^*A)^{n_0-1} \in \mathfrak{C}(H)$. 任取 $\{x_k\} \subset H$ 满足 $\|x_k\|_H \leq M < \infty (\forall k)$, 由 $(A^*A)^{n_0} \in \mathfrak{C}(H)$ 知 $\{(A^*A)^{n_0}x_k\}$ 存在收敛子列, 不妨仍记该子列为 $\{(A^*A)^{n_0}x_k\}$, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall k, m > N (\|(A^*A)^{n_0}x_k - (A^*A)^{n_0}x_m\|_H < \varepsilon).$$

现针对 $\{(A^*A)^{n_0-1}x_k\}$ 知 $k, m > N$ 时有:

$$\begin{aligned} \|(A^*A)^{n_0-1}(x_k - x_m)\|_H^2 &= ((A^*A)^{n_0-1}(x_k - x_m) | (A^*A)^{n_0-1}(x_k - x_m))_H \\ &= ((A^*A)^{n_0}(x_k - x_m) | (A^*A)^{n_0-2}(x_k - x_m))_H \\ &\leq \|(A^*A)^{n_0-2}(x_k - x_m)\|_H \|(A^*A)^{n_0}(x_k - x_m)\|_H \\ &\leq \|(A^*A)^{n_0-2}\|_{H \rightarrow H} \|x_k - x_m\|_H \varepsilon \\ &\leq 2M \|(A^*A)^{n_0-2}\|_{H \rightarrow H} \varepsilon. \end{aligned}$$

由习题6.41知 $A^*A \in L(H)$, 因此 $\{(A^*A)^{n_0-1}x_k\}$ 同样是 H 中的 Cauchy 列, 这说明 $(A^*A)^{n_0-1}$ 是紧算子. 上述过程说明了 $(A^*A)^{n_0} \in \mathfrak{C}(H) \Rightarrow (A^*A)^{n_0-1} \in \mathfrak{C}(H)$ ($n_0 \geq 2$), 进而重复该过程有限次可得 $A^*A \in \mathfrak{C}(H)$, 至此结论得证.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 由 (iii) 知 $A^*A \in \mathfrak{C}(H)$. 现设 $\{x_k\} \subset H$ 满足 $\|x_k\|_H \leq M(\forall k)$, 则 $\{A^*Ax_k\}$ 存在收敛子列, 不妨仍记该子列为 $\{A^*Ax_k\}$, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall k, m > N (\|A^*A(x_k - x_m)\|_H < \varepsilon).$$

现针对 $\{Ax_k\}$ 知 $k, m > N$ 时有:

$$\begin{aligned} \|A(x_k - x_m)\|_H^2 &= (A(x_k - x_m)|A(x_k - x_m))_H \\ &= (A^*A(x_k - x_m)|x_k - x_m)_H \\ &\leq \|x_k - x_m\|_H \|A^*A(x_k - x_m)\|_H \leq 2M\varepsilon, \end{aligned}$$

故 $\{Ax_k\}$ 同样是 H 中的 Cauchy 列, 因此 $A \in \mathfrak{C}(H)$. □

注 6.45 这题也可以按照 (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) 的顺序来. (i) $\Rightarrow$ (iii) 显然, (iii) $\Rightarrow$ (ii) 显然. (ii) $\Rightarrow$ (i) 分下述三步:

第一步考虑 $n_0 = 1$ 的情形. 此时 $A^*A \in \mathfrak{C}(H)$, 根据紧算子定义知对任意 $\{x_n\} \subset \partial B(0_H, 1)$ 与任意 $m, n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|A(x_m - x_n)\|_H^2 = (A^*A(x_m - x_n)|x_m - x_n) \leq \|A^*A(x_m - x_n)\| \|x_m - x_n\| \leq 2\|A^*A(x_m - x_n)\|,$$

上右式由 A^*A 紧成为 Cauchy 列, 于是上左式作为 Cauchy 列使得 $\{Ax_n\}$ 收敛, 故 $A \in \mathfrak{C}(H)$.

第二步考虑 $n_0 = 2^m$ 的情形, 此时 $(A^*A)^{2^m} \in \mathfrak{C}(H)$. 因为 $(A^*A)^* = A^*A$, 故 $((A^*A)^{2^m-1})^* = (A^*A)^{2^m-1}$, 从而

$$(A^*A)^{2^m} = (A^*A)^{2^m-1}(A^*A)^{2^m-1} = ((A^*A)^{2^m-1})^*(A^*A)^{2^m-1},$$

由 $(A^*A)^{2^m} \in \mathfrak{C}(H)$ 与第一步的结论知 $(A^*A)^{2^m-1} \in \mathfrak{C}(H)$, 依此类推即得 $A^*A \in \mathfrak{C}(H)$, 由第一步结论即得 $A \in \mathfrak{C}(H)$.

第三步考虑一般情形 $n_0 \in \mathbb{N}$, 此时 $(A^*A)^{n_0} \in \mathfrak{C}(H)$. 设 m 为使得 $n_0 < 2^m$ 的最小正整数, 记 $l := 2^m - n_0$, 则 $(A^*A)^{2^m} = (A^*A)^{n_0}(A^*A)^l$, 由 $(A^*A)^{n_0} \in \mathfrak{C}(H)$, $(A^*A)^l \in L(H)$ 得 $(A^*A)^{2^m} \in \mathfrak{C}(H)$, 进而第二步表明 $A \in \mathfrak{C}(H)$. □

练习 6.51

设 H 为 Hilbert 空间, A 是 H 上的紧算子, 且

$$(Ax|x)_H \geq 0, \forall x \in H.$$

证明对任意 $n \in \mathbb{N}^+$ 均存在 H 上的对称紧算子 B 使得 $A = B^n$. 💧

证明 因为 $(Ax|x)_H \geq 0(\forall x \in H)$ 蕴含了 $(Ax|x)_H \in \mathbb{R}(\forall x \in H)$, 故 A 对称, 进而由 Hilbert-Schmidt 定理知存在 A 的至多可数非零特征值列 $\{\lambda_j\}$, 其对应的正交规范特征向量列 $\{e_j\}$ 与 $N(A)$ 的规范正交基 $\{e_\alpha^{(0)}\}$ 使得

$$\begin{aligned} x &= \sum_j (x|e_j)_H e_j + \sum_\alpha (x|e_\alpha)_H e_\alpha, \\ Ax &= \sum_j \lambda_j (x|e_j)_H e_j. \end{aligned}$$

下面说明对任意 j 而言, λ_j 均为正数. 这是因为只要存在 $\lambda_j < 0$, 取 e_j 为它对应的规范特征向量, 则

$$(Ae_j|e_j)_H = (\lambda_j e_j|e_j)_H = \lambda_j < 0,$$

矛盾! 现对取定的 $n \in \mathbb{N}^+$ 记

$$B = \sum_j \lambda_j^{\frac{1}{n}} e_j \otimes e_j,$$

下证 B 对称紧, 且 $A = B^n$. 首先说明 B 良定义, 此即说明 B 定义式右端的级数在 $L(H)$ 意义下收敛. 一方面由

$\{\lambda_j\}$ 作为紧算子非零特征值列知可设 $\sup_j |\lambda_j| \leq M < \infty$, 另一方面由 Bessel 不等式知 $\sum_j |(x|e_j)_H|$ 收敛, 故由 $\{e_j\}$ 正交规范知

$$\forall x \in \partial B(0_H, 1) \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 \forall l > k > N \left(\left\| \sum_{j=k}^l (x|e_j)_H e_j \right\|_H = \sum_{j=k}^l |(x|e_j)_H| < \varepsilon \right).$$

于是 $l > k > N$ 时有:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=k}^l \lambda_j^{\frac{1}{n}} e_j \otimes e_j \right\|_{L(H)} &= \sup_{\|x\|_H=1} \left\| \sum_{j=k}^l \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x|e_j)_H e_j \right\|_H \\ &\leq \sup_j |\lambda_j|^{\frac{1}{n}} \sup_{\|x\|_H=1} \left\| \sum_{j=k}^l (x|e_j)_H e_j \right\|_H \\ &\leq M^{\frac{1}{n}} \sum_{j=k}^l |(x|e_j)_H| < M^{\frac{1}{n}} \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $\left\{ \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} e_j \otimes e_j \right\}_k$ 是 $L(H)$ 中的 Cauchy 列, 故级数 $\sum_j \lambda_j^{\frac{1}{n}} e_j \otimes e_j$ 收敛, 从而 B 良定义. 现因 $\sum_j \lambda_j^{\frac{1}{n}} e_j \otimes e_j \in \overline{F(H)} = \mathfrak{C}(H)$, 故 B 是紧算子. 针对对称性, 知对任取的 $x \in H$ 由内积的连续性有:

$$\begin{aligned} (Bx|x)_H &= \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x|e_j)_H e_j \middle| x \right)_H \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} ((x|e_j)_H e_j | x)_H \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x|e_j)_H (e_j | x)_H \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x | \overline{(e_j | x)_H} e_j)_H \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x | (x|e_j)_H e_j)_H \\ &= \left(x \middle| \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x|e_j)_H e_j \right)_H = (x|Bx)_H. \end{aligned}$$

故 B 对称.

最后说明 $A = B^n$, 为此首先注意到

$$Be_j = \lambda_j^{\frac{1}{n}} e_j \Rightarrow B^k e_j = \lambda_j^{\frac{k}{n}} e_j (\forall k),$$

故任取 $x \in H$, 由 B 连续 (进而 B^n 连续 ($\forall n$)) 知

$$\begin{aligned} B^n x &= B^{n-1} \left(\sum_j \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x|e_j)_H e_j \right) \\ &= \sum_j \lambda_j^{\frac{1}{n}} (x|e_j)_H B^{n-1} e_j \\ &= \sum_j \lambda_j (x|e_j)_H e_j = Ax. \end{aligned}$$

因此 $A = B^n$. □

练习 6.52

设 H 是复 Hilbert 空间, T 为 H 上的对称算子, 令

$$m := \inf_{\|x\|_H=1} (Tx|x)_H, \quad M := \sup_{\|x\|_H=1} (Tx|x)_H,$$

证明:

- (i) $\sigma(T) \subset [m, M]$;
- (ii) $m \in \sigma(T), M \in \sigma(T)$;
- (iii) $\|T\|_{H \rightarrow H} = \max\{|m|, |M|\}$.



证明 (i) 既然 T 对称, 故 $m, M \in \mathbb{R}$. 根据 m, M 的构造显见 $(Tx|x)_H \in [m, M] (\forall x \in \partial B(0_H, 1))$, 故由习题 6.48 即得结论.

(ii) 往证 $m \notin \rho(T), M \notin \rho(T)$. 若 $m \in \rho(T)$, 则 $(T - mI)^{-1} \in L(H)$, 设 $\|(T - mI)^{-1}\|_{H \rightarrow H} \leq C < \infty$. 由 m 的定义知存在序列 $\{y_n\} \subset \partial B(0_H, 1)$ 满足

$$(Ty_n|y_n)_H \leq m + \frac{1}{n}.$$

显见 $(T - mI)^{-1}$ 此时是满射, 故对每个 n 均存在 x_n 使得 $y_n = (T - mI)^{-1}x_n (\forall n)$, 此即 $x_n = (T - mI)y_n$, 于是

$$(x_n|y_n)_H = (Ty_n - my_n|y_n)_H = (Ty_n|y_n)_H - m \in \left[0, \frac{1}{n}\right].$$

进一步对任意 $0_H \neq y \in H$ 均存在 $x_y \in H$ 使得 $y = (T - mI)^{-1}x_y$, 于是

$$(x_y|y)_H = ((T - mI)y|y)_H = \|y\|_H^2 \left(\left(T \left(\frac{y}{\|y\|_H} \right) \middle| \frac{y}{\|y\|_H} \right)_H - m \right) \geq 0,$$

进而由习题 6.42 知

$$\|(T - mI)y_n\|_H^2 \leq \|T - mI\|_{H \rightarrow H} ((T - mI)y_n|y_n)_H \leq \frac{1}{n} \|T - mI\|_{H \rightarrow H},$$

另一方面由 $\|(T - mI)^{-1}\|_{H \rightarrow H} \leq C$ 知

$$\|y_n\|_H = \|(T - mI)^{-1}x_n\|_H \leq C\|x_n\|_H = C\|(T - mI)y_n\|_H,$$

因此

$$\|y_n\|_H^2 \leq \frac{C^2}{n} \|T - mI\|_{H \rightarrow H},$$

取 $n > C^2 \|T - mI\|_{H \rightarrow H}$ 即得 $\|y_n\|_H^2 < 1$, 这与 $y_n \in \partial B(0_H, 1)$ 矛盾! 故 $m \notin \rho(T)$, 此即 $m \in \sigma(T)$.

针对 M , 若 $M \in \rho(T)$, 则 $(MI - T)^{-1} \in L(H)$, 设 $\|(MI - T)^{-1}\|_{H \rightarrow H} \leq C < \infty$. 由 M 的定义知存在序列 $\{y_n\} \subset \partial B(0_H, 1)$ 满足

$$(Ty_n|y_n)_H \geq M - \frac{1}{n}.$$

显见 $(MI - T)^{-1}$ 此时是满射, 故对每个 n 均存在 x_n 使得 $y_n = (MI - T)^{-1}x_n (\forall n)$, 此即 $x_n = (MI - T)y_n$, 于是

$$(x_n|y_n)_H = (My_n - Ty_n|y_n)_H = M - (Ty_n|y_n)_H \in \left[0, \frac{1}{n}\right].$$

进一步对任意 $0_H \neq y \in H$ 均存在 $x_y \in H$ 使得 $y = (MI - T)^{-1}x_y$, 于是

$$(x_y|y)_H = ((MI - T)y|y)_H = \|y\|_H^2 \left(M - \left(T \left(\frac{y}{\|y\|_H} \right) \middle| \frac{y}{\|y\|_H} \right)_H \right) \geq 0,$$

进而由习题 6.42 知

$$\|(MI - T)y_n\|_H^2 \leq \|MI - T\|_{H \rightarrow H} ((MI - T)y_n|y_n)_H \leq \frac{1}{n} \|MI - T\|_{H \rightarrow H},$$

另一方面由 $\|(MI - T)^{-1}\|_{H \rightarrow H} \leq C$ 知

$$\|y_n\|_H = \|(MI - T)^{-1}x_n\|_H \leq C\|x_n\|_H = C\|(MI - T)y_n\|_H,$$

因此

$$\|y_n\|_H^2 \leq \frac{C^2}{n} \|MI - T\|_{H \rightarrow H},$$

取 $n > C^2 \|MI - T\|_{H \rightarrow H}$ 即得 $\|y_n\|_H^2 < 1$, 这与 $y_n \in \partial B(0_H, 1)$ 矛盾! 故 $M \notin \rho(T)$, 此即 $M \in \sigma(T)$.

(iii) 根据谱半径的定义与 (i),(ii) 结论知 $r_\sigma(T) = \max\{|m|, |M|\}$, 另在习题6.49中已经证过 T 对称时 $r_\sigma(T) = \|T\|_{H \rightarrow H}$, 结合两式即得结论. $\square$

注 6.46 这里 (ii) 因为藏了规范化所以看起来有点复杂, 下面收录一个简单一点的版本. 考虑反证, 设 $m \in \rho(T)$, 此时 $(mI - T)^{-1} \in L(H)$. 由 m 定义知存在 $\{x_n\} \subset \partial B(0_H, 1)$ 使得 $(Tx_n|x_n) \rightarrow m$, 另由 m 定义知 $m \leq (Tx|x) (\forall x \in \partial B(0_H, 1))$, 于是 $((T - mI)x|x) \geq 0$, 利用前面习题可知

$$\|(T - mI)x\|_H^2 \leq \|T - mI\|_{H \rightarrow H} ((T - mI)x|x),$$

代入 $x = x_n$ 得

$$\|(T - mI)x_n\|_H^2 \leq \|T - mI\|_{H \rightarrow H} ((Tx_n|x_n) - m),$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $\|(T - mI)x_n\|_H \rightarrow 0$, 由 $(mI - T)^{-1}$ 有界即知 $\|x_n\|_H \rightarrow 0$, 这与 $\{x_n\} \subset \partial B(0_H, 1)$ 矛盾! 故 $m \in \sigma(T)$, 同理可证 $M \in \sigma(T)$. $\square$

第七章 Hille-Yosida 定理

本章选自 [2], 统一用 H 表示 Hilbert 空间.

7.1 极大单调算子的定义与初等性质

定义 7.1 (单调算子 (monotone operator), 极大单调算子 (maximal monotone operator))

若无界线性算子 $A: D(A) \subset H \rightarrow H$ 满足

$$(Av, v) \geq 0, \quad \forall v \in D(A)$$

就称 A 是单调算子^a. 若另外还有 $R(I + A) = H$, 即

$$\forall f \in H \exists u \in D(A) \text{ s.t. } u + Au = f,$$

就称 A 是极大单调算子.

^a有的作者会把这样的 A 称为增强算子或把 $-A$ 称为耗散算子.

命题 7.1 (极大单调算子的性质)

设 A 是极大单调算子, 则

- (i) $D(A)$ 在 H 中稠密,
- (ii) A 是闭算子,
- (iii) 对 $\forall \lambda > 0$ 而言, $I + \lambda A$ 是 $D(A) \rightarrow H$ 的双射, $(I + \lambda A)^{-1}$ 是有界算子, 且 $\|(I + \lambda A)^{-1}\|_{L(H)} \leq 1$.

证明 (i) 我们考虑用推论 2.4 证明 $D(A)$ 的稠密性, 为此设 $f \in H$ 满足 $\forall v \in D(A) ((f, v) = 0)$, 往证 $f = 0_H$. 根据极大单调算子的定义知对这个选定的 f 存在 $v_0 \in D(A)$ 使得

$$v_0 + Av_0 = f.$$

两边与 v_0 作内积可得

$$0 = (f, v_0) = \|v_0\|_H^2 + (Av_0, v_0) \geq \|v_0\|_H^2$$

因此只能有 $v_0 = 0_H$, 于是 $f = v_0 + Av_0 = 0_H$.

(ii) 从闭算子的定义出发, 设 $\{u_n\} \subset D(A)$ 满足 $u_n \rightarrow u, Au_n \rightarrow f$, 往证 $u \in D(A), f = Au$. 现在已知

$$u_n + Au_n = (I + A)u_n \rightarrow u + f,$$

如果现在能说明 $(I + A)^{-1} \in L(H)$, 就有

$$u_n = (I + A)^{-1}(I + A)u_n \rightarrow (I + A)^{-1}(u + f) = u,$$

于是方面 $u \in D(I + A) = D(A)$, 另一方面通过 $u + f = Au + u$ 也能说明 $f = Au$.

下面说明确有 $(I + A)^{-1} \in L(H)$. 因为 $R(I + A) = H$, 故 $(I + A)^{-1}$ 的存在性不成问题, 但我们还需要验证 $(I + A)^{-1}$ 是单值映射, 亦即对任意 $f \in H$ 而言, 均存在唯一的 $u \in D(A)$ 使得 $u + Au = f$. 现设 $\tilde{u}$ 同样满足 $\tilde{u} + A\tilde{u} = f$, 则

$$u - \tilde{u} + A(u - \tilde{u}) = 0.$$

上式两端与 $u - \tilde{u}$ 作内积可得

$$\|u - \tilde{u}\|_H^2 + (A(u - \tilde{u}), u - \tilde{u}) = 0$$

但上左式的两项都是非负的, 故只能有

$$\|u - \tilde{u}\|_H^2 = (A(u - \tilde{u}), u - \tilde{u}) = 0$$

因此 $u = \tilde{u}$, 于是 $(I + A)^{-1}$ 确为映射, 显见 $(I + A)^{-1}$ 是线性的. 接下来再说明 $(I + A)^{-1}$ 的有界性. 因为

$$\|u\|_H^2 \leq \|u\|_H^2 + (Au, u) = (f, u) \leq \|f\|_H \|u\|_H.$$

因此 $\|u\|_H = \|(I + A)^{-1}f\|_H \leq \|f\|_H$, 于是 $(I + A)^{-1} \in L(H)$, (ii) 至此即证.

(iii) (ii) 中已经说明了结论在 $\lambda = 1$ 时成立, 因此我们只需说明由 A 是极大单调算子能推知对 $\forall \lambda > 0$ 而言 λA 都是极大单调算子即可, 后者实际上就是求解方程

$$u + \lambda Au = f, \quad \lambda > 0.$$

现在把方程重写为

$$u + Au = \frac{1}{\lambda}f + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)u,$$

进一步写成能应用压缩映射原理的形式:

$$u = (I + A)^{-1} \left(\frac{1}{\lambda}f + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)u \right),$$

对于算子

$$T: u \mapsto (I + A)^{-1} \left(\frac{1}{\lambda}f + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)u \right),$$

知

$$\|Tu_1 - Tu_2\|_H = \left\| (I + A)^{-1} \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)(u_1 - u_2) \right\|_H.$$

现若 $|1 - \frac{1}{\lambda}| \leq \frac{1}{2}$, 即 $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq 2$, 则利用压缩映射原理即可说明方程 $u + \lambda Au = f$ 确实有解.

为了将结论推广到 $\mathbb{R}^+$ 上, 我们需要对更一般的情形进行说明. 假设现在已知 $R(I + \lambda_0 A) = H$ (其中 $\lambda_0 > 0$), 我们考虑当 λ 在怎样的范围内时依旧有 $R(I + \lambda A) = H$. 通过与前文相同的方法, 不难发现要想 $R(I + \lambda A) = H$, 只需 $|1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}| \leq \frac{1}{2}$, 亦即 $\frac{2}{3}\lambda_0 \leq \lambda \leq 2\lambda_0$. 现在分别取 $\lambda_0 = \frac{2}{3}$ 与 $\lambda = 2$, 可知 $R(I + \lambda A) = H$ 在 $\lambda \in [(\frac{2}{3})^2, 2^2]$ 时也成立. 重复该操作即知对任意 $n \in \mathbb{N}$ 而言, $R(I + \lambda A) = H$ 都在 $\lambda \in [(\frac{2}{3})^n, 2^n]$ 时成立, 因此结论在 $\lambda \in (0, \infty)$ 时成立. $\square$

注 7.1 根据前述证明, 只要 A 是极大单调算子, 那么对任意 $\lambda > 0$ 而言 λA 也就是极大单调算子. 但是当 A, B 都是极大单调算子时, 定义在 $D(A) \cap D(B)$ 上的算子 $A + B$ 未必是极大单调算子.

定义 7.2 (Yosida 逼近 (Yosida approximation))

设 A 是极大单调算子, 定义

$$J_\lambda = (I + \lambda A)^{-1}, \quad A_\lambda = \frac{1}{\lambda}(I - J_\lambda),$$

称 A_λ 为 A 的 Yosida 逼近 (或 Yosida 正则化).



注 7.2 根据命题 7.1 的证明显见 $\|J_\lambda\|_{L(H)} \leq 1$.

命题 7.2 (Yosida 逼近的性质)

设 A 是极大单调算子, 则:

- (i) 对 $\forall v \in H$ 与 $\forall \lambda > 0$ 均有 $A_\lambda v = A(J_\lambda v)$.
- (ii) 对 $\forall v \in D(A)$ 与 $\forall \lambda > 0$ 均有 $A_\lambda v = J_\lambda(Av)$.
- (iii) 对 $\forall v \in D(A)$ 与 $\forall \lambda > 0$ 均有 $\|A_\lambda v\|_H \leq \|Av\|_H$.
- (iv) 对 $\forall v \in H$ 有 $J_\lambda v \rightarrow v (\lambda \rightarrow 0)$.
- (v) 对 $\forall v \in D(A)$ 有 $A_\lambda v \rightarrow Av (\lambda \rightarrow 0)$.
- (vi) 对 $\forall v \in H$ 与 $\forall \lambda > 0$ 有 $(A_\lambda v, v) \geq 0$.

(vii) 对 $\forall v \in H$ 与 $\forall \lambda > 0$ 有 $\|A_\lambda v\|_H \leq (1/\lambda)\|v\|_H$.

证明 (i) 欲证结论即

$$\frac{1}{\lambda}(v - J_\lambda v) = A(J_\lambda v) \Rightarrow v = (J_\lambda v) + \lambda A(J_\lambda v),$$

代入 J_λ 的定义立得结论.

(ii) 由 (i) 知

$$A_\lambda v + A(v - J_\lambda v) = Av,$$

此即

$$A_\lambda v + \lambda A(A_\lambda v) = Av,$$

这表明 $A_\lambda v = (I_\lambda A)^{-1} Av = J_\lambda(Av)$.

(iii) 由 (ii) 与 $\|J_\lambda\|_{L(H)} \leq 1$ 立得结论.

(iv) 首先设 $v \in D(A)$, 则由 (ii),(iii) 知

$$\|v - J_\lambda v\|_H = \lambda \|A_\lambda v\|_H \leq \lambda \|Av\|_H$$

因此 $J_\lambda v \rightarrow v (\lambda \rightarrow 0)$.

现在设 $v \in H$, 根据 $D(A)$ 在 H 中的稠密性 (命题 7.1(i)) 知对任意 $\varepsilon > 0$ 总存在 $v_1 \in D(A)$ 使得 $|v - v_1| \leq \varepsilon$, 于是

$$\begin{aligned} \|J_\lambda v - v\|_H &\leq \|J_\lambda v - J_\lambda v_1\|_H + \|J_\lambda v_1 - v_1\|_H + \|v_1 - v\|_H \\ &\leq 2\|v_1 - v\|_H + \|J_\lambda v_1 - v_1\|_H \leq 2\varepsilon + \|J_\lambda v_1 - v_1\|_H. \end{aligned}$$

结合 $v \in D(A)$ 的情况可知

$$\limsup_{\lambda \rightarrow 0} \|J_\lambda v - v\|_H \leq 2\varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

因此

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|J_\lambda v - v\|_H = 0.$$

(v) 由 (ii),(iv) 可知

$$A_\lambda v = J_\lambda(Av) \rightarrow Av, \quad \lambda \rightarrow 0.$$

(vi) 知

$$(A_\lambda v, v) = (A_\lambda v, v - J_\lambda v) + (A_\lambda v, J_\lambda v) = \lambda \|A_\lambda v\|_H^2 + (A(J_\lambda v), J_\lambda v),$$

由 A 的单调性可知

$$(A_\lambda v, v) \geq \lambda \|A_\lambda v\|_H^2. \quad (7.1)$$

(vii) 由 (7.1) 式与 Cahuchy-Schwarz 不等式知

$$\|A_\lambda v\|_H^2 \leq \frac{1}{\lambda} (A_\lambda v, v) \leq \frac{1}{\lambda} \|A_\lambda v\|_H \|v\|_H$$

两边约去 $\|A_\lambda v\|_H$ 即可. □

注 7.3 命题 7.2 表明 $\{A_\lambda\}_{\lambda>0}$ 实际上是在 $\lambda \rightarrow 0$ 时“逼近”无界算子 A 的一族有界算子. 这一逼近在 PDE 中应用得非常广. 当然, 一般情况下 $\|A_\lambda\|_{L(H)}$ 在 $\lambda \rightarrow 0$ 时都会爆破.

7.2 演化方程 $\frac{du}{dt} + Au = 0, u(0) = u_0$ 在 $[0, +\infty)$ 上解的存在性与唯一性

我们首先回顾下述经典结果:

定理 7.1 (Cauchy, Lipschitz, Picard)

设 E 是 Banach 空间, $F: E \rightarrow E$ 是 Lipschitz 映射, 即存在常数 L 使得

$$\|Fu - Fv\|_E \leq L\|u - v\|_E, \quad \forall u, v \in E.$$

则对任意给定的 $u_0 \in E$, 下述初值问题总存在唯一解 $u \in C^1([0, +\infty); E)$:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt}(t) = Fu(t), & t \in [0, +\infty) \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (7.2)$$

此时称 u_0 为初值.



证明 首先说明解的存在性. 显见要求解方程(7.2), 首先可以考虑在 $C([0, +\infty); E)$ 中求解下述积分方程:

$$u(t) = u_0 + \int_0^t F(u(s))ds. \quad (7.3)$$

为了应用压缩映射原理5.4, 我们就需要找到一个合适的工作空间 X . X 作为 $C([0, +\infty), E)$ 的子空间应该非空完备可度量, 且它满足

$$u \in X, \Phi(u) := u_0 + \int_0^t F(u(s))ds \in X, d_X(\Phi(u), \Phi(v)) \leq \alpha d_X(u, v),$$

其中 d_X 是 X 上的度量. 不妨就设 X 可赋范, 从形式上看, 如果 F 是常值映射, 那么方程的解应该是

$$u(t) = e^{tF}u_0.$$

亦即 $u_0 = e^{-tF}u(t)$, 这暗示看似与 t 有关的 $e^{-tF}u(t)$ 实际上与 t 无关, 因此我们可以尝试考虑形如 $e^{-kt}u(t)$ 的量构造范数. 又因为 $X \subset C([0, +\infty); E)$, 故自然可以对 $e^{-kt}u(t)$ 应用 $C([0, +\infty); E)$ 的范数, 即 $\sup_{t \geq 0} e^{-kt}\|u(t)\|_E$. 因此我们考虑空间

$$X = \left\{ u \in C([0, +\infty); E); \|u\|_X := \sup_{t \geq 0} e^{-kt}\|u(t)\|_E < \infty \right\},$$

其中 $k > 0$ 待定. 因为 $u \in C([0, +\infty); E) \Rightarrow e^{-k \cdot} u \in C([0, +\infty); E)$, 故 X 首先是赋范且非空的. 下面说明 X 完备, 设 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X 中的基本列, 根据定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall m, n > N \left(\sup_{t \geq 0} e^{-kt}\|u_m(t) - u_n(t)\|_E < \varepsilon \right)$$

于是对每个取定的 $t' \in [0, +\infty)$ 均有

$$e^{-kt'}\|u_m(t') - u_n(t')\|_E < \varepsilon$$

这说明对每个取定的 $t' \in [0, +\infty)$ 而言, $\{u_n(t')\}_{n \in \mathbb{N}}$ 都是 E 中的基本列, 于是对每个固定的 t' 均有

$$\|u_m(t') - u_n(t')\|_E \rightarrow \|u_m(t') - u(t')\|_E, \quad n \rightarrow \infty$$

下面说明 $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $\|\cdot\|_X$ 的意义下收敛到 u , 事实上对任意 $m, n > N$ 有:

$$\begin{aligned} \sup_{t \geq 0} e^{-kt}\|u_m(t) - u(t)\|_E &= \sup_{t \geq 0} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-kt}\|u_m(t) - u_n(t)\|_E \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{t \geq 0} e^{-kt}\|u_m(t) - u_n(t)\|_E < \varepsilon. \end{aligned}$$

现在只需说明 $u \in X$, 这通过 $\|u\|_X \leq \|u - u_n\|_X + \|u_n\|_X < \infty$ 立得, 因此 $(X, \|\cdot\|_X)$ 完备.

下面说明当 $u \in X$ 时, Φu 也在 X 内. 由 $u \in X$ 知可设存在 $M > 0$ 使得

$$\sup_{t \geq 0} e^{-kt}\|u(t)\|_E \leq M < \infty,$$

另外显见 $F(0_E) = 0_E$, 于是

$$\begin{aligned}
 \|\Phi u\|_X &\leq \|u_0\|_X + \left\| \int_0^t F(u(s)) ds \right\|_X \\
 &\leq \|u_0\|_X + \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t \|F(u(s))\|_E ds \\
 &\leq \|u_0\|_X + L \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t \|u(s)\|_E ds \\
 &\leq \|u_0\|_X + L \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t e^{ks} \sup_{s \geq 0} e^{-ks} \|u(s)\|_E ds \\
 &\leq \|u_0\|_X + ML \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t e^{ks} ds < \infty.
 \end{aligned}$$

因此 $\Phi u \in X$. 现在

$$\begin{aligned}
 \|\Phi u - \Phi v\|_X &= \left\| \int_0^t (F(u(s)) - F(v(s))) ds \right\|_X \\
 &\leq \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t \|F(u(s)) - F(v(s))\|_E ds \\
 &\leq L \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t \|u(s) - v(s)\|_E ds \\
 &\leq L \sup_{t \geq 0} e^{-kt} \int_0^t e^{ks} \sup_{s \geq 0} e^{-ks} \|u(s) - v(s)\|_E ds \\
 &= \frac{L}{k} \sup_{t \geq 0} (1 - e^{-kt}) \|u - v\|_X = \frac{L}{k} \|u - v\|_X.
 \end{aligned}$$

取 $k > L$, 则 Φ 是 X 中的压缩映射, 根据压缩映射原理 5.4 即知 Φ 在 X 中存在不动点 u , 而由 $X \subset C([0, +\infty); E)$ 可知 $u \in C([0, +\infty); E)$, 因此 u 是积分方程 (7.3) 的解, 而 u 能表成 Bochner 积分这件事自然意味着它对 t 一阶可微, 因此 u 也是方程 (7.2) 的解.

下面说明解的唯一性. 设 $u, \bar{u}$ 是方程 (7.2) 的两个解, 设

$$\varphi(t) = \|u(t) - \bar{u}(t)\|_E.$$

由 (7.3) 式知

$$\varphi(t) \leq L \int_0^t \varphi(s) ds, \quad \forall t \geq 0,$$

于是 Gronwall 不等式表明此时只能有 $\varphi \equiv 0$. □

前述定理在 ODE 的研究中非常有用, 但它在 PDE 的研究中用的很少, 这是因为微分算子往往不是 Lipschitz 映射. 因此我们给出求解演化方程的下述强力工具:

定理 7.2 (Hille-Yosida)

设 A 是极大单调算子, 则对任意给定的 $u_0 \in D(A)$ 而言, 存在唯一函数^a

$$u \in C^1([0, +\infty); H) \cap C([0, +\infty); D(A))$$

满足下述方程:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0, & t \in [0, +\infty) \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (7.4)$$

且

$$|u(t)| \leq |u_0|, \quad \left| \frac{du}{dt}(t) \right| = |Au(t)| \leq |Au_0|, \quad \forall t \geq 0.$$

^a其中 $D(A)$ 赋的是图范数 $\|v\|_H + \|Av\|_H$ 或与图范数等价的 Hilbert 范数 $(\|v\|_H^2 + \|Av\|_H^2)^{\frac{1}{2}}$.

注 7.4 Hille-Yosida 定理的主要威力在于只要 A 是单调算子 (这在实践中很容易验证, 尤其是对微分算子), 它就可以把“演化问题”的研究转化为“驻定问题” $u + Au = f$ 的研究.

证明 定理的证明主要分为六步.

第一步: 唯一性. 设 $u, \bar{u}$ 是方程(7.4)的两个解, 则

$$\left(\frac{d}{dt}(u - \bar{u}), (u - \bar{u}) \right) = -(A(u - \bar{u}), u - \bar{u}) \leq 0,$$

但另一方面有¹:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t) - \bar{u}(t)\|_H^2 = \left(\frac{d}{dt}(u(t) - \bar{u}(t)), u(t) - \bar{u}(t) \right).$$

因此函数 $t \mapsto |u(t) - \bar{u}(t)|$ 在 $[0, +\infty)$ 上不减. 又因为 $|u(0) - \bar{u}(0)| = 0$, 故

$$|u(t) - \bar{u}(t)| = 0, \quad \forall t \geq 0.$$

对于存在性的证明, 我们的思路是在方程(7.4)中用 A_λ 替换 A , 对替换后的方程用定理7.1, 再用与 λ 无关的估计得到 $\lambda \rightarrow 0$ 时的极限. 现设 u_λ 时下述初值问题的解:

$$\begin{cases} \frac{du_\lambda}{dt} + A_\lambda u_\lambda = 0, & t \in [0, +\infty), \\ u_\lambda(0) = u_0 \in D(A). \end{cases} \quad (7.5)$$

第二步: 估计 $|u_\lambda(t)|, \left| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right|$. 往证估计

$$|u_\lambda(t)| \leq |u_0|, \quad \forall t \geq 0, \forall \lambda > 0 \quad (7.6)$$

$$\left| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right| = |A_\lambda u_\lambda(t)| \leq |A u_0|, \quad \forall t \geq 0, \forall \lambda > 0. \quad (7.7)$$

为此我们考虑下述引理:

引理 7.1

设 $w \in C^1([0, +\infty); H)$ 是满足下述方程的函数:

$$\frac{dw}{dt} + A_\lambda w = 0, \quad t \in [0, +\infty) \quad (7.8)$$

则函数 $t \mapsto |w(t)|, t \mapsto \left| \frac{dw}{dt}(t) \right| = |A_\lambda w(t)|$ 在 $[0, +\infty)$ 上不减.

现在证明引理7.1. 知

$$\left(\frac{dw}{dt}, w \right) + (A_\lambda w, w) = 0.$$

根据 Yosida 逼近的性质7.2(vi) 知 $(A_\lambda w, w) \geq 0$, 因此只能有 $\left(\frac{dw}{dt}, w \right) \leq 0$, 亦即 $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_H^2 \leq 0$, 从而 $\|w(t)\|_H$ 不减. 另一方面, 因为 A_λ 是有界线性算子, 故

$$\begin{aligned} \frac{d^2 w}{dt^2}(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{dw}{dt}(t+h) - \frac{dw}{dt}(t)}{h} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A_\lambda w(t+h) - A_\lambda w(t)}{h} \\ &= -A_\lambda \left(\frac{dw}{dt}(t) \right) \end{aligned}$$

因此 $w \in C^1([0, +\infty); H) \Rightarrow w \in C^2([0, +\infty); H)$, 归纳可得 $w \in C^\infty([0, +\infty); H)$. 且上式表明

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dw}{dt} \right) + A_\lambda \left(\frac{dw}{dt} \right) = 0.$$

将上式两端与 $\frac{dw}{dt}$ 作内积, 与前文同理可得 $\left\| \frac{dw}{dt} \right\|_H$ 不减. 事实上对任意 $k \in \mathbb{N}$ 而言, 函数 $\left\| \frac{d^k w}{dt^k}(t) \right\|_H$ 都是不减的. 引理证毕.

根据上述引理与 Yosida 逼近的性质7.2(iii) 立得(7.6),(7.7)式.

¹注意当 $\varphi \in C^1([0, +\infty); H)$ 时必有 $\|\varphi\|_H^2 \in C^1([0, +\infty); \mathbb{R})$, 且 $\frac{d}{dt} \|\varphi\|_H^2 = 2 \left(\frac{d\varphi}{dt}, \varphi \right)$.

第三步: $u_\lambda(t)$ 的收敛性. 往证对任意 $t \geq 0$ 而言, $u_\lambda(t)$ 在 $\lambda \rightarrow 0$ 时均收敛, 记该极限为 $u(t)$. 另外这一收敛在任意有界区间 $[0, T]$ 上都是一致的.

对任意 $\lambda, \mu > 0$, 知

$$\frac{du_\lambda}{dt} - \frac{du_\mu}{dt} + A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu = 0,$$

因此

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_\lambda(t) - u_\mu(t)\|_H^2 + (A_\lambda u_\lambda(t) - A_\mu u_\mu(t), u_\lambda(t) - u_\mu(t)) = 0. \quad (7.9)$$

简便起见我们把 $u(t)$ 就写成 u , 对上左式第二项利用 Yosida 逼近的性质 7.2(i) 有

$$\begin{aligned} (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, u_\lambda - u_\mu) &= (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, u_\lambda - J_\lambda u_\lambda + J_\lambda u_\lambda - J_\mu u_\mu + J_\mu u_\mu - u_\mu) \\ &= (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, \lambda A_\lambda u_\lambda - \mu A_\mu u_\mu) + (A(J_\lambda u_\lambda - J_\mu u_\mu), J_\lambda u_\lambda - J_\mu u_\mu) \\ &\geq (A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, \lambda A_\lambda u_\lambda - \mu A_\mu u_\mu). \end{aligned} \quad (7.10)$$

于是由 (7.7), (7.9), (7.10) 式知

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_\lambda - u_\mu\|^2 &= -(A_\lambda u_\lambda(t) - A_\mu u_\mu(t), u_\lambda(t) - u_\mu(t)) \\ &\leq -(A_\lambda u_\lambda - A_\mu u_\mu, \lambda A_\lambda u_\lambda - \mu A_\mu u_\mu) \\ &\leq \lambda \|A_\lambda u_\lambda\|_H^2 + (\lambda + \mu) \|A_\mu u_\mu\|_H \|A_\lambda u_\lambda\|_H + \mu \|A_\mu u_\mu\|_H^2 \\ &\leq 2(\lambda + \mu) \|Au_0\|_H^2. \end{aligned}$$

对上述不等式两端积分有

$$\|u_\lambda(t) - u_\mu(t)\|_H^2 \leq 4(\lambda + \mu)t \|Au_0\|_H^2,$$

即

$$\|u_\lambda(t) - u_\mu(t)\|_H \leq 2\sqrt{(\lambda + \mu)t} \|Au_0\|_H. \quad (7.11)$$

因此对每个取定的 $t \geq 0$ 而言, $\{u_\lambda(t)\}_{\lambda>0}$ 都是 $\lambda \rightarrow 0$ 时的 Cauchy 列, 由 H 的完备性知 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} u_\lambda(t)$ 存在, 记之为 $u(t)$. 现在在 (7.11) 式两端令 $\mu \rightarrow 0$ 可得

$$\|u_\lambda(t) - u(t)\|_H \leq 2\sqrt{\lambda t} \|Au_0\|_H.$$

故在每个有界区间 $[0, T]$ 上, $u_\lambda(t) \rightarrow u(t)$ 都是关于 t 一致的, 于是根据 $C[0, T]$ 的完备性知 $u \in C([0, T]; H)$ 对任意 $T > 0$ 均成立, 因此 $u \in C([0, +\infty); H)$.

第四步: $\frac{du_\lambda}{dt}$ 的收敛性. 设 $u_0 \in D(A^2)$ (即 $u_0 \in D(A^2), Au_0 \in D(A)$), 往证 $\lambda \rightarrow 0$ 时 $\frac{du_\lambda}{dt}(t)$ 能收敛到某极限, 且该收敛在每个有界区间 $[0, T]$ 上均一致.

设 $v_\lambda = \frac{du_\lambda}{dt}$, 则由引理 7.1 的证明可知 $\frac{dv_\lambda}{dt} + A_\lambda v_\lambda = 0$, 于是第三步的结果表明

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|v_\lambda - v_\mu\|_H^2 \leq (\|A_\lambda v_\lambda\|_H + \|A_\mu v_\mu\|_H)(\lambda \|A_\lambda v_\lambda\|_H + \mu \|A_\mu v_\mu\|_H). \quad (7.12)$$

由引理 7.1 知

$$\|A_\lambda v_\lambda(t)\|_H \leq \|A_\lambda v_\lambda(0)\|_H = \|A_\lambda A_\lambda u_0\|_H. \quad (7.13)$$

类似有

$$\|A_\mu v_\mu(t)\|_H \leq \|A_\mu v_\mu(0)\|_H = \|A_\mu A_\mu u_0\|_H. \quad (7.14)$$

又因为 $Au_0 \in D(A)$, 故根据 Yosida 逼近的性质 7.2(i), (ii) 知

$$A_\lambda A_\lambda u_0 = J_\lambda A J_\lambda A u_0 = J_\lambda J_\lambda A A u_0 = J_\lambda^2 A^2 u_0,$$

由 $\|J_\lambda\|_{L(H)} \leq 1$ 知

$$\|A_\lambda A_\lambda u_0\|_H \leq \|A^2 u_0\|_H, \quad \|A_\mu A_\mu u_0\|_H \leq \|A^2 u_0\|_H. \quad (7.15)$$

结合(7.12)-(7.15)式可知

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|v_\lambda - v_\mu\|_H^2 \leq 2(\lambda + \mu) \|A^2 u_0\|_H^2.$$

于是重复第三步的过程可知 $v_\lambda(t) = \frac{du_\lambda}{dt}(t)$ 在 $\lambda \rightarrow 0$ 时收敛到某极限, 且这一收敛在任意有界区间 $[0, T]$ 上关于 t 都是一致的.

第五步: 说明 u 是方程(7.4)的解. 设 $u_0 \in D(A^2)$, 第三步与第四步说明了对任意 $T < \infty$ 均有

$$\begin{cases} u_\lambda(t) \rightarrow u(t) (\lambda \rightarrow 0) \text{ 在 } [0, T] \text{ 上一致,} \\ \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{du_\lambda}{dt}(t) \text{ 存在且在 } [0, T] \text{ 上一致.} \end{cases}$$

因此 $u \in C^1([0, +\infty); H)$, 且在 $[0, T]$ 上总有 $\frac{du_\lambda}{dt}(t) \rightarrow \frac{du}{dt}(t) (\lambda \rightarrow 0)$ 关于 t 一致成立. 现在把(7.5)式重写为

$$\frac{du_\lambda}{dt}(t) + A(J_\lambda u_\lambda(t)) = 0. \quad (7.16)$$

根据极大单调算子的性质7.1(ii)知 A 的图是闭集, 因此对任意 $t \geq 0$ 而言, $u(t)$ 作为 $u_\lambda(t)$ 在 $D(A)$ 中的聚点也应在 $D(A)$ 中. 现在对每个 $t \geq 0$, 在(7.16)式中令 $\lambda \rightarrow 0$ 即得

$$\frac{du}{dt}(t) + Au(t) = 0.$$

最后, 因为 $u \in C^1([0, +\infty); H)$, 故函数 $t \mapsto Au(t) = -\frac{du}{dt}(t)$ 是 $[0, +\infty) \rightarrow H$ 的连续函数, 这说明函数 $t \mapsto u(t)$ 在范数 $\|\cdot\|_H + \|A \cdot\|_H$ 下连续, 因此 $u \in C([0, +\infty); D(A))$. 至此我们便得到了方程(7.4)的一个解, 且该解满足

$$\|u(t)\|_H \leq \|u_0\|_H, \quad \left\| \frac{du}{dt}(t) \right\|_H = \|Au(t)\|_H \leq \|Au_0\|_H, \quad \forall t \geq 0.$$

第六步: 减弱 $u_0 \in D(A^2)$ 的条件. 回到定理本身, 注意我们并没有限定 $u_0 \in D(A^2)$, 而是只知道 $u_0 \in D(A)$. 因此我们需要通过下述引理把条件减弱:

引理 7.2

设 $u_0 \in D(A)$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$ 均存在 $\bar{u}_0 \in D(A^2)$ 使得 $\|u_0 - \bar{u}_0\|_H < \varepsilon, \|Au_0 - A\bar{u}_0\|_H < \varepsilon$, 亦即 $D(A^2)$ 在图范数意义下在 $D(A)$ 中稠密.

现在证明引理7.2. 取 $\bar{u}_0 = J_\lambda u_0$, 其中 $\lambda > 0$ 待定. 知

$$\bar{u}_0 \in D(A), \quad \bar{u}_0 + \lambda A\bar{u}_0 = u_0.$$

于是 $A\bar{u}_0 \in D(A) \Rightarrow \bar{u}_0 \in D(A^2)$. 另一方面, 根据 Yosida 逼近的性质7.2(v),(i),(ii)知

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|J_\lambda u_0 - u_0\|_H = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} \|J_\lambda Au_0 - Au_0\|_H = 0, \quad J_\lambda Au_0 = AJ_\lambda u_0.$$

因此只需取 $\lambda > 0$ 即得欲证. 引理证毕.

回到定理7.2的证明. 现在对每个给定的 $u_0 \in D(A)$, 根据引理7.2知总可以找到 $D(A^2)$ 中的序列 $\{u_{0,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $u_{0,n} \rightarrow u_0, Au_{0,n} \rightarrow Au_0$. 根据第五步的结果可知对每个 $u_{0,n}$ 而言, 都存在 u_n 满足下述初值问题:

$$\begin{cases} \frac{du_n}{dt} + Au_n = 0, \quad t \in [0, +\infty) \\ u_n(0) = u_{0,n}. \end{cases} \quad (7.17)$$

于是对任意 $t \geq 0$ 有

$$\begin{aligned} \|u_n(t) - u_m(t)\|_H &\leq \|u_{0,n} - u_{0,m}\|_H \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty \\ \left\| \frac{du_n}{dt}(t) - \frac{du_m}{dt}(t) \right\|_H &\leq \|Au_{0,n} - Au_{0,m}\|_H \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

这说明存在 $u \in C^1([0, +\infty); H)$ 使得

$$\begin{aligned} u_n(t) &\rightarrow u(t) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上一致,} \\ \frac{du_n}{dt}(t) &\rightarrow \frac{du}{dt}(t) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上一致.} \end{aligned}$$

因为 A 是闭算子, 故 $u \in D(A)$, 因此在方程(7.17)中令 $n \rightarrow \infty$ 即知 u 满足方程(7.4), 再由方程(7.4)的成立即知 $u \in C([0, +\infty); D(A))$. $\square$

注 7.5 设 u_λ 是方程(7.5)的解:

- (a) 若假设 $u_0 \in D(A)$, 则根据第三步可知对每个 $t \geq 0$, $u_\lambda(t)$ 在 $\lambda \rightarrow 0$ 时都将收敛到某极限 $u(t)$. 我们实际上可以从这点出发直接证明 $u \in C^1([0, +\infty); H) \cap C([0, +\infty); D(A))$, 且 u 是方程(7.4)的解.
- (b) 若只假设 $u_0 \in H$, 则我们依旧可以说明对每个 $t \geq 0$, $u_\lambda(t)$ 在 $\lambda \rightarrow 0$ 时都收敛到某极限 $u(t)$, 但此时极限函数 $u(t)$ 可能对 $\forall t > 0$ 都不在 $D(A)$ 内, 且 $u(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上无处可微. 因此 $u(t)$ 此时并不是方程(7.4)的“经典”解. 事实上, 对这样的 u_0 而言, 方程(7.4)是没有经典解的, 不过我们可以把 u 看成方程(7.4)的“广义”解. 后面我们会说明这种情况在 A 是自伴算子时不会发生: 此时对每个 $u_0 \in H$ 而言 $u(t)$ 都是方程(7.4)的“经典”解, 就算 $u_0 \notin D(A)$ 也是如此.

注 7.6 对每个 $t \geq 0$, 考虑线性映射 $D(A) \ni u_0 \mapsto u(t) \in D(A)$, 其中 $u(t)$ 是 Hille-Yosida 定理断言存在的方程(7.4)的解. 因为 $\|u(t)\|_H \leq \|u_0\|_H$, 而 $D(A)$ 在 H 中稠密, 故该连续线性映射可以延拓为 $H \rightarrow H$ 的有界算子, 记之为² $S_A(t)$. 显见 $S_A(t)$ 具有下述性质:

- (a) 对每个 $t \geq 0$ 而言均有 $S_A(t) \in L(H)$, 且 $\|S_A(t)\|_{L(H)} \leq 1$,
- (b) 对 $\forall t_1, t_2 \geq 0$ 均有 $S_A(t_1 + t_2) = S_A(t_1) \circ S_A(t_2)$, 且 $S_A(0) = I$,
- (c) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \|S_A(t)u_0 - u_0\|_H = 0 (\forall u_0 \in H)$.

依赖于参数 $t \geq 0$ 且满足性质 (a)-(c) 的 $H \rightarrow H$ 算子族 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 就称为**压缩连续半群 (continuous semigroup of contractions)**.

Hille 和 Yosida 给出的一个惊人结果断言了压缩连续半群均可以用 $S_A(t)$ 刻画. 也就是说对给定的在 H 上的压缩连续半群 $S(t)$, 总存在唯一极大单调算子 A 使得对 $\forall t \geq 0$ 均有 $S(t) = S_A(t)$. 这表明极大单调算子与压缩连续半群之间存在双射.

注 7.7 设 A 是极大单调算子, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则初值问题

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au + \lambda u = 0, & t \in [0, +\infty) \\ u(0) = u_0, \end{cases}$$

可以通过下述过程转化为初值问题(7.5): 取

$$v(t) = e^{\lambda t} u(t),$$

则 v 满足

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} + Av = 0, & t \in [0, +\infty) \\ v(0) = u_0. \end{cases}$$

7.3 正则性

本节说明只要对初值 u_0 加一点额外条件, 就能让 Hille-Yosida 定理 7.2 中给出的方程(7.4)的解 u 比 $C^1([0, +\infty); H) \cap C([0, +\infty); D(A))$ 更加正则. 为此我们先归纳地定义空间

$$D(A^k) = \{v \in D(A^{k-1}) : Av \in D(A^{k-1})\},$$

其中 k 是整数, 且 $k \geq 2$. 显见 $D(A^k)$ 在赋下述内积后成为 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{D(A^k)} = \sum_{j=0}^k (A^j u, A^j v)_H,$$

该内积对应的范数为

$$\|u\|_{D(A^k)} = \left(\sum_{j=0}^k \|A^j u\|_H^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

²当然如果我们采用上一注 (b) 的想法, 允许映射的输出是方程(7.4)的广义解的话, 就可以直接在 H 上定义 $S_A(t)$ 为 $H \ni u_0 \mapsto u(t) \in H$.

定理 7.3

设 $u_0 \in D(A^k)$, 其中 k 是不小于 2 的整数, 则通过定理 7.2 得到的初值问题 (7.4) 的解 u 满足

$$u \in C^{k-j}([0, +\infty); D(A^j)), \quad \forall j = 0, 1, \dots, k.$$



证明 首先设 $k = 2$, 考察装备内积 $(u, v)_{D(A)}$ 的 Hilbert 空间 $H_1 = D(A)$. 根据 A 的极大单调性, 显见算子

$$A_1 : H_1 \supset D(A_1) = D(A^2) \rightarrow H_1, \quad u \mapsto A_1 u = Au$$

是 H_1 中的极大单调算子. 因此在空间 H_1 中对 A_1 应用 Hille-Yosida 定理 7.2 知存在函数

$$u \in C^1([0, +\infty); H_1) \cap C([0, +\infty); D(A_1))$$

满足

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + A_1 u = 0, & t \in [0, +\infty) \\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

特别地, u 也满足方程 (7.4), 因此根据解的唯一性知 u 实际上就是方程 (7.4) 的解. 现在只需说明 $u \in C^2([0, +\infty); H)$. 因为

$$A \in L(H_1, H), \quad u \in C^1([0, +\infty); H_1),$$

故 $Au \in C^1([0, +\infty); H)$, 且

$$\frac{d}{dt}(Au) = A \left(\frac{du}{dt} \right) \quad (7.18)$$

回到方程 (7.4), 由 $Au \in C^1([0, +\infty); H)$ 知 $\frac{du}{dt} \in C^1([0, +\infty); H)$, 因此 $u \in C^2([0, +\infty); H)$ 且

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{du}{dt} \right) + A \left(\frac{du}{dt} \right) = 0, \quad t \in [0, +\infty). \quad (7.19)$$

下面讨论 $k \geq 3$ 的一般情况, 我们对 k 使用归纳法: 设结果对直到 $k-1$ 的整数都成立, 取 $u_0 \in D(A^k)$. 根据前述分析可知方程 (7.4) 的解 $u \in C^2([0, +\infty); H) \cap C^1([0, +\infty); D(A))$, 且 u 满足 (7.19) 式. 设

$$v = \frac{du}{dt},$$

则

$$\begin{cases} v \in C^1([0, +\infty); H) \cap C([0, +\infty); D(A)), \\ \frac{dv}{dt} + Av = 0, & t \in [0, +\infty) \\ v(0) = -Au_0. \end{cases}$$

也就是说, v 是方程 (7.4) 对应初值 $v_0 = -Au_0$ 的解. 由 $u_0 \in D(A^k)$ 知 $v_0 \in D(A^{k-1})$, 于是根据归纳假设知

$$v \in C^{k-1-j}([0, +\infty); D(A^j)), \quad \forall j = 0, 1, \dots, k-1, \quad (7.20)$$

亦即

$$u \in C^{k-j}([0, +\infty); D(A^j)), \quad \forall j = 0, 1, \dots, k-1.$$

现在只需说明

$$u \in C([0, +\infty); D(A^k)). \quad (7.21)$$

在 (7.20) 式中取 $j = k-1$ 知

$$\frac{du}{dt} \in C([0, +\infty); D(A^{k-1})), \quad (7.22)$$

于是由 (7.22) 式与方程 (7.4) 知

$$Au \in C([0, +\infty); D(A^{k-1})),$$

这便是 (7.21) 式. □

7.4 自伴算子的情形

设 $A: H \supset D(A) \rightarrow H$ 是满足 $\overline{D(A)} = H$ 的无界线性算子, 在将 H^* 与 H 等同后, 我们就可以把 A^* 看成 H 中的无界线性算子.

定义 7.3 (对称算子 (symmetric operator), 自伴算子 (self-adjoint operator))

- 若 A 满足对 $\forall u, v \in D(A)$ 均有 $(Au, v) = (u, Av)$, 就称 A 是对称算子.
- 若 A 满足 $D(A^*) = D(A)$, $A^* = A$, 就称 A 是自伴算子.



注 7.8 对有界算子而言, 对称与自伴这两个概念是相同的. 但如果 A 无界, 则对称算子与自伴算子之间还是有些细微的差距. 显见任意自伴算子都是对称算子, 但反之不然: 算子 A 对称当且仅当 $A \subset A^*$ (即 $D(A) \subset D(A^*)$), 且在 $D(A)$ 上 $A^* = A$, 实际上 A 作为对称算子使得 $D(A) \neq D(A^*)$ 的情况是存在的. 我们的下一条结果表明只要 A 是极大单调算子, 那么

$$A \text{ 对称} \Leftrightarrow A \text{ 自伴}.$$

命题 7.3 (极大单调算子自伴与对称的等价性)

设 A 是极大单调对称算子, 则 A 自伴.



证明 记 $J_1 = (I + A)^{-1}$, 我们首先说明 J_1 自伴. 因为 $J_1 \in L(H)$, 故只需说明

$$(J_1 u, v) = (u, J_1 v), \quad \forall u, v \in H. \quad (7.23)$$

记 $u_1 = J_1 u, v_1 = J_1 v$, 则

$$u_1 + Au_1 = u,$$

$$v_1 + Av_1 = v.$$

因为 A 对称, 故 $(u_1, Av_1) = (Au_1, v_1)$, 因此 $(u_1, v) = (u, v_1)$, 这便是(7.23)式.

现设 $u \in D(A^*)$, 记 $f = u + A^*u$, 知

$$(f, v) = (u, v + Av), \quad \forall v \in D(A),$$

即

$$(f, J_1 w) = (u, w), \quad \forall w \in H.$$

其中 $w \in H$ 是因为 $R(I + A) = H$. 由上式可知 $u = J_1 f$, 因此 $u \in D(A)$, 故 $D(A^*) = D(A)$, 从而 A 自伴. $\square$

注 7.9 特别注意当 A 是单调算子 (乃至对称单调算子) 时, A^* 未必是单调算子. 不过我们可以证明下述等价:

A 是极大单调算子 $\Leftrightarrow A^*$ 是极大单调算子

$\Leftrightarrow A$ 是闭算子, $D(A)$ 在 H 中稠密, A, A^* 同时是单调算子.

定理 7.4 (自伴算子的 Hille-Yosida 定理)

设 A 是自伴极大单调算子, 则对每个 $u_0 \in H$ 均存在唯一函数

$$u \in C([0, +\infty); H) \cap C^1((0, +\infty); H) \cap C((0, +\infty); D(A))$$

满足

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0, & t \in (0, +\infty) \\ u(0) = u_0. \end{cases}$$

且有

$$\begin{aligned} \|u(t)\|_H &\leq \|u_0\|_H, \quad \left\| \frac{du}{dt}(t) \right\|_H = \|Au(t)\|_H \leq \frac{1}{t} \|u_0\|_H, \quad \forall t > 0, \\ u &\in C^k((0, +\infty); D(A^l)), \quad \forall k, l \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (7.24)$$

♡

注 7.10 我们这里强调一定理 7.4 与原本的 Hille-Yosida 定理 7.2 有何区别. 定理 7.4 减弱了 u_0 的条件 (这里只需要 $u_0 \in H$, 而定理 7.2 要求 $u_0 \in D(A)$), 且增强了方程 (7.4) 解在 $t = 0$ 之外的正则性. 但 $|\frac{du}{dt}(t)|$ 此时可能在 $t \rightarrow 0$ 时爆破.

证明 对于唯一性, 设 $u, \bar{u}$ 是初值问题的两个解, 由 A 的单调性可知 $\varphi(t) = \|u(t) - \bar{u}(t)\|_H^2$ 在 $(0, +\infty)$ 上不增. 另一方面, φ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且 $\varphi(0) = 0$, 因此 $\varphi \equiv 0$.

对于存在性, 我们分两步进行证明.

第一步: 通过增强 u_0 的条件得到结论. 设 $u_0 \in D(A^2)$, 则由 Hille-Yosida 定理 7.2 知方程 (7.4) 存在解 u . 下面说明

$$\left\| \frac{du}{dt}(t) \right\| \leq \frac{1}{t} \|u_0\|_H, \quad \forall t > 0. \quad (7.25)$$

根据极大单调算子的性质 7.1, 对 $\forall \lambda > 0$ 而言 λA 是极大单调算子, 而由 A 的自伴性显然可得 λA 的自伴性, 于是仿照命题 7.3 的证明可知

$$J_\lambda^* = J_\lambda, \quad \forall \lambda > 0$$

根据 A_λ 的构造进一步可知

$$A_\lambda^* = A_\lambda, \quad \forall \lambda > 0$$

回到证明 Hille-Yosida 定理 7.2 时给出的逼近初值问题:

$$\begin{cases} \frac{du_\lambda}{dt} + A_\lambda u_\lambda = 0, & t \in [0, +\infty) \\ u_\lambda(0) = u_0. \end{cases} \quad (7.26)$$

我们希望先对 u_λ 给出形如 (7.25) 式的估计, 再用极限过渡到 u 上. 为此将 (7.26) 式两端与 u_λ 作内积, 再在 $[0, T]$ 上积分, 可得

$$\frac{1}{2} \|u_\lambda(T)\|_H^2 + \int_0^T (A_\lambda u_\lambda, u_\lambda) dt = \frac{1}{2} \|u_0\|_H^2. \quad (7.27)$$

再将 (7.26) 式两端与 $t \frac{du_\lambda}{dt}$ 作内积并在 $[0, T]$ 上积分, 可得

$$\int_0^T \left\| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right\|_H^2 t dt + \int_0^T \left(A_\lambda u_\lambda(t), \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right) t dt = 0. \quad (7.28)$$

因为 $A_\lambda^* = A_\lambda$, 故

$$\frac{d}{dt} (A_\lambda u_\lambda, u_\lambda) = \left(A_\lambda \frac{du_\lambda}{dt}, u_\lambda \right) + \left(A_\lambda u_\lambda, \frac{du_\lambda}{dt} \right) = 2 \left(A_\lambda u_\lambda, \frac{du_\lambda}{dt} \right).$$

现在对 (7.28) 左式第二项分部积分有

$$\int_0^T \left(A_\lambda u_\lambda(t), \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right) t dt = \frac{1}{2} \int_0^T \frac{d}{dt} [(A_\lambda u_\lambda, u_\lambda)] t dt = \frac{1}{2} (A_\lambda u_\lambda(T), u_\lambda(T)) T - \frac{1}{2} \int_0^T (A_\lambda u_\lambda, u_\lambda) dt. \quad (7.29)$$

另一方面, 根据引理 7.1, 函数 $t \mapsto \left| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right|$ 不增, 因此

$$\int_0^T \left\| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right\|_H^2 t dt \geq \left\| \frac{du_\lambda}{dt}(T) \right\|_H^2 \frac{T^2}{2}. \quad (7.30)$$

综合 (7.27)-(7.30) 式知

$$\frac{1}{2} \|u_\lambda(T)\|_H^2 + T (A_\lambda u_\lambda(T), u_\lambda(T)) + T^2 \left\| \frac{du_\lambda}{dt}(T) \right\|_H^2 \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_H^2,$$

根据 A_λ 的单调性知上式表明

$$\left\| \frac{du_\lambda}{dt}(t) \right\|_H \leq \frac{1}{T} \|u_0\|_H, \quad \forall T > 0. \quad (7.31)$$

在(7.31)式中令 $\lambda \rightarrow 0$, 由 Hille-Yosida 定理 7.2 证明第五步给出的 $\frac{du_\lambda}{dt} \rightarrow \frac{du}{dt}$ 即得(7.25)式.

第二步: 减弱 u_0 的条件. 现在设 $u_0 \in H$. 引理 7.2 表明 $D(A^2)$ 在图范数意义下在 $D(A)$ 中稠密, 进而 $D(A^2)$ 在 $\|\cdot\|_H$ 意义下在 $D(A)$ 中稠密, 又因为 $D(A)$ 在 $\|\cdot\|_H$ 意义下在 H 中稠密, 故 $D(A^2)$ 在 $\|\cdot\|_H$ 意义下在 H 中稠密, 这说明存在 $\{u_{0,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A^2)$ 使得 $u_{0,n} \rightarrow u_0$. 设 u_n 是下述初值问题的解:

$$\begin{cases} \frac{du_n}{dt} + Au_n = 0, & t \in [0, +\infty) \\ u_n(0) = u_{0,n}. \end{cases}$$

由 Hille-Yosida 定理 7.2 证明的第六步知

$$\|u_n(t) - u_m(t)\|_H \leq \|u_{0,n} - u_{0,m}\|_H, \quad \forall m, n, \forall t \geq 0.$$

再由前述第一步的结果知

$$\left\| \frac{du_n}{dt}(t) - \frac{du_m}{dt}(t) \right\|_H \leq \frac{1}{t} \|u_{0,n} - u_{0,m}\|_H, \quad \forall m, n, \forall t > 0.$$

这说明 $u_n(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上关于 t 一致收敛到某极限 $u(t)$, $\frac{du_n}{dt}(t)$ 在任意形如 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 的区间上关于 t 一致收敛到 $\frac{du}{dt}(t)$. 因此极限函数 u 满足

$$u \in C([0, +\infty); H) \cap C^1((0, +\infty); H).$$

又因为 A 是闭算子, 故

$$\begin{cases} u_n(t) \rightarrow u(t), \forall t > 0 \\ \frac{du_n}{dt}(t) = -Au_n(t) \rightarrow \frac{du}{dt}(t), \forall t > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(t) \in D(A), \forall t > 0 \\ \frac{du}{dt}(t) = -Au(t), \forall t > 0 \end{cases}$$

因此 u 是方程(7.4)的解. 下面我们证明正则性结果(7.24), 考虑对 $k \geq 2$ 用归纳法, 说明

$$u \in C^{k-j}((0, +\infty); D(A^j)), \quad \forall j = 0, 1, \dots, k. \quad (7.32)$$

设(7.32)式对直到 $k-1$ 的整数均成立, 于是特别对 $k-1$ 有

$$u \in C((0, +\infty); D(A^{k-1})). \quad (7.33)$$

现在为了说明(7.32)式在 k 时也成立, 仿照定理 7.3 的证明知只需证明

$$u \in C((0, +\infty); D(A^k)) \quad (7.34)$$

即可. 考虑 Hilbert 空间 $\tilde{H} = D(A^{k-1})$ 与算子

$$\tilde{A} : \tilde{H} \supset D(\tilde{A}) = D(A^k) \rightarrow \tilde{H}, \quad u \mapsto \tilde{A}u = Au,$$

显见 $\tilde{A}$ 是 $\tilde{H}$ 中的极大单调对称算子, 因此它是自伴的. 对 $\tilde{A}$ 在 $\tilde{H}$ 中应用已经证明的定理 7.4 第一条断言知对任意给定的 $v_0 \in \tilde{H}$ 而言, 下述初值问题存在唯一解 v :

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} + \tilde{A}v = 0, & t \in (0, +\infty) \\ v(0) = v_0. \end{cases} \quad (7.35)$$

且

$$v \in C([0, +\infty); \tilde{H}) \cap C^1((0, +\infty); \tilde{H}) \cap C((0, +\infty); D(\tilde{A})).$$

根据(7.33)式, 不妨取 $v_0 = u(\varepsilon)$ ($\varepsilon > 0$), 这便得到 $u \in C((\varepsilon, +\infty); D(A^k))$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得欲证. $\square$

第八章 Banach 代数

8.1 代数的预备知识

定义 8.1 (代数 (algebra), 单位元 (unit), 含么代数 (unital algebra))

称 $\mathcal{A}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个代数, 如果

- (i) $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个线性空间,
- (ii) $\mathcal{A}$ 上定义了乘法映射 $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 使得对 $\forall a, b, c, d \in \mathcal{A}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 均有

$$(ab)c = a(bc),$$

$$(a+b)(c+d) = ac + bc + ad + bd,$$

$$(\lambda\mu)(ab) = (\lambda a)(\mu b).$$

若 $\mathcal{A}$ 中有元素 $e_{\mathcal{A}}$ 使得对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均有 $e_{\mathcal{A}}a = ae_{\mathcal{A}} = a$, 就称 $e_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的单位元 (或么元), 此时称 $\mathcal{A}$ 为含么代数.



注 8.1 当 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个代数时:

- (i) $\mathcal{A}$ 未必有单位元. 如果 $\mathcal{A}$ 有单位元, 则单位元必唯一, 这是因为若 $\widetilde{e_{\mathcal{A}}}$ 也是 $\mathcal{A}$ 的单位元, 则由单位元的定义知 $\widetilde{e_{\mathcal{A}}} = \widetilde{e_{\mathcal{A}}}e_{\mathcal{A}} = e_{\mathcal{A}}$.
- (ii) 设 $\mathcal{A}$ 有单位元, 若对 $a \in \mathcal{A}$ 而言存在 $b \in \mathcal{A}$ 使得

$$ab = ba = e_{\mathcal{A}},$$

就称 a 可逆, 称 b 为 a 的逆, 记为 a^{-1} . 如果 a 可逆, 那么 a 的逆唯一, 这是因为若 b_1, b_2 均为 a 的逆, 则

$$b_1 = b_1e_{\mathcal{A}} = b_1ab_2 = e_{\mathcal{A}}b_2 = b_2.$$

如果 $\mathcal{A}$ 中的每个非零元均可逆, 就称 $\mathcal{A}$ 为可除代数 (division algebra).

- (iii) 如果 $\mathcal{A}$ 的乘法满足交换律, 即对 $\forall a, b \in \mathcal{A}$ 均有 $ab = ba$, 就称 $\mathcal{A}$ 为交换代数 (commutative algebra).
- (iv) 若 $0_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的零元, 则对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均有 $0_{\mathcal{A}}a = (0_{\mathcal{A}} - 0_{\mathcal{A}})a = 0_{\mathcal{A}}a - 0_{\mathcal{A}}a = 0_{\mathcal{A}}$. 同理可证 $a0_{\mathcal{A}} = 0_{\mathcal{A}}$.

例 8.1 下面给出两个代数的简单例子.

- (i) $\mathbb{C}$ 关于复数乘法构成可除交换代数.
- (ii) $n \times n$ 复矩阵全体关于矩阵乘法构成含么不可交换代数.

定义 8.2 (同态 (homomorphism), 代数同构 (isomorphism))

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是两个代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是映射. 若对 $\forall a, b \in \mathcal{A}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 均有

$$\varphi(\lambda a + \mu b) = \lambda\varphi(a) + \mu\varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

就称 φ 是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 的同态. 若同态 φ 既单又满, 就称 φ 是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 的 (到上) 代数同构.



注 8.2 记 $0_{\mathcal{A}}, 0_{\mathcal{B}}$ 分别是 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的零元. 若 φ 是同态, 则 $\varphi(0_{\mathcal{A}}) = 0_{\mathcal{B}}$. 这是因为 $\varphi(0_{\mathcal{A}}) = \varphi(0_{\mathcal{A}} + 0_{\mathcal{A}}) = \varphi(0_{\mathcal{A}}) + \varphi(0_{\mathcal{A}})$, 由此即得 $\varphi(0_{\mathcal{A}}) = 0_{\mathcal{B}}$.

定义 8.3 (子代数 (subalgebra))

设 $\mathcal{A}$ 是代数, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子空间. 若 $\mathcal{B}$ 对乘法封闭, 就称 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子代数.



命题 8.1

若 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是同态, 则 $\mathcal{A}$ 的子代数在 φ 下的像是 $\mathcal{B}$ 的子代数. 特别地, $\varphi(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}$ 的一个子代数. 

证明 设 $\mathcal{A}_1$ 是 $\mathcal{A}$ 的子代数, 因为 φ 保持线性运算, 故 $\varphi(\mathcal{A}_1)$ 是 $\mathcal{B}$ 的线性子空间, 下面说明 $\varphi(\mathcal{A}_1)$ 对乘法封闭. 设 $c, d \in \varphi(\mathcal{A}_1)$, 知存在 $a, b \in \mathcal{A}_1$ 使得 $c = \varphi(a), d = \varphi(b)$. 因为 φ 是同态, 故 $cd = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab)$. 因为 $\mathcal{A}_1$ 本身作为子代数对乘法封闭, 故 $ab \in \mathcal{A}_1$, 从而 $cd \in \varphi(\mathcal{A}_1)$, 即 $\varphi(\mathcal{A}_1)$ 对乘法封闭. $\square$

注 8.3 对于无单位元的代数 $\mathcal{A}$, 可以构造一个含幺代数 $\widehat{\mathcal{A}}$ 使得 $\mathcal{A}$ 代数同构于 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的一个子代数. 因此在代数同构的意义下, 无单位元的代数总可以增添单位元.

事实上, 令 $\widehat{\mathcal{A}} := \mathcal{A} \times \mathbb{C}$, 规定 $\widehat{\mathcal{A}}$ 上的代数运算如下:

$$\begin{cases} \alpha(a, \lambda) = (\alpha a, \alpha \lambda), \\ (a, \lambda) + (b, \mu) = (a + b, \lambda + \mu), \\ (a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda \mu), \end{cases}$$

其中 $(a, \lambda), (b, \mu) \in \widehat{\mathcal{A}}, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 则可以证明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是代数, 且其单位元为

$$e_{\widehat{\mathcal{A}}} = (0_{\mathcal{A}}, 1).$$

下面说明 $\mathcal{A}$ 同构于 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的一个子代数. 事实上, 令

$$\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \widehat{\mathcal{A}}, \quad a \mapsto \varphi(a) := (a, 0),$$

下面说明 φ 同时是同态与单射. 事实上, 若 $\varphi(a) = (0_{\mathcal{A}}, 0)$, 则 $(a, 0) = (0_{\mathcal{A}}, 0)$, 故 $a = 0_{\mathcal{A}}$, 从而 φ 是单射. 又对 $\forall a, b \in \mathcal{A}$ 有

$$\varphi(a)\varphi(b) = (a, 0)(b, 0) = (ab, 0) = \varphi(ab)$$

故 φ 是同态. 因此 $\mathcal{A}$ 同构于 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的子代数 $\varphi(\mathcal{A})$. $\square$

命题 8.2 (同态的判别及其在单位元和可逆元上的作用)

设 φ 是 $\mathbb{C}$ 上代数 $\mathcal{A}$ 的一个非零线性泛函, 满足

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

则 φ 是 $\mathcal{A}$ 上的复同态, 且

- (i) 若 $\mathcal{A}$ 有单位元 $e_{\mathcal{A}}$, 则 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$;
 - (ii) 对 $\mathcal{A}$ 中的任意可逆元 a 均有 $\varphi(a) \neq 0$.
- 

证明 (i) 因为 $\langle \varphi, e_{\mathcal{A}}^2 \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = [\varphi(e_{\mathcal{A}})]^2$, 故 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = [\varphi(e_{\mathcal{A}})]^2$, 这说明要么 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 要么 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 0$. 若 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 0$, 则对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均有

$$\varphi(a) = \langle \varphi, ae_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \varphi(a)\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 0,$$

这与 φ 的非零性矛盾! 故 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$.

(ii) 由 (i) 知对 $a \in \mathcal{A}$ 而言, 若 a 有逆元 a^{-1} , 则

$$1 = \varphi(e_{\mathcal{A}}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}),$$

因此 $\varphi(a) \neq 0$. $\square$

定义 8.4 (理想 (ideal))

设 $\mathcal{A}$ 是代数, 若 $\mathcal{J}$ 作为 $\mathcal{A}$ 的子代数满足:

- (i) 对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均有 $a\mathcal{J} \subset \mathcal{J}, \mathcal{J}a \subset \mathcal{J}$, 其中 $a\mathcal{J} = \{ax : x \in \mathcal{J}\}, \mathcal{J}a = \{xa : x \in \mathcal{J}\}$.
- (ii) $\mathcal{J} \neq \mathcal{A}$,

就称 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的双边理想, 简称理想. 

注 8.4

- (i) 若 $\mathcal{A}$ 是非零代数, 则 $\mathcal{A}$ 总存在理想 $\mathcal{I} = \{0_{\mathcal{A}}\}$.
- (ii) 若 $\mathcal{A}$ 是交换代数, 则理想的双边定义可改为单边: $\forall a \in \mathcal{I} (a\mathcal{I} \subset \mathcal{I})$.
- (iii) 理想某种意义上刻画了 $\mathcal{A}$ 中的不可逆元, 这件事会在命题 8.4 中具体说明.

命题 8.3

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是非平凡同态 (即 $\varphi(\mathcal{A}) \neq \{0_{\mathcal{B}}\}$), 则 φ 的核 $\ker \varphi := \varphi^{-1}(\{0_{\mathcal{B}}\})$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想.

证明 首先说明 $\ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子代数. 因为 φ 是同态, 故对 $\forall a, b \in \ker \varphi, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 均有

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda a + \mu b) &= \lambda \varphi(a) + \mu \varphi(b) = 0_{\mathcal{B}}, \\ \varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b) = 0_{\mathcal{B}},\end{aligned}$$

因此 $\ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的子代数.

下面说明 $\ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想. 由 φ 的非平凡性知

$$\ker \varphi \neq \mathcal{A}.$$

又对 $\forall a \in \mathcal{A}, \forall x \in \ker \varphi$, 由 φ 为同态知

$$\begin{aligned}\varphi(ax) &= \varphi(a)\varphi(x) = 0_{\mathcal{B}}, \\ \varphi(xa) &= \varphi(x)\varphi(a) = 0_{\mathcal{B}},\end{aligned}$$

故

$$a(\ker \varphi) \subset \ker \varphi, (\ker \varphi)a \subset \ker \varphi.$$

因此 $\ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想. □

命题 8.4 (理想的不可除性)

设含么代数 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想, 则

- (i) $e_{\mathcal{A}} \notin \mathcal{I}$,
- (ii) 若 $a \in \mathcal{A}$ 有逆元, 则 $a \notin \mathcal{I}$.

证明 (i) 若 $e_{\mathcal{A}} \in \mathcal{I}$, 则根据理想的定义知对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$a = ae_{\mathcal{A}} \in \mathcal{I},$$

于是 $\mathcal{I} = \mathcal{A}$, 这与定义矛盾!

(ii) 若 $a \in \mathcal{I}$ 有逆元, 则 $e_{\mathcal{A}} = aa^{-1} \in \mathcal{I}$, 这与 (i) 矛盾! □

推论 8.1

设含么代数 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, $\mathcal{J}$ 为 $\mathcal{A}$ 的子代数, 且对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$a\mathcal{J} \subset \mathcal{J} \text{ (或 } \mathcal{J}a \subset \mathcal{J}),$$

则下述三个命题等价:

- (i) $\mathcal{J} \neq \mathcal{A}$;
- (ii) $e_{\mathcal{A}} \notin \mathcal{J}$;
- (iii) 若 a 可逆, 则 $a \notin \mathcal{J}$.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 若 $e_{\mathcal{A}} \in \mathcal{J}$, 则对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有 $a = ae_{\mathcal{A}} \in a\mathcal{J} \subset \mathcal{J}$, 这说明 $\mathcal{A} \subset \mathcal{J}$, 从而 $\mathcal{J} = \mathcal{A}$, 这与 (i) 矛盾!

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 若存在可逆元 a 使得 $a \in \mathcal{J}$, 则 $e_{\mathcal{A}} = a^{-1}a \in \mathcal{J}$, 这与 (ii) 矛盾!

(iii) $\Rightarrow$ (i): 若 $\mathcal{J} = \mathcal{A}$, 则 $e_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A} = \mathcal{J}$, 于是对可逆元 a 有 $a = ae_{\mathcal{A}} \in \mathcal{J}$, 这与 (iii) 矛盾! □

定义 8.5 (商代数 (quotient algebra))

设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想, 定义商空间 $\mathcal{B} := \mathcal{A} / \mathcal{J}$ 为等价类 $[a] := \{b \in \mathcal{A} : b - a \in \mathcal{J}\}$ 构成的全体. 在 $\mathcal{B}$ 上赋代数运算:

$$\lambda[a] := [\lambda a], \quad (8.1)$$

$$[a] + [b] := [a + b], \quad (8.2)$$

$$[a][b] := [ab], \quad (8.3)$$

其中 $a, b \in \mathcal{B}, \lambda \in \mathbb{C}$. 则 $\mathcal{B}$ 是代数, 称为 $\mathcal{A}$ 关于理想 $\mathcal{J}$ 的商代数.

**注 8.5**

- (i) 在一些运算验证的方法中会提到(8.1),(8.2)能合成为 $\lambda[a] + \mu[b] = [\lambda a + \mu b]$, 如果按照合成的单个式子倒是也可以定义加法和数乘¹, 不过在提代数上的加法和数乘的时候一般都是分开提, 这是线性空间作为数域上的模所蕴含的定义.
- (ii) 在上述定义中, 等价元 $[a]$ 的定义还能写成

$$[a] = a + \mathcal{J} = \{a + b : b \in \mathcal{J}\}.$$

- (iii) 商代数是良定义的, 为此我们只需说明运算(8.1)-(8.3)良定义. 任取 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}, a_1, a_2 \in [a], b_1, b_2 \in [b]$, 因为 $\mathcal{J}$ 是子代数, 故

$$\lambda a_1 + \mu b_1 - (\lambda a_2 + \mu b_2) = \lambda(a_1 - a_2) + \mu(b_1 - b_2) \in \mathcal{J}.$$

因此 $[\lambda a_1 + \mu b_1] = [\lambda a_2 + \mu b_2]$, 故(8.1),(8.2)良定义. 另一方面, 对于乘法知

$$a_1 b_1 - a_2 b_2 = (a_1 - a_2)b_1 + a_2(b_1 - b_2) \in \mathcal{J},$$

因此 $[a_1 b_1] = [a_2 b_2]$, 故(8.3)良定义.

代数 $\mathcal{A}$ 到商代数 $\mathcal{A} / \mathcal{J}$ 有自然映射

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} / \mathcal{J}, a \mapsto [a].$$

显见 φ 是线性的, 且对 $\forall a, b \in \mathcal{A}$ 有

$$\varphi(ab) = [ab] = [a][b] = \varphi(a)\varphi(b),$$

因此 φ 是同态. 又因为 $\mathcal{J} \neq \mathcal{A}$, 故 φ 是非平凡的²(即 φ 不是零映射).

为预备极大理想的介绍, 这里先介绍偏序集及其性质.

定义 8.6

设 A 为一个集合, $<$ 为 A 上的一个关系.

(I) 若对 $\forall a, b, c \in A$ 有

(i) 自反性: $a < a$,

(ii) 反对称性: $a < b \wedge b < a \Rightarrow a = b$,

(iii) 传递性: $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$.

则称 $<$ 为 A 的一个偏序, 此时称 $(A, <)$ 为偏序集.

(II) 设 $(A, <)$ 为偏序集, 若对 $\forall a, b \in A$ 均有 $a < b$ 或 $b < a$, 则称 $(A, <)$ 为全序集.

(III) 若对 $\forall b \in A$ 均有 $a < b \Rightarrow a = b$, 则称 $a \in A$ 为 A 的极大元.

(IV) 设 $B \subset A$. 若存在 $a \in A$ 使得 $\forall b \in B (b < a)$, 则称 a 为 B 的上界.



¹这是因为如果把合成式看成算子 $\mathcal{L} : (\mathbb{C} \times \mathcal{B}) \times (\mathbb{C} \times \mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{B}, \mathcal{L}((\lambda, [a]), (\mu, [b])) = [S(M_{\mathbb{C}}(\lambda, a), M_{\mathbb{C}}(\mu, b))]$ 的定义式, 就可以考虑加法 $S_{\mathcal{B}} : \mathcal{B} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}, ([a], [b]) \mapsto S_{\mathcal{B}}([a], [b]) := \mathcal{L}((1, [a]), (1, [b])) = [a + b]$ 和数乘 $M_{\mathcal{B}, \mathbb{C}}(\lambda, [a]) : \mathbb{C} \times \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}, (\lambda, [a]) \mapsto M_{\mathcal{B}, \mathbb{C}}(\lambda, [a]) := \mathcal{L}((\lambda, [a]), (0, 0_{\mathcal{A}})) = [\lambda a]$.

²若 φ 平凡, 即 $\varphi = 0_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} / \mathcal{J}}$, 则 $\varphi^{-1}([0_{\mathcal{A}}]) = \mathcal{A}$, 这说明对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均有 $[a] = [0_{\mathcal{A}}]$, 亦即 $a \in \mathcal{J}$, 这与 $\mathcal{J}$ 作为理想所满足的 $\mathcal{A} \neq \mathcal{J}$ 矛盾!

命题 8.5

若 $(A, <)$ 为全序集, $a \in A$, 则下述三条结论等价:

- (i) $a \in A$ 为 A 的极大元;
- (ii) 对 $\forall b \in A$ 均有 $b < a$;
- (iii) 对 $\forall b \in A$ 且 $b \neq a$, 均有 $b < a$.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 显见 $a < a$. 对任意 $\forall b \in A$, 若 $b \neq a$, 则必有 $b < a$, 否则只要存在 $b_0 \in A$ 使得 $b_0 \neq a \wedge a < b_0$, 由 a 是极大元知只能有 $b_0 = a$, 矛盾! 故 $b < a$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 显见.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 若对 $\forall b \in A$ 且 $b \neq a$ 均有 $b < a$, 设 a 并非 A 的极大元, 则 $\exists b_0 \in A (a < b_0 \wedge b_0 \neq a)$, 又由 (iii) 知 $b_0 < a$, 故只能有 $b_0 = a$, 矛盾! 故 a 只能是 A 的极大元. $\square$

下面再回顾 Zorn 引理.

引理 8.1 (Zorn)

设 A 为偏序集, 若 A 的每个全序子集均有一个上界, 则 A 有极大元.

**定义 8.7 (极大理想 (maximal ideal))**

设 $\mathcal{J}$ 是代数 $\mathcal{A}$ 的一个理想. 若对 $\mathcal{A}$ 的任意理想 $\widetilde{\mathcal{J}}$ 而言, 只要 $\mathcal{J} \subset \widetilde{\mathcal{J}}$, 就有 $\mathcal{J} = \widetilde{\mathcal{J}}$, 则称 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想.

**定理 8.1**

设代数 $\mathcal{A}$ 有单位元 $e_{\mathcal{A}}$, 则它的每个理想 $\mathcal{J}$ 都含于某极大理想中.



注 8.6 因为非零代数 $\mathcal{A}$ 总存在理想 $\mathcal{J} = \{0_{\mathcal{A}}\}$, 故由定理 8.1 可知非零代数总有极大理想.

证明 设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想, 记

$$\mathcal{P} := \{\mathcal{B} \subset \mathcal{A} : \mathcal{B} \text{ 是理想, 且 } \mathcal{J} \subset \mathcal{B}\}.$$

在集合 $\mathcal{P}$ 上按照集合包含关系定义偏序: 若 $J_1 \subset J_2$, 则 $J_1 < J_2$, 此时 $(\mathcal{P}, <)$ 是偏序集.

现在要说明存在包含 $\mathcal{J}$ 的极大理想, 只需说明 $(\mathcal{P}, <)$ 存在极大元. 根据 Zorn 引理 8.1, 只需说明 $\mathcal{P}$ 的每个全序子集在 $\mathcal{P}$ 中均有上界即可. 现设 $\{J_{\lambda} : \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathcal{P}$ 的一个全序子集 (其中 Λ 是指标集), 令

$$J_0 := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_{\lambda}.$$

为说明 J_0 是该全序集的上界, 只需说明 J_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想.

首先说明 J_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个子代数. 任取 $a, b \in J_0, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 根据 J_0 的定义知存在 $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ 使得 $a \in J_{\lambda_1}, b \in J_{\lambda_2}$. 因为 $\{J_{\lambda} : \lambda \in \Lambda\}$ 是全序集, 故要么 $J_{\lambda_1} \subset J_{\lambda_2}$, 要么 $J_{\lambda_2} \subset J_{\lambda_1}$, 不妨设 $J_{\lambda_1} \subset J_{\lambda_2}$, 则 $a, b \in J_{\lambda_2}$. 由 J_{λ_2} 是子代数知

$$\lambda a + \mu b \in J_{\lambda_2} \subset J_0,$$

且 $ab \in J_{\lambda_2} \subset J_0$, 故 J_0 是子代数.

下面说明 J_0 是理想. 一方面对 $\forall a \in \mathcal{A}, \forall \lambda \in \Lambda$, 由 J_{λ} 是理想知 $aJ_{\lambda} \subset J_{\lambda}, J_{\lambda}a \subset J_{\lambda}$, 因此 $aJ_0 \subset J_0, J_0a \subset J_0$. 另一方面, 对 $\forall \lambda \in \Lambda$, 因为 J_{λ} 是理想, 故由理想的不可除性 8.4 知 $e_{\mathcal{A}} \notin J_{\lambda}$, 于是 $e_{\mathcal{A}} \notin J_0$, 于是推论 8.1 表明 $J_0 \neq \mathcal{A}$, 故 J_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想. $\square$

利用理想的不可除性和极大理想的极大性可得下述定理:

定理 8.2

设交换代数 $\mathcal{A}$ 有单位元 $e_{\mathcal{A}}$, 则

- (i) $a \in \mathcal{A}$ 属于 $\mathcal{A}$ 的某一个理想当且仅当 a^{-1} 不存在.
- (ii) $\mathcal{A}$ 的理想 $\mathcal{J}$ 极大当且仅当商代数 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 是可除代数.



证明 (i) 由理想的不可除性 8.4 知 $a \in \mathcal{A}$ 在某理想内 $\Rightarrow a^{-1}$ 不存在. 下面说明充分性, 令

$$\mathcal{J}_a := a\mathcal{A},$$

因为 a^{-1} 不存在, 故 $e_{\mathcal{A}} \notin \mathcal{J}_a$, 否则存在 $b \in \mathcal{A}$ 使得 $ab = e_{\mathcal{A}}$, 又由 $\mathcal{A}$ 可交换知 $ba = ab = e_{\mathcal{A}}$, 这说明 $a^{-1} = b$, 与 a^{-1} 不存在矛盾. 现在推论 8.1 表明 $\mathcal{J}_a \neq \mathcal{A}$, 注意到对 $\forall g \in \mathcal{A}$ 有

$$\mathcal{J}_a g = a\mathcal{A}g \subset a\mathcal{A} = \mathcal{J}_a,$$

由 $\mathcal{A}$ 可交换与 $\mathcal{J}_a$ 的构造知 $\mathcal{J}_a$ 是理想, 且 $a = ae_{\mathcal{A}} \in \mathcal{J}_a$, 故 a 确实在理想 $\mathcal{J}_a$ 中.

(ii) 先证必要性. 设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 但 $\mathcal{B} := \mathcal{A}/\mathcal{J}$ 不是可除代数. 根据可除代数的定义知存在 $[b] \in \mathcal{B}$ 满足 $[b] \neq 0_{\mathcal{B}}$ (即 $b \notin \mathcal{J}$), 且 $[b]$ 不可逆. 现令 $\mathcal{J}_b = [b]\mathcal{B}$, 由 $\mathcal{A}$ 可换知 $\mathcal{B}$ 可换, 于是重复 (i) 的证明可知 $\mathcal{J}_b$ 是 $\mathcal{B}$ 的一个理想, 且 $[b] \in \mathcal{J}_b$. 作商代数 $\mathcal{B}/\mathcal{J}_b$, 知存在自然映射 φ, ψ 满足:

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{A}/\mathcal{J} \xrightarrow{\psi} \mathcal{B}/\mathcal{J}_b,$$

因为 $\mathcal{J} \subsetneq \mathcal{A}$, 故任取 $b \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{J}$ 知 $[b] \neq [0_{\mathcal{A}}]$, 从而 $\varphi(b) = [b] \neq [0_{\mathcal{A}}]$, 这说明 φ 是非平凡同态, 同理, 由 $\mathcal{J}_b \subsetneq \mathcal{B}$ 知任取 $[a] \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{J}_b$ (其中 $a \in \mathcal{A}$), 则 $[[a]] \neq [[0_{\mathcal{A}}]]$, 且

$$\psi \circ \varphi(a) = \psi([a]) = [[a]] \neq [[0_{\mathcal{A}}]],$$

因此 $\psi \circ \varphi$ 非平凡. 由命题 8.3 知 $\ker(\psi \circ \varphi), \ker \varphi$ 均为 $\mathcal{A}$ 的理想. 现在分别记 $\mathcal{A}, \mathcal{A}/\mathcal{J}, \mathcal{B}/\mathcal{J}_b$ 的零元为 $0_{\mathcal{A}}, [0_{\mathcal{A}}], [[0_{\mathcal{A}}]]$. 若 $a \in \ker \varphi$, 则由 $\varphi(a) = [0_{\mathcal{A}}]$ 知

$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi(a) &= \psi([0_{\mathcal{A}}]) = [0_{\mathcal{A}}] + \mathcal{J}_b = [b][0_{\mathcal{A}}] + \mathcal{J}_b \\ &= [b]([0_{\mathcal{A}}] + \mathcal{B}) = [b]\mathcal{B} = \mathcal{J}_b = [[0_{\mathcal{A}}]], \end{aligned}$$

故 $a \in \ker(\psi \circ \varphi)$, 于是 $\ker \varphi \subset \ker(\psi \circ \varphi)$. 此外注意到 $[[0_{\mathcal{A}}]] = \mathcal{J}_b$, 又由 $[b] \in \mathcal{J}_b$ 知 $[[b]] = [b] + \mathcal{J}_b = \mathcal{J}_b = [[0_{\mathcal{A}}]]$, 故

$$\psi \circ \varphi(b) = \psi([b]) = [[0_{\mathcal{A}}]].$$

因此 $b \in \ker(\psi \circ \varphi)$, 同时 $b \notin \mathcal{J} = \ker \varphi$. 这说明 $\mathcal{J} \subsetneq \ker(\psi \circ \varphi)$, 即 $\mathcal{J}$ 并非极大理想, 矛盾!

再证充分性. 设 $\mathcal{B} := \mathcal{A}/\mathcal{J}$ 是可除代数, 但 $\mathcal{J}$ 不是极大理想. 知存在 $\mathcal{A}$ 的理想 $\mathcal{J}_1 \supsetneq \mathcal{J}$ 与非零元 $a \in \mathcal{J}_1 \setminus \mathcal{J}$. 记 $[a]$ 为 a 在 $\mathcal{B}$ 中对应的等价类, 则

$$[a] \neq [0_{\mathcal{A}}].$$

由 $\mathcal{B}$ 可除知 $[a]$ 有逆元 $[b] := [a]^{-1} \in \mathcal{B}$, 于是

$$[ba] = [ab] = [a][b] = [e_{\mathcal{A}}],$$

即 $e_{\mathcal{A}} - ba \in \mathcal{J}$, 从而 $e_{\mathcal{A}} - ba \in \mathcal{J}_1$. 又因为 $a \in \mathcal{J}_1$, 故 $ba \in \mathcal{J}_1$, 这说明 $e_{\mathcal{A}} \in \mathcal{J}_1$, 但这就说明 $\mathcal{J}_1$ 不是理想, 矛盾! $\square$

下述命题是代数中极大理想的经典判别法.

命题 8.6 (极大理想的判别法)

设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想, 则 $\mathcal{J}$ 极大当且仅当 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 没有非零理想.



证明 先证必要性. 设 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 若 $\mathcal{B} := \mathcal{A}/\mathcal{J}$ 有非零理想 $\mathcal{J}_0$, 作自然映射

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{A}/\mathcal{J} \xrightarrow{\psi} \mathcal{B}/\mathcal{J}_0,$$

类似于定理8.2的证明可知 $\ker \varphi, \ker(\psi \circ \varphi)$ 均为 $\mathcal{A}$ 的理想, 且

$$\mathcal{J} = \ker \varphi \subset \ker(\psi \circ \varphi).$$

因为 $\mathcal{J}_0$ 非零, 故存在 $[b] \in \mathcal{A}/\mathcal{J}$ 满足 $[b] \neq [0_{\mathcal{A}}], [b] \in \mathcal{J}_0$. 由此知存在 $b \in [b]$ 使得 $b \notin \mathcal{J} = \ker \varphi$, 但

$$\psi \circ \varphi(b) = \psi([b]) = [[b]] = [[0_{\mathcal{A}}]],$$

于是

$$\mathcal{J} = \ker \varphi \subsetneq \ker(\psi \circ \varphi),$$

这与 $\mathcal{J}$ 极大矛盾! 故 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 无非零理想.

再证充分性³. 设 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 没有非零理想, 往证 $\mathcal{J}$ 极大. 用反证法, 若存在 $\mathcal{A}$ 的理想 $\mathcal{J}_1$ 使得 $\mathcal{J} \subsetneq \mathcal{J}_1$, 令 $\mathcal{B}_1 := \mathcal{J}_1/\mathcal{J}$, 则 $\mathcal{B}_1$ 非零. 只要说明了 $\mathcal{B}_1$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 的非零理想, 就能得到矛盾. 现在为证 $\mathcal{B}_1$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 的非零理想, 由 $\mathcal{B}_1$ 的定义显见 $\mathcal{B}_1$ 是代数. 由 $\mathcal{J}_1$ 是理想知 $\mathcal{J}_1 \neq \mathcal{A}$, 于是存在 $a \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{J}_1$, 进而 $a \notin \mathcal{J}$. 由此可知 $[a] \notin \mathcal{B}_1 = \mathcal{J}_1/\mathcal{J}$, 否则存在 $b \in \mathcal{J}_1$ 使得 $[a] = b + \mathcal{J}$, 从而 $a - b \in \mathcal{J} \subset \mathcal{J}_1$, 由 $\mathcal{J}_1$ 是理想知 $a \in \mathcal{J}_1$, 矛盾! 因此 $\mathcal{B}_1 \subsetneq \mathcal{A}/\mathcal{J}$.

下面说明 $\mathcal{B}_1$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 的理想. 任取 $x + \mathcal{J} \in \mathcal{B}_1$ (其中 $x \in \mathcal{J}_1$), 对每个 $r + \mathcal{J} \in \mathcal{A}/\mathcal{J}$ (其中 $r \in \mathcal{A}$), 由 $\mathcal{J}_1$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想与乘法分配律知 $rx \in \mathcal{J}_1$, 且

$$(r + \mathcal{J})(x + \mathcal{J}) = rx + \mathcal{J} \in \mathcal{B}_1.$$

同理可证 $(x + \mathcal{J})(r + \mathcal{J}) \in \mathcal{B}_1$, 故 $\mathcal{B}_1$ 为 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 的非零理想, 矛盾! □

注 8.7 若交换代数 $\mathcal{A}$ 有单位元 $e_{\mathcal{A}}$, 则利用定理8.2(i) 可证命题8.6与定理8.2(ii) 等价. 事实上:

命题8.6 $\Rightarrow$ **定理8.2**: 由命题8.6知 $\mathcal{J}$ 是极大理想当且仅当 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 无非零理想, 而由定理8.2(i) 知 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 无非零理想当且仅当 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 无非零不可逆元, 因此 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 的非零元均可逆, 亦即 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 是可除代数, 此即定理8.2(ii).

定理8.2 $\Rightarrow$ **命题8.6**: 由定理8.2(ii) 知 $\mathcal{J}$ 是极大理想当且仅当 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 是可除代数, 由可除代数的定义知 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 可除当且仅当 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 中无非零不可逆元, 于是由定理8.2(i) 知 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 无非零不可逆元当且仅当 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 无非零理想, 此即命题8.6.

注 8.8 注意命题8.6中代数 $\mathcal{A}$ 未必有单位元, 且我们并不能利用同构给 $\mathcal{A}$ 赋单位元再利用定理8.2. 这是因为用于给 $\mathcal{A}$ 增添单位元的同构是将其映成子代数, 而子代数未必是全空间, 于是该同构未必有全空间到原代数的逆.

[19]2.1 习题

练习 8.1

在注8.3中, 若 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数, 在 $\widehat{\mathcal{A}}$ 上赋范

$$\|(x, \alpha)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} := \|x\|_{\mathcal{A}} + |\alpha|,$$

证明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是 Banach 代数. ♠

证明 首先说明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是代数, 为此只需说明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 关于线性运算 $\alpha(x, \lambda) + \beta(y, \mu) = (\alpha x + \beta y, \alpha \lambda + \beta \mu)$ 与乘法 $(x, \lambda)(y, \mu) = (xy + \lambda y + \mu x, \lambda \mu)$ 封闭, 且加法, 乘法与数乘满足公理式的三条性质即可. 由 $\mathcal{A}$ 是代数立得封闭

³这里干的事有点类似于环的第三同构定理: 只要 I, S 是环 R 的两个理想, $I \subset S$, 则 S/I 是 R/I 的理想, 且 $R/S \simeq (R/I)/(S/I)$. 参看 [18].

性. 现任取 $x, y, z, w \in \mathcal{A}, \alpha, \beta, \gamma, \xi \in \mathbb{C}$, 知

$$\begin{aligned}
 ((x, \alpha)(y, \beta))(z, \gamma) &= (xy + \beta x + \alpha y, \alpha\beta)(z, \gamma) \\
 &= (xyz + \beta xz + \alpha yz + \gamma xy + \beta \gamma x + \alpha \gamma y + \alpha \beta z, \alpha \beta \gamma) \\
 &= (x, \alpha)(yz + \gamma y + \beta z, \beta \gamma) \\
 &= (x, \alpha)((y, \beta)(z, \gamma)). \\
 ((x, \alpha) + (y, \beta))((z, \gamma) + (w, \xi)) &= (x + y, \alpha + \beta)(z + w, \gamma + \xi) \\
 &= ((x + y)(z + w) + (\gamma + \xi)(x + y) + (\alpha + \beta)(z + w), (\alpha + \beta)(\gamma + \xi)) \\
 &= (xz + \gamma x + \alpha z, \alpha \gamma) + (xw + \xi x + \alpha w, \alpha \xi) \\
 &\quad + (yz + \gamma y + \beta z, \beta \gamma) + (yw + \xi y + \beta w, \beta \xi) \\
 &= (x, \alpha)(z, \gamma) + (x, \alpha)(w, \xi) + (y, \beta)(z, \gamma) + (y, \beta)(w, \xi). \\
 (\gamma \xi)((x, \alpha)(y, \beta)) &= (\gamma \xi)(xy + \beta x + \alpha y, \alpha \beta) \\
 &= (\gamma \xi xy + \gamma \xi \beta x + \gamma \xi \alpha y, \alpha \beta \gamma \xi) \\
 &= (\gamma x, \gamma \alpha)(\xi y, \xi \beta) = (\gamma(x, \alpha))(\xi(y, \beta)).
 \end{aligned}$$

下面说明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的乘法与范数相容. 任取 $x, y \in \mathcal{A}, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 由 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数知

$$\begin{aligned}
 \|(x, \lambda)(y, \mu)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} &= \|(xy + \mu x + \lambda y, \lambda \mu)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} \\
 &= \|xy + \mu x + \lambda y\|_{\mathcal{A}} + |\lambda \mu| \\
 &\leq \|xy\|_{\mathcal{A}} + |\mu| \|x\|_{\mathcal{A}} + |\lambda| \|y\|_{\mathcal{A}} + |\lambda \mu| \\
 &\leq \|x\|_{\mathcal{A}} \|y\|_{\mathcal{A}} + |\mu| \|x\|_{\mathcal{A}} + |\lambda| \|y\|_{\mathcal{A}} + |\lambda \mu| \\
 &= (\|x\|_{\mathcal{A}} + \lambda)(\|y\|_{\mathcal{A}} + \mu) = \|(x, \lambda)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} \cdot \|(y, \mu)\|_{\widehat{\mathcal{A}}},
 \end{aligned}$$

至此即得 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是代数.

最后说明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 完备. 设 $\{(x_n, \lambda_n)\}_n$ 是 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的 Cauchy 列, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > m > N (\|(x_n, \lambda_n) - (x_m, \lambda_m)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} < \varepsilon).$$

于是

$$\|(x_n, \lambda_n) - (x_m, \lambda_m)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} = \|x_n - x_m\|_{\mathcal{A}} + |\lambda_n - \lambda_m| < \varepsilon, \forall n, m > N,$$

这说明 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 Cauchy 列, $\{\lambda_n\}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 Cauchy 列, 故存在 $x \in \mathcal{A}, \lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $x_n \rightarrow x(\mathcal{A}), \lambda_n \rightarrow \lambda(\mathbb{C})$, 进一步有 $(x, \lambda) \in \widehat{\mathcal{A}}$.

下面说明 $(x_n, \lambda_n) \rightarrow (x, \lambda)(\widehat{\mathcal{A}})$. 知

$$\|(x_n, \lambda_n) - (x, \lambda)\|_{\widehat{\mathcal{A}}} = \|x_n - x\|_{\mathcal{A}} + |\lambda_n - \lambda| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

因此 $\widehat{\mathcal{A}}$ 完备, 故 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是 Banach 代数. □

练习 8.2

证明定义 8.1 中 $(a + b)(c + d) = ac + bc + ad + bd$ 等价于

$$\begin{cases} (a + b)c = ac + bc, \\ a(c + d) = ac + ad, \end{cases}$$

且 $(\lambda \mu)(ab) = (\lambda a)(\mu b)$ 等价于

$$\begin{cases} \lambda(ab) = (\lambda a)b, \\ \lambda(ab) = a(\lambda b). \end{cases}$$



证明 若 $(a+b)(c+d) = ac+bc+ad+bd (\forall a, b, c, d \in \mathcal{A})$, 令 $d = 0_{\mathcal{A}}$ 即知

$$(a+b)(c+0_{\mathcal{A}}) = (a+b)c = ac+bc+a0_{\mathcal{A}}+b0_{\mathcal{A}} = ac+bc.$$

另令 $b = 0_{\mathcal{A}}$ 知

$$(a+0_{\mathcal{A}})(c+d) = a(c+d) = ac+0_{\mathcal{A}}c+ad+0_{\mathcal{A}}d = ac+ad.$$

若 $(a+b)c = ac+bc, a(c+d) = ac+ad (\forall a, b, c, d \in \mathcal{A})$, 则

$$ac+bc+ad+bd = (a+b)c + (a+b)d = (a+b)(c+d).$$

若 $(\lambda\mu)(ab) = (\lambda a)(\mu b) (\forall a, b \in \mathcal{A}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C})$, 令 $\mu = 1$ 即知

$$(\lambda 1)(ab) = \lambda(ab) = (\lambda a)(1b) = (\lambda a)b.$$

另令 $\lambda = 1$ 知

$$(1\mu)(ab) = \mu(ab) = (1a)(\mu b) = a(\mu b).$$

若 $\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b) (\forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall a, b \in \mathcal{A})$, 则

$$(\lambda\mu)(ab) = ((\lambda\mu)a)b = (\mu(\lambda a))b = (\lambda a)(\mu b).$$

□

练习 8.3

设 $\mathcal{A}$ 为一个代数, 令 $\widehat{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \times \mathbb{C}$, 并规定 $\widehat{\mathcal{A}}$ 上代数运算如下:

$$\begin{cases} \alpha(a, \lambda) := (\alpha a, \alpha \lambda), \\ (a, \lambda) + (b, \mu) := (a+b, \lambda+\mu), \end{cases}$$

且

$$(a, \lambda)(b, \mu) := (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu),$$

其中 $(a, \lambda), (b, \mu) \in \widehat{\mathcal{A}}, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$. 证明 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是含幺代数.

♠

证明 习题 8.1 已证 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是代数, 下证 $\widehat{\mathcal{A}}$ 含幺. 取 $(0_{\mathcal{A}}, 1) \in \widehat{\mathcal{A}}$, 任取 $(a, \lambda) \in \widehat{\mathcal{A}}$, 知

$$(0_{\mathcal{A}}, 1)(a, \lambda) = (0_{\mathcal{A}}a + \lambda 0_{\mathcal{A}} + 1a, 1\lambda) = (a, \lambda),$$

$$(a, \lambda)(0_{\mathcal{A}}, 1) = (a0_{\mathcal{A}} + \lambda 0_{\mathcal{A}} + a1, \lambda) = (a, \lambda),$$

故 $(0_{\mathcal{A}}, 1)$ 是 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的单位元.

□

练习 8.4

设 $\mathcal{A}$ 是一个代数, $x, y \in \mathcal{A}$, 记 $G(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 中可逆元全体.

- (i) 若 $x, xy \in G(\mathcal{A})$, 证明 $y \in G(\mathcal{A})$.
- (ii) 若 $xy, yx \in G(\mathcal{A})$, 证明 $x, y \in G(\mathcal{A})$.
- (iii) 说明可能存在 $xy = e_{\mathcal{A}}$, 但 $yx \neq e_{\mathcal{A}}$ 的情形.
- (iv) 若 $xy = e_{\mathcal{A}}$ 且 $yx = z \neq e_{\mathcal{A}}$, 说明 z 是非平凡的幂等元 (即 $z^2 = z, z \neq 0_{\mathcal{A}}$ 且 $z \neq e_{\mathcal{A}}$).

♠

证明 (i) 首先说明 $a, b \in G(\mathcal{A}) \Rightarrow ab \in G(\mathcal{A})$. 取 $b^{-1}a^{-1} \in \mathcal{A}$ 知

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = ae_{\mathcal{A}}a^{-1} = aa^{-1} = e_{\mathcal{A}},$$

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}e_{\mathcal{A}}b = b^{-1}b = e_{\mathcal{A}}.$$

现知 $x \in G(\mathcal{A}) \Rightarrow x^{-1} \in G(\mathcal{A})$, 于是 $x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = y \in G(\mathcal{A})$.

(ii) 首先证明 $y(xy)^{-1} = (yx)^{-1}y$, 为此由 $xy, yx \in G(\mathcal{A})$ 知只需证 $(yx)y = y(xy)$, 后者显然成立. 现有

$$x(y(xy)^{-1}) = (xy)(xy)^{-1} = e_{\mathcal{A}} = (yx)^{-1}(yx) = ((yx)^{-1}y)x = (y(xy)^{-1})x.$$

因此 x 存在逆元 $y(xy)^{-1}$, 故 $x \in G(\mathcal{A})$. 同理可证 $x(yx)^{-1} = (xy)^{-1}x$, 于是

$$y(x(yx)^{-1}) = e_{\mathcal{A}} = ((xy)^{-1}x)y = (x(yx)^{-1})y,$$

因此 y 存在逆元 $x(yx)^{-1}$, 故 $y \in G(\mathcal{A})$.

(iii) 取 $\mathcal{A}$ 是 $l^2(\mathbb{N})$ 上的有界线性算子依作为乘法的算子复合构成的代数, T_1, T_2 分别是左推移算子与右推移算子:

$$T_1 : (x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots),$$

$$T_2 : (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, \dots),$$

则 $T_1 \circ T_2 = \text{Id}, T_2 \circ T_1 \neq \text{Id}$.

(iv) 针对幂等知

$$z^2 = yxyx = y(xy)x = ye_{\mathcal{A}}x = yx = z.$$

针对非平凡性, 只需证明 $z \neq 0_{\mathcal{A}}$. 若 $z = 0_{\mathcal{A}}$, 则

$$0_{\mathcal{A}} = x0_{\mathcal{A}} = x(yx) = xyx = (xy)x = e_{\mathcal{A}}x = x$$

因此 $x = 0_{\mathcal{A}}$, 于是 $xy = 0_{\mathcal{A}}$, 这与 $\mathcal{A}$ 内蕴的非平凡性矛盾! □

练习 8.5

验证定义 8.5 中的商空间 $\mathcal{B}$ 确为代数. ♠

证明 任取 $[a], [b], [c], [d] \in \mathcal{B}, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 知

$$([a][b])[c] = [ab][c] = [abc] = [a][bc] = [a]([b][c]).$$

$$([a] + [b])([c] + [d]) = [a + b][c + d] = [ac + bc + ad + bd]$$

$$= [ac] + [bc] + [ad] + [bd]$$

$$= [a][c] + [b][c] + [a][d] + [b][d].$$

$$(\lambda\mu)([a][b]) = (\lambda\mu)[ab] = [(\lambda\mu)ab] = [(\lambda a)(\mu b)] = [\lambda a][\mu b] = (\lambda[a])(\mu[b]).$$

□

8.2 Banach 代数

8.2.1 Banach 代数的定义

定义 8.8 (Banach 代数 (Banach algebra))

称 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数 (简称为 B 代数), 如果

- (i) $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的代数;
- (ii) $\mathcal{A}$ 可赋范 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$, 且在范数 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 下 $\mathcal{A}$ 是 Banach 空间;
- (iii) 对 $\forall a, b \in \mathcal{A}$ 有 $\|ab\|_{\mathcal{A}} \leq \|a\|_{\mathcal{A}}\|b\|_{\mathcal{A}}$.

♣

注 8.9 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中的乘法关于范数连续. 设 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b.$$

因为 $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛, 故 $\{\|b_n\|_{\mathcal{A}}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有界, 设其界为 M , 则

$$\begin{aligned}\|a_n b_n - ab\|_{\mathcal{A}} &\leq \|a_n b_n - ab_n\|_{\mathcal{A}} + \|ab_n - ab\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq \|a_n - a\|_{\mathcal{A}} \|b_n\|_{\mathcal{A}} + \|a\|_{\mathcal{A}} \|b_n - b\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq M \|a_n - a\|_{\mathcal{A}} + \|a\|_{\mathcal{A}} \|b_n - b\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0.\end{aligned}$$

因此 Banach 空间的范数与乘法相容.

注 8.10 本注计算 Banach 代数中单位元的范数. 设 $\mathcal{A}$ 是有单位元 $e_{\mathcal{A}}$ 的非零 Banach 代数.

(i) $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} \geq 1$. 事实上, 因为 $e_{\mathcal{A}} = e_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}}$, 故

$$\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = \|e_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} \leq \|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}}^2. \quad (8.4)$$

下面说明若 $\mathcal{A}$ 是有单位元 $e_{\mathcal{A}}$ 的 Banach 代数, 则 $\mathcal{A} = \{0_{\mathcal{A}}\}$ 当且仅当 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 0$. 事实上, 若 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 0$, 则 $e_{\mathcal{A}} = 0_{\mathcal{A}}$, 于是对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$a = a e_{\mathcal{A}} = a 0_{\mathcal{A}} = 0_{\mathcal{A}}.$$

因此 $\mathcal{A} = \{0_{\mathcal{A}}\}$. 反之, 若 $\mathcal{A} = \{0_{\mathcal{A}}\}$, 则 $e_{\mathcal{A}} = 0_{\mathcal{A}}$, 于是 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 0$. 现在因为 $\mathcal{A}$ 非平凡, 故 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} \neq 0$, 从而由(8.4)知 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} \geq 1$.

(ii) 可以在 $\mathcal{A}$ 上赋另一个范数 $||| \cdot |||$ 使得 $|||e_{\mathcal{A}}||| = 1$. 对 $\forall a \in \mathcal{A}$, 令

$$|||a||| := \sup_{b \in \mathcal{A} \setminus \{0_{\mathcal{A}}\}} \frac{\|ab\|_{\mathcal{A}}}{\|b\|_{\mathcal{A}}},$$

显见 $|||e_{\mathcal{A}}||| = 1$, 且对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 由乘法定义知

$$\frac{\|a\|_{\mathcal{A}}}{\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}}} = \frac{\|a e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}}}{\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}}} \leq |||a||| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}, \quad (8.5)$$

因此 $||| \cdot |||$ 与 $\| \cdot \|$ 等价. 下证 $(\mathcal{A}, ||| \cdot |||)$ 完备. 任取 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $(\mathcal{A}, ||| \cdot |||)$ 的基本列, 由(8.5)第一式知 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $(\mathcal{A}, \| \cdot \|_{\mathcal{A}})$ 的基本列. 因为 $(\mathcal{A}, \| \cdot \|_{\mathcal{A}})$ 是 Banach 代数, 故存在 $b \in \mathcal{A}$ 使得

$$\|a_n - b\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

由(8.5)第二式知 $|||a_n - b||| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 因此 $(\mathcal{A}, ||| \cdot |||)$ 完备. 下面再证 $||| \cdot |||$ 与乘法相容. 由 $||| \cdot |||$ 的定义知对 $\forall a, b, c \in \mathcal{A}$ 有

$$\|cb\|_{\mathcal{A}} \leq |||c||| |||b|||, \quad \|acb\|_{\mathcal{A}} \leq |||a||| |||cb|||.$$

从而

$$\|acb\|_{\mathcal{A}} \leq |||a||| \cdot |||c||| \cdot |||b|||,$$

由 $||| \cdot |||$ 的定义知

$$|||ac||| = \sup_{b \in \mathcal{A} \setminus \{0_{\mathcal{A}}\}} \frac{\|acb\|_{\mathcal{A}}}{\|b\|_{\mathcal{A}}} \leq |||a||| \cdot |||c|||,$$

因此 $(\mathcal{A}, ||| \cdot |||)$ 是 Banach 代数, 故在等价范数的意义下可设单位元范数为 1. 此后我们就约定 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$.

例 8.2 设 X 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{A} := L(X)$ 在赋算子范数后成为含么 $e_{\mathcal{A}} := I$ 的不可交换 Banach 代数, 其上乘法定义为算子的复合. 事实上, 显见 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 在定义乘法为算子复合后 $\mathcal{A}$ 成为 $\mathbb{C}$ 上的代数, 由算子复合的不可换性可知 $\mathcal{A}$ 不可换. 另对 $\forall T \in L(X), \forall x \in X$ 有

$$(I \circ T)(x) = I(T(x)) = T(x),$$

$$(T \circ I)(x) = T(I(x)) = T(x),$$

因此 I 是 $\mathcal{A}$ 的单位元. □

例 8.3 设 M 是紧拓扑空间, $C(M)$ 为 M 上的连续函数全体, 若在 $C(M)$ 上赋函数加法, 函数数乘与函数的点态乘法, 赋一致范数

$$\|f\| := \sup_{x \in M} |f(x)|,$$

则 $C(M)$ 成为含么交换 Banach 代数, 其单位元为常值函数 $f(x) = 1 (\forall x \in M)$.

例 8.4 设 $\mathbb{S}^1$ 是平面上的单位圆周, 且

$$\mathcal{A} := \left\{ u \in C(\mathbb{S}^1) : u(e^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n| < \infty \right\},$$

在 $\mathcal{A}$ 上赋范 $\|u\|_{\mathcal{A}} := \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n| (\forall u = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta} \in \mathcal{A})$, 则 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 按级数加法, 级数数乘与级数乘法构成含么交换 Banach 代数. 下面验证 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 的乘法与范数相容. 事实上, 取

$$u := \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}, v := \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n e^{in\theta}.$$

由级数的 Tonelli 定理知

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_k d_{n-k}| = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k| \sum_{n \in \mathbb{Z}} |d_n| < \infty.$$

再由级数的 Fubini 定理知

$$\begin{aligned} uv &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_k d_n e^{i(n+k)\theta} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_k d_{n-k} e^{in\theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k d_{n-k} \right) e^{in\theta}, \end{aligned}$$

于是

$$\|uv\|_{\mathcal{A}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k d_{n-k} \right| \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n| \right) \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |d_n| \right) = \|u\|_{\mathcal{A}} \|v\|_{\mathcal{A}}.$$

故 $\mathcal{A}$ 关于乘法封闭, 且 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $u \equiv 1 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \tilde{c}_n e^{in\theta}$, 其中

$$\tilde{c}_n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

□

注 8.11 注意例 8.4 中 $\mathcal{A} \neq C(\mathbb{S}^1)$, 这是因为存在 $u \in C(\mathbb{S}^1)$ 使得 u 的 Fourier 级数在 $\mathbb{S}^1$ 的某点发散, 参看 [5] pg.6 Thm.1.5.

例 8.5 设

$$A_0(\mathbb{D}) := \{u : u \text{ 是 } \mathbb{D} \text{ 上的复函数, 在 } \mathbb{D} \text{ 内解析, 在 } \bar{\mathbb{D}} \text{ 上连续}\},$$

其中 $\mathbb{D}$ 是复平面上的单位开圆盘, 在 $A_0(\mathbb{D})$ 上定义范数

$$\|u\|_{\mathcal{A}} := \max_{|z| \leq 1} |u(z)|, \forall u \in A_0(\mathbb{D})$$

则 $(A_0(\mathbb{D}), \|\cdot\|_{\mathcal{A}})$ 按函数加法, 函数数乘与函数的点态乘法构成含么交换 Banach 代数.

例 8.6 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上将卷积

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

作为 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中 f, g 的乘法, 则 $(L^1(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{L^1(\mathbb{R}^n)})$ 按卷积乘法构成无单位元的交换 Banach 代数. 其中交换性源自卷积的交换性, 下面验证 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 无单位元. 若设 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 有单位元 e_{L^1} , 则对 $\forall g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$g * e_{L^1}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g(y)e_{L^1}(x-y)dy = g(x).$$

因为 $e_{L^1} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 故存在 $\delta > 0$ 使得

$$\int_{[-2\delta, 2\delta]^n} |e_{L^1}(x)|dx < 1,$$

现取

$$g_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\delta, \delta]^n, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

则 $g_0 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 而对 $\forall x \in [-\delta, \delta]^n$ 有

$$\begin{aligned} 1 &= g_0(x) = |g_0(x)| \\ &= |g_0 * e_{L^1}(x)| = \left| \int_{[-\delta, \delta]^n} e_{L^1}(x-y) dy \right| \\ &\leq \int_{[x_1-\delta, x_1+\delta] \times \cdots \times [x_n-\delta, x_n+\delta]} |e_{L^1}(t)| dt \\ &\leq \int_{[-2\delta, 2\delta]^n} |e_{L^1}(t)| dt < 1. \end{aligned}$$

矛盾! 故 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 不存在单位元.

注 8.12 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 无单位元还有下述证法. 设 $e_{L^1} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 为单位元, 则对 $\forall f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $e_{L^1} * f(x) = f(x)$. 两边取 Fourier 变换知对 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\widehat{f}(\xi) \widehat{e}(\xi) = \widehat{f}(\xi),$$

现令 $f(x) := e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\widehat{e_{L^1}}(\xi)$ 必为常值函数, 但 Riemann-Lebesgue 定理表明 $\widehat{e_{L^1}}$ 至少应该衰减, 矛盾! $\square$

8.2.2 代数的极大理想与 Gelfand 表示

本节主要讨论含么交换 Banach 代数的特征, 我们将看到若 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 则商代数 $\mathcal{B} := \mathcal{A}/J$ 等距同构于 $\mathbb{C}$. 这是 Gelfand-Mazur 定理的推论, 而这个结果可以导出含么交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示.

现设 $G(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 中的可逆元全体. 下述引理是 Neumann 级数(6.13)的代数版本.

引理 8.2 (von Neumann)

设 $\mathcal{A}$ 是含么 Banach 代数, $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, 则

(i) 若 $a \in \mathcal{A}$ 且 $\|a\|_{\mathcal{A}} < 1$, 则 $e_{\mathcal{A}} - a \in G(\mathcal{A})$, 且有幂级数展开

$$(e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n;$$

(ii) $G(\mathcal{A})$ 是开集, 且 $a \mapsto a^{-1}$ 是连续映射. 由此可知 $a \mapsto a^{-1}$ 是 $G(\mathcal{A})$ 到自身的同胚.

证明 (i) 记 $b_n := \sum_{i=0}^n a^i$ (其中约定 $a^0 = e$). 根据乘法定义知对 $\forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$ 有 $\|a^i\|_{\mathcal{A}} \leq \|a\|_{\mathcal{A}}^i$, $\|a\|_{\mathcal{A}} < 1$, 故序列 $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 Cauchy 列, 因此存在 $b \in \mathcal{A}$ 使得 $b_n \rightarrow b$ ($n \rightarrow \infty$). 注意到

$$b_n(e_{\mathcal{A}} - a) = e_{\mathcal{A}} - a^{n+1} = (e_{\mathcal{A}} - a)b_n,$$

而 $a^n \rightarrow 0_{\mathcal{A}}$, 故在上式中令 $n \rightarrow \infty$ 知

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) (e_{\mathcal{A}} - a) = (e_{\mathcal{A}} - a) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = e_{\mathcal{A}}.$$

因此

$$b(e_{\mathcal{A}} - a) = (e_{\mathcal{A}} - a)b = e_{\mathcal{A}}.$$

这说明 $e_{\mathcal{A}} - a$ 可逆, 且 $b = \sum_{i=0}^{\infty} a^i$ 是 $e_{\mathcal{A}} - a$ 的逆.

(ii) 对 $\forall a \in G(\mathcal{A})$, 因为 a 可逆且

$$1 = \|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = \|aa^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \|a\|_{\mathcal{A}} \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}},$$

故

$$\|a^{-1}\|_{\mathcal{A}} \neq 0.$$

现令 $B_a := B\left(a, \frac{1}{\|a^{-1}\|_{\mathcal{A}}}\right)$. 注意到对 $\forall b \in B_a$ 有

$$b = a - (a - b) = [e_{\mathcal{A}} - (a - b)a^{-1}]a. \quad (8.6)$$

因为 $\|a - b\|_{\mathcal{A}} < \frac{1}{\|a^{-1}\|_{\mathcal{A}}}$, 故

$$\|(a - b)a^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \|a - b\|_{\mathcal{A}} \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}} < 1.$$

由 (i) 知 $e_{\mathcal{A}} - (a - b)a^{-1}$ 可逆, 故

$$[e_{\mathcal{A}} - (a - b)a^{-1}]a \in G(\mathcal{A}) \Rightarrow b \in G(\mathcal{A}).$$

因此 $B_a \subset G(\mathcal{A})$, 即 $G(\mathcal{A})$ 是开集. 由 (8.6) 式与 (i) 进一步知

$$b^{-1} = a^{-1}[e_{\mathcal{A}} - (a - b)a^{-1}]^{-1} = a^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n = a^{-1} + a^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n.$$

又因为 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| a^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n \right\|_{\mathcal{A}} - \left\| a^{-1} \sum_{n=1}^N [(a - b)a^{-1}]^n \right\|_{\mathcal{A}} \leq \left\| a^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n - a^{-1} \sum_{n=N+1}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n \right\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0,$$

故

$$\begin{aligned} \left\| a^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n \right\|_{\mathcal{A}} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| a^{-1} \sum_{n=1}^N [(a - b)a^{-1}]^n \right\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}} \sum_{n=1}^N \|(a - b)a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^n \\ &\leq \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^2 \|a - b\|_{\mathcal{A}} \sum_{n=1}^{\infty} \|(a - b)a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^{n-1} \\ &= \|a - b\|_{\mathcal{A}} \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^2 \sum_{n=0}^{\infty} \|(a - b)a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^n. \end{aligned}$$

现当 $b \rightarrow a$ 时有

$$\begin{aligned} \|b^{-1} - a^{-1}\|_{\mathcal{A}} &= \left\| a^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} [(a - b)a^{-1}]^n \right\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq \|a - b\|_{\mathcal{A}} \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^2 \sum_{n=0}^{\infty} \|(a - b)a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^n \\ &= \|a - b\|_{\mathcal{A}} \|a^{-1}\|_{\mathcal{A}}^2 \frac{1}{1 - \|(a - b)a^{-1}\|_{\mathcal{A}}} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

因此映射 $a \mapsto a^{-1}$ 连续. □

定理 8.3 (Gelfand-Mazur)

设 $\mathcal{A}$ 是可除 Banach 代数, 则 $\mathcal{A}$ 等距同构于 $\mathbb{C}$.



注 8.13 上述定理蕴含了表明谱点存在的 Gelfand-Mazur 定理 6.3. 事实上如果存在 $A \in L(X)$ 满足 $\sigma(A) = \emptyset$, 记 L_A 为形如 $P(A)$ (其中 P 为一元多项式) 的算子构成的集合, 则 $\overline{L_A}^{L(X)}$ 是含么交换 Banach 代数. 针对 $\overline{L_A}^{L(X)}$ 中的元素 $p(A)$, 若 $p(A)$ 是关于 A 的非零一元多项式, 根据代数基本定理知 $p(A)$ 能表为有限个形如 $(\lambda_k I - A)$ ($\lambda_k \in \mathbb{C}$) 的算子的复合, 而 $\sigma(A) = \emptyset$ 表明全体形如 $\lambda I - A$ ($\lambda \in \mathbb{C}$) 的算子均可逆, 故 $p(A)$ 可逆. 现取 $p(A) \in \overline{L_A}^{L(X)} \setminus L(A)$, 知 $p(A) \neq 0_{X \rightarrow X}$, 且存在 $p_n(A) \in L_A$ 使得 $p_n(A) \rightarrow p(A)$ ($L(X)$). 要说明 $p(A)$ 可逆, 就是说明下述算子可逆:

$$p(A) - p_n(A) + p_n(A) = p_n(A)(p_n(A)^{-1}(p(A) - p_n(A)) + \text{Id}),$$

这也就是说明 $\text{Id} + p_n(A)^{-1}(p(A) - p_n(A))$ 可逆, 为此由引理 8.2 知只需

$$\|p(A) - p_n(A)\|_{X \rightarrow X} \leq \|p_n(A)^{-1}\|_{X \rightarrow X}^{-1}.$$

但因为 $p(A) \neq 0_{X \rightarrow X}$, 故上右式在 n 足够大时有正下确界, 而上左式是趋零的, 因此 $p(A)$ 确实可逆, 于是 $\overline{L_A}^{L(X)}$ 成为可除 Banach 代数, 根据上述结果它便等距同构于 $\mathbb{C}$. 但另一方面通过等距 (拓扑) 同构可以诱导代数同构,

于是 $\overline{L_A}^{L(X)}$ 同样代数同构于 $\mathbb{C}$, 这意味着 $\dim \overline{L_A}^{L(X)} = \dim \mathbb{C} = 1$, 而要做到这一点只能是存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $A = \lambda \text{Id}$, 这种情况下显然有 $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \sigma(A) \neq \emptyset$, 矛盾! 故对全体 $A \in L(X)$ 均有 $\sigma(A) \neq \emptyset$.

根据这一事实, 之后当我们称 Gelfand-Mazur 定理时统一指定理 8.3, 而把定理 6.3 称为 (算子的) 谱点存在定理.

证明 令

$$\mathcal{B} := \{ze_{\mathcal{A}} : z \in \mathbb{C}\}$$

其中 $e_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的单位元. 因为 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$, 故 $\mathcal{B}$ 等距同构于 $\mathbb{C}$, 因此只需说明 $\mathcal{B} = \mathcal{A}$ 即可, 亦即对 $\forall a \in \mathcal{A}$, 往证存在⁴ $z \in \mathbb{C}$ 使得 $a = ze_{\mathcal{A}}$. 用反证法, 如若不然, 则存在 $a \in \mathcal{A}$ 使得对 $\forall z \in \mathbb{C}$ 均有 $ze_{\mathcal{A}} - a \neq 0_{\mathcal{A}}$. 因为 $\mathcal{A}$ 是可除代数, 故 $(ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 存在, 现定义向量值函数

$$r(z) := (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

接下来我们说明 r 弱解析且 $\|r(z)\|_{\mathcal{A}}$ 有界.

首先说明 r 弱解析, 亦即对 $\forall f \in \mathcal{A}^*$ 而言, 函数

$$F(z) := \langle f, r(z) \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}$$

均在 $\mathbb{C}$ 上解析. 事实上, 对 $\forall z_0, z \in \mathbb{C}$ 有

$$\begin{aligned} (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} - (z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} &= [(ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(z_0e_{\mathcal{A}} - a) - e](z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \\ &= (z_0 - z)(ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}. \end{aligned} \quad (8.7)$$

而由 $a \mapsto a^{-1}$ 的连续性 (引理 8.2(ii)) 知 $z \rightarrow z_0$ 时有:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|(ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} - (z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-2}\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq \|(ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} - (z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \|(z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0, \end{aligned} \quad (8.8)$$

因此

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} = (z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-2}.$$

故对 $\forall f \in \mathcal{A}^*$, 由 (8.7), (8.8) 式知

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\langle f, r(z) \rangle - \langle f, r(z_0) \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z_0 - z) \langle f, (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{z - z_0} \\ &= -\langle f, (z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-2} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}. \end{aligned}$$

从而 $F(z)$ 在 z_0 处可微, 且

$$\left. \frac{d}{dz} F(z) \right|_{z=z_0} = -\langle f, (z_0e_{\mathcal{A}} - a)^{-2} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}},$$

由 z_0 的任意性即知 F 在全平面解析.

现在说明 $\|r(z)\|_{\mathcal{A}}$ 有界. 由 $a \mapsto a^{-1}$ 的连续性 (引理 8.2(ii)) 知 $r(z)$ 连续, 于是对 $\forall z, z_0 \in \mathbb{C}$ 有

$$|\|r(z)\|_{\mathcal{A}} - \|r(z_0)\|_{\mathcal{A}}| \leq \|r(z) - r(z_0)\|_{\mathcal{A}},$$

故 $\|r(z)\|_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 由 $\overline{B(0, 2\|a\|_{\mathcal{A}})}$ 的紧性即知 $\|r(z)\|_{\mathcal{A}}$ 在 $\overline{B(0, 2\|a\|_{\mathcal{A}})}$ 上有界.

当 $|z| > 2\|a\|_{\mathcal{A}}$ 时, 由 $\|z^{-1}a\|_{\mathcal{A}} < 1$ 与引理 8.2(i) 知 $e_{\mathcal{A}} - z^{-1}a$ 可逆, 又因为 $N \rightarrow \infty$ 时有

$$\left\| \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1}a)^n \right\|_{\mathcal{A}} - \left\| \sum_{n=0}^N (z^{-1}a)^n \right\|_{\mathcal{A}} \leq \left\| \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1}a)^n - \sum_{n=0}^N (z^{-1}a)^n \right\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0,$$

故

$$\left\| \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1}a)^n \right\|_{\mathcal{A}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=0}^N (z^{-1}a)^n \right\|_{\mathcal{A}} \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \|(z^{-1}a)^n\|_{\mathcal{A}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} |z|^{-n} \|a\|_{\mathcal{A}}^n.$$

⁴根据 $\mathcal{A}$ 非平凡知这个表示存在必唯一, 因此 $r(z)$ 良定义.

由此与引理 8.2(i) 知 $|z| > 2\|a\|_{\mathcal{A}}$ 时有

$$\begin{aligned}\|r(z)\|_{\mathcal{A}} &= |z|^{-1} \|(e_{\mathcal{A}} - z^{-1}a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \stackrel{(A)}{=} |z|^{-1} \left\| \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1}a)^n \right\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq |z|^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} |z|^{-n} \|a\|_{\mathcal{A}}^n \\ &= |z|^{-1} \frac{1}{1 - |z|^{-1} \|a\|_{\mathcal{A}}} < \frac{1}{\|a\|_{\mathcal{A}}},\end{aligned}$$

其中 (A) 还暗示了 $|z| \rightarrow \infty$ 时有

$$\|r(z)\|_{\mathcal{A}} \leq \frac{1}{|z| - \|a\|_{\mathcal{A}}} \rightarrow 0.$$

综上可知 $\|r(z)\|_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界, 因此 $F(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界, 且当 $|z| \rightarrow \infty$ 时

$$|F(z)| \leq \|f\|_{\mathcal{A}^*} \|r(z)\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0.$$

由 Liouville 定理知 $F \equiv 0$, 再由 Hahn-Banach 定理的推论 2.3 与 f 的任意性知只能有 $r(z) = 0_{\mathcal{A}} (\forall z \in \mathbb{C})$, 这与 $ze - a$ 可逆矛盾! $\square$

注 8.14

1. 注 8.13 中我们已经暗示了 Gelfand-Mazur 定理和谱点存在定理之间有关系, 从证明过程也能看出 Gelfand-Mazur 定理 8.3 的证明也基本和谱点存在定理 6.3 一样. 其实在 Banach 代数中确实也有谱点存在定理, 此即定理 8.7, 而且这里通常的讲法是先介绍定理 8.7, 再介绍 Gelfand-Mazur 定理 8.3 (参看 [10]), 实际上后者证明的大部头其实都是在证谱点存在定理 8.7 的中间步骤. 注 8.13 干的事也可以搬到 Banach 代数上的谱点存在定理上, 因此 Gelfand-Mazur 定理和谱点存在定理其实本质上是互推的.

2. 根据 Gelfand-Mazur 定理 8.3, 任何可除 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 必是一维交换 Banach 代数, 且对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $a = ze_{\mathcal{A}}$, 其中 $z \in \mathbb{C}$. 显见 $|z| = \|a\|_{\mathcal{A}}$.

回忆定理 8.2(ii), 含么交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 模去其极大理想 $\mathcal{J}$ 后成为可除代数 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{J}$. 如果 $\mathcal{B}$ 进一步能成为可除 Banach 代数, Gelfand-Mazur 定理就表明 $\mathcal{A}/\mathcal{J}$ 等距同构于 $\mathbb{C}$, 这个结论就相当精彩了. 为了说明 $\mathcal{B}$ 确实能成为 Banach 代数, 我们需要下述引理:

引理 8.3 (含么 Banach 代数极大理想的闭性)

若 $\mathcal{A}$ 是含么 Banach 代数, 则它的任意极大理想 J 都是闭的.



证明 往证 $J = \bar{J}$. 显见 $J \subset \bar{J}$, 要说明 $\bar{J} \subset J$, 因为 J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 故只需说明 $\bar{J}$ 是理想. 首先说明 $\bar{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的子代数, 任取 $a, b \in \bar{J}, \lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 根据闭包的定义知存在 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset J$ 使得 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b (n \rightarrow \infty)$. 于是 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\|(\lambda a + \mu b) - (\lambda a_n + \mu b_n)\|_{\mathcal{A}} \leq |\lambda| \|a - a_n\|_{\mathcal{A}} + |\mu| \|b - b_n\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0.$$

又因为 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛, 故 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\| \|a_n\|_{\mathcal{A}} - \|a\|_{\mathcal{A}} \| \leq \|a_n - a\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0,$$

因此 $\{\|a_n\|_{\mathcal{A}}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有界, 设其界为 M , 则 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\begin{aligned}\|ab - a_n b_n\|_{\mathcal{A}} &\leq \|a - a_n\|_{\mathcal{A}} \|b\|_{\mathcal{A}} + \|a_n\|_{\mathcal{A}} \|b - b_n\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq \|a - a_n\|_{\mathcal{A}} \|b\|_{\mathcal{A}} + M \|b - b_n\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0.\end{aligned}$$

因为 J 是代数, 故 $\{\lambda a_n + \mu b_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{a_n b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset J$, 从而 $\lambda a + \mu b, ab \in \bar{J}$, 从而 $\bar{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的子代数.

下面说明对任意 $a \in \mathcal{A}$ 均有 $a\bar{J} \subset \bar{J}, \bar{J}a \subset \bar{J}$. 任取 $a \in \mathcal{A}, b \in \bar{J}$, 知存在 $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset J$ 使得 $b_n \rightarrow b (n \rightarrow \infty)$. 由 J 是理想知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有 $ab_n \in J$. 因为 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\|ab - a_n b_n\|_{\mathcal{A}} \leq \|a\|_{\mathcal{A}} \|b - b_n\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0,$$

故 $ab \in \bar{J}$, 因此 $a\bar{J} \subset \bar{J}$, 同理可证 $\bar{J}a \subset \bar{J}$.

最后说明 $\bar{J} \neq \mathcal{A}$, 为此只需说明 $\mathcal{A}$ 的单位元 $e_{\mathcal{A}} \notin \bar{J}$, 这便需要说明 $e_{\mathcal{A}}$ 的某个邻域都在 $\bar{J}$ 外. 因为 $\|a\|_{\mathcal{A}} < 1$ 时由 von Neumann 引理 8.2(i) 知

$$(e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \in \mathcal{A}.$$

由 J 是理想与理想的不可除性 8.4 表明 $e_{\mathcal{A}} - a \notin J$, 而

$$\begin{aligned} b \in B(e_{\mathcal{A}}, 1) \cap J &\Leftrightarrow \|e_{\mathcal{A}} - b\|_{\mathcal{A}} < 1, b \in J \\ &\Leftrightarrow a := e_{\mathcal{A}} - b \text{ 满足 } \|a\|_{\mathcal{A}} < 1, e_{\mathcal{A}} - a \in J \\ &\Leftrightarrow b = e_{\mathcal{A}} - a \text{ 可逆, 且 } b \in J, \end{aligned}$$

矛盾! 故只能有 $B(e_{\mathcal{A}}, 1) \cap J = \emptyset$, 因此 $e_{\mathcal{A}} \notin \bar{J}$, 从而 $\bar{J}$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想. 由 J 的极大性知 $J = \bar{J}$, 因此 J 闭. $\square$

定理 8.4 (含么交换 Banach 代数模极大理想的刻画)

若 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, J 是 $\mathcal{A}$ 的一个极大理想, 则 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/J$ 等距同构于 $\mathbb{C}$, 记作 $\mathcal{A}/J \simeq \mathbb{C}$.



证明 由引理 8.3 知 J 是闭的. 又由 $\mathcal{A}$ 是 Banach 空间知 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/J$ 也是 Banach 空间, 其上范数为商范数⁵: 对 $\forall a \in \mathcal{B}$ 有

$$\|[a]\|_* := \inf_{x \in [a]} \|x\|_{\mathcal{A}}.$$

容易验证 $\mathcal{B}$ 是商代数, 且对 $\forall [a], [b] \in \mathcal{B}$ 有

$$\|[a][b]\|_* = \|[ab]\|_* = \inf_{z \in [ab]} \|z\|_{\mathcal{A}}.$$

再验证乘法不等式. 若 $x \in [a], y \in [b]$, 由 J 为理想知 $xy - ab = (x - a)y + a(y - b) \in J$, 因此 $xy \in [ab]$, 于是

$$\begin{aligned} \|[a][b]\|_* &\leq \inf_{x \in [a], y \in [b]} \|xy\|_{\mathcal{A}} \leq \inf_{x \in [a], y \in [b]} \|x\|_{\mathcal{A}} \|y\|_{\mathcal{A}} \\ &= \inf_{x \in [a]} \|x\|_{\mathcal{A}} \inf_{y \in [b]} \|y\|_{\mathcal{A}} = \|[a]\|_* \|[b]\|_*, \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{B}$ 是 Banach 代数.

设 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, 下面说明商范数足以保证⁶ $\|[e_{\mathcal{A}}]\|_* = 1$. 由 $\|\cdot\|_*$ 的定义知 $\|[e_{\mathcal{A}}]\|_* \leq \|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$. 现在因为 J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 故由理想的不可除性 8.4(i) 知 $e_{\mathcal{A}} \notin J$, 于是 $[e_{\mathcal{A}}] \neq [0_{\mathcal{A}}]$, 从而 $\|[e_{\mathcal{A}}]\|_* \neq 0$. 由此及

$$\|[e_{\mathcal{A}}]\|_* = \|[e_{\mathcal{A}}e_{\mathcal{A}}]\|_* \leq \|[e_{\mathcal{A}}]\|_* \|[e_{\mathcal{A}}]\|_*$$

可知 $\|[e_{\mathcal{A}}]\|_* \geq 1$, 因此 $\|[e_{\mathcal{A}}]\|_* = 1$.

现在由 J 的极大性与定理 8.2(ii) 知 $\mathcal{B}$ 是可除代数, 于是 Gelfand-Mazur 定理 8.3 表明 $\mathcal{B} \simeq \mathbb{C}$, 此即欲证. $\square$

注 8.15 根据定理 8.2(i), 含么可换 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中元素 a 的可逆性与 $\mathcal{A}$ 的理想有关, 进而它与 $\mathcal{A}$ 的极大理想也有关. 又因为 a 的谱本质上是 $\lambda e_{\mathcal{A}} - a$ 的可逆性, 故可以猜测 a 的谱能由 $\mathcal{A}$ 的极大理想确定. 为此我们需要研究 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示, 而定理 8.4 就为 Gelfand 表示的定义提供了渠道.

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 其上单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, φ 是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/J$ 的自然映射, I 是 $\mathcal{A}/J \rightarrow \mathbb{C}$ 的等距同构. 定义

$$\varphi_J = I \circ \varphi: \mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{A}/J \xrightarrow{I} \mathbb{C}, \quad a \mapsto [a] =: z[e_{\mathcal{A}}] \mapsto z, \quad (8.9)$$

其中 $z \in \mathbb{C}, |z| = \|[a]\|_*$.

命题 8.7

依照 (8.9) 式定义 φ_J , 则 φ_J 为 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零连续同态, $\varphi_J(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 且

$$|\varphi_J(a)| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}.$$



⁵ J 的闭性用于说明商范数确为范数.

⁶ 进而商范数本身能成为等距同构一端的距离, 另一端显然是复数模 $|\cdot|$.

证明 设 $[a] = z_a[e_{\mathcal{A}}]$, $[b] = z_b[e_{\mathcal{A}}]$, 其中 $z_a, z_b \in \mathbb{C}$, 则由乘法公式知

$$[a] = [z_a e_{\mathcal{A}}], [b] = [z_b e_{\mathcal{A}}].$$

因此对 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 有

$$\begin{aligned}\varphi_J(\lambda a + \mu b) &= I([\lambda a + \mu b]) = I(\lambda[a] + \mu[b]) \\ &= I(\lambda z_a[e_{\mathcal{A}}] + \mu z_b[e_{\mathcal{A}}]) = I((\lambda z_a + \mu z_b)[e_{\mathcal{A}}]) \\ &= \lambda z_a + \mu z_b = \lambda \varphi_J(a) + \mu \varphi_J(b).\end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}\varphi_J(ab) &= I([a][b]) = I([z_a e_{\mathcal{A}}][z_b e_{\mathcal{A}}]) = I([z_a e_{\mathcal{A}} z_b e_{\mathcal{A}}]) \\ &= I([z_a z_b e_{\mathcal{A}}]) = I(z_a z_b[e_{\mathcal{A}}]) = z_a z_b = \varphi_J(a) \varphi_J(b).\end{aligned}$$

故 φ_J 为同态. 因为 $\varphi_J(e_{\mathcal{A}}) = I([e_{\mathcal{A}}]) = 1$, 故 φ_J 为非零同态. 又由(8.9)式知

$$|\varphi_J(a)| = |z| = \|[a]\|_* \leq \|a\|_{\mathcal{A}},$$

故 φ_J 连续. □

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 记 $\mathfrak{M}$ 为 $\mathcal{A}$ 的全体极大理想组成的集合, 对任意取定的 $a \in \mathcal{A}$ 与 $J \in \mathfrak{M}$, 记 $\hat{a}(J) := \varphi_J(a)$, 则 $\{\hat{a}(\cdot) : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C} | a \in \mathcal{A}\}$ 构成 $\mathfrak{M}$ 上复值函数的代数, 定义

$$\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \{\hat{a}(\cdot) : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C} | a \in \mathcal{A}\}, a \mapsto \hat{a}(\cdot). \quad (8.10)$$

称 Γ 为含么交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的 **Gelfand 表示 (Gelfand representation)**.

命题 8.8 (Gelfand 表示的同态性)

依照(8.10)式定义的 Γ 是同态.

证明 由定义式(8.10)与命题8.7知对 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}, a, b \in \mathcal{A}, J \in \mathfrak{M}$ 有

$$\begin{aligned}\Gamma(\lambda a + \mu b)(J) &= (\lambda a + \mu b)^\wedge(J) = \varphi_J(\lambda a + \mu b) \\ &= \lambda \varphi_J(a) + \mu \varphi_J(b) = \lambda \hat{a}(J) + \mu \hat{b}(J) \\ &= \lambda \Gamma(a)(J) + \mu \Gamma(b)(J)\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\Gamma(ab)(J) &= (ab)^\wedge(J) = \varphi_J(ab) = \varphi_J(a) \varphi_J(b) \\ &= \hat{a}(J) \hat{b}(J) = \Gamma(a)(J) \Gamma(b)(J).\end{aligned}$$

因此 Γ 是同态. □

为了刻画 Gelfand 表示 Γ 的分析性质, 我们需要在其定义域 $\mathfrak{M}$ 上引入某个拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$, 使得 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 能让作为 Γ 输出的映射族 $\{\hat{a}(\cdot)\}_{a \in \mathcal{A}}$ 成为 $\mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射族, 根据 $\hat{a}(\cdot)$ 的定义知这也就是要 $\{\varphi_J(a)\}_{a \in \mathcal{A}}$ 是关于 J 连续的映射族. 现在 φ_J 作为 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零连续同态首先是 $\mathcal{A}$ 上的连续泛函, 因此若设

$$\Delta := \{\varphi \in \mathcal{A}^* : \forall a, b \in \mathcal{A}, \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1\} \quad (8.11)$$

为 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零连续同态全体, 则显见 $\Delta \subset \mathcal{A}^*$.

$\Delta \subset \mathcal{A}^*$ 这件事说明每个 φ_J 天生地在 $\mathcal{A}^*$ 内, 因此 $\mathfrak{M}$ 上的拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 需要能使得映射 $i : \mathfrak{M} \rightarrow \Delta, J \mapsto \varphi_J$ 在输出空间 $\mathcal{A}^*$ 上诱导的拓扑能使得 $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}^{**}$ 诱导的映射族 $\{\varphi_J(a)\}_{a \in \mathcal{A}} = \{\langle \varphi_J, \cdot \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}\}_{a \in \mathcal{A}}$ 关于 φ_J 连续, 而 $\mathcal{A}^*$ 自带的弱*拓扑 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 正好是让映射族 $\{\langle f, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}\}_{a \in \mathcal{A}}$ 关于 $f \in \mathcal{A}^*$ 连续的最弱拓扑. 只要把 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 限制在子空间 Δ 上, 得到的子空间拓扑正是使得映射族 $\{\langle \varphi_J, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}\}_{a \in \mathcal{A}}$ 连续的最弱拓扑! 这便确定了 Δ 上一个满足条件的拓扑, 如果我们能进一步用 Δ 上的这一拓扑诱导出 $\mathfrak{M}$ 上的拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$, 一切就大功告成了.

我们从 $\mathfrak{M}$ 与 Δ 的关系入手. 考虑映射

$$i: \mathfrak{M} \rightarrow \Delta, J \mapsto \varphi_J, \quad (8.12)$$

其中 φ_J 依照(8.9)式定义. 要想说明 Δ 上的拓扑能唯一确定 $\mathfrak{M}$ 上的拓扑, 就是要证映射 $i: \mathfrak{M} \rightarrow \Delta$ 是同胚. 为此需要先证 i 是双射.

下述引理暗示了 i 是单射:

引理 8.4 (极大理想的核刻画)

若 $J \in \mathfrak{M}$, 则 $\ker \varphi_J = J$, 其中 φ_J 依照(8.9)式定义.



证明 若 $a \in J$, 则 $[a] = [0_{\mathcal{A}}] = 0[e_{\mathcal{A}}]$, 于是由 $\varphi_J(a)$ 的定义知 $\varphi_J(a) = 0$, 即 $J \subset \ker \varphi_J$. 又由命题 8.3 知 $\ker \varphi_J$ 是理想, 由 $J \in \mathfrak{M}$ 蕴含的极大性知 $\ker \varphi_J \subset J$, 因此 $J = \ker \varphi_J$. $\square$

注 8.16 根据引理 8.4, 只要 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}$ 满足 $J_1 \neq J_2$, 则 $\ker \varphi_{J_1} \neq \ker \varphi_{J_2}$, 自然就有 $\varphi_{J_1} = i(J_1) \neq i(J_2) = \varphi_{J_2}$.

为说明 i 是满射, 回到 Δ 的定义, 知 Δ 本身是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零连续同态全体. 为了让 $\varphi \in \Delta$ 回到 $\mathfrak{M}$, 引理 8.4 已经暗示了回去的方法就是证明 $\ker \varphi$ 是极大理想, 而极大理想本身蕴含的闭性要求 φ 需要是连续线性泛函. 虽说这件事在前面我们已经提过了, 但它本身还可以进一步强化. 下述结果就说明了其实只要 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零同态, 它就连续:

命题 8.9 (非零同态的连续性)

设 $\mathcal{A}$ 是含幺 Banach 代数, $e_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的单位元, 则:

(i) 若 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零同态, 则 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 且对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$|\varphi(a)| \leq \|a\|_{\mathcal{A}};$$

(ii) 若 $\mathcal{A}$ 交换, 则 $a \in \mathcal{A}$ 可逆当且仅当对每个 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零同态 φ 均有 $\varphi(a) \neq 0$.



证明 (i) 因为 φ 是同态, 故对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有 $\varphi(a) = \varphi(ae_{\mathcal{A}}) = \varphi(a)\varphi(e_{\mathcal{A}})$. 因为 φ 非零, 故存在 $a \in \mathcal{A}$ 使得 $\varphi(a) \neq 0$, 因此 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$. 现对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$\varphi(\varphi(a)e_{\mathcal{A}} - a) = \varphi(a) - \varphi(e_{\mathcal{A}}) = 0,$$

由同态在可逆元上的作用 8.2(ii) 可知 $\varphi(a)e_{\mathcal{A}} - a$ 不可逆, 下面说明 $|\varphi(a)| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}$. 若 $|\varphi(a)| > \|a\|_{\mathcal{A}}$, 则 $\varphi(a) \neq 0$ 的同时 $\|\frac{a}{\varphi(a)}\|_{\mathcal{A}} < 1$, 因此引理 8.2(i) 表明 $e_{\mathcal{A}} - \frac{a}{\varphi(a)}$ 可逆, 于是 $\varphi(a)e_{\mathcal{A}} - a$ 可逆, 矛盾! 故只能有 $|\varphi(a)| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}$.

(ii) 若 a 可逆, 则 $aa^{-1} = e_{\mathcal{A}}$, 于是由 (i) 知

$$1 = \varphi(e_{\mathcal{A}}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}),$$

因此 $\varphi(a) \neq 0$ (这件事也能由命题 8.2(ii) 直接得到). 反之, 若存在不可逆元 a 满足对每个 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零同态 φ 均有 $\varphi(a) \neq 0$, 由不可逆性与定理 8.2(i) 知 a 在 $\mathcal{A}$ 的某个理想中. 又因为 $\mathcal{A}$ 含幺, 故定理 8.1 表明存在极大理想 $J_0 \in \mathfrak{M}$ 使得 $a \in J_0$, 于是引理 8.4 表明 $a \in J_0 = \ker \varphi_{J_0}$, 但 φ_{J_0} 当然也是非零同态, 且 $\varphi_{J_0}(a) = 0$, 这与假设矛盾! $\square$

注 8.17 由命题 8.9(i) 知含幺 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的全体复同态 φ 均连续, 且它们的算子范数均不超过 1, 因此 $\varphi \in \mathcal{A}^*$. 若进一步设 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$, 则 $\|\varphi\|_{\mathcal{A}^*} = 1$. 事实上, 因为对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 而言命题 8.9(i) 表明 $|\varphi(a)| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}$, 故 $\|\varphi\|_{\mathcal{A}^*} \leq 1$. 又若 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$, 则

$$\|\varphi\|_{\mathcal{A}^*} := \sup_{\|a\|=1} |\varphi(a)| \geq |\varphi(e_{\mathcal{A}})| = 1,$$

故 $\|\varphi\|_{\mathcal{A}^*} = 1$. 这件事蕴含了下述四条结论:

- Δ 的定义中可以不要要求 φ 连续, 因为在定义中 $\mathcal{A}$ 作为含幺交换 Banach 代数, 它到 $\mathbb{C}$ 的非零同态由命题 8.9(i) 必定连续.
- (8.11) 式中的 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$ 可以换为 φ 非零.
- 只要 $\varphi \in \Delta$, φ 就是满射. 这是因为对 $\forall z \in \mathbb{C}$ 有 $z = z\varphi(e_{\mathcal{A}}) = \varphi(ze_{\mathcal{A}})$.

- 对于含么交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 而言, Δ 是 $\mathcal{A}^*$ 中闭单位球的子集.

下述引理暗示了 i 是满射:

引理 8.5 (同态核的极大性)

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零同态, 则 $J := \ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个极大理想.



证明 由非零同态的连续性 8.9(i) 知 φ 连续. 因为 φ 非退化, 故命题 8.3 表明 $J = \ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想.

下面说明 J 是闭的. 任取 $a \in \overline{\ker \varphi}$, 由闭包的定义知存在 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \ker \varphi$ 使得 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 于是由 φ 的连续性进一步有

$$\varphi(a) = \varphi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(a_n) = 0,$$

因此 $a \in \ker \varphi$, 故 $\overline{\ker \varphi} \subset \ker \varphi$, 又显见 $\ker \varphi \subset \overline{\ker \varphi}$, 故 $\ker \varphi = \overline{\ker \varphi}$, 即 J 是闭的.

现在要说明 J 是极大理想, 由定理 8.2(ii) 知只需说明 $\mathcal{A}/J$ 是可除代数. 现设 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, 任取 $[a] \in \mathcal{A}/J$ 满足 $[a] \neq [0_{\mathcal{A}}]$, 则 $\varphi(a) \neq 0$, 又由 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$ 知

$$\varphi(a - \varphi(a)e_{\mathcal{A}}) = 0.$$

这说明 $a - \varphi(a)e_{\mathcal{A}} \in J$, 故 $[a] = \varphi(a)[e_{\mathcal{A}}]$, 从而 $[a]$ 可逆, 且

$$[a]^{-1} = [\varphi(a)]^{-1}[e_{\mathcal{A}}],$$

故 $\mathcal{A}/J$ 可除, 从而 J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想. □

注 8.18 回忆代数中的环的概念:

定义 8.9 (环 (ring))

若集合 R 上赋有 $R \times R \rightarrow R$ 的加法运算 $(x, y) \mapsto x + y$ 与乘法运算 $(x, y) \mapsto xy$, 且:

- (i) R 关于加法运算成为交换群,
- (ii) R 中的加法与乘法满足分配律,
- (iii) R 中的乘法满足结合律,
- (iv) R 中存在乘法单位元,

就称 R 是环. ♣

因此含么代数实际上是赋了标量乘法的环, 代数同态实际上是特殊的环同态. 现在回忆环同态基本定理:

定理 8.5 (环同态基本定理)

设 R, S 是环, $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则映射 $R/\ker f \rightarrow f(R), [a] \mapsto f(a)$ 是环同构. ♥

藉由环同态基本定理, 我们可以给出引理 8.5 中 J 极大的另一证法: 环同态基本定理表明映射

$$\tilde{\varphi}: \mathcal{A}/\ker \varphi \rightarrow \tilde{\varphi}(\mathcal{A}/\ker \varphi) \subset \mathbb{C}, \quad [a] \mapsto \varphi(a)$$

至少是环同构, 因此 $\tilde{\varphi}: \mathcal{A}/\ker \varphi \rightarrow \mathbb{C}$ 至少是单代数同态. 现由非零同态的连续性 8.9(i) 知 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 于是

$$\tilde{\varphi}(\tilde{\varphi}([a])[e_{\mathcal{A}}]) = \tilde{\varphi}([a])\tilde{\varphi}([e_{\mathcal{A}}]) = \tilde{\varphi}([a])\varphi(e_{\mathcal{A}}) = \tilde{\varphi}([a]),$$

由 $\tilde{\varphi}$ 是单射知 $\tilde{\varphi}([a])[e_{\mathcal{A}}] = [a]$, 而 $[a] \neq [0_{\mathcal{A}}] \Rightarrow \tilde{\varphi}([a]) \neq 0$, 故 $[a]$ 可逆, 且

$$[a]^{-1} = (\tilde{\varphi}([a]))^{-1}[e_{\mathcal{A}}].$$

因此 $\mathcal{A}/\ker \varphi$ 可除, 故 J 是极大理想. □

现在正式说明 $i: \mathfrak{M} \rightarrow \Delta, J \mapsto \varphi_J$ 是双射.

引理 8.6

若 i 依 (8.12) 式定义, 则 i 是双射. ♥

证明 先证 i 是满射. 任取 $\varphi \in \Delta$, 记 $J = \ker \varphi$, 则同态核的极大性 8.5 表明 J 是极大理想, 再由极大理想的核刻画 8.4 知

$$\ker \varphi_J = J = \ker \varphi.$$

下面说明 $\varphi_J = i(J) = \varphi$. 任取 $a \in \mathcal{A}$, 由 $\varphi(a - \varphi(a)e_{\mathcal{A}}) = 0$ (这里需要 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$) 知

$$\varphi_J(a - \varphi(a)e_{\mathcal{A}}) = 0,$$

又因为 $\varphi_J(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 故

$$\varphi_J(a) = \varphi(a)\varphi_J(e_{\mathcal{A}}) = \varphi(a).$$

因此 $\varphi = \varphi_J$, 即 i 是满射.

再证明 i 是单射. 设 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}$ 满足 $i(J_1) = i(J_2)$, 则 $\varphi_{J_1} = \varphi_{J_2}$, 于是核刻画 8.4 表明

$$J_1 = \ker \varphi_{J_1} = \ker \varphi_{J_2} = J_2,$$

因此 i 是单射, 从而 i 是双射.

如前述所言, 现在我们在 Δ 上赋 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 的子空间拓扑, 给出下述推论:

推论 8.2 (Δ 的弱 * 拓扑性质)

若 $\mathcal{A}$ 是含么 Banach 代数, 则依 (8.11) 式定义的 Δ 是拓扑 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 下的紧 Hausdorff 空间.



证明 由命题 8.9 的注知 Δ 是 $\mathcal{A}^*$ 中闭单位球 $B_{\mathcal{A}^*}$ 的子集. Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理 3.3 表明 $B_{\mathcal{A}^*}$ 是 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 中的紧集, 而命题 3.7 表明 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 是 Hausdorff 拓扑, 因此 $B_{\mathcal{A}^*}$ 是 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 下的紧 Hausdorff 空间, 由定理 1.14(ii) 知只需说明 Δ 是 $B_{\mathcal{A}^*}$ 在 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 下的闭子集即可.

现记 $\overline{\Delta}$ 是 Δ 在 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 下的闭包, 往证 $\overline{\Delta} = \Delta$, 显见只需说明 $\overline{\Delta} \subset \Delta$. 任取 $\varphi_0 \in \overline{\Delta}$, 根据闭包的定义知存在 φ_0 的邻域系 $\mathcal{N}(\varphi_0)$ 使得对 $\forall N \in \mathcal{N}(\varphi_0)$ 均有 $N \cap \Delta \neq \emptyset$. 根据弱 * 拓扑的邻域基 3.8, 不妨设 N 形如

$$N = N(a_1, \dots, a_k; \varepsilon) = \{\varphi \in \mathcal{A}^* : |\langle \varphi - \varphi_0, a_i \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}| < \varepsilon, \forall i = 1, \dots, k\}, k \in \mathbb{N}, \varepsilon > 0.$$

其中 $a_1, \dots, a_k \in \mathcal{A}$ 取定.

为说明 φ_0 是非零同态, 注意到 φ_0 首先是线性泛函, 于是本身对 $\forall a, b \in \mathcal{A}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 就有

$$\varphi_0(\lambda a + \mu b) = \lambda \varphi_0(a) + \mu \varphi_0(b).$$

因此只需说明 φ_0 非零且 $\varphi_0(ab) = \varphi_0(a)\varphi_0(b)$ ($\forall a, b \in \mathcal{A}$). 首先说明 $\varphi_0(e_{\mathcal{A}}) = 1$ (进而 φ 非零). 任取 $\varepsilon > 0$ 与邻域基 $N_{e_{\mathcal{A}}} = N(e_{\mathcal{A}}; \varepsilon)$, 由 $N_{e_{\mathcal{A}}} \cap \Delta \neq \emptyset$ 知可设 $\varphi' \in N_{e_{\mathcal{A}}} \cap \Delta$, 于是

$$|\langle \varphi_0 - \varphi', e_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}| < \varepsilon \Rightarrow |\varphi_0(e_{\mathcal{A}}) - 1| < \varepsilon,$$

由 ε 的任意性知只能有 $\varphi_0(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 故 φ_0 非零.

现在对 $\forall a, b \in \mathcal{A}$ 与 $\forall \varepsilon > 0$ 取 $N' = N(a, b, ab; \varepsilon)$, 知存在 $\varphi'' \in N' \cap \Delta$, 于是

$$\max\{|\langle \varphi_0 - \varphi'', a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|, |\langle \varphi_0 - \varphi'', b \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|, |\langle \varphi_0 - \varphi'', ab \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|\} < \varepsilon,$$

因此

$$\begin{aligned} |\varphi_0(ab) - \varphi_0(a)\varphi_0(b)| &\leq |\varphi_0(ab) - \varphi''(ab)| + |\varphi''(ab) - \varphi_0(a)\varphi_0(b)| \\ &< \varepsilon + |\varphi''(a)\varphi''(b) - \varphi_0(a)\varphi_0(b)| \\ &\leq \varepsilon + |\varphi''(a)\varphi''(b) - \varphi''(a)\varphi_0(b)| + |\varphi''(a)\varphi_0(b) - \varphi_0(a)\varphi_0(b)| \\ &\leq \varepsilon + |\varphi''(a)| |\varphi''(b) - \varphi_0(b)| + |\varphi_0(b)| |\varphi''(a) - \varphi_0(a)| \\ &< \varepsilon(1 + |\varphi''(a)| + |\varphi_0(b)|). \end{aligned}$$

因为 $B_{\mathcal{A}^*}$ 是 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 中的紧集 (进而是闭集), 故 $\Delta \subset B_{\mathcal{A}^*} \Rightarrow \overline{\Delta} \subset B_{\mathcal{A}^*}$, 因此 $\|\varphi_0\|_{\mathcal{A}^*} \leq 1, \|\varphi''\|_{\mathcal{A}^*} \leq 1$, 故

$$|\varphi_0(ab) - \varphi_0(a)\varphi_0(b)| < \varepsilon(1 + \|a\|_{\mathcal{A}} + \|b\|_{\mathcal{A}})$$

由 ε 的任意性知只能有 $\varphi_0(ab) = \varphi_0(a)\varphi_0(b)$. 因此 φ_0 是非零同态, 故 $\varphi_0 \in \Delta$, 亦即 $\overline{\Delta} \subset \Delta$, 从而 Δ 是 $B_{\mathcal{A}^*}$ 中在

$\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 下的闭集, 此即欲证. $\square$

最后, 因为 $i: \mathfrak{M} \rightarrow \Delta$ 是双射, 故 $i^{-1}: \Delta \rightarrow \mathfrak{M}, \varphi_J \mapsto J$ 是良定义的双射. 我们希望在 $\mathfrak{M}$ 上定义的拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 能使得 i 成为同胚, 为此最方便的做法就是考虑商映射. 回忆对拓扑空间 X, Y 而言, 只要 $\pi: X \rightarrow Y$ 是满射, 就总是可以在 Y 上定义拓扑: $O \subset Y$ 是开集当且仅当 $\pi^{-1}(O) \subset X$ 是开集. 称 Y 上的这一拓扑为 π 决定的商拓扑, 称 π 为商映射. 容易证明商映射有下述性质:

命题 8.10 (商映射的性质)

设 $\pi: X \rightarrow Y$ 是商映射, 则:

- (i) 对任意拓扑空间 B 而言, 映射 $f: Y \rightarrow B$ 连续 $\Leftrightarrow f \circ \pi: X \rightarrow B$ 连续.
- (ii) 商拓扑是 Y 上使得 (i) 成立的唯一拓扑.
- (iii) $K \subset Y$ 是闭集 $\Leftrightarrow \pi^{-1}(K)$ 是 X 中的闭集.

现在把 $i^{-1}: \Delta \rightarrow \mathfrak{M}$ 取成商映射, 在 $\mathfrak{M}$ 上赋 i^{-1} 决定的拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$, 性质 (i) 进而表明 $i: J \mapsto \varphi_J$ 连续当且仅当 $i \circ i^{-1}: \varphi_J \mapsto \varphi_J$ 连续, 而后者是显然的. 另外根据性质 (ii), 拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是唯一的. 最后商映射的取法决定了 i^{-1} 此时必是 $\Delta \rightarrow \mathfrak{M}$ 的连续映射, 结合 i 的连续性可知 i 是同胚. 因为同胚保持紧性和 Hausdorff 性, 故由 Δ 在 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 下的紧 Hausdorff 性知 $\mathfrak{M}$ 是 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 下的紧 Hausdorff 空间, 现在就称 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的 **Gelfand 拓扑 (Gelfand topology)**. 根据例 8.3, $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 上取值于 $\mathbb{C}$ 的连续函数全体 $C(\mathfrak{M})$ 成为 Banach 代数. 进一步有下述结论成立:

定理 8.6 (Gelfand 表示的连续同态性)

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 则 Gelfand 表示

$$\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M}), a \mapsto \hat{a}(\cdot), \hat{a}(J) := \varphi_J(a), \forall J \in \mathfrak{M}$$

是连续同态, 且

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|a\|_{\mathcal{A}}.$$

证明 首先说明 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示 $\Gamma a = \hat{a}$ 良定义, 亦即对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 而言, $J \mapsto \hat{a}(J)$ 是 $\mathfrak{M}$ 上的连续函数, 而后者是 Gelfand 拓扑作为商拓扑的本身具有的性质, 因此 Γ 良定义. 现由命题 8.8 知 Γ 是同态, 再由命题 8.7 知

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \max_{J \in \mathfrak{M}} |\varphi_J(a)| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}.$$

因此 Γ 连续. $\square$

注 8.19 本注说明 Gelfand 拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 的最弱性. 设 $\mathfrak{M}$ 上存在比 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 更弱的拓扑 τ' , 且 τ' 也能让映射族 $\{\hat{a}(\cdot)\}_{a \in \mathcal{A}}$ 成为 $\mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射族. 因为 $i: \mathfrak{M} \rightarrow \Delta$ 是商映射, 故 $i\tau'$ 作为 Δ 上的拓扑弱于 $i\tau_{\mathfrak{M}}$. 但 $i\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 在 Δ 上的子空间拓扑, 根据 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 的最弱性知必定存在 $a_0 \in \mathcal{A}$ 使得 $\varphi_J \mapsto \langle \varphi_J, a_0 \rangle$ 并不是 $(\Delta, i\tau') \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射, 因此复合映射 $J \mapsto \langle \varphi_J, a_0 \rangle = \hat{a}_0(J)$ 并不是 $\mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射, 矛盾! 故 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是令映射族 $\{\hat{a}(\cdot)\}_{a \in \mathcal{A}}$ 成为 $\mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射族的最弱拓扑. 图 8.1 展示了这些关系.

Gelfand 表示可以用来刻画元素 $a \in \mathcal{A}$ 的谱集.

定义 8.10 (谱集, 预解集, 谱半径)

设 $\mathcal{A}$ 是含么 Banach 代数, 其单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 中的可逆元全体. 对 $\forall a \in \mathcal{A}$, 令

$$\sigma(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda e_{\mathcal{A}} - a \notin G(\mathcal{A})\};$$

$$\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a),$$

分别称 $\sigma(a)$ 和 $\rho(a)$ 为 a 的谱集和预解集, 另记

$$r(a) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\},$$

称 $r(a)$ 为 a 的谱半径.




图 8.1: Gelfand 拓扑的构造.

定理 8.7 (谱集和预解集的基本性质)

设 $\mathcal{A}$ 是含么 Banach 代数, 则对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有:

- (i) $\rho(a)$ 是开集;
- (ii) $\sigma(a)$ 是紧集;
- (iii) $\sigma(a)$ 非空.

证明 (i) 设 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, 设 $\lambda_0 \in \rho(a)$, 则 $\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a$ 可逆. 对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 有:

$$\begin{aligned} \lambda e_{\mathcal{A}} - a &= (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a) - (\lambda_0 - \lambda)e_{\mathcal{A}} \\ &= (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)[e_{\mathcal{A}} - (\lambda_0 - \lambda)(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}], \end{aligned}$$

因此 $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}}}$ 时, 由 von Neumann 引理 8.2(i) 可知 $e_{\mathcal{A}} - (\lambda_0 - \lambda)(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 可逆, 因此 $\lambda e_{\mathcal{A}} - a$ 可逆, 从而 $\lambda \in \rho(a)$, 故 $\rho(a)$ 是开集.

(ii) 由 (i) 知 $\sigma(a)$ 至少是闭集. 另对 $\forall \lambda \in \sigma(a)$, 我们断言 $|\lambda| \leq \|a\|_{\mathcal{A}}$. 若不然, 则 $\lambda \neq 0$, 且由引理 8.2(i) 可知 $e_{\mathcal{A}} - \frac{a}{\lambda}$ 可逆, 因此 $\lambda e_{\mathcal{A}} - a$ 可逆, 故 $\lambda \in \rho(a)$, 矛盾! 因此 $\sigma(a)$ 是 $\mathbb{C}$ 的紧子空间 $\overline{B(0, \|a\|_{\mathcal{A}})}$ 的闭子集, 从而 $\sigma(a)$ 是紧集.

(iii) 若 $\sigma(a) = \emptyset$, 则 $\rho(a) = \mathbb{C}$. 对任意 $z \in \mathbb{C}$, 令 $R(z) := (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$, 则 Gelfand-Mazur 定理 8.3 的证明表明 $R(z)$ 弱解析, 下面进一步说明 $\|R(z)\|_{\mathcal{A}}$ 关于 z 在 $\mathbb{C}$ 上有界. 由 $ze_{\mathcal{A}} - a$ 关于 z 在 $\mathbb{C}$ 上连续与引理 8.2(ii) 知 $R(z)$ 关于 z 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 因此 $\|R(z)\|_{\mathcal{A}}$ 关于 z 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 故 $\|R(z)\|_{\mathcal{A}}$ 在 $\overline{B(0, 2\|a\|_{\mathcal{A}})}$ 上有界. 当 $|z| > 2\|a\|_{\mathcal{A}}$ 时, 因为 $\|z^{-1}a\|_{\mathcal{A}} < 1$, 故引理 8.2(i) 表明

$$\begin{aligned} \|R(z)\|_{\mathcal{A}} &= |z|^{-1} \|(e_{\mathcal{A}} - z^{-1}a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \\ &\leq |z|^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (|z|^{-1}\|a\|_{\mathcal{A}})^n \\ &= |z|^{-1} \frac{1}{1 - |z|^{-1}\|a\|_{\mathcal{A}}} = \frac{1}{|z| - \|a\|_{\mathcal{A}}} < \frac{1}{\|a\|_{\mathcal{A}}}, \end{aligned}$$

因此 $\|R(z)\|_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界, 进一步可知 $\|R(z)\|_{\mathcal{A}} \leq \frac{1}{|z| - \|a\|_{\mathcal{A}}} \rightarrow 0 (|z| \rightarrow \infty)$. 现在对 $\forall f \in \mathcal{A}^*$ 与 $z \in \mathbb{C}$, 记

$$F(z) := \langle f, R(z) \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}},$$

则根据 Cauchy-Schwarz 不等式知 $|F(z)|$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界. $R(z)$ 的弱解析性表明 $F(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 因此 Liouville 定理表明 $F(z)$ 只能是常值函数. 又因为 $|z| \rightarrow \infty$ 时有

$$|F(z)| \leq \|f\|_{\mathcal{A}^*} \|R(z)\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0.$$

故 $F \equiv 0$. 现在对每个取定的 $z \in \mathbb{C}$ 在 Hahn-Banach 定理的推论 2.2 中取 f_R 满足 $\langle f_R, R(z) \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \|R(z)\|_{\mathcal{A}}^2$, 可

知 $R(z) = 0_{\mathcal{A}}$, 这与 $z \in \rho(A)$ 矛盾! 故 $\sigma(a) \neq \emptyset$.

注 8.20

- (i) 不难发现基本性质 8.7, Gelfand-Mazur 定理 8.3 与谱点存在定理 6.3 的证明思路都是类似的.
- (ii) 基本性质 8.7 蕴含了 Gelfand-Mazur 定理 8.3. 事实上, 设 $\mathcal{A}$ 是含么可除 Banach 代数, 任取 $a \in \mathcal{A}$, 设 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$. 由基本性质 8.7(iii) 知 $\sigma(a) \neq \emptyset$, 因此存在 $\lambda_a \in \sigma(a)$ 满足 $\lambda_a e_{\mathcal{A}} - a \notin G(\mathcal{A})$. 因为 $\mathcal{A}$ 可除, 故只能有 $\lambda_a e_{\mathcal{A}} - a = 0_{\mathcal{A}}$, 即 $a = \lambda_a e_{\mathcal{A}}$. 这便可以定义映射

$$i: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}, a \mapsto \lambda_a.$$

首先说明 i 良定义. 若另有 $\lambda_b \in \sigma(a)$, 则也有 $a = \lambda_b e_{\mathcal{A}}$, 因此 $\lambda_b = \lambda_a$, 从而 i 良定义, 这也说明对每个 $a \in \mathcal{A}$ 而言 $\sigma(a)$ 都是非空单点集.

下面说明 i 是等距同构. 前面已经说明了对每个 $a \in \mathcal{A}$, 存在唯一 $\lambda_a \in \mathbb{C}$ 使得 $a = \lambda_a e_{\mathcal{A}}$, 因此对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$[i(a)]e_{\mathcal{A}} = \lambda_a e_{\mathcal{A}} = a, \quad (8.13)$$

故对 $\forall \mu, \nu \in \mathbb{C}, \forall a, b \in \mathcal{A}$ 有

$$\begin{aligned} [i(\mu a + \nu b)]e_{\mathcal{A}} &= \mu a + \nu b = \mu [i(a)]e_{\mathcal{A}} + \nu [i(b)]e_{\mathcal{A}} \\ &= [\mu i(a) + \nu i(b)]e_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

因此 $i(\mu a + \nu b) = \mu i(a) + \nu i(b)$. 进一步由 (8.13) 式知

$$[i(ab)]e_{\mathcal{A}} = ab = [i(a)]e_{\mathcal{A}} [i(b)]e_{\mathcal{A}} = [i(a)i(b)]e_{\mathcal{A}}$$

因此 $i(ab) = i(a)i(b)$, 故 i 是同态.

现若 $a \in \mathcal{A}$ 且 $i(a) = 0$, 由 (8.13) 式知 $a = [i(a)]e_{\mathcal{A}} = 0_{\mathcal{A}}$, 因此 i 是单射. 又任取 $z \in \mathbb{C}$, 由 (8.13) 式知 $[i(ze_{\mathcal{A}})]e_{\mathcal{A}} = ze_{\mathcal{A}}$, 因此 $i(ze_{\mathcal{A}}) = z$, 故 i 是满射. 至此可得 i 是代数同构.

下面说明 i 等距. 任取 $a \in \mathcal{A}$, 由 (8.13) 式知 $a = [i(a)]e_{\mathcal{A}}$, 由此及 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$ 知

$$|i(a)| = |i(a)|\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = \|i(a)\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}},$$

故 i 等距. □

定理 8.8 (谱集与谱半径的 Gelfand 表示刻画)

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 则对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$\sigma(a) = \{\hat{a}(J) : J \in \mathfrak{M}\} = R(\Gamma a),$$

进而

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\} = r(a).$$



证明 设 $\mathcal{A}$ 的单位元为 $e_{\mathcal{A}}$. 由定理 8.1 与定理 8.2 知

$$\begin{aligned} \lambda \in \sigma(a) &\Leftrightarrow \lambda e_{\mathcal{A}} - a \notin G(\mathcal{A}) \\ &\Leftrightarrow \exists J \in \mathfrak{M}, \lambda e_{\mathcal{A}} - a \in J \\ &\Leftrightarrow \exists J \in \mathfrak{M}, \varphi_J(\lambda e_{\mathcal{A}} - a) = 0. \end{aligned}$$

故 $\lambda = \varphi_J(a) = \hat{a}(J)$ (这里需要 $\varphi_J(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 见命题 8.9), 因此 $\sigma(a) = \{\hat{a}(J) : J \in \mathfrak{M}\}$, 且

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \sup_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma a(J)| = \sup_{J \in \mathfrak{M}} |\hat{a}(J)| = \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda| = r(a).$$



我们接下来进一步研究含么交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示 Γ 的性质, 具体来说我们要研究三个问题:

- (i) Γ 在何时成为单射?
- (ii) Γ 在何时成为等距单射?
- (iii) Γ 在何时成为等距到上同构?

对于问题 (i), 注意到

$$\begin{aligned}\Gamma a = 0 &\Leftrightarrow \hat{a}(J) = \varphi_J(a) = 0, \forall J \in \mathfrak{M} \\ &\Leftrightarrow a \in \ker \varphi_J = J, \forall J \in \mathfrak{M} \\ &\Leftrightarrow a \in \bigcap_{J \in \mathfrak{M}} J,\end{aligned}$$

因此 Γ 为单射当且仅当 $\bigcap_{J \in \mathfrak{M}} J = \{0_{\mathcal{A}}\}$. 我们称满足 $\bigcap_{J \in \mathfrak{M}} J = \{0_{\mathcal{A}}\}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 为半单代数 (semisimple algebra), 则 Γ 是单射当且仅当 $\mathcal{A}$ 半单.

为研究问题 (ii), (iii), 我们需要下述 Gelfand 引理:

引理 8.7 (Gelfand)

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 则对每个 $a \in \mathcal{A}$ 有

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}.$$



证明 首先梳理一下整个证明的思路. 这里的证明过程和先前针对算子的 Gelfand 定理 6.4 思路基本是一样的, 不过这里极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$ 的存在性⁷搬到了习题 8.15. 总的来说, 我们的目标还是证明下述两个用于逼近的极限式:

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon (\forall \varepsilon > 0).$$

在 n 足够大时上述两式两端都可以取 n 次幂. 左式此时就展现了 Gelfand 表示在处理算子谱问题时的优势了: 它和算子的复合是天生适配的. 准确来说, 左式要证的在某种意义上就是

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}^n \leq \|a^n\|_{\mathcal{A}},$$

本身 $\Gamma(a^n) = (\Gamma a)^n$, 而上左式某种意义上是点态值 $\Gamma(a)(J)$, 所以很自然地会猜想是否有 $\|\Gamma a^n\|_{C(\mathfrak{M})} = \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}^n$, 这也就是我们要证的第一步. 然而因为 Γ 作为连续同态只能优化 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}$ 的方向, 所以对于反向不等式 $\|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|\Gamma(a)\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon$, 我们还是得回到老路子, 用 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = r(a)$ 和 $r(a)$ 蕴含的 von Neumann 引理给出证明. 之前在算子情形下我们是受 Cauchy-Hadamard 公式的启发给出的步骤, 不过这里因为我们研究的对象抽象成了代数元素 a (而非某个天生具有作用对象的算子 A), 其实可以考虑另一条路: 用类似 Cauchy 积分公式的方法刻画 a^n . 回忆 Cauchy 积分公式指的是只要 f 在 Ω 上全纯, 围道 γ 在 Ω 内, 对合适的 z 就能有:

$$f(z) = \frac{1}{i2\pi} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

如果形式上令 $f(z) = z^n, z = a$, 就能有

$$a^n = \frac{1}{i2\pi} \int_{\gamma} \xi^n (\xi - a)^{-1} d\xi.$$

$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}$ 作为谱半径天生和围道 γ 有关, ξ^n 提供了 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}$ 的幂次, 而 $(\xi - a)^{-1} = (\xi e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 可以通过 von Neumann 引理控制, 通过放大不等式就能得到 $\|a^n\|_{\mathcal{A}}$ 的 Γa 控制了. 后面针对上极限的一长串证明其实就是在干这个事: 找到 a^n 所满足的合适的 Cauchy 积分公式, 用 von Neumann 引理控制 $(ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$, 再用放大不等式得到估计.

下面开始正式证明. 因为 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 是同态, 故对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与任意 $a \in \mathcal{A}$ 有

$$\Gamma(a^n) = (\Gamma a)^n. \quad (8.14)$$

下面断言

$$\left[\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)| \right]^n = \max_{J \in \mathfrak{M}} [|\Gamma(a)(J)|]^n. \quad (8.15)$$

⁷当然算子的 Gelfand 定理本身也不需要特别说明这个极限的存在性, 两个定理本质上都是用上下极限的夹逼来证明的. 这里特别提一下是因为极限存在性本身只需要 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数, 所以其实把极限存在性单拎出来还更好一些.

事实上, 显见对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 有

$$|\Gamma(a)(J)| \leq \max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)|.$$

故 $|\Gamma(a)(J)|^n \leq [\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)|]^n$, 从而

$$\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)|^n \leq [\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)|]^n.$$

又显见对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 有

$$|\Gamma(a)(J)|^n \leq \max_{J \in \mathfrak{M}} [|\Gamma(a)(J)|^n],$$

因此

$$|\Gamma(a)(J)| \leq [\max_{J \in \mathfrak{M}} [|\Gamma(a)(J)|^n]]^{\frac{1}{n}},$$

故

$$\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)| \leq [\max_{J \in \mathfrak{M}} [|\Gamma(a)(J)|^n]]^{\frac{1}{n}},$$

即

$$[\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)|]^n \leq \max_{J \in \mathfrak{M}} [|\Gamma(a)(J)|^n],$$

因此(8.15)式成立.

现在由(8.15)式, (8.14)式与 Gelfand 表示的连续性8.6知

$$\begin{aligned} \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}^n &= [\max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a)(J)|]^n \\ &= \max_{J \in \mathfrak{M}} [|\Gamma(a)(J)|]^n = \max_{J \in \mathfrak{M}} |\Gamma(a^n)(J)| \\ &= \|\Gamma a^n\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|a^n\|_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

因此

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}.$$

现在还需证明对 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon.$$

当 $|\lambda| > \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = r(a)$ 时, 知 $\lambda \notin \sigma(a)$, 因此 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \in \mathcal{A}$. 下面说明 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 关于 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 连续. 事实上, 任取 $\lambda_0, \lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$, 由谱半径的 Gelfand 表示刻画8.8知 $(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 和 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 均存在. 当 $\lambda \rightarrow \lambda_0$ 时, 显见

$$\lambda e_{\mathcal{A}} - a \rightarrow \lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a,$$

于是引理8.2(ii)表明

$$(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rightarrow (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1},$$

因此 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 关于 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 连续. 令

$$C_{\varepsilon} := \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon\} \subset \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}, \quad (8.16)$$

记

$$M_{\varepsilon} := \max_{\lambda \in C_{\varepsilon}} \|(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}}.$$

因为 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 在 C_{ε} 上连续, 而 C_{ε} 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, 故 $M_{\varepsilon} < \infty$.

下面说明 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 关于 λ 在区域 $\mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 内弱解析. 事实上, 任意取定 $\varphi \in \mathcal{A}^*$, 对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 记

$$F(\lambda) := \langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}.$$

下证 F 在 $\mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 内解析. 任取 $\lambda_0, \lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$, 因为

$$\begin{aligned} (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} - (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} &= [(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(\lambda e_{\mathcal{A}} - a) - e_{\mathcal{A}}](\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \\ &= [(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(\lambda e_{\mathcal{A}} - a) - (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)](\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \\ &= (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}. \end{aligned}$$

由上式, $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 蕴含的连续线性性与前述 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 的连续性知

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{F(\lambda_0) - F(\lambda)}{\lambda_0 - \lambda} &= \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{\langle \varphi, (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} - \langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{\lambda_0 - \lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{(\lambda - \lambda_0) \langle \varphi, (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{\lambda_0 - \lambda} \\ &= -\langle \varphi, (\lambda_0 e_{\mathcal{A}} - a)^{-2} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}. \end{aligned}$$

因此 F 在 $\lambda_0 \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 处可微, 由 λ_0 的任意性知 F 在 $\mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 中解析, 故 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 关于 λ 在区域 $\mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 中弱解析.

现在对 $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$, 令 $w := \frac{1}{\lambda}$, 则 $w \in B(0, \frac{1}{\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2}})$, 故

$$F(\lambda) = \langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \langle \varphi, w(e_{\mathcal{A}} - wa)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} =: T(w). \quad (8.17)$$

下面说明 T 在 $B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1})$ 上解析. 事实上, 若 $0 < |w| < (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1}$, 则由(8.17)式与 F 在 $\mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 内的解析性知 T 在 w 处可微. 现设 $w = 0$, 任取 $h \in \mathbb{C}$ 满足 $|h| < \frac{1}{2\|a\|_{\mathcal{A}} + \varepsilon}$, 则由引理8.2(i)知

$$(e_{\mathcal{A}} - ha)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (ha)^n = e_{\mathcal{A}} + ha \sum_{n=0}^{\infty} (ha)^n.$$

由此及 $|h|\|a\|_{\mathcal{A}} < \frac{1}{2}$ 知当 $h \rightarrow 0$ 时有

$$\begin{aligned} \|(e_{\mathcal{A}} - ha)^{-1} - e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} &\leq \|ha\|_{\mathcal{A}} \sum_{n=0}^{\infty} \|ha\|_{\mathcal{A}}^n = \|ha\|_{\mathcal{A}} \frac{1}{1 - |h|\|a\|_{\mathcal{A}}} \\ &\leq 2|h|\|a\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} (e_{\mathcal{A}} - ha)^{-1} = e_{\mathcal{A}}. \quad (8.18)$$

因为 Gelfand 表示的连续性8.6表明 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|a\|_{\mathcal{A}}$, 故 $|h| < \frac{1}{2\|a\|_{\mathcal{A}} + \varepsilon} \Rightarrow h \in B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1})$, 因此 $|h| < \frac{1}{2\|a\|_{\mathcal{A}} + \varepsilon}$ 时 $T(h)$ 至少有定义. 于是结合 T 的定义式(8.17), $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 与(8.18)式知

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h) - T(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\langle \varphi, h(e_{\mathcal{A}} - ha)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} - \langle \varphi, 0_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \langle \varphi, (e_{\mathcal{A}} - ha)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \langle \varphi, e_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}. \end{aligned}$$

故 T 在 0 处可微, 因此 T 在 $B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1})$ 上解析.

我们接下来断言对 $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 有下述 Laurent 展式成立:

$$\langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^{-(n+1)}}{i2\pi} \int_{C_{\varepsilon}} z^n \langle \varphi, (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} dz,$$

其中 $\varepsilon \in (0, \infty)$, C_{ε} 依照(8.16)式定义. 事实上, 由 T 在 $B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1})$ 内的解析性与 T 的 Taylor 展式知对 $\forall w \in B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1})$ 有

$$\langle \varphi, w(e_{\mathcal{A}} - wa)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = T(w) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n, \quad (8.19)$$

其中

$$c_n := \frac{1}{i2\pi} \int_{\partial B(0, R)} \frac{\langle \varphi, \xi(e_{\mathcal{A}} - \xi a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{\xi^{n+1}} d\xi = \frac{T^{(n)}(0)}{n!},$$

这里 $R := (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon)^{-1}, \varepsilon \in (0, \infty)$. 注意由(8.19)式知

$$c_0 = T(0) = \langle \varphi, 0_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = 0,$$

故(8.19)式表明对 $\forall w \in B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1})$ 有

$$\langle \varphi, w(e_{\mathcal{A}} - wa)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n w^n. \quad (8.20)$$

又因为对 $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 有 $w := \frac{1}{\lambda} \in B(0, (\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})^{-1}) \setminus \{0\}$, 故由(8.20)式知

$$\begin{aligned} \langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} &= \left\langle \varphi, \frac{1}{\lambda} \left(e_{\mathcal{A}} - \frac{a}{\lambda} \right)^{-1} \right\rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \langle \varphi, w(e_{\mathcal{A}} - wa)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n w^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{\lambda^n}. \end{aligned} \quad (8.21)$$

注意到对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 考虑极坐标换元 $\xi = \rho e^{i\theta}$ 知

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{i2\pi} \int_{\partial B(0, \rho)} \frac{\langle \varphi, \xi(e_{\mathcal{A}} - \xi a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{\xi^{n+1}} d\xi \\ &= \frac{1}{i2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\langle \varphi, \rho e^{i\theta}(e_{\mathcal{A}} - \rho e^{i\theta}a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{(\rho e^{i\theta})^{n+1}} \rho i e^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\langle \varphi, \rho e^{i\theta}(e_{\mathcal{A}} - \rho e^{i\theta}a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{(\rho e^{i\theta})^n} d\theta \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{-2\pi} \frac{\langle \varphi, \rho e^{-i\theta}(e_{\mathcal{A}} - \rho e^{-i\theta}a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}}{(\rho e^{-i\theta})^n} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^0 (\rho^{-1} e^{i\theta})^n \langle \varphi, (\rho^{-1} e^{i\theta} e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} d\theta \\ &= \frac{1}{i2\pi} \int_0^{2\pi} (\rho^{-1} e^{i\theta})^{n-1} \langle \varphi, (\rho^{-1} e^{i\theta} e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} (\rho^{-1} e^{i\theta})' d\theta \\ &= \frac{1}{i2\pi} \int_{\partial B(0, \rho^{-1})} z^{n-1} \langle \varphi, (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} dz. \end{aligned}$$

根据上式结果, (8.21)式与 C_ε 的定义即知对 $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{B(0, \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{\varepsilon}{2})}$ 有

$$\begin{aligned} \langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^{-n}}{i2\pi} \int_{C_\varepsilon} z^{n-1} \langle \varphi, (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} dz \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^{-(n+1)}}{i2\pi} \int_{C_\varepsilon} z^n \langle \varphi, (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} dz, \end{aligned}$$

此即欲证断言.

回到引理8.2(i), 当 $|\lambda| > \|a\|$ 时有

$$(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-(n+1)} a^n$$

因此 $|\lambda| > \|a\|$ 时由 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 知

$$\langle \varphi, (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-(n+1)} \langle \varphi, a^n \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}.$$

由 Laurent 展式的唯一性知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$\langle \varphi, a^n \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} = \frac{1}{i2\pi} \int_{C_\varepsilon} z^n \langle \varphi, (ze_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} dz.$$

故对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 与 $\forall \varphi \in \mathcal{A}^*$ 有

$$|\langle \varphi, a^n \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}| \leq \|\varphi\|_{\mathcal{A}^*} M_\varepsilon (\varepsilon + \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})})^{n+1}.$$

又由 $a^n \in \mathcal{A} \subset \mathcal{A}^{**}$ 知对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$\|a^n\|_{\mathcal{A}} = \|a^n\|_{\mathcal{A}^{**}} = \sup_{0 \neq \varphi \in \mathcal{A}^*} \frac{|\langle \varphi, a^n \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|}{\|\varphi\|_{\mathcal{A}^*}} \leq M_\varepsilon(\varepsilon + \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})})^{n+1},$$

故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性即知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})},$$

故 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$. □

定理 8.9 (Gelfand 表示为单射的等价条件)

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 则下述三条命题等价:

- (i) $\mathcal{A}$ 半单;
- (ii) $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 是单射;
- (iii) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = 0$, 则 $a = 0_{\mathcal{A}}$.



证明 先前已经说明了 (i) $\Leftrightarrow$ (ii). 下面说明 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii). 设 (ii) 成立, 则当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = 0$ 时, 由 Gelfand 引理 8.7 知 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = 0$. 又因为 Γ 是单射, 故只能有 $a = 0_{\mathcal{A}}$.

若 (iii) 成立, 由 Gelfand 引理 8.7 知只要 $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = 0$, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = 0.$$

因此 $a = 0_{\mathcal{A}}$, 即 Γ 是单射. □

定理 8.10 (Gelfand 表示为等距单射的等价条件)

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, 则 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 是等距单射当且仅当

$$\|a^2\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}^2 \quad (8.22)$$

对每个 $a \in \mathcal{A}$ 成立. □

证明 $\Rightarrow$: 设 Γ 是等距单射, 则对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有

$$\|a^2\|_{\mathcal{A}} = \|\Gamma a^2\|_{C(\mathfrak{M})} = \|(\Gamma a)^2\|_{C(\mathfrak{M})} \stackrel{(A)}{=} \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})}^2 = \|a\|_{\mathcal{A}}^2.$$

其中 (A) 是 (8.15) 式.

$\Leftarrow$: 由 (8.22) 式知对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 有

$$\|a^{2^k}\|_{\mathcal{A}} = \|(a^{2^{k-1}})^2\|_{\mathcal{A}} = \|a^{2^{k-1}}\|_{\mathcal{A}}^2 = \cdots = \|a\|_{\mathcal{A}}^{2^k}.$$

由上式与 Gelfand 引理 8.7 知

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|a^{2^k}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^k}} = \|a\|_{\mathcal{A}}.$$



问题 (iii) 将在 C^* 代数一节进行讨论.

[19]2.2 习题

练习 8.6

证明例8.4中 $\mathcal{A}$ 完备, 其中

$$\mathcal{A} := \left\{ u \in C(\mathbb{S}^1) : u(e^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}, \|u\|_{\mathcal{A}} := \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n| < \infty \right\}.$$

证明 设 $\{u_n\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 Cauchy 列, 知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > m > N \left(\|u_n - u_m\|_{\mathcal{A}} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_{n,k} - c_{m,k}| = \|\{c_{n,k}\}_k - \{c_{m,k}\}_k\|_{l^1(\mathbb{Z})} < \varepsilon \right).$$

这说明 $\{\{c_{n,k}\}_k\}_n$ 是 $l^1(\mathbb{Z})$ 中的 Cauchy 列, 于是存在 $\{c_k\}_k \in l^1(\mathbb{Z})$ 使得 $\{c_{n,k}\}_k \rightarrow \{c_k\}_k (l^1(\mathbb{Z}))$. 记

$$u(e^{i\theta}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta},$$

下面首先说明 $u \in C(\mathbb{S}^1)$. 取定 $\theta_0 \in \mathbb{R}$, 因为 $\{c_k e^{ik\theta}\}_k$ 关于 k 求和时绝对收敛, 故

$$\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} u(e^{i\theta}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \lim_{\theta \rightarrow \theta_0} c_k e^{ik\theta} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta_0} = u(e^{i\theta_0}),$$

故 $u \in C(\mathbb{S}^1)$. 进一步知

$$\|u_n - u\|_{\mathcal{A}} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_{n,k} - c_k| = \|\{c_{n,k}\}_k - \{c_k\}_k\|_{l^1(\mathbb{Z})} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

故 $u_n \rightarrow u(\mathcal{A})$, 因此 $\mathcal{A}$ 完备. □

练习 8.7

设 X 为赋范线性空间, φ, ψ 为 X 上的线性泛函. 若存在 $x_0 \in X$ 使得 $\varphi(x_0) = \psi(x_0) \neq 0$, 且 $\ker \varphi = \ker \psi$, 证明 $\varphi = \psi$.

证明 首先说明 $\ker \varphi = \ker \psi \Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K} (\varphi = \lambda\psi)$. 定义映射

$$G : R(\varphi) \rightarrow \mathbb{K}, y = \varphi(x) \mapsto G(y) := \psi(x).$$

首先说明 G 良定义, 这是因为若 x_1, x_2 满足 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$, 则

$$\varphi(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 \in \ker \varphi = \ker \psi \Rightarrow \psi(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow \psi(x_1) = \psi(x_2).$$

显见 G 是线性映射. 现在因为 $R(\varphi) \subset \mathbb{K}$, 由 $\mathbb{K}$ 是有限维空间, $R(\varphi)$ 是闭子空间知故 G 总能延拓到 $\mathbb{K}$ 上. 记延拓后的算子为 $\widetilde{G}$, 则 $\widetilde{G}$ 作为 $\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ 的线性映射必满足

$$\exists \lambda \in \mathbb{K} \forall z \in \mathbb{K} (\widetilde{G}(z) = \lambda z).$$

特别取 $\widetilde{G}|_{R(\varphi)}$ 知对任意 $x \in X$ 均有

$$\lambda \varphi(x) = \widetilde{G}(\varphi(x)) = \psi(x).$$

代入 $x = x_0$ 即得 $\lambda = 1$, 故 $\varphi = \psi$. □

注 8.21 上述过程是更适应于多个泛函的对应结论的. 单针对两个泛函的结论, 本题还能仿照引理8.6进行证明. 任取 $x \in X$, 知

$$\varphi(\varphi(x_0)x - \varphi(x)x_0) = 0.$$

因为 $\ker \varphi = \ker \psi, \varphi(x_0) = \psi(x_0) \neq 0$, 故

$$\psi(\varphi(x_0)x - \varphi(x)x_0) = 0 \Rightarrow \varphi(x_0)\psi(x) = \varphi(x)\psi(x_0) \Rightarrow \psi(x) = \varphi(x).$$

□

练习 8.8

设所有记号同定理 8.4, 证明

$$\inf_{x \in [a], y \in [b]} \|xy\|_{\mathcal{A}} = \inf_{x \in [a]} \|x\|_{\mathcal{A}} \inf_{y \in [b]} \|y\|_{\mathcal{A}}.$$



证明 一方面由 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数知

$$\|xy\|_{\mathcal{A}} \leq \|x\|_{\mathcal{A}} \|y\|_{\mathcal{A}}, \quad \forall x, y \in \mathcal{A},$$

上式两端先关于 $x \in [a]$ 取下确界, 再关于 $y \in [b]$ 取下确界即得

$$\inf_{x \in [a], y \in [b]} \|xy\|_{\mathcal{A}} \leq \inf_{x \in [a]} \|x\|_{\mathcal{A}} \inf_{y \in [b]} \|y\|_{\mathcal{A}}.$$

另一方面, 定理 8.4 已经表明存在等距同构 $I: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{C}, [a] =: z_a[e_{\mathcal{A}}] \mapsto z_a$ 满足 $\|[a]\|_* = \inf_{x \in [a]} \|x\|_{\mathcal{A}} = |z_a|, I([ab]) = z_a z_b$, 故针对反向不等式只需证

$$\inf_{x \in [a], y \in [b]} \|xy\|_{\mathcal{A}} \geq |z_a| |z_b| = |z_a z_b|.$$

事实上因为

$$x \in [a] \wedge y \in [b] \Rightarrow xy \in [ab],$$

故

$$\inf_{x \in [a], y \in [b]} \|xy\|_{\mathcal{A}} \geq \inf_{xy \in [ab]} \|xy\|_{\mathcal{A}} = |z_{ab}| = |z_a z_b|.$$

至此反向不等式即证, 从而结论得证. □

练习 8.9

设 $\mathcal{A}$ 是含么 $e_{\mathcal{A}}$ 的 Banach 代数, $a, b \in \mathcal{A}$, 证明

- (i) 若 $e_{\mathcal{A}} - ab$ 可逆, 则 $e_{\mathcal{A}} - ba$ 可逆.
- (ii) 若非零复数 $\lambda \in \sigma(ab)$, 则 $\lambda \in \sigma(ba)$.
- (iii) 若 a 可逆, 则 $\sigma(ab) = \sigma(ba)$.



证明 (i) 设 $c(e_{\mathcal{A}} - ab) = (e_{\mathcal{A}} - ab)c = e_{\mathcal{A}}$, 知 $c = e_{\mathcal{A}} + cab = e_{\mathcal{A}} + abc$, 则

$$\begin{aligned} (e_{\mathcal{A}} - ba)(e_{\mathcal{A}} + bca) &= e_{\mathcal{A}} - ba + bca - babca \\ &= e_{\mathcal{A}} - ba + bca - b(c - e_{\mathcal{A}})a \\ &= e_{\mathcal{A}} - ba + bca - bca + ba = e_{\mathcal{A}}, \\ (e_{\mathcal{A}} + bca)(e_{\mathcal{A}} - ba) &= e_{\mathcal{A}} - ba + bca - bcaba \\ &= e_{\mathcal{A}} - ba + bca - b(c - e_{\mathcal{A}})a \\ &= e_{\mathcal{A}} - ba + bca - bca + ba = e_{\mathcal{A}}, \end{aligned}$$

故 $e_{\mathcal{A}} - ba$ 可逆, 且其逆为 $e_{\mathcal{A}} + bca$.

(ii) 考虑反证. 若 $\lambda \in \sigma(ab), \lambda \notin \sigma(ba)$, 则 $\lambda \in \rho(ba)$. 因为 $\lambda \neq 0$, 故 $e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}ba$ 可逆, 由 (i) 知 $e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}ab$ 可逆, 故 $\lambda \in \rho(ab)$, 矛盾!

(iii) 由 (ii) 知只需证明 $0 \in \sigma(ab) \Leftrightarrow 0 \in \sigma(ba)$ 即可, 这又只需证 $0 \in \rho(ab) \Leftrightarrow 0 \in \rho(ba)$. 知 $0 \in \rho(ab) \Leftrightarrow ab$ 可逆, 但因为已知 a 可逆, 故易证 $(ab)^{-1}a = b^{-1}$, 从而 b 可逆, 进而 ba 可逆, 因此确有 $0 \in \rho(ab) \Leftrightarrow 0 \in \rho(ba)$, 至此

结论得证. □

注 8.22 (i) 中逆元 $e_{\mathcal{A}} + bca$ 的构造是有迹可循的. 从 $e_{\mathcal{A}} - ab$ 出发可知

$$\begin{aligned} (e_{\mathcal{A}} - ab)(e_{\mathcal{A}} - ab)^{-1} &= e_{\mathcal{A}} \\ \Rightarrow (b - bab)(e_{\mathcal{A}} - ab)^{-1} &= b \\ \Rightarrow (e_{\mathcal{A}} - ba)b(e_{\mathcal{A}} - ab)^{-1} &= b \\ \Rightarrow (e_{\mathcal{A}} - ba)b(e_{\mathcal{A}} - ab)^{-1}a &= ba - e_{\mathcal{A}} + e_{\mathcal{A}} \\ \Rightarrow (e_{\mathcal{A}} - ba)(b(e_{\mathcal{A}} - ab)^{-1}a + e_{\mathcal{A}}) &= e_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

练习 8.10

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是两个含么交换 Banach 代数, $\mathcal{B}$ 半单, 且 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是同态, 证明 φ 连续. 💧

证明 φ 为零同态时命题无所可证, 下设 φ 非零. 首先说明 φ 保么, 即 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$. 设 $\mathcal{B}$ 的 Gelfand 表示为 $\Gamma_{\mathcal{B}}$, $\mathcal{B}$ 的全体极大理想依 Gelfand 拓扑构成的空间为 $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$. 因为 $\mathcal{B}$ 半单, 故 $\mathcal{B} \ni b = 0_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow \Gamma_{\mathcal{B}}(b) = 0_{C(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}})}$, 因此只需说明 $\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(e_{\mathcal{A}})) \equiv 1_{C(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}})}$ 即可. 现任取 $J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$, 则 $\phi := \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(\cdot))(J)$ 是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的映射, 且由 $\varphi, \Gamma_{\mathcal{B}}$ 均为同态知 ϕ 是同态. 因为 φ 非零, 故由 $\Gamma_{\mathcal{B}}$ 是单射知 ϕ 非零, 因此 ϕ 作为 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零同态必有 $\phi(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 此即

$$\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(e_{\mathcal{A}}))(J) = \varphi_J(\varphi(e_{\mathcal{A}})) = 1, \forall J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}},$$

此即 $\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(e_{\mathcal{A}})) \equiv 1$, 故 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$.

接下来用闭图像定理说明 φ 连续. 因为 $\mathcal{A} = D(\varphi)$ 本身是闭集, 故只需证明

$$\begin{cases} \mathcal{A} \ni a_n \rightarrow a(\mathcal{A}), \\ \varphi(a_n) \rightarrow b(\mathcal{B}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \in \mathcal{A}, \\ b = \varphi(a). \end{cases}$$

$a \in \mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}$ 完备自动成立. 现因 φ 保么, 故对任取的 $J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$ 而言, $\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(\cdot))(J)$ 都是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的非零同态, 进而

$$\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a_n))(J) \rightarrow \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))(J), \forall J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}.$$

另一方面由 $\Gamma_{\mathcal{B}}$ 自身连续知

$$\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a_n))(J) \rightarrow \Gamma_{\mathcal{B}}(b)(J), \forall J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}},$$

故

$$\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a) - b)(J) = 0(\forall J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}) \Rightarrow \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a) - b) = 0_{C(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}})}.$$

由 $\Gamma_{\mathcal{B}}$ 是单射知只能有 $b = \varphi(a)$, 至此由闭图像定理即得 φ 连续. □

练习 8.11

设 X 是集合, 另设对每个 $x \in X$ 均存在 X 中的集族 $\mathcal{U}_x$ 满足

- (i) 对任意 $x \in X$ 均有 $\mathcal{U}_x \neq \emptyset$, 且若 $U \in \mathcal{U}_x$ 则 $x \in U$.
- (ii) 若 $U, V \in \mathcal{U}_x$, 则 $U \cap V \in \mathcal{U}_x$.
- (iii) 若 $U \in \mathcal{U}_x$ 且 $U \subset V$, 则 $V \in \mathcal{U}_x$.
- (iv) 若 $U \in \mathcal{U}_x$, 则存在 $V \in \mathcal{U}_x$ 满足 $V \subset U$, 且对任意 $y \in V$ 有 $V \in \mathcal{U}_y$,

则 X 中存在唯一拓扑 τ 使得对任意 $x \in X$ 而言集族 $\mathcal{U}_x$ 恰为 x 在拓扑空间 (X, τ) 中的邻域系.

现设 X 是线性赋范空间, 对任意 $\varepsilon \in (0, \infty)$, 任意 $n \in \mathbb{N}$ 与任意 $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ 令

$$V(\varepsilon, x_1, \dots, x_n) := \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, i \in \{1, \dots, n\}\}. \quad (8.23)$$

称 X^* 中任意含某个形如(8.23)的集合的子集为 X^* 中零泛函的一个邻域. 根据前述集族诱导拓扑的结果说明所有这样的邻域构成 X^* 原点的邻域系, 且该邻域系及其平移唯一确定 X^* 的弱*拓扑, 另外 X^* 依该弱*拓扑构成拓扑线性空间. 💧

证明 记满足要求的零泛函邻域构成的集族为 $\mathcal{U}_{0_{X^*}}$, 即:

$$\mathcal{U}_{0_{X^*}} = \{U \subset X : \exists V = V(\varepsilon, x_1, \dots, x_n)(V \subset U)\}.$$

依照平移进一步定义

$$\mathcal{U}_{\varphi_0} = \{U \subset X : \exists V = V(\varphi_0, \varepsilon, x_1, \dots, x_n) := \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\}(V \subset U)\}. \quad (8.24)$$

下面验证 $\{\mathcal{U}_{\varphi_0}\}_{\varphi_0 \in X^*}$ 满足集族诱导拓扑的四个条件:

(i) 任取 $\varphi_0 \in X^*$, 取 $V = \{\varphi_0\} \neq \emptyset$, 显见 V 满足(8.24), 进一步取 $U = V$ 即知 $U \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$, 故 $\mathcal{U}_{\varphi_0} \neq \emptyset$. 若 $U \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$, 由定义即知

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \exists N > 0 \exists \{x_1, \dots, x_N\} \subset X (V := \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon_0, 1 \leq i \leq N\} \subset U),$$

显见

$$|\langle \varphi_0 - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| = 0 < \varepsilon_0, \forall 1 \leq i \leq N,$$

故 $\varphi_0 \in V \subset U$.

(ii) 设 $U, V \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$, 则

$$\exists \varepsilon_1 > 0 \exists N_1 > 0 \exists \{x_1, \dots, x_{N_1}\} \subset X (\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon_1, 1 \leq i \leq N_1\} \subset U),$$

$$\exists \varepsilon_2 > 0 \exists N_2 > 0 \exists \{y_1, \dots, y_{N_2}\} \subset X (\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, y_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon_2, 1 \leq i \leq N_2\} \subset V).$$

于是

$$\begin{aligned} & V(\min(\varepsilon_1, \varepsilon_2), \varphi_0, x_1, \dots, x_{N_1}, y_1, \dots, y_{N_2}) \\ &= \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, z \rangle_{X^* \times X}| < \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2), z \in \{x_1, \dots, x_{N_1}, y_1, \dots, y_{N_2}\}\} \\ &\subset U \cap V, \end{aligned}$$

因此 $U \cap V \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$.

(iii) 设 $U \in \mathcal{U}_{\varphi_0}, U \subset V$, 则

$$\exists \varepsilon > 0 \exists N > 0 \exists \{x_1, \dots, x_N\} \subset X (\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq N\} \subset U \subset V),$$

因此根据 $\mathcal{U}_{\varphi_0}$ 的定义即知 $V \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$.

(iv) 设 $U \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$, 则

$$\exists \varepsilon > 0 \exists N > 0 \exists \{x_1, \dots, x_N\} \subset X (\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq N\} \subset U),$$

但本身有

$$V(\varepsilon, \varphi_0, x_1, \dots, x_N) := \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq N\} \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$$

故确实存在 $V = V(\varepsilon, \varphi_0, x_1, \dots, x_N) \in \mathcal{U}_{\varphi_0}$ 满足 $V \subset U$. 另任取 $\varphi_1 \in V$, 往证

$$\exists \varepsilon' > 0 \exists N' > 0 \exists \{x'_1, \dots, x'_{N'}\} \subset X (V' := \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_1, x'_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon', 1 \leq i \leq N'\} \subset V).$$

为此注意到既然 $\varphi_1 \in V$, 故 $\max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon$. 取

$$\varepsilon' = \varepsilon - \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}|, \quad x'_i = x_i, \quad N' = N,$$

知对任意 $\varphi \in V'$ 与任意 $1 \leq i \leq N$ 均有

$$\begin{aligned} |\langle \varphi - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| &\leq |\langle \varphi - \varphi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| + |\langle \varphi_1 - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| \\ &\leq \varepsilon' + \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 - \varphi_0, x_i \rangle_{X^* \times X}| = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此确有 $V' \subset V$.

至此集族 $\{\mathcal{U}_{\varphi_0}\}_{\varphi_0 \in X^*}$ 便诱导了 X^* 上的拓扑 τ_{X^*} , 使得对每个 $\varphi_0 \in X^*$ 而言 $\mathcal{U}_{\varphi_0}$ 均为 φ_0 在 τ_{X^*} 下的邻域系, 特别 $\mathcal{U}_{0_{X^*}}$ 成为 0_{X^*} 在 τ_{X^*} 下的邻域系. 接下来说明弱 * 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 在 τ_{X^*} 内, 为此回忆弱 * 拓扑是使得全体映射 $\langle \cdot, x \rangle_{X^* \times X} (x \in X)$ 均成为 X^* 上连续线性泛函的最弱拓扑. 现任取 $x \in X$, 往证映射 $\iota_x := \langle \cdot, x \rangle_{X^* \times X} : (X^*, \tau_{X^*}) \rightarrow (\mathbb{C}, |\cdot|)$ 连续, 为此只需说明复平面中的开球 $B(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$ 满足

$\iota_x^{-1}(B(z_0, r)) \in \tau_{X^*}$. 因为 τ_{X^*} 本身是由平移形成的邻域基诱导的拓扑, 故只需证明 $z_0 = 0$ 的情形即可. 知

$$\iota_x^{-1}(B(0, r)) = \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x \rangle_{X^* \times X}| < r\},$$

取

$$V = V(r, x) = \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x \rangle_{X^* \times X}| < r\},$$

显见 $\iota_x^{-1}(B(0, r)) = V$, 而 V 作为 τ_{X^*} 在 0_{X^*} 处邻域基中的元素自动在 τ_{X^*} 内, 因此 $\iota_x^{-1}(B(0, r)) \in \tau_{X^*}$, 由 x 的任意性与 $\sigma(X^*, X)$ 的极小性即得 $\sigma(X^*, X) \subset \tau_{X^*}$.

接下来说明 $\tau_{X^*} \subset \sigma(X^*, X)$, 为此只需说明 τ_{X^*} 在每点的邻域基中的每个元素都在 $\sigma(X^*, X)$ 内. 根据平移性进一步只需证明 0_{X^*} 在 τ_{X^*} 中的每个邻域基均在 $\sigma(X^*, X)$ 内即可, 此即往证

$$\forall \varepsilon > 0 \forall N > 0 \forall \{x_i\}_{i=1}^N \subset X \exists \{z_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{C} \exists r > 0 \left(\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq N\} = \bigcup_{i=1}^N \iota_{x_i}^{-1}(B(z_i, r)) \right).$$

知

$$\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq N\} = \bigcap_{i=1}^N \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon\},$$

而

$$\{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon\} = \iota_{x_i}^{-1}(B(0, \varepsilon)),$$

故

$$\bigcap_{i=1}^N \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon\} \subset \bigcup_{i=1}^N \iota_{x_i}^{-1}(B(0, \varepsilon)),$$

因此 $\tau_{X^*} \subset \sigma(X^*, X)$, 故 $\tau_{X^*} = \sigma(X^*, X)$. 既然 τ_{X^*} 是由集族 $\{\mathcal{U}_{\varphi_0}\}_{\varphi_0 \in X^*}$ 唯一确定的, 弱 * 拓扑自然也是集族 $\{\mathcal{U}_{\varphi_0}\}_{\varphi_0 \in X^*}$ 唯一确定的.

最后说明 X^* 依弱 * 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 构成拓扑线性空间, 为此只需说明 X^* 上的线性运算关于 $\sigma(X^*, X)$ 连续, 根据线性运算的线性性又只需说明线性运算在 0_{X^*} 处关于 $\sigma(X^*, X)$ 连续即可. 针对加法映射 $+: X \times X^* \rightarrow X^*, (x, \varphi) \mapsto x + \varphi$, 取 0_{X^*} 的邻域

$$V := \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, 1 \leq i \leq N\},$$

依乘积拓扑在 $X^* \times X^*$ 上赋拓扑 $\tau_{X^* \times X^*}$, 知 $\tau_{X^* \times X^*}$ 的拓扑基为 $\{\mathcal{U}_{\varphi_0} \times \mathcal{U}_{\varphi'_0}\}_{\varphi_0, \varphi'_0 \in X^*}$, 往证

$$+(V)^{-1} := \{(\varphi, \psi) \in X^* \times X^* : \varphi + \psi \in V\} \in \tau_{X^* \times X^*}.$$

为此只需证明对任意 $(\varphi_1, \psi_1) \in +(V)^{-1}$ 而言, 均存在 $A \in \mathcal{U}_{\varphi_1}, B \in \mathcal{U}_{\psi_1}$ 使得 $\varphi_1 \in A, \psi_1 \in B, A \times B \subset +(V)^{-1}$ 即可. 现由 $\varphi_1 + \psi_1 \in V$ 知

$$|\langle \varphi_1 + \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, \forall 1 \leq i \leq N.$$

取 $\varepsilon' > 0$ 待定, 取

$$A := \{\varphi' \in X^* : |\langle \varphi_1 - \varphi', x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon', 1 \leq i \leq N\},$$

$$B := \{\psi' \in X^* : |\langle \psi_1 - \psi', x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon', 1 \leq i \leq N\},$$

则显见 $\varphi_1 \in A, \psi_1 \in B$, 下面说明 $A \times B \subset +(V)^{-1}$. 任取 $(\varphi'', \psi'') \in A \times B$, 知:

$$\begin{aligned} |\langle \varphi'' + \psi'', x_i \rangle_{X^* \times X}| &\leq |\langle \varphi'' - \varphi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| + |\langle \psi'' - \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| + |\langle \varphi_1 + \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| \\ &< 2\varepsilon' + \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 + \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}|. \end{aligned}$$

因为 $\max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 + \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon$, 故 $\varepsilon - \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 + \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}| > 0$, 进而取

$$\varepsilon' = \frac{1}{2}(\varepsilon - \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \varphi_1 + \psi_1, x_i \rangle_{X^* \times X}|),$$

即得 $|\langle \varphi'' + \psi'', x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon$, 因此 $A \times B \subset +(V)^{-1}$, 从而 $+(V)^{-1} \in \tau_{X^* \times X^*}$, 故加法映射关于 $\sigma(X^*, X)$ 连续.

再说明数乘映射 $\cdot: \mathbb{K} \times X^* \rightarrow X^*, (\lambda, \varphi) \mapsto \lambda\varphi$ 在 0_{X^*} 处关于 $\sigma(X^*, X)$ 连续. 取 0_{X^*} 的邻域 V 与前文设置

相同, 依乘积拓扑在 $\mathbb{K} \times X^*$ 上赋拓扑 $\tau_{\mathbb{K} \times X^*}$, 设 $\mathbb{K}$ 的邻域基为 $\mathcal{U}$, 记

$$\cdot(V)^{-1} := \{(\lambda, \varphi) \in \mathbb{K} \times X^* : \lambda\varphi \in V\}.$$

往证对任意 $(a, \psi) \in \cdot(V)^{-1}$ 而言, 均存在 $A \in \mathcal{U}, B \in \mathcal{U}_\psi$ 使得 $A \times B \subset \cdot(V)^{-1}$. 现由 $a\psi \in V$ 知

$$|\langle a\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon, \forall 1 \leq i \leq N.$$

取 $\varepsilon' > 0$ 待定, 取

$$A := \{a' \in \mathbb{K} : |a - a'| < \varepsilon'\},$$

$$B := \{\psi' \in X^* : |\langle \psi' - \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon', 1 \leq i \leq N\},$$

则显见 $a \in A, \psi \in B$, 下面说明 $A \times B \subset \cdot(V)^{-1}$. 若 $a = 0$, 任取 $(b, \phi) \in A \times B$, 知

$$\begin{aligned} |\langle b\phi, x_i \rangle_{X^* \times X}| &\leq |\langle b(\phi - \psi), x_i \rangle_{X^* \times X}| + |\langle b\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| \\ &< (\varepsilon')^2 + \varepsilon' |\langle \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}|. \end{aligned}$$

因为 $\psi \in X^*$, 故 $\max_{1 \leq i \leq N} |\langle \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \infty$, 进而取

$$\varepsilon' = \frac{\min(\varepsilon, \sqrt{\varepsilon})}{\max(2 \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}|, 2)},$$

知

$$|\langle b\phi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \Rightarrow A \times B \subset \cdot(V)^{-1},$$

故 $\cdot(V)^{-1} \in \tau_{\mathbb{K} \times X^*}$.

若 $a \neq 0$, 任取 $(b, \phi) \in A \times B$, 知

$$\begin{aligned} |\langle b\phi, x_i \rangle_{X^* \times X}| &\leq |b| |\langle \phi - \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| + |\langle b\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| \\ &< (|a| + \varepsilon') \varepsilon' + |b - a| |\langle \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| + |\langle a\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| \\ &< (|a| + \varepsilon') \varepsilon' + \varepsilon' \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| + \max_{1 \leq i \leq N} |\langle a\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}|. \end{aligned}$$

知 $\varepsilon - \max_{1 \leq i \leq N} |\langle a\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}| > 0$, 故取

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon - \max_{1 \leq i \leq N} |\langle a\psi, x_i \rangle_{X^* \times X}|}{|a| + \max_{1 \leq i \leq N} |\langle \psi, x_i \rangle_{X^* \times X}|}$$

即知 $|\langle b\phi, x_i \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon$, 故 $A \times B \subset \cdot(V)^{-1}$, 从而 $\cdot(V)^{-1} \in \tau_{\mathbb{K} \times X^*}$, 因此数乘映射关于 $\sigma(X^*, X)$ 连续, 至此 $(X^*, \sigma(X^*, X))$ 成为拓扑线性空间. $\square$

练习 8.12

证明下述两命题等价:

- (i) 设 X 为 Banach 空间, 则对任意 $A \in L(X)$ 而言 A 谱集均非空.
- (ii) 设 $\mathcal{A}$ 为含么 Banach 代数, 则对任意 $a \in \mathcal{A}$ 而言 a 谱集均非空.



证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 任取 $a \in \mathcal{A}$, 考虑映射 $\varphi_a : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, x \mapsto ax$, 显见 $\varphi_a \in L(\mathcal{A})$, 于是 $\sigma(\varphi_a) \neq \emptyset$, 下证 $\sigma(\varphi_a) \subset \sigma(a)$, 为此只需证 $\rho(a) \subset \rho(\varphi_a)$.

任取 $\lambda \in \rho(a)$, 知 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 存在. 下面说明 $\lambda \text{Id} - \varphi_a$ 是双射. 针对单射, 设 $x_0 \in \mathcal{A}$ 满足 $(\lambda \text{Id} - \varphi_a)x_0 = 0_{\mathcal{A}}$, 则 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)x_0 = 0_{\mathcal{A}}$, 由 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 存在知 $x_0 = 0_{\mathcal{A}}$, 故 $\lambda \text{Id} - \varphi_a$ 确为单射. 针对满射, 任取 $b \in \mathcal{A}$, 知 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}b \in \mathcal{A}$, 于是

$$(\lambda \text{Id} - \varphi_a)((\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}b) = \lambda(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}b - a(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}b = b,$$

故 $b \in R(\lambda \text{Id} - \varphi_a)$, 因此 $\lambda \text{Id} - \varphi_a$ 是双射, 又显见 $\lambda \text{Id} - \varphi_a \in L(\mathcal{A})$, 故 $\lambda \in \rho(\varphi_a)$, 因此 $\rho(a) \subset \rho(\varphi_a)$, 至此即得 (i) $\Rightarrow$ (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (i): 令 $\mathcal{A} = L(X), a = A$ 即得结论. $\square$

练习 8.13

证明引理 8.5 证明中的 $\tilde{\varphi}$ 为 $\mathcal{A}/J \rightarrow \mathbb{C}$ 的到上等距同构.

证明 记 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为非零同态, $J = \ker \varphi$, 记

$$\tilde{\varphi}: \mathcal{A}/J \rightarrow \mathbb{C}, [a] \mapsto \varphi(a).$$

首先说明 $\tilde{\varphi}$ 是双射. 针对单射, 若 $\tilde{\varphi}([a]) = 0$, 则 $\varphi(a) = 0$, 这说明 $a \in \ker \varphi = J$, 于是 $[a] = [0_{\mathcal{A}}] = 0_{\mathcal{A}/J}$. 针对满射, 任取 $0 \neq z \in \mathbb{C}$. 因为 φ 是非零同态, 故必有 $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = 1$. 现考虑 $\tilde{\varphi}([ze_{\mathcal{A}}])$. 因为 $ze_{\mathcal{A}}$ 不可逆, 故 $[ze_{\mathcal{A}}] \neq [0_{\mathcal{A}}]$, 进而

$$\tilde{\varphi}([ze_{\mathcal{A}}]) = \varphi(ze_{\mathcal{A}}) = z\varphi(e_{\mathcal{A}}) = z,$$

因此 $z \in R(\tilde{\varphi})$, 故 $\tilde{\varphi}$ 是双射.

再说明 $\tilde{\varphi}$ 是同态. 任取 $a, b \in \mathcal{A}$, 知

$$\tilde{\varphi}([ab]) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \tilde{\varphi}([a])\tilde{\varphi}([b]).$$

最后说明 $\tilde{\varphi}$ 保范. 已知 $J = \ker \varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 于是 $\mathcal{A}/J \simeq \mathbb{C}$. 现任取 $[a] \in \mathcal{A}/J$, 知存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $[a] = z[e_{\mathcal{A}}]$, 且 $|z| = \|[a]\|_{\mathcal{A}/J}$. 现有

$$|\tilde{\varphi}([a])| = |\tilde{\varphi}(z[e_{\mathcal{A}}])| = |z||\tilde{\varphi}([e_{\mathcal{A}}])| = |z||\varphi(e_{\mathcal{A}})| = |z| = \|[a]\|_{\mathcal{A}/J},$$

故 $\tilde{\varphi}$ 保范, 至此结论得证. $\square$

练习 8.14

设 X 为赋范线性空间, 若 S 为 X^* 的弱*闭集且有界, 证明 S 弱*紧.

证明 任取 $a > 0$. 针对弱*闭球 $\overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)}$, 设 $\mathcal{U} := \bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} U_{\alpha}$ 为 $\overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)}$ 在弱*拓扑下的开覆盖, 由习题 8.11 的结论知不妨设

$$U_{\alpha} = \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_{\alpha}, x_{\alpha, i} \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon_{\alpha}, 1 \leq i \leq N_{\alpha}\}.$$

则

$$\begin{aligned} \frac{1}{a}U_{\alpha} &= \left\{ \frac{1}{a}\varphi \in X^* : |\langle \varphi - \varphi_{\alpha}, x_{\alpha, i} \rangle_{X^* \times X}| < \varepsilon_{\alpha}, 1 \leq i \leq N_{\alpha} \right\} \\ &= \{\varphi \in X^* : |\langle \varphi - a^{-1}\varphi_{\alpha}, x_{\alpha, i} \rangle_{X^* \times X}| < a^{-1}\varepsilon_{\alpha}, 1 \leq i \leq N_{\alpha}\}, \end{aligned}$$

这说明 $a^{-1}U_{\alpha}$ 同样是 $\sigma(X^*, X)$ 下的开集. 现若 $\varphi \in \overline{B(0_{X^*}, 1)}^{\sigma(X^*, X)}$, 由 $B(0_{X^*}, a) = aB(0_{X^*}, 1)$ 与 $\varphi_n \rightharpoonup^* \varphi(\sigma(X^*, X)) \Leftrightarrow a\varphi_n \rightharpoonup^* a\varphi(\sigma(X^*, X))$ 知 $a\varphi \in \overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)}$, 于是存在 $\alpha \in \mathcal{I}$ 使得 $a\varphi \in U_{\alpha}$, 此即

$$\forall 1 \leq i \leq N_{\alpha} (| \langle a\varphi - \varphi_{\alpha}, x_{\alpha, i} \rangle_{X^* \times X} | < \varepsilon_{\alpha}),$$

亦即

$$\forall 1 \leq i \leq N_{\alpha} (| \langle \varphi - a^{-1}\varphi_{\alpha}, x_{\alpha, i} \rangle_{X^* \times X} | < a^{-1}\varepsilon_{\alpha}),$$

故 $\varphi \in a^{-1}U_{\alpha}$. 这说明 $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{I}} a^{-1}U_{\alpha}$ 是 $\overline{B(0_{X^*}, 1)}^{\sigma(X^*, X)}$ 的开覆盖. Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理已经表明 $\overline{B(0_{X^*}, 1)}^{\sigma(X^*, X)}$ 是弱*紧集, 故存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{I}$ 使得

$$\overline{B(0_{X^*}, 1)}^{\sigma(X^*, X)} \subset \bigcup_{i=1}^n a^{-1}U_{\alpha_n}.$$

现任取 $\varphi \in \overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)}$, 知 $a^{-1}\varphi \in \overline{B(0_{X^*}, 1)}^{\sigma(X^*, X)}$, 于是存在 n_0 使得 $a^{-1}\varphi \in a^{-1}U_{\alpha_n}$, 此即 $\varphi \in U_{\alpha_n}$, 故

$$\overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)} \subset \bigcup_{i=1}^n U_{\alpha_n}.$$

至此 $\{U_{\alpha_n}\}$ 即为 $\overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)}$ 的有限子覆盖, 故 $\overline{B(0_{X^*}, a)}^{\sigma(X^*, X)}$ 是弱*紧集.

针对一般情形, 由 S 有界知存在 $r > 0$ 使得

$$S \subset B(0_{X^*}, r) \subset \overline{B(0_{X^*}, r)}^{\sigma(X^*, X)}.$$

因为 $\overline{B(0_{X^*}, r)}^{\sigma(X^*, X)}$ 是弱*紧集, S 是弱*闭集, 且 $\sigma(X^*, X)$ 是 Hausdorff 拓扑, 故 S 弱*紧. $\square$

练习 8.15

设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数, 证明对任意 $x \in \mathcal{A}$ 而言 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$ 均存在, 且该极限等于 $\inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$.

证明 显见 $\inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} < \infty$, 且

$$\inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}.$$

另一方面由下确界的定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \left(\inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|x^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n_0}} \leq \inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} + \varepsilon \right).$$

显见对任意 $n \geq n_0$ 总存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $n = kn_0 + s, 0 \leq s < n_0$, 故

$$\|x^n\|_{\mathcal{A}} = \|x^{kn_0+s}\|_{\mathcal{A}} \leq \|x^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^k \|x\|_{\mathcal{A}}^s.$$

故

$$\|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \|x^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{k}{kn_0+s}} \|x\|_{\mathcal{A}}^{\frac{s}{n}}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 此时 $k \rightarrow \infty$, 于是

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|x^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{k}{kn_0+s}} \|x\|_{\mathcal{A}}^{\frac{s}{n}} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{k}{kn_0+s}} \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\|_{\mathcal{A}}^{\frac{s}{n}} \\ &= \|x^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n_0}} < \inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性即知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} \leq \inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}},$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$ 存在且等于 $\inf_{n \in \mathbb{N}^+} \|x^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$. $\square$

练习 8.16

设 $\mathcal{A}$ 是含么 $e_{\mathcal{A}}$ 的 Banach 代数, $x \in \mathcal{A}$, 且 Ω 作为 $\mathbb{C}$ 中的开集满足 $\sigma(x) \subset \Omega$, 证明存在 $\delta \in (0, \infty)$ 使得

$$\forall y \in \mathcal{A} (\|y\|_{\mathcal{A}} < \delta \Rightarrow \sigma(x+y) \subset \Omega).$$

证明 $\Omega = \mathbb{C}$ 时命题无所可证, 下设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$. 现待定 $\delta > 0$, 为证 $\sigma(x+y) \subset \Omega$, 只需证 $\Omega^c \subset \rho(x+y)$. 任取 $\lambda \in \Omega^c$, 因为 $\sigma(x) \subset \Omega \Rightarrow \Omega^c \subset \rho(x)$, 故 $\lambda \in \rho(x)$, 从而往证

$$\lambda e_{\mathcal{A}} - (x+y) = (\lambda e_{\mathcal{A}} - x)(e_{\mathcal{A}} - (\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}y) \in G(\mathcal{A}).$$

由 von Neumann 引理知只需证 $\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}y\|_{\mathcal{A}} < 1$, 进一步只需证 $\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \|y\|_{\mathcal{A}} < 1$, 为此考虑说明 $\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}}$ 有关于 λ 一致的上界. 下面首先说明 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}$ 关于 $\lambda \in \Omega^c$ 连续. 因为 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1} \in G(\mathcal{A})$, 故要证 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}$ 关于 λ 连续, 只需说明 $\lambda e_{\mathcal{A}} - x$ 关于 λ 连续. 为此知

$$\forall \lambda \in \Omega^c \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{1}{2}\varepsilon \forall \lambda' \in \Omega^c (|\lambda - \lambda'| < \delta \Rightarrow \|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x) - (\lambda' e_{\mathcal{A}} - x)\|_{\mathcal{A}} = |\lambda - \lambda'| < \varepsilon).$$

因此 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}$ 关于 $\lambda \in \Omega^c$ 连续, 进而 $\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}}$ 关于 $\lambda \in \Omega^c$ 连续. 现若存在足够大的 $M > 0$ 使得 $|\lambda| > M > 2\|x\|_{\mathcal{A}} + 1$, 则 $\|\lambda^{-1}x\|_{\mathcal{A}} < 1$, 进而

$$(e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda^{-1}x)^n,$$

于是

$$\|(e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}x)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|\lambda^{-1}x\|_{\mathcal{A}}^n \leq \frac{1}{1 - \|\lambda^{-1}x\|_{\mathcal{A}}}$$

进而

$$\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \frac{1}{|\lambda| - \|x\|_{\mathcal{A}}} < \frac{1}{\|x\|_{\mathcal{A}} + 1}.$$

另若 $\lambda \in \overline{B(0, M)} \cap \Omega^c$, 由 Ω 开知 Ω^c 闭, 进而 $\overline{B(0, M)} \cap \Omega^c$ 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, 从而 $\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}}$ 作为紧集上的连续函数能达到最大值 M' , 因此

$$\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \max\{(\|x\|_{\mathcal{A}} + 1)^{-1}, M'\} =: A, \forall \lambda \in \Omega^c.$$

现取 $\delta = (2A)^{-1}$, 则

$$\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \|y\|_{\mathcal{A}} \leq \frac{1}{2} < 1,$$

于是只要 $\|y\|_{\mathcal{A}} < \delta$, 在 $\lambda \in \Omega^c$ 时就有 $\lambda e_{\mathcal{A}} - (x + y) \in G(\mathcal{A})$, 进而 $\Omega^c \subset \rho(x + y) \Rightarrow \sigma(x + y) \subset \Omega$, 至此结论即证. $\square$

练习 8.17

设 $\mathcal{A}$ 是含幺 $e_{\mathcal{A}}$ 的交换 Banach 代数, 且 f 作为 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函满足对 $\mathcal{A}$ 中的任意可逆元 a 均有 $f(a) \neq 0$. 令

$$N(f) := \{a \in \mathcal{A} : f(a) = 0\},$$

证明:

(i) f 有界,

(ii) 若 f 满足 $f(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 且 $\forall a \in N(f)(f(a^2) = 0)$, 则 $N(f)$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想.

证明 (i) 既然 f 线性, 故 f 有界当且仅当 f 在原点处连续. 现设 f 在原点处不连续, 即

$$\exists \{a_n\} \subset \mathcal{A} (\|a_n\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0 \wedge \exists \varepsilon_0 > 0 \forall n > 0 \exists n_0 > n (|f(a_{n_0})| > \varepsilon_0)).$$

不妨设 $0_{\mathcal{A}} \notin \{a_n\}$, 记 $b_n = a_n \|a_n\|_{\mathcal{A}}^{-\frac{1}{2}}$, 则 $\|b_n\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0$, 且 $|f(b_n)| = |f(a_n)| \|a_n\|_{\mathcal{A}}^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \infty$. 不妨设 $n > N \Rightarrow |f(b_n)| > \max\{1, 2|f(e_{\mathcal{A}})|\|b_n\|_{\mathcal{A}}\}$, 记 $x = b_n f(e_{\mathcal{A}})(f(b_n))^{-1}$, 则 $\|x\|_{\mathcal{A}} < 1/2$, 于是 von Neumann 引理表明 $e_{\mathcal{A}} - x \in G(\mathcal{A})$, 进而

$$f(e_{\mathcal{A}} - x_n) \neq 0.$$

但另一方面知

$$f(e_{\mathcal{A}} - x_n) = f(e_{\mathcal{A}}) - f(e_{\mathcal{A}}) = 0,$$

矛盾! 故 f 在原点处连续, 进而 f 有界.

(ii) 由 $f(e_{\mathcal{A}}) = 1$ 知只需证明 f 是同态即可, 为此进一步只需证 f 保持乘法. 任取 $a \in \mathcal{A}$, 设 $x = a - f(a)e_{\mathcal{A}}$, 知

$$f(x) = f(a) - f(a) = 0 \Rightarrow x \in N(f),$$

于是

$$f(x^2) = f(a^2 - 2af(a) + (f(a))^2 e_{\mathcal{A}}) = f(a^2) - 2(f(a))^2 + (f(a))^2 = 0 \Rightarrow f(a^2) = (f(a))^2.$$

现对任意 $a, b \in \mathcal{A}$, 由 $\mathcal{A}$ 交换知

$$ab = \frac{1}{2}((a+b)^2 - a^2 - b^2),$$

于是

$$f(ab) = \frac{1}{2}(f((a+b)^2) - f(a^2) - f(b^2)) = \frac{1}{2}((f(a) + f(b))^2 - (f(a))^2 - (f(b))^2) = f(a)f(b),$$

因此 f 确为同态, 从而 $N(f) = \ker f$ 成为 $\mathcal{A}$ 的极大理想. $\square$

注 8.23 (i) 也可以顺证. 任取 $a \in \mathcal{A}$ 满足 $f(a) \neq 0$, 记 $b := e_{\mathcal{A}} - \frac{f(e_{\mathcal{A}})}{f(a)}a$, 由 f 线性知 $f(b) = 0$, 于是条件表明 b 不可逆. 由 $b = e_{\mathcal{A}} - (e_{\mathcal{A}} - b)$ 与 von Neumann 引理知必有

$$\|e_{\mathcal{A}} - b\|_{\mathcal{A}} = \left\| \frac{f(e_{\mathcal{A}})}{f(b)}a \right\|_{\mathcal{A}} \geq 1 \Rightarrow |f(a)| \leq |f(e_{\mathcal{A}})|\|a\|_{\mathcal{A}},$$

因此 f 有界 (注意 $f(a) = 0$ 处自动有界).

8.3 例子与应用

本节我们研究一些具体的 Banach 代数及其极大理想空间 $\mathfrak{M}$ 的结构, 并利用例 8.4 中 Banach 代数的极大理想空间结构导出调和分析中的 Wiener 定理.

在正式讨论之前我们先预备一个拓扑中的引理:

引理 8.8 (拓扑等价定理)

设 τ_1, τ_2 是集合 Y 上的拓扑. 若 (Y, τ_1) 是 Hausdorff 空间, (Y, τ_2) 是紧空间, 且 $\tau_1 \subset \tau_2$, 则 τ_1 与 τ_2 等价. 

证明 由 $\tau_1 \subset \tau_2$ 知 τ_1 中的开集必定是 τ_2 中的开集, 因此 (Y, τ_1) 是 Hausdorff 空间表明 (Y, τ_2) 也是 Hausdorff 空间. 为说明 $\tau_2 \subset \tau_1$, 只需说明 τ_2 对应的闭集均为 τ_1 对应的闭集即可. 现设 $C \subset Y$ 是 τ_2 对应的闭集, 由 (Y, τ_2) 的紧 Hausdorff 性知 C 是 (Y, τ_2) 中的紧集. 因为 $\tau_1 \subset \tau_2$, 故 C 在 τ_1 下的开覆盖必为 C 在 τ_2 下的开覆盖, 而 C 作为 τ_2 下的紧集具有有限子覆盖, 因此 C 的每个在 τ_1 下的开覆盖也有有限子覆盖, 从而 C 是 (Y, τ_1) 中的紧集. 因为 (Y, τ_1) 是 Hausdorff 空间, 故对 $\forall x \in C, \forall y \in C^c$ 均存在 τ_1 中的开邻域 $U_x \ni x, U_y \ni y$ 满足

$$U_x \cap U_y = \emptyset. \quad (8.25)$$

下面说明对 C^c 中的每个 y 均存在 τ_1 中的开邻域 $\tilde{U}_y$ 满足 $\tilde{U}_y \subset C^c$. 取定 $y \in C^c$, 显见 $\bigcup_{x \in C} U_x$ 是 C 在 τ_1 下的开覆盖, 由 C 在 (Y, τ_1) 中的紧性知可取 $\{U_{x_i}\}_{i=1}^n \subset \{U_x : x \in C\}$ 使得 $C \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$. 根据 (8.25), 每个 U_{x_i} 在 τ_1 中关于 $y \in C^c$ 都能对应开邻域 U_{y_i} , 进一步知 $\tilde{U}_y := \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$ 依旧是 y 在 τ_1 中的开邻域, 且 $\tilde{U}_y \cap (\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}) = \emptyset$. 因此

$$\tilde{U}_y \cap C = \emptyset.$$

这说明 $\tilde{U}_y \subset C^c$, 因此 C^c 是 τ_1 中的开集, 从而 C 是 τ_1 对应的闭集, 因此 $\tau_2 \subset \tau_1$. $\square$

下面我们研究紧 Hausdorff 空间上连续函数代数的极大理想全体的结构. 回忆若 M 是紧 Hausdorff 空间, 则 $\mathcal{A} := C(M)$ 依照函数加法, 函数数乘与函数的点态乘法构成含么交换 Banach 代数, 其中范数为

$$\|f\|_{\mathcal{A}} := \max_{x \in M} |f(x)|.$$

定理 8.11 ($C(M)$ 极大理想全体的结构)

设 $\mathfrak{M}$ 是 $C(M)$ 的极大理想全体, 则 $\mathfrak{M}$ 与 M 同胚. 

证明 第一步: 建立 $\mathfrak{M}$ 与 M 的一一对应. 任取 $x_0 \in M$, 令

$$J_{x_0} := \{f \in C(M) : f(x_0) = 0\}.$$

下面说明 J_{x_0} 是 $C(M)$ 的一个极大理想. 显见 $J_{x_0} \subsetneq C(M)$, 定义映射

$$\tilde{\varphi}_{x_0} : C(M) \rightarrow \mathbb{C}, f \mapsto f(x_0),$$

则

$$\ker \tilde{\varphi}_{x_0} = J_{x_0}. \quad (8.26)$$

下证 $\tilde{\varphi}_{x_0}$ 是 $C(M)$ 上的一个非零连续复同态. 事实上, 对 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \forall f, g \in C(M)$ 显见

$$\tilde{\varphi}_{x_0}(\alpha f + \beta g) = \alpha \tilde{\varphi}_{x_0}(f) + \beta \tilde{\varphi}_{x_0}(g),$$

$$\tilde{\varphi}_{x_0}(fg) = \tilde{\varphi}_{x_0}(f)\tilde{\varphi}_{x_0}(g),$$

$$|\tilde{\varphi}_{x_0}(f)| = |f(x_0)| \leq \|f\|_{\mathcal{A}},$$

且 $\tilde{\varphi}_{x_0}(\mathbf{1}_M) = 1$ (进而 $\tilde{\varphi}_{x_0}$ 保么), 因此 $\tilde{\varphi}_{x_0}$ 确为 $C(M)$ 上的非零连续复同态, 由同态核的极大性 8.5 即知 $J_{x_0} = \ker \tilde{\varphi}_{x_0} \in \mathfrak{M}$. 现在定义映射

$$j: M \rightarrow \mathfrak{M}, x_0 \mapsto J_{x_0}.$$

下面说明 j 是双射. 对于单射性, 任取 $x_1, x_2 \in M$ 满足 $x_1 \neq x_2$, 由 M 是 Hausdorff 空间知 $\{x_1\}^c, \{x_2\}^c$ 是开集, 因此 $\{x_1\}, \{x_2\}$ 是 M 中的闭集. 再由 M 的紧性与 Urysohn 引理 1.18 知存在 $f \in C(M)$ 使得 $f(x_1) = 1, f(x_2) = 0$. 此时 $f \in J_{x_1}, f \notin J_{x_2}$, 故 $J_{x_1} \neq J_{x_2}$, 即 j 是单射.

对于满射性, 往证对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 均存在 $x_0 \in M$ 使得⁸

$$J = J_{x_0}.$$

用反证法, 设 $\exists J \in \mathfrak{M} \forall x \in M (J \neq J_x)$, 下面首先从反设条件推导断言: $\forall x \in M \exists f_x \in J (f_x \notin J_x)$. 这是因为如果 $\exists x_0 \in M \forall f_{x_0} \in J (f_{x_0} \in J_{x_0})$, 则由 $J \neq J_{x_0}$ 知 $J \subsetneq J_{x_0}$, 这与 J 的极大性矛盾! 因此 $\forall x \in M \exists f_x \in J (f_x \notin J_x)$. 根据 f_x 的连续性知存在 x 的邻域 U_x 使得对 $\forall y \in U_x$ 均有 $f_x(y) \neq 0$ 成立. 令 x 遍历 M , 知经前述过程产生的邻域族 $\{U_x : x \in M\}$ 覆盖 M , 由 M 的紧性知存在有限族集 $\{U_{x_i}\}_{i=1}^n$ 覆盖 M , 即 $M = \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$. 现对 $\forall x \in M$ 令

$$f(x) := \sum_{i=1}^n \overline{f_{x_i}(x)} f_{x_i}(x),$$

则 $f \in J$ 满足 $f(x) \neq 0 (\forall x \in M)$, 故 $g := f^{-1} \in C(M)$ 是 f 的逆, 但理想的不可除性 8.4 表明 J 不应含有逆元, 矛盾! 故 j 是满射, 因此 j 是双射.

第二步: 说明 $\mathfrak{M}$ 与 M 同胚. 记 M 的拓扑为 τ_M , 下面说明 $j: (M, \tau_M) \rightarrow (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 是同胚. 注意到如果在 $\mathfrak{M}$ 上赋 $j: M \rightarrow \mathfrak{M}$ 诱导的商拓扑 $j\tau_M$, 则显见 $j: (M, \tau_M) \rightarrow (\mathfrak{M}, j\tau_M)$ 是同胚, 因此只需说明 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 和 $j\tau_M$ 是 $\mathfrak{M}$ 上的等价拓扑即可. 我们考虑使用拓扑等价定理 8.8, 首先说明 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset j\tau_M$. 因为 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是使得映射族 $\{\hat{f}(\cdot)\}_{f \in C(M)}$ 成为 $\mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射族的最弱拓扑, 故只需说明 $j\tau_M$ 也能让映射族 $\{\hat{f}(\cdot)\}_{f \in C(M)}$ 成为 $(\mathfrak{M}, j\tau_M) \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续映射族. 如果能说明⁹

$$\hat{f}(J) = (f \circ j^{-1})(J), \quad \forall J \in \mathfrak{M}, \quad (8.27)$$

待证结果就等价于证明 $\{f \circ j^{-1}\}_{f \in C(M)}$ 是 $(\mathfrak{M}, j\tau_M) \rightarrow \mathbb{C}$ 的连续函数族, 而后者由 $j^{-1}: (\mathfrak{M}, j\tau_M) \rightarrow (M, \tau_M)$ 连续与 $f \in C(M)$ 立得, 因此这里的关键就是证明 (8.27).




图 8.2: 提出 (8.27) 的思路, 整个故事无非是说明这个图交换.

因为 $j: M \rightarrow \mathfrak{M}, x_0 \mapsto J_{x_0}$ 是双射, 故任取 $J \in \mathfrak{M}$, 总存在 $x_0 \in M$ 使得 $J = J_{x_0}$. 又因为极大理想本身有核

⁸反证法从直觉上也是说得通的: 如果某个极大理想 J 中总能取出在 $x \in M$ 处非零的元素 f , 因为 M 紧, 利用连续性诱导的邻域选出代表点 $x_1, \dots, x_n$, 记 $f_1, \dots, f_n$ 为分别在这些点处非零的元素, 取这些函数的欧氏模得到 f . 一方面 J 作为理想对加法封闭, 于是 $f \in J$, 另一方面 f 在每个点处的取值都能靠近 $|f_i|^2 > 0$, 这说明 f 定号, 而定号函数 f 在 $C(M)$ 中显然有可逆元 $1/f$. 后面的过程无非是把这个思路严格说了一遍.

⁹这个式子其实很自然, 参看图 8.2.

刻画8.4, 故

$$J = J_{x_0} = \ker \varphi_{J_{x_0}},$$

其中

$$\varphi_J : \mathcal{A} = C(M) \rightarrow \mathcal{A}/J \rightarrow \mathbb{C}, f \mapsto [f] = z_f[e_{\mathcal{A}}] \mapsto z_f.$$

另一方面由(8.26)知

$$J_{x_0} = \ker \tilde{\varphi}_{x_0},$$

这说明 $\ker \tilde{\varphi}_{x_0} = \ker \varphi_{J_{x_0}}$. 由习题8.7, $\tilde{\varphi}_{x_0}, \varphi_{J_{x_0}}$ 非零与 $\tilde{\varphi}_{x_0}, \varphi_{J_{x_0}}$ 均保么知只能有 $\tilde{\varphi}_{x_0} = \varphi_{J_{x_0}}$. 因此对任意 $J \in \mathfrak{M}$ 均有

$$\hat{f}(J) = \hat{f}(J_{x_0}) = \varphi_{J_{x_0}}(f) = \tilde{\varphi}_{x_0}(f) = f(x_0) = (f \circ j^{-1})(J_{x_0}) = (f \circ j^{-1})(J).$$

因为 $j^{-1} : (\mathfrak{M}, j\tau_M) \rightarrow (M, \tau_M)$ 是商拓扑对应的商映射, 故 j^{-1} 连续, 因此 $f \circ j^{-1} = \hat{f} : (\mathfrak{M}, j\tau_M) \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 故 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset j\tau_M$.

现在 $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 是 Hausdorff 空间, 而 (M, τ_M) 的紧性与商拓扑对紧性的保持知 $(\mathfrak{M}, j\tau_M)$ 紧, 因此拓扑等价定理8.8表明 $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 与 $(\mathfrak{M}, j\tau_M)$ 同胚, 而后者与 (M, τ_M) 同胚, 定理至此即证. $\square$

注 8.24 定理8.11的结论完全可以再往前走一步. 我们首先用图8.3梳理一下目前针对 $C(M)$ 干的所有事情:




图 8.3: 紧 Hausdorff 空间 M 的拓扑关系.

上图右半边是通用的 Gelfand 表示体系, 其中 (Δ, τ_Δ) 是 $\mathcal{A} = C(M)$ 上的非零复同态构成的集合, 其上拓扑为 $\sigma(\mathcal{A}^*, \mathcal{A})$ 的子空间拓扑. Gelfand 拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是商映射 $i^{-1} : \varphi \mapsto J = \ker \varphi$ 诱导的拓扑. 上图左半边与箭头 $(\mathfrak{M}, j\tau_M) \leftrightarrow (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 是定理8.11的贡献, 它给出了背景空间 (M, τ_M) 到极大理想空间的商映射 $j : x_0 \mapsto J_{x_0}$, 并证明了 $j\tau_M = \tau_{\mathfrak{M}}$. 因为到商拓扑空间的商映射自动成为同胚, 故上图中 $(M, \tau_M) \leftrightarrow (\mathfrak{M}, j\tau_M), (\Delta, \tau_\Delta) \leftrightarrow (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}}), (\mathfrak{M}, j\tau_M) \leftrightarrow (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 全都是同胚, 进一步我们自然会问上图中间矩形上端最后的箭头 $(M, \tau_M) \leftrightarrow (\Delta, \tau_\Delta)$ 会表示什么关系. 既然同胚可传递, 通过复合就能得到

$$(M, \tau_M) \rightarrow (\mathfrak{M}, j\tau_M) \rightarrow (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}}) \rightarrow (\Delta, \tau_\Delta)$$

是同胚. 因此从定理8.11出发可以自动得到下述推论¹⁰:

推论 8.3

任意紧 Hausdorff 空间 (M, τ_M) 均与其上连续函数空间对应的非零复同态空间 $(\Delta(C(M)), \tau_{\Delta(C(M))})$ 同胚. $\heartsuit$

¹⁰虽说我们的课程没有讲接下来的两个结果, 但个人觉得推论8.3点明的是点态值函数构成空间的特殊性质: 每个取定的背景空间点能成为作用在函数上的泛函. 这件事和赋范线性空间升级成双重对偶空间的过程很像, 彼时线性空间中的点与线性空间上的有界线性泛函攻守易形, 只是此时攻守易形的对象从线性泛函升级成了更一般的连续 (未必线性) 函数. 在写这部分内容时我一开始以为 $x_0 \in M$ 诱导 $(C(M))^*$ 中元素这件事可能相对更简单一点 (毕竟 $f \mapsto f(x_0)$ 作为泛函很好理解), 但经过答疑才明白其实这件事要更难说, 反而是把所有人拉到极大理想的框架下才会更好说. 另外还需要注意 Δ 本身并不是线性空间, 所以这套过程并没有包含任何线性结构的信息, 这也是它能针对一般连续函数 (而非仅仅是线性连续泛函) 的原因.

接下来我们研究例8.4提过的下述函数代数:

$$\mathcal{A} := \left\{ f \in C(\mathbb{S}^1) : f(e^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n| < \infty \right\},$$

其中 $\mathbb{S}^1$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的单位圆周, $\mathcal{A}$ 按范数 $\|f\| := \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|$ 构成含么交换 Banach 代数. 显见 $\mathcal{A}$ 表示的是具有绝对收敛 Fourier 级数的连续周期函数全体.

定理 8.12 ($\mathcal{A}$ 极大理想全体的结构)

$\mathcal{A}$ 的极大理想全体与 $\mathbb{S}^1$ 同胚.



证明 设 $\mathcal{A}$ 的极大理想全体为 $\mathfrak{M}$. 任取 $e^{i\theta_0} \in \mathbb{S}^1$, 令

$$\tilde{\varphi}_{\theta_0} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(e^{i\theta_0}) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta_0}.$$

显见 $\tilde{\varphi}_{\theta_0}$ 是线性的. 另任取 $f, g \in \mathcal{A}$, 记

$$f(e^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}, \quad g(e^{i\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n e^{in\theta},$$

则

$$\tilde{\varphi}_{\theta_0}(fg) = (fg)(e^{i\theta_0}) = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta_0} \right) \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n e^{in\theta_0} \right) = \tilde{\varphi}_{\theta_0}(f) \tilde{\varphi}_{\theta_0}(g),$$

且

$$|\tilde{\varphi}_{\theta_0}(f) - \tilde{\varphi}_{\theta_0}(g)| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n - d_n| = \|f - g\|,$$

因此 $\tilde{\varphi}_{\theta_0}$ 是 $\mathcal{A}$ 上的非零连续线性同态, 且 $\tilde{\varphi}_{\theta_0}(\mathbf{1}_{\mathbb{S}^1}) = 1$. 由同态核的极大性8.5可知

$$J_{\theta_0} := \ker \tilde{\varphi}_{\theta_0} \in \mathfrak{M}.$$

现在定义

$$j : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathfrak{M}, \quad e^{i\theta} \mapsto J_{\theta}.$$

下证 j 是单射. 取 $e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2} \in \mathbb{S}^1$ 满足 $e^{i\theta_1} \neq e^{i\theta_2}$, 设 $f(e^{i\theta}) := c_0 + c_1 e^{i\theta}$, 令

$$\begin{cases} c_0 + c_1 e^{i\theta_1} = 0, \\ c_0 + c_1 e^{i\theta_2} = 1, \end{cases}$$

显见上述方程组存在唯一解 (c_0, c_1) , 因此总存在 $f \in J_{\theta_1} \setminus J_{\theta_2}$, 故 $J_{\theta_1} \neq J_{\theta_2}$, 即 j 为单射.

再说明 j 是满射, 为此考虑说明对 $\forall J \in \mathfrak{M}$, 取 φ_J 为(8.9)式定义的连续复同态 $\mathcal{A} \ni f \mapsto [z_f][e_{\mathcal{A}}] \mapsto z_f \in \mathbb{C}$, 则必存在 $e^{i\theta_0} \in \mathbb{S}^1$ 使得 $\varphi_J = \tilde{\varphi}_{\theta_0}$. 此即证明对 $\forall f \in \mathcal{A}$ 有

$$\langle \varphi_J, f \rangle = \langle \tilde{\varphi}_{\theta_0}, f \rangle = f(e^{i\theta_0}).$$

事实上, 若令

$$\tau_0 : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{C}, \quad e^{i\theta} \mapsto e^{i\theta}$$

则 $\tau_0 \in \mathcal{A} \subset C(\mathbb{S}^1)$, $\tau_0(e^{i\theta}) = e^{i\theta}$, 因此 $\|\tau_0\| = 1$. 记 $\tau_0^n : e^{i\theta} \mapsto (\tau_0(e^{i\theta}))^n = e^{in\theta} \in \mathbb{C}$, 则由 φ_J 是同态知对 $\forall n \in \mathbb{Z}$ 有

$$\langle \varphi_J, \tau_0^n \rangle = (\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle)^n.$$

若

$$|\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle| \neq 1,$$

不妨设 $|\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle| > 1$, 则必有

$$|\langle \varphi_J, \tau_0^n \rangle| = |\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle|^n \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow +\infty.$$

($|\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle| < 1$ 时取 $n \rightarrow -\infty$.) 但另一方面非零同态的连续性 8.9 表明

$$|\langle \varphi_J, \tau_0^n \rangle| \leq \|\tau_0^n\| \leq 1,$$

矛盾! 故只能有

$$|\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle| = 1,$$

故必存在 $e^{i\theta_0} \in \mathbb{S}^1$ 使得 $\varphi_J(\tau_0) = e^{i\theta_0}$. 现对 $\forall f \in \mathcal{A}$ 有

$$f(e^{i\theta}) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \tau_0^n(e^{i\theta}),$$

由 φ_J 在 $\mathcal{A}$ 上的连续性知

$$\begin{aligned} \langle \varphi_J, f \rangle &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \langle \varphi_J, \tau_0^n \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle)^n \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta_0} = f(e^{i\theta_0}) = \langle \tilde{\varphi}_{\theta_0}, f \rangle. \end{aligned}$$

因此 $\varphi_J = \tilde{\varphi}_{\theta_0}$, 从而 j 是满射.

下面说明 $j: (\mathbb{S}^1, \tau_{\mathbb{S}^1}) \rightarrow (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 是同胚, 其中 $\tau_{\mathbb{S}^1}$ 是 $\mathbb{S}^1$ 作为 $\mathbb{R}^2$ 子空间的子空间拓扑. 注意到 $j: (\mathbb{S}^1, \tau_{\mathbb{S}^1}) \rightarrow (\mathfrak{M}, j\tau_{\mathbb{S}^1})$ 显然是同胚, 其中 $j\tau_{\mathbb{S}^1}$ 是 $\mathfrak{M}$ 上以 j 为商映射诱导的商拓扑. 因此只需说明 $j\tau_{\mathbb{S}^1} = \tau_{\mathfrak{M}}$. 类似于 $C(M)$ 极大理想全体结构 8.11 的证明, 对 $\forall f \in \mathcal{A}$ 而言可以说明 $\hat{f} = f \circ j^{-1}$, 其中 $\hat{f}$ 为 f 的 Gelfand 表示. 现在 $j^{-1}: (\mathfrak{M}, j\tau_{\mathbb{S}^1}) \rightarrow (\mathbb{S}^1, \tau_{\mathbb{S}^1})$ 与 $f: (\mathbb{S}^1, \tau_{\mathbb{S}^1}) \rightarrow \mathbb{C}$ 均连续, 故 $\hat{f}: (\mathfrak{M}, j\tau_{\mathbb{S}^1}) \rightarrow \mathbb{C}$ 连续. 但 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是使得 $\hat{f}$ 连续的最弱拓扑, 故

$$\tau_{\mathfrak{M}} \subset j\tau_{\mathbb{S}^1}.$$

又因为 $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 是 Hausdorff 空间, 而 $(\mathbb{S}^1, \tau_{\mathbb{S}^1})$ 的紧性与 j 是商映射表明 $(\mathfrak{M}, j\tau_{\mathbb{S}^1})$ 是紧空间, 故拓扑等价定理 8.8 表明 $j\tau_{\mathbb{S}^1} = \tau_{\mathfrak{M}}$, 因此 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathbb{S}^1$ 同胚. $\square$

利用 $\mathcal{A}$ 极大理想全体的结构 8.12 可以证明下述结果:

定理 8.13 (Wiener)

设 $f \in \mathcal{A}$ 满足对 $\forall e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1$ 均有 $f(e^{i\theta}) \neq 0$, 则 $1/f \in \mathcal{A}$, 亦即 $1/f$ 的 Fourier 级数绝对收敛.

证明 因为 $f(e^{i\theta}) \neq 0 (\forall e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1)$, 故对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 而言均有 $f \notin J$. 这是因为如果存在 $J \in \mathfrak{M}$ 使得 $f \in J$, 根据定理 8.12 的证明知存在 $e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1$ 使得 $J = \ker \tilde{\varphi}_{\theta}$, 于是

$$f(e^{i\theta}) = \langle \tilde{\varphi}_{\theta}, f \rangle = 0,$$

这与 $f(e^{i\theta}) \neq 0$ 矛盾! 于是定理 8.1 表明 f 不会出现在 $\mathcal{A}$ 的任何理想中, 再由定理 8.2(i) 知 f 在 $\mathcal{A}$ 中可逆, 亦即存在 $g \in \mathcal{A}$ 使得 $fg = 1$, 此即 $1/f = g \in \mathcal{A}$. $\square$

接下来我们研究例 8.5 给出的解析函数代数的极大理想全体结构. 回忆

$$A_0(\mathbb{D}) := \{f: f \text{ 是 } \mathbb{D} \text{ 上的复函数, 在 } \mathbb{D} \text{ 内解析, 在 } \overline{\mathbb{D}} \text{ 上连续}\},$$

其中 $\mathbb{D}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的单位开圆盘. 在 $A_0(\mathbb{D})$ 上定义

$$\|f\| := \max_{|z| \leq 1} |f(z)|,$$

则 $A_0(\mathbb{D})$ 成为含么交换 Banach 代数. 设 $A_0(\mathbb{D})$ 的极大理想全体为 $\mathfrak{M}$.

定理 8.14 ($A_0(\mathbb{D})$ 极大理想全体的结构)

$\mathfrak{M}$ 与 $\overline{\mathbb{D}}$ 同胚.

证明 首先建立 $\mathfrak{M} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ 的一一对应. 任取 $\omega_0 \in \overline{\mathbb{D}}$, 考察连续同态

$$\tilde{\varphi}_{\omega_0}: A_0(\mathbb{D}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(\omega_0)$$

及其对应的极大理想 $J_{\omega_0} := \ker \tilde{\varphi}_{\omega_0}$. 我们接下来说明 $\omega_0 \rightarrow J_{\omega_0}$ 是一一对应的. 定义

$$j: \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathfrak{M}, \quad re^{i\theta} \mapsto J_{re^{i\theta}},$$

首先说明 j 是单射. 任取 $re^{i\theta} \in \overline{\mathbb{D}}$, 定义 $f(re^{i\theta}) := c_0 + c_1 re^{i\theta}$, 显见 $f \in A_0(\mathbb{D})$. 现在对 $\forall r_1 e^{i\theta_1}, r_2 e^{i\theta_2} \in \overline{\mathbb{D}}$, 取 $r_1 e^{i\theta_1} \neq r_2 e^{i\theta_2}$, 考察

$$\begin{cases} c_0 + c_1 r_1 e^{i\theta_1} = 0, \\ c_0 + c_1 r_2 e^{i\theta_2} = 1, \end{cases}$$

显见上述方程存在唯一解 (c_0, c_1) , 因此存在 $f \in J_{r_1 e^{i\theta_1}} \setminus J_{r_2 e^{i\theta_2}}$, 这说明 $J_{r_1 e^{i\theta_1}} \neq J_{r_2 e^{i\theta_2}}$, 此即 j 为单射.

再说明 j 是满射. 取 φ_J 是(8.9)式定义的 $A_0(\mathbb{D})$ 上的连续同态, 往证对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 总存在 $r_0 e^{i\theta_0} \in \overline{\mathbb{D}}$ 使得 $\varphi_J = \tilde{\varphi}_{r_0 e^{i\theta_0}}$. 此即对 $\forall f \in A_0(\mathbb{D})$ 有

$$\langle \varphi_J, f \rangle = f(r_0 e^{i\theta_0}).$$

事实上, 令

$$\tau_0: \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C}, \quad re^{i\theta} \mapsto re^{i\theta}$$

则 $\tau_0 \in A_0(\mathbb{D})$, 且非零同态的连续性8.9表明 $|\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle| \leq \|\tau_0\| = 1$, 故必存在 $r_0 e^{i\theta_0} \in \overline{\mathbb{D}}$ 使得

$$\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle = r_0 e^{i\theta_0}. \quad (8.28)$$

现在我们需要承认一个定理:

引理 8.9 (Mergelyan 定理)

设 $K \subset \mathbb{C}$ 是紧集, $\mathbb{C} \setminus K$ 连通. 若 $f \in C(K)$ 在 K° 上解析, 则对 $\forall \varepsilon > 0$ 而言, 存在多项式 P 使得对 $\forall z \in K$ 总有 $|f(z) - P(z)| < \varepsilon$.

利用 Mergelyan 定理8.9, 知对 $\forall f \in A_0(\mathbb{D})$ 与 $\forall \varepsilon > 0$ 而言, 均存在复多项式

$$P_\varepsilon(re^{i\theta}) := \sum_{n=1}^{N_\varepsilon} a_n(\varepsilon)(re^{i\theta})^n, \quad \forall re^{i\theta} \in \overline{\mathbb{D}}$$

使得对 $\forall re^{i\theta} \in \overline{\mathbb{D}}$ 有

$$|P_\varepsilon(re^{i\theta}) - f(re^{i\theta})| < \varepsilon. \quad (8.29)$$

根据 P_ε 的构造, φ_J 的线性性与(8.29)式知

$$\begin{aligned} \langle \varphi_J, P_\varepsilon \rangle &= \sum_{n=1}^{N_\varepsilon} a_n(\varepsilon) \langle \varphi_J, \tau_0^n \rangle = \sum_{n=1}^{N_\varepsilon} a_n(\varepsilon) (\langle \varphi_J, \tau_0 \rangle)^n \\ &= \sum_{n=1}^{N_\varepsilon} a_n(\varepsilon) (r_0 e^{i\theta_0})^n = P_\varepsilon(r_0 e^{i\theta_0}). \end{aligned}$$

由上式, φ_J 的连续性与(8.29)式可知对 $\forall f \in A_0(\mathbb{D})$ 有

$$\langle \varphi_J, f \rangle = f(r_0 e^{i\theta_0}) = \langle \tilde{\varphi}_{r_0 e^{i\theta_0}}, f \rangle.$$

因此 j 是满射, 从而 j 是 $\overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathfrak{M}$ 的双射.

现在仿照 $C(M)$ 的情况(定理8.11)与 $\mathcal{A}$ 的情况(定理8.12), 可以说明 $\Gamma f = \hat{f} = f \circ j^{-1}$ 是 $(\mathfrak{M}, j\tau_{\overline{\mathbb{D}}}) \rightarrow (\overline{\mathbb{D}}, \tau_{\overline{\mathbb{D}}})$ 的连续映射, 其中 $j\tau_{\overline{\mathbb{D}}}$ 是 j 作为商映射在 $\mathfrak{M}$ 上诱导的商拓扑. 由 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 的最弱性可知 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset j\tau_{\overline{\mathbb{D}}}$, 进一步可见 $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 是 Hausdorff 空间, 由 j 是商映射与 $(\overline{\mathbb{D}}, \tau_{\overline{\mathbb{D}}})$ 的紧性可知 $(\mathfrak{M}, j\tau_{\overline{\mathbb{D}}})$ 是紧空间, 因此 $\tau_{\mathfrak{M}} = j\tau_{\overline{\mathbb{D}}}$, 至此定理即证. $\square$

定理8.14有下述应用:

定理 8.15

设 $\{f_1, \dots, f_n\} \subset A_0(\mathbb{D})$, 若 $f_1, \dots, f_n$ 无公共零点, 则必存在 $\{g_1, \dots, g_n\} \subset A_0(\mathbb{D})$ 使得

$$g_1 f_1 + \dots + g_n f_n \equiv 1.$$



证明 如果对 $\forall \{g_i\}_{i=1}^n \subset A_0(\mathbb{D})$ 而言, 函数 $\sum_{i=1}^n g_i f_i$ 均不可能恒为 1, 考虑由 $\{f_i\}_{i=1}^n$ 生成的集合

$$J := \{h_1 f_1 + \dots + h_n f_n : h_1, \dots, h_n \in A_0(\mathbb{D})\},$$

根据反设, $A_0(\mathbb{D})$ 的单位元 1 不在 J 中, 因此 J 是理想, 由定理 8.1 知 J 必在某极大理想 J_0 中, 再由 $A_0(\mathbb{D})$ 极大理想全体的结构 8.14 知存在 $\omega_0 \in \mathbb{D}$ 使得 $J_0 = \ker \tilde{\varphi}_{\omega_0}$, 其中 $\tilde{\varphi}_{\omega_0} : f \mapsto f(\omega_0)$. 因为 $\{f_i\}_{i=1}^n \subset J_0$, 故

$$f_i(\omega_0) = 0, \quad \forall 1 \leq i \leq n$$

故 ω_0 是 $f_1, \dots, f_n$ 的公共零点, 矛盾! □

[19]2.3 习题

练习 8.18

设

$$\mathcal{A} := \left\{ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C} \mid \|f\|_{\mathcal{A}} := \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| 2^{|n|} < \infty \right\},$$

依函数加法与数乘定义 $\mathcal{A}$ 上的线性运算, 并依下述方式定义乘法: 对 $\forall f, g \in \mathcal{A}$ 与 $\forall n \in \mathbb{Z}$ 令

$$f * g(n) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(n-k)g(k).$$

证明:

(i) $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数.

(ii) 令

$$K := \left\{ z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} \leq |z| \leq 2 \right\},$$

则存在 $K \rightarrow \mathfrak{M}$ 的双射, 使得 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示与该映射的复合^a是 K 上绝对收敛的 Laurent 级数.

^a我觉得这个表述其实有点歧义, 因为待求映射是 $K \rightarrow \mathfrak{M}$ 的, 而 Gelfand 表示是 $\mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 的, 两者其实作为映射本身没法复合. 如果设待求双射为 ι , 我觉得把待证结果表为对任意 $a \in \mathcal{A}$ 而言 $\hat{a}(\iota(\cdot))$ 都是 K 上的绝对收敛 Laurent 级数会更清楚一些.



证明 (i) 首先说明 $\mathcal{A}$ 是代数. 针对加法封闭性, 任取 $f, g \in \mathcal{A}$, 知

$$\|f + g\|_{\mathcal{A}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |(f + g)(n)| 2^{|n|} \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| 2^{|n|} + \sum_{n \in \mathbb{Z}} |g(n)| 2^{|n|} = \|f\|_{\mathcal{A}} + \|g\|_{\mathcal{A}} < \infty,$$

故 $f + g \in \mathcal{A}$. 上式同时证明了 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 的三角不等式.

针对数乘封闭性, 任取 $f \in \mathcal{A}, \lambda \in \mathbb{C}$, 知

$$\|\lambda f\|_{\mathcal{A}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\lambda f(n)| 2^{|n|} = |\lambda| \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| 2^{|n|} = |\lambda| \|f\|_{\mathcal{A}} < \infty,$$

故 $\lambda f \in \mathcal{A}$. 上式同时证明了 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 的齐次性.

针对乘法封闭性, 任取 $f, g \in \mathcal{A}$, 由离散的 Tonelli 定理知

$$\begin{aligned}\|f * g\|_{\mathcal{A}} &\leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(n-k)g(k)| 2^{|n-k|+|k|} \\ &\leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(n-k)g(k)| 2^{|n-k|} 2^{|k|} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} |g(k)| 2^{|k|} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n-k)| 2^{|n-k|} \\ &= \|g\|_{\mathcal{A}} \|f\|_{\mathcal{A}} < \infty,\end{aligned}$$

故 $f * g \in \mathcal{A}$. 上式同时证明了 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 的乘法不等式. 至此即得 $\mathcal{A}$ 是代数.

再证 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 是范数, 为此只需证 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 非负且正定. 非负性显见. 若 $\|f\|_{\mathcal{A}} = 0$, 则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| 2^{|n|} = 0 \Leftrightarrow |f(n)| = 0 (\forall n \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow f \equiv 0_{\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}},$$

因此 $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$ 正定, 从而 $\mathcal{A}$ 成为赋范线性空间.

再证 $\mathcal{A}$ 完备. 设 $\{f_l\}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的 Cauchy 列, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists L > 0 \forall l > r > L \left(\|f_l - f_r\|_{\mathcal{A}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f_l(n) - f_r(n)| 2^{|n|} = \|\{2^{|\cdot|} f_l(\cdot)\} - \{2^{|\cdot|} f_r(\cdot)\}\|_{l^1(\mathbb{Z})} < \varepsilon \right).$$

这说明 $\{2^{|\cdot|} f_l(\cdot)\}_l$ 是 $l^1(\mathbb{Z})$ 中的 Cauchy 列, 从而存在 $\{g(\cdot)\} \in l^1(\mathbb{Z})$ 使得 $\{2^{|\cdot|} f_l(\cdot)\} \rightarrow \{g(\cdot)\} (l^1(\mathbb{Z}))$. 记 $h(n) = g(n) 2^{-|n|}$, 则由 $g(\cdot) : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ 知 $h(\cdot)$ 是 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ 的, 且由 $g \in l^1(\mathbb{Z})$ 知

$$\|h\|_{\mathcal{A}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |g(n) 2^{-|n|}| 2^{|n|} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |g(n)| = \|\{g(\cdot)\}\|_{l^1(\mathbb{Z})} < \infty,$$

故 $h \in \mathcal{A}$. 进一步有

$$\|f_l - h\|_{\mathcal{A}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f_l(n) - h(n)| 2^{|n|} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |2^{|n|} f_l(n) - g(n)| = \|\{2^{|\cdot|} f_l\} - \{g(\cdot)\}\|_{l^1(\mathbb{Z})} \rightarrow 0,$$

因此确有 $f_l \rightarrow h(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A}$ 完备. 至此 $\mathcal{A}$ 成为 Banach 代数.

最后说明 $\mathcal{A}$ 交换. 若 $f \in \mathcal{A}, g \in \mathcal{A}$, 则考虑换元 $k \mapsto n-k$ 知

$$f * g(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(n-k)g(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(n-(n-k))g(n-k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} g(n-k)f(k) = g * f(n).$$

因此 $\mathcal{A}$ 交换, 故 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数.

(ii) 为定义 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示, 首先说明 $\mathcal{A}$ 含幺. 记

$$e^{(n)} = \mathbf{1}_{\{n\}}, \quad e_{\mathcal{A}} := e^{(0)} = \mathbf{1}_{\{0\}},$$

知¹¹

$$e^{(n)} \in \mathcal{A} (\forall n \in \mathbb{Z}), \quad \|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1, \quad f * e_{\mathcal{A}}(n) = f(n) = e_{\mathcal{A}} * f(n) (\forall f \in \mathcal{A}),$$

因此 $e_{\mathcal{A}}$ 确为 $\mathcal{A}$ 的单位元. 现在已知 $\mathfrak{M} \rightarrow \Delta$ 存在双射 $J \mapsto \varphi_J$, 进一步考虑映射

$$\iota : \Delta \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \varphi(e^{(1)}).$$

一方面

$$|\iota(\varphi)| = |\varphi(e^{(1)})| \leq \|\varphi\|_{\Delta} \|e^{(1)}\|_{\mathcal{A}} \leq 2,$$

另一方面显见 $e^{(1)} * e^{(-1)} = e_{\mathcal{A}}$, 因此由 φ 是同态知

$$|\iota(\varphi)| = |\varphi(e^{(-1)})^{-1}| = \frac{1}{|\varphi(e^{(-1)})|} \geq \frac{1}{\|\varphi\|_{\Delta} \|e^{(-1)}\|_{\mathcal{A}}} \geq \frac{1}{2},$$

¹¹ 回忆与 δ 函数的卷积实际上就是平移, 因此这里的 $e^{(n)}$ 实际上可以看成是用于诱导平移算子的元素. $e^{(n)}$ 类似于平移这个理解会让后面的证明过程相当自然.

因此实际上 $\iota: \Delta \rightarrow K$. 下面说明 ι 是双射, 为此首先说明 $e^{(r+l)} = e^{(r)} * e^{(l)} (\forall r, l \in \mathbb{Z})$. 这是因为

$$e^{(r)} * e^{(l)}(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbf{1}_{\{r\}}(n-k) \mathbf{1}_{\{l\}}(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathbf{1}_{\{n-r\}}(k) \mathbf{1}_{\{l\}}(k) = \mathbf{1}_{\{r+l\}}(n) = e^{(r+l)}.$$

现在针对单射, 若 $\varphi(e^{(1)}) = \psi(e^{(1)})$, 由 φ, ψ 均为同态知对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有

$$\varphi(e^{(k)}) = \varphi((e^{(1)})^k) = (\varphi(e^{(1)}))^k = (\psi(e^{(1)}))^k = \psi((e^{(1)})^k) = \psi(e^{(k)}).$$

针对一般的 $f \in \mathcal{A}$, 因为

$$f(n) = f * e_{\mathcal{A}}(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \mathbf{1}_{\{0\}}(n-k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \mathbf{1}_{\{n\}}(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) e^{(n)}(k),$$

于是 $f(\cdot) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) e^{(\cdot)}(k)$, 进而由同态的连续性与前述结论知

$$\varphi(f) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(f(k) e^{(\cdot)}(k)) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \varphi(e^{(\cdot)}(k)) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \psi(e^{(\cdot)}(k)) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi(f(k) e^{(\cdot)}(k)) = \psi(f),$$

因此 $\varphi = \psi$, 故 ι 是单射. 针对满射, 任取 $z \in K$, 记

$$\varphi_z(f) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) z^n,$$

由 $1/2 \leq |z| \leq 2$ 与 $f \in \mathcal{A}$ 知 φ_z 良定, 下面说明 φ_z 是非零复同态. 取 $f = e_{\mathcal{A}}$ 显见 $\varphi_z(e_{\mathcal{A}}) = 1$, 故 φ_z 非零. 针对同态, 任取 $f, g \in \mathcal{A}$, 由离散的 Fubini 定理知

$$\begin{aligned} \varphi_z(f * g) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f * g(n) z^n = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(n-k) g(k) z^{n-k} z^k \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} g(k) z^k \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n-k) z^{n-k} = \varphi_z(f) \varphi_z(g). \end{aligned}$$

因此 φ_z 是同态, 从而自动有 $\varphi_z \in \Delta$, 且 $\varphi_z(e^{(1)}) = \iota(\varphi_z) = z$, 故 ι 是满射. 现在 ι 成为 $\Delta \rightarrow K$ 的双射, 而用于诱导 Gelfand 拓扑的商映射 $i: \mathfrak{M} \rightarrow \Delta, J \mapsto \varphi_J$ 也是双射, 故 $T := \iota \circ i$ 是 $\mathfrak{M} \rightarrow K$ 的双射, 取 $T^{-1}: K \rightarrow \mathfrak{M}$ 即为待求双射.

最后说明 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示与 T^{-1} 的复合是 K 上的绝对收敛 Laurent 级数. 任取 $z \in K$, 知 $T^{-1}(z) = i^{-1}(\varphi_z) = \ker \varphi_z$, 于是对任意 $f \in \mathcal{A}$ 有

$$\widehat{f}(\ker \varphi_z) = \varphi_z(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) z^n,$$

进而由 $f \in \mathcal{A}$ 知

$$|\widehat{f}(\ker \varphi_z)| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| |z|^n \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| 2^{|n|} < \infty,$$

故 $\widehat{f}(\ker \varphi_z)$ 绝对收敛. □

练习 8.19

设 M 是紧 Hausdorff 拓扑空间, 证明 M 的全体非空闭子集与 $C(M)$ 的全体闭理想之间有一一对应.

证明 设 $C(M)$ 的全体闭理想构成的集合为 $\mathfrak{M}_c$, M 的全体非空闭子集构成的集合为 τ_c . 首先说明对任意 $A \in \tau_c$ 而言, 集合

$$J_A := \{f \in C(M) : f(x) = 0 (\forall x \in A)\} \quad (8.30)$$

均为 $C(M)$ 的闭理想. 既然 $C(M)$ 上的乘法是函数的点态乘法, 显见 J_A 首先是 $C(M)$ 的理想. 针对闭性, 任取 $\{f_n\} \subset J$ 是 $C(M)$ 中的 Cauchy 列, 设 $f_n \rightarrow f(C(M))$, 则 $\forall x \in M (f_n(x) \rightarrow f(x))$. 因为 $f_n(x) = 0 (\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A)$, 故 $f(x) = 0 (\forall x \in A)$, 因此 J_A 是闭理想.

再说明

$$\forall J \in \mathfrak{M}_c \exists A \in \tau_c (J = \{f \in C(M) : f(x) = 0 (\forall x \in A)\}). \quad (8.31)$$

考虑反证法, 设

$$\exists J \in \mathfrak{M}_c \forall A \in \tau_c \exists f_A \in J \exists x_A \in A (f_A(x_A) \neq 0).$$

因为 M 是紧 Hausdorff 空间, 故单点集是 M 中的闭集, 进而任取 $x_0 \in A$, 知总存在 $f_{x_0} \in J$ 使得 $f_{x_0}(x_0) \neq 0$. 因为 $f \in J \Leftrightarrow -f \in J \Leftrightarrow f\bar{f} \in J$, 故不妨设总存在 f_{x_0} 使得 $f_{x_0}(x_0) > 0$. 因为 $f_{x_0} \in C(M)$, 故每个 f_{x_0} 都存在开邻域 $U_{x_0} \in \tau_M$ 使得 $f_{x_0}(y) > 0 (\forall y \in U_{x_0})$. 显见 $M \subset \bigcup_{x_0 \in M} U_{x_0}$, 由 M 的紧性即知存在有限点集 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 使得 $M \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$. 记

$$f(x) := \sum_{i=1}^n f_{x_i}(x), \quad \forall x \in M,$$

显见 $f(x) \in C(M)$, 且 $\forall x \in M (f(x) > 0)$, 于是 f 在 $C(M)$ 中存在逆元 $1/f$. 另一方面因为理想作为子代数对加法封闭, 故 $f \in J$, 这与 J 是理想矛盾! 至此断言 (8.31) 得证. 依 (8.31) 定义映射:

$$\iota: \mathfrak{M}_c \rightarrow \tau_c, \quad J \mapsto \iota(J) =: A_J.$$

(8.30) 已经说明了 ι 是满射. 针对单射, 若 $A_{J_1} = A_{J_2}$, 则 $x \in A_{J_1} \Leftrightarrow x \in A_{J_2}$, 因此 $J_1 = J_2$. 至此 ι 成为 $\mathfrak{M}_c \rightarrow \tau_c$ 的一一对应. $\square$

练习 8.20

设 $\mathcal{A}$ 是半单含么交换 Banach 代数, 证明 $\mathcal{A}$ 的 Gelfand 表示的值域 $\Gamma(\mathcal{A})$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的闭集 $\Leftrightarrow$ 存在 $k \in (0, \infty)$ 使得对任意 $a \in \mathcal{A}$ 有

$$\|a\|_{\mathcal{A}}^2 \leq k \|a^2\|_{\mathcal{A}}.$$

证明 $\Rightarrow$: 因为 $\mathcal{A}$ 半单, 故 Γ 是 $\mathcal{A} \rightarrow \Gamma(\mathcal{A})$ 的连续线性双射, 从而 Banach 逆算子定理表明 Γ 存在有界逆 $\Gamma^{-1}: \Gamma(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$, 设 $\|\Gamma^{-1}\|_{C(\mathfrak{M}) \rightarrow \mathcal{A}} \leq C$. 现任取 $a \in \mathcal{A}$, 知

$$\|a\|_{\mathcal{A}} = \|\Gamma^{-1}(\hat{a})\|_{\mathcal{A}} \leq C \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})} = C \|\Gamma(a)\|_{C(\mathfrak{M})} = C \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}.$$

根据极限定义知

$$\exists N = N_a > 0 \forall n > N \left(\|a^{2^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^n}} - \|\Gamma(a)\|_{C(\mathfrak{M})} \right) < \frac{1}{2C} \|a\|_{\mathcal{A}} \Rightarrow \|\Gamma(a)\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \frac{1}{2C} \|a\|_{\mathcal{A}} + \|a^{2^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^n}}.$$

于是对每个 $a \in \mathcal{A}$ 均对应存在 $n_a \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|a\|_{\mathcal{A}} \leq 2C \|a^{2^{n_a}}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^{n_a}}}.$$

而由 Banach 代数的乘法不等式知

$$\|a^{2^{n_a}}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^{n_a}}} \leq \|a^{2^{n_a-1}}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^{n_a-1}}} \leq \dots \leq \|a^2\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2}},$$

因此

$$\|a\|_{\mathcal{A}} \leq 2C \|a^2\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \|a\|_{\mathcal{A}}^2 \leq 4C^2 \|a^2\|_{\mathcal{A}},$$

取 $k = 4C^2$ 即可.

$\Leftarrow$: 因为 $\mathcal{A}$ 半单, 故 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow \Gamma(\mathcal{A})$ 是连续线性单射, 进而 $\Gamma^{-1}: \Gamma(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 存在且为线性映射, 下证 Γ^{-1} 连续. 任取 $\hat{a} \in \Gamma(\mathcal{A})$, 知

$$\|a\|_{\mathcal{A}} \leq k^{\frac{1}{2}} \|a^2\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2}} \leq k^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} \|a^4\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{4}} \leq \dots \leq k^{\sum_{i=1}^n 2^{-i}} \|a^{2^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^n}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

若 $k \in (0, 1]$, 则 $k^\alpha \leq 1 (\forall \alpha > 0)$. 若 $k \in (1, \infty)$, 则 k^α 是关于 $\alpha > 0$ 的递增函数. 因为数列 $\{\sum_{i=1}^n 2^{-i}\}_n$ 是递增列, 故依照上述过程可得

$$k^{\sum_{i=1}^n 2^{-i}} \|a^{2^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^n}} \leq \max(1, k) \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^{2^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{2^n}} = \max(1, k) \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

这说明

$$\|\Gamma^{-1}(\hat{a})\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}} \leq \max(1, k) \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})}.$$

因此 Γ^{-1} 连续, 从而 $\Gamma(\mathcal{A}) = (\Gamma^{-1})^{-1}(\mathcal{A})$ 作为闭集的原像为闭集. $\square$

练习 8.21

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, $m \in \mathbb{N} \cap [3, \infty)$, $k \in (0, \infty)$, 且对任意 $x \in \mathcal{A}$ 均有 $\|x\|_{\mathcal{A}}^m \leq k \|x^m\|_{\mathcal{A}}$. 证明对任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 均存在 $k_n \in (0, \infty)$ 使得对任意 $x \in \mathcal{A}$ 均有

$$\|x\|_{\mathcal{A}}^n \leq k_n \|x^n\|_{\mathcal{A}}.$$



证明 $n = 1$ 的情形无可证, 下设 $n \geq 2$. 首先说明 $\mathcal{A}$ 半单, 为此只需说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = 0 \Rightarrow a = 0_{\mathcal{A}}$. 习题 8.15 已经说明过极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}}$ 存在, 因此由 $m \geq 3$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} = 0,$$

于是由条件, 仿照习题 8.20 的过程知

$$0 \leq \|a\|_{\mathcal{A}} \leq k^{\frac{1}{m}} \|a^m\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m}} \leq \dots \leq k^{\sum_{i=1}^n m^{-i}} \|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} \leq \max(1, k) \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} = 0,$$

因此只能有 $a = 0_{\mathcal{A}}$, 至此即得 $\mathcal{A}$ 半单, 进而 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow \Gamma(\mathcal{A})$ 成为连续线性单射, 从而 $\Gamma^{-1}: \Gamma(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 成为良定的线性映射, 下证 Γ^{-1} 连续. 任取 $\hat{a} \in \Gamma(\mathcal{A})$, 知

$$\exists N = N_a > 0 \forall n > N \left(\|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} - \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})} \right) < \frac{1}{2} \min \left\{ \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^{\infty} m^{-i}}, 1 \right\} \|a\|_{\mathcal{A}}.$$

于是

$$\|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} \leq \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})} + \frac{1}{2} \min \left\{ \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^{\infty} m^{-i}}, 1 \right\} \|a\|_{\mathcal{A}}$$

另一方面

$$\|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}} \geq \frac{1}{k} \|a^{m^{n-1}}\|_{\mathcal{A}}^m \geq \dots \geq \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^n m^i} \|a\|_{\mathcal{A}}^{m^n},$$

此即

$$\|a^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} \geq \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^n m^{-i}} \|a\|_{\mathcal{A}} \geq \min \left\{ \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^{\infty} m^{-i}}, 1 \right\} \|a\|_{\mathcal{A}},$$

故

$$\frac{1}{2} \min \left\{ \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^{\infty} m^{-i}}, 1 \right\} \|a\|_{\mathcal{A}} \leq \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})} \Rightarrow \|a\|_{\mathcal{A}} \leq C \|\hat{a}\|_{C(\mathfrak{M})}, \quad C := 2 \min \left\{ \left(\frac{1}{k} \right)^{\sum_{i=1}^{\infty} m^{-i}}, 1 \right\}^{-1} < \infty.$$

因此 Γ^{-1} 确实连续, 从而 $\Gamma(\mathcal{A})$ 成为 $C(\mathfrak{M})$ 的闭集, 进而由习题 8.20 结论知存在 $K \in (0, \infty)$ 使得

$$\|a\|_{\mathcal{A}}^2 \leq K \|a^2\|_{\mathcal{A}}.$$

至此 $n = 2$ 的情形得证. 对于 $n > 2$ 的情形考虑归纳法, 设 $n_0 > 2$, 且对任意 $n < n_0$ 均存在 $k_n \in (0, \infty)$ 使得 $\|a\|_{\mathcal{A}}^n \leq k_n \|a^n\|_{\mathcal{A}}$, 往证存在 $C \in (0, \infty)$ 使得 $\|a\|_{\mathcal{A}}^{n_0} \leq C \|a^{n_0}\|_{\mathcal{A}}$. 知

$$\begin{aligned} \|a\|_{\mathcal{A}} &\leq k_{n_0-1}^{\frac{1}{n_0-1}} \|a^{n_0-1}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n_0-1}} \leq k_{n_0-1}^{\frac{1}{n_0-1} + \frac{1}{(n_0-1)^2}} \|a^{(n_0-1)^2}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{(n_0-1)^2}} \\ &= C_{k, n_0} \|a^{n_0^2-2n_0+1}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{(n_0-1)^2}} \leq C_{k, n_0} \|a^{n_0(n_0-2)}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{(n_0-1)^2}} \|a\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{(n_0-1)^2}} \\ &\leq C_{k, n_0} \|a^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{n_0-2}{(n_0-1)^2}} \|a\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{(n_0-1)^2}} \end{aligned}$$

其中 $C_{k, n_0} := k_{n_0-1}^{\frac{1}{n_0-1} + \frac{1}{(n_0-1)^2}}$. 于是

$$\|a\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{(n_0-1)^2}} \leq C_{k, n_0} \|a^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{n_0-2}{(n_0-1)^2}} \Rightarrow \|a\|_{\mathcal{A}} \leq C_{k, n_0}^{\frac{1}{1-(n_0-1)^{-2}}} \|a^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{n_0-2}{(n_0-1)^2-1}} = C_{k, n_0}^{\frac{1}{1-(n_0-1)^{-2}}} \|a^{n_0}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n_0}}.$$

取 $k_{n_0} = C_{k, n_0}^{\frac{n_0}{1-(n_0-1)^{-2}}}$ 即得待证结果. □

注 8.25 因为已经经历了习题 8.20, 所以上述过程也可以改的更简单一点. 根据条件已知对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$\|x^{m^n}\|_{\mathcal{A}} \geq k^{-1} \|x^{m^{n-1}}\|_{\mathcal{A}}^m \geq \dots \geq k^{\frac{m^n-1}{1-m}} \|x\|_{\mathcal{A}}^{m^n},$$

于是

$$\|x\|_{\mathcal{A}} \leq k^{\frac{1-m-n}{1-m}} \|x^{m^n}\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{m^n}} \leq k^{\frac{1}{1-m}} \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})},$$

于是

$$\|x\|_{\mathcal{A}}^n \leq k^{\frac{n}{m-1}} \|\Gamma x\|_{C(\mathfrak{M})}^n = k^{\frac{n}{m-1}} \|\Gamma x^n\|_{C(\mathfrak{M})} \leq k^{\frac{n}{m-1}} \|x^n\|_{\mathcal{A}}.$$

□

练习 8.22

设 $\mathcal{A}$ 是含么交换 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$, 证明 a 在 $\mathcal{A}$ 中可逆当且仅当 a 的 Gelfand 表示 $\Gamma(a)$ 在 $C(\mathfrak{M})$ 中可逆.

♠

证明 $\Rightarrow$: 若 a 可逆, 则对任意 $J \in \mathfrak{M}$ 均有 $a \notin J$, 这说明 $\hat{a}(J) \neq 0 (\forall J \in \mathfrak{M})$, 故 $\frac{1}{\hat{a}(J)}$ 对任意 $J \in \mathfrak{M}$ 均有意义. 进一步因为

$$aa^{-1} = e_{\mathcal{A}} \Rightarrow 1_{C(\mathfrak{M})} = \Gamma(aa^{-1}) = \Gamma(a)\Gamma(a^{-1}),$$

由 $C(\mathfrak{M})$ 交换即知 $\Gamma(a^{-1})$ 是 $\Gamma(a)$ 的逆.

$\Leftarrow$: 设 $\Gamma(a)$ 可逆且其逆元为 f , 则 $\Gamma(a)(J)f(J) \equiv 1 (\forall J \in \mathfrak{M})$. 若存在 $J_0 \in \mathfrak{M}$ 使得 $\Gamma(a)(J_0) = 0$, 则必有 $\Gamma(a)(J_0)f(J_0) = 0$, 矛盾! 故对任意 $J \in \mathfrak{M}$ 均有 $\Gamma(a)(J) \neq 0$, 此即 $\varphi_J(a) \neq 0 (\forall J \in \mathfrak{M})$, 亦即 $a \notin J (\forall J \in \mathfrak{M})$. 现若存在理想 I 使得 $a \in I$, 因为必存在 $\tilde{I} \in \mathfrak{M}$ 使得 $I \subset \tilde{I}$, 故 $a \in \tilde{I}$, 矛盾! 因此 a 也不在任何理想内, 故 a 可逆. □

练习 8.23

设 $\mathcal{A}$ 是含么 Banach 代数, 且存在正常数 M 使得对任意 $x, y \in \mathcal{A}$ 有

$$\|x\|_{\mathcal{A}} \|y\|_{\mathcal{A}} \leq M \|xy\|_{\mathcal{A}}.$$

证明 $\mathcal{A}$ 等距同构于 $\mathbb{C}$.

♠

证明 设 $e_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的单位元, 记

$$\iota: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{A}, z \mapsto ze_{\mathcal{A}}.$$

显见 ι 线性. 若 $\iota(z_1) = \iota(z_2)$, 则 $(z_1 - z_2)e_{\mathcal{A}} = 0_{\mathcal{A}}$, 由 $\mathcal{A}$ 非平凡知 $z_1 = z_2$, 故 ι 是单射. 下证 ι 是满射.

任取 $a \in \mathcal{A}$, 由 Gelfand-Mazur 定理知 $\sigma(a)$ 非空且为紧集. 设 $\lambda \in \partial\sigma(a) \subset \sigma(a)$, 则存在 $\{\lambda_n\} \subset \rho(a)$ 使得 $\lambda_n \rightarrow \lambda (n \rightarrow \infty)$. 下面说明 $\lambda e_{\mathcal{A}} - a = 0_{\mathcal{A}}$. 由 $\rho(a)$ 的定义知对每个 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \in \mathcal{A}$, 下证 $\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$. 考虑反证, 若

$$\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} (\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq C),$$

由 $\lambda_n \rightarrow \lambda$ 知

$$\exists N > 0 \forall n > N \left(|\lambda_n - \lambda| < \frac{1}{C} \right),$$

于是

$$\|e_{\mathcal{A}} - (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a) - (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)\|_{\mathcal{A}} < 1,$$

由 von Neumann 引理即知 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1} \in G(\mathcal{A})$, 但这与 $\lambda \in \sigma(a)$ 矛盾! 故确有 $\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$. 因此

$$\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \|\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a\|_{\mathcal{A}} \leq M \|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)\|_{\mathcal{A}} = M$$

此即

$$\|\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a\|_{\mathcal{A}} \leq \frac{M}{\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}}} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty,$$

由范数的连续性知只能有 $a = \lambda e_{\mathcal{A}}$, 至此 ι 成为双射. 显见 $a \neq 0_{\mathcal{A}} \Leftrightarrow \iota^{-1}(a) \neq 0$, 而 $e_{\mathcal{A}}$ 可逆 $\Leftrightarrow \lambda e_{\mathcal{A}}$ 可逆 $(\forall \lambda \neq 0)$, 故 $\mathcal{A}$ 中的全体非零元均可逆, 这说明 $\mathcal{A}$ 是可除 Banach 代数, 由 Gelfand-Mazur 定理立得结论. □

练习 8.24

设 $\mathcal{A}$ 为含么 $e_{\mathcal{A}}$ 的 Banach 代数, 记 $r: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\mathcal{A}$ 上的谱半径函数. 证明若 $a \in \mathcal{A}$ 且 $r(a) = 0$, 则 r 在 a 处连续.



证明 设 $a \in \mathcal{A}$ 满足 $r(a) = 0$, 往证

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall b \in \mathcal{A} (\|b - a\|_{\mathcal{A}} < \delta \Rightarrow r(b) < \varepsilon).$$

注意 $r(b) < \varepsilon$ 等价于

$$\forall \lambda \in \mathbb{C} (|\lambda| \geq \varepsilon \Rightarrow \lambda \in \rho(b) \Rightarrow (\lambda e_{\mathcal{A}} - b) \in G(\mathcal{A})).$$

现待定 δ , 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $|\lambda| \geq \varepsilon$, 则要想 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - b) \in G(\mathcal{A})$, 只需 $(e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}b) \in G(\mathcal{A})$. 因为 $r(a) = 0$, 故已知 $e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}a \in G(\mathcal{A})$, 于是

$$\begin{aligned} e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}b &= e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}a + \lambda^{-1}a - \lambda^{-1}b \\ &= (e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}a)(e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}(e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}a)^{-1}(b - a)) \\ &= (e_{\mathcal{A}} - \lambda^{-1}a)(e_{\mathcal{A}} - (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(b - a)), \end{aligned}$$

因此只需证明 $(e_{\mathcal{A}} - (\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(b - a)) \in G(\mathcal{A})$, 根据 von Neumann 引理此即证明

$$\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(b - a)\|_{\mathcal{A}} < 1.$$

下面估计 $\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}}$. 若 $\varepsilon \leq |\lambda| \leq 2\|a\|_{\mathcal{A}} + \varepsilon$, 因为已知 $x \mapsto x^{-1}$ 是 $G(\mathcal{A})$ 中的连续映射, 故 $(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}$ 作为关于 λ 的连续函数在该紧区域上有一致上界 M . 另若 $\lambda > 2\|a\|_{\mathcal{A}} + \varepsilon$, 则 von Neumann 引理表明

$$\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \leq \frac{1}{|\lambda| - \|a\|_{\mathcal{A}}} \leq \frac{1}{\varepsilon + \|a\|_{\mathcal{A}}}.$$

现取

$$\delta = \frac{1}{2} \min \left\{ \frac{1}{M}, \varepsilon + \|a\|_{\mathcal{A}} \right\},$$

知

$$\|(\lambda e_{\mathcal{A}} - a)^{-1}(b - a)\|_{\mathcal{A}} \leq \max \left\{ M\delta, \frac{1}{\varepsilon + \|a\|_{\mathcal{A}}} \delta \right\} \leq \frac{1}{2} < 1,$$

至此即得结论. □

练习 8.25

设 X 为含么交换 Banach 代数, 对任意 $x \in X$ 令

$$r(x) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

设 $x, y \in X$, 证明:

- (i) $r(xy) \leq r(x)r(y)$.
- (ii) $r(x + y) \leq r(x) + r(y)$.



证明 (i) 知

$$r(xy) = \|\Gamma(xy)\|_{C(\mathfrak{M})} = \|\Gamma(x)\Gamma(y)\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|\Gamma(x)\|_{C(\mathfrak{M})} \|\Gamma(y)\|_{C(\mathfrak{M})} = r(x)r(y).$$

(ii) 知

$$r(x + y) = \|\Gamma(x + y)\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|\Gamma(x) + \Gamma(y)\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|\Gamma(x)\|_{C(\mathfrak{M})} + \|\Gamma(y)\|_{C(\mathfrak{M})} = r(x) + r(y).$$



练习 8.26

设 $\mathcal{A}$ 为含么 $e_{\mathcal{A}}$ 的交换 Banach 代数, 且存在 $n \in \mathbb{N}_+$ 与 $\mathcal{A}$ 中的点列 $\{x_k\}_{k=1}^n$, 使得以其为变量的复系数多项式全体在 $\mathcal{A}$ 中稠密. 定义

$$\phi: \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}^n, J \mapsto (\widehat{x_1}(J), \dots, \widehat{x_n}(J)).$$

证明:

(i) ϕ 是单射.

(ii) ϕ 是 $\mathfrak{M}$ 到 $\mathbb{C}^n$ 中某个紧集的同胚.



证明 (i) 设 $\phi(J_1) = \phi(J_2)$, 则 $\widehat{x_i}(J_1) = \widehat{x_i}(J_2) (\forall 1 \leq i \leq n)$. 因为 $\{x_k\}_{k=1}^n$ 生成的代数在 $\mathcal{A}$ 中稠密, 故对任意 $x \in \mathcal{A}$ 总存在多项式列 $P_k(x_1, \dots, x_n) \rightarrow x(\mathcal{A})$. 因为 $a \mapsto \widehat{a}$ 是连续同态, 故 $(P_k(x_1, \dots, x_n))^{\wedge} = P_k(\widehat{x_1}, \dots, \widehat{x_n}) \rightarrow \widehat{x}(C(\mathfrak{M}))$, 进而由 $P_k(\widehat{x_1}, \dots, \widehat{x_n})(J_1) = P_k(\widehat{x_1}, \dots, \widehat{x_n})(J_2) (\forall k)$ 得 $\widehat{x}(J_1) = \widehat{x}(J_2)$. 因为 $x \in \mathcal{A}$ 是任取的, 故只能有 $J_1 = J_2$, 从而 ϕ 是单射.

(ii) 首先说明 ϕ 连续. 已知 $\widehat{x_i} \in C(\mathfrak{M}) (\forall 1 \leq i \leq n)$, 故 $\phi \in (C(\mathfrak{M}))^n$, 而直积保持连续性, 故 ϕ 连续.

既然已知 ϕ 是单射, 故 $\phi^{-1}: \mathbb{C}^n \supset \phi(\mathfrak{M}) \rightarrow \mathfrak{M}$ 存在, 下证 ϕ^{-1} 连续, 为此只需说明 $\mathfrak{M}$ 的每个邻域基的原像均为开集即可. 取定 $J_0 \in \mathfrak{M}, \varepsilon > 0, m > 0, a_i \in \mathcal{A} (1 \leq i \leq m)$, 设

$$U = \{J \in \mathfrak{M} : |\widehat{a_i}(J) - \widehat{a_i}(J_0)| < \varepsilon, \forall 1 \leq i \leq m\}.$$

则

$$(\phi^{-1})^{-1}(U) = \phi(U) = \{z := (\widehat{x_1}(J), \dots, \widehat{x_n}(J)) \in \mathbb{C}^n \cap \phi(\mathfrak{M}) : |\widehat{a_i}(J) - \widehat{a_i}(J_0)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq m\}.$$

现任取 $z_1 = (\widehat{x_1}(J_1), \dots, \widehat{x_n}(J_1)) \in \phi(U)$, 往证存在开集 $V \in \tau_{\phi(\mathfrak{M})}$ 使得 $z_1 \in V, V \subset \phi(U)$. 为此由已知稠密性知对每个 $a_i \in \mathcal{A}$ 均存在多项式 $P_i(x_1, \dots, x_n) =: P_i$ 使得

$$\|P_i - a_i\|_{\mathcal{A}} < C\varepsilon,$$

其中 C 待定. 由 Γ 是连续同态知

$$\|\widehat{P_i} - \widehat{a_i}\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|P_i - a_i\|_{\mathcal{A}} < C\varepsilon,$$

现取

$$V := \{z' = (\widehat{x_1}(J'), \dots, \widehat{x_n}(J')) \in \mathbb{C}^n \cap \phi(\mathfrak{M}) : |\widehat{P_i}(J') - \widehat{P_i}(J_1)| < C'\varepsilon, \forall 1 \leq i \leq m\},$$

其中 C' 待定. 知对任意 $z' = (\widehat{x_1}(J'), \dots, \widehat{x_n}(J')) \in V$ 均有

$$\begin{aligned} |\widehat{a_i}(J') - \widehat{a_i}(J_0)| &\leq |\widehat{a_i}(J_1) - \widehat{a_i}(J_0)| + |\widehat{a_i}(J') - \widehat{a_i}(J_1)| \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq m} |\widehat{a_i}(J_1) - \widehat{a_i}(J_0)| + |\widehat{a_i}(J') - \widehat{P_i}(J')| + |\widehat{P_i}(J') - \widehat{P_i}(J_1)| + |\widehat{P_i}(J_1) - \widehat{a_i}(J_1)| \\ &< \max_{1 \leq i \leq m} |\widehat{a_i}(J_1) - \widehat{a_i}(J_0)| + 2C\varepsilon + C'\varepsilon \end{aligned}$$

令

$$2C + C' = \frac{1}{\varepsilon} \left(\varepsilon - \max_{1 \leq i \leq m} |\widehat{a_i}(J_1) - \widehat{a_i}(J_0)| \right),$$

例如取 $C = C' = \varepsilon^{-1}(\varepsilon - \max_{1 \leq i \leq m} |\widehat{a_i}(J_1) - \widehat{a_i}(J_0)|)/3$, 则

$$|\widehat{a_i}(J') - \widehat{a_i}(J_0)| < \varepsilon (\forall 1 \leq i \leq m) \Rightarrow V \subset \phi(U).$$

显见 $z_1 \in V$, 最后说明 $V \in \tau_{\phi(\mathfrak{M})}$. 注意到

$$V = \bigcap_{i=1}^m \{z' = (\widehat{x_1}(J'), \dots, \widehat{x_n}(J')) \in \mathbb{C}^n \cap \phi(\mathfrak{M}) : |\widehat{P_i}(J') - \widehat{P_i}(J_1)| < C'\varepsilon\} =: \bigcap_{i=1}^m V_i,$$

因此只需说明 $V_i \in \tau_{\phi(\mathfrak{M})} (\forall 1 \leq i \leq m)$. 为此注意到

$$\widehat{P_i}(J') - \widehat{P_i}(J_1) = P_i(\widehat{x_1}(J'), \dots, \widehat{x_n}(J')) - P_i(\widehat{x_1}(J_1), \dots, \widehat{x_n}(J_1)),$$

上右式是关于 $z = (\widehat{x_1}(J'), \dots, \widehat{x_n}(J'))$ 的连续函数, 而对取定的 β 而言 $\{\alpha : |\alpha - \beta| < C'\varepsilon\}$ 显然是 $\mathbb{C}$ 中的开集, 故 V_i 作为开集在连续函数下的原像是 $\mathbb{C}^n \cap \phi(\mathfrak{M})$ 中的开集, 从而 V 是开集, 至此即得 ϕ^{-1} 连续, 故 ϕ 是 $\mathfrak{M} \rightarrow \phi(\mathfrak{M})$ 的同胚. 因为 $\mathfrak{M}$ 是紧 Hausdorff 空间, 故由同胚保紧性知 $\phi(\mathfrak{M})$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的紧子集. $\square$

注 8.26 (ii) 还可以写得更有商映射的味一点. ϕ 连续顺证, 难点在 ϕ^{-1} 连续. 设 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 Gelfand 拓扑, τ 是 $\mathbb{C}^n$ 在 $\phi(\mathfrak{M})$ 上的子拓扑. 只要能证明 $\tau_{\mathfrak{M}} = \phi^{-1}(\tau)$, 由 $\phi : \mathfrak{M} \rightarrow \phi(\mathfrak{M})$ 是双射即知 $\tau = \phi(\tau_{\mathfrak{M}})$, 依连续定义即得 ϕ^{-1} 连续. 现在要证 $\tau_{\mathfrak{M}} = \phi^{-1}(\tau)$, 就是要用拓扑等价定理. 由 ϕ 连续知天生有 $\phi^{-1}(\tau) \subset \tau_{\mathfrak{M}}$, 往证 $(\mathfrak{M}, \phi^{-1}(\tau))$ 是 Hausdorff 空间, $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 紧, 后者自动成立.

下证 $(\mathfrak{M}, \phi^{-1}(\tau))$ 是 Hausdorff 空间. 任取 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}$ 满足 $J_1 \neq J_2$, 由 ϕ 是单射知 $\phi(J_1) \neq \phi(J_2)$, 于是由 $(\mathbb{C}^n, \tau)$ 是 Hausdorff 空间知存在 $U, V \in \tau$ 满足 $U \cap V = \emptyset, \phi(J_1) \in U, \phi(J_2) \in V$, 这说明 $J_1 \in \phi^{-1}(U), J_2 \in \phi^{-1}(V), \phi^{-1}(U) \cap \phi^{-1}(V) = \phi^{-1}(U \cap V) = \emptyset$, 由 $\phi^{-1}(U), \phi^{-1}(V) \in \phi^{-1}(\tau)$ 即知 $(\mathfrak{M}, \phi^{-1}(\tau))$ 是 Hausdorff 空间, 至此即得 $\tau_{\mathfrak{M}} = \phi^{-1}(\tau)$, 故 $\tau = \phi(\tau_{\mathfrak{M}})$, 从而 ϕ^{-1} 连续, ϕ 成为同胚.

8.4 C^* 代数

本节旨在介绍 C^* 代数的定义与基本性质, 并给出交换 C^* 代数的 Gelfand-Naimark 定理.

定义 8.11 (对合 (involution), 反自 (代数) 同构 (anti-automorphism))

设 $\mathcal{A}$ 是代数, 如果映射 $*$: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 满足对 $\forall a, b \in \mathcal{A}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$ 有:

$$(i) \quad (a + b)^* = a^* + b^*;$$

$$(ii) \quad (\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*;$$

$$(iii) \quad (ab)^* = b^* a^*;$$

$$(iv) \quad (a^*)^* = a,$$

就称 $*$ 是对合. 若 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 的双射满足上述性质 (iii), 就称该同构为反自同构.

命题 8.11

代数 $\mathcal{A}$ 上的对合 $*$ 是周期为 2 的共轭线性反自同构, 且

$$0_{\mathcal{A}}^* = 0_{\mathcal{A}}, \quad (a - b)^* = a^* - b^*.$$

证明 根据定义 8.11(i) 知

$$0_{\mathcal{A}}^* = (0_{\mathcal{A}} + 0_{\mathcal{A}})^* = 0_{\mathcal{A}}^* + 0_{\mathcal{A}}^*,$$

因此 $0_{\mathcal{A}}^* = 0_{\mathcal{A}}$. 由定义 8.11(ii) 知 $(-a)^* = -a^*$, 再由定义 8.11(i) 知

$$(a - b)^* = (a + (-b))^* = a^* + (-b)^* = a^* - b^*.$$

下面说明对合是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 的双射. 若 $a^* = b^*$, 则 $(a - b)^* = 0_{\mathcal{A}}$, 从而

$$a - b = (a - b)^{**} = 0_{\mathcal{A}},$$

因此对合是单射. 另对任意 $c \in \mathcal{A}$ 显见 $(c^*)^* = c$, 故对合是满射, 因此对合是 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 的双射, 进而是 $\mathcal{A}$ 上的共轭线性反自同构.

下面给出两个约定意义下的例子, 没有特别声明的时候我们就默认这两个例子是对应空间上的给定对合了.

例 8.7 设 $\mathcal{A} = C(M)$, 其中 M 是紧 Hausdorff 空间, 定义

$$* : \varphi \mapsto \bar{\varphi},$$

亦即 $*$ 为 $C(M)$ 上的共轭运算, 则 $*$ 是 $C(M)$ 上的对合.

例 8.8 设 $\mathcal{A} = L(H)$, 其中 H 是 Hilbert 空间. 对 $\forall A \in L(H)$ 定义

$$* : A \mapsto A^*,$$

亦即 $*$ 把 A 映成 A 的共轭算子¹², 则由 $H^* = H$ 知 $*$ 是 $L(H)$ 上的对合.

定义 8.12 (Hermite 元 (Hermite element, self-adjoint element))

设 $\mathcal{A}$ 是有对合 $*$ 的代数, $a \in \mathcal{A}$. 若 $a^* = a$, 就称 a 是 $\mathcal{A}$ 的 Hermite 元.



引理 8.10 (Hermite 元的基本性质)

设 $\mathcal{A}$ 是有对合 $*$ 的含么 Banach 代数, $a \in \mathcal{A}$, 则:

- (i) $a + a^*, i(a - a^*), i(a^* - a), aa^*$ 均为 Hermite 元;
- (ii) a 有唯一分解 $a = u + iv$, 其中 u, v 为 Hermite 元;
- (iii) $\mathcal{A}$ 的单位元 $e_{\mathcal{A}}$ 是 Hermite 元;
- (iv) a 在 $\mathcal{A}$ 中可逆当且仅当 a^* 可逆, 此时 $(a^*)^{-1} = (a^{-1})^*$;
- (v) $\lambda \in \sigma(a) \Leftrightarrow \bar{\lambda} \in \sigma(a^*)$.



证明 (i) 由定义 8.11 知

$$\begin{aligned}(a + a^*)^* &= a^* + (a^*)^* = a + a^*, \\ (i(a - a^*))^* &= -i(a^* - (a^*)^*) = i(a - a^*), \\ (i(a^* - a))^* &= -i((a^*)^* - a^*) = i(a^* - a), \\ (aa^*)^* &= (a^*)^* a^* = aa^*.\end{aligned}$$

(ii) 令

$$u := \frac{1}{2}(a + a^*), \quad v := \frac{i}{2}(a^* - a),$$

则由 (i) 知 u, v 是 Hermite 元, 且 $a = u + iv$. 下面说明分解的唯一性, 设另存在分解 $a = u_1 + iv_1$ (其中 u_1, v_1 是 Hermite 元), 令 $\omega := v_1 - v$. 因为 $u + iv = u_1 + iv_1$, 故 $u - u_1 = i(v_1 - v)$, 因此 $i\omega = u - u_1$, 从而 ω 与 $i\omega$ 都是 Hermite 元, 因此

$$i\omega = (i\omega)^* = -i\omega^* = -i\omega,$$

故 $\omega = 0_{\mathcal{A}}$, 因此分解 $a = u + iv$ 唯一.

(iii) 因为 $e_{\mathcal{A}}^* = e_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}}^*$, 由 (i) 可知 $e_{\mathcal{A}}^*$ 是 Hermite 元, 于是 $e_{\mathcal{A}} = (e_{\mathcal{A}}^*)^* = e_{\mathcal{A}}^*$, 因此 $e_{\mathcal{A}}$ 是 Hermite 元.

(iv) 设 a 可逆且 a^{-1} 为 a 的逆元, 因为 $aa^{-1} = e_{\mathcal{A}} = a^{-1}a$, 故由 (iii) 知

$$(a^{-1})^* a^* = (aa^{-1})^* = e_{\mathcal{A}}^* = e_{\mathcal{A}} = e_{\mathcal{A}}^* = (a^{-1}a)^* = a^*(a^{-1})^*,$$

因此 $(a^*)^{-1} = (a^{-1})^*$. 反之, 设 a^* 可逆且其逆元为 $(a^*)^{-1}$, 则

$$a^*(a^*)^{-1} = e_{\mathcal{A}} = (a^*)^{-1}a^*,$$

由 (iii) 与前述即知

$$((a^*)^{-1})^* a = e_{\mathcal{A}}^* = e_{\mathcal{A}} = e_{\mathcal{A}}^* = a((a^*)^{-1})^*,$$

因此 a 可逆且其逆元为 $a^{-1} = ((a^*)^{-1})^*$, 由定义 8.11(iv) 进而可得 $(a^{-1})^* = (a^*)^{-1}$.

(v) 回忆 $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 中的可逆元全体, 由 (iv) 的逆否命题知:

$$\begin{aligned}\lambda \in \sigma(a) &\Leftrightarrow \lambda e_{\mathcal{A}} - a \notin G(\mathcal{A}) \\ &\Leftrightarrow \bar{\lambda} e_{\mathcal{A}} - a^* \notin G(\mathcal{A}) \\ &\Leftrightarrow \bar{\lambda} \in \sigma(a^*).\end{aligned}$$

□

注 8.27 由基本性质 8.10(ii) 与定义 8.11(i),(ii) 可知对合运算 $*$ 类似于 $\mathbb{C}$ 中的共轭运算. 事实上, 对 $\forall a \in \mathcal{A}$, 由基本

¹² 回忆 Hilbert-Schmidt 定理那节, 共轭算子指的是 $A^* : H \rightarrow H, (Ax|y)_H = (x|A^*y)_H$, 它和转置算子 $A^t : H^* \rightarrow H^*, \langle A^t x, y \rangle_{H^* \times H} = \langle x, Ay \rangle_{H^* \times H}$ 是有点区别的.

性质8.10(ii) 知 $a = u + iv$, 其中 u, v 均为 Hermite 元. 于是由定义8.11(i),(ii) 知

$$a^* = (u + iv)^* = u^* - iv^* = u - iv.$$

定义 8.13 (C^* 代数 (C^* algebra))

设 $\mathcal{A}$ 是有对合 $*$ 的含么 Banach 代数, 若对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 均有

$$\|a^*a\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}^2,$$

就称 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数.



注 8.28 上述定义中的条件 $\|a^*a\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}^2$ 可以换成 $\|a^*a\|_{\mathcal{A}} = \|a^*\|_{\mathcal{A}}\|a\|_{\mathcal{A}}$, 参看 [4].

注 8.29 虽说可能和真实的历史按不太上, 但我觉得把希望 Γ 成为等距到上同构作为 C^* 代数的动机的话, 对合运算和 C^* 代数的提出都是很自然的. 如果 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 是等距到上同构, 因为 $C(\mathfrak{M})$ 上天生存在有共轭运算 $f \mapsto \bar{f}$, 故 Γ^{-1} 作为单射需要区分共轭元 $f, \bar{f}$ (即对 $f \notin \mathbb{R}$ 而言不能有 $\Gamma^{-1}(f) = \Gamma^{-1}(\bar{f})$), 这便要求 $f, \bar{f}$ 本身来自 $\mathcal{A}$ 中的不同元素, 很自然的想法就是让 a 对应 f , 再找一个 $\mathcal{A}$ 上类似共轭的运算 $*$ 使得 a^* 对应 $\bar{f}$. 现在只要 Γ 等距, 就有

$$\|aa^*\|_{\mathcal{A}} = \|\Gamma(aa^*)\|_{C(\mathfrak{M})} = \|f\bar{f}\|_{C(\mathfrak{M})} = \|f\|_{C(\mathfrak{M})}^2 = \|a\|_{\mathcal{A}}^2,$$

这正是用于定义 C^* 代数的乘积恒等式.

注 8.30 先前在介绍 Gelfand-Mazur 定理8.3时候我们提过用 $\overline{L_A}^{L(X)}$ 的视角考虑问题, 此时 $\overline{L_A}^{L(X)}$ 作为含么 Banach 代数 (简单起见后面就把这个代数称为 A 的生成代数) 自动交换. 这个代数也可以放到 C^* 代数里提. 回忆习题6.41表明 $A \in L(H) \Rightarrow \|AA^*\|_{H \rightarrow H} = \|A\|_{H \rightarrow H}^2$. 因此 Hilbert 空间上有界线性算子的生成代数自动成为 C^* 代数. 我自己认为生成代数是可以作为正常算子的动机的: 正常算子指的是 $N^*N = NN^*$, 此时生成代数自动成为交换 C^* 代数.

引理 8.11

设 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数, 则

- (i) $\|a^*\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}, a \in \mathcal{A}$;
- (ii) 若 a 是 Hermite 元, 则 $\|a^2\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}^2$.



证明 (i) 由 C^* 代数的定义知

$$\|a\|_{\mathcal{A}}^2 = \|a^*a\|_{\mathcal{A}} \leq \|a^*\|_{\mathcal{A}}\|a\|_{\mathcal{A}},$$

因此 $\|a\| \leq \|a^*\|$. 反之对 a^* 应用上述结论知

$$\|a^*\|_{\mathcal{A}} \leq \|a^{**}\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}},$$

因此对 $\forall a \in \mathcal{A}$ 有 $\|a\|_{\mathcal{A}} = \|a^*\|_{\mathcal{A}}$.

(ii) 当 a 是 Hermite 元时, 知 $a = a^*$, 于是由 C^* 代数的定义知

$$\|a^2\|_{\mathcal{A}} = \|a^*a\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}^2.$$

□

定义 8.14 ($*$ 同态)

设 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是两个 C^* 代数, $\varphi: \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2$ 是映射. 若对 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}, \forall a, b \in \mathcal{A}_1$ 有:

- (i) $\varphi(\lambda a + \mu b) = \lambda \varphi(a) + \mu \varphi(b)$ (保线性运算),
- (ii) $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ (保乘法运算),
- (iii) $\varphi(a^*) = (\varphi(a))^*$ (保 $*$ 运算),
- (iv) $\|\varphi(a)\|_{\mathcal{A}_2} \leq \|a\|_{\mathcal{A}_1}$ (连续),

则称 φ 是 $*$ 同态.



命题 8.12

设 H 是 Hilbert 空间, 则 $L(H)$ 中所有对算子共轭运算 $*$ 封闭的含么闭子代数均为 C^* 代数.



注 8.31 这里含么 (即含恒同算子 Id) 条件不能省掉, 这是因为无穷维 Hilbert 空间 H 上的紧算子全体 $\mathfrak{K}(H)$ 就是不含 Id 且对算子共轭运算 $*$ 封闭的闭子代数, 同时对任意 $L \in \mathfrak{K}(H)$ 均有

$$\|L^*L\|_{H \rightarrow H} = \|L\|_{H \rightarrow H}^2.$$

然而 $\mathfrak{K}(H)$ 并不是 C^* 代数 (毕竟 C^* 代数首先是含么代数).

证明 只需说明对 $\forall L \in L(H)$ 均有

$$\|L^*L\|_{H \rightarrow H} = \|L\|_{H \rightarrow H}^2.$$

事实上, 显见 L^*L 是 H 上的对称算子, 根据对称算子的基本性质 6.9(v) 可知

$$\begin{aligned} \|L^*L\|_{H \rightarrow H} &= \sup_{\|x\|_H=1} |(L^*Lx)_H| \\ &= \sup_{\|x\|_H=1} |(Lx)_H| \\ &= \sup_{\|x\|_H=1} \|Lx\|_H^2 = \|L\|_{H \rightarrow H}^2. \end{aligned}$$

□

命题 8.12 的逆命题即为 Gelfand-Naimark 定理:

定理 8.16 (Gelfand-Naimark)

每个 C^* 代数都 $*$ 等距同构于 $L(H)$ 的某个对算子共轭运算 $*$ 封闭的闭子代数.



对一般的定理 8.16 的证明这里就省略了, 我们着重讨论交换 C^* 代数的情况:

定理 8.17 (Gelfand-Naimark)

设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^* 代数, 则其 Gelfand 表示 $\Gamma: \mathcal{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 是一个 $*$ 等距到上同构, 即:

- (i) $\widehat{a^*}(J) = \overline{\widehat{a}(J)}$ ($\forall a \in \mathcal{A}, \forall J \in \mathfrak{M}$) (Γ 保对合^a);
- (ii) $\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \|a\|_{\mathcal{A}}$ ($\forall a \in \mathcal{A}$) (Γ 是等距单射);
- (iii) Γ 是满射.

^a再换句话说就是 $\Gamma(a^*) = (\Gamma(a))^*$, 从注 8.29 解释的动机出发的话可以发现这个结果是理所应当的.



在证明定理 8.17 之前, 我们需要用到两条结论:

引理 8.12 (Arens 引理)

设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^* 代数, $a \in \mathcal{A}$ 是 Hermite 元, 则 Γa 是 $\mathfrak{M}$ 上的实值函数.



注 8.32 Arens 引理表明针对 Hermite 元 a 直接有

$$\widehat{a^*}(J) = \Gamma(a^*)(J) = \Gamma(a)(J) = \overline{\Gamma(a)(J)} = (\Gamma(a))^*(J).$$

而一般的 $a \in \mathcal{A}$ 依引理 8.10 能唯一分解为 Hermite 元之和, 于是在 Arens 引理得证后定理 8.16(i) 能用上 Hermite 分解与实虚部分解.

证明 根据 Γ 的定义知对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 有

$$(\Gamma a)(J) = \widehat{a}(J) = \langle \varphi_J, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}},$$

其中 $\varphi_J \in \Delta$, Δ 依 (8.11) 式定义. 因此只需说明对 $\forall \varphi \in \Delta$ 而言 $\langle \varphi, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} \in \mathbb{R}$ 即可. 设

$$\langle \varphi, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} := \alpha + i\beta,$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 设 $e_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的单位元, 则对 $\forall t \in \mathbb{R}$, 由非零同态的连续性 8.9 与 a 是 Hermite 元知

$$\begin{aligned} |\langle \varphi, a + ite_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|^2 &\leq \|a + ite_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}}^2 \\ &= \|(a + ite_{\mathcal{A}})^*(a + ite_{\mathcal{A}})\|_{\mathcal{A}} \\ &= \|(a^* - ite_{\mathcal{A}}^*)(a + ite_{\mathcal{A}})\|_{\mathcal{A}} \\ &= \|(a - ite_{\mathcal{A}})(a + ite_{\mathcal{A}})\|_{\mathcal{A}} \\ &= \|a^2 + t^2 e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} \leq \|a^2\|_{\mathcal{A}} + t^2, \end{aligned}$$

而对上左式另有

$$\begin{aligned} |\langle \varphi, a + ite_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|^2 &= |\langle \varphi, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} + it\langle \varphi, e_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}}|^2 \\ &= |\langle \varphi, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} + it|^2 \\ &= |\alpha + i(\beta + t)|^2 \\ &= \alpha^2 + (\beta + t)^2. \end{aligned}$$

因此

$$\alpha^2 + \beta^2 + 2\beta t \leq \|a\|_{\mathcal{A}}^2.$$

若 $\beta \neq 0$, 则取 $t = \lambda\beta$, 令 $\lambda \rightarrow \infty$ 即得矛盾, 故只能有 $\beta = 0$, 从而 $\langle \varphi, a \rangle_{\mathcal{A}^* \times \mathcal{A}} \in \mathbb{R}$. □

定理 8.18 (Stone-Weierstrass)

设 $\mathcal{A}$ 是 $C(M)$ 的闭子代数, 其中 M 是紧空间, 且满足

- (i) $\mathcal{A}$ 含幺, 即 $1_M \in \mathcal{A}$;
 - (ii) $\mathcal{A}$ 对复共轭运算封闭, 即 $f \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{f} \in \mathcal{A}$;
 - (iii) $\mathcal{A}$ 能分离 M 中的点, 即若 $x, y \in M, x \neq y$, 就必存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq f(y)$;
- 那么就有 $\mathcal{A} = C(M)$. ♥

注 8.33 上手证明 Gelfand-Naimark 定理 8.16 的时候就会发现最难的那部分其实就是证 Γ 是满射. Arens 引理完全解决了 (i), 另外可以说明交换 C^* 代数自动成为半单含幺代数, 且 $\|a\|_{\mathcal{A}}^2 = \|a^2\|_{\mathcal{A}}$, 于是 (ii) 通过定理 8.10 就能实现. 这里之所以会想到用 Stone-Weierstrass 定理, 我猜可能是从 $\Gamma(\mathcal{A})$ 包含生成代数这点出发的. 前述平方模等式与习题 8.20 表明 $\Gamma(\mathcal{A})$ 已经是 $C(\mathfrak{M})$ 的闭子集了, 所以要想 $\Gamma(\mathcal{A}) = C(\mathfrak{M})$, 一个很公式的方法就是证 $\Gamma(\mathcal{A})$ 在 $C(\mathfrak{M})$ 中稠密. 显见每个 $a \in \mathcal{A}$ 都能对应 $C(\mathfrak{M})$ 中的一个元素 $\hat{a}(\cdot)$, 而 Γ 作为同态保持了乘法, 所以对任意多项式 $P(a) \in \mathcal{A}$ 而言均有 $\Gamma(P(a))(J) = P(\Gamma(\cdot))(J)$, 这某种意义上暗示了 $\Gamma(\mathcal{A})$ 能包含某个多项式构成的空间, 思路便回到了经典的 Weierstrass 定理.

注 8.34 算子代数版本的 Stone-Weierstrass 定理 8.18 的提法显然和数学分析的 Weierstrass 定理不一样, 但它的三个条件都有 Weierstrass 定理和前述解释的影子. 注意这个定理本身的使命是解决 $\Gamma(\mathcal{A})$ 在 $C(\mathfrak{M})$ 中的稠密性, 而前面已经推出了 $\Gamma(\mathcal{A})$ 包含全体形如 $P(\Gamma(a))(\cdot)$ 的函数. 如果形式上把 $\mathfrak{M}$ 看成 $\mathbb{C}$, $P(\Gamma(a))(\cdot)$ 就可以非常自然地成为输入复数的多项式了, 特别它是由单项式 $f(z) = z$ 生成的. 但对于一般的 $\mathfrak{M}$ 而言我们没法把 $f(J) = J$ 这种东西看成 $C(\mathfrak{M})$ 的元素, 进而直接套用 Weierstrass 定理就不是很现实, 分离性 (iii) 正是这个思路的替代提法: 虽说 $f(J) = J$ 不是一个合法元素, 但总可以说对每个 J 而言有元素能在 $C(\mathfrak{M})$ 中扮演 J (即不存在其它的 J' 使得 $f(J) = f(J')$). (i) 我理解成是源自 $\Gamma(\mathcal{A})$ 包含一元多项式 (进而包含常值函数 $1_{\mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}}$), (ii) 我理解成是源自 C^* 代数对 Γ 的责任: Γ^{-1} 希望区分共轭元, 所以从共轭元都是合法输入这一点看, $\Gamma(\mathcal{A})$ 最好对共轭运算封闭.

证明 首先解释一下总的思路. 因为条件 (ii) 本身只是为了让 $\mathcal{A}$ 与 $C(M)$ 特有的共轭运算结构适配, 所以完全可以先搁置 (ii), 把实值情况证完之后用 (对 (ii) 负责的) 共轭运算的性质推到复值情况上. 对于实值情形, 因为已经知道 $\mathcal{A}$ 是闭的了, 所以定理想要的还是说明 $\mathcal{A}$ 在 $C(M)$ 中稠. 现在对于给定的 $h \in C(M)$, 最简单的逼近 h 的方法就是分段线性连接, 即取定 $x \neq y \in M$, 尝试在 $\mathbb{C}$ 中线性连接 $h(x), h(y)$. 但是现在并不知道 h 在不在 $\mathcal{A}$ 内, 因此我们没法直接用 $th(x) + (1-t)h(y)$ 这种方法进行连接. $\mathcal{A}$ 唯一能和 $x \neq y$ 扯上联系的方式就

是分离性,于是我们可以说存在 $g_{xy} \in \mathcal{A}$ 使得 $0 = g_{xy}(x) \neq g_{xy}(y)$. 对于候选的线性连接函数 f_{xy} , 现在希望 $f_{xy}(x) = h(x), f_{xy}(y) = h(y)$, 如果用 $g(z)$ 替代参数 t , f_{xy} 就可以写成

$$f_{xy}(z) = h(x) + \frac{h(y) - h(x)}{g_{xy}(y)} g_{xy}(z).$$

现在只要 x, y 间隔足够小, f_{xy} 就有希望在小邻域 $U_{xy} \subset M$ 内逼近 h . 但因为示性函数 $\mathbf{1}_{U_{xy}}$ 本身不在 $C(M)$ 内, 故从小邻域 U_{xy} 的结果过渡到全空间 M 上需要另选分段方法. 因为本身 $f_{xy}(y) - h(y) = 0$, 故对取定的 ε 而言, 对每个 y 均存在小邻域 U_y 使得在小邻域内有

$$-\varepsilon < f_{xy}(z) - h(z) < \varepsilon,$$

于是根据 M 的紧性, 可以造 $\max$ 函数 f_x 使得 $f_x(z) - h(z) > -\varepsilon$, 通过同样的方法可以再造 $\min$ 函数 f 使得 $f(z) - h(z) < \varepsilon$, 因此只要 $\mathcal{A}$ 对 $\max, \min$ 运算封闭, 稠密性就能成立. 又因为本质上 $\max, \min$ 运算是加法和绝对值的复合, 所以只需要证 $\mathcal{A}$ 对 $|\cdot|$ 封闭即可. 下面的证明无非就是把这个过程反着说一遍.

现在开始正式证明. 先证实值函数的情形. 设 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 为 $C(M)$ 的实值子代数, $\mathcal{B}$ 是 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 的闭子代数, 且 $\mathcal{B}$ 满足条件 (i), (iii), 下面证明 $\mathcal{B} = C(M)_{\mathbb{R}}$.

首先说明 $f \in \mathcal{B} \Rightarrow |f| \in \mathcal{B}$. 根据 Weierstrass 定理, 设 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间, 则存在多项式列 $\{P_n(t)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \forall t \in [a, b] (|P_n(t) - |t|| < \varepsilon).$$

现取

$$a := -\|f\|_{C(M)}, \quad b := \|f\|_{C(M)},$$

则对 $\forall x \in M$ 有 $f(x) \in [-\|f\|_{C(M)}, \|f\|_{C(M)}]$, 因此当 $n > N$ 时对 $\forall x \in M$ 有

$$|P_n(f(x)) - |f(x)|| < \varepsilon,$$

这说明 $\{P_n(f)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $C(M)$ 意义下收敛到 $|f|$. 因为 $f \in \mathcal{B}$, 由 $\mathcal{B}$ 作为代数对代数运算封闭知 $P_n(f) \in \mathcal{B} (\forall n \in \mathbb{N})$, 进而由 $\mathcal{B}$ 的闭性知 $|f| \in \mathcal{B}$.

根据前述断言, 对 $\forall f, g \in \mathcal{B}$ 有

$$\begin{aligned} \max\{f, g\} &= \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \in \mathcal{B}, \\ \min\{f, g\} &= \frac{1}{2}(f + g - |f - g|) \in \mathcal{B}. \end{aligned}$$

注意到对 $\forall x, y \in M$, 只要 $x \neq y$, 就必存在 $g \in \mathcal{B}$ 使得 $0 = g(x) \neq g(y)$. 这是因为由 $\mathcal{B}$ 满足条件 (iii) 知必存在 $\tilde{g} \in \mathcal{B}$ 使得 $\tilde{g}(x) \neq \tilde{g}(y)$. 对 $\forall z \in M$ 取

$$g(z) := \tilde{g}(z) - \tilde{g}(x)$$

即可. 现在任取 $h \in C(M)_{\mathbb{R}}$, 令

$$\alpha := h(x), \quad \beta := \frac{h(y) - h(x)}{g(y)},$$

对 $\forall z \in M$ 令

$$f_{xy}(z) := \alpha + \beta g(z),$$

则 $f_{xy}(x) = h(x), f_{xy}(y) = h(y)$, 且 $f_{xy} \in \mathcal{B}$. 另若 $x = y$, 则对 $\forall z \in M$ 令

$$f_{xy}(z) := h(x).$$

现在利用 f_{xy} 产生逼近 h 的实值连续函数族. 因为 $f_{xy}(y) - h(y) = 0$, 且 $f_{xy}(z) - h(z)$ 关于 z 连续, 故

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists N(y) \ni y \forall u \in N(y) (f_{xy}(u) > h(u) - \varepsilon),$$

其中 $N(y)$ 是 y 的某开邻域. 显见 $\{N(y)\}_{y \in M}$ 是 M 的开覆盖, 因为 M 是紧集, 故存在 $\{y_1, \dots, y_n\} \subset M$ 使得

$$M = \bigcup_{i=1}^n N(y_i).$$

令

$$f_x := \max_{1 \leq i \leq n} f_{xy_i}$$

则 $f_x \in \mathcal{B}$ 满足 $f_x(x) = h(x)$, $f_x(u) > h(u) - \varepsilon (\forall u \in M)$. 又因为 $f_x(x) - h(x) = 0$, $f_x(z) - h(z)$ 关于 z 连续, 故存在 x 的邻域 $V(x)$ 使得 $\forall u \in V(x) (f_x(u) < h(u) + \varepsilon)$. 同理利用 M 的紧性可得 $\{x_1, \dots, x_m\} \subset M$ 使得 $M = \bigcup_{i=1}^m V(x_i)$. 令

$$f := \min_{1 \leq i \leq m} f_{x_i},$$

则 $f \in \mathcal{B}$, 且

$$h(u) - \varepsilon < f(u) < h(u) + \varepsilon, \quad \forall u \in M.$$

由此可知对 $\forall h \in C(M)_{\mathbb{R}}$ 与 $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$ 而言, 均存在 $f \in \mathcal{B}$ 使得

$$\|f - h\|_{C(M)} < \varepsilon.$$

因此 $\mathcal{B}$ 在 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 中稠密. 又因为 $\mathcal{B}$ 是闭的, 故 $\mathcal{B} = C(M)_{\mathbb{R}}$.

回到原定理. 现取 $\mathcal{B} := \mathcal{A} \cap C(M)_{\mathbb{R}}$, 则 $\mathcal{B}$ 为 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 的闭子代数¹³. 因为 $\mathcal{A}$ 能分离 M 中的点, 故存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq f(y)$. 令

$$g := \frac{1}{2}(f + \bar{f}), \quad h := \frac{i}{2}(f - \bar{f}),$$

由条件 (ii) 知 $g, h \in \mathcal{A}$. 又因为 g, h 是实值函数, 故 $g, h \in \mathcal{B}$. 现在因为

$$f = g - ih, \quad (8.32)$$

故由 $f(x) \neq f(y)$ 知 $g(x) \neq g(y), h(x) \neq h(y)$, 因此 $\mathcal{B}$ 能分离 M 中的点. 前面已经说明了 $\mathcal{B} = C(M)_{\mathbb{R}}$, 又由 (8.32) 知 $\mathcal{A} = \mathcal{B} - i\mathcal{B}$, 故

$$\mathcal{A} = C(M)_{\mathbb{R}} - iC(M)_{\mathbb{R}} = C(M),$$

此即欲证. □

注 8.35 注意到前述 Stone-Weierstrass 定理 8.18 并没有设 M 是 Hausdorff 空间. 事实上条件 (iii) 保证了 M 是 Hausdorff 空间. 这是因为任取 $x, y \in M, x \neq y$, 根据条件 (iii) 知存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq f(y)$, 利用背景数域 $\mathbb{K}$ 的 Hausdorff 性知存在开集 $U, V \subset \mathbb{K}$ 使得 $f(x) \in U, f(y) \in V, U \cap V = \emptyset$. 又因为 $f \in \mathcal{A} \subset C(M)$, 故连续性表明 $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ 是 M 中的开集, 又由 $U \cap V = \emptyset$ 知

$$f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = \emptyset.$$

而 $x \in f^{-1}(U), y \in f^{-1}(V)$, 故 M 是 Hausdorff 空间.

现在利用 Arens 引理 8.12 与 Stone-Weierstrass 定理 8.18 就可以证明 Gelfand-Naimark 定理 8.17 了:

证明 (i) 由 Hermite 元的基本性质 8.10(ii) 知任意 $a \in \mathcal{A}$ 均有唯一分解 $a = u + iv$, 其中 u, v 为 Hermite 元. 显见 $a^* = u - iv$, 由 Arens 引理 8.12 知

$$\Gamma a^* = \Gamma u - i\Gamma v = \overline{\Gamma u + i\Gamma v} = \overline{\Gamma a},$$

此即 (i).

(ii) 因为 $\mathcal{A}$ 交换, 故

$$\begin{aligned} \|a^2\|_{\mathcal{A}}^2 &\stackrel{(A)}{=} \|(a^2)^* a^2\|_{\mathcal{A}} \stackrel{(B)}{=} \|(a^*)^2 a^2\|_{\mathcal{A}} \\ &\stackrel{(C)}{=} \|(a^* a)(a^* a)\|_{\mathcal{A}} \stackrel{(D)}{=} \|a^* a\|_{\mathcal{A}}^2 = \|a\|_{\mathcal{A}}^4 \end{aligned}$$

其中 (A) 是 C^* 代数的定义; (B) 是定义 8.11(iii); (C) 是因为 $\mathcal{A}$ 交换; (D) 是因为 $a^* a$ 是 Hermite 元. 因此 $\|a^2\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}}^2$, 由 Γ 成为等距单射的等价条件 8.10 知 Γ 是等距单射, 此即 (ii).

¹³ $\mathcal{A}$ 已经是 $C(M)$ 的闭子代数了. 针对 $C(M)_{\mathbb{R}}$, 注意 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 是连续线性算子 $\text{Im} : C(M) \rightarrow C(M), f \mapsto \text{Im } f$ 的核, 于是 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 首先是 $C(M)$ 中的闭集. 又显见 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 是代数, 因此 $C(M)_{\mathbb{R}}$ 是 $C(M)$ 的闭子代数, 从而 $\mathcal{B} = \mathcal{A} \cap C(M)_{\mathbb{R}}$ 作为闭子代数之交为闭子代数, 进而在子空间拓扑下同样为闭子代数.

(iii) 考虑使用 Stone-Weierstrass 定理 8.18, 为此需要说明 $\Gamma(\mathcal{A})$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的闭子代数, $\Gamma\mathcal{A}$ 含幺, 对共轭封闭, 且可分离 $\mathfrak{M}$ 中的点. 首先说明 $\Gamma\mathcal{A}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的一个闭子代数. 设 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}, b \in C(\mathfrak{M})$ 满足 $\Gamma a_n \rightarrow b (n \rightarrow \infty)$. 因为 $m, n \rightarrow \infty$ 时

$$\|\Gamma a_n - \Gamma a_m\|_{C(\mathfrak{M})} \rightarrow 0,$$

故由 (ii) 知 $\|a_n - a_m\|_{\mathcal{A}} \rightarrow 0$, 由 $\mathcal{A}$ 完备知存在 $a \in \mathcal{A}$ 满足 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$. 因为 Γ 连续, 故 $\Gamma a_n \rightarrow \Gamma a (n \rightarrow \infty)$, 因此 $b = \Gamma a \in \Gamma\mathcal{A}$, 从而 $\Gamma\mathcal{A}$ 闭. 由 Γ 是同态知 $\Gamma\mathcal{A}$ 对代数运算封闭, 因此 $\Gamma\mathcal{A}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 的闭子代数.

下证 $\Gamma\mathcal{A}$ 含幺. 设 $e_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的单位元, 则由非零同态的连续性 8.9(i) 知对 $\forall J \in \mathfrak{M}$ 有

$$1 = \varphi_J(e_{\mathcal{A}}) = \widehat{e_{\mathcal{A}}}(J) = \Gamma(e_{\mathcal{A}})(J).$$

因此 $1 = \Gamma(e_{\mathcal{A}}) \in \Gamma\mathcal{A}$.

再证 $\Gamma\mathcal{A}$ 对共轭封闭. 由 (i) 知

$$\overline{\Gamma(a)} = \widehat{\bar{a}} = \widehat{a^*} = \Gamma(a^*) \in \Gamma\mathcal{A}.$$

最后说明 $\Gamma\mathcal{A}$ 能够分离 $\mathfrak{M}$ 中的点. 设

$$J_1, J_2 \in \mathfrak{M}, J_1 \neq J_2,$$

则可取 $a \in J_1 \setminus J_2$, 由极大理想的刻画 8.4 知

$$\widehat{a}(J_1) = \varphi_{J_1}(a) = 0, \widehat{a}(J_2) = \varphi_{J_2}(a) \neq 0.$$

因此 $\Gamma\mathcal{A}$ 能分离 $\mathfrak{M}$ 中的点 J_1, J_2 . 现在利用 Stone-Weierstrass 定理 8.18 即知 $C(\mathfrak{M}) = \Gamma\mathcal{A}$, 从而 Γ 是满射. $\square$

这里我们需要特别再提一下 Stone-Weierstrass 定理 8.18, 它实际上就是经典的 Weierstrass 多项式逼近定理的推广. 这是因为如果取 $P(M)$ 是多项式代数, 则 $P(M)$ 已经满足条件 (i)-(iii), 取 $\mathcal{A} = \overline{P(M)}$ 立得 Weierstrass 多项式逼近定理. Stone-Weierstrass 定理 8.18 在研究一般紧 Hausdorff 空间上的连续函数时有重要作用. 需要注意 Stone-Weierstrass 定理中 M 是紧空间这一条件是本质的 (否则取 $M = (-\pi, \pi), \mathcal{A} = \overline{P(-\pi, \pi)}$, 由 $\tan(\cdot) \notin \mathcal{A}$ 即得反例). 对于非紧的 M , Stone-Weierstrass 定理还能作下述推广:

设 X 是局部紧空间¹⁴, 记 $C_{\infty}(X)$ 为 X 上的衰减实值连续函数全体¹⁵, 即:

$$C_{\infty}(X) := \{f \in C(X) : f(X) \subset \mathbb{R}, \forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists \text{紧集 } D_{\varepsilon} \subset X \forall x \notin D_{\varepsilon} (|f(x)| < \varepsilon)\},$$

则有:

定理 8.19 (局部紧空间上的 Stone-Weierstrass 定理)

设 X 是局部紧空间, $\mathcal{A}$ 是 $C_{\infty}(X)$ 的闭子代数. 若 $\mathcal{A}$ 分离 X 中的点, 且对每个 $x \in X$ 均存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq 0$, 那么 $\mathcal{A} = C_{\infty}(X)$.



注 8.36 定理 8.19 中 $\mathcal{A}$ 的分离性保证了 X 是 Hausdorff 空间, 证明与 Stone-Weierstrass 定理 8.18 的相关注记完全类似.

为证明定理 8.19, 我们需要引入下述定义:

定义 8.15 (紧化 (compactification), 单点紧化 ((Alexandroff) one-point compactification))

拓扑空间 X 作为稠密子集到紧空间 Y 的嵌入称为 X 的一个紧化, Y 称为 X 的一个紧化空间. 非紧的 Hausdorff 空间 (X, τ) 的单点紧化空间定义为 $Y := X \cup \{\partial\}$, 其上拓扑定义为

$$\tau_Y := \tau \cup \{(X \setminus K) \cup \{\partial\} : K \subset X \text{ 是紧集}\}.$$



注 8.37

¹⁴称 $A \subset X$ 为 $x \in X$ (或 $E \subset X$) 的紧邻域, 如果 A 是 X 中的紧集, 且 $x \in A^{\circ}$ (或 $E \subset A^{\circ}$). 如果 X 中的每个点都存在紧邻域, 就称 X 局部紧.

¹⁵注意因为 X 没有赋度量结构, 所以我们没法用 $d(0_X, \cdot) \rightarrow \infty$ 这种表述描述无穷远处. 这里的表述其实就是 X 上无度量时无穷远处的替代表述, 它是赋范情形下 $\forall x \text{ s.t. } \|x\|_X > M$ 这句话的自然推广.

- 单点紧化空间中新添的点 ∂ 意指 $\overline{X}$ 外的某点, 可能甚至与 X 都不在同一个全集中, 比如 X 作为 $\mathbb{R}$ 时把 ∂ 选成实轴的无穷远点 ∞ . 大多数情况下 ∂ 其实都是意指无穷远点. 特别对于 $X = [0, \infty)$ 的情形, $[0, \infty)$ 到 $[0, \infty) \cup \{\infty\}$ 的单点紧化过程其实就是实分析提的广义实数系构造过程, 单点紧化拓扑在这种情况下对应的就是广义实数系的标准拓扑. 非紧 Hausdorff 空间通过单点紧化成为紧空间这件事我觉得也可以通过 $[0, \infty)$ 作为非紧空间通过添加 $\{\infty\}$ 成为紧空间 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 这个过程从直觉上进行理解.
- 非紧的 Hausdorff 空间 (X, τ) 的单点紧化空间 (Y, τ_Y) 上的拓扑是良定义的 (亦即 τ_Y 确为拓扑). 这只需要说明集族 τ_Y 对任意并封闭, 亦即对 X 中的任意紧集族 $\{K_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 而言, 并集

$$\bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus K_\alpha) \cup \{\partial\}$$

均为 τ_Y 下的开集. 因为 X 是 Hausdorff 空间, 故 $\{K_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 首先是 X 中的闭集族, 于是 $\bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha$ 是 X 中的闭集. 现在任意取定 $\{K_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 中的某元素 K , 记 τ_K 是 τ 在 K 上诱导的子空间拓扑, 则 (K, τ_K) 成为紧 Hausdorff 空间, 于是由 $\bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha \subset K$ 是闭集与定理 1.14 知 $\bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha$ 是 (K, τ_K) 中的紧集, 进而根据定义可知 $\bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha$ 是 (X, τ) 中的紧集. 现在

$$\bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus K_\alpha) \cup \{\partial\} = X \setminus \left(\bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha \right) \cup \{\partial\} \in \tau_Y,$$

此即待证结果. 注意如果 X 不是 Hausdorff 空间, 则 τ_Y 未必是拓扑.

命题 8.13 (单点紧化空间的紧性)

设 (X, τ) 是非紧的 Hausdorff 空间, 则其单点紧化空间 (Y, τ_Y) 是紧空间, 且 (X, τ) 是 (Y, τ_Y) 的稠密子空间. 若 (X, τ) 是局部紧但非紧的 Hausdorff 空间, 则 (Y, τ_Y) 是紧 Hausdorff 空间.

证明 对于非紧的 Hausdorff 空间 (X, τ) , 首先说明 (Y, τ_Y) 是紧空间. 设 $\mathcal{U} := \{U_\alpha : \alpha \in J\}$ 是 (Y, τ_Y) 的一族开覆盖, 因为 $\{\partial\}$ 是 $\overline{X}$ 外的一点, 故必存在

$$U_{\alpha_0} := (X \setminus K) \cup \{\partial\} \in \mathcal{U},$$

其中 K 是 X 的紧子集, 且 $\mathcal{U} \setminus \{U_{\alpha_0}\}$ 覆盖 K . 因为 K 是 X 中的紧集, 故能在 $\mathcal{U} \setminus U_{\alpha_0}$ 中找到 K 的有限子覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^n$, 现取 $\{U_{\alpha_0}\} \cup \{U_i\}_{i=1}^n$ 即得 (Y, τ_Y) 的有限子覆盖, 故 (Y, τ_Y) 是紧空间.

接下来说明 (X, τ) 在 (Y, τ_Y) 中的稠密性, 根据 Y 的构造只需说明 ∂ 是 X 的聚点即可. 注意到 ∂ 的任意开邻域都是形如 $(X \setminus K) \cup \{\partial\}$ 的开集, 其中 K 是 X 中的紧集. 由 X 非紧知 $X \setminus K$ 必定非空, 因此 $X \setminus K$ 包含 X 中的点, 故 ∂ 是 X 的聚点, 从而 (X, τ) 是 (Y, τ_Y) 的稠密子空间.

下设 (X, τ) 是局部紧但非紧的 Hausdorff 空间, 往证 (Y, τ_Y) 是紧 Hausdorff 空间. 由前述结论知只需说明 τ_Y 的 Hausdorff 性即可. 因为 X 本身是 Hausdorff 空间, 故只需说明任意 $x \in X$ 都与 ∂ 有不相交的开邻域即可. 现因 X 是局部紧的, 故对任取的 $x \in X$, X 中都存在其紧邻域 K , 再取 ∂ 的开邻域 $(X \setminus K) \cup \{\partial\}$ 即知

$$K^\circ \cap [(X \setminus K) \cup \{\partial\}] \subset K^\circ \cap [(X \setminus K) \cup \{\partial\}] = \emptyset,$$

因此 K° 与 $(X \setminus K) \cup \{\partial\}$ 分别是包含 x 的 ∂ 的不交开邻域. □

下面证明局部紧空间上的 Stone-Weierstrass 定理 8.19:

证明 回忆 $\mathcal{A}$ 是 $C_\infty(X)$ 的闭子代数, 设 $Y = X \cup \{\partial\}$ 是 X 的单点紧化空间, 我们的主要思路是对紧化空间 Y 用 Stone-Weierstrass 定理. 现在先说明对 $\forall f \in C_\infty(X)$ 而言, 只要 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ 满足 $x_n \rightarrow \partial$ 在 τ_Y 的意义下成立, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0. \quad (8.33)$$

事实上, 由 $f \in C_\infty(X)$ 知

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists \text{ 紧集 } D_\varepsilon \subset X \forall x \in X \setminus D_\varepsilon (|f(x)| < \varepsilon).$$

又因为 x_n 在 τ_Y 意义下收敛到 ∂ , 故

$$\exists (X \setminus D_\varepsilon) \cup \{\partial\} \ni \partial \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n > N_\varepsilon (x_n \in (X \setminus D_\varepsilon) \cup \{\partial\}).$$

这说明对 $\forall n > N_\varepsilon$ 均有 $|f(x_n)| < \varepsilon$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

此即(8.33)式.

现在根据(8.33)式知可以定义 $f(\partial) := 0$. 另定义

$$\widetilde{\mathcal{A}} := \{f + r : f \in \mathcal{A}, r \in \mathbb{R}\}.$$

接下来我们说明 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 在 Y 上满足 Stone-Weierstrass 定理的条件. 回忆 $C_\infty(X)$ 本身就是由实值函数构成的, 因此

$$f \in C(Y)_\mathbb{R}. \quad (8.34)$$

因此 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是 $C(Y)_\mathbb{R}$ 的实值子代数.

下面说明 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 在 $C(Y)_\mathbb{R}$ 中闭. 设 $\{\tilde{f}_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \widetilde{\mathcal{A}}$ 在 $\|\cdot\|_{C(Y)_\mathbb{R}}$ 的意义下收敛到 f_0 , 往证 $f_0 \in \widetilde{\mathcal{A}}$. 因为 $\|\cdot\|_{C(Y)_\mathbb{R}} = \|\cdot\|_{C(Y)}$, 而 $(C(Y), \|\cdot\|_{C(Y)})$ 完备, 故 $f_0 \in C(Y)$. 现记

$$\tilde{f}_n = f_n + r_n$$

其中 $f_n \in \mathcal{A}, r_n \in \mathbb{R}$. 因为

$$\max_{x \in Y} |\tilde{f}_n(x) - f_0(x)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

故

$$|\tilde{f}_n(\partial) - f_0(\partial)| \leq \max_{x \in Y} |\tilde{f}_n(x) - f_0(x)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

又因为对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 而言均有 $f_n(\partial) = 0$, 故

$$|r_n - f_0(\partial)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

因此 $f_0(\partial) \in \mathbb{R}$. 接下来说明 f_n 收敛到 $\mathcal{A}$ 中的元素. 对 $\forall x \in X$, 记

$$g(x) := f_0(x) - f_0(\partial),$$

由 $f_0 \in C(Y)$ 知

$$\lim_{x \rightarrow \partial} g(x) = 0.$$

这说明

$$\forall \varepsilon \in (0, \infty) \exists \text{ 紧集 } D_\varepsilon \subset X \forall x \in X \setminus D_\varepsilon (|g(x)| < \varepsilon).$$

因此 $g \in C_\infty(X)$. 下面说明 $g \in \mathcal{A}$, 注意到

$$\begin{aligned} \|f_n - g\|_{C(X)} &\leq \|f_n - g\|_{C(Y)} \\ &\leq \|f_n + r_n - g - f_0(\partial)\|_{C(Y)} + |r_n - f_0(\partial)| \\ &= \|\tilde{f}_n - f_0\|_{C(Y)} + |r_n - f_0(\partial)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

于是 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ 在 $C(X)$ 的意义下收敛到 g , 由 $\mathcal{A}$ 的闭性知 $g \in \mathcal{A}$, 因此 $f_0 = g + f_0(\partial) \in \widetilde{\mathcal{A}}$, 故 $\mathcal{A}$ 在 $C(Y)_\mathbb{R}$ 中闭.

现在验证 Stone-Weierstrass 定理 8.18 的条件. 因为 $0 \in \mathcal{A}$, 故取 $f = 0, r = 1$ 知 $1 \in \mathcal{A}$. 下面说明 $\mathcal{A}$ 分离 Y 中的点. 任取 $x, y \in Y$ 满足 $x \neq y$, 若 $x, y \in X$, 则由 $\mathcal{A}$ 分离 X 知存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq f(y)$, 令 $f(\partial) = 0$ 可知 $f \in \mathcal{A}$ 即为欲求. 若 $x \in X, y = \partial$, 则由 $\mathcal{A}$ 的条件知总存在 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq 0$, 但我们总可以令 $f(\partial) = 0$, 这样得到的 f 即为欲求, 故 $\mathcal{A}$ 分离 Y .

根据 Stone-Weierstrass 定理 8.18, 现在可得 $\widetilde{\mathcal{A}} = C(Y)_\mathbb{R}$. 类似于 $g \in C_\infty(X)$ 的证明, 可以说明对 $\forall \tilde{f} \in C(Y)_\mathbb{R}$ 均有

$$f := \tilde{f} - \tilde{f}(\partial) \in C_\infty(X).$$

因此

$$C(Y)_\mathbb{R} \subset \{f + r : f \in C_\infty(X), r \in \mathbb{R}\}.$$

由(8.34)式知 $C_\infty(X) \subset C(Y)_\mathbb{R}$, 故

$$\{f + r : f \in C_\infty(X), r \in \mathbb{R}\} \subset C(Y)_\mathbb{R}.$$

故

$$C(Y)_\mathbb{R} = \{f + r : f \in C_\infty(X), r \in \mathbb{R}\}.$$

最后说明 $\mathcal{A} = C_\infty(X)$. 条件已经给出 $\mathcal{A} \subset C_\infty(X)$, 下面说明 $C_\infty(X) \subset \mathcal{A}$. 任取 $f \in C_\infty(X)$, 因为

$$\begin{aligned} \{g + r : g \in \mathcal{A}, r \in \mathbb{R}\} &= \widetilde{\mathcal{A}} = C(Y)_\mathbb{R} \\ &= \{g + r : g \in C_\infty(X), r \in \mathbb{R}\}, \end{aligned}$$

而 $0 \in \mathbb{R}$, 故在上右式中取 $r = 0, g = f$ 可知 $f \in \{g + r : g \in \mathcal{A}, r \in \mathbb{R}\}$, 亦即存在 $g \in \mathcal{A}, r \in \mathbb{R}$ 使得 $f = g + r$. 现在 $r = f - g \in C_\infty(X)$, 根据 $C_\infty(X)$ 的定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \text{紧集 } D_\varepsilon \subset X \forall x \notin D_\varepsilon (|r| = |f(x) - g(x)| < \varepsilon).$$

由 ε 的任意性知只能有 $r = 0$, 因此 $f = g \in \mathcal{A}$, 这说明 $C_\infty(X) \subset \mathcal{A}$, 从而 $C_\infty(X) = \mathcal{A}$. □

注 8.38 由局部紧空间的 Stone-Weierstrass 定理 8.19 的证明知:

$$f \in C_\infty(X) \Leftrightarrow f \in C(Y)_\mathbb{R} \wedge f(\partial) = 0.$$

其中 $\Rightarrow$ 是因为总可以令 $f(\partial) := 0$, 由(8.34)式即得结论. 对于 $\Leftarrow$, 根据连续性知

$$\lim_{x \rightarrow \partial} f(x) = f(\partial) = 0.$$

故

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \text{紧集 } D_\varepsilon \subset X \forall x \notin D_\varepsilon (|f(x)| = |f(x) - f(\partial)| < \varepsilon)$$

因此 $f \in C_\infty(X)$. □

[19]2.4 习题

练习 8.27

设所有记号同定理 8.19 的证明, 证明 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为 $C(Y)$ 的实值子代数.

证明 针对加法, 任取 $f + r_f, g + r_g \in \widetilde{\mathcal{A}}$, 知 $f, g \in \mathcal{A}, r_f, r_g \in \mathbb{R}$, 于是 $f + g \in \mathcal{A}, r_f + r_g \in \mathbb{R}$, 故

$$(f + r_f) + (g + r_g) = (f + g) + (r_f + r_g) \in \widetilde{\mathcal{A}}.$$

针对数乘, 任取 $f + r_f \in \widetilde{\mathcal{A}}, \lambda \in \mathbb{R}$, 知 $\lambda f \in \mathcal{A}, \lambda r_f \in \mathbb{R}$, 故

$$\lambda(f + r_f) = \lambda f + \lambda r_f \in \widetilde{\mathcal{A}}.$$

针对乘法, 任取 $f + r_f, g + r_g \in \widetilde{\mathcal{A}}$, 知 $f, g \in \mathcal{A}, r_f, r_g \in \mathbb{R}$, 于是 $fg + r_f r_g \in \mathcal{A}, r_f r_g \in \mathbb{R}$, 故

$$(f + r_f)(g + r_g) = (fg + r_f r_g) + r_f r_g \in \widetilde{\mathcal{A}}.$$

至此 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 成为代数, 又因为 $\mathcal{A}$ 是 $C(Y)$ 的实值子代数, 故 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中的全体元素也均为实值函数. 另显见连续函数与常值之和必连续, 故 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是 $C(Y)$ 的实值子代数. □

练习 8.28

证明含么交换半单 Banach 代数上的任意对合运算均连续.

证明 考虑闭图像定理, 设 $\mathcal{A}$ 是满足条件的代数, $*$ 是 $\mathcal{A}$ 上的对合运算, $e_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 上的单位元, 往证

$$\begin{cases} a_n \rightarrow a(\mathcal{A}) \\ a_n^* \rightarrow b(\mathcal{A}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \in \mathcal{A}, \\ b = a^*. \end{cases}$$

$a \in \mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数立得. 针对 $b = a^*$, 由条件知

$$a_n - a \rightarrow 0_{\mathcal{A}(\mathcal{A})}, a_n^* - b \rightarrow 0_{\mathcal{A}(\mathcal{A})},$$

由习题 8.24 知 $r(a_n - a) \rightarrow 0, r(a_n^* - b) \rightarrow 0$. 由 $\lambda \in \sigma(a) \Leftrightarrow \bar{\lambda} \in \sigma(a^*)$ 知 $r(a_n^* - a^*) = r(a_n - a) \rightarrow 0$, 因此由 $\mathcal{A}$ 交换与习题 8.25 知

$$r(a^* - b) \leq r(a^* - a_n^*) + r(a_n^* - b), \forall n \in \mathbb{N},$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $r(a^* - b) = 0$, 于是 $\|\Gamma(a^* - b)\|_{C(\mathfrak{M})} = r(a^* - b) = 0$, 进而由 $\mathcal{A}$ 半单导出的 Γ 为单射知 $a^* - b = 0_{\mathcal{A}}$, 此即 $b = a^*$. $\square$

练习 8.29

设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$. 若 x 为 $\mathcal{A}$ 的 Hermite 元且 $\sigma(x) \subset [0, \infty)$, 就称 x 是正的, 记为 $x \geq 0$. 证明

(i) $x \geq 0$ 当且仅当存在 Hermite 元 $h \in \mathcal{A}$ 使得 $x = h^2$.

(ii) 若 $\mathcal{A}$ 有单位元 $e_{\mathcal{A}}$, 则 $x \geq 0$ 当且仅当 x 为 Hermite 元且 $\|x\|_{\mathcal{A}e_{\mathcal{A}}} - x\|_{\mathcal{A}} \leq \|x\|_{\mathcal{A}}$.

证明 (i) $\Leftarrow$: 若 $x = h^2$, h 为 Hermite 元, 则显见 x 为 Hermite 元且 $R(\Gamma h) \subset \mathbb{R}$, 于是

$$\sigma(x) = R(\Gamma x) = R(\Gamma(h^2)) = R((\Gamma h)^2) \subset [0, \infty).$$

$\Rightarrow$: 若 $x \geq 0$, 则

$$R(\Gamma x) = \sigma(x) \subset [0, \infty),$$

这说明

$$\forall J \in \mathfrak{M}(\Gamma(x)(J) \geq 0) \Rightarrow \forall J \in \mathfrak{M}((\Gamma(x)(J))^{\frac{1}{2}} \geq 0).$$

既然 $\mathcal{A}$ 是交换 C^* 代数, 故 Γ 是满射, 从而对于 $(\Gamma(x))^{\frac{1}{2}} \in C(\mathfrak{M})$ 而言, 存在 $h \in \mathcal{A}$ 使得 $\Gamma(h) = (\Gamma(x))^{\frac{1}{2}}$ 点态成立, 此即

$$\forall J \in \mathfrak{M}((\Gamma(h)(J))^2 = \Gamma(h^2)(J) = \Gamma(x)(J)) \Rightarrow \forall J \in \mathfrak{M}(\Gamma(x - h^2)(J) = 0) \Rightarrow x = h^2.$$

再证 h 是 Hermite 元, 由 $\Gamma(h)(J) = (\Gamma(x)(J))^{\frac{1}{2}} \in \mathbb{R}(\forall J \in \mathfrak{M})$ 知

$$\forall J \in \mathfrak{M}(\Gamma(h^*)(J) = \overline{\Gamma(h)(J)} = \Gamma(h)(J)) \Rightarrow \forall J \in \mathfrak{M}(\Gamma(h^* - h)(J) = 0) \Rightarrow h^* = h.$$

前两式的最后一步均源自 Gelfand-Naimark 定理 (ii).

(ii) 知

$$x \geq 0 \Leftrightarrow x = x^* \wedge \sigma(x) \subset [0, \infty)$$

$$\stackrel{(A)}{\Leftrightarrow} x = x^* \wedge (\forall J \in \mathfrak{M}(\Gamma(x)(J) \in [0, \|x\|_{\mathcal{A}}]))$$

$$\Leftrightarrow x = x^* \wedge (\forall J \in \mathfrak{M}(\|x\|_{\mathcal{A}}\Gamma(e_{\mathcal{A}})(J) - \Gamma(x)(J) \in [0, \|x\|_{\mathcal{A}}]))$$

$$\Leftrightarrow x = x^* \wedge \|\|x\|_{\mathcal{A}}\Gamma(e_{\mathcal{A}}) - \Gamma(x)\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|x\|_{\mathcal{A}}$$

$$\stackrel{(B)}{\Leftrightarrow} x = x^* \wedge \|\|x\|_{\mathcal{A}}e_{\mathcal{A}} - x\|_{\mathcal{A}} \leq \|x\|_{\mathcal{A}},$$

其中 (A) 源自 Arens 引理与 $\sigma(x) = R(\Gamma x)$, (B) 源自 Gelfand-Naimark 定理.

练习 8.30

设 H 为 Hilbert 空间, $\mathcal{A}$ 为 $L(X)$ 上的 C^* 代数. 称

$$\mathcal{A}^c := \{T \in L(X) : TA = AT, \forall A \in \mathcal{A}\}$$

为 $\mathcal{A}$ 的中心. 证明 $\mathcal{A}^c$ 是 C^* 代数.

证明 针对加法, 任取 $T_1, T_2 \in \mathcal{A}^c$ 知

$$(T_1 + T_2)A = T_1A + T_2A = AT_1 + AT_2 = A(T_1 + T_2),$$

故 $T_1 + T_2 \in \mathcal{A}^c$.

针对数乘, 任取 $\lambda \in \mathbb{C}, T \in \mathcal{A}^c$ 知

$$(\lambda T)A = \lambda(TA) = \lambda(AT) = A(\lambda T),$$

故 $\lambda T \in \mathcal{A}^c$.

针对乘法, 任取 $T_1, T_2 \in \mathcal{A}^c$ 知

$$(T_1 T_2)A = T_1(T_2 A) = T_1(AT_2) = (T_1 A)T_2 = (AT_1)T_2 = A(T_1 T_2),$$

故 $T_1 T_2 \in \mathcal{A}^c$.

针对对合, 任取 $T \in \mathcal{A}^c$ 知

$$T^* A = T^* A^{**} = (A^* T)^* = (TA^*)^* = A^{**} T^* = AT^*,$$

故 $T^* \in \mathcal{A}^c$.

针对含么, 显见 $IA = AI$, 故 $I = e_{L(X)} \in \mathcal{A}^c$.

针对完备, 设 $\{T_n\} \subset \mathcal{A}^c$ 满足 $T_n \rightarrow T(L(H))$, 则对任意 $x \in H$ 有

$$TAx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(Ax) = \lim_{n \rightarrow \infty} A(T_n x) = A\left(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x\right) = ATx,$$

故 $TA = AT$, 即 $T \in \mathcal{A}^c$. 至此 $\mathcal{A}^c$ 成为 C^* 代数. □

练习 8.31

设 $\mathcal{A}$ 为含么 Banach 代数. 对任意 $x \in \mathcal{A}$, 令 P 为复系数多项式, 证明 $\sigma(P(x)) = P(\sigma(x))$. 💧

证明 设 $e_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的单位元. p 为零阶多项式时结论显然成立, 下设 p 为 n 阶多项式 ($n \in \mathbb{N}$). 现在断言若 $\mu \in \mathbb{C}$, 则 $p(x) - \mu e_{\mathcal{A}} \notin G(\mathcal{A})$ 当且仅当多项式 $p - \mu$ 存在根 λ 使得 $x - \lambda e_{\mathcal{A}} \notin G(\mathcal{A})$. 为此对 $p(x) - \mu e_{\mathcal{A}}$ 因式分解得 $\gamma \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i e_{\mathcal{A}})$, 其中 $\gamma \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\{\lambda_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{C}$ 是多项式 $p - \mu$ 的全体根.

针对 $\Rightarrow$, 若 $p(x) - \mu e_{\mathcal{A}} \notin G(\mathcal{A})$ 的同时对任意 i 均有 $x - \lambda_i e_{\mathcal{A}} \in G(\mathcal{A})$, 则 $\prod_{i=1}^n (x - \lambda_i e_{\mathcal{A}}) \in G(\mathcal{A})$, 进而必有 $p(x) - \mu e_{\mathcal{A}} \in G(\mathcal{A})$, 矛盾!

针对 $\Leftarrow$, 不失一般性设 λ_n 满足 $x - \lambda_n e_{\mathcal{A}} \notin G(\mathcal{A})$, 考虑反证. 若 $p(x) - \mu e_{\mathcal{A}} \in G(\mathcal{A})$, 记其逆元为 b , 由多项式内各项可换知

$$\begin{aligned} e_{\mathcal{A}} &= \left(\gamma \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i e_{\mathcal{A}}) \right) b \\ &= (x - \lambda_n e_{\mathcal{A}}) \left(\gamma \prod_{i=1}^{n-1} (x - \lambda_i e_{\mathcal{A}}) \right) b \\ &= b \left(\gamma \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i e_{\mathcal{A}}) \right) \\ &= b \left(\gamma \prod_{i=1}^{n-1} (x - \lambda_i e_{\mathcal{A}}) \right) (x - \lambda_n e_{\mathcal{A}}), \end{aligned}$$

这说明 $x - \lambda_n e_{\mathcal{A}}$ 同时有左右逆, 故 $x - \lambda_n e_{\mathcal{A}} \in G(\mathcal{A})$, 矛盾! 至此断言得证.

现在由断言与谱的定义知

$$\begin{aligned} \mu \in \sigma(p(x)) &\Leftrightarrow p(x) - \mu e_{\mathcal{A}} \notin G(\mathcal{A}) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{C} (p(\lambda) - \mu = 0 \wedge x - \lambda e_{\mathcal{A}} \notin G(\mathcal{A})) \\ &\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{C} (p(\lambda) = \mu \wedge \lambda \in \sigma(x)) \Leftrightarrow \mu \in p(\sigma(x)). \end{aligned}$$

□

练习 8.32

设 $\mathcal{A}$ 是含么 $e_{\mathcal{A}}$ 的交换 C^* 代数, f 为 $\mathcal{A}$ 上的线性泛函, 且对任意 $x \in \mathcal{A}$ 均有 $f(xx^*) \geq 0$. 证明

(i) 对任意 $x, y \in \mathcal{A}$ 均有 $|f(xy^*)|^2 \leq f(xx^*)f(yy^*)$.

- (ii) 对任意 Hermite 元 $x \in \mathcal{A}$ 均存在 Hermite 元 $y \in \mathcal{A}$ 使得 $\|x\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - x = y^2$.
 (iii) $\|f\|_{\mathcal{A}^*} = f(e_{\mathcal{A}})$.



证明 (i) 若 $|f(xy^*)| = 0$, 则由条件立得结论, 故下设 $|f(xy^*)| \neq 0$. 由条件知对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$0 \leq f((x + \lambda y)(x + \lambda y)^*) = f((x + \lambda y)(x^* + \overline{\lambda}y^*)) = f(xx^*) + |\lambda|^2 f(yy^*) + \lambda f(yx^*) + \overline{\lambda} f(xy^*). \quad (8.35)$$

在上式中分别取 $\lambda = 1, \lambda = i$ 可得 $f(yx^*) + f(xy^*) \in \mathbb{R}, i(f(yx^*) - f(xy^*)) \in \mathbb{R}$, 故

$$0 = \operatorname{Im}(f(yx^*) + f(xy^*)) = \operatorname{Im} f(yx^*) + \operatorname{Im} f(xy^*),$$

$$0 = \operatorname{Im}(i(f(yx^*) - f(xy^*))) = \operatorname{Re} f(yx^*) - \operatorname{Re} f(xy^*).$$

这说明

$$f(yx^*) = \operatorname{Re} f(yx^*) + i \operatorname{Im} f(yx^*) = \operatorname{Re} f(xy^*) - i \operatorname{Im} f(xy^*) = \overline{f(xy^*)}.$$

将上述结果代回 (8.35) 即知对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 均有

$$f(xx^*) + |\lambda|^2 f(yy^*) + \lambda \overline{f(xy^*)} + \overline{\lambda} f(xy^*) \geq 0.$$

在上式中取 $\lambda := t \frac{f(xy^*)}{|f(xy^*)|} (t \in \mathbb{R})$ 得

$$f(xx^*) + 2|f(xy^*)|t + f(yy^*)t^2 \geq 0.$$

因为 $|f(xy^*)| \neq 0$, 故必有 $f(yy^*) \neq 0$, 于是由上左式判别式非正即得 $|f(xy^*)|^2 \leq f(xx^*)f(yy^*)$.

(ii) 由 x 是 Hermite 元知 Γx 是实值函数, 且 $|\Gamma(x)(J)| \leq \|x\|_{\mathcal{A}} (\forall J \in \mathfrak{M})$. 由此与 $\Gamma(e_{\mathcal{A}}) = 1_{C(\mathfrak{M})}$ 知对任意 $J \in \mathfrak{M}$ 均有

$$\Gamma(\|x\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - x)(J) \subset [0, 2\|x\|_{\mathcal{A}}],$$

这说明 $f(J) := \sqrt{\Gamma(\|x\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - x)} \in C(\mathfrak{M})$, 进一步由 Gelfand-Naimark 定理知存在 $y \in \mathcal{A}$ 使得 $\Gamma y = \sqrt{\Gamma(\|x\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - x)}$, 由 Γ 为单射知此即 $y^2 = \|x\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - x$. 另由构造知 Γy 是实值函数, 故 $\Gamma y = \overline{\Gamma y} = \Gamma y^*$, 从而 $y = y^*$, 即 y 为 Hermite 元.

(iii) 先证 $f \in \mathcal{A}^*$ 且 $\|f\|_{\mathcal{A}^*} \leq f(e_{\mathcal{A}})$. 由 (i) 知对任意 $x \in \mathcal{A}$ 均有

$$|f(x)|^2 = |f(xe_{\mathcal{A}}^*)|^2 \leq f(xx^*)f(e_{\mathcal{A}}e_{\mathcal{A}}^*) = f(xx^*)f(e_{\mathcal{A}}).$$

因为 xx^* 是 Hermite 元, 故由 (ii) 知存在 Hermite 元 $y \in \mathcal{A}$ 使得

$$\|xx^*\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - xx^* = y^2 \Rightarrow xx^* = \|xx^*\|_{\mathcal{A}} e_{\mathcal{A}} - y^2,$$

故

$$|f(x)|^2 \leq (\|xx^*\|_{\mathcal{A}} f(e_{\mathcal{A}}) - f(y^2))f(e_{\mathcal{A}}) \leq \|xx^*\|_{\mathcal{A}} f(e_{\mathcal{A}})^2 = \|x\|_{\mathcal{A}}^2 f(e_{\mathcal{A}})^2,$$

此即 $|f(x)| \leq f(e_{\mathcal{A}})\|x\|_{\mathcal{A}}$, 故 $f \in \mathcal{A}^*$ 且 $\|f\|_{\mathcal{A}^*} \leq f(e_{\mathcal{A}})$.

针对反向不等式, 由 $\|e_{\mathcal{A}}\|_{\mathcal{A}} = 1$ 知 $\|f\|_{\mathcal{A}^*} \geq |f(e_{\mathcal{A}})|$, 至此结论得证. □

练习 8.33

设 $\mathcal{A}$ 是交换 C^* 代数. 若 $x, y \in \mathcal{A}, x \geq 0, y \geq 0$, 证明 $x + y \geq 0$.



证明 由 $x \geq 0, y \geq 0$ 知 $\sigma(x) = R(\Gamma x) \subset [0, \infty), \sigma(y) = R(\Gamma y) \subset [0, \infty)$, 故

$$\sigma(x + y) = \Gamma(x + y)(\mathfrak{M}) \subset \Gamma(x)(\mathfrak{M}) + \Gamma(y)(\mathfrak{M}) \subset [0, \infty),$$

此即 $x + y \geq 0$. □

练习 8.34

设 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数, 其单位元为 $e_{\mathcal{A}}$, B 为 $\mathcal{A}$ 的闭子代数, $e_{\mathcal{A}} \in B$, 且对任意 $x \in B$ 有 $x^* \in B$. 证明对任意 $x \in B$ 有

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_B(x),$$

其中 $\sigma_{\mathcal{A}}(x), \sigma_B(x)$ 分别表示 x 在 $\mathcal{A}$ 和 B 中的谱集.

证明 我们首先预备下述引理:

引理 8.13

若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$ 为 Hermite 元, 则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$.

为此先证 $i \notin \sigma(x)$. 考虑反证, 若 $i \in \sigma(x)$, 则 $ie_{\mathcal{A}} - x \notin G(\mathcal{A}) \Leftrightarrow \forall t \in (0, \infty) ((t+1)ie_{\mathcal{A}} - (ite_{\mathcal{A}} + x) \notin G(\mathcal{A}))$, 亦即对任意 $t \in (0, \infty)$ 均有 $(t+1)i \in \sigma(ite_{\mathcal{A}} + x)$, 进而由谱半径的估计知

$$(t+1)^2 = \|(t+1)i\|^2 \leq \|ite_{\mathcal{A}} + x\|_{\mathcal{A}}^2 = \|(ite_{\mathcal{A}} + x)(ite_{\mathcal{A}} + x)^*\|_{\mathcal{A}} = \|(ite_{\mathcal{A}} + x)(-ite_{\mathcal{A}} + x)\|_{\mathcal{A}} = \|t^2 e_{\mathcal{A}} + x^2\|_{\mathcal{A}} \leq t^2 + \|x^2\|_{\mathcal{A}}.$$

这表明 $2t+1 \leq \|x^2\|_{\mathcal{A}} (\forall t \in \mathbb{R})$, 令 $t \rightarrow \infty$ 即得矛盾, 故 $i \notin \sigma(x)$.

再任取 $\lambda = a + ib, b \neq 0$, 若 $\lambda \in \sigma(x)$, 则 $\lambda e_{\mathcal{A}} - x = (a + ib)e_{\mathcal{A}} - x \notin G(\mathcal{A})$, 从而 $b(ie_{\mathcal{A}} - b^{-1}(x - ae_{\mathcal{A}})) \notin G(\mathcal{A})$, 这说明 $i \in \sigma(b^{-1}(x - ae_{\mathcal{A}}))$. 因为 x 是 Hermite 元, 故 $b^{-1}(x - ae_{\mathcal{A}})$ 也是 Hermite 元, 于是前述结果表明 $i \notin \sigma(b^{-1}(x - ae_{\mathcal{A}}))$, 矛盾! 至此 $\lambda \in \sigma(x) \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$, 引理得证.

回到习题证明. 任取 $x \in B$, 首先证明 $\sigma_{\mathcal{A}}(xx^*) = \sigma_B(xx^*)$. 由定义立得 $\sigma_{\mathcal{A}}(xx^*) \subset \sigma_B(xx^*)$, 下证 $\sigma_B(xx^*) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(xx^*)$. 任取 $\lambda \in \sigma_B(xx^*)$, 由 xx^* 是 Hermite 元知 $\sigma_B(xx^*) \subset \mathbb{R}$, 于是 $\partial \rho_B(xx^*) = \sigma_B(xx^*)$, 这说明存在 $\{\lambda_n\} \subset \rho_B(xx^*)$ 使得 $\lambda_n \rightarrow \lambda (n \rightarrow \infty)$. 因为 $\lambda_n \in \rho_B(xx^*) (\forall n)$, 故 $\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^* \in G(B)$, 于是

$$\lambda e_{\mathcal{A}} - xx^* = (\lambda - \lambda_n)e_{\mathcal{A}} + \lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^* = (\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)(e_{\mathcal{A}} + (\lambda - \lambda_n)(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1}),$$

既然 $\lambda \in \sigma_B(xx^*)$, 故 $\lambda e_{\mathcal{A}} - xx^* \notin G(B)$, 这要求 $e_{\mathcal{A}} + (\lambda - \lambda_n)(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1} \notin G(B)$, 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$ 均有

$$|\lambda - \lambda_n| \|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1}\|_{\mathcal{A}} = |\lambda - \lambda_n| \|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1}\|_B \geq 1.$$

这说明 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1}\|_{\mathcal{A}} \geq \frac{1}{|\lambda - \lambda_n|} \rightarrow \infty.$$

现若 $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(xx^*)$, 则 $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(xx^*)$, 由 $a \mapsto a^{-1}$ 连续知

$$\lambda_n \rightarrow \lambda \Rightarrow (\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1} \rightarrow (\lambda e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1} (\mathcal{A}).$$

这说明 $\{\|(\lambda_n e_{\mathcal{A}} - xx^*)^{-1}\|_{\mathcal{A}}\}$ 作为收敛列的范数起码有界, 这与前述结果矛盾! 故 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(xx^*)$, 从而 $\sigma_B(xx^*) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(xx^*)$, 至此即得 $\sigma_{\mathcal{A}}(xx^*) = \sigma_B(xx^*)$.

下面说明 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_B(x)$. 由定义立得 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset \sigma_B(x)$, 下证 $\sigma_B(x) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x)$, 知

$$\begin{aligned} \lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(x) &\Rightarrow \lambda e_{\mathcal{A}} - x \in G(\mathcal{A}) \cap B \\ &\Rightarrow (\lambda e_{\mathcal{A}} - x)(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^* \in G(\mathcal{A}) \cap B \\ &\Rightarrow 0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}((\lambda e_{\mathcal{A}} - x)(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^*) = \sigma_B((\lambda e_{\mathcal{A}} - x)(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^*) \\ &\Rightarrow (\lambda e_{\mathcal{A}} - x)(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^* \in G(B) \\ &\Rightarrow (\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^{-1} = (\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^*((\lambda e_{\mathcal{A}} - x)(\lambda e_{\mathcal{A}} - x)^*)^{-1} \in B \\ &\Rightarrow \lambda \in \rho_B(x). \end{aligned}$$

至此即得 $\rho_{\mathcal{A}}(x) \subset \rho_B(x)$, 此即 $\sigma_B(x) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x)$. □

注 8.39 引理 8.13 也可以用生成代数方法写. 设 $\mathcal{A}_x := \overline{L_x^{\mathcal{A}}}$ 是关于 x 的全体一元多项式构成代数的闭包, 则 $\mathcal{A}_x$ 自动成为含么交换 Banach 代数. 由 x 是 Hermite 元知 L_x 中的任意元素均为 Hermite 元, 而 Hermite 元 a 满足

$\|\Gamma(a)\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|_{\mathcal{A}}^{\frac{1}{n}} = \|a\|_{\mathcal{A}}$, 故 Γ 在 L_x 上是单射. 针对 ∂L_x , 设 $a \in \partial L_x$ 满足 $L_x \ni a_n \rightarrow a(\mathcal{A})$, 则

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} \Gamma a_n \right\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\Gamma a_n\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\|_{\mathcal{A}} = \|a\|_{\mathcal{A}},$$

因此对 $a \in \partial L_x$ 同样有 $\Gamma a = 0_{C(\mathfrak{M})} \Rightarrow a = 0_{\mathcal{A}}$, 这说明 $\mathcal{A}_x$ 半单, 从而 $*$ 在 $\mathcal{A}_x$ 上连续, 进而 $\mathcal{A}_x$ 成为交换 C^* 代数. 设 x 在 $\mathcal{A}_x$ 中的谱为 $\sigma_{\mathcal{A}_x}(x)$, 则 Arens 引理表明 $\sigma_{\mathcal{A}_x}(x) \subset \mathbb{R}$, 而 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma(x) \subset \sigma_{\mathcal{A}_x}(x)$, 故 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$. $\square$

注 8.40 $\sigma_B(xx^*) \subset \mathbb{R} \Rightarrow \partial \rho_B(xx^*) = \sigma_B(xx^*)$ 这个观察相当不凡, 不过既然这里出现了 $\partial \rho_B(xx^*)$, 一个很自然的想法就是问这里能不能用 Shilov 引理??, 答案是肯定的. 下面用 Shilov 引理说明对任意 Hermite 元 $a \in B$ 均有 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_B(a)$. 设 $\mathcal{A}_a$ 是 a 的生成代数, 则前注已证 $\mathcal{A}_a$ 是交换 C^* 代数, 且由定义已知 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subset \sigma_B(a) \subset \sigma_{\mathcal{A}_a}(a)$, 往证 $\sigma_{\mathcal{A}_a}(a) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. 事实上由引理 8.13 知 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subset \mathbb{R}$, $\sigma_{\mathcal{A}_a}(a) \subset \mathbb{R}$, 于是 Shilov 引理表明

$$\sigma_{\mathcal{A}_a}(a) = \partial \sigma_{\mathcal{A}_a}(a) = \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a).$$

至此即得结论. 当然总的来说, 这里谈的这么多过程其实都可以用闭子代数继承谱的引理??概括. $\square$

练习 8.35

设 $\mathcal{A}$ 为交换 C^* 代数, $x \in \mathcal{A}$, 且

$$\{P(x, x^*) : P(y, z) \text{ 为复系数二元多项式}\}$$

在 $\mathcal{A}$ 中稠密. 对任意 $f \in C(\sigma(x))$ 令

$$\Psi f := \Gamma^{-1}(f \circ \hat{x}),$$

证明:

(i) Ψ 良定.

(ii) $\Psi : C(\sigma(x)) \rightarrow \mathcal{A}$ 为等距到上同构, 且对任意 $f \in C(\sigma(x))$ 均有

$$\Psi \bar{f} = (\Psi f)^*.$$

证明 (i) 要证 Ψ 良定, 根据 Gelfand-Naimark 定理只需证 $f \circ \hat{x} \in C(\mathfrak{M})$. 注意 $\hat{x}(\mathfrak{M}) = R(\Gamma a) = \sigma(x)$, 故 $f \circ \hat{x}$ 对每个 $J \in \mathfrak{M}$ 均有定义, 且由 $\hat{x} \in C(\mathfrak{M})$ 与 $f \in C(\sigma(x))$ 即知 $f \circ \hat{x} \in C(\mathfrak{M})$.

(ii) 先证 Ψ 是单射. 任取 $f_1, f_2 \in C(\sigma(x))$ 满足 $\Psi f_1 = \Psi f_2$. 因为 Γ^{-1} 显然是单射, 故只能有 $f_1 \circ \hat{x} = f_2 \circ \hat{x}$, 此即对任意 $J \in \mathfrak{M}$ 均有 $f_1(\hat{x}(J)) = f_2(\hat{x}(J))$. 因为 $\hat{x}(\mathfrak{M}) = \sigma(x)$, 故对任意 $a \in \sigma(x)$ 均有 $f_1(a) = f_2(a)$, 此即 $f_1 = f_2$.

再证 Ψ 等距, 由 Gelfand-Naimark 定理已知

$$\|\Psi f\|_{\mathcal{A}} = \|f \circ \hat{x}\|_{C(\mathfrak{M})},$$

往证

$$\|f \circ \hat{x}\|_{C(\mathfrak{M})} = \|f\|_{C(\sigma(x))}.$$

为此只需要说明 $\hat{x} : \mathfrak{M} \rightarrow \sigma(x)$ 是一一映射, 由 $\hat{x}(\mathfrak{M}) = R(\Gamma x) = \sigma(x)$ 进一步知只需证 $\hat{x}$ 是单射¹⁶. 任取 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}$ 使得 $\hat{x}(J_1) = \hat{x}(J_2)$, 由 Gelfand-Naimark 定理知

$$\widehat{x^*}(J_1) = \overline{\widehat{x}(J_1)} = \overline{\widehat{x}(J_2)} = \widehat{x^*}(J_2).$$

对任意 $J \in \mathfrak{M}, a \in \mathcal{A}$ 记 $\varphi_J(a) := \widehat{a}(J)$, 则已知 φ_J 是 $\mathcal{A}$ 上的连续同态, 于是对任意二元多项式 P 均有

$$\varphi_{J_1}(P(x, x^*)) = \varphi_{J_2}(P(x, x^*)).$$

又因为 $\mathcal{P} := \{P(x, x^*) : P(y, z) \text{ 为二元多项式}\}$ 在 $\mathcal{A}$ 中稠密, 故对任意 $a \in \mathcal{A}$ 均有 $\varphi_{J_1}(a) = \varphi_{J_2}(a)$, 因此

$$J_1 = \ker \varphi_{J_1} = \ker \varphi_{J_2} = J_2.$$

因此 $\hat{x}$ 是单射, 从而 $\hat{x}$ 是一一映射, 进而 Ψ 等距.

最后说明 Ψ 是满射. 任取 $a \in \mathcal{A}$, 往证存在 $f \in C(\sigma(x))$ 使得 $\Gamma^{-1}(f \circ \hat{x}) = a$, 由 Γ^{-1} 是单射知只需 $f \circ \hat{x} = \Gamma a$.

¹⁶注意 Gelfand-Naimark 定理保证的是 $x \mapsto \hat{x}$ 单, 它没法保证 $\hat{x}$ 本身作为函数是单射.

由条件蕴含的稠密性知存在二元多项式列 $\{P_n(x, x^*)\}$ 使得

$$P_n(x, x^*) \rightarrow a(\mathcal{A}).$$

这说明 $\{P_n(x, x^*)\}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 Cauchy 列. 由 Gelfand-Naimark 定理知 $\{P_n(\widehat{x}, \widehat{x^*})\} = \{P_n(\widehat{x}, \widehat{\bar{x}})\}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 中的 Cauchy 列. 显然 $\overline{\Gamma(\mathcal{P})}^{C(\mathfrak{M})}$ 含幺且对复共轭封闭, 下证 $\overline{\Gamma(\mathcal{P})}^{C(\mathfrak{M})}$ 分离 $\mathfrak{M}$ 中的点. 任取 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}$ 满足 $J_1 \neq J_2$, 则由 J_1, J_2 的极大性知 $J_1 \setminus J_2 \neq \emptyset, J_2 \setminus J_1 \neq \emptyset$, 取 $a_1 \in J_1 \setminus J_2, a_2 \in J_2 \setminus J_1$ 即知

$$\widehat{a_1}(J_1) = 0 = \widehat{a_2}(J_2), \widehat{a_1}(J_2) \neq 0, \widehat{a_2}(J_1) \neq 0,$$

取 $\mathcal{P} \ni Q_n^1(x, x^*) \rightarrow a_1, \mathcal{P} \ni Q_n^2(x, x^*) \rightarrow a_2$, 则由 Γ 连续知必存在足够大的 N 使得

$$|\Gamma(Q_N^1(x, x^*))(J_1)| < \frac{1}{2}|\widehat{a_2}(J_1)| < |\Gamma(Q_N^2(x, x^*))(J_2)|,$$

因此 Stone-Weierstrass 定理表明 $\overline{\Gamma(\mathcal{P})}^{C(\mathfrak{M})} = C(\mathfrak{M})$, 因此 $P_n(\widehat{x}, \widehat{\bar{x}})$ 在 $C(\mathfrak{M})$ 中存在极限, 记之为 f , 则

$$f \circ \widehat{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(\widehat{x}, \widehat{\bar{x}}) = \Gamma\left(\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x, x^*)\right) = \Gamma a.$$

至此 Ψ 成为满射.

针对对合恒等式, 由 Gelfand-Naimark 定理知

$$\Gamma(\Psi \bar{f}) = \bar{f} \circ \widehat{x} = \overline{f \circ \widehat{x}} = \overline{\Gamma(\Psi f)} = \Gamma((\Psi f)^*),$$

进而 $\Psi \bar{f} = (\Psi f)^*$. □

注 8.41 在证 Ψ 为满射的时候也可以先证 $\widehat{x}$ 是同胚, 因为只要 $\widehat{x}$ 成为同胚, 任取 $a \in \mathcal{A}$, 已知 $\widehat{a} \in C(\mathfrak{M})$, 直接令 $f = \widehat{a} \circ \widehat{x}^{-1}$ 即知

$$\Gamma(\Psi f) = \widehat{a} \circ \widehat{x}^{-1} \circ \widehat{x} = \widehat{a} = \Gamma(a),$$

由此立得 $\Psi f = a$. 现在针对同胚性, 已知 $\widehat{x}: (\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}}) \rightarrow (\sigma(x), \tau)$ 是连续一一映射 (其中 τ 是 $\mathbb{C}$ 在 $\sigma(x)$ 上的子空间拓扑), 往证 $\widehat{x}^{-1}$ 连续, 为此只需证 $\widehat{x}(\tau_{\mathfrak{M}}) = \tau$, 亦即 $\tau_{\mathfrak{M}} = \widehat{x}^{-1}(\tau)$. 由 $\widehat{x}$ 连续已知 $\widehat{x}^{-1}(\tau) \subset \tau_{\mathfrak{M}}$, 于是从拓扑等价定理出发, 只需证 $(\mathfrak{M}, \tau_{\mathfrak{M}})$ 紧且 $(\mathfrak{M}, \widehat{x}^{-1}(\tau))$ Hausdorff 即可. 前者自动成立. 针对后者, 任取 $J_1, J_2 \in \mathfrak{M}$ 满足 $J_1 \neq J_2$, 由 $\widehat{x}$ 是单射知 $\widehat{x}(J_1) \neq \widehat{x}(J_2)$, 由 τ Hausdorff 知存在 $U, V \in \tau$ 满足 $U \cap V = \emptyset, \widehat{x}(J_1) \in U, \widehat{x}(J_2) \in V$, 于是 $J_1 \in \widehat{x}^{-1}(U), J_2 \in \widehat{x}^{-1}(V)$, 且 $\widehat{x}^{-1}(U) \cap \widehat{x}^{-1}(V) = \widehat{x}^{-1}(U \cap V) = \emptyset$. 又因为 $\widehat{x}^{-1}(U), \widehat{x}^{-1}(V) \in \widehat{x}^{-1}(\tau)$, 故 $(\mathfrak{M}, \widehat{x}^{-1}(\tau))$ Hausdorff, 自此即得待证结论. □

注 8.42 这道习题正是连续算符演算的前夜. 我们用下述过程说明一下这道题中发生了什么事:

$$\begin{array}{ccccccc} x & \mapsto & \Gamma x & \mapsto & f \circ \Gamma x & \mapsto & \Gamma^{-1} \circ f \circ \Gamma x, \\ \mathcal{A} & \rightarrow & C(\mathfrak{M}) & \rightarrow & C(\mathfrak{M}) & \rightarrow & \mathcal{A}. \end{array}$$

于是只要给定一个连续函数 $f \in C(\sigma(x))$, 我们都可以通过将它作用在 $\widehat{x}$ 上来假装这个连续函数作用在了非合法输入 $x \in \mathcal{A}$ 上, 这便诱导了代数元素的某种连续算符运算, 于是特别对给定的元素 a 而言, 只要 a 性质够好, $a^n, \sqrt{a}$ 就全都有了意义, 特别如果再加入形式上的 Taylor 公式, $e^a = e + a + a^2 + \cdots$ 也就有了意义. 这种连续函数 $f \in C(\sigma(x))$ 在代数元素 x 上的作用, 正是接下来的连续算符演算要讲的故事.

注 8.43 这道习题的结果还可以往后走一步, 本注研究 f 通过 $*$ 保么同态在不同 C^* 代数之间的迁移. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是交换 C^* 代数, $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}, \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$ 分别是 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 上的极大理想构成的空间, $\Gamma_{\mathcal{A}}, \Gamma_{\mathcal{B}}$ 分别是 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 对应的 Gelfand 表示, $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是 $*$ 保么同态. 进一步设 $a \in \mathcal{A}, \varphi(a) \in \mathcal{B}$ 生成 C^* 代数的闭包. 先前的习题表明 f 可以通过下述过程作用在代数元素 x 上:

$$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, x \mapsto \Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}} x.$$

现在 $\Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}} x$ 作为 $\mathcal{A}$ 中的元素, 自然能通过 $*$ 同态 φ 迁移到 $\mathcal{B}$ 内, 于是每个 $x \in \mathcal{A}$ 都能通过下述过程对应到 $\mathcal{B}$ 中的某个元素:

$$\begin{array}{ccccccc} x & \mapsto & \Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}(x) & \mapsto & \varphi(\Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}(x)), \\ \mathcal{A} & \rightarrow & \mathcal{A} & \rightarrow & \mathcal{B}. \end{array}$$

但另一方面 $\varphi(x)$ 本身自然也是 $\mathcal{B}$ 中的元素, 于是它也能被 f 经由同样的过程作用, 因此 x 通过下述过程也诱导

了 $\mathcal{B}$ 中的某个元素:

$$\begin{array}{ccccc} x & \mapsto & \varphi(x) & \mapsto & \Gamma_{\mathcal{B}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)), \\ \mathcal{A} & \rightarrow & \mathcal{B} & \rightarrow & \mathcal{B}. \end{array}$$

既然有了两个同样是诱导 $\mathcal{B}$ 中元素的过程, 我们自然会想研究下述图的交换性:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{\Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}} & \mathcal{A} \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{\Gamma_{\mathcal{B}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{B}}} & \mathcal{B} \end{array}$$

也就是说, 我们希望

$$\varphi(\Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}(x)) = \Gamma_{\mathcal{B}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)), \quad \forall x \in \mathcal{A}. \quad (8.36)$$

因为 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 本身可以视作由 $a, \varphi(a)$ 生成的, 故只需要对 $x = a$ 说明上述关系就可以了. 进一步如果想要处理 $\Gamma_{\mathcal{B}}\varphi$ 与 $\varphi(\Gamma_{\mathcal{A}}^{-1})$ 这类量, 不可避免地就会需要研究 φ 与 Gelfand 变换的某种交换性, 这也就是研究下述图的某种交换性:

$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{\varphi} & \varphi(a) \\ \Gamma_{\mathcal{A}} \downarrow & & \downarrow \Gamma_{\mathcal{B}} \\ \Gamma_{\mathcal{A}}(a) & \xrightarrow{\quad ? \quad} & \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a)) \end{array}$$

现在先启发式地尝试把 $\Gamma_{\mathcal{A}}(a)$ 与 $\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$ 扯上关系. 任取 $J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$, 设

$$\Gamma_{\mathcal{A}}(a)(J) = z = \Gamma_{\mathcal{A}}(ze_{\mathcal{A}})(J),$$

则由 $\Gamma_{\mathcal{A}}$ 此时为单射知 $a - ze_{\mathcal{A}} \in J$, 两边同时作用 φ 可得

$$\varphi(a - ze_{\mathcal{A}}) \in \varphi(J).$$

如果 $\varphi(J) \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$, 则结合上式与 φ 保么知

$$\Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a) - \varphi(ze_{\mathcal{A}}))(\varphi(J)) = 0 \Leftrightarrow \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))(\varphi(J)) = z = \Gamma_{\mathcal{A}}(a)(J). \quad (8.37)$$

然而 φ 作为 $*$ 同态保持可逆性, 因此 $\varphi(J)$ 确实在 $\mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$ 内. 进一步生成 C^* 代数间的 $*$ 同态自动成为单射, 且因为 $\mathcal{B}$ 由 $\varphi(a)$ 生成, 故对每个 $J_B \in \mathfrak{M}_{\mathcal{B}}$ 都存在 $J_A \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ 使得 $\varphi(J_A) = J_B$. 现在(8.36)成立当且仅当

$$\Gamma_{\mathcal{B}} \circ \varphi(\Gamma_{\mathcal{A}}^{-1} \circ f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}(x))(\varphi(J_A)) = f \circ \Gamma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))(\varphi(J_A)), \quad \forall J_A \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}},$$

对上左右两式同时应用(8.37)知上式成立进一步当且仅当

$$f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}(x)(J) = f \circ \Gamma_{\mathcal{A}}(x)(J), \quad \forall J \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}},$$

而这件事显然, 因此对于生成 C^* 代数 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 与 $*$ 同态 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 而言, 只要 f 依先前习题作用在 $\mathcal{A}$ 上, $\varphi \circ f$ 就能通过 $*$ 同态作用在 $\mathcal{B}$ 上, 且这个作用等价于 $f \circ \varphi$ 经先前习题同样的过程在 $\mathcal{B}$ 上的作用.

参考文献

- [1] Axler, Sheldon. *Measure, integration & real analysis*. Springer Nature, 2020.
- [2] Brezis, Haim. *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*. Vol. 2. 3. Springer, 2011.
- [3] Ciarlet, Philippe G. 线性与非线性泛函分析及其应用 (下册). 高等教育出版社, 2017.
- [4] Doran, Robert. *Characterizations of c^* algebras: the gelfand naimark theorems*. CRC press, 2018.
- [5] Duoandikoetxea, Javier. *Fourier analysis*. Vol. 29. American Mathematical Society, 2024.
- [6] Fleming, R. J. and Jamison, J. E. *Isometries on Banach Spaces: function spaces*. Chapman and Hall, 2002.
- [7] Folland, Gerald B. *Real analysis: modern techniques and their applications*. John Wiley & Sons, 1999.
- [8] Grafakos, Loukas. *Classical Fourier Analysis*. 2014.
- [9] Krasnosel'skii, Yu P. "Topological methods in the theory of nonlinear integral equations". In: *Pergamon Press* (1964).
- [10] Rudin, Walter. *Functional Analysis*. McGraw-Hill, Inc., 1991.
- [11] Schmüdgen, Konrad. *Unbounded self-adjoint operators on Hilbert space*. Vol. 265. Springer Science & Business Media, 2012.
- [12] Schwarz, L. 广义函数论. 高等教育出版社, 2010.
- [13] 刘培德. 拓扑线性空间与算子谱理论. 高等教育出版社, 2014.
- [14] 卓里奇. 数学分析: 第二卷. 高等教育出版社, 2019.
- [15] 叶东 and 周凤. 泛函分析: 理论和应用. 清华大学出版社, 2009.
- [16] 周民强. 实变函数论. 北京大学出版社, 2016.
- [17] 张恭庆 and 林源渠. 泛函分析讲义. 北京大学出版社, 2021.
- [18] 张英伯 and 王恺顺. 代数学基础. 北京师范大学出版社, 2013.
- [19] 杨大春 and 袁文. 泛函分析选讲. 北京师范大学出版社, 2016.
- [20] 许全华, 马涛, and 尹智. 泛函分析讲义. 高等教育出版社, 2017.