

Reporte para el Indicador: **Número de muertes atribuido a enfermedades no transmisibles, desglosado por tipo de enfermedad y sexo (en cantidades) en Paraguay**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este reporte ofrece un análisis del indicador **Número de muertes atribuido a enfermedades no transmisibles, desglosado por tipo de enfermedad y sexo (en cantidades)** en Paraguay, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo y la diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2000 y 2019. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Enfermedades.

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.


Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPAL - Naciones Unidas, con última actualización al Jul 3 2025.

1. Evolución temporal desglosada por sexo

Esta sección muestra la evolución temporal del indicador desglosado por sexo. Se presentan datos desagregado por Enfermedades.



En el grupo **Cáncer**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 5,436.00 en el año 2019 y el mínimo de 3,308.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 3,040.00 en el año 2019 y el mínimo de 1,763.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 2,395.00 en el año 2019 y el mínimo de 1,545.00 en 2000.

En el grupo **Diabetes**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 2,993.00 en el año 2019 y el mínimo de 1,174.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 1,365.00 en el año 2019 y el mínimo de 421.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 1,629.00 en el año 2019 y el mínimo de 753.00 en 2000.


En el grupo **Enfermedad cardiovascular**, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 9,153.00 en el año 2019 y el mínimo de 5,420.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 5,173.00 en el año 2019 y el mínimo de 2,804.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 3,981.00 en el año 2019 y el mínimo

de 2,616.00 en 2000.

En el grupo ***Enfermedad respiratoria crónica***, el indicador presenta los siguientes valores. Para ambos sexos, el valor máximo fue de 1,934.00 en el año 2019 y el mínimo de 849.00 en 2000. Para hombres, el valor máximo fue de 1,219.00 en el año 2019 y el mínimo de 463.00 en 2000. Para mujeres, el valor máximo fue de 715.00 en el año 2019 y el mínimo de 351.00 en 2005.

2. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Enfermedades, con una perspectiva de género.



En Paraguay, para ambos sexos, el valor más alto registrado fue de 9,153.00, observado en el grupo ***Enfermedad cardiovascular***. El nivel más bajo se encontró en 1,934.00, para el grupo ***Enfermedad respiratoria crónica***. Para hombres, el valor más alto registrado fue de 5,173.00, observado en el grupo ***Enfermedad cardiovascular***. El nivel más bajo se encontró en 1,219.00, para el grupo ***Enfermedad respiratoria crónica***. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 3,981.00, observado en el grupo ***Enfermedad cardiovascular***. El nivel más bajo se encontró en 715.00, para el grupo ***Enfermedad respiratoria crónica***.