

Reporte para el Indicador: **Tiempo de trabajo no remunerado según años de estudio y sexo**

ONU Mujeres, a través del proyecto Women Count, busca reducir las brechas de acceso a la información, proporcionando herramientas que permitan a diversos actores de la sociedad acceder a datos clave y precisos que contribuyan a la promoción de la igualdad de género. Estos reportes son desarrollados por el Área de Datos de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, con base en una amplia variedad de indicadores que permiten un análisis integral de la realidad de género en la región.

Este informe ofrece un análisis del indicador **Tiempo de trabajo no remunerado según años de estudio y sexo** en América Latina y el Caribe, centrándose en las variaciones a lo largo del tiempo, las diferencias entre países y diferencia por sexo. Este indicador cubre el período comprendido entre 2007 y 2024, e incluye datos de 15 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Adicionalmente, este indicador tiene información desagregada por dimensión según las siguientes variables: Escolaridad (EH).

Disclaimer: Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fecha de último corte de la información: 20/01/2026

Fecha de generación del informe: 03/03/2026

Estos datos son tomados de CEPALSTAT, con última actualización al Jul 22 2025.


1. Situación de los hombres, mujeres y ambos sexos con enfoque interseccional

En esta sección se muestra el desglose de los datos por Escolaridad (EH) con una perspectiva de género. Para cada país se presenta la información del último año disponible.

Argentina

En Argentina, para hombres, el valor más alto registrado fue de 23.90, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 18.60, para el grupo **13 años y más**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.20, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 30.50, para el grupo **13 años y más**.


Argentina (2021)



Brasil


En Brasil, para hombres, el valor más alto registrado fue de 14.05, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 11.50, para el grupo **13 años y más**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 25.40, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 18.83, para el grupo **13 años y más**.

Brasil (2019)




Chile

En Chile, para hombres, el valor más alto registrado fue de 21.87, observado en el grupo **13 años y más**. El nivel más bajo se encontró en 16.82, para el grupo **0 a 5 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 45.61, observado en el grupo **10 a 12 años**. El nivel más bajo se encontró en 35.89, para el grupo **0 a 5 años**.



Colombia


En Colombia, para hombres, el valor más alto registrado fue de 18.37, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 15.34, para el grupo **6 a 9 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.03, observado en el grupo **10 a 12 años**. El nivel más bajo se encontró en 31.56, para el grupo **13 años y más**.



Costa Rica

En Costa Rica, para hombres, el valor más alto registrado fue de 19.49, observado en el grupo **13 años y más**. El nivel más bajo se encontró en 17.03, para el grupo **10 a 12 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 38.54, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 30.94, para el grupo **13 años y más**.


Costa Rica (2022)



Ecuador

En Ecuador, para hombres, el valor más alto registrado fue de 13.67, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 9.49, para el grupo **10 a 12 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 43.74, observado en el grupo **6 a 9 años**. El nivel más bajo se encontró en 30.34, para el grupo **13 años y más**.


Ecuador (2012)



El Salvador

En El Salvador, para hombres, el valor más alto registrado fue de 32.60, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 26.30, para el grupo **13 años y más**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 51.10, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 43.00, para el grupo **13 años y más**.


El Salvador (2022)



Guatemala

En Guatemala, para hombres, el valor más alto registrado fue de 17.30, observado en el grupo **10 a 12 años**. El nivel más bajo se encontró en 15.20, para el grupo **0 a 5 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 46.40, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 36.40, para el grupo **13 años y más**.


Guatemala (2022)



Honduras

En Honduras, para hombres, el valor más alto registrado fue de 16.10, observado en el grupo **13 años y más**. El nivel más bajo se encontró en 13.35, para el grupo **0 a 5 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 31.81, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 25.31, para el grupo **13 años y más**.


Honduras (2009)



México

En México, para hombres, el valor más alto registrado fue de 18.05, observado en el grupo **13 años y más**. El nivel más bajo se encontró en 16.27, para el grupo **10 a 12 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 46.56, observado en el grupo **10 a 12 años**. El nivel más bajo se encontró en 39.87, para el grupo **13 años y más**.


México (2019)



Panamá

En Panamá, para hombres, el valor más alto registrado fue de 15.35, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 13.59, para el grupo **10 a 12 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 35.58, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 28.37, para el grupo **13 años y más**.


Panamá (2011)



Paraguay


En Paraguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 17.20, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 10.38, para el grupo **10 a 12 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 31.94, observado en el grupo **6 a 9 años**. El nivel más bajo se encontró en 24.26, para el grupo **13 años y más**.

Paraguay (2016)




Perú

En Perú, para hombres, el valor más alto registrado fue de 23.10, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 15.70, para el grupo **6 a 9 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 43.70, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 32.00, para el grupo **13 años y más**.



República Dominicana

En República Dominicana, para hombres, el valor más alto registrado fue de 14.58, observado en el grupo **13 años y más**. El nivel más bajo se encontró en 10.79, para el grupo **6 a 9 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 27.65, observado en el grupo **10 a 12 años**. El nivel más bajo se encontró en 21.87, para el grupo **0 a 5 años**.



Uruguay

En Uruguay, para hombres, el valor más alto registrado fue de 20.44, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 18.00, para el grupo **10 a 12 años**. Para mujeres, el valor más alto registrado fue de 36.11, observado en el grupo **0 a 5 años**. El nivel más bajo se encontró en 30.40, para el grupo **13 años y más**.

Uruguay (2022)

