


Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Departamento de Matemática

Métodos Numéricos (M2039)

Ano Letivo 2026/2027

Trabalho Prático 1

Relatório

Realizado por:

Pedro André Silva Pinho Gonçalves	up202405642
Filipe Marques Mano	up202506000
Martim Andrade Ribeiro	up202505495

Outubro 2026

1 Motivação do trabalho

Este trabalho prático tem como foco a resolução de problemas de aproximação de constantes matemáticas (como e e π^2) em ambiente computacional, exigindo que os resultados cumpram critérios de paragem analíticos baseados na majoração do erro de truncatura. Paralelamente, procuramos investigar o limite de precisão da máquina (epsilon da máquina) e como este influencia, e por vezes corrompe, os resultados obtidos.

2 Resolução da Questão 3

2.1 Métodos

Para a aproximação da constante de Euler ($e \approx 2.71828...$), o guião sugere a utilização de duas abordagens matemáticas distintas, a Fórmula A e a Fórmula B, definidas respetivamente por:

$$\text{Fórmula A:} \quad a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\text{Fórmula B:} \quad b_m = \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!}$$

A implementação da Fórmula A consiste na tradução direta da expressão algébrica numa função simples:

```
def a_euler(n):
    return (1 + 1/n)**n
```

Já na Fórmula B, o algoritmo baseia-se num ciclo `while (k <= m)` que vai acumulando os termos da série a cada iteração. Para otimizar o código, evitamos o cálculo repetitivo de fatoriais do zero a cada iteração implementando uma relação de recorrência. Sabendo que o termo geral da série é $a_k = \frac{1}{k!}$, o termo seguinte pode ser deduzido a partir do termo atual através da expressão:

$$a_{k+1} = \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{(k+1) \times k!} = a_k \times \frac{1}{k+1}$$

Desta forma, o programa calcula o próximo valor a adicionar à soma multiplicando simplesmente o termo anterior por $\frac{1}{k+1}$:

```
def b_euler(m):
    soma = 0.0
    termo = 1.0
    k = 0

    while (k <= m):
        soma += termo
        termo = termo * (1 / (k + 1))
        k += 1

    return soma
```

2.2 Discussão dos Resultados

Pela análise dos resultados da fórmula A (Tabela **??**), observa-se que, ao aumentar o valor de n, a sucessão começa a convergir para o valor da constante de Euler. No entanto, a partir de $n = 10^{12}$, nota-se o início de uma divergência progressiva em relação ao valor de referência. Esta alteração deve-se à aproximação ao limite de precisão da máquina, o que provoca perdas severas de algarismos significativos. Ao elevar esta base, já com erros de arredondamento, a um expoente muito elevado, o pequeno erro inicial sofre uma propagação massiva que corrompe o resultado final. O caso extremo ocorre quando $n = 10^{16}$, onde a parcela $1/n$ (10^{-16}) é inferior ao epsilon da máquina. Nesta iteração, o computador não consegue distinguir 1.0 da soma $1.0 + 10^{-16}$, efetuando o arredondamento para 1.0. Por fim, a operação realizada é $1.0^{10^{16}}$, o que resulta em 1.0.

n	**Resultado**	**Erro Absoluto Efetivo**
10^1	2.5937424601000023	1.245×10^{-1}
10^2	2.7048138294215285	1.347×10^{-2}
10^3	2.7169239322355936	1.358×10^{-3}
10^4	2.7181459268249255	1.359×10^{-4}
10^5	2.7182682371922975	1.359×10^{-5}
10^6	2.7182804690957534	1.359×10^{-6}
10^7	2.7182816941320818	1.343×10^{-7}
10^8	2.7182817983473577	3.011×10^{-8}
10^9	2.7182820520115603	2.236×10^{-7}
10^{10}	2.7182820532347876	2.248×10^{-7}
10^{11}	2.7182820533571100	2.249×10^{-7}
10^{12}	2.7185234960372378	2.417×10^{-4}
10^{13}	2.7161100340869010	2.172×10^{-3}
10^{14}	2.7161100340870230	2.172×10^{-3}
10^{15}	3.0350352065492620	3.168×10^{-1}
10^{16}	1.0000000000000000	1.718×10^{0}

Table 1: Resultados da aproximação da constante de Euler utilizando a Fórmula A.

Por outro lado, a fórmula B (Tabela **??**) mostra um comportamento estável. Ao aumentar a quantidade de termos da série, os valores convergem de forma consistente para o valor real da constante, verificando-se uma estagnação a partir da iteração $m = 17$. Esta estagnação deve-se ao limite de precisão do computador. Para $m = 18$, o termo a adicionar à soma é $1/18! \approx 1.56 \times 10^{-16}$, que é inferior ao epsilon da máquina. Por conseguinte, os termos a partir da décima oitava iteração não agregam qualquer valor à soma acumulada, uma vez que estes excedem a capacidade de representação da mantissa do sistema, sendo ignorados durante o processo de arredondamento.

m	**Resultado**	**Erro Absoluto Efetivo**
1	2.0000000000000000	7.183×10^{-1}
2	2.5000000000000000	2.183×10^{-1}
3	2.6666666666666665	5.162×10^{-2}
4	2.7083333333333330	9.948×10^{-3}
5	2.7166666666666663	1.615×10^{-3}
6	2.7180555555555554	2.263×10^{-4}
7	2.7182539682539684	2.786×10^{-5}
8	2.7182787698412700	3.059×10^{-6}
9	2.7182815255731922	3.029×10^{-7}
10	2.7182818011463845	2.731×10^{-8}
11	2.7182818261984930	2.261×10^{-9}
12	2.7182818282861687	1.729×10^{-10}
13	2.7182818284467594	1.229×10^{-11}
14	2.7182818284582300	8.149×10^{-13}
15	2.7182818284589950	5.018×10^{-14}
16	2.7182818284590430	2.220×10^{-15}
17	2.7182818284590455	4.441×10^{-16}
18	2.7182818284590455	4.441×10^{-16}
19	2.7182818284590455	4.441×10^{-16}
20	2.7182818284590455	4.441×10^{-16}

Table 2: Resultados da aproximação da constante de Euler utilizando a Fórmula B.