

# **Teorija upodobitev**

Urban Jezernik

21. julij 2022



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Temelji teorije upodobitev</b>	<b>5</b>
1.1	Osnovni pojmi . . . . .	5
1.2	Fundamentalne konstrukcije . . . . .	9
<b>2</b>	<b>Upodobitev pod mikroskopom</b>	<b>21</b>
2.1	Razstavljanje upodobitve . . . . .	21
2.2	Matrični koeficienti . . . . .	29
<b>3</b>	<b>Upodobitve končnih grup</b>	<b>35</b>
3.1	Polenostavnost . . . . .	35
3.2	Karakterji . . . . .	39
<b>4</b>	<b>Razširjeni zgledi – končni</b>	<b>57</b>
4.1	Simetrične grupe . . . . .	57
4.2	Splošne linearne grupe . . . . .	66
<b>5</b>	<b>Aplikacije</b>	<b>77</b>
5.1	Aritmetična zaporedja . . . . .	77
5.2	Podmnožice brez produktov . . . . .	82
5.3	Prepoznavanje komutatorjev . . . . .	86
5.4	Slučajni sprehodi . . . . .	89
<b>6</b>	<b>Razširjeni zgledi – neskončni</b>	<b>99</b>
6.1	Kompaktne grupe . . . . .	100
6.2	Zvezne linearne grupe . . . . .	103
6.3	Diskretne linearne grupe . . . . .	103

## Kratek opis predmeta

### Literatura

- E. Kowalski, *An Introduction to the Representation Theory of Groups*, American Mathematical Society, 2014.
- W. Fulton, J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, Springer GTM 129, 2004.
- J. P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Springer GTM 42, 1977.
- P. Diaconis, *Group representations in probability and statistics*, Lecture notes - monograph series 11, i-192, 1988.
- C. J. Bushnell, G. Henniart, *The Local Langlands Conjecture for  $GL(2)$* , Springer Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **335**, 2006.
- W. T. Gowers, *Generalizations of Fourier analysis, and how to apply them*, Bulletin of the American Mathematical Society **54**, 1-44 (2017).
- S. Eberhard, *Product mixing in the alternating group*, Discrete Analysis, 2-18 (2016).

# Poglavje 1

## Temelji teorije upodobitev

V tem poglavju bomo vzpostavili temelje teorije upodobitev. Spoznali bomo koncept upodobitve in si ogledali mnogo primerov. Premislili bomo, kako upodobitve med sabo primerjamo in kako iz danih upodobitev sestavimo nove.

### 1.1 Osnovni pojmi

#### Upodobitve grup

Naj bo  $G$  grupa in  $V$  vektorski prostor nad poljem  $F$ . Upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $V$  je delovanje  $G$  na množici  $V$ , ki upošteva dodatno strukturo množice  $V$ , namreč to, da je vektorski prostor. Natančneje, **upodobitev** (rekli bomo tudi **linearno delovanje**) grupe  $G$  na prostoru  $V$  je homomorfizem grup

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V).$$

Pri tem razsežnosti prostora  $V$  rečemo **stopnja upodobitve** in jo označimo z  $\deg(\rho)$ .

Ko v prostoru  $V$  izberemo bazo in torej izomorfizem  $V \cong F^{\deg(\rho)}$ , lahko upodobitev  $\rho$  enakovredno zapišemo kot homomorfizem

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}_{\deg(\rho)}(F)$$

iz grupe  $G$  v obrnljive matrike razsežnosti  $\deg(\rho)$  nad  $F$ .

Nad poljem kompleksnih števil  $F = \mathbb{C}$  upodobitvam rečemo **kompleksne**, nad polji karakteristike  $p > 0$ , na primer  $F = \mathbb{F}_p$ , pa upodobitvam rečemo **modularne**.

Za element  $g \in G$  in vektor  $v \in V$  rezultat delovanja elementa  $g$  na vektorju  $v$ , se pravi  $\rho(g)(v)$ , včasih pišemo krajše kot  $g \cdot v$  ali kar  $gv$ .

#### Zgled.

- Opazujmo grupo ostankov  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  in racionalni vektorski prostor  $\mathbb{Q}^2$ . Preslikava

$$\rho: \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \text{GL}(\mathbb{Q}^2) = \text{GL}_2(\mathbb{Q}), \quad x \mapsto \begin{pmatrix} 1/2 & 1/8 \\ -6 & 1/2 \end{pmatrix}^x$$

je upodobitev grupe  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ . Relevantna matrika je namreč reda 6.

- Opazujmo matrično grupo  $\text{GL}_2(\mathbb{C})$  in vektorski prostor  $\mathbb{C}^2$ . Množenje matrik z vektorji podaja upodobitev

$$\rho: \text{GL}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \text{GL}(\mathbb{C}^2) = \text{GL}_2(\mathbb{C}), \quad A \mapsto (v \mapsto A \cdot v) = A.$$

- Opazujemo grupo realnih števil  $\mathbf{R}^*$  za množenje in vektorski prostor  $\mathbf{C}$ . Absolutna vrednost podaja upodobitev

$$|\cdot|: \mathbf{R}^* \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto |x|.$$

- Opazujemo grupo celih števil  $\mathbf{Z}$  in vektorski prostor  $\mathbf{C}$ . Eksponentna funkcija podaja upodobitev

$$\chi: \mathbf{Z} \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto e^x.$$

Splošneje imamo za vsak parameter  $\alpha \in \mathbf{C}$  upodobitev

$$\chi_\alpha: \mathbf{Z} \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto e^{\alpha x}.$$

- Opazujemo grupo ostankov  $\mathbf{Z}/q\mathbf{Z}$  za poljubno naravno število  $q$ . Za vsak parameter  $m \in \mathbf{Z}/q\mathbf{Z}$  imamo upodobitev

$$\chi_m: \mathbf{Z}/q\mathbf{Z} \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto e^{2\pi i m x / q}.$$

- Opazujemo diedrsko grupo  $D_{2n} = \langle s, r \rangle$ , v kateri je  $s^2 = 1$ ,  $r^n = 1$  in  $srs = r^{-1}$ . Ta grupa izhaja iz simetrij kvadrata v ravnini, s čimer nam ponuja svojo naravno upodobitev  $\rho: D_{2n} \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{R}^2) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{R})$ , ki preslika generatorja kot

$$s \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad r \mapsto \begin{pmatrix} \cos(2\pi/n) & -\sin(2\pi/n) \\ \sin(2\pi/n) & \cos(2\pi/n) \end{pmatrix}.$$

Splošneje imamo za vsak parameter  $k \in \mathbf{Z}$  upodobitev  $\rho_k: D_{2n} \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{R}^2) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{R})$ , ki preslika generatorja kot

$$s \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad r \mapsto \begin{pmatrix} \cos(2\pi k/n) & -\sin(2\pi k/n) \\ \sin(2\pi k/n) & \cos(2\pi k/n) \end{pmatrix}.$$

- Opazujemo ciklično grupo  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$  za praštevilo  $p$  nad končnim poljem  $\mathbf{F}_p$ . Preslikava

$$\rho: \mathbf{Z}/p\mathbf{Z} \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbf{F}_p^2) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_p), \quad x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

podaja modularno upodobitev grupe  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ . Relevantna matrika je namreč reda  $p$ .

- Naj bo  $G$  grupa in  $V$  vektorski prostor nad poljem  $F$ . **Trivialna upodobitev** grupe  $G$  je homomorfizem

$$\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V), \quad g \mapsto \mathrm{id}_V.$$

Kadar je vektorski prostor  $V$  razsežnosti 1, trivialno upodobitev in vektorski prostor sam označimo kot  $\mathbf{1}$ , v primerih višje razsežnosti pa ju označimo kot  $\mathbf{1}^{\dim V}$ .

- Naj bo  $V$  vektorski prostor in naj bo  $G$  poljubna podgrupa grupe  $\mathrm{GL}(V)$ . Tedaj je naravna vložitev  $G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$  upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $V$ .

Za konkreten zgled lahko vzamemo  $V = \mathbf{C}^2$  in  $G = \langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle \leq \mathrm{GL}(\mathbf{C}^2)$ . Na ta način dobimo upodobitev grupe  $G \cong \mathbf{Z}$  na prostoru  $\mathbf{C}^2$ . Na istem prostoru lahko vzamemo tudi  $G = \langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rangle \leq \mathrm{GL}(\mathbf{C}^2)$ . Grupa  $G$  je neskončna diedrska grupa  $G \cong D_\infty$ .

- Naj bo  $G$  poljubna grupa, opremljena z delovanjem na neki množici  $X$ . Naj bo  $F[X]$  vektorski prostor z bazo  $\{e_x\}_{x \in X}$ . Grupa  $G$  deluje na  $F[X]$  s homomorfizmom

$$\pi: G \rightarrow \text{GL}(F[X]), \quad g \mapsto (e_x \mapsto e_{g \cdot x}),$$

kjer je  $x \in X$ . To delovanje imenujemo **permutacijska upodobitev** grupe  $G$  na  $F[X]$ .

Za konkreten zgled lahko vzamemo  $G = S_n$ , ki naravno deluje na množici  $X = \{1, 2, \dots, n\}$ . Na ta način dobimo permutacijsko upodobitev grupe  $S_n$  na prostoru  $F[\{1, 2, \dots, n\}]$  razsežnosti  $n$ .

- Naj bo  $G$  grupa in  $F$  polje. Grupa  $G$  vselej deluje na sebi s Cayleyjevim delovanjem. Prirejene permutacijski upodobitvi grupe  $G$  na  $F[G]$ <sup>1</sup> rečemo **Cayleyjeva upodobitev** grupe  $G$  nad  $F$ . To delovanje označimo z  $\pi_{\text{Cay}}$ .
- Naj bo  $G$  grupa in  $F$  polje. Naj bo  $\text{fun}(G, F)$  množica vseh funkcij iz množice  $G$  v  $F$ . Te funkcije lahko po točkah seštevamo in množimo s skalarji, na ta način je  $\text{fun}(G, F)$  vektorski prostor. Grupa  $G$  deluje na  $\text{fun}(G, F)$  s homomorfizmom

$$\rho_{\text{fun}}: G \rightarrow \text{GL}(\text{fun}(G, F)), \quad g \mapsto (f \mapsto (x \mapsto f(xg))),$$

kjer je  $f \in \text{fun}(G, F)$ ,  $x \in G$ . To delovanje izhaja iz (desnega) delovanja grupe  $G$  na sebi in ga zato imenujemo **(desna) regularna upodobitev** grupe  $G$  nad  $F$ .

Upodobitev  $\rho$  grupe  $G$  pohvalimo s pridevnikom **zvesta**, kadar je injektivna, se pravi  $\ker \rho = 1$ . Trivialna upodobitev netrivialne grupe ni zvesta, sta pa vselej zvesti Cayleyjeva in desna regularna upodobitev.

## Kategorija upodobitev

Naj bo  $G$  grupa. Opazujmo neki njeni upodobitvi  $\rho_1$  in  $\rho_2$  nad vektorskima prostoroma  $V_1$  in  $V_2$ , obema nad poljem  $F$ . Ti dve upodobitvi lahko *primerjamo* med sabo, in sicer tako, da hkrati primerjamo vektorska prostora in delovanji grupe  $G$  na teh dveh prostorih.

Natančneje, **spletična**<sup>2</sup> med upodobitvama  $\rho_1$  in  $\rho_2$  je linearna preslika  $\Phi: V_1 \rightarrow V_2$ , za katero za vsak  $g \in G$  in  $v \in V_1$  velja<sup>3</sup>

$$\Phi(\rho_1(g) \cdot v) = \rho_2(g) \cdot \Phi(v).$$

**Zgled.** Opazujmo grupo  $\mathbf{Z}$  in dve njeni upodobitvi, ki smo jih že videli. Prva naj bo upodobitev

$$\rho: \mathbf{Z} \rightarrow \text{GL}(\mathbf{C}^2), \quad x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

<sup>1</sup>Prostor  $F[G]$  je vektorski prostor nad  $F$ , generiran z množico  $G$ . Običajno mu pravimo **grupna algebra**, saj ta prostor na naraven način podeduje operacijo množenja iz grupe  $G$ .

<sup>2</sup>Angleško *intertwiner*.

<sup>3</sup>Z opustitvijo eksplicitnih oznak za delovanja lahko ta pogoj pišemo krajše kot  $\Phi(gv) = g\Phi(v)$ .

druga pa naj bo kar trivialna upodobitev  $\mathbf{1}$  na prostoru  $\mathbf{C}$ . Predpišimo linearno preslikavo  $\Phi: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^2$  v standardni bazi z matriko  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Tedaj za vsak vektor  $v \in \mathbf{C}$  in vsako število  $x \in \mathbf{Z}$  velja

$$\Phi(x \cdot v) = \begin{pmatrix} xv \\ 0 \end{pmatrix} = x \cdot \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = x \cdot \Phi(v),$$

zato je  $\Phi$  spletična med  $\mathbf{1}$  in  $\rho$ .

Množica vseh spletičen med  $\rho_1$  in  $\rho_2$  je podmnožica množice linearnih preslikav  $\text{hom}(V_1, V_2)$ , za katero uporabimo oznako  $\text{hom}_G(\rho_1, \rho_2)$  ali kar  $\text{hom}_G(V_1, V_2)$ .

Za dano upodobitev  $\rho$  grupe  $G$  na vektorskem prostoru  $V$  je identična preslikava  $\text{id}_V$  seveda spletična med  $\rho$  in  $\rho$ . Prav tako lahko vsaki dve spletični  $\Phi_1$  med  $\rho_1$  in  $\rho_2$  ter  $\Phi_2$  med  $\rho_2$  in  $\rho_3$  skomponiramo do spletične  $\Phi_2 \circ \Phi_1$  med  $\rho_1$  in  $\rho_3$ . Množica vseh upodobitev dane grupe  $G$  nad poljem  $F$  torej tvoji **kategorijo upodobitev**, katere objekti so upodobitve grupe  $G$  nad  $F$ , morfizmi pa so spletične med upodobitvami. To kategorijo označimo z  $\text{Rep}_G$ .

## Izomorfnost upodobitev

Naj bo  $G$  grupa in  $F$  polje. Kadar je spletična  $\Phi: V_1 \rightarrow V_2$  med  $\rho_1$  in  $\rho_2$  obrnljiva kot linearna preslikava, je tudi njen inverz  $\Phi^{-1}$  spletična med  $\rho_2$  in  $\rho_1$ . V tem primeru spletični  $\Phi$  rečemo **izomorfizem** upodobitev  $\rho_1$  in  $\rho_2$ .

**Zgled.** Opazujmo ciklično grupo  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  za poljuben  $n > 1$ . Ta grupa naravno deluje na množici  $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ ,<sup>4</sup> od koder izhaja permutacijska upodobitev

$$\pi: \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \rightarrow \text{GL}(\mathbf{C}[\Omega]).$$

Grupa  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  ima tudi Cayleyjevo upodobitev,

$$\pi_{\text{Cay}}: \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \rightarrow \text{GL}(\mathbf{C}[\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}]).$$

Ti dve upodobitvi sta izomorfni. Vektorska prostora lahko namreč naravno primerjamo z bijektivno linearno preslikavo

$$\Phi: \mathbf{C}[\Omega] \rightarrow \mathbf{C}[\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}], \quad e_i \mapsto e_{\bar{i}},$$

kjer je  $i \in \Omega$ . Preslikava  $\Phi$  je spletična, saj za vsak  $\bar{x} \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  in  $i \in \Omega$  velja

$$\Phi(\bar{x} \cdot e_i) = \Phi(e_{x+i}) = e_{\overline{x+i}} = \bar{x} \cdot e_{\bar{i}} = \bar{x} \cdot \Phi(e_i).$$

V to kratko zgodbo lahko vključimo še desno regularno upodobitev

$$\rho_{\text{fun}}: \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \rightarrow \text{GL}(\text{fun}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, \mathbf{C})).$$

Vektorski prostor  $\text{fun}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, \mathbf{C})$  lahko na naraven način opremimo z bazo iz karakterističnih funkcij

$$1_{\bar{x}}: \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{C}, \quad \bar{y} \mapsto \begin{cases} 1 & \bar{y} = \bar{x}, \\ 0 & \text{sicer} \end{cases}$$

<sup>4</sup>Generator  $\bar{1} = 1 + n\mathbf{Z} \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  deluje kot cikel  $(1 \ 2 \ \dots \ n)$ .



za  $\bar{x} \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ . Predpišimo linearno preslikavo<sup>5</sup>

$$\Phi': \mathbf{C}[\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}] \rightarrow \text{fun}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, \mathbf{C}), \quad e_{\bar{x}} \mapsto 1_{-\bar{x}}.$$

Jasno je  $\Phi'$  bijektivna. Preverimo še, da je res spletična. Za vsaka  $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  velja

$$\Phi'(\bar{x} \cdot e_{\bar{y}}) = \Phi'(e_{\overline{x+y}}) = 1_{-\overline{x+y}}.$$

Po drugi strani za vsak  $\bar{z} \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  velja

$$(\bar{x} \cdot \Phi'(e_{\bar{y}}))(\bar{z}) = (\bar{x} \cdot 1_{-\bar{y}})(\bar{z}) = 1_{-\bar{y}}(\bar{z} + \bar{x}) = \begin{cases} 1 & \bar{z} = -\bar{x} + \bar{y}, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Torej je res  $\Phi'(\bar{x} \cdot e_{\bar{y}}) = \bar{x} \cdot \Phi'(e_{\bar{y}})$ . S tem je  $\Phi'$  izomorfizem med Cayleyjevo upodobitvijo in desno regularno upodobitvijo.

Eden pomembnih ciljev teorije upodobitev je razumeti vse upodobitve dane grupe do izomorfizma natančno. Kasneje bomo spoznali, kako lahko to v določenih<sup>6</sup> primerih *precej dobro* uresničimo.

## 1.2 Fundamentalne konstrukcije

Naj bo  $\rho$  upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $V$  nad poljem  $F$ . Premislili bomo, kako lahko prostor, grupo ali polje modificiramo na različne načine in tako dobimo neko drugo, novo upodobitev, oziroma kako lahko dano upodobitev vidimo kot rezultat kakšne od teh fundamentalnih konstrukcij.

### Podupodobitve

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ . Denimo, da obstaja vektorski podprostor  $W \leq V$ , ki je *invarianten* za delovanje grupe  $G$ , se pravi  $g \cdot w \in W$  za vsak  $g \in G, w \in W$ . V tem primeru upodobitev  $\rho$  inducira upodobitev  $\tilde{\rho}: G \rightarrow \text{GL}(W)$  in vložitev vektorskih prostorov  $\iota: W \rightarrow V$  je spletična. Upodobitvi  $\tilde{\rho}$  rečemo **podupodobitev** upodobitve  $\rho$ .

**Zgled.**

- Naj bo  $n$  naravno število. Opazujmo permutacijsko delovanje grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  na množici  $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ , ki porodi permutacijsko upodobitev na prostoru  $\mathbf{C}[\Omega]$  z baznimi vektorji  $e_i$  za  $i \in \Omega$ . Naj bo še  $e_0 = e_n$ .

Naj bo  $\zeta \in \mathbf{C}$  primitiven  $n$ -ti koren enote. Za  $j \in \Omega$  naj bo

$$f_j = \sum_{i \in \Omega} \zeta^{ij} e_i \in \mathbf{C}[\Omega].$$

Za vsak  $\bar{x} \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  velja

$$\bar{x} \cdot f_j = \sum_{i \in \Omega} \zeta^{ij} e_{\overline{x+i}} = \sum_{i \in \Omega} \zeta^{(i-\bar{x})j} e_i = \zeta^{-\bar{x}j} \cdot f_j,$$

zato je vsak podprostor  $\mathbf{C} \cdot f_j \leq \mathbf{C}[\Omega]$  invarianten za delovanje grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  in podupodobitev na tem podprostoru  $\mathbf{C} \cdot f_j$  je očitno izomorfna upodobitvi  $\chi_{-j}$  grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ . Na ta način smo sestavili  $n$  podupodobitev permutacijske in s tem regularne upodobitve ciklične grupe moči  $n$ .

<sup>5</sup>Pozor, karakteristična funkcija je zasidrana pri inverzu elementa  $\bar{x}$  v  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ .

<sup>6</sup>Na primer, *precej dobro* bomo opisali upodobitve poljubne končne grupe nad poljem kompleksnih števil.

- Naj bo  $G$  grupa in  $\rho$  njena upodobitev na prostoru  $V$ . Opazujemo množico vseh fiksnih vektorjev te upodobitve,

$$V^G = \{v \in V \mid \forall g \in G: g \cdot v = v\}.$$

Množica  $V^G$  je vektorski podprostor prostora  $V$ , ki je invarianten za delovanje grupe  $G$ . Torej je  $\tilde{\rho}: G \rightarrow \text{GL}(V^G)$  podupodobitev upodobitve  $\rho$ . Na prostoru  $V^G$  po definiciji grupa  $G$  deluje trivialno, torej je  $\tilde{\rho}$  izomorfna trivialni upodobitvi  $\mathbf{1}^{\dim V^G}$ .

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  grupa in  $F$  polje. Določi upodobitvi  $F[G]^G$  in  $\text{fun}(G, F)^G$ .

Prostor  $V^G$  lahko razumemo še na naslednji alternativen način, ki nam bo prišel zelo prav v nadaljevanju. Iz vsakega vektorja  $v \in V^G$  izhaja injektivna spletična

$$\Phi_v: \mathbf{1} \rightarrow V, \quad x \mapsto xv$$

med  $\mathbf{1}$  in  $\rho$ . S tem je določena preslikava  $V^G \rightarrow \text{hom}_G(\mathbf{1}, V)$ . Ta preslikava ima jasen inverz, ki spletični  $\Phi \in \text{hom}_G(\mathbf{1}, V)$  priredi  $\Phi(1)$ . Na ta način lahko identificiramo prostor  $V^G$  z množico spletičen  $\text{hom}_G(\mathbf{1}, V)$ .

- Naj bo  $G$  grupa in  $\rho$  njena upodobitev na prostoru  $V$ . Predpostavimo, da obstaja vektor  $v \in V$ , ki je lastni vektor vsake linearne preslikave  $\rho(g)$  za  $g \in G$ .

Torej za vsak  $g \in G$  obstaja  $\chi(g) \in F$ , da je  $\rho(g) \cdot v = \chi(g)v$ . Na ta način dobimo funkcijo  $\chi: G \rightarrow F$ , se pravi element prostora  $\text{fun}(G, F)$ . Ta funkcija ni čisto poljubna; ker je  $\rho$  upodobitev, je  $\chi$  nujno *homomorfizem* iz grupe  $G$  v grupo  $F^*$ . Torej je  $\chi$  pravzaprav upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $F$  razsežnosti 1.<sup>7</sup>

Zdaj kot v zadnjem zgledu s predpisom

$$\Phi: F \rightarrow V, \quad x \mapsto xv$$

dobimo injektivno spletično med  $\chi$  in  $\rho$ , torej lahko vidimo  $\chi$  kot enorazsežno podupodobitev upodobitve  $\rho$ . Hkrati lahko iz te spletične obnovimo podatek o skupnem lastnem vektorju  $v$  in upodobitvi  $\chi$ .<sup>8</sup>

Torej smo vzpostavili bijektivno korespondenco med množico enorazsežnih podupodobitev upodobitve  $\rho$  in skupnimi lastnimi vektorji vseh preslikav  $\rho(g)$  za  $g \in G$ .

Poseben primer te korespondence je zadnji zgled. Množico enorazsežnih trivialnih podupodobitev upodobitve  $\rho$  lahko identificiramo z množico neničelnih spletičen  $\text{hom}_G(\mathbf{1}, V) \setminus \{x \mapsto 0\}$ , ta pa ustreza skupnim lastnim vektorjem  $\rho(g)$  za  $g \in G$  z lastno vrednostjo 1, kar je ravno množica  $V^G \setminus \{0\}$ .

- Naj bo  $G$  grupa in  $F$  polje. Opazujemo Cayleyjevo upodobitev  $\pi_{\text{Cay}}$  na  $F[G]$  in desno regularno upodobitev  $\rho_{\text{fun}}$  na  $\text{fun}(G, F)$ . Trdimo, da je  $\pi_{\text{Cay}}$  podupodobitev upodobitve  $\rho_{\text{fun}}$ .

<sup>7</sup>Kadar je  $\chi(g) = 1$  za vsak  $g \in G$ , je ta upodobitev izomorfna  $\mathbf{1}$ . Kadar je  $\chi(g) \neq 1$  za vsaj kak  $g \in G$ , pa ta upodobitev ni trivialna.

<sup>8</sup>Namreč,  $v = \Phi(1)$  in  $\chi(g) = \rho(g) \cdot 1$ .

V ta namen predpišimo linearno preslikavo<sup>9</sup>

$$\Phi: F[G] \rightarrow \text{fun}(G, F), \quad e_g \mapsto 1_{g^{-1}}$$

za  $g \in G$ . Jasno je  $\Phi$  injektivna preslikava. Hkrati za vse  $g, h, x \in G$  velja

$$\Phi(\pi_{\text{Cay}}(g) \cdot e_h) = \Phi(e_{gh}) = 1_{h^{-1}g^{-1}}$$

in

$$(\rho_{\text{fun}}(g) \cdot \Phi(e_h))(x) = 1_{h^{-1}}(xg) = 1_{g^{-1}h^{-1}}(x),$$

zato je  $\Phi$  tudi spletična.

Kadar je grupa  $G$  končna, sta prostora  $F[G]$  in  $\text{fun}(G, F)$  enake razsežnosti, zato sta v tem primeru upodobitvi  $\pi_{\text{Cay}}$  in  $\rho_{\text{fun}}$  izomorfni. Kadar je grupa  $G$  neskončna, pa preslikava  $\Phi$  vsekakor ni bijektivna.<sup>10</sup> V tem primeru upodobitvi nista izomorfni.<sup>11</sup>

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$ . Naj bo  $N$  podgrupa edinka v  $G$ . Premisli, da množica fiksnih točk

$$V^N = \{v \in V \mid \forall n \in N: \rho(n) \cdot v = v\}$$

tvori podupodobitev upodobitve  $\rho$ , ki jo lahko identificiraš z množico  $\text{hom}_N(\mathbf{1}, V)$ .

## Jedro, slika, kvocient

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$ . Ogledali smo si že, kako za vsak  $G$ -invarianten podprostor  $W \leq V$  dobimo podupodobitev upodobitve  $\rho$ . Sorodno lahko za vsak  $G$ -invarianten podprostor  $W \leq V$  tvorimo **kvocient**  $V/W$ , na njem linearno deluje grupa  $G$  s predpisom

$$G \rightarrow \text{GL}(V/W), \quad g \mapsto (v + W \mapsto \rho(g) \cdot v + W)$$

za  $v \in V$ .

Na vse do zdaj omenjene konstrukcije lahko gledamo na skupen način, in sicer s pomočjo spletične  $\Phi$ , ki vlaga prostor  $W$  v  $V$ . Ni težko preveriti, da so standardne konstrukcije, ki jih lahko uporabimo na spletičnih vektorskih prostorov, na naraven način opremljene z linearnim delovanjem grupe  $G$ .

**Trditev.** Naj bo  $\Phi$  spletična upodobitev grupe  $G$ . Tedaj prostori  $\ker \Phi$ ,  $\text{im } \Phi$ , coker  $\Phi$  podedujejo linearno delovanje grupe  $G$ .

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa in  $\rho$  njena upodobitev na prostoru  $V$ . Podprostor prostora  $V$ , na katerem grupa  $G$  deluje trivialno, je vselej  $G$ -invarianten. Največji tak podprostor je ravno prostor vseh fiksnih vektorjev  $V^G$ . Videli smo že, da lahko ta prostor identificiramo z množico spletičen  $\text{hom}_G(\mathbf{1}, V)$ .

Oglejmo si sedaj še dual zgodnje konstrukcije. Naj bo  $V_1 = \langle \rho(g) \cdot v - v \mid v \in V, g \in G \rangle$ . Prostor  $V_1$  je  $G$ -invarianten podprostor prostora  $V$ , zato

<sup>9</sup>Poseben primer te preslikave smo videli za grupo  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ , kjer smo premislili, da je celo bijektivna.

<sup>10</sup>Slika  $\text{im } \Phi$  namreč sestoji iz funkcij, ki so neničelne le v končno mnogo elementih grupe  $G$ .

<sup>11</sup>To sledi na primer iz dejstva, da prostora  $F[G]^G$  in  $\text{fun}(G, F)^G$  nista izomorfna.

kvocient  $V/V_1$  podeduje linearno delovanje grupe  $G$ . Po konstrukciji je to delovanje trivialno in prostor  $V/V_1$  je največji kvocient prostora  $V$ , na katerem grupa  $G$  deluje trivialno. Kvocient  $V/V_1$  označimo z  $V_G$  in mu pravimo **prostor koinvariant** upodobitve  $\rho$ .

**Domača naloga.** Izračunaj prostor koinvariant regularne upodobitve ciklične grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ .

Prostor koinvariant je po konstrukciji dualen prostoru fiksnih vektorjev, zato lahko nanj prenesemo tudi interpretacijo s spletičnimi. Opazujmo množico  $\text{hom}_G(V, \mathbf{1})$ . Spletične iz te množice so ravno homomorfizmi  $\lambda: V \rightarrow F$  z lastnostjo  $\lambda(\rho(g) \cdot v) = \lambda(v)$  za vsaka  $v \in V$ ,  $g \in G$ , kar je ekvivalentno pogoju  $\lambda(V_1) = 0$ . Vsako tako spletično lahko zato interpretiramo kot linearno preslikavo iz  $V/V_1 = V_G$  v  $F$ . Na ta način je vzpostavljena bijektivna korespondenca med množico spletičen  $\text{hom}_G(V, \mathbf{1})$  in množico linearnih preslikav  $\text{hom}_F(V_G, F)$ , slednja množica pa je ravno dual  $V_G^*$  prostora koinvariant  $V_G$ .

## Direktna vsota

Naj ima grupa  $G$  družino upodobitev  $\{\rho_i\}_{i \in I}$  na vektorskih prostorih  $\{V_i\}_{i \in I}$ . Tedaj lahko tvorimo direktno vsoto vektorskih prostorov  $\bigoplus_{i \in I} V_i$ , ki je opremljena z linearnim delovanjem

$$\bigoplus_{i \in I} \rho_i: G \rightarrow \text{GL}\left(\bigoplus_{i \in I} V_i\right), \quad g \mapsto \left( \sum_{i \in I} v_i \mapsto \sum_{i \in I} \rho_i(g) \cdot v_i \right).$$

Na ta način dobimo **direktno vsoto** upodobitev  $\bigoplus_{i \in I} \rho_i$ . Pri tem je vsaka od upodobitev  $\rho_i$  podupodobitev te direktne vsote.

**Zgled.**

- Opazujmo permutacijsko upodobitev  $\pi$  grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  na prostoru  $\mathbf{C}[\Omega]$ , kjer je  $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ . Premislili smo že, da ima ta upodobitev  $n$  podupodobitev. Za vsak  $j \in \Omega$  imamo upodobitev na podprostoru  $\mathbf{C} \cdot f_j$ , ki je izomorfna upodobitvi  $\chi_{-j}$ . Ker je množica vektorjev  $\{f_j \mid j \in \Omega\}$  linearno neodvisna,<sup>12</sup> lahko permutacijsko upodobitev torej zapišemo kot direktno vsoto  $\pi = \bigoplus_{j \in \Omega} \chi_j$ .

**Domača naloga.** Prepričaj se, da so upodobitve  $\chi_j$  za  $j \in \Omega$  grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  med sabo paroma neizomorfne.

- Opazujmo permutacijsko upodobitev simetrične grupe  $S_3$  na prostoru  $\mathbf{R}[\{1, 2, 3\}] = \mathbf{R}^3$ . Delovanje grupe  $S_3$  ohranja vektor  $e_1 + e_2 + e_3$ , zato ima ta upodobitev trivialno enorazsežno podupodobitev, dano s podprostorom  $\langle e_1 + e_2 + e_3 \rangle$ . Eden od komplementov tega podprostora je  $\langle e_1 - e_2, e_2 - e_3 \rangle$ , ki je hkrati  $S_3$ -invarianten podprostor.<sup>13</sup> Če označimo  $u_1 = e_1 - e_2$  in  $u_2 = e_2 - e_3$ , lahko slednjo upodobitev opišemo s homomorfizmom

$$\rho: S_3 \rightarrow \text{GL}(\langle u_1, u_2 \rangle), \quad (1\ 2) \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1\ 2\ 3) \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

<sup>12</sup>Prehodna matrika iz baze  $e_i$  v bazo  $f_j$  je ravno Vandermondova matrika.

<sup>13</sup>Na primer, generator  $(1\ 3\ 2)$  preslika vektor  $e_1 - e_2$  v  $e_3 - e_1$ , kar lahko zapišemo kot  $-(e_1 - e_2) - (e_2 - e_3)$ .

Permutacijska upodobitev  $S_3$  je zato direktna vsota enorazsežne podupodobitve  $\mathbf{1}$  in dvorazsežne podupodobitve  $\rho$ .

Premislamo, da upodobitve  $\rho$  ne moremo zapisati kot direktne vsote svojih pravih podupodobitev. V ta namen opazujemo njene morebitne enorazsežne podupodobitve. Premislili smo že, da te ustrezajo skupnim lastnim vektorjem vseh preslikav  $\rho(x)$  za  $x \in S_3$ . Lastna vektorja  $\rho((1\ 2))$  sta  $u_1$  in  $u_1 + 2u_2$ . Noben od teh dveh vektorjev ni hkrati lastni vektor  $\rho((1\ 2\ 3))$ . Torej je upodobitev  $\rho$  stopnje 2, hkrati pa nima enorazsežnih podupodobitev in je torej ne moremo nadalje razstaviti.

Direktna vsota je najbolj preprost način, kako lahko iz danih upodobitev sestavimo novo upodobitev. V nadaljevanju bomo zato veliko časa posvetili obratnemu problemu: dano upodobitev bomo kot v zadnjem zgledu skušali razstaviti na direktno vsoto čim bolj enostavnih podupodobitev.

## Tenzorski produkt

Naj ima grupa  $G$  upodobitvi  $\rho_1$  in  $\rho_2$  na prostorih  $V_1$  in  $V_2$ . Tedaj lahko tvorimo **tenzorski produkt** vektorskih prostorov  $V_1 \otimes V_2$ , ki je naravno opremljen z linearnim delovanjem

$$\rho_1 \otimes \rho_2: G \rightarrow \text{GL}(V_1 \otimes V_2), \quad g \mapsto (v_1 \otimes v_2 \mapsto \rho_1(g)v_1 \otimes \rho_2(g)v_2).$$

**Zgled.** Opazujemo simetrično grupo  $S_3$ . Ogledali smo si že njeno permutacijsko upodobitev na prostoru  $\mathbf{R}^3$ , ki smo jo razstavili na direktno vsoto trivialne upodobitve  $\mathbf{1}$  in dvorazsežne upodobitve  $\rho$ . Poleg teh dveh ima grupa  $S_3$  še eno zanimivo upodobitev, ki izračuna predznak dane permutacije, se pravi

$$\text{sgn}: S_3 \rightarrow \text{GL}(\mathbf{R}) = \mathbf{R}^*, \quad \sigma \mapsto \text{sgn}(\sigma).$$

To je netrivialna enorazsežna upodobitev.

Tvorimo tenzorski produkt upodobitev  $\rho$  in  $\text{sgn}$ . Dobimo upodobitev na vektorskem prostoru  $\mathbf{R} \otimes \mathbf{R}^2$ , ki ga lahko naravno identificiramo s prostorom  $\mathbf{R}^2$ . V tem smislu je upodobitev  $\text{sgn} \otimes \rho$  izomorfna dvorazsežni upodobitvi

$$S_3 \rightarrow \text{GL}(\mathbf{R}^2), \quad \sigma \mapsto (v \mapsto \text{sgn}(\sigma) \cdot \rho(\sigma) \cdot v).$$

**Domača naloga.** Dokaži, da sta upodobitvi  $\rho$  in  $\text{sgn} \otimes \rho$  izomorfni.

Naj ima grupa  $G$  upodobitev na prostoru  $V$ . Tedaj lahko tvorimo **tenzorske potence**  $V^{\otimes n}$  za  $n \in \mathbf{N}_0$ . Vsaka od teh tvori upodobitev grupe  $G$ . Na prostoru  $V^{\otimes n}$  deluje simetrična grupa  $S_n$ , in sicer na dva načina. Prvi način izhaja iz permutacijske upodobitve grupe  $S_n$ , in sicer dobimo delovanje

$$\pi: S_n \rightarrow \text{GL}(V^{\otimes n}), \quad \sigma \mapsto (v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto v_{\sigma(1)} \otimes v_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)}).$$

Drugi način delovanja grupe  $S_n$  na tenzorski potenci pa je  $\text{sgn} \otimes \pi$ , pri katerem delovanje  $\pi$  še utežimo s predznakom delujoče permutacije. Prostor koinvariant upodobitve  $\pi$  je

$$\text{Sym}^n(V) = \frac{V^{\otimes n}}{\langle v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_n - v_{\sigma(1)} \otimes v_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)} \mid v_i \in V, \sigma \in S_n \rangle},$$

imenujemo ga **simetrična potenca** upodobitve  $G$  na  $V$ . Analogno prostor koinvariant upodobitve  $\text{sgn} \otimes \pi$  označimo z  $\wedge^n(V)$  in imenujemo **alternirajoča potenca**. Obe potenci sta seveda upodobitvi grupe  $G$ . Vse potence hkrati zajamemo z direktnima vsotama

$$\text{Sym}(V) = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}_0} \text{Sym}^n(V) \quad \text{in} \quad \wedge V = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}_0} \wedge^n(V).$$

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  grupa s kompleksno upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  razsežnosti  $\deg(\rho) < \infty$ . Dokaži, da je upodobitev  $G$  na alternirajoči potenci  $\wedge^{\deg(\rho)} V$  izomorfna enorazsežni upodobitvi  $G \rightarrow \mathbf{C}^*$ ,  $g \mapsto \det(\rho(g))$ .

## Dual

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  nad poljem  $F$ . Tvorimo lahko **dualen prostor**  $V^* = \text{hom}(V, F)$ , ki je naravno opremljen z linearnim delovanjem

$$\rho^*: G \rightarrow \text{GL}(V^*), \quad g \mapsto (\lambda \mapsto (v \mapsto \lambda(\rho(g^{-1}) \cdot v)))$$

za  $\lambda \in V^*$ ,  $v \in V$ . Na ta način dobimo **dualno upodobitev**  $\rho^*$  upodobitve  $\rho$ .

Za funkcional  $\lambda \in V^*$  in vektor  $v \in V$  včasih uporabimo oznako  $\langle \lambda, v \rangle$  za aplikacijo  $\lambda(v)$ . S to oznako lahko zapišemo definicijo dualne upodobitve kot

$$\langle \rho^*(g) \cdot \lambda, v \rangle = \langle \lambda, \rho(g^{-1}) \cdot v \rangle.$$

**Zgled.** Opazujmo grupo  $\mathbf{Z}$  in za parameter  $a \in \mathbf{C}$  njeno upodobitev

$$\chi_a: \mathbf{Z} \rightarrow \text{GL}(\mathbf{C}), \quad x \mapsto e^{ax}.$$

Za dualno upodobitev  $\chi_a^*$ , funkcional  $\lambda \in \mathbf{C}^*$  in vektor  $z \in \mathbf{C}$  velja

$$\langle \chi_a^*(x) \cdot \lambda, z \rangle = \langle \lambda, \chi_a(-x) \cdot z \rangle = \lambda(e^{-ax} \cdot z).$$

Funkcionalni v dualnem prostoru  $\mathbf{C}^*$  so skalarna množenja s kompleksnimi števili. Če funkcionalu  $\lambda$  ustreza število  $l \in \mathbf{C}$ , dobimo torej

$$\chi_a^*(x) \cdot l = e^{-ax} \cdot l.$$

Dualna upodobitev  $\chi_a^*$  je torej enorazsežna upodobitev, ki je izomorfna upodobitvi  $\chi_{-a}$ .

**Domača naloga.**

- Naj bosta  $\rho_1, \rho_2$  upodobitvi grupe  $G$ . Dokaži, da je

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)^* \cong \rho_1^* \oplus \rho_2^* \quad \text{in} \quad (\rho_1 \otimes \rho_2)^* \cong \rho_1^* \otimes \rho_2^*.$$

- Naj bo  $\rho$  upodobitev grupe  $G$  z  $\deg(\rho) < \infty$ . Tedaj je  $(\rho^*)^* \cong \rho$ .

Naj bo zdaj  $G$  grupa z dvema upodobitvama  $\rho$  in  $\sigma$  na prostorih  $V$  in  $W$ . **Prostor linearnih preslikav**  $\text{hom}(V, W)$  je naravno opremljen z linearnim delovanjem

$$\text{hom}(\rho, \sigma): G \rightarrow \text{GL}(\text{hom}(V, W)), \quad g \mapsto (\Phi \mapsto (v \mapsto \sigma(g) \cdot \Phi \cdot \rho(g^{-1}) \cdot v)).$$

Invariante tega delovanja sestojijo iz linearnih preslikav, ki so invariantne glede na predpisano delovanje grupe  $G$ , se pravi ravno iz spletičen med  $\rho$  in  $\sigma$ . S simboli je torej  $\text{hom}(V, W)^G = \text{hom}_G(V, W)$ .

**Trditev.** Naj bo  $G$  grupa z upodobitvama  $\rho$  in  $\sigma$ . Predpostavimo, da je  $\deg(\sigma) < \infty$ . Tedaj je  $\text{hom}(\rho, \sigma) \cong \rho^* \otimes \sigma$ .

*Dokaz.* Naj bo  $\rho$  upodobitev na prostoru  $V$  in  $\sigma$  upodobitev na prostoru  $W$ . Izomorfizem med vektorskima prostoroma  $V^* \otimes W$  in  $\text{hom}(V, W)$  podaja linearna preslikava

$$V^* \otimes W \rightarrow \text{hom}(V, W), \quad \lambda \otimes w \mapsto (v \mapsto \lambda(v) \cdot w).$$

Ni težko preveriti, da je ta preslikava spletična.  $\square$

## Skalarji

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  nad poljem  $F$ . Naj bo  $E$  razširitev polja  $F$ . Tedaj je prostor  $E \otimes V$  naravno opremljen z linearnim delovanjem

$$E \otimes \rho: G \rightarrow \text{GL}(E \otimes V), \quad g \mapsto (e \otimes v \mapsto e \otimes \rho(g) \cdot v).$$

Ta postopek konstrukcije prostora  $E \otimes V$  imenujemo **razširitev skalarjev**. Dano upodobitev lahko razširimo do ugodnejših skalarjev<sup>14</sup>, lahko pa tudi dano upodobitev nad velikim poljem  $E$  gledamo kot razširitev skalarjev neke upodobitve nad preprostejšim poljem  $F$ .<sup>15</sup> V tem slednjem primeru rečemo, da je dana upodobitev **definirana nad poljem  $F$** . Včasih nam uspe najti celo preprost *podkolobar* polja  $F$ , nad katerim je definirana dana upodobitev.

**Zgled.** Opazujemo grupo  $S_3$  in njeno permutacijsko upodobitev na realnem prostoru  $\mathbf{R}[\{1, 2, 3\}]$ . Poznamo že njeno dvorazsežno upodobitev  $\rho$  na podprostoru  $\langle e_1 - e_2, e_2 - e_3 \rangle$ , ki nima enorazsežnih podupodobitev. Ta je definirana z matrikami, ki imajo zgolj celoštevilске koeficiente. Upodobitev  $\rho$  je zato definirana nad *kolobarjem*  $\mathbf{Z}$ . To upodobitev lahko zato *projiciramo* s homomorfizmom kolobarjev  $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$  za poljubno praštevilo  $p$  do upodobitve

$$S_3 \rightarrow \text{GL}_2(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}), \quad (1\ 2) \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1\ 2\ 3) \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

ki je definirana nad *končnim* poljem  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ . Pri  $p = 3$  ima ta projicirana upodobitev enorazsežen invarianten podprostor  $\langle e_1 + e_2 + e_3 \rangle$ . Projekcije nam lahko torej dano upodobitev dodatno razstavijo.

Kadar imamo opravka s konkretnim poljem  $F$ , lahko dano upodobitev modificiramo tudi z **avtomorfizmi polja**. Te si najlažje predstavljamo po izbiri baze vektorskega prostora. Če je  $\sigma \in \text{Aut}(F)$ , dobimo iz dane upodobitve  $\rho: G \rightarrow \text{GL}_n(F)$  modificirano upodobitev

$$\rho^\sigma: G \rightarrow \text{GL}_n(F), \quad g \mapsto \rho(g)^\sigma,$$

pri kateri vsak člen matrike  $\rho(g)$  preslikamo z avtomorfizmom  $\sigma$ .

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa s kompleksno upodobitvijo  $\rho$ . Kompleksno konjugiranje je avtomorfizem polja  $\mathbf{C}$ , zato lahko s konjugiranjem členov matrik tvorimo **konjugirano upodobitev**  $\bar{\rho}$ .

<sup>14</sup>Na primer polja kompleksnih števil.

<sup>15</sup>Na primer  $E = \mathbf{C}$  in  $F = \mathbf{Q}$ .



## Restrikcija

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ . Kadar je na voljo še ena grupa  $H$  s homomorfizmom  $\phi: H \rightarrow G$ , lahko upodobitev  $\rho$  sklopimo s  $\phi$  in dobimo upodobitev  $\rho \circ \phi$  grupe  $H$  na prostoru  $V$ . Temu postopku pridobivanja upodobitev grupe  $H$  iz upodobitev grupe  $G$  pravimo **restrikcija**, pri tem pa novo upodobitev  $\rho \circ \phi$  označimo kot  $\text{Res}_H^G(\rho)$ . Predstavljamo si, da smo upodobitev  $\rho$  *potegnili nazaj* vzdolž homomorfizma  $\phi$ . Restrikcija je funktor iz kategorije  $\text{Rep}_G$  v kategorijo  $\text{Rep}_H$ .

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa s podgrupo edinko  $N$ . Tvorimo kvocientni homomorfizem  $\phi: G \rightarrow G/N$ . Vsaki upodobitvi grupe  $G/N$  lahko z restrikcijo priredimo upodobitev grupe  $G$ . Vsaka taka pridobljena upodobitev grupe  $G$  vsebuje podgrupo  $N$  v svojem jedru. Na ta način dobimo bijektivno korespondenco med upodobitvami grupe  $G/N$  in upodobitvami grupe  $G$ , ki so trivialne na  $N$ .

Običajno ni res, da je vsaka upodobitev grupe  $G$  trivialna na  $N$ , se pa to lahko zgodi v kakšnih posebnih primerih. Na primer, *enorazsežne* upodobitve grupe  $G$  nad poljem  $F$  so homomorfizmi iz  $G$  v  $F^*$ , kar ravno ustreza homomorfizmu iz abelove grupe  $G/[G, G]$  v  $F^*$ . Vsaka enorazsežna upodobitev grupe  $G$  je torej trivialna na  $[G, G]$ .

Za konkreten primer si oglejmo simetrično grupo  $S_n$ . Njene kompleksne enorazsežne upodobitve ustrezajo homomorfizmu  $S_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ . Ker je  $[S_n, S_n] = A_n$ , opazujemo torej homomorfizme  $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}^*$ . Na voljo sta le dva taka homomorfizma: trivialen in netrivialen (ki preslika generator grupe  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  v  $-1 \in \mathbb{C}^*$ ). Prvi ustreza trivialni upodobitvi  $\mathbf{1}$ , drugi pa ustreza predznačni upodobitvi  $\text{sgn}$ .

Kadar imamo na voljo tri grupe, povezane s homomorfizmoma  $\phi_2: H_2 \rightarrow H_1$  in  $\phi_1: H_1 \rightarrow G$ , lahko restrikcijo izvedemo dvakrat zaporedoma. Upodobitvi  $\rho$  v  $\text{Rep}_G$  tako priredimo upodobitev  $\text{Res}_{H_2}^{H_1}(\text{Res}_{H_1}^G(\rho))$  v  $\text{Rep}_{H_2}$ . Od grupe  $H_2$  do  $G$  imamo neposredno povezavo prek homomorfizma  $\phi_1 \circ \phi_2$ , s čimer dobimo upodobitev  $\text{Res}_{H_2}^G(\rho)$ . Ni težko preveriti, da sta dobljeni upodobitvi izomorfni. Tej lastnosti restrikcije pravimo **tranzitivnost**.

## Indukcija

Naj bo kot zgoraj  $G$  grupa in  $H$  še ena grupa s homomorfizmom  $\phi: H \rightarrow G$ . **Indukcija** je postopek, ki s pomočjo homomorfizma  $\phi$  upodobitvi  $\rho$  grupe  $H$  priredi upodobitev grupe  $G$ . Indukcija torej deluje ravno v obratno smer kot restrikcija in nam omogoča, da upodobitev  $\rho$  *potisnemo naprej* vzdolž homomorfizma  $\phi$ . Ta postopek je nekoliko bolj zapleten kot restrikcija.

Začnimo z upodobitvijo  $\rho: H \rightarrow \text{GL}(V)$ . Konstruirali bomo prostor, na katerem deluje grupa  $G$ . Odskočna deska za to bo regularna upodobitev grupe  $G$ , katere vektorski prostor je prostor funkcij  $\text{fun}(G, F)$ . Ta prostor razširimo s prostorom  $V$  do prostora funkcij

$$\text{fun}(G, V) = \{f \mid f: G \rightarrow V\},$$

na katerem linearno deluje grupa  $G$  z analogom regularne upodobitve, in sicer kot

$$g \cdot f = (x \mapsto f(xg))$$

za  $g \in G$ ,  $f \in \text{fun}(G, V)$ . Po drugi strani na tej množici deluje tudi grupa  $H$ , in sicer na dva načina: prvič prek homomorfizma  $\phi$  in pravkar opisanega



delovanja grupe  $G$ , drugič pa prek svojega delovanja  $\rho$  na prostoru  $V$ . Ko ti dve delovanji združimo, dobimo delovanje grupe  $H$  na prostoru funkcij  $\text{fun}(G, V)$  s predpisom

$$h \cdot f = (x \mapsto \rho(h) \cdot f(\phi(h^{-1}) \cdot x))$$

za  $h \in H$ ,  $f \in \text{fun}(G, V)$ .<sup>16</sup> Opazujemo invariantni podprostor

$$\text{fun}(G, V)^H = \{f \in \text{fun}(G, V) \mid \forall h \in H, x \in G. \rho(h) \cdot f(x) = f(\phi(h) \cdot x)\}.$$

Ker grupa  $G$  deluje na  $\text{fun}(G, V)$  prek množenja z *desne*, pogoj pripadnosti invariantam  $\text{fun}(G, V)^H$  pa je izražen prek množenja z *leve*, je podprostor  $\text{fun}(G, V)^H$  avtomatično  $G$ -invarianten. S tem smo dobili upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $\text{fun}(G, V)^H$ . To je zelena **inducirana upodobitev**. Zanj uporabimo oznako  $\text{Ind}_H^G(\rho)$ .

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa z vložitvijo  $\phi: 1 \rightarrow G$  trivialne podgrupe. Vsaka upodobitev trivialne grupe nad poljem  $F$  je trivialna. Iz enorazsežne trivialne upodobitve **1** dobimo prostor funkcij  $\text{fun}(G, F)$ , na katerem grupa  $G$  deluje z regularno upodobitvijo. Inducirana upodobitev je v tem primeru torej kar regularna, se pravi  $\text{Ind}_1^G(\mathbf{1}) = \rho_{\text{fun}}$ .

Inducirano upodobitev  $\text{Ind}_H^G(\rho) = \text{fun}(G, V)^H$  smo konstruirali z invariantami grupe  $H$ . To pomeni, da vektorji v tem prostoru niso poljubne funkcije v  $\text{fun}(G, V)$ , temveč zadoščajo določenim restriktivnim pogojem. Te funkcije so določene z vrednostmi, ki jih zavzamejo na predstavnikih desnih odsekov  $\text{im } \phi \backslash G$ ,<sup>17</sup> in te vrednosti pripadajo podprostoru  $V^{\ker \phi}$ .<sup>18</sup>

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  in naj bo  $\phi = \text{id}_G$ . Tedaj je vsaka funkcija  $f \in \text{fun}(G, V)^G$  določena že z vrednostjo  $f(1)$ . Dodatnih restrikcij za to vrednost ni, zato dobimo izomorfizem vektorskih prostorov

$$\text{fun}(G, V)^G \rightarrow V, \quad f \mapsto f(1),$$

ki je spletična glede na regularno delovanje  $G$  na  $\text{fun}(G, V)$ . S tem imamo torej izomorfizem upodobitev  $\text{Ind}_G^G(\rho) \cong \rho$ .

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  in naj bo  $\phi: G \rightarrow G/N$  kvocientna projekcija za neko podgrupo edinko  $N$  v  $G$ . Dokaži, da je  $\text{Ind}_G^{G/N}(\rho)$  izomorfna upodobitvi  $G/N$  na prostoru  $V^N$ , ki izhaja iz upodobitve  $\rho$ .

Najpomembnejši primer indukcije, čeravno ne tudi najbolj preprost, je **indukcija iz podgrupe končnega indeksa**. Naj bo  $G$  grupa s podgrupo  $H$  in naj bo  $\phi$  vložitev  $H$  v  $G$ . Predpostavimo, da je  $|G : H| < \infty$ . Naj bo  $\rho$  upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $V$ . Premislimo, kako izgleda upodobitev  $\text{Ind}_H^G(\rho)$ .

Naj bo  $R$  neka izbrana množica predstavnikov desnih odsekov  $H$  v  $G$ . Vsaka funkcija  $f \in \text{fun}(G, V)^H$  je določena z vrednostmi  $f(r)$  za  $r \in R$  in

<sup>16</sup>Delovanje  $H$  na  $\text{fun}(G, V)$  je konstruirano analogno delovanju grupe na prostoru linearnih preslikav.

<sup>17</sup>Če je  $R$  množica predstavnikov desnih odsekov  $\text{im } \phi$  v  $G$  in če že poznamo vrednosti  $f \in \text{fun}(G, V)$  na množici  $R$ , potem lahko vsako drugo vrednost  $f$  izračunamo kot  $f(x \cdot r) = \rho(y) \cdot f(r)$  za  $x = \phi(y) \in \text{im } \phi$ .

<sup>18</sup>Če je  $f \in \text{fun}(G, V)^H$ , potem pogoj  $H$ -invariantnosti uporabimo z elementi  $h \in \ker \phi$  in dobimo  $\rho(h) \cdot f(x) = f(x)$ , torej je  $f \in V^h$ .

dodatnih restrikcij za te vrednosti ni, zato dobimo izomorfizem vektorskih prostorov<sup>19</sup>

$$\Phi: \text{fun}(G, V)^H \rightarrow \text{fun}(R, V), \quad f \mapsto (r \mapsto f(r)).$$

Da dobimo spletično, moramo posplošitev regularnega delovanja  $G$  na  $\text{fun}(G, V)$  prenesti prek linearnega izomorfizma  $\Phi$  na desno stran. V ta namen naj bo  $v \in V$  in  $f \in \text{fun}(G, V)^H$  z lastnostjo  $f(r_0) = v$  in  $f(r) = 0$  za  $r \in R \setminus \{r_0\}$ . Za vsak  $g \in G$  mora tako veljati

$$g \cdot \left( r \mapsto \begin{cases} v & r = r_0, \\ 0 & r \neq r_0 \end{cases} \right) = \Phi(g \cdot f) = \Phi(x \mapsto f(xg)).$$

Za  $x \in R$  z lastnostjo  $xg \in Hr_0$ , se pravi  $x = hr_0g^{-1}$  za nek  $h \in H$ , velja  $f(xg) = f(hr_0) = \rho(h) \cdot v$ . Seveda je  $|R \cap Hr_0g^{-1}| = 1$ , torej obstaja natanko en tak  $x$ . Za  $x \in R$  z lastnostjo  $xg \notin Hr_0$  pa velja  $f(xg) = 0$ . S tem je

$$g \cdot \left( r \mapsto \begin{cases} v & r = r_0, \\ 0 & r \neq r_0 \end{cases} \right) = \left( r \mapsto \begin{cases} \rho(h) \cdot v & r = hr_0g^{-1} \text{ za nek } h \in H, \\ 0 & r \notin Hr_0g^{-1} \end{cases} \right).$$

Da bo preslikava  $\Phi$  spletična, moramo na  $\text{fun}(R, V)$  torej uvesti tako delovanje grupe  $G$ , ki dan vektor  $v$  pri vnosu  $r_0 \in R$  preslika tako, da najprej izračuna odsek elementa  $r_0g^{-1}$  po  $H$ , ta element zapiše kot  $r_0g^{-1} = h^{-1}r$  za  $h \in H$ ,  $r \in R$ , nato pa na vektor  $v$  deluje z  $\rho(h)$  in ga hkrati prestavi k vnosu  $r$ .

Opisan postopek si lahko nekoliko lažje predstavljamo tako, da množico  $\text{fun}(R, V)$  identificiramo z direktno vsoto  $\bigoplus_{r \in R} Vr$ , kjer je  $Vr$  kopija vektorskega prostora  $V$  pri komponenti  $r$ . Element  $g \in G$  deluje na vektorju  $vr_0 \in Vr_0$  kot  $g^{-1}$  z desne. V teh domačih oznakah izračunamo

$$g \cdot vr_0 = vr_0g^{-1} = vh^{-1}r = (h \cdot v)r = (\rho(h) \cdot v)r,$$

kar ravno ustreza bolj zakompliciranemu zapisu zgoraj.

Poseben primer opisane indukcije dobimo z enorazsežnimi upodobitvami grupe  $H$ . Vsak homomorfizem  $\rho: H \rightarrow F^*$  porodi prostor  $\text{fun}(G, F)^H$  razsežnosti  $|G: H|$ , ki je podprostor prostora funkcij  $\text{fun}(G, F)$  in na katerem torej grupa  $G$  deluje z regularno upodobitvjo. Inducirana upodobitev je v tem primeru podupodobitev regularne upodobitve  $\rho_{\text{fun}}$ . Na ta način lahko dobimo mnogo različnih upodobitev grupe  $G$ .

**Zgled.** Opazujmo grupo  $S_n$  in njeno podgrupo  $A_n$  indeksa 2. Za  $n \geq 5$  je grupa  $A_n$  enostavna, zato je  $A_n = [A_n, A_n]$  in ni netrivialnih enorazsežnih upodobitev. Oglejmo si inducirano upodobitev  $\text{Ind}_{A_n}^{S_n}(1)$ . A priori vemo, da je to dvorazsežna upodobitev. Za množico predstavnikov odsekov vzamemo  $R = \{(), (1\ 2)\}$ . V domačih oznakah je vektorski prostor upodobitve enak  $F() \oplus F(1\ 2)$ , na katerem deluje grupa  $S_n$  s predpisom

$$g \cdot x\sigma = x\sigma g^{-1} = \begin{cases} x\sigma & g \in A_n, \\ x((1\ 2)\sigma) & g \notin A_n \end{cases}$$

za  $g \in S_n$ ,  $x \in F$ ,  $\sigma \in R$ . To delovanje lahko zapišemo še enostavneje. Vektorski prostor identificiramo z dvorazsežnim prostorom  $F^2$ , delovanje

<sup>19</sup>Množico funkcij  $\text{fun}(R, V)$  lahko vidimo kot direktno vsoto prostorov  $V$ , indeksirano z množico  $R$ .

pa opišemo kot

$$g \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & g \in A_n, \\ \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} & g \notin A_n \end{cases}$$

za  $x, y \in F$ ,  $g \in S_n$ . Alternirajoča grupa  $A_n$  je v jedru te upodobitve, ki zato izhaja iz kvocienta  $S_n/A_n \cong \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ . Opisana upodobitev je natanko permutacijska upodobitev grupe  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$  na prostoru  $F[\{1, 2\}]$ , inducirana upodobitev pa je ravno restrikcija te upodobitve vzdolž kvocientne projekcije  $S_n \rightarrow S_n/A_n$ . Inducirano upodobitev lahko zapišemo kot vsoto dveh enorazsežnih podupodobitev. Prva je podupodobitev z diagonalnim prostorom  $\{(x, x) \mid x \in F\} \leq F^2$ , ta je izomorfna trivialni upodobitvi  $\mathbf{1}$ . Druga pa je podupodobitev z antidiagonalnim prostorom  $\{(x, -x) \mid x \in F\} \leq F^2$ . Ta ni trivialna, saj element  $(1 \ 2)$  deluje na  $(1, -1)$  kot množenje z  $-1 \in F$ . Ta podupodobitev je zato izomorfna predznačni upodobitvi  $\text{sgn}$ . Nazadnje je torej  $\text{Ind}_{A_n}^{S_n}(\mathbf{1}) \cong \mathbf{1} \oplus \text{sgn}$ .

Naj bosta  $G, H$  grupi s homomorfizmom  $\phi: H \rightarrow G$ . Ni težko preveriti, da indukcija naravno presene spletično med dvema upodobitvama grupe  $H$  v spletično med induciranimi upodobitvama. Indukcija je torej funktor iz kategorije  $\text{Rep}_H$  v kategorijo  $\text{Rep}_G$ .

Kadar imamo na voljo tri grupe, povezane s homomorfizmoma  $\phi_2: H_2 \rightarrow H_1$  in  $\phi_1: H_1 \rightarrow G$ , lahko indukcijo izvedemo dvakrat zaporedoma. Upodobitvi  $\rho$  v  $\text{Rep}_{H_2}$  tako priredimo upodobitev  $\text{Ind}_{H_1}^G(\text{Ind}_{H_2}^{H_1}(\rho))$  v  $\text{Rep}_G$ . Od grupe  $H_2$  do  $G$  imamo neposredno povezavo prek homomorfizma  $\phi_1 \circ \phi_2$ , s čimer dobimo upodobitev  $\text{Ind}_H^G(\rho)$ . Ni težko preveriti, da sta dobljeni upodobitvi izomorfni. Tej lastnosti indukcije pravimo **tranzitivnost**.

**Domača naloga.** Dokaži tranzitivnost indukcije.

S tranzitivnostjo indukcije lahko vsako indukcijo vzdolž homomorfizma  $\phi: H \rightarrow G$  razdelimo na tri korake: najprej induciramo vzdolž kvocientne projekcije  $H \rightarrow H/\ker \phi$ , nato vzdolž izomorfizma  $H/\ker \phi \rightarrow \text{im } \phi$  in nazadnje vzdolž vložitve  $\text{im } \phi \rightarrow G$ . Vsako od teh posameznih indukcij razumemo precej dobro in zato lahko to znanje uporabimo pri razumevanju indukcije vzdolž  $\phi$ . Na primer, iz povedanega in razmislekov o preprostejših indukcijah, ki smo jih že naredili, sledi, da je razsežnost inducirane upodobitve  $\rho$  grupe  $H$  na prostoru  $V$  enaka

$$\deg(\text{Ind}_H^G(\rho)) = |G : \text{im } \phi| \cdot \dim(V^{\ker \phi}).$$

## Adjunkcija restrikcije in indukcije

Indukcija in restrikcija vsekakor nista inverzna funktorja. Na primer, če je  $H \leq G$  in  $\phi$  vložitev, potem za upodobitev  $\rho$  v  $\text{Rep}_G$  velja  $\deg(\text{Res}_H^G(\rho)) = \deg(\rho)$  in zato  $\deg(\text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(\rho))) = |G : H| \cdot \deg(\rho)$ , kar je lahko mnogo večje od  $\deg(\rho)$ . Sta pa funktorja restrikcije in indukcije vendarle tesno povezana. Tvorita namreč **adjungiran par** funktorjev.<sup>20</sup>

**Trditev.** Naj bosta  $G, H$  grupi s homomorfizmom  $\phi: H \rightarrow G$ . Za vsako upodobitev  $\rho$  v  $\text{Rep}_G$  in upodobitev  $\sigma$  v  $\text{Rep}_H$  velja

$$\text{hom}_H(\text{Res}_H^G(\rho), \sigma) \cong \text{hom}_G(\rho, \text{Ind}_H^G(\sigma)).$$

<sup>20</sup>V nadaljevanju bomo spoznali presenetljivo uporabnost tega navidez naključnega dejstva.

*Dokaz.* Naj bo  $\rho$  upodobitev na prostoru  $V$  in  $\sigma$  upodobitev na prostoru  $W$ . Naj bo

$$\Phi \in \text{hom}_H(\text{Res}_H^G(\rho), \sigma) = \text{hom}_H(V, W).$$

Sestavimo pripadajočo spletično

$$\Psi \in \text{hom}_G(\rho, \text{Ind}_H^G(\sigma)) = \text{hom}_G(V, \text{fun}(G, W)^H).$$

Za vektor  $v \in V$  definirajmo

$$\Psi(v) = (x \mapsto \Phi(\rho(x) \cdot v)) \in \text{fun}(G, W).$$

Ni težko (je pa sitno) preveriti, da opisano prirejanje vzpostavi izomorfizem med prostoroma spletičen  $\text{hom}_H(V, W)$  in  $\text{hom}_G(V, \text{fun}(G, W)^H)$ .  $\square$

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa s podgrupo  $H$  končnega indeksa. Grupa  $G$  deluje na množici desnih odsekov  $H \backslash G$  s homomorfizmom

$$G \rightarrow \text{Sym}(H \backslash G), \quad g \mapsto (Hx \mapsto Hxg^{-1}).$$

Iz tega delovanja izhaja permutacijska upodobitev  $\pi$  grupe  $G$  na prostoru  $F[H \backslash G]$ . Po konstrukciji je  $\pi \cong \text{Ind}_H^G(\mathbf{1})$ . Iz adjunkcije med restrikcijo in indukcijo za trivialni upodobitvi grup  $G$  in  $H$  od tod izpeljemo izomorfizem

$$\text{hom}_H(\mathbf{1}, \mathbf{1}) \cong \text{hom}_G(\mathbf{1}, \pi) \cong F[H \backslash G]^G.$$

Prostor  $\text{hom}_H(\mathbf{1}, \mathbf{1}) = \text{hom}(F, F)$  sestoji zgolj iz skalarnih množenj in je torej enorazsežen. Zato je enorazsežen tudi prostor invariant  $F[H \backslash G]^G$ . Vektor, ki ga razpenja, lahko dobimo kot sliko  $\text{id}_F \in \text{hom}_H(\mathbf{1}, \mathbf{1})$ . Tej spletični po adjunkciji ustreza spletična

$$\Psi: F \rightarrow F[H \backslash G], \quad 1 \mapsto \sum_{Hx \in H \backslash G} e_{Hx},$$

od koder sledi

$$F[H \backslash G]^G = \left\langle \sum_{Hx \in H \backslash G} e_{Hx} \right\rangle.$$

**Domača naloga.** Naj bosta  $G, H$  grupi s homomorfizmom  $\phi: H \rightarrow G$ . Za vsako upodobitev  $\rho$  v  $\text{Rep}_G$  in upodobitev  $\sigma$  v  $\text{Rep}_H$  velja

$$\text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(\rho) \otimes \sigma) \cong \rho \otimes \text{Ind}_H^G(\sigma).$$

**Domača naloga.** Premisli, kako se restrikcija in indukcija ujameta z dualom, direktno vsoto in tenzorskim produktom.

## Poglavje 2

# Upodobitev pod mikroskopom

V tem poglavju bomo približali upodobitev dane grupe in se ji tesno približali, kot da bi jo pogledali pod mikroskopom. Pri tem bomo najprej uzrli osnovne kose, iz katerih je sestavljena upodobitev. Ti osnovni kosi ustrezajo celicam, ki jih vidimo pod mikroskopom. Za tem se bomo približali še sestavi teh osnovnih kosov: vsak je dan s homomorfizmom v matrike, zato bomo raziskali koeficiente te matrike. Ti ustrezajo organelom, ki jih v celici vidimo pod mikroskopom. Nazadnje bomo premislili, da so te upodobitvene celice dovolj diferencirane med sabo, da za njihovo identifikacijo zadošča poznavanje le nekaterih njihovih organelov.

### 2.1 Razstavljanje upodobitve

Pogosto nas zanima, ali lahko dano upodobitev  $\rho$  grupe  $G$  na prostoru  $V$  zapišemo kot direktno vsoto nekih podupodobitev in na ta način upodobitev  $\rho$  *razstavimo* na preprostejše upodobitve, podobno kot razstavimo števila na manjše faktorje.

#### Nerazcepnost

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V \neq 0$ . Kadar *ne* obstaja noben  $G$ -invarianten podprostor prostora  $V$  (razen prostorov  $0$  in  $V$ ), tedaj rečemo, da je upodobitev  $\rho$  **nerazcepna**.<sup>1</sup> V tem primeru upodobitve seveda ne moremo razstaviti na enostavnejše v smislu direktne vsote.

#### Zgled.

- Opazujemo permutacijsko upodobitev simetrične grupe  $S_3$  na prostoru  $\mathbf{R}[\{1, 2, 3\}] = \mathbf{R}^3$ . Premislili smo že, da je ta upodobitev direktna vsota enorazsežne podupodobitve  $\mathbf{1}$  in dvorazsežne podupodobitve  $\rho$ , pri čemer slednja nima nobene enorazsežne podupodobitve. S tem je permutacijska upodobitev razstavljena kot direktna vsota dveh nerazcepnih upodobitev.
- Opazujemo diedrsko grupo  $D_{2n}$  z dvorazsežno upodobitvijo  $\rho_k$  za  $k \in \mathbf{Z}$ , ki jo obravnavajmo kot kompleksno upodobitev. Matrika  $\rho_k(r)$  ima lastni vrednosti  $e^{\pm 2\pi i k / n}$ . Ti dve vrednosti sta različni, če in

<sup>1</sup>Rečemo tudi, da je  $V$  **enostavna** upodobitev. Te terminologija izhaja iz alternativne obravnave upodobitev kot *modulov nad grupnimi algebrami*.

samo če  $k$  ni deljiv z  $n/2$ . Za vsak  $0 < k < n/2$  ima  $\rho_k(r)$  torej različni lastni vrednosti z lastnima vektorjema  $\begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix}$ . Matrika  $\rho_k(s)$  zamenja ta dva lastna podprostora med sabo. Upodobitev  $\rho_k$  za  $0 < k < n/2$  torej nima nobene enorazsežne kompleksne podupodobitve in je zato nerazcepna.

Preverimo, da so nerazcepne upodobitve dane grupe med sabo *neprimerljive*, tudi če so enake razsežnosti. Zatorej si jih lahko predstavljamo kot neodvisne osnovne kose kategorije upodobitev dane grupe.<sup>2</sup>

**Lema** (Schurova lema). *Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  in nerazcepno upodobitvijo  $\pi$ . Tedaj je vsaka spletična v  $\text{hom}_G(\pi, \rho)$  bodisi injektivna bodisi ničelna in vsaka spletična v  $\text{hom}_G(\rho, \pi)$  je bodisi surjektivna bodisi ničelna. V posebnem je vsaka spletična med dvema nerazcepnima upodobitvama grupe  $G$  bodisi izomorfizem bodisi ničelna.*

*Dokaz.* Naj bo  $\Phi \in \text{hom}_G(\pi, \rho)$ . Tedaj je  $\ker \Phi$  podupodobitev  $\pi$ , zato je po nerazcepnosti bodisi  $\ker \Phi = 0$  bodisi  $\Phi = 0$ . Prvi primer ustreza možnosti, da je  $\Phi$  injektivna, v drugem primeru pa je  $\Phi$  ničelna. Soroden razmislek dokaže trditev o spletičnih v  $\text{hom}_G(\rho, \pi)$ .  $\square$

Nad algebraično zaprtimi polji lahko to neprimerljivost raztegnemo do ene same upodobitve: osnovni kosi nimajo netrivialnih simetrij.

**Posledica.** *Naj bo  $G$  grupa z nerazcepno upodobitvijo  $\pi$  končne razsežnosti nad algebraično zaprtim poljem. Tedaj je  $\dim \text{hom}_G(\pi, \pi) = 1$ . Povedano še drugače: množica  $\text{hom}_G(\pi, \pi)$  sestoji le iz skalarnih večkratnikov identitete.*

*Dokaz.* Naj bo  $0 \neq \Phi \in \text{hom}_G(\pi, \pi)$ . Ker je polje algebraično zaprto, ima linearna preslikava  $\Phi$  vsaj kakšno lastno vrednost, recimo  $\lambda$ . Preslikava  $\Phi - \lambda \cdot \text{id} \in \text{hom}_G(\pi, \pi)$  zato ni injektivna, s čimer mora biti po Schurovi lemi ničelna, se pravi  $\Phi = \lambda \cdot \text{id}$ .  $\square$

Množico vseh izomorfnostnih razredov nerazcepnih upodobitev dane grupe  $G$  označimo z  $\text{Irr}(G)$ .

**Zgled.** Naj bo  $G$  grupa z nerazcepno upodobitvijo  $\pi$  končne razsežnosti nad poljem kompleksnih števil. Spletične  $\text{hom}_G(\pi, \pi) = \text{hom}(\pi, \pi)^G$  so endomorfizmi vektorskega prostora, ki so  $G$ -invariantni, se pravi komutirajo z delovanjem grupe  $G$ . Zglede takih endomorfizmov lahko dobimo iz delovanja centralnih elementov grupe  $G$ ; za vsak  $z \in Z(G)$  je  $\pi(z) \in \text{hom}_G(\pi, \pi)$ . Po Schurovi lemi je zato  $\pi(z) = \omega(z) \cdot \text{id}$  za nek skalar  $\omega(z)$ . Ker je  $\pi$  homomorfizem, je  $\omega: Z(G) \rightarrow \mathbb{C}^*$  enorazsežna upodobitev centra grupe  $G$ . Tej upodobitvi rečemo **centralni karakter** upodobitve  $\pi$ .

Še posebej zanimiv je primer, ko je  $G$  *abelova* grupa. Takrat za vsako nerazcepno upodobitev  $\pi$  končne razsežnosti nad poljem  $\mathbb{C}$  velja  $\pi(g) = \omega(g) \cdot \text{id}$  za vsak  $g \in G$ . Vsak enorazsežen podprostor je zato avtomatično podupodobitev. Ker je  $\pi$  nerazcepna, od tod sklepamo  $\deg(\pi) = 1$  in s tem  $\pi = \omega$ . Upodobitev  $\pi$  je tako *enorazsežna*. Na primer, vsaka končnorazsežna nerazcepna upodobitev grupe  $\mathbf{R}$  je nujno enorazsežna.

**Domača naloga.** Poišči kakšno nerazcepno upodobitev ciklične grupe  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$  nad poljem  $\mathbf{Q}$ , ki *ni* enorazsežna.

<sup>2</sup>Po analogiji s faktorizacijo števil si nerazcepne upodobitve lahko predstavljamo kot praštevila.

## Komplementarna podupodobitev

Predpostavimo zdaj, da ima dana upodobitev  $\rho$  grupe  $G$  na prostoru  $V$  neko podupodobitev  $\tilde{\rho}$  na podprostoru  $W \leq V$ . Seveda lahko vselej najdemo vektorski prostor  $U \leq V$ , za katerega je  $V = U \oplus W$ , vsekakor pa ni jasno, če lahko najdemo tak podprostor  $U$ , ki je celo  $G$ -invarianten. Kadar je temu tako, rečemo, da smo našli **komplementarno podupodobitev** podupodobitve  $\tilde{\rho}$ .<sup>3</sup> Ni vsaka podupodobitev komplementirana.

**Zgled.** Naj grupa  $\mathbf{R}$  deluje na realnem prostoru  $\mathbf{R}^2$  s homomorfizmom

$$\rho: \mathbf{R} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{R}), \quad x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Oglejmo si enorazsežne podupodobitve. Premislili smo že, da te ustrezajo skupnim lastnim vektorjem vseh preslikav  $\rho(x)$  za  $x \in \mathbf{R}$ . Pri  $x = 1$  imamo linearno preslikavo  $\rho(1)$  z enim samim lastnim vektorjem, in sicer  $e_1 \in \mathbf{R}^2$ . Hkrati je  $e_1$  lastni vektor vseh preslikav  $\rho(x)$  za  $x \in \mathbf{R}$ . Torej ima  $\rho$  *eno samo* enorazsežno podupodobitev, in sicer je to  $\mathbf{R} \cdot e_1 \leq \mathbf{R}^2$ . Ta vektorski podprostor ima mnogo komplementov v  $\mathbf{R}^2$ , noben od teh pa ni hkrati enorazsežna podupodobitev  $\rho$ .

Ni težko preveriti, da obstoj komplementirane podupodobitve vselej izhaja iz **projekcijskih spletičen**.<sup>4</sup>

**Trditev.** Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  in naj bo  $\tilde{\rho}$  njena podupodobitev na prostoru  $W \leq V$ . Tedaj ima  $\tilde{\rho}$  komplementirano podupodobitev, če in samo če obstaja spletična  $\Phi \in \mathrm{hom}_G(V, V)$ , ki je projekcija na  $W$ . V tem primeru je  $\ker \Phi$  komplementirana upodobitev.

## Polenostavnost

Vrnimo se k začetni ideji o razstavljanju dane upodobitve. Kadar lahko dano upodobitev  $\rho$  zapišemo kot direktno vsoto nerazcepnih upodobitev  $\bigoplus_{i \in I} \rho_i$ , tedaj rečemo, da je  $\rho$  **polenostavna** upodobitev. Če so pri tem vse podupodobitve  $\rho_i$  izomorfne med sabo, upodobitev  $\rho$  imenujemo **izotipična** upodobitev.

**Zgled.**

- Permutacijska upodobitev grupe  $S_3$  na  $\mathbf{R}^3$  je polenostavna.
- Regularna upodobitev ciklične grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  nad  $\mathbf{C}$  je polenostavna.

Vseh upodobitev žal ne moremo razstaviti na direktno vsoto nerazcepnih.<sup>5</sup> Polenostavnost dane upodobitve je namreč tesno povezana z obstojem komplementiranih podupodobitev.

**Trditev.** Upodobitev grupe  $G$  je polenostavna, če in samo če ima vsaka njena podupodobitev komplementirano podupodobitev.

<sup>3</sup>Če komplementarna podupodobitev obstaja, potem je enolično določena (do izomorfizma upodobitev), saj je izomorfna kvocientu  $\rho/\tilde{\rho}$ .

<sup>4</sup>Linearna preslikava  $A: X \rightarrow X$  je projekcija na podprostor  $Y \leq X$ , če je  $A^2 = A$  in  $\mathrm{im} A = Y$ . Projekcijska spletična je torej spletična, ki je hkrati projekcija na nek podprostor.

<sup>5</sup>V nadaljevanju bomo pokazali, da so upodobitve *končnih* grup nad poljem karakteristike 0 vselej poenostavne.



*Dokaz.* ( $\Rightarrow$ ): Naj bo najprej  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$  polenostavna upodobitev, pri kateri je  $V = \bigoplus_{i \in I} V_i$  in upodobitve  $G$  na podprostorih  $V_i$  so nerazcepne. Naj bo  $W \leq V$  poljuben  $G$ -invarianten podprostor. Po Zornovi lemi obstaja maksimalen  $G$ -invarianten podprostor  $U \leq V$  z lastnostjo  $U \cap W = 0$ . Izberimo poljuben  $i \in I$ . Presek  $(U \oplus W) \cap V_i$  je  $G$ -invarianten podprostor prostora  $V_i$ , zato je po nerazcepnosti bodisi trivialen bodisi enak  $V_i$ . Če bi bil trivialen, bi lahko  $U$  povečali do prostora  $U \oplus V_i$ , kar je v nasprotju z maksimalnostjo izbire  $U$ . Zatorej je  $(U \oplus W) \cap V_i = V_i$  in tako  $(U \oplus W) \geq V_i$ . Ker je bil  $i$  poljuben, od tod sledi  $U \oplus W = V$ . Podupodobitev  $W$  ima torej komplementirano podupodobitev  $U$ . ✓

( $\Leftarrow$ ): Naj bo  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$  upodobitev, v kateri je vsaka podupodobitev komplementirana. Dokazati želimo, da je  $\rho$  polenostavna. Uporabili bomo naslednjo pomožno trditev, ki je ni težko preveriti.

**Domača naloga.** Naj bo  $\rho$  upodobitev, v kateri je vsaka podupodobitev komplementirana. Tedaj ima  $\rho$  nerazcepno podupodobitev.

Naj bo  $W$  vsota vseh  $G$ -invariantnih podprostorov v  $V$ , ki so nerazcepne upodobitve, se pravi  $W = \sum_{i \in I} V_i$ , a ta vsota ni nujno direktna. Po pomožni trditvi je  $W \neq 0$ . Po predpostavki je  $W$  komplementirana z  $G$ -invariantnim podprostorom  $U$ . Po pomožni trditvi ima tudi  $U$  nerazcepno podupodobitev, zato je ta vsebovana v  $W$ , kar implicira  $W = V$ . Dokažimo zdaj še, da je  $W$  direktna vsota podprostorov  $V_i$ . V ta namen naj bo  $J$  maksimalna podmnožica indeksne množice  $I$ , za katero je  $\sum_{j \in J} V_j$  direktna vsota. Taka podmnožica obstaj po Zornovi lemi. Označimo  $\tilde{V} = \bigoplus_{j \in J} V_j$ . Če velja  $\tilde{V} \neq V$ , potem mora za nek  $i \in I \setminus J$  po nerazcepnosti veljati  $V_i \cap \tilde{V}$ , kar pa je v nasprotju z maksimalnostjo množice  $J$ . Tako je res  $\tilde{V} = V$  in upodobitev  $V$  je polenostavna. ✓

**Zgled.** Eničnozgornjetrikotna upodobitev grupe  $\mathbf{R}$  na  $\mathbf{R}^2$  ni nerazcepna, hkrati pa njena podupodobitev  $\mathbf{R} \cdot e_1 \cong \mathbf{1}$  ni komplementirana. Ta upodobitev zatorej ni polenostavna.

Z uporabo zadnjega kriterija lahko dokažemo, da je polenostavnost zaprta za osnovne konstrukcije z upodobitvami.

**Posledica.** Podupodobitve, kvocienti in direktne vsote polenostavnih upodobitev dane grupe so polenostavne.

*Dokaz.* Preverimo le zaprtost za podupodobitve. Naj bo  $\rho$  polenostavna upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $V$  in naj bo  $W \leq V$  podupodobitev. Naj bo  $U \leq W$  poljubna podupodobitev upodobitve na  $W$ . Po polenostavnosti obstaja komplementirana podupodobitev  $\tilde{U} \leq V$  upodobitve  $U \leq V$ . Tedaj je  $\tilde{U} \cap W$  podupodobitev, ki je komplementirana podupodobitvi  $U$  v  $W$ . □

Nazadnje lahko s pomočjo projekcijskih spletičen naredimo še en korak naprej pri razumevanju simetrij upodobitev. Premislili smo že, da so osnovni kosi brez netrivialnih simetrij. V primeru polenostavnih upodobitev drži tudi obratno.

**Posledica.** Naj bo  $G$  grupa s polenostavno upodobitvijo  $\rho$  končne razsežnosti nad algebraično zaprtim poljem. Če je  $\dim \text{hom}_G(\rho, \rho) = 1$ , potem je  $\rho$  nerazcepna.



*Dokaz.* Naj  $\rho$  upodablja grupo  $G$  na prostoru  $V$ . Naj bo  $W \leq V$  nerazcepna podupodobitev in naj bo  $U$  njena komplementirana podupodobitev. Naj bo  $\Phi: V \rightarrow V$  pripadajoča projekcija na podprostor  $W$  z jedrom  $U$ . Ker je  $\Phi \in \text{hom}_G(\rho, \rho)$ , iz predpostavke sledi, da je  $\Phi$  skalarni večkratnik identitete. To je mogoče le v primeru, ko je  $V = W$  in  $U = 0$ , torej je  $\rho$  nerazcepna.  $\square$

## Kompozicijska vrsta

Vsake upodobitve ne moremo razstaviti kot direktno vsoto nerazcepnih upodobitev. Kljub temu pa je res, da lahko vsako upodobitev (na končno razsežnem prostoru) razstavimo na nerazcepne upodobitve, le da moramo pri tem poseči po nekoliko zahtevnejšem načinu razstavljanja.

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo na prostoru  $V$ . Predpostavimo, da obstaja zaporedje  $G$ -invariantnih podprostorov

$$0 = V_0 \leq V_1 \leq V_2 \leq \dots \leq V_n = V,$$

pri čemer so vsi zaporedni kvocienti  $V_i/V_{i-1}$  za  $1 \leq i \leq n$ , gledani kot upodobitve grupe  $G$ , *nerazcepni*. Tako zaporedje imenujemo **kompozicijska vrsta** upodobitve na prostoru  $V$ . Kvocienti  $V_i/V_{i-1}$  se pri tem imenujejo **kompozicijski faktorji**.

**Zgled.** Naj bo  $\rho$  eničnozgornjetrikotna upodobitev grupe  $\mathbf{R}$  na  $V = \mathbf{R}^2$ . Ta upodobitev ima podupodobitev  $V_1 = \mathbf{R} \cdot e_1$ . Kvocient  $V/V_1$  je enorazsežen in na njem grupa  $\mathbf{R}$  deluje trivialno. Dobimo torej kompozicijsko vrsto

$$0 = V_0 \leq V_1 \leq V,$$

katere kompozicijska faktorja sta kot upodobitvi izomorfna **1**. Sama upodobitev grupe  $\mathbf{R}$  na  $V$  pa seveda ni trivialna.

**Izrek (Jordan-Hölder-Noether).** Vsaka upodobitev na končno razsežnem prostoru ima kompozicijsko vrsto. Vsaki dve kompozicijski vrsti imata enako število členov in do permutacije natančno enake kompozicijske faktorje.

*Dokaz.* Naj grupa deluje linearno na končno razsežnem prostoru  $V$ . Da kompozicijska vrsta res obstaja, ni težko preveriti. Najprej izberemo neko nerazcepno podupodobitev  $V_1$ . Če je  $V_1 < V$ , potem izberemo podupodobitev  $V_2$ , ki vsebuje  $V_1$  in je med vsemi takimi minimalne razsežnosti. S tem je  $V_2/V_1$  nerazcepna. Induktivno nadaljujemo z grajenjem kompozicijske vrste. Ker je  $V$  končno razsežen, se ta postopek ustavi.

Premislimo še, kako lahko vsaki dve kompozicijski vrsti povežemo med sabo. Opazujmo dve taki vrsti,

$$0 = V_0 \leq V_1 \leq \dots \leq V_n = V \quad \text{in} \quad 0 = W_0 \leq W_1 \leq \dots \leq W_m = V.$$

S pomočjo druge vrste bomo skušali *pofiniti* prvo vrsto in obratno.<sup>6</sup> Za  $0 \leq i < n$  in  $0 \leq j \leq m$  naj bo

$$V_{i,j} = V_i + (V_{i+1} \cap W_j),$$

<sup>6</sup>Ta argument je soroden premisleku o obstoju Hirschove dolžine v policikličnih grupah iz (Teorija grup).

S tem dobimo verigo

$$V_i = V_{i,0} \leq V_{i,1} \leq \dots V_{i,m} = V_{i+1}$$

med  $V_i$  in  $V_{i+1}$ . Ker je kvocient  $V_{i+1}/V_i$  nerazcepen in je vsak  $V_{i,j}$  podobitev, mora za natanko en indeks  $j$  veljati  $V_i = V_{i,j}$  in  $V_{i+1} = V_{i,j+1}$ . Kompozicijski faktor  $V_{i+1}/V_i$  je tedaj izomorfen kvocientu

$$\frac{V_i + (V_{i+1} \cap W_{j+1})}{V_i + (V_{i+1} \cap W_j)}.$$

Zgodbo zdaj ponovimo še za drugo verigo. Pofinimo jo s pomočjo prve, definiramo  $W_{j,i} = W_j + (W_{j+1} \cap V_i)$ . Kvocient  $W_{j+1}/W_j$  je enak

$$\frac{W_j + (W_{j+1} \cap V_{i+1})}{W_j + (W_{j+1} \cap V_i)}.$$

**Domača naloga.** Prepričaj se, da velja

$$\frac{V_i + (V_{i+1} \cap W_{j+1})}{V_i + (V_{i+1} \cap W_j)} \cong \frac{W_j + (W_{j+1} \cap V_{i+1})}{W_j + (W_{j+1} \cap V_i)}.$$

S tem smo za vsak  $0 \leq i < n$  našli natanko določen  $j$ , da je  $V_{i+1}/V_i \cong W_{j+1}/W_j$ . Premislimo še, da je to prirejanje injektivno. Indeks  $j$  je enolično določen s pogojem, da je  $V_{i,j+1}/V_{i,j} \neq 0$ , kar je po gornjem izomorfizmu enakovredno pogoju  $W_{j,i+1}/W_{j,i} \neq 0$ . Ker je  $W_{j+1}/W_j$  nerazcepen, je slednji pogoj lahko izpolnjen le za *en* indeks  $i$ .  $\square$

Iz izreka sledi, da lahko za vsako upodobitev  $\rho$  grupe  $G$  na končno razsežnem prostoru najdemo bazo prostora, v kateri imajo vse matrike  $\rho(g)$  za  $g \in G$  *bločnozgornjetrikotno* obliko. Po drugi strani lahko za *polenostavno* upodobitev najdemo bazo prostora, v kateri imajo vse matrike *bločnodiagonalno* obliko.

## Izotipične komponente

Po zadnjem izreku je za dano upodobitev  $\rho$  in nerazcepno upodobitev  $\pi$  število kompozicijskih faktorjev, ki so izomorfní  $\pi$ , neodvisno od kompozicijske vrste. Temu številu pravimo **večkratnost**  $\pi$  v  $\rho$  in ga označimo z  $\text{mult}_\rho(\pi)$ .

Kadar je dana upodobitev *polenostavna*, je do izomorfizma natančno enolično določena s svojimi večkratnostmi. Če je  $\rho = \bigoplus_{i \in I} \rho_i$ , potem je

$$\text{hom}_G(\pi, \rho) = \bigoplus_{i \in I} \text{hom}_G(\pi, \rho_i).$$

Po Schurovi lemi je (nad algebraično zaprtim poljem) vsak od zadnjih prostorov spletičen bodisi trivialen bodisi enorazsežen. Večkratnost  $\pi$  v  $\rho$  lahko torej izračunamo kot

$$\text{mult}_\rho(\pi) = \dim \text{hom}_G(\pi, \rho).$$

**Zgled.**

- Za eničnozgornjetrikotno upodobitev  $\rho$  grupe  $\mathbf{R}$  na  $\mathbf{R}^2$  je  $\text{mult}_\rho(\mathbf{1}) = 2$ . Ker ta upodobitev ni trivialna, ne more biti polenostavna, saj bi sicer bila izomorfna  $\mathbf{1}^2$ .

- Opazujemo permutacijsko upodobitev  $\pi$  grupe  $S_3$  na  $\mathbf{R}^3$ . To upodobitev smo že razstavili na direktno vsoto  $\mathbf{1} \oplus \rho$ , kjer je  $\rho$  dvorazsežna nerazcepna upodobitev na podprostoru  $\langle u_1 = e_1 - e_2, u_2 = e_2 - e_3 \rangle$ . Premislili smo, kako lahko to upodobitev projiciramo do upodobitve  $\tilde{\rho}$  grupe  $S_3$  na prostoru  $(\mathbf{Z}/3\mathbf{Z})^2$  nad končnim poljem  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$ .

Upodobitev  $\tilde{\rho}$  ni nerazcepna, saj ima invarianten podprostor  $\langle u_1 - u_2 = e_1 + e_2 + e_3 \rangle$ . Na tem podprostoru grupa  $S_3$  deluje trivialno. V kvocientu  $(\mathbf{Z}/3\mathbf{Z})^2 / \langle u_1 - u_2 \rangle \cong \mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$  generatorja  $(1\ 2)$  in  $(1\ 2\ 3)$  grupe  $S_3$  preslikata odsek vektorja  $u_1$  v odsek  $-u_1$  oziroma  $u_1$ . V tem prepoznamo predznačno upodobitev, interpretirano kot homomorfizem  $\text{sgn}: S_3 \rightarrow \text{GL}_1(\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}) \cong \{1, -1\}$ . Nad poljem  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$  za permutacijsko upodobitev  $\pi$  tako velja  $\text{mult}_\pi(\mathbf{1}) = 2$  in  $\text{mult}_\pi(\text{sgn}) = 1$ .

Premislimo, da upodobitev  $\pi$  nad  $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$  ni polenostavna. Če bi namreč bila, bi po zgornjem morala biti izmorfna direktni vsoti  $\mathbf{1} \oplus \mathbf{1} \oplus \text{sgn}$ . Prostor  $(\mathbf{Z}/3\mathbf{Z})^3$  bi zatorej imel bazo, v kateri bi matriki za  $\pi((1\ 2))$  in  $\pi((1\ 2\ 3))$  bili hkrati diagonalni. Ti dve matriki bi zato komutirali, kar pomeni, da bi morali komutirati tudi linearni preslikavi  $\pi((1\ 2))$  in  $\pi((1\ 2\ 3))$ . Temu pa ni tako, saj na primer velja  $\pi((1\ 2\ 3)(1\ 2))e_1 = e_3$  in  $\pi((1\ 2)(1\ 2\ 3))e_1 = e_1$ .

Čeravno so kompozicijski faktorji upodobitve enolično določeni do permutacije natančno, pa ni res, da so enolično določeni tudi členi kompozicijske vrste, niti kadar je dana upodobitev polenostavna. Lahko se namreč zgodi, da neka nerazcepna podupodobitev nastopa z večkratnostjo vsaj 2.<sup>7</sup>

Oglejmo si tako situacijo še podrobneje. Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$ . Naj bo  $\pi$  neka nerazcepna upodobitev grupe  $G$ . Opazujemo vse  $G$ -invariantne podprostore v  $V$ , ki so kot upodobitve izomorfní  $\pi$ . Vsota (ne nujno direktna) vseh teh podprostorov

$$\text{Izotip}_\rho(\pi) = \sum_{W \leq V, W \cong \pi} W$$

je  **$\pi$ -izotipična komponenta** upodobitve  $\rho$ . Ta je sicer definirana za vsako upodobitev, a jo je za polenostavne upodobitve še posebej lahko določiti.

**Trditev.** Naj bo  $G$  grupa s polenostavno upodobitvijo  $\rho = \bigoplus_{i \in I} \rho_i$  na prostoru  $V = \bigoplus_{i \in I} V_i$ , kjer je vsak  $\rho_i$  nerazcepna podupodobitev. Za vsako nerazcepno upodobitev  $\pi$  grupe  $G$  je

$$\text{Izotip}_\rho(\pi) = \bigoplus_{i \in I: \rho_i \cong \pi} V_i.$$

*Dokaz.* Naj bo  $W$  direktna vsota podprostorov  $V_i$ , ki so kot upodobitev izomorfní  $\pi$ . Seveda je  $W \leq \text{Izotip}_\rho(\pi)$ . Dokažimo, da velja tudi obratna neenakost. Naj bo  $U$  direktna vsota tistih prostorov  $V_i$ , ki kot upodobitev niso izomorfní  $\pi$ . Velja  $V = W \oplus U$ . Opazujemo projekcijo  $p: V \rightarrow U$  z jedrom  $W$ . Naj bo  $Z \leq \text{Izotip}_\rho(\pi)$  podprostor, ki je kot upodobitev izomorfen  $\pi$ . Zožitev  $p|_Z$  je spletična v  $\text{hom}_G(Z, U)$ , ki je po Schurovi lemi ničeln prostor. Torej je  $p(Z) = 0$  in s tem  $Z \leq W$ . Ker je bil  $Z$  poljuben, smo s tem dokazali  $\text{Izotip}_\rho(\pi) \leq W$ .  $\square$

<sup>7</sup>Na primer, kadar je upodobitev trivialna, se pravi  $V = \mathbf{1}^k$  za nek  $k > 1$ , lahko izberemo poljubno bazo prostora  $V$  in prek nje dobimo nek drug izomorfizem  $V \cong \mathbf{1}^k$ .

Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  in nerazcepno upodobitvijo  $\pi$  na prostoru  $W$ . Vsak  $G$ -invarianten podprostor v  $V$ , ki je kot upodobitev izomorfen  $\pi$ , lahko dobimo kot sliko prostora  $W$  z neko spletično v  $\text{hom}_G(\pi, \rho)$ .<sup>8</sup> Vsoto vseh takih  $G$ -invariantnih podprostorov lahko torej zajamemo kot sliko linearne preslikave

$$\Sigma_{\pi, \rho}: \text{hom}_G(\pi, \rho) \otimes W \rightarrow V, \quad \Phi \otimes w \mapsto \Phi(w).$$

S tem je  $\text{im } \Sigma_{\pi, \rho} = \text{Izotip}_\rho \pi$ . Grupa  $G$  deluje na  $\text{hom}_G(\pi, \sigma) = \text{hom}(W, V)^G$  trivialno, na  $W$  pa prek  $\pi$ . Na ta način je  $\Sigma_{\pi, \rho}$  celo spletična upodobitev.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  in nerazcepno upodobitvijo  $\pi$  nad algebraično zaprtim poljem. Predpostavimo, da je  $\dim \text{hom}_G(\pi, \rho) < \infty$ . Tedaj je  $\Sigma_{\pi, \rho}$  injektivna.*

*Dokaz.* Naj bo  $\{\Phi_i\}_{i \in I}$  baza prostora  $\text{hom}_G(\pi, \rho)$ . Premisljmo, da prostori  $\text{im } \Phi_i$  tvorijo notranjo direktno vsoto v  $V$ . Injektivnost  $\Sigma_{\pi, \rho}$  od tod neposredno sledi.

Dokazujemo s protislovjem. Naj bo  $J \subseteq I$  množica najmanjše moči, za katero prostori  $\text{im } \Phi_j$  za  $j \in J$  ne tvorijo direktne vsote. Obstaja torej  $k \in J$ , da je

$$\text{im } \Phi_k \cap \sum_{j \in J \setminus \{k\}} \text{im } \Phi_j \neq 0.$$

Po nerazcepnosti  $\pi$  je spletična  $\Phi_k$  injektivna, zato je  $\text{im } \Phi_k$  nujno vsebovana v vsoti  $\sum_{j \in J \setminus \{k\}} \text{im } \Phi_j$ . Po minimalnosti  $J$  je zadnja vsota direktna, zato je

$$\Phi_k \in \text{hom}_G(W, \bigoplus_{j \in J \setminus \{k\}} \text{im } \Phi_j).$$

Slednji prostor je direktna vsota prostorov  $\text{hom}_G(W, \text{im } \Phi_j)$ . Po Schurovi lemi je vsak od teh bodisi ničeln bodisi enorazsežen. V neničelnem primeru je seveda  $\text{hom}_G(W, \text{im } \Phi_j)$  generiran s spletično  $\Phi_j$ . Od tod sledi, da je  $\Phi_k$  linearna kombinacija spletičen  $\Phi_j$  za  $j \in J \setminus \{k\}$ . To je protislovno z dejstvom, da je  $\{\Phi_i\}_{i \in I}$  baza prostora  $\text{hom}_G(\pi, \rho)$ .  $\square$

**Posledica.** *Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  in nerazcepno upodobitvijo  $\pi$  nad algebraično zaprtim poljem. Predpostavimo, da je  $\dim \text{hom}_G(\pi, \rho) < \infty$ . Izotipična komponenta  $\text{Izotip}_\rho(\pi)$  je polenostavna,  $\pi$ -izotipična in vsebuje  $\pi$  z večkratnostjo  $\dim \text{hom}_G(\pi, \rho)$ .*

*Dokaz.* Iz injektivnosti  $\Sigma_{\pi, \rho}$  sledi  $\text{Izotip}_\rho(\pi) \cong \text{hom}_G(\pi, \sigma) \otimes W$ . Ker grupa  $G$  deluje trivialno na  $\text{hom}_G(\pi, \sigma)$ , je prostor  $\text{hom}_G(\pi, \sigma) \otimes W$  kot upodobitev izomorfen direktni vsoti  $\dim \text{hom}_G(\pi, \sigma)$  kopij prostora  $W$ , na katerem  $G$  deluje s  $\pi$ .  $\square$

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  grupa s končnorazsežno upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$ . Premisli, da se izotipične komponente, ki pripadajo paroma neizomorfni nerazcepnim upodobitvam, sekajo trivialno.

**Zgled.**

<sup>8</sup>Vsaka neničelna spletična v  $\text{hom}_G(\pi, \rho)$  je namreč injektivna.

- Naj bo  $G$  grupa s polenostavno upodobitvijo  $\rho = \bigoplus_{i \in I} \rho_i$  na prostoru  $V = \bigoplus_{i \in I} V_i$ , v kateri vsaka nerazcepna podupodobitev nastopa z večkratnostjo 1. Upodobitve  $\rho_i$  so torej paroma neizomorfne. Izotipične komponente so torej kar enake podprostorom  $V_i$ . Ker so te komponente neodvisne od izbire dekompozicije, so torej podprostori  $V_i$  polenostavne dekompozicije enolično določeni.

Naj bo  $W \leq V$  nek  $G$ -invarianten podprostor. Upodobitev  $G$  na tem podprostoru je tudi polenostavna. Vsaka njena nerazcepna podupodobitev je hkrati podupodobitev  $\rho$ , zato po enoličnosti podprostorov  $V_i$  sestoji iz nekaterih teh podprostorov. Prostor  $W$  je zato enak  $\bigoplus_{i \in J} V_i$  za neko podmnožico  $J \subseteq I$ .

Za konkreten zgled lahko vzamemo ciklično grupo  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  in njeno regularno upodobitev, ki smo jo razcepili na direktno vsoto upodobitev  $\bigoplus_{j \in \{1, 2, \dots, n\}} \chi_j$ . Po zadnjem komentarju je vsaka podupodobitev regularne upodobitve torej enaka direktni vsoti nekaterih od upodobitev  $\chi_j$ .

- Naj bo  $G$  grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$  in naj bo  $\pi$  neka njena enorazsežna upodobitev. Taka upodobitev je seveda nerazcepna. Vektor  $v \in V$  pripada izotipični komponenti  $\text{Izotip}_\rho(\pi)$ , če in samo če grupa  $G$  na prostoru  $\langle v \rangle$  deluje kot s  $\pi$ , se pravi

$$\text{Izotip}_\rho(\pi) = \{v \in V \mid \forall g \in G: \rho(g) \cdot v = \pi(g)v\}.$$

Kadar je grupa  $G$  abelova, je vsaka njena nerazcepna upodobitev nad algebraično zaprtim poljem enorazsežna. Vsaka polenostavna upodobitev take grupe je zato direktna vsota podprostorov, na katerih grupa deluje s skalarnimi množenji prek svojih enorazsežnih upodobitev.

## 2.2 Matrični koeficienti

Vsaka upodobitev dane grupe je homomorfizem v grupo obrnljivih matrik  $\text{GL}(V)$ . Do sedaj smo na upodobitve gledali z bolj konceptualnega stališča: govorili smo o strukturi prostora  $V$  in o njegovi morebitni dekompoziciji na nerazcepne upodobitve. Zdaj si bomo z vsako od teh umazali roke in jo pogledali še podrobneje.

Predpostavimo, da je prostor  $V$  končnorazsežen. Izberimo bazo prostora  $V$  in s tem izomorfizem  $V \cong F^n$  za nek  $n$ , tako da je upodobitev dana s homomorfizmom  $\rho: G \rightarrow \text{GL}_n(F)$ . Vsak tak homomorfizem je po komponentah podan s svojimi **matričnimi koeficienti**; to so funkcije

$$f_{i,j}: G \rightarrow F, \quad g \mapsto \langle e_i^*, \rho(g) \cdot e_j \rangle = \rho(g)_{i,j}$$

za  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

O matričnih koeficientih upodobitve  $\rho$  lahko abstraktneje govorimo tudi brez izbire baze prostora. Za vsak vektor  $v \in V$  in kovektor  $\lambda \in V^*$  definiramo  $f_{v,\lambda}: G \rightarrow F$ ,  $g \mapsto \langle \lambda, \rho(g) \cdot v \rangle$ . To so **posplošeni matrični koeficienti**. Kadar je prostor  $V$  končnorazsežen, lahko vsak vektor razvijemo po izbrani bazi in vsak kovektor po dualni bazi, s čimer splošeni matrični koeficient razvijemo po običajnih matričnih koeficientih.

## Matrični koeficienti in regularna upodobitev

Matrične koeficiente lahko vidimo kot elemente vektorskega prostora funkcij  $\text{fun}(G, F)$  iz  $G$  v  $F$ . Na tem prostoru deluje grupa  $G$  z regularno upodobitvijo  $\rho_{\text{fun}}$ . Naj bo  $\text{MK}(\pi) \leq \text{fun}(G, F)$  podprostor, ki ga razpenjajo matrični koeficienti neke končnorazsežne nerazcepne upodobitve  $\pi$ .<sup>9</sup>

**Trditev.**  $\text{MK}(\pi)$  je  $G$ -invarianten podprostor.

*Dokaz.* Naj bo  $g \in G$  in  $f_{v,\lambda}$  splošen matrični koeficient. Velja

$$g \cdot f_{v,\lambda}: x \mapsto f_{v,\lambda}(xg) = \langle \lambda, \pi(xg) \cdot v \rangle = f_{\pi(g) \cdot v, \lambda}(x),$$

zato je  $g \cdot f_{v,\lambda} = f_{\pi(g) \cdot v, \lambda} \in \text{MK}(\pi)$ . □

Matrični koeficienti upodobitve  $\pi$  nam torej dajejo podupodobitev na prostoru  $\text{MK}(\pi)$  znotraj regularne upodobitve  $\rho_{\text{fun}}$  na  $\text{fun}(G, F)$ . Ni presenetljivo, da je ta podupodobitev v resnici tesno povezana s  $\pi$ .

**Izrek.** Naj bo  $G$  grupa s končnorazsežno nerazcepno upodobitvijo  $\pi$ . Tedaj je

$$\text{MK}(\pi) = \text{Izotip}_{\rho_{\text{fun}}}(\pi)$$

Nad algebraično zaprtim poljem je večkratnost  $\pi$  v slednji upodobitvi enaka  $\deg(\pi)$ .

*Dokaz.* Naj bo  $\pi$  upodobitev na prostoru  $W$ . Spomnimo se, da je  $\pi$ -izotipična komponenta v  $\rho_{\text{fun}}$  napeta na vektorje oblike  $\Phi(w)$  za  $\Phi \in \text{hom}_G(\pi, \rho_{\text{fun}})$  in  $w \in W$ . Regularno upodobitev predstavimo kot inducirano upodobitev  $\rho_{\text{fun}} = \text{Ind}_1^G(\mathbf{1})$ . Po adjunkciji med restrikcijo in indukcijo je

$$\text{hom}_G(\pi, \rho_{\text{fun}}) \cong \text{hom}_1(\text{Res}_1^G(\pi), \mathbf{1}) \cong \text{hom}(\mathbf{1}^{\deg(\pi)}, \mathbf{1}).$$

Standardna dualna baza  $\{e_i^* \mid 1 \leq i \leq \deg(\pi)\}$  v zadnjem vektorskem prostoru nam po tej adjunkciji porodi bazo

$$\Phi_i: W \rightarrow \text{fun}(G, F), \quad w \mapsto (g \mapsto \langle e_i^*, \pi(g) \cdot w \rangle) = f_{e_i^*, w}$$

za  $1 \leq i \leq \deg(\pi)$  prostora spletičen  $\text{hom}_G(\pi, \rho_{\text{fun}})$ . Ko te bazne spletične evalviramo na neki izbrani bazi  $\{f_j \mid 1 \leq j \leq \deg(\pi)\}$  prostora  $W$ , dobimo torej ravno prostor  $\text{MK}(\pi)$ . Nad algebraično zaprtim poljem te evalvacije tvorijo celo bazo<sup>10</sup>

$$\Phi_i(f_j) = f_{i,j}$$

prostora  $\text{Izotip}_{\rho_{\text{fun}}}(\pi)$ . V izbranih bazah torej matrični koeficienti tvorijo bazo za  $\pi$ -izotipično komponento regularne upodobitve. Večkratnost  $\pi$  v njej je enaka  $\dim \text{hom}_G(\pi, \rho_{\text{fun}}) = \deg(\pi)$ . □

Izpostavimo pomembno posledico, ki nam pove, da lahko vse nerazcepne upodobitve najdemo v regularni.

**Posledica.** Vsaka končnorazsežna nerazcepna upodobitev dane grupe je uresničljiva kot podupodobitev regularne.

<sup>9</sup>Prostor  $\text{MK}(\pi)$  je enak prostoru, ki ga razpenjajo splošeni matrični koeficienti upodobitve  $\pi$ , zato je neodvisen od izbire baze.

<sup>10</sup>Preslikava  $\Sigma_{\pi, \rho_{\text{fun}}}$  je injektivna, ker je  $\dim \text{hom}_G(\pi, \rho_{\text{fun}}) = \deg(\pi) < \infty$ .

V posebnem smo tekom zadnjega dokaza izpeljali, da so po izbiri baze matrični koeficienti končnorazsežne nerazcepne upodobitve nad algebraično zaprtim poljem  $\pi$  vselej linearno neodvisni.<sup>11</sup> Vseh je ravno  $\deg(\pi)^2$  in znotraj regularne upodobitve tvorijo podupodobitev  $\text{MK}(\pi)$ , ki sestoji iz  $\deg(\pi)$  mnogo kopij upodobitve  $\pi$ .

Vse podobno velja, kadar imamo namesto ene same nerazcepne upodobitve *končno mnogo* paroma neizomorfni nerazcepnih upodobitev  $\{\pi_i\}_{i \in I}$  dane grupe  $G$ . Vsaka od njih nam po izbiri baze podari svoje matrične koeficiente. Ti razpenjajo prostore, ki so enakim izotipičnim komponentam v regularni upodobitvi in te komponente tvorijo notranjo direktno vsoto. Matrični koeficienti vseh teh upodobitev so torej linearno neodvisni med sabo. Vseh skupaj je  $\sum_{i \in I} \deg(\pi_i)^2$ .

Matrični koeficienti so elementi prostora funkcij  $\text{fun}(G, F)$ . V primeru, ko je grupa končna, lahko po primerjanju dimenzij zato izpeljemo neenakost

$$\sum_{i \in I} \deg(\pi_i)^2 \leq \dim \text{fun}(G, F) = |G|.$$

**Posledica.** *Končna grupa ima le končno mnogo končnorazsežnih nerazcepnih upodobitev. Nad algebraično zaprtim poljem je vsaka od njih stopnje kvečjemu  $\sqrt{|G|}$ .*

*Dokaz.* Vsaka končnorazsežna nerazcepna upodobitev je vsebovana v regularni in se zatorej pojavi kot njen kompozicijski faktor. Vseh možnih kompozicijskih faktorjev je končno mnogo, ker je prostor  $\text{fun}(G, F)$  končnorazsežen. Drugi del posledice sledi neposredno iz neenakosti pred njo.  $\square$

**Zgled.** Opazujmo grupo  $S_3$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Njeno regularno upodobitev smo že razstavili na direktno vsoto  $\mathbf{1} \oplus \rho$ , kjer je  $\rho$  dvorazsežna nerazcepna upodobitev. Poleg tega poznamo še enorazsežno predznačno upodobitev  $\text{sgn}$ . Vsota kvadratov stopenj teh treh upodobitev je  $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$ , kar je ravno enako moči grupe  $S_3$ . Od tod sledi, da so te tri vse končnorazsežne nerazcepne upodobitve grupe  $S_3$ .

Več o upodobitvah končnih grup si bomo pogledali nekoliko kasneje.

## Karakterji

Naj bo  $G$  grupa in  $\rho$  njena končnorazsežna upodobitev. Po izbiri baze dobimo matrične koeficiente  $f_{i,j}$ . Te lahko kombiniramo na različne načine, da dobimo funkcije v  $\text{fun}(G, F)$ , ki so nazadnje *neodvisne* od izbire baze. Najosnovnejša<sup>12</sup> taka funkcija je sled linearnega operatorja, se pravi

$$\chi_\rho: G \rightarrow F, \quad g \mapsto \text{tr}(\rho(g)) = \sum_{i=1}^{\deg(\rho)} f_{i,i}(g).$$

To funkcijo imenujemo **karakter** upodobitve  $\rho$ . Kadar je upodobitev  $\rho$  nerazcepna, tudi njenemu karakterju dodamo pridevnik *nerazcepen*.

Karakter je neodvisen od izbire baze, zato za vsaka  $x, g \in G$  velja  $\chi_\rho(xgx^{-1}) = \chi_\rho(g)$ . Karakterji so torej funkcije na  $G$ , ki so konstantne

<sup>11</sup>Temu dejstvu včasih pravimo *Burnsideov izrek o nerazcepnosti*.

<sup>12</sup>V resnici je sled do skalarja natančno *edina* taka funkcija.



	( )	(1 2)	(1 2 3)
$\chi_1$	1	1	1
$\chi_{\text{sgn}}$	1	-1	1
$\chi_\rho$	2	0	-1

Tabela 2.1: Tabela karakterjev  $S_3$

na konjugiranostnih razredih.<sup>13</sup> Takim funkcijam pravimo **razredne funkcije** in jih označimo s

$$\text{fun}_{\text{cl}}(G, F) = \{f \in \text{fun}(G, F) \mid \forall x, g \in G: f(xgx^{-1}) = f(g)\}.$$

Za dan konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$  v grupi  $G$  bomo pisali  $\chi_\rho(\mathcal{C})$  za vrednost karakterja v poljubnem predstavniku tega razreda.

**Zgled.** Opazujemo grupo  $S_3$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Poznamo že vse tri njene končnorazsežne nerazcepne upodobitve. Določimo karakterje teh nerazcepnih upodobitev. Karakterji enorazsežnih upodobitev so kot funkcije kar enaki upodobitvam. Za karakter  $\chi_\rho$  velja

$$() \mapsto \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad (1\ 2) \mapsto \text{tr} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0, \quad (1\ 2\ 3) \mapsto \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1.$$

V grupi  $S_3$  je vsak element konjugiran enemu od  $()$ ,  $(1\ 2)$  ali  $(1\ 2\ 3)$ . S tem so torej vse vrednosti karakterja  $\chi_\rho$  določene.

Vse podatke o vrednostih karakterjev dane grupe ponavadi zložimo v **tabelo karakterjev**. Stolpce indeksiramo s predstavniki konjugiranostnih razredov, vrstice pa z nerazcepnimi karakterji. Vrednosti v tabeli so vrednosti karakterjev v konjugiranostnih razredih.

Že samo imenovanje karakterjev odzvanja, da to niso poljubne funkcije v  $\text{fun}(G, F)$ , temveč da v nekem smislu zajemajo srž upodobitve.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  grupa s končnorazsežnima nerazcepnima upodobitvama nad algebraično zaprtim poljem. Ti dve upodobitvi sta izomorfni, če in samo če imata enaka karakterja.*

*Dokaz.* Ker so matrični koeficienti različnih nerazcepnih upodobitev linearno neodvisni med sabo, so tudi njihovi karakterji linearno neodvisni kot elementi prostora  $\text{fun}(G, F)$ .  $\square$

Karakterjev fundamentalnih konstrukcij različnih upodobitev ni težko izračunati.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  grupa s končnorazsežnimi upodobitvami  $\rho$ ,  $\rho_1$ ,  $\rho_2$ . Tedaj za vse  $g \in G$  velja*

$$\chi_\rho(1) = \deg(\rho), \quad \chi_{\rho_1 \oplus \rho_2} = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}, \quad \chi_{\rho_1 \otimes \rho_2} = \chi_{\rho_1} \cdot \chi_{\rho_2}, \quad \chi_{\rho^*}(g) = \chi_\rho(g^{-1}).$$

*Za podgrupo  $H \leq G$  in poljuben  $h \in H$  velja*

$$\chi_{\text{Res}_H^G(\rho)}(h) = \chi_\rho(h).$$

*Kadar je  $H \leq G$  končnega indeksa in  $\rho$  upodobitev grupe  $H$ , za poljubno izbiro predstavnikov desnih odsekov  $R$  grupe  $H$  v  $G$  velja*

$$\chi_{\text{Ind}_H^G(\rho)}(g) = \sum_{r \in R: rgr^{-1} \in H} \chi_\rho(rgr^{-1}).$$

<sup>13</sup>**Konjugiranostni razred** elementa  $g \in G$  je množica  $\{xgx^{-1} \mid x \in G\}$ . Grupa  $G$  je disjunktna unija konjugiranostnih razredov svojih elementov. Včasih uporabljamo oznako  $g^x = x^{-1}gx$  in s tem oznako  $g^G$  za konjugiranostni razred elementa  $g$  v  $G$ .



*Dokaz.* Netrivialna je le zadnja enakost o indukciji. Naj  $H$  deluje na prostoru  $V$  prek  $\rho$ . Spomnimo se, da lahko induciran prostor identificiramo z direktno vsoto  $\bigoplus_{r \in R} Vr$ , kjer je  $Vr$  kopija prostora  $V$  pri komponenti  $r$ . Element  $g \in G$  deluje na  $vr_0 \in Vr_0$  kot

$$g \cdot vr_0 = (\rho(h) \cdot v)r,$$

kjer je  $r = hr_0g^{-1}$  za enolično določena  $r \in R, h \in H$ . Prostori  $Vr$  se torej pri delovanju med sabo permutirajo, poleg tega pa grupa deluje netrivialno še na vsaki komponenti posebej. Za izračun sledi so zato relevantne samo komponente, ki so fiksne pri tej permutaciji. To so komponente  $Vr_0$ , za katere je  $r = r_0$ , se pravi komponente z lastnostjo  $hr_0g^{-1} = Hr_0$ , kar je nazadnje enakovredno pogoju  $r_0gr_0^{-1} \in H$ . Za tako komponento  $Vr_0$  element  $g$  deluje na vektorju  $vr_0$  kot

$$g \cdot vr_0 = (\rho(r_0gr_0^{-1}) \cdot v)r_0,$$

zato je sled induciranega delovanja  $g$  na  $Vr_0$  enaka  $\chi_\rho(r_0gr_0^{-1})$ . Ko seštejemo prispevke po vseh relevantnih predstavnikih  $r_0 \in R$ , dobimo želeno formulo za induciran karakter.  $\square$

**Zgled.** Naj bo  $G$  končna grupa. V tem primeru je regularna upodobitev  $\rho_{\text{fun}}$  končnorazsežna. Določimo njen karakter najprej na roke. V regularni upodobitvi imamo naravno bazo iz karakterističnih funkcij

$$1_x: G \rightarrow F, \quad y \mapsto \begin{cases} 1 & y = x, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Na vsaki od teh elemente grupe  $g \in G$  deluje kot  $\rho_{\text{fun}}(g) \cdot 1_x = 1_{xg^{-1}}$ . Grupa  $G$  torej permutira karakteristične funkcije. Sled preslikave  $\rho_{\text{fun}}(g)$  je zato enaka številu karakterističnih funkcij, ki jih ta preslikava fiksira. To je mogoče le, če je  $x = xg^{-1}$ , kar pa se zgodi zgolj pri  $g = 1$ , ko je  $\rho_{\text{fun}}(1) = \text{id}$  s sledjo  $\dim \text{fun}(G, F) = |G|$ . Torej je karakter regularne upodobitve končne grupe enak

$$\chi_{\rho_{\text{fun}}}: G \rightarrow F, \quad g \mapsto \begin{cases} |G| & g = 1, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Ta karakter bi lahko hitreje izračunali s pomočjo znane identifikacije  $\rho_{\text{fun}} \cong \text{Ind}_1^G(\mathbf{1})$ . V tem primeru je  $R = G$  in za  $g \neq 1$  je vsota v formuli za induciran karakter prazna, torej se evalvira v 0, za  $g = 1$  pa dobimo  $\sum_{r \in G} \chi_1(1) = |G|$ .

Lastnost karakterjev kot srža upodobitve se prenese na končnorazsežne polenostavne upodobitve, če je le polje ničelne karakteristike. Karakter dane polenostavne upodobitve  $\rho$  namreč lahko razvijemo kot

$$\chi_\rho = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \text{mult}_\rho(\pi) \cdot \chi_\pi.$$

Polenostavna upodobitev je enolično določena s svojimi nerazcepnimi komponentami in njihovimi večkratnostmi. Če je torej  $\chi_{\rho_1} = \chi_{\rho_2}$  za polenostavni upodobitvi  $\rho_1, \rho_2$ , potem od tod iz neodvisnosti nerazcepnih karakterjev sledi enakost  $\text{mult}_{\rho_1}(\pi) = \text{mult}_{\rho_2}(\pi)$  za vsako nerazcepno upodobitev  $\pi$ . To je enakost v polju  $F$ , od koder po predpostavki o ničelni karakteristiki sledi, da ta enakost velja tudi v kolobarju celih števil. S tem je  $\rho_1 \cong \rho_2$ .

**Posledica.** *Nad algebraično zaprtim poljem ničelne karakteristike je polenostavna upodobitev do izomorfizma natančno določena s svojim karakterjem.*

Karakterji so torej funkcije na grupi, s katerimi so v mnogih primerih upodobitve, ki so sicer mnogo bolj kompleksni objekti kot le funkcije na grupi, natančno določene. V nadaljevanju bomo videli, da lahko včasih eksplicitno izračunamo vse nerazcepne karakterje, brez da bi sploh poznali same nerazcepne upodobitve. Na ta način lahko dodobra razumemo kategorijo upodobitev dane grupe zgolj z uporabo karakterjev.

## Poglavje 3

# Upodobitve končnih grup

V tem poglavju bomo raziskali kategorijo upodobitev končne grupe s posebnim poudarkom na situaciji, ko je karakteristika polja tuja moči grupe. V tem primeru je, kot bomo videli, vsaka upodobitev polenostavna, zato lahko vprežemo karakterje za razumevanje kategorije upodobitev.

### 3.1 Polenostavnost

#### Nerazcepne upodobitve

Prepričajmo se najprej, da končne grupe nimajo *prevelikih* nerazcepnih upodobitev.

**Trditev.** Vsaka nerazcepna upodobitev končne grupe je končnorazsežna.

*Dokaz.* Naj bo  $G$  končna grupa z upodobitvijo  $\rho$  na prostoru  $V$ . Izberimo poljuben neničeln vektor  $v \in V$ . Opazujmo podprostor

$$W = \langle \rho(g) \cdot v \mid g \in G \rangle$$

prostora  $V$ . Ker je  $G$  končna, je  $W$  končnorazsežen. Hkrati je po konstrukciji ta podprostor  $G$ -invarianten. Vsaka upodobitev končne grupe ima torej končnorazsežno podupodobitev. V posebnem to pomeni, da ni neskončnorazsežne nerazcepne upodobitve.  $\square$

Iz trditve in razmislekov v prejšnjem poglavju sledi, da je vsaka nerazcepna upodobitev končne grupe vsebovana v regularni upodobitvi. Nad algebraino zaprtim poljem dodatno velja, da je razsežnosti kvečjemu  $\sqrt{|G|}$ .

#### Maschkejev izrek

Spoznali smo že, da niso vse upodobitve polenostavne, niti kadar je grupa končna. Videli smo primer grupe  $S_3$  z dvorazsežno upodobitvijo  $\rho$ , ki je bila definirana nad kolobarjem  $\mathbf{Z}$  in katere projekcija po modulu 3 *ni* bila polenostavna. Naslednji izrek razkrije, da je to mogoče le v primeru, ko karakteristika polja deli moč grupe.

**Izrek (Maschke).** Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  polje. Tedaj je vsaka upodobitev  $G$  nad poljem  $F$  polenostavna, če in samo če  $\text{char}(F) \nmid |G|$ .

Preden dokažemo izrek, pojasnimo, kako in zakaj nam prideta prav končnost grupe  $G$  in ustrezna karakteristika polja  $F$ . Ti dve predpostavki namreč odpirata vrata orodju **povprečenja po grupi**. Za dano funkcijo  $f \in \text{fun}(G, F)$  lahko v tej ugodni situaciji izračunamo njeno povprečno vrednost<sup>1</sup>

$$\mathbf{E}(f) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \in F.$$

Te račune povprečij lahko razširimo na izračun povprečne linearne preslikave upodobitve. Za dano upodobitev  $\rho$  grupe  $G$  na prostoru  $V$  lahko v tej ugodni situaciji izračunamo njeno povprečno vrednost

$$\mathbf{E}(\rho) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \in \text{hom}(V, V).$$

**Domača naloga.** Preveri, da je  $\mathbf{E}(\rho) \in \text{hom}_G(V, V)$  projekcijska spletična na podprostor fiksnih vektorjev  $V^G$ .

*Dokaz Maschkejevega izreka.* ( $\Leftarrow$ ): Predpostavimo  $\text{char}(F) \nmid |G|$ . Naj bo  $\rho$  upodobitev grupe  $G$  na prostoru  $V$  in naj bo  $W$  poljuben  $G$ -invarianten podprostor. Naj bo  $P \in \text{hom}(V, V)$  projektor na  $W$ . Grupa  $G$  deluje na prostoru linearnih preslikav  $\text{hom}(V, V)$ . Povprečna vrednost tega delovanja je projekcijska spletična na podprostor spletičen  $\text{hom}(V, V)^G = \text{hom}_G(V, V)$ . Ko to povprečno vrednost uporabimo na projektorju  $P$ , dobimo torej linearno preslikavo

$$Q = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot P \in \text{hom}_G(V, V),$$

za katero velja  $Q|_W = \text{id}_W$  in  $\text{im } Q = W$ . Torej je  $Q$  projekcijska spletična na  $W$ . Njeno jedro je zato  $G$ -invarianten komplement prostora  $W \vee V$ . ✓

( $\Rightarrow$ ): Predpostavimo, da  $\text{char}(F) \mid |G|$ .<sup>2</sup> Opazujmo regularno upodobitev  $\rho_{\text{fun}}$  na prostoru  $\text{fun}(G, F)$ . Ta prostor ima vselej  $G$ -invarianten podprostor

$$\text{hom}_0(G, F) = \{f \in \text{fun}(G, F) \mid \sum_{g \in G} f(g) = 0\}$$

korazsežnosti 1 v  $\text{fun}(G, F)$ . Dokažimo, da upodobitev na tem podprostoru ni komplementirana in da torej vsaka upodobitev ni polenostavna.

Zavoljo protislovja predpostavimo, da komplement obstaja. Imamo torej funkcijo  $0 \neq \phi \in \text{fun}(G, F)$ , za katero velja  $\sum_{g \in G} \phi(g) \neq 0$  in prostor  $F \cdot \phi$  je  $G$ -invarianten. Torej obstaja enorazsežna upodobitev  $\chi: G \rightarrow F^*$ , da pri vsakem  $g \in G$  velja  $g \cdot \phi = \chi(g) \cdot \phi$ , se pravi  $\phi(g) = \chi(g) \cdot \phi(1)$ . Od tod sledi

$$\sum_{g \in G} \phi(g) = \phi(1) \cdot \sum_{g \in G} \chi(g).$$

Trdimo, da je zadnja vsota vselej ničelna, kar nas privede v protislovje s predpostavko  $\sum_{g \in G} \phi(g) \neq 0$ . Če je namreč  $\chi$  trivialna upodobitev, potem iz predpostavke o karakteristiki izpeljemo

$$\sum_{g \in G} \chi(g) = |G| = 0.$$

<sup>1</sup>Tukaj uporabljamo verjetnostno oznako za povprečno vrednost. Mislimo si, da enakomerno naključno izberemo element  $X$  iz grupe  $G$  in v njem izračunamo vrednost  $f$ . Število  $\mathbf{E}(f)$  je pričakovana vrednost slučajne spremenljivke  $f(X)$ .

<sup>2</sup>V tem primeru sicer nimamo dostopa do povprečenja v celoti, lahko pa uporabimo delno povprečenje, ki izračuna le vsoto po grupi.

Če pa  $\chi$  ni trivialna, potem za nek  $x \in G$  velja  $\chi(x) \neq 1$  in v tem primeru izračunamo

$$(\chi(x) - 1) \cdot \sum_{g \in G} \chi(g) = \sum_{g \in G} \chi(xg) - \sum_{g \in G} \chi(g) = 0,$$

kar zopet implicira  $\sum_{g \in G} \chi(g) = 0$ .  $\checkmark$

□

**Zgled.** V ekstremni situaciji, ko je  $\text{char}(F) = p > 0$  in  $|G| = p^n$  za nek  $n \in \mathbf{N}$ , kategorija upodobitev izgleda precej nenavadno. V takih neugodnih razmerah *netrivialnih nerazcepnih upodobitev ni*. Poglejmo si, zakaj je temu tako v primeru  $F = \mathbf{F}_p$  za neko praštevilo  $p$ .<sup>3</sup>

Imejmo netrivialno nerazcepno upodobitev  $p$ -grupe  $G$  na prostoru  $V$  nad poljem  $\mathbf{F}_p$ . Vemo že, da je  $V$  nujno končnorazsežen, zato je  $|V| = p^k$  za nek  $k \in \mathbf{N}$ . Grupa  $G$  permutacijsko deluje na množici neničelnih vektorjev  $V \setminus \{0\}$ . Po lemi o orbiti in stabilizatorju je velikost orbite vsakega neničelnega vektorja enaka indeksu stabilizatorja, ki je po predpostavki o moči grupe nujno potenca praštevila  $p$ . Ker pa moč  $|V \setminus \{0\}|$  ni deljiva s  $p$ , mora obstajati vektor  $0 \neq v \in V$  z orbito moči 1. Ta vektor je torej fiksni za delovanje grupe  $G$  in zato razpenja enorazsežen podprostor  $\mathbf{F}_p \cdot v$ , ki je kot upodobitev izomorfen **1**. To je seveda sprto s predpostavko o nerazcepni upodobitvi  $G$  na  $V$ .

## Dekompozicija regularne upodobitve

Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Vsaka nerazcepna upodobitev  $\pi$  grupe  $G$  nad  $F$  je uresničljiva kot podupodobitev regularne  $\rho_{\text{fun}}$ . Slednja je po Maschkejevem izreku polenostavna, zato jo lahko zapišemo kot direktno vsoto izotipičnih komponent nerazcepnih upodobitev. Vsaka  $\pi$ -komponenta pri tem sestoji iz  $\deg(\pi)$  mnogo kopij upodobitve  $\pi$ . Izpostavimo in povzemimo.

**Izrek.** *Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Velja*

$$\rho_{\text{fun}} \cong \bigoplus_{\pi \in \text{Irr}(G)} \underbrace{\pi \oplus \pi \oplus \cdots \oplus \pi}_{\deg(\pi)}.$$

V posebnem iz izreka po primerjavi razsežnosti izpeljemo

$$\sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \deg(\pi)^2 = |G|.$$

**Zgled.**

- Opazujmo permutacijsko upodobitev  $\pi$  grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  na prostoru  $\mathbf{C}[\Omega]$ , kjer je  $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ . Premislili smo že, da je  $\pi$  izomorfna regularni upodobitvi in da jo lahko razstavimo kot direktno vsoto  $\pi = \bigoplus_{j \in \Omega} \chi_j$ , kjer je  $\chi_j: \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{C}^*$ ,  $x \mapsto e^{2\pi i j x / n}$ , enorazsežna upodobitev. V posebnem od tod sledi, da so  $\{\chi_j \mid j \in \Omega\}$  vse neizomorfne nerazcepne upodobitve ciklične grupe  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ .

<sup>3</sup>Splošen primer hitro sledi iz tega posebnega. Če je namreč  $F$  karakteristike  $p$ , ima prapolje  $\mathbf{F}_p$ . Upodobitev v tem primeru obravnavamo nad tem prapoljem.

- Naj bo  $A$  poljubna končna abelova grupa. Strukturni izrek o abelovih grupah nam pove, da  $A$  lahko zapišemo kot direktni produkt določenih cikličnih grup, se pravi  $A = C_1 \times C_2 \times \cdots \times C_k$ . Kategorijo upodobitev vsake od cikličnih kosov nad  $\mathbf{C}$  že poznamo. Naj bodo  $\{\chi_j^i \mid j \in \Omega_i\}$  nerazcepne upodobitve grupe  $C_i$ . Tvorimo lahko **produkt upodobitev**

$$\chi_{j_1}^1 \times \chi_{j_2}^2 \times \cdots \times \chi_{j_k}^k : \prod_{i=1}^k C_i = A \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad (c_1, c_2, \dots, c_k) \mapsto \prod_{i=1}^k \chi_{j_i}^i(c_i).$$

Na ta način dobimo  $\prod_{i=1}^k |\Omega_i| = \prod_{i=1}^k |C_i| = |A|$  enorazsežnih upodobitev. Vsaki dve od teh sta različni med sabo. Na ta način smo torej našli vse nerazcepne upodobitve abelove grupe  $A$ .

## Ortogonalnost matričnih koeficientov

Na prostor funkcij  $\text{fun}(G, F)$  uvedimo **skalarni produkt** s predpisom

$$[f_1, f_2] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) f_2(g^{-1})$$

za  $f_1, f_2 \in \text{fun}(G, F)$ . Ker je polje  $F$  v splošnem abstraktno, to sicer ni običajen skalarni produkt, je pa to vendarle nedegenerirana simetrična bilinearna forma na  $\text{fun}(G, F)$ , zato zanjo uporabljamo vso standardno terminologijo iz običajnih skalarnih produktov.

Z uporabo povprečenja na prostoru linearnih preslikav (podobno kot pri dokazu Maschkejevega izreka) bomo nadgradili dekompozicijo regularne upodobitve na *ortogonalno* direktno vsoto.

**Trditev.** Naj bo  $G$  končna grupa z neizomorfne nerazcepnimi upodobitvama  $\pi_1, \pi_2$  nad algebraično zaprtim poljem karakteristike tuje  $|G|$ . Tedaj sta prostora  $\text{MK}(\pi_1)$  in  $\text{MK}(\pi_2)$  ortogonalna.

*Dokaz.* Naj upodobitvi  $\pi_1, \pi_2$  delujeta na prostorih  $V_1, V_2$ . Grupa  $G$  deluje na prostoru linearnih preslikav  $\text{hom}(V_1, V_2)$ . Povprečje tega delovanja je projekcijska spletična na podprostor  $\text{hom}(V_1, V_2)^G = \text{hom}_G(V_1, V_2)$ , ki je po Schurovi lemi trivialen. Za poljubno linearno preslikavo  $A \in \text{hom}(V_1, V_2)$  je torej

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot A = 0.$$

Konkretizirajmo preslikavo  $A$ . Naj bo  $\{e_i\}_i$  baza prostora  $V_1$  in  $\{f_j\}_j$  baza prostora  $V_2$ . Vzemimo

$$A_{i,l} : V_1 \rightarrow V_2, \quad v \mapsto [e_i^*, v] f_l.$$

S to izbiro dosežemo enakost

$$0 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot A_{i,l}(g^{-1} \cdot e_j) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [e_i^*, g^{-1} \cdot e_j] g \cdot f_l = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_{i,j}^{\pi_1}(g^{-1}) g \cdot f_l.$$

Na zadnjem uporabimo še  $f_k^*$ , pa dobimo

$$0 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_{i,j}^{\pi_1}(g^{-1}) [f_k^*, g \cdot f_l] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_{i,j}^{\pi_1}(g^{-1}) f_{k,l}^{\pi_2}(g),$$

kar je enakovredno  $[f_{i,j}^{\pi_1}, f_{k,l}^{\pi_2}] = 0$ , se pravi ortogonalnosti matričnih koeficientov.  $\square$

Na soroden način lahko analiziramo skalarne produkte znotraj matričnih koeficientov ene same nerazcepne upodobitve.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  končna grupa z nerazcepno upodobitvijo  $\pi$  nad algebraično zaprtim poljem karakteristike tuje  $|G|$ . Po izbiri poljubne baze za matrične koeficiente velja*

$$[f_{i,j}, f_{k,l}] = \begin{cases} 1/\deg(\pi) & (i,j) = (l,k) \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

*Dokaz.* Pristopimo kot pri zadnjem dokazu, pri čemer prostor spletičen  $\text{hom}_G(V, V)$  po Schurovi lemi zdaj sestoji le iz skalarnih večkratnikov identitete. Za linearno preslikavo  $A \in \text{hom}(V, V)$  je zato

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot A = \lambda_A \cdot \text{id}_V$$

za nek  $\lambda_A \in F^*$ . Velja  $g \cdot A = \pi(g)A\pi(g)^{-1}$ , zato je  $\text{tr}(g \cdot A) = \text{tr}(A)$ , od koder izpeljemo

$$\lambda_A = \frac{\text{tr}(A)}{\deg(\pi)}.$$

Kot v zadnjem dokazu dobljeno uporabimo s preslikavo  $A_{i,l}(v) = [e_i^*, v]e_l$  za neko izbrano bazo  $\{e_i\}_i$  prostora  $V$ . Velja  $\text{tr}(A_{i,l}) = [e_i^*, e_l] = 1_{i=l}$ , od koder kot v zadnjem dokazu izpeljemo

$$[f_{i,j}, f_{k,l}] = [e_k^*, e_j] \frac{1_{i=l}}{\deg(\pi)} = \frac{1_{i=l, j=k}}{\deg(\pi)},$$

kar je natanko želeno. □

## 3.2 Karakterji

Iz rezultatov zadnjega razdelka sledi, da je nad algebraično zaprtim poljem ničelne karakteristike (na primer zelo ugodnim poljem  $\mathbf{C}$ ) kategorija upodobitev dane končne grupe popolnoma določena z nerazcepnimi upodobitvami, ki jih lahko razumemo s pomočjo karakterjev. V tem razdelku bomo podrobneje razvili to teorijo.

### Ortonormiranost karakterjev

Iz ortogonalnosti matričnih koeficientov z lahkoto izpeljemo ortonormiranost karakterjev.

**Posledica.** *Naj bo  $G$  končna grupa z nerazcepnima upodobitvama  $\pi_1, \pi_2$  nad algebraično zaprtim poljem karakteristike tuje  $|G|$ . Velja*

$$[\chi_{\pi_1}, \chi_{\pi_2}] = \begin{cases} 1 & \pi_1 \cong \pi_2, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

*Dokaz.* Izberemo bazo, izrazimo  $\chi_\pi = \sum_i f_{i,i}^\pi$  in uporabimo zadnji dve trditvi o skalarnih produktih matričnih koeficientov. □

V skladu z običajno terminologijo za funkcijo  $f \in \text{fun}(G, F)$  označimo  $\|f\| = \sqrt{[f, f]}$ , to je **norma** funkcije  $f$ . Nerazcepni karakterji tvorijo ortonormiran sistem vektorjev v  $\text{fun}(G, F)$ .

## Razredne funkcije

Karakterji niso poljubne funkcije v  $\text{fun}(G, F)$ , temveč vselej pripadajo prostoru  $\text{fun}_{\text{cl}}(G, F)$  razrednih funkcij. Vemo že tudi, da so karakterji nerazcepnih upodobitev tudi linearno nedovisni. S pomočjo ortonormiranosti karakterjev bomo sedaj dokazali, da tvorijo celo bazo prostora razrednih funkcij.

**Izrek** (o bazi razrednih funkcij). *Naj bo  $G$  grupa in  $F$  algebrastično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Tedaj karakterji nerazcepnih upodobitev tvorijo ortonormirano bazo prostora  $\text{fun}_{\text{cl}}(G, F)$ .*

Zopet bomo za dokaz uporabili metodo povprečenja po grupi, a bomo to povprečenje še utežili. Za dano funkcijo  $f \in \text{fun}(G, F)$  definiramo njeno **nekomutativno Fourierovo transformacijo**  $\hat{f}$  kot funkcijo, ki poljubni upodobitvi  $\rho$  grupe  $G$  na prostoru  $V$  priredi

$$\hat{f}(\rho) = \sum_{g \in G} f(g) \rho(g^{-1}) \in \text{hom}(V, V).$$

Fourierova transformacija funkciji  $f$  torej priredi njeno uteženo povprečje poljubne upodobitve vzdolž  $f$ , pri čemer se zgleduje po skalarnem produktu na prostoru funkcij  $\text{fun}(G, F)$ . V primeru, ko je  $f$  konstantna funkcija  $1/|G|$ , z njeno Fourierovo transformacijo najdemo običajno povprečno vrednost upodobitve  $\mathbf{E}(\rho)$ .

### Zgled.

- Naj bo  $f$  poljubna periodična funkcija na množici  $\mathbf{Z}$  s periodo  $n > 1$  in vrednostmi v  $\mathbf{C}$ . Funkcijo  $f$  lahko torej obravnavamo kot funkcijo na ciklični grupi  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ . Nerazcepne kompleksne upodobitve slednje grupe so ravno enorazsežne upodobitve  $\chi_j(x) = e^{2\pi i j x / n}$  za  $j \in \Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ . Nekomutativna Fourierova transformacija funkcije  $f$  v teh upodobitvah je

$$\hat{f}(\chi_j) = \sum_{x \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} f(x) e^{-2\pi i j x / n}.$$

Vektorju števil  $(f(1), f(2), \dots, f(n)) \in \mathbf{C}^n$  na ta način priredimo vektor števil  $(\hat{f}(\chi_1), \hat{f}(\chi_2), \dots, \hat{f}(\chi_n)) \in \mathbf{C}^n$ . To prirejanje je v numerični matematiki znano pod imenom **diskretna Fourierova transformacija** in je fundamentalno v digitalnem procesiranju signalov.

- Naj bo  $f \in \text{fun}(G, F)$  funkcija na  $G$  in  $\rho_{\text{fun}}$  regularna upodobitev grupe  $G$ . Vrednost  $\hat{f}(\rho_{\text{fun}})$  je linearni endomorfizem prostora funkcij  $\text{fun}(G, F)$ . Pri tem se karakteristična funkcija  $1_x$  za  $x \in G$  preslika v

$$\hat{f}(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_x = \sum_{g \in G} f(g) \rho_{\text{fun}}(g^{-1}) \cdot 1_x = \sum_{g \in G} f(g) 1_{xg} = \sum_{g \in G} f(x^{-1}g) 1_g.$$

V posebnem pri  $x = 1$  dobimo  $\hat{f}(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_1 = f$ . Funkcijo  $f$  lahko torej rekonstruiramo iz vrednosti njene Fourierove transformacije v regularni upodobitvi.

Regularna upodobitev končne grupe nad ugodnim poljem je direktna vsota nerazcepnih upodobitev grupe, zato je tudi Fourierova transformacija v regularni upodobitvi direktna vsota Fourierovih transformacij v nerazcepnih upodobitvah. Iz zgornjega premisleka sledi, da je vsaka funkcija zatorej enolično določena z vrednostmi svoje Fourierove transformacije v vseh nerazcepnih upodobitvah.



**Lema** (o Fourierovi transformaciji razredne funkcije). *Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Za vsako razredno funkcijo  $f$  in nerazcepno upodobitev  $\pi$  na prostoru  $V$  je*

$$\hat{f}(\pi) = \frac{|G|}{\deg(\pi)} \cdot [f, \chi_\pi] \cdot \text{id}_V.$$

*Dokaz.* Za vsak  $h \in G$  velja

$$\hat{f}(\pi) \cdot \pi(h) = \sum_{g \in G} f(g) \pi(g^{-1}h) = \sum_{g \in G} f(g) \pi(h) \pi(h^{-1}g^{-1}h).$$

Izpostavimo  $\pi(h)$  in na grupi  $G$  uporabimo avtomorfizem  $g \mapsto hgh^{-1}$ , pa lahko zadnjo vsoto zapišemo kot

$$\pi(h) \sum_{g \in G} f(hgh^{-1}) \pi(g^{-1}).$$

Ker je  $f$  razredna funkcija, je dobljeno ravno enako  $\pi(h) \cdot \hat{f}(\pi)$ . Vrednost Fourierove transformacije v  $\pi$  je torej spletična v  $\text{hom}_G(\pi, \pi)$ . Po Schurovi lemi sklepamo, da je  $\hat{f}(\pi)$  skalarni večkratnik identitete. Njegova sled je enaka

$$\text{tr}(\hat{f}(\pi)) = \sum_{g \in G} f(g) \chi_\pi(g^{-1}) = |G| \cdot [f, \chi_\pi].$$

Od tod izračunamo relevantni skalar kot  $|G| \cdot [f, \chi_\pi] / \deg(\pi)$ . □

Opremljeni lahko z lahkoto izpeljemo izrek.

*Dokaz izreka o bazi razrednih funkcij.* Predpostavimo, da nerazcepni karakterji *ne* razpenjajo prostora razrednih funkcij. Torej obstaja funkcija  $f \in \text{fun}_{\text{cl}}(G, F)$ , ki je vsebovana v ortogonalnem komplementu vseh nerazcepnih karakterjev. Za vsak  $\pi \in \text{Irr}(G)$  velja torej  $[f, \chi_\pi] = 0$ . Preslikava  $\hat{f}(\pi)$  je po lemi zato ničelna. Ker to velja za vsako nerazcepno upodobitev, mora veljati tudi za regularno upodobitev, se pravi  $\hat{f}(\rho_{\text{fun}}) = 0$ . Po zadnjem zgledu to implicira  $f = 0$ . □

Vsaka razredna funkcija je enolično določena s svojimi vrednostmi v predstavnikih konjugiranih razredov. Če **število konjugiranih razredov** označimo s  $k(G)$ , velja torej  $\dim \text{fun}_{\text{cl}}(G, F) = k(G)$ . Ker karakterji tvorijo bazo prostora razrednih funkcij, lahko število nerazcepnih upodobitev torej izračunamo neposredno iz algebraične strukture grupe.

**Posledica.** *Za končno grupo  $G$  nad algebraično zaprtim poljem karakteristike tuje  $|G|$  velja  $|\text{Irr}(G)| = k(G)$ .*

V splošnem *ne* poznamo eksplisitne korespondence<sup>4</sup> med konjugiranimi razredi in nerazcepnimi upodobitvami. Vemo le, da njuno število sovpada.

**Zgled.**

---

<sup>4</sup>In najverjetneje taka korespondenca v splošnem *ne* obstaja. Je pa na voljo za kakšne posebne družine grup, kot bomo spoznali kasneje.

	1	$r^i$	$s$
$\chi_\epsilon$	1	1	$\epsilon$
$\chi_{\rho_k}$	2	$2\cos(2\pi i k/n)$	0

Tabela 3.1: Tabela karakterjev  $D_{2n}$  za lih  $n$

- Opazujemo diedrsko grupo  $D_{2n}$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Vsak element te grupe lahko zapišemo v obliki  $r^i$  ali  $sr^i$  za nek  $0 \leq i < n$ . Izračunajmo konjugiranostne razrede. Velja

$$(r^i)^{r^j} = r^i, \quad (r^i)^{sr^j} = r^{-i},$$

zato je konjugiranostni razred  $r^i$  enak  $\{r^i, r^{-i}\}$ . Za  $i \neq 0, n/2$  ima vsak razred 2 elementa. Vseh teh konjugiranostnih razredov je torej  $\lfloor (n+2)/2 \rfloor$ . Velja tudi

$$(sr^i)^{r^j} = sr^{2j+i}, \quad (sr^i)^{sr^j} = r^{sr^{2j-i}},$$

zato je konjugiranostni razred  $s$  enak  $\{sr^{2j} \mid j \in \mathbf{Z}\}$  in konjugiranostni razred  $sr$  je enak  $\{sr^{2j+1} \mid j \in \mathbf{Z}\}$ . Če je  $n$  sod, sta ta dva razreda disjunktna, če je  $n$  lih, pa sovpadata. Skupaj torej dobimo

$$k(D_{2n}) = \begin{cases} n/2 + 3 & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ (n+3)/2 & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

Določimo zdaj še nerazcepne upodobitve. Poznamo že dvorazsežne nerazcepne upodobitve  $\rho_k$  za  $0 < k < n/2$ , vseh teh je  $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ . Za karakter take upodobitve velja  $\chi_{\rho_k}(r) = 2\cos(2\pi k/n)$ , zato so vsi ti karakterji različni med sabo in s tem so upodobitve  $\rho_k$  neizomorfne. Poleg teh dvorazsežnih upodobitev imamo še linearne upodobitve. Število teh je enako velikosti abelacije  $D_{2n}/[D_{2n}, D_{2n}]$ . Velja

$$[r^i, sr^j] = r^{-i} (r^i)^{sr^j} = r^{-2i}, \quad [sr^i, sr^j] = r^{-i} s (sr^i)^{sr^j} = sr^{2j-2i},$$

zato je  $[D_{2n}, D_{2n}] = \langle r^2 \rangle$ . S tem je

$$D_{2n}/[D_{2n}, D_{2n}] \cong \begin{cases} (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^2 & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

Linearne upodobitve so torej oblike

$$\chi_{\epsilon, \delta}: D_{2n} \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad s \mapsto \epsilon, \quad r \mapsto \delta$$

za  $\epsilon, \delta \in \{1, -1\}$ . Ko je  $n$  lih, je nujno  $\delta = 1$ .

Skupaj smo torej našli ravno  $k(D_{2n})$  nerazcepnih upodobitev, zato so to vse nerazcepne upodobitve grupe  $D_{2n}$ .

- Opazujemo simetrično grupo  $S_n$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Vsako njeno permutacijo  $\sigma \in S_n$  lahko zapišemo kot produkt disjunktnih ciklov.<sup>5</sup> Recimo, da so dolžine teh ciklov enake  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k$ . Seveda velja  $\sum_{i=1}^k \lambda_i = n$ . Zaporedju  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$  pravimo **ciklični tip** permutacije  $\sigma$ . Kadar so kateri od členov cikličnega tipa enaki, ciklični tip pišemo tudi kot  $1^{i_1} 2^{i_2} \dots n^{i_n}$ , kjer je  $i_m$  število ciklov dolžine  $m$  v  $\sigma$ .

<sup>5</sup>Pri tem fiksne točke permutacije obravnavamo kot cikle dolžine 1.

**Domača naloga.** Konjugiranostni razredi v  $S_n$  so določeni s cikličnim tipom. Natančneje, če je  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$  ciklični tip permutacije  $\sigma$ , potem konjugiranostni razred  $\sigma^{S_n}$  sestoji natanko iz vseh permutacij s tem cikličnim tipom. Ta konjugiranostni razred ponavadi označimo kot  $\mathcal{C}_{(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)}$ .

V teoriji števil in kombinatoriki cikličnim tipom rečemo tudi **razčlenitve** števila  $n$ . Število vseh razčlenitev označimo s  $p(n)$ . Velja torej  $p(n) = k(S_n) = |\text{Irr}(S_n)|$ . Splošna eksplicitna formula za to število ne obstaja, poznamo pa njeno asimptotsko oceno<sup>6</sup>

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}}$$

za  $n \rightarrow \infty$ .

V konkretnem primeru  $n = 3$  velja  $p(3) = 3$ , namreč  $3 = 3 = 2 + 1 = 1 + 1 + 1$ . Res smo našli natanko 3 nerazcepne upodobitve grupe  $S_3$ . V primeru  $n = 4$  pa velja  $p(4) = 5$ . Temu ustrezajo konjugiranostni razredi identične permutacije  $()$  ( $4 = 1 + 1 + 1 + 1$ ), transpozicije  $(1\ 2)$  ( $4 = 2 + 1 + 1$ ), tricikla  $(1\ 2\ 3)$  ( $4 = 3 + 1$ ), štiricikla  $(1\ 2\ 3\ 4)$  ( $4 = 4$ ) in produkta dveh tranzpozicij  $(1\ 2)(3\ 4)$  ( $4 = 2 + 2$ ). Ti konjugiranostni razredi so zaporedoma velikosti 1, 6, 8, 6, 3. Kmalu bomo s tem podatkom določili tabelo karakterjev grupe  $S_4$ .

Ker nerazcepni karakterji tvorijo ortonormirano bazo prostora razrednih funkcij, lahko vsako razredno funkcijo  $f \in \text{fun}_{\text{cl}}(G, F)$  razvijemo po tej bazi kot

$$f = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} [f, \chi_\pi] \chi_\pi.$$

Alternativna baza prostora razrednih funkcij sestoji iz karakterističnih funkcij konjugiranostnih razredov v  $G$ . Razvoj te baze po karakterjih nam podaja še eno relacijo med karakterji, ki je ortogonalna<sup>7</sup> ortonormiranosti.

**Posledica.** Naj bo  $G$  končna grupa nad algebraično zaprtim poljem karakteristike tuje  $|G|$ . Za vsaka elementa  $g, h \in G$  velja

$$\sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_\pi(g) \chi_\pi(h^{-1}) = \begin{cases} |G|/|g^G| & g^G = h^G, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

*Dokaz.* Karakteristično funkcijo  $1_{h^G}$  razvijemo po nerazcepnih karakterjih kot

$$1_{h^G} = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} [1_{h^G}, \chi_\pi] \chi_\pi = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \frac{|h^G|}{|G|} \chi_\pi(h^{-1}) \chi_\pi$$

in dobljeno evalviramo v elementu  $g$ . □

<sup>6</sup>G. H. Hardy in S. Ramanujan, *Asymptotic formulae in combinatory analysis*, *Proceedings of the London Mathematical Society, Second Series*, **17** (1918) 75–115.

<sup>7</sup>Relaciji sta ortogonalni v smislu tabele karakterjev. Ortonormiranost karakterjev preberemo tako, da fiksiramo vrstice. To drugo relacijo pa preberemo tako, da fiksiramo stolpce. Tej relaciji včasih rečemo **druga ortogonalnostna relacija**.

## Razstavljanje upodobitve

S pomočjo ortonormirane baze karakterjev lahko z lahkoto razumemo vsako končnorazsežno upodobitev končne grupe nad ugodnim poljem.

**Posledica.** Naj bo  $G$  končna grupa s končnorazsežno upodobitvijo  $\rho$  nad algebraično zaprtim poljem karakteristike 0.

1. Za vsako nerazcepno upodobitev  $\pi$  velja  $\text{mult}_\rho(\pi) = [\chi_\rho, \chi_\pi]$ .
2.  $\|\chi_\rho\|^2 = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \text{mult}_\rho(\pi)^2$ .
3. Upodobitev  $\rho$  je nerazcepna, če in samo če  $\|\chi_\rho\| = 1$ .

*Dokaz.* Upodobitev  $\rho$  je polenostavna, zato lahko njen karakter zapišemo kot

$$\chi_\rho = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \text{mult}_\rho(\pi) \cdot \chi_\pi.$$

Skalarno pomnožimo s  $\chi_\pi$  in uporabimo ortonormiranost, pa dobimo  $\text{mult}_\rho(\pi) = [\chi_\rho, \chi_\pi]$ . Od tod izračunamo

$$\|\chi_\rho\|^2 = [\chi_\rho, \chi_\rho] = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \text{mult}_\rho(\pi) \cdot [\chi_\rho, \chi_\pi] = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \text{mult}_\rho(\pi)^2.$$

Nazadnje je  $\|\chi_\rho\| = 1$ , če in samo če je za natanko eno nerazcepno upodobitev  $\pi$  njena večkratnost v  $\rho$  enaka 1, se pravi če je  $\rho$  nerazcepna.  $\square$

**Zgled.** Opazujmo grupo  $S_4$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Vemo že, da za predstavnike konjugiranostnih razredov lahko izberemo elemente  $1 = ()$ ,  $(1\ 2)$ ,  $(1\ 2\ 3)$ ,  $(1\ 2\ 3\ 4)$  in  $(1\ 2)(3\ 4)$ . S tem je število nerazcepnih upodobitev enako 5. Določimo jih.

Vemo že, da imamo natanko dve enorazsežni upodobitvi, in sicer  $\mathbf{1}$  in  $\text{sgn}$ . Naj bo  $\pi$  permutacijska upodobitev na prostoru  $\mathbf{C}[\Omega]$ , kjer je  $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ . V standardni bazi je vsaka matrika te upodobitve permutacijska, zato je vrednost karakterja  $\chi_\pi$  v permutaciji  $\sigma$  ravno število fiksnih točk  $\sigma$ . V izbranih predstavnikih konjugiranostnih razredov ima torej  $\chi_\pi$  vrednosti 4, 2, 1, 0, 0. Od tod izračunamo normo

$$\|\chi_\pi\|^2 = \frac{1}{4!} (1 \cdot 4^2 + 6 \cdot 2^2 + 8 \cdot 1^2) = 2.$$

Upodobitev  $\chi_\pi$  torej ni nerazcepna. Velja

$$[\chi_\pi, \chi_1] = \frac{1}{4!} (1 \cdot 4 + 6 \cdot 2 + 8 \cdot 1) = 1,$$

torej  $\pi$  vsebuje  $\mathbf{1}$  z večkratnostjo 1, kar je povsem analogno temu, kar smo videli pri grupi  $S_3$ . Zapišemo lahko torej  $\pi = \mathbf{1} \oplus \rho$  za neko upodobitev  $\rho$ . Njen karakter ima vrednosti 3, 1, 0, -1, -1 in s tem normo

$$\|\chi_\rho\|^2 = \frac{1}{4!} (1 \cdot 3^2 + 6 \cdot 1^2 + 6 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1)^2) = 1,$$

zato je upodobitev  $\rho$  nerazcepna.

Zaenkrat imamo tri nerazcepne upodobitve stopenj 1, 1, 3. Iščemo torej še dve nerazcepni upodobitvi, katerih vsote kvadratov stopenj so enake  $24 - (1^2 + 1^2 + 3^2) = 13$ . Stopnji teh dveh neznanih upodobitev sta zato nujno enaki 2 in 3. Ker že imamo eno nerazcepno upodobitev stopnje

	$()$	$(1\ 2)$	$(1\ 2\ 3)$	$(1\ 2\ 3\ 4)$	$(1\ 2)(3\ 4)$
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_{\text{sgn}}$	1	-1	1	-1	1
$\chi_\tau$	2	0	-1	0	2
$\chi_\rho$	3	1	0	-1	-1
$\chi_{\text{sgn} \otimes \rho}$	3	-1	0	1	-1

Tabela 3.2: Tabela karakterjev  $S_4$

3, lahko iz nje pridelamo novo s tenzoriranjem z upodobitvijo stopnje 1. Dobimo upodobitev  $\text{sgn} \otimes \rho$ . Njen karakter ima vrednosti 3, -1, 0, 1, -1 in s tem normo 1, zato je upodobitev  $\text{sgn} \otimes \rho$  res nerazcepna. Nazadnje nam torej manjka le še ena upodobitev stopnje 2. Imenujmo jo  $\tau$ . Čeprav je ne poznamo, lahko iz ortonormiranosti karakterjev določimo njen karakter  $\chi_\tau$  kot natanko tisto razredno funkcijo, ki je ortogonalna na vse poznane nerazcepne karakterje in je norme 1. Na ta način dobimo vrednosti 2, 0, -1, 0, 2. S tem smo nazadnje določili celotno tabelo karakterjev grupe  $S_4$  nad  $\mathbb{C}$ .<sup>8</sup>

Upodobitve  $\tau$  ni težko eksplicitno določiti. Vemo, da je stopnje 2. Njena vrednost  $\tau((1\ 2)(3\ 4))$  je matrika v  $\text{GL}_2(\mathbb{C})$  reda 2 s sledjo 2. Taka matrika je lahko le identiteta. Torej je  $\tau$  trivialna v konjugiranostnem razredu elementa  $(1\ 2)(3\ 4)$  in je zato pravzaprav restrikcija upodobitve kvocientne grupe  $S_4 w$  po edinki, generirani s tem konjugiranostnim razredom. Slednjo kvocientno grupo identificiramo kot  $S_3$  prek epimorfizma

$$\psi: S_4 \rightarrow S_3, \quad (1\ 2) \mapsto (1\ 2), \quad (1\ 2\ 3\ 4) \mapsto (1\ 3)$$

z jedrom  $\{(), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$ . Upodobitev  $\tau$  torej prepoznamo kot restrikcijo dvorazsežne nerazcepne upodobitve grupe  $S_3$  vzdolž homomorfizma  $\psi$ .

## Projekcije na izotipične komponente

Dekompozicijo regularne upodobitve smo dobili iz matričnih koeficientov nerazcepnih upodobitev, torej gre za nekakšno *notranjo* dekompozicijo. Obstaja pa tudi *zunanja* dekompozicija, pri kateri iz upodobitve same s pomočjo ustreznih projekcijskih spletičen najdemo izotipične komponente upodobitve.

Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Naj bo  $\rho$  podupodobitev regularne upodobitve  $\rho_{\text{fun}}$  na prostoru  $V \leq \text{fun}(G, F)$ . Ta prostor lahko predstavimo kot sliko neke projekcijske spletične  $\Phi \in \text{hom}_G(\rho_{\text{fun}}, \rho)$ . Res je tudi obratno, vsaka spletična  $\Phi \in \text{hom}_G(\rho_{\text{fun}}, \rho_{\text{fun}})$ , ki zadošča  $\Phi^2 = \Phi$ , podaja prek svoje slike podupodobitev regularne upodobitve. Podupodobitve so torej parametrizirane s spletičnimi. Izkaže se, da te vselej izhajajo iz Fourierovih transformacij.

**Trditev.** Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Preslikava

$$\mathcal{F}: \text{fun}(G, F) \rightarrow \text{hom}_G(\rho_{\text{fun}}, \rho_{\text{fun}}), \quad f \mapsto (h \mapsto \hat{h}(\rho_{\text{fun}}) \cdot f)$$

je izomorfizem vektorskih prostorov.

<sup>8</sup>Zanimivo je, da smo uspeli določiti tabelo karakterjev, brez da bi eksplicitno poznali vse upodobitve.

*Dokaz.* Ni težko preveriti, da je  $\mathcal{F}$  dobro definirana preslikava. Očitno je linearna. Za  $f \in \text{fun}(G, F)$  je  $\mathcal{F}(f) \cdot 1_1 = \widehat{1}_1(\rho_{\text{fun}}) \cdot f = f$ , zato je  $\mathcal{F}$  injektivna. Oba prostora sta enake razsežnosti, namreč  $|G|$ , zato je  $\mathcal{F}$  izomorfizem.  $\square$

V posebnem je vsaka endospletična regularne upodobitve enaka evalvaciji Fourierovi transformacije v neki fiksni funkciji.<sup>9</sup> Nekoliko natančneje si pogledjmo, kaj je ta evalvacija. Za funkciji  $f, g \in \text{fun}(G, F)$  je

$$\widehat{h}(\rho_{\text{fun}}) \cdot f = \sum_{g \in G} h(g) \rho_{\text{fun}}(g^{-1}) \cdot f = \left( x \mapsto \sum_{g \in G} h(g) f(xg^{-1}) \right).$$

Zadnjo vsoto prepoznamo kot **konvolucijo** funkcij  $f$  in  $h$ , se pravi

$$(f * h)(x) = \sum_{g \in G} f(xg^{-1})h(g).$$

Velja torej  $\widehat{h}(\rho_{\text{fun}}) \cdot f = f * h$ . Če dodatno predpostavimo, da je  $f$  razredna funkcija, potem se ni težko prepričati, da velja  $f * h = h * f$ , torej je v tem primeru

$$\mathcal{F}(f) \cdot h = \widehat{h}(\rho_{\text{fun}}) \cdot f = \widehat{f}(\rho_{\text{fun}}) \cdot h$$

in zato preslikava  $\mathcal{F}$  ni nič drugega kot običajna Fourierova transformacija razredne funkcije. V posebnem so torej Fourierove transformacije karakterjev endospletične regularne upodobitve. Izkaže se, da so te vselej tesno povezane s projekcijami na izotipične komponente.

**Trditev.** Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Za vsako končnorazsežno upodobitev  $\rho$  in nerazcepno upodobitev  $\pi$  je

$$\frac{\deg(\pi)}{|G|} \cdot \widehat{\chi_\pi}(\rho)$$

projektor na  $\pi$ -izotipično komponento v  $\rho$ .

*Dokaz.* Iz leme o Fourierovi transformaciji razredne funkcije izpeljemo, da za vsaki nerazcepni upodobitvi  $\pi_1, \pi_2$  na prostorih  $V_1, V_2$  velja

$$\frac{\deg(\pi_1)}{|G|} \cdot \widehat{\chi_{\pi_1}}(\pi_2) = \begin{cases} \text{id}_{V_2} & \pi_1 \cong \pi_2, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Ko upodobitev  $\rho$  razstavimo na direktno vsoto nerazcepnih podupodobitev, je linearni endomorfizem  $\deg(\pi)/|G| \cdot \widehat{\chi_\pi}(\rho)$  torej ničeln na podupodobitvah, ki niso izomorfne  $\pi$ , in identiteta na podupodobitvah, ki so izomorfne  $\pi$ . Ta endomorfizem je torej projektor na direktno vsoto podupodobitev, ki so izomorfne  $\pi$ , torej ravno na  $\pi$ -izotipično komponento.  $\square$

**Zgled.** Naj bo  $\rho_{\text{fun}}$  regularna upodobitev grupe  $G$ . Vemo že, da za vsako funkcijo  $f \in \text{fun}(G, F)$  velja  $\widehat{f}(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_1 = f$ . Torej je projekcija funkcije  $1_1$  na  $\pi$ -izotipično komponento enaka

$$\frac{\deg(\pi)}{|G|} \cdot \widehat{\chi_\pi}(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_1 = \frac{\deg(\pi)}{|G|} \cdot \chi_\pi.$$

<sup>9</sup>V asociativni algebri to izrečemo ponavadi takole: vsak levi ideal v polenostavni algebri je glavni.

S tem dobimo razvoj

$$1_1 = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_\pi(1) \cdot \chi_\pi,$$

ki je le poseben primer druge ortogonalnostne relacije.

Oglejmo si še karakteristično funkcijo  $1_x$  za  $x \in G$ . Njena projekcija na  $\pi$ -izotipično komponento je

$$\frac{\deg(\pi)}{|G|} \cdot \widehat{\chi}_\pi(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_x = \frac{\deg(\pi)}{|G|} \cdot (g \mapsto \chi_\pi(x^{-1}g)),$$

s čimer dobimo razvoj

$$1_x(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_\pi(1) \chi_\pi(x^{-1}g).$$

Vsako funkcijo  $f \in \text{fun}(G, F)$  lahko razvijemo po karakterističnih funkcijah kot  $f = \sum_{x \in G} f(x) 1_x$ . Ker že poznamo razvoj vsake od karakterističnih funkcij po  $\pi$ -izotipičnih komponentah, od tod izpeljemo

$$f(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \sum_{x \in G} f(x) \chi_\pi(1) \text{tr}(\pi(x^{-1}) \cdot \pi(g)),$$

kar lahko po upoštevanju linearnosti sledi izrazimo kot

$$f(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_\pi(1) \text{tr}(\hat{f}(\pi) \cdot \pi(g)).$$

Temu razvoju funkcije  $f$  po  $\pi$ -izotipičnih komponentah rečemo **Fourierova inverzija**, saj nam eksplicitno pove, kako lahko  $f$  izračunamo iz njenih Fourierovih transformacij v nerazcepnih upodobitvah.

**Zgled.** Naj bo  $A$  končna abelova grupa. Vemo že, da so vse njene kompleksne upodobitve enorazsežne. V tem primeru so upodobitve kar enake svojim karakterjem. Za dano funkcijo  $f \in \text{fun}(A, \mathbb{C})$  lahko Fourierovo inverzijo zapišemo kot

$$f = \frac{1}{|A|} \sum_{\chi \in \text{Irr}(A)} \hat{f}(\chi) \cdot \chi,$$

kar je le posledica dejstva  $\hat{f}(\chi) = |A| \cdot [f, \chi]$ .

## Izračunljivost tabele karakterjev

Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike 0. Kategorijo  $\text{Rep}(G)$  v tem primeru razumemo zelo dobro, če le poznamo tabelo karakterjev. Za zdaj smo si pogledali nekaj zgledov, kako to tabelo izračunati za posebne primere grupe. Pri tem smo si sicer res pomagali z razvito teorijo, a je bil večji del izračuna tabele opravljen z metodo ostrega pogleda. V splošnem se temu lahko izognemo; obstaja namreč več algoritmov, ki le z uporabo linearne algebre izračunajo tabelo karakterjev.

Pogledali si bomo enega takih algoritmov, ki uporablja projekcije na izotipične komponente iz zadnjega razdelka. Algoritem temelji na Fourierovi transformaciji karakteristične funkcije  $1_C$  konjugiranostnega razreda  $C$  grupe  $G$  v regularni upodobitvi  $\rho_{\text{fun}}$ . Po lemi o Fourierovi transformaciji

razredne funkcije je namreč zožitev  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$  na  $\pi$ -izotipično komponento skalarno množenje s številom

$$\frac{|G|}{\deg(\pi)} \cdot [1_C, \chi_\pi] = |C| \cdot \frac{\chi_\pi(C^{-1})}{\chi_\pi(1)}.$$

Vektorji v  $\pi$ -izotipični komponenti so zato hkratni lastni vektorji preslikav  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$ , ko  $C$  preteče vse konjugiranostne razrede grupe  $G$ . Pokažimo, da je ta opis v resnici karakterizacija  $\pi$ -izotipičnih komponent.

**Lema.** *Naj bo  $G$  končna grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike tuje  $|G|$ . Izotipične komponente regularne upodobitve so natanko netrivialni preseki lastnih podprostorov  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$ , ko  $C$  preteče vse konjugiranostne razrede grupe  $G$ .*

*Dokaz.* Naj bo

$$W = \bigcap_C E_{\lambda_C}(\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})) \leq \text{fun}(G, F)$$

presekok lastnih podprostorov za neke skalarje  $\lambda_C$ , kjer presek teče po vseh konjugiranostnih razredih grupe  $G$ . Predpostavimo, da je  $W \neq 0$ . Naj bo  $w \in W$ . Za  $\pi \in \text{Irr}(G)$  naj bo  $P_\pi$  projekcija na  $\pi$ -izotipično komponento. Velja

$$P_\pi \cdot w = \frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \widehat{\chi}_\pi(\rho_{\text{fun}}) \cdot w = \frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\pi(g) \rho_{\text{fun}}(g^{-1}) \cdot w.$$

Vsoto lahko razvijemo po vsakem konjugiranostnem razredu posebej in dobimo

$$\frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \sum_C \chi_\pi(C) \sum_{g \in C} \rho_{\text{fun}}(g^{-1}) \cdot w = \left( \frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \sum_C \chi_\pi(C) \lambda_C \right) w$$

kjer smo v enakosti upoštevali, da je  $w \in W$ . Od tod sledi

$$W \leq E_{\frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \sum_C \chi_\pi(C) \lambda_C} (P_\pi).$$

Projektor  $P_\pi$  ima seveda le dve možni lastni vrednosti: 0 in 1. Ker je po predpostavki  $W \neq 0$ , ne mora biti za vse  $\pi \in \text{Irr}(G)$  projekcija na  $\pi$ -izotipično komponento ničelna na  $W$ . Torej je za nek  $\pi$  nujno

$$W \leq E_1(P_\pi) = \text{Izotip}_{\rho_{\text{fun}}}(\pi).$$

Vemo že, kako deluje  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$  na  $\pi$ -izotipični komponenti, od koder določimo skalarje kot  $\lambda_C = |C| \cdot \chi_\pi(C^{-1}) / \chi_\pi(1)$ . Iz definicije  $W$  zdaj sledi, da je  $\pi$ -izotipična komponenta vsebovana v  $W$ , s čimer smo nazadnje izpeljali  $W = \text{Izotip}_{\rho_{\text{fun}}}(\pi)$ .  $\square$

S to karakterizacijo izotipičnih komponent lahko opišemo algoritem za izračun tabele karakterjev. Najprej oštevilčimo elemente grupe  $G$  kot  $g_1, g_2, \dots, g_{|G|}$  in pripravimo vektorski prostor  $F^{|G|} \cong \text{hom}(G, F)$  s standardno bazo  $e_i$ , ki ustreza karakteristični funkciji  $1_{g_i}$ . Izračunamo še konjugiranostne razrede grupe  $G$  in iz vsakega izberemo predstavnika. Pripravimo funkcijo, ki izračuna matriko regularne upodobitve  $\rho_{\text{fun}}$  v poljubnem elementu  $x \in G$ , in za tem še funkcijo, ki izračuna matriko Fourierove transformacije  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{hom}})$  za konjugiranostni razred  $C$ . Izračunamo



	( )	(1 2)(3 4)	(1 2 3)	(1 2 3 4 5)	(1 2 3 5 4)
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_2$	5	1	-1	0	0
$\chi_3$	4	0	1	-1	-1
$\chi_4$	3	-1	0	$-\zeta^2 - \zeta^3$	$-\zeta - \zeta^4$
$\chi_5$	3	-1	0	$-\zeta - \zeta^4$	$-\zeta^2 - \zeta^3$

Tabela 3.3: Tabela karakterjev  $A_5$ , kjer je  $\zeta = e^{2\pi i/5}$

lastne podprostore vseh teh matrik in za tem vse njihove netrivialne preseke. Te so ravno izotipične komponente. V vsaki komponenti  $W$  izberemo bazo, v kateri izračunamo sled zožitve matrike  $\rho_{\text{fun}}(x)$  na  $W$ . Ker je  $W$  kot upodobitev izomorfen direktni vsoti  $\deg(\pi)$  kopij neke nerazcepne upodobitve  $\pi$ , velja  $\dim(W) = \deg(\pi)^2$  in zato

$$\text{tr}(\rho_{\text{fun}}(x)|_W) = \sqrt{\dim(W)} \cdot \chi_\pi(x).$$

Iz izračunane sledi torej lahko določimo vrednost pripadajočega karakterja v predstavnikih konjugiranih razredov. Implementacija predstavljenega algoritma za izračun tabele karakterjev nad  $\mathbf{C}$  v programskem jeziku GAP<sup>10</sup> je dostopna [tukaj](#).

**Zgled.** Opazujmo alternirajočo grupo  $A_5$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Z opisanim algoritmom hitro izračunamo njeno tabelo karakterjev.

Iz tabele lahko razberemo kar nekaj lastnosti grupe. Poglejmo si, kako hitro premislamo, da je  $A_5$  enostavna grupa. Če bi namreč  $A_5$  imela kakšno pravo netrivialno edinko  $N$ , potem bi kvocient  $A_5/N$  imel kakšno netrivialno nerazcepno upodobitev  $\rho$ . Restrikcija  $\text{Res}_{G/N}^G(\rho)$  je zato netrivialna nerazcepna upodobitev grupe  $A_5$  z netrivialnim jedrom  $N$ . Vrednost karakterja  $\chi_\rho$  v poljubnem elementu  $N$  je torej enaka  $\chi_\rho(1)$ . Iz tabele karakterjev grupe  $A_5$  pa je jasno, da takega karakterja ni.<sup>11</sup>

Predstavljeni algoritem ima mnogo pomanjkljivosti. V programskem jeziku GAP je za izračun tabele karakterjev implementiran algoritem (Dixon 1967, Schneider 1990), ki izboljša predstavljenega na naslednja dva načina.

1. S predstavljenim algoritmom bomo težko izračunali tabelo karakterjev kakšne zelo velike grupe, saj moramo v postopku diagonalizirati matrike velikosti  $|G| \times |G|$ . Algoritem v GAP sicer temelji na enaki ideji iskanja skupnih lastnih podprostorov, a pri tem ne opazuje regularne upodobitve, temveč upošteva abstraktne formule med karakterji in iz njih izpelje matrike velikosti  $k(G) \times k(G)$ , katerih skupni lastni vektorji so (bolj ali manj) karakterji. Ker je  $k(G)$  bistveno manjše od  $|G|$ , je ta izračun mnogo lažji in hitrejši.
2. Za izračun natančnih vrednosti karakterjev moramo vse račune izvajati eksaktno in brez približkov. Numerične metode, ki jih sicer lahko uporabimo za hitro računanje lastnih vrednosti velikih matrik, torej odpadejo. Programski jezik GAP zna računati simbolično, a je

<sup>10</sup>GAP je programski jezik, ki pride zelo prav pri delu z grupami, saj ima implementiranih veliko standardnih konstrukcij grup in funkcij za delo z njimi. Dostopen je prosto na naslovu <https://www.gap-system.org>.

<sup>11</sup>Iz argumenta vidimo, da velja celo naslednje. Končna grupa  $G$  je enostavna, če in samo če je vsaka njena netrivialna nerazcepna upodobitev zvesta.

to lahko precej zamudno. Algoritem v GAP se temu izogne tako, da večino računov opravi nad poljem  $\mathbf{F}_p$  za ustrezno izbrano dovolj veliko praštevilo  $p$ , potem pa te rezultate prenese nazaj nad  $\mathbf{C}$ . Vsi računi so zato hitri in eksaktni.

## Kolobar virtualnih karakterjev

Pogosto nas ne zanima le računski aspekt upodobitev, temveč konceptualno razumevanje, od kod prihajajo nerazcepne upodobitve dane grupe. Kot bomo videli, tukaj igra glavno vlogo indukcija.

Naj bo  $G$  grupa in  $F$  algebraično zaprto polje karakteristike 0. Karakterji upodobitev grupe  $G$  so celoštevilске kombinacije nerazcepnih karakterjev. Tvorimo množico vseh takih kombinacij, se pravi

$$R(G) = \bigoplus_{\pi \in \text{Irr}(G)} \mathbf{Z} \cdot \chi_\pi \subseteq \text{fun}_{\text{cl}}(G, F).$$

Množica  $R(G)$  je najprej očitno abelova podgrupa razrednih funkcij. Za tem je opremljena z množenjem, ki izhaja iz tenzorskega produkta upodobitev. Množica  $R(G)$  na ta način postane komutativen podkolobar v  $\text{fun}_{\text{cl}}(G, F)$ , ki ga imenujemo **kolobar virtualnih karakterjev**.<sup>12</sup>

Naj bo  $H$  podgrupa v  $G$ . Restrikcija vzdolž vložitve  $H$  v  $G$  porodi *homomorfizem kolobarjev*

$$\text{Res}: R(G) \rightarrow R(H), \quad \chi_\pi \mapsto \text{Res}_H^G(\chi_\pi).$$

Sorodno dobimo z indukcijo preslikavo

$$\text{Ind}: R(H) \rightarrow R(G), \quad \chi_\pi \mapsto \text{Ind}_H^G(\chi_\pi),$$

ki pa je le *homomorfizem abelovih grup*. Ob koncu razdelka o indukciji smo za upodobitvi  $\rho$  v  $\text{Rep}_G$  in  $\sigma$  v  $\text{Rep}_H$  zapisali izomorfizem

$$\text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(\rho) \otimes \sigma) \cong \rho \otimes \text{Ind}_H^G(\sigma),$$

ki ga zdaj lahko interpretiramo s karakterji teh upodobitev in sklenemo, da je slika  $\text{Ind}(R(H))$  *ideal* v  $R(G)$ .

**Zgled.** Naj bo  $H$  ciklična grupa. Definirajmo indikatorsko funkcijo generatorjev grupe  $H$  kot

$$c_H: H \rightarrow F, \quad h \mapsto \begin{cases} |H| & \langle h \rangle = H, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Ker je  $H$  abelova grupa, je seveda  $c_H \in \text{fun}_{\text{cl}}(H, F)$ .

Premislmo, da je celo  $c_H \in R(H)$ . Dokazujmo z indukcijo na  $|H|$ . Vsaka prava podgrupa  $K \leq H$  je tudi ciklična, zato zanjo po indukcijski predpostavki velja  $c_K \in R(K)$ . Naj bo  $R$  množica predstavnikov odsekov  $K \vee H$ . S formulo za indukcijo karakterja za  $h \in H$  izračunamo

$$\text{Ind}_K^H(c_K)(h) = \sum_{r \in R: h \in K} c_K(h) = \begin{cases} |H:K| c_K(h) & h \in K, \\ 0 & \text{sicer} \end{cases} = \begin{cases} |H| & \langle h \rangle = K, \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

<sup>12</sup>Virtualnih, ker vsebuje tudi negativne kombinacije nerazcepnih kolobarjev, ki ne ustrezajo karakterjem upodobitev.

Vsak element  $h \in H$  generira neko podgrupo  $H$ , bodisi pravo bodisi kar  $H$ . Torej lahko zapišemo

$$c_H = |H| - \sum_{K < H} \text{Ind}_K^H(c_K).$$

Konstanta  $|H|$  je karakter trivialne upodobitve  $\mathbf{1}^{|H|}$  grupe  $H$ , torej iz zadnje enakosti sledi želeno  $c_H \in R(H)$ .

Naj bo  $C$  množica vseh cikličnih pogrup grupe  $G$  in izberimo  $H \in C$ . Naj bo  $R$  množica predstavnikov desnih odsekov  $H$  v  $G$ . Zadnji zgled nam pove  $c_H \in R(H)$ . Ta virtualni karakter lahko induciramo na grupo  $G$  in za  $g \in G$  dobimo

$$\text{Ind}_H^G(c_H)(g) = \sum_{r \in R: rgr^{-1} \in H} c_H(rgr^{-1}) = \sum_{r \in R: \langle rgr^{-1} \rangle = H} |H| = \sum_{x \in G: \langle xgx^{-1} \rangle = H} 1.$$

Ko torej seštejemo prispevke po vseh cikličnih podgrupah, dobimo

$$\sum_{H \in C} \text{Ind}_H^G(c_H)(g) = \sum_{x \in G} \sum_{H \in C} 1_{\langle xgx^{-1} \rangle = H} = \sum_{x \in G} 1 = |G|.$$

Konstantna funkcija  $|G|$  je torej element ideala  $\sum_{H \in C} \text{Ind}(R(H))$  v  $R(G)$ . Od tod seveda sledi enakost

$$|G| \cdot R(G) = \sum_{H \in C} \text{Ind}(R(H)).$$

Vsak virtualni karakter v  $R(G)$  je zato linearna kombinacija induciranih virtualnih karakterjev cikličnih podgrup, pri čemer so koeficienti racionalna števila z imenovalcem kvečjemu  $|G|$ . Povzemimo to presenetljivo ugotovitev.

**Izrek** (Artinov izrek). *Naj bo  $G$  grupa in  $\rho$  njena končnorazsežna upodobitev nad algebraično zaprtim poljem karakteristike 0. Tedaj je  $\chi_\rho$  racionalna linearna kombinacija indukcij nerazcepnih karakterjev cikličnih podgrup grupe  $G$ .*

Racionalnim kombinacijam se lahko izognemo, če razširimo razred podgrup s cikličnih na ***p-elementarne podgrupe*** grupe  $G$ . To so podgrupe, ki so izomorfne direktnemu produktu ciklične grupe in  $p$ -grupe.

**Izrek** (Brauerjev izrek). *Naj bo  $G$  grupa in  $\rho$  njena končnorazsežna upodobitev nad algebraično zaprtim poljem karakteristike 0. Tedaj je  $\chi_\rho$  celoštevilaska linearna kombinacija indukcij nerazcepnih karakterjev *p*-elementarnih podgrup grupe  $G$ , ko  $p$  preteče vse praštevilske delitelje moči  $G$ .*

Dokaz Brauerjevega izreka je nekoliko bolj zapleten kot preprost argument, ki nas je pripeljal do Artinovega izreka. Bralec ga lahko najde v (Serre 1977).

Ne spreglejmo ključne lekcije tega razdelka: nerazcepne upodobitve dane končne grupe iščemo s pomočjo indukcije iz preprostih podgrup.

## Kompleksne upodobitve

Splošno teorijo upodobitev končnih grup zaključimo z upodobitvami nad najugodnejšim poljem  $\mathbb{C}$ . To polje je daleč od abstraktnega in je opremljeno z mnogo dodatne strukture, ki jo lahko pri upodobitvah izkoristimo.

## Vrednosti karakterjev

Najprej si oglejmo nekaj dodatnih lastnosti, ki jih imajo karakterji kompleksnih upodobitev. Njihove vrednosti namreč niso čisto poljubna kompleksna števila, temveč so algebrailčna cela števila<sup>13</sup> omejene absolutne vrednosti.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  končna grupa. Za vsako končnorazsežno kompleksno upodobitev  $\rho$  in vsak  $g \in G$  je*

$$|\chi_\rho(g)| \leq \deg(\rho), \quad \chi_\rho(g) \in \bar{\mathbf{Z}}, \quad \chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}.$$

*Dokaz.* Velja  $\rho(g^{|G|}) = \rho(1) = \text{id}$ , zato je  $\rho(g)$  linearna preslikava končnega reda. Take preslikave so diagonalizabilne.<sup>14</sup> V posebnem je zato vsaka lastna vrednost  $\lambda \in \text{Spec}(\rho(g))$  končnega reda v  $\mathbf{C}^*$ . S tem je seveda

$$\chi_\rho(g) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\rho(g))} \lambda \in \bar{\mathbf{Z}}, \quad |\chi_\rho(g)| \leq \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\rho(g))} |\lambda| = \deg(\rho)$$

in hkrati

$$\chi_\rho(g^{-1}) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\rho(g))} \lambda^{-1} = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(\rho(g))} \bar{\lambda} = \overline{\chi_\rho(g)}.$$

□

S pomočjo te restriktivne lastnosti vrednosti karakterjev lahko izpeljemo pomembno lastnost stopenj nerazcepnih kompleksnih upodobitev.

**Izrek** (o stopnjah upodobitev). *Stopnja vsake nerazcepne kompleksne upodobitve končne grupe deli moč grupe.*

Dokaz bomo navezali na edino mesto, kjer smo že videli ulomek  $|G|/\deg(\pi)$ , in sicer je to lema o Fourierovi transformaciji razredne funkcije. Ko funkcija, vzdolž katere izvedemo transformacijo, slika v kolobar algebrailčnih celih števil, lahko lemo o Fourierovi transformaciji razredne funkcije zaostrimo na naslednji način.

**Lema.** *Naj bo  $G$  končna grupa. Za vsako funkcijo  $f \in \text{fun}_{\text{cl}}(G, \bar{\mathbf{Z}})$  in nerazcepno kompleksno upodobitev  $\pi$  je  $\hat{f}(\pi)$  skalarno množenje z algebrailčnim celim številom.*

*Dokaz.* Vemo že, da je  $\hat{f}(\pi)$  skalarno množenje s številom

$$\frac{|G|}{\deg(\pi)} \cdot [f, \chi_\pi].$$

Preveriti moramo torej, da je to algebrailčno celo število. Funkcijo  $f$  lahko razvijemo kot vsoto karakterističnih funkcij konjugiranostnih razredov s koeficienti v  $\bar{\mathbf{Z}}$ . Ker  $\bar{\mathbf{Z}}$  tvori kolobar, bo torej trditev dovolj preveriti za primer, ko je  $f = 1_C$  za nek konjugiranostni razred  $C$  v  $G$ .

Vse narazcepne upodobitve lahko obravnavamo v enem zamahu, in sicer tako, da opazujemo regularno upodobitev in s tem linearno preslikavo

<sup>13</sup>**Algebrailčno celo število** je kompleksno število, ki je ničla moničnega polinoma s celoštevilskimi koeficienti. Množico algebrailčnih celih števil označimo z  $\bar{\mathbf{Z}}$ . Ni se težko prepričati, da  $\bar{\mathbf{Z}}$  tvori kolobar in da velja  $\mathbf{Q} \cap \bar{\mathbf{Z}} = \mathbf{Z}$ .

<sup>14</sup>Diagonalizabilnost sledi iz obravnave Jordanove normalne forme preslikave  $\rho(g)$ .

$\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$ . Na vsaki od podupodobitev, ki je izomorfna  $\pi$ , ta preslikava deluje kot  $\widehat{1}_C(\pi)$ , torej kot skalarno množenje z gornjim številom. To število je zato lastna vrednost preslikave  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$ .

Vemo že, da  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$  deluje na naravni bazi iz karakterističnih funkcij  $1_x$  za  $x \in G$  kot

$$\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_x = \sum_{g \in G} 1_C(x^{-1}g) 1_g \in \text{fun}(G, \{0, 1\}).$$

V tej bazi ima torej  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$  matriko s koeficienti v množici  $\{0, 1\}$ . Karakteristični polinom te matrike ima zato celoštevilске koeficiente, torej so lastne vrednosti preslikave  $\widehat{1}_C(\rho_{\text{fun}})$  algebraična cela števila.  $\square$

*Dokaz izreka o stopnjah upodobitev.* Naj bo  $\pi \in \text{Irr}(G)$ . Uporabimo lemo s funkcijo  $f = \chi_\pi$ , ki nam pove, da je

$$\frac{|G|}{\deg(\pi)} \cdot [\chi_\pi, \chi_\pi] = \frac{|G|}{\deg(\pi)} \in \bar{\mathbb{Z}}.$$

Ker je zadnje število hkrati v  $\mathbb{Q}$ , je torej v  $\mathbb{Q} \cap \bar{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$ .  $\square$

### Skalarni produkti in unitarnost

Polje  $\mathbb{C}$  je opremljeno s standardnim skalarnim produktom  $\langle z, w \rangle = z \cdot \bar{w}$ . Ta produkt lahko razširimo na vsak končnorazsežen kompleksen vektorski prostor. Obravnavali bomo dve taki razširitvi, in sicer na prostor funkcij  $\text{fun}(G, \mathbb{C})$  ter na vektorski prostor, na katerem upodabljammo grupo  $G$ .

Opazujmo najprej prostor funkcij  $\text{fun}(G, \mathbb{C})$ . Vemo že, da ga lahko opremimo s skalarnim produktom  $[\cdot, \cdot]$ . Ker pa je ta prostor kompleksen, lahko nanj vpeljemo še **standarden kompleksni skalarni produkt**,

$$\langle f, h \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \overline{h(g)}$$

za  $f, h \in \text{fun}(G, \mathbb{C})$ . Za vsako končnorazsežno kompleksno upodobitev  $\rho$  po zadnji trditvi velja

$$[f, \chi_\rho] = \langle f, \chi_\rho \rangle,$$

zato se večina rezultatov, ki smo jih izpeljali za skalarni produkt  $[\cdot, \cdot]$ , prenese na skalarni produkt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . V posebnem karakterji še vedno tvorijo ortonormiran sistem vektorjev v  $\text{fun}(G, \mathbb{C})$  in koeficienti razvoja razrednih funkcij po karakterjih se ne spremenijo.

Osredotočimo se sedaj še na upodobitveni prostor. Naj bo  $\rho$  kompleksna upodobitev grupe  $G$  na končnorazsežnem prostoru  $V$ . Izberimo bazo prostora  $\{v_i\}_i$  in z njo kompleksen skalarni produkt

$$\left\langle \sum_i \alpha_i v_i, \sum_i \beta_i v_i \right\rangle = \sum_i \alpha_i \bar{\beta}_i.$$

Prostor  $V$  je opremljen z linearnim delovanjem grupe  $G$ . Zdaj smo na ta prostor dodali strukturo skalarnega produkta in ni jasno, ali je grupa  $G$  kompatibilna s to dodatno strukturo. Kadar je temu tako, se pravi

$$\forall g \in G. \forall v, w \in V. \quad \langle \rho(g) \cdot v, \rho(g) \cdot w \rangle = \langle v, w \rangle,$$

tedaj rečemo, da je  $\rho$  **unitarna upodobitev**. V tem primeru  $\rho$  slika iz  $G$  v grupo unitarnih transformacij  $U(V)$  prostora  $V$  s skalarnim produktom  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Seveda ni vsaka upodobitev končne grupe unitarna,<sup>15</sup> je pa vsaka upodobitev *unitarizabilna*.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  končna grupa in  $\rho$  njena končnorazsežna kompleksna upodobitev na prostoru  $V$ . Tedaj na  $V$  obstaja skalarni produkt, glede na katerega je  $\rho$  unitarna.*

*Dokaz.* Izberimo poljuben skalarni produkt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  na  $V$  in ga povprečimo do

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_0: V \times V \rightarrow \mathbf{C}, \quad \langle v, w \rangle_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle \rho(g) \cdot v, \rho(g) \cdot w \rangle.$$

Ni težko preveriti, da je  $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$  skalarni produkt na  $V$ , glede na katerega je  $\rho$  unitarna upodobitev.  $\square$

V kontekstu kompleksnih upodobitev končnih grup lahko torej brez škode predpostavimo, da je prostor opremljen s skalarnim produktom, glede na katerega je dana upodobitev unitarna.

**Zgled.** Končna grupa deluje z regularno upodobitvijo  $\rho_{\text{fun}}$  na prostoru funkcij  $\text{fun}(G, \mathbf{C})$ . Ta prostor je opremljen s standardnim kompleksnim skalarnim produktom. Glede na ta skalarni produkt je  $\rho_{\text{fun}}$  unitarna upodobitev, saj za vsaka  $f, h \in \text{fun}(G, \mathbf{C})$  in  $x \in G$  velja

$$\langle \rho_{\text{fun}}(G, \mathbf{C})(x) \cdot f, \rho_{\text{fun}}(G, \mathbf{C})(x) \cdot h \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(gx) \overline{h(gx)} = \langle f, h \rangle.$$

Unitarnost upodobitev končne grupe  $G$  lahko izkoristimo pri Fourierovi transformaciji. Za unitarno upodobitev  $\rho$  je namreč  $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^*$  za vsak  $g \in G$  in s tem

$$\hat{f}(\rho) = \sum_{g \in G} f(g) \rho(g)^*.$$

Opremljeni s tem komentarjem se obrnimo k Fourierovi inverziji. Formula za razvoj funkcije  $f \in \text{fun}(G, \mathbf{C})$  po  $\pi$ -izotipičnih komponentah je nekoliko asimetrična. To lahko popravimo tako, da jo uteženo povprečimo z neko drugo funkcijo  $h \in \text{fun}(G, \mathbf{C})$ . Dobimo

$$\sum_{g \in G} f(g) \overline{h(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \sum_{g \in G} \overline{h(g)} \chi_{\pi}(1) \text{tr}(\hat{f}(\pi) \cdot \pi(g)),$$

kar lahko po upoštevanju linearnosti sledi in gornjega komentarja glede unitarnosti upodobitve  $\pi$  zapišemo kot

$$\langle f, h \rangle = \frac{1}{|G|^2} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \text{tr}(\hat{f}(\pi) \cdot \hat{h}(\pi)^*).$$

Tej enakosti rečemo **Parsevalov izrek**. Nekoliko pregledneje ga lahko zapišemo z uporabo še enega skalarnega produkta, tokrat na prostoru endomorfizmov danega vektorskega prostora  $V$ . Za linearni preslikavi  $A, B \in \text{hom}(V, V)$  definiramo

$$\langle A, B \rangle_{\text{HS}} = \text{tr}(A \cdot B^*),$$

<sup>15</sup>Skalarni produkt na danem prostoru lahko izberemo na mnogo različnih načinov.

to je ***Hilbert-Schmidtov skalarni produkt***. Parsevalov izrek nam torej povezuje standarden kompleksni skalarni produkt funkcij s Hilbert-Schmidtovim skalarnim produktom Fourierovih transformacij v nerazcepnih upodobitvah,

$$\langle f, h \rangle = \frac{1}{|G|^2} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \langle \hat{f}(\pi), \hat{h}(\pi) \rangle_{\text{HS}}.$$





## Poglavje 4

# Razširjeni zgledi – končni

Kategorijo upodobitev dane končne grupe nad ugodnim poljem razumemo, če imamo na voljo tabelo karakterjev, izračun te pa je končen problem. S tem smo za konkretne končne grupe dosegli ultimativen cilj teorije upodobitev. Biti pa moramo previdni, da zaradi vseh teh čudovitih dreves ne spregledamo gozda. Grupe namreč praviloma ne nastopajo posamično, temveč kot del večjih družin.<sup>1</sup> V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali dve temeljni družini grup, in sicer simetrične grupe ter splošne linearne grupe nad končnim poljem.<sup>2</sup> Njuno teorijo upodobitev bomo obravnavali celostno.

### 4.1 Simetrične grupe

Opazujmo simetrično grupo  $S_n$  za  $n \in \mathbf{N}$  nad poljem  $\mathbf{C}$ . Ogleдали smo si že tabele karakterjev za  $n \leq 4$  in razložili, da je število nerazcepnih upodobitev enako številu konjugiranostnih razredov, to pa je enako številu razčlenitev  $p(n)$ . Družina simetričnih grup je posebna, saj zanjo presenetljivo obstaja eksplicitna korespondenca med konjugiranostnimi razredi in nerazcepnimi upodobitvami. Iz dane razčlenitve  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$  števila  $n$  lahko torej konstruiramo nerazcepno upodobitev grupe  $S_n$  in za tem z nekoliko več truda določimo vrednosti karakterjev.

#### Nerazcepne upodobitve

Naj bo  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$  razčlenitev  $n$ . Nerazcepno upodobitev grupe  $S_n$ , prirejeno  $\lambda$ , kot ponavadi iščemo z indukcijo iz podgrup. Razčlenitev  $\lambda$  lahko interpretiramo kot ciklični tip permutacij, zato se naravno ponuja

**Youngova grupa**

$$P = S_{\lambda_1} \times S_{\lambda_2} \times \dots \times S_{\lambda_k}.$$

Razčlenitev  $\lambda$  si lahko predstavljamo kot zaporedje vrstic diagrama, v katerem je  $\lambda_1$  škatlic v 1. vrstici,  $\lambda_2$  škatlic v 2. vrstici,  $\dots$ ,  $\lambda_k$  škatlic v  $k$ . vrstici. Pri tem so vrstice poravnane na levo. Takemu shematičnemu prikazu razčlenitve pravimo **Youngov diagram**. Diagram ima  $n$  škatlic,

<sup>1</sup>Na primer abelove grupe, simetrične grupe, diedrske grupe, splošne linearne grupe, končne enostavne grupe,  $\dots$

<sup>2</sup>Vsaka končna grupa je zgrajena iz končnih enostavnih grup, te pa sestojijo iz, grobo rečeno, treh neskončnih družin, in sicer cikličnih grup praštevilske moči  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ , alternirajočih grup  $A_n$  in različnih matričnih grup nad končnimi polji, na primer  $\mathrm{SL}_n(\mathbf{F}_p)/\mathrm{Z}(\mathrm{SL}_n(\mathbf{F}_p))$ . Zgleda družin, ki si jih bomo ogledali, sta torej do neke mere reprezentativna za razumevanje upodobitev nekomutativnih končnih enostavnih grup.

v katere poljubno vpišemo števila od 1 do  $n$ . Tako izpolnjenemu diagramu pravimo **Youngov tablo**. Vsak Youngov tablo nam pravzaprav ponuja vložitev grupe  $P$  v  $S_n$ . Fiksirajmo standardno vložitev, ki ustreza temu, da v škatlice vpišemo po vrsti števila od 1 do  $n$ , začeniši zgoraj levo in hodeč po 1. vrstici, nato po 2. vrstici in tako naprej. Grupa  $P$ , standardno vložena v  $S_n$ , predstavlja ravno vse permutacije, ki ohranjajo *vrstice* tabloja.

Inducirajmo trivialno upodobitev iz  $P$  na  $S_n$ . V razdelku o indukciji smo spoznali, da lahko  $\text{Ind}_P^{S_n}(\mathbf{1})$  interpretiramo kot permutacijsko upodobitev  $S_n$  na desnih odsekih podgrupe  $P$ . To interpretacijo lahko vložimo v prostor funkcij  $\text{fun}(S_n, \mathbf{C})$ . Namesto množice  $P$  lahko namreč opazujemo indikatorsko funkcijo  $1_P$ . Element  $g \in S_n$  na njej deluje kot  $\rho_{\text{fun}}(g) \cdot 1_P = 1_{Pg^{-1}}$ , se pravi kot permutacija desnih odsekov. Na ta način upodobitveni prostor upodobitve  $\text{Ind}_P^{S_n}(\mathbf{1})$  vidimo kot

$$\langle \rho_{\text{fun}}(g) \cdot 1_P \mid g \in G \rangle.$$

Ta prostor lahko izrazimo s pomočjo Fourierove transformacije kot

$$\langle \hat{f}(\rho_{\text{fun}}) \cdot 1_P \mid f \in \text{fun}(S_n, \mathbf{C}) \rangle = \text{im } \mathcal{F}(1_P) = \langle 1_P * f \mid f \in \text{fun}(S_n, \mathbf{C}) \rangle.$$

Upodobitev  $S_n$  na tem prostoru gotovo *ni* nerazcepna, saj na primer vsebuje trivialno z večkratnostjo  $\langle \chi_1, \text{Ind}_P^{S_n}(\chi_1) \rangle = \langle \chi_1, \chi_1 \rangle = 1$ . Ta prostor bomo zato še dodatno projicirali na nek podprostor.

Do zdaj smo upoštevali le grupo  $P$  permutacij, ki ohranjajo *vrstice* izbranega Youngovega tabloja. Iz tega gledišča je naravno, da obravnavamo tudi grupo permutacij, ki ohranjajo *stolpce* tabloja. Označimo jo s  $Q$ . Ravno ta podgrupa je dodatek, ki nam bo dodatno reduciral upodobitev zgoraj opisano inducirano upodobitev. Pri tem bomo upoštevali, da je  $Q$  sestavljena dualno  $P$ , zato jo bomo utežili s predznačno upodobitvijo  $\text{sgn}$ .

Definirajmo funkcijo

$$\sigma_\lambda = (\text{sgn} \cdot 1_Q) * 1_P \in \text{fun}(S_n, \mathbf{C}),$$

ki ji pravimo **Youngov simetrizator**. Njene vrednosti so

$$\sigma_\lambda(x) = \sum_{p \in P, q \in Q: qp=x} \text{sgn}(q).$$

Ker velja  $P \cap Q = 1$ , ima vsak element  $x \in S_n$  *kvečjemu en* zapis v obliki  $x = qp$  za  $p \in P, q \in Q$ ,<sup>3</sup> torej ima zadnja vsota kvečjemu en neničeln člen in je torej enaka karakteristični funkciji množice  $QP = \{qp \mid q \in Q, p \in P\}$ , uteženi s predznakom člena v  $Q$ .

Vzdolž Youngovega simetrizatorja dobimo endospletično  $\mathcal{F}(\sigma_\lambda)$  regularne upodobitve, katere slika je vektorski prostor

$$V_\lambda = \text{im } \mathcal{F}(\sigma_\lambda) = \langle \sigma_\lambda * f \mid f \in \text{fun}(S_n, \mathbf{C}) \rangle,$$

ki ga imenujemo **Spechtov modul**. Na tem prostoru naravno deluje grupa  $S_n$ <sup>4</sup>, dobljeno upodobitev označimo z  $\rho_\lambda$ .

**Izrek** (o nerazcepnih upodobitvah simetrične grupe).

<sup>3</sup>Res, če je  $x = q_1 p_1 = q_2 p_2$ , potem je  $q_2^{-1} q_1 = p_2 p_1^{-1} \in P \cap Q = 1$ , zato je  $q_1 = q_2$  in  $p_1 = p_2$ .

<sup>4</sup>Ker je  $\mathcal{F}(\sigma_\lambda)$  spletična, je to res invarianten podprostor. Ni pa težko videti, kako elementi grupe zares delujejo; za  $g \in S_n$  element  $\rho_{\text{fun}}(g)$  preslika  $\sigma_\lambda * f$  v  $\sigma_\lambda * (\rho_{\text{fun}}(g) \cdot f)$ .

1. Za vsako razčlenitev  $\lambda$  je  $\rho_\lambda$  nerazcepna.
2. Za različni razčlenitvi  $\lambda, \mu$  je  $\rho_\lambda \not\equiv \rho_\mu$ .
3. Vsaka nerazcepna upodobitev simetrične grupe je izomorfná  $\rho_\lambda$  za neko razčlenitev  $\lambda$ .

Zadnja točka seveda sledi iz prvih dveh, saj je število nerazcepnih upodobitev ravno enako številu razčlenitev  $n$ . Pred dokazom izreka si oglejmo nekaj zgledov.

### Zgled.

- Naj bo  $\lambda = (n)$ . Tedaj je  $P = S_n$  in  $Q = 1$ , zato je  $\sigma_\lambda = 1$ . Za funkcijo  $f \in \text{fun}(S_n, \mathbb{C})$  je  $\mathcal{F}(1) \cdot f = 1 * f = |G| \cdot \mathbf{E}(f)$  in grupa  $S_n$  deluje trivialno na tej funkciji. S tem je

$$V_\lambda = \text{im } \mathcal{F}(1) = \mathbb{C}$$

in dobimo trivialno upodobitev.

- Naj bo  $\lambda = (1, 1, \dots, 1)$ . Tedaj je  $P = 1$  in  $Q = S_n$ , zato je  $\sigma_\lambda = \text{sgn}$ . Za funkcijo  $f \in \text{fun}(S_n, \mathbb{C})$  je

$$\mathcal{F}(\text{sgn}) \cdot f = \text{sgn} * f = \left( x \mapsto \sum_{g \in G} \text{sgn}(xg^{-1})f(g) \right) = (\text{sgn} * f)(1) \cdot \text{sgn},$$

zato je

$$V_\lambda = \text{im } \mathcal{F}(\text{sgn}) = \langle \text{sgn} \rangle.$$

Na funkciji  $\text{sgn}$  grupa  $S_n$  deluje kot  $\rho_{\text{fun}}(g) \cdot \text{sgn} = \text{sgn}(g) \cdot \text{sgn}$ , torej je  $\rho_\lambda$  predznačna upodobitev.

- Naj bo  $\lambda = (n-1, 1)$ . Tedaj je  $P = S_{n-1}$  in  $Q = \{(), (1\ n)\}$ . Za funkcijo  $f \in \text{fun}(S_n, \mathbb{C})$  velja najprej

$$(1_P * f)(x) = \sum_{p \in P} f(p^{-1}x) = \sum_{g \in Px} f(g),$$

torej  $1_P * f$  izračuna vsoto funkcije  $f$  po odseku  $Px$ . Prostor  $\text{im } \mathcal{F}(1_P)$  lahko zato identificiramo s podprostorom funkcij  $\text{fun}_{S \setminus S_n}(S_n, \mathbb{C})$ , ki so konstantne na desnih odsekih  $S \setminus S_n$ . Delovanje  $S_n$  na tem prostoru ni nič drugega kot  $\text{Ind}_P^{S_n}(1)$ , kar prepoznamo kot standardno permutacijska upodobitev grupe  $S_n$  njenega delovanja na  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Uporabimo zdaj še konvolucijo s funkcijo  $\text{sgn} \cdot 1_Q$ . Dobimo linearno preslikavo

$$\text{fun}_{S \setminus S_n}(S_n, \mathbb{C}) \rightarrow \text{fun}_{S \setminus S_n}(S_n, \mathbb{C}), \quad \psi \mapsto (x \mapsto \psi(x) - \psi((1\ n) \cdot x)).$$

Njeno jedro sestoji iz funkcij  $\psi$ , ki so konstantne na odsekih  $S$  in povrh zadoščajo še enakosti  $\psi(x) = \psi((1\ n) \cdot x)$  za vsak  $x \in S_n$ . Ko ta pogoj uporabimo s transpozicijami  $(i\ n)$  za  $1 \leq i < n$ , sklenemo, da je vsaka taka funkcija  $\psi$  nujno konstantna. Nazadnje je torej

$$V_\lambda = \text{im } \mathcal{F}(\sigma_\lambda) \cong \frac{\text{fun}_{S \setminus S_n}(S_n, \mathbb{C})}{\mathbb{C}}.$$

Ta prostor je razsežnosti  $n-1$ . Prirejeno upodobitev imenujemo **standardna upodobitev** simetrične grupe  $S_n$ . Kot smo videli, jo lahko dobimo tako, da iz standardne permutacijske upodobitve odstanimo trivialno upodobitev.

**Domača naloga.** Naj bo  $\lambda$  razčlenitev  $n$  in  $\lambda'$  razčlenitev, ki jo iz  $\lambda$  dobimo tako, da transponiramo Youngov diagram. Preveri, da velja  $\text{sgn} \otimes \rho_\lambda \cong \rho_{\lambda'}$ .

Dokaz izreka bomo izpeljali s pomočjo naslednje leme, v kateri igra ključno vlogo delovanje Youngovega simetrizatorja  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}})$  na prostoru  $V_\lambda$ . V lemi uporabljamo leksikografsko delno urejenost  $<$  na množici vseh razčlenitev.

**Lema.**

1. Za vsako razčlenitev  $\lambda$  je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot V_\lambda \subseteq \mathbf{C} \cdot \sigma_\lambda$ .
2. Za razčlenitvi  $\lambda > \mu$  je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot V_\mu = 0$ .

*Dokaz izreka o nerazcepnih upodobitvah simetrične grupe.*

1. Naj bo  $W \leq V_\lambda$  podupodobitev. Po lemi je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot W$  bodisi  $\mathbf{C} \cdot \sigma_\lambda$  bodisi 0.

V prvem primeru sledi, da je  $\sigma_\lambda \in W$ , od koder iz nerazcepnosti  $W$  sklenemo  $W = \text{im } \mathcal{F}(\sigma_\lambda) = V_\lambda$ . ✓

Privzemimo zdaj, da je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot W = 0$ , kar lahko zapišemo kot  $W * \sigma_\lambda = 0$ . Od tod sledi  $W * V_\lambda = 0$  in zato  $W * W = 0$ . Naj bo  $W = \text{im } P$  za neko projektorsko endospletično  $P$  regularne upodobitve. Vemo že, da so vse take preslikave oblike  $P = \mathcal{F}(w)$  za neko funkcijo  $w \in \text{fun}(S_n, \mathbf{C})$ . Ker je  $P \cdot 1_1 = \widehat{1}_1(\rho_{\text{fun}}) \cdot w = w$ , sledi  $w \in W$ . Še več, ker je  $P^2 = P$ , izračunamo  $w = P \cdot w = \widehat{w}(\rho_{\text{fun}}) \cdot w = w * w$ . Ker je  $W * W = 0$ , sledi  $w = 0$  in s tem  $W = 0$ . ✓

2. Za različni razčlenitvi  $\lambda, \mu$  lahko brez škode predpostavimo  $\lambda > \mu$ , saj je  $<$  linearna urejenost. Po lemi je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot V_\mu = 0$ . Hkrati je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot V_\lambda$  bodisi  $\mathbf{C} \cdot \sigma_\lambda$  bodisi 0. V slednjem primeru pristopimo kot zgoraj: velja  $V_\lambda * V_\lambda = 0$  in projektorska endospletična regularne upodobitve na  $V_\lambda$  je oblike  $\mathcal{F}(v)$  za nek  $v \in V_\lambda$  z lastnostjo  $v = v * v$ , kar implicira  $v = 0$  in s tem  $V_\lambda = 0$ , protislovje. Torej je  $\widehat{\sigma}_\lambda(\rho_{\text{fun}}) \cdot V_\lambda \neq 0$  in zato  $V_\lambda \not\subseteq V_\mu$ .

□

Preostane nam še dokaz leme.

*Dokaz leme.*

1. Za vsaka  $p \in P, q \in Q$  je  $\text{sgn} \cdot 1_q * \sigma_\lambda * 1_p = \sigma_\lambda$ . Dokažimo najprej, da je Youngov simetrizator do skalarja natančno *edina* funkcija s to lastnostjo.

Res, naj funkcija  $f \in \text{hom}(S_n, \mathbf{C})$  zadošča  $\text{sgn} \cdot 1_q * f * 1_p = f$ . To pomeni, da za vsak  $g \in G$  velja

$$f(g) = \sum_{x \in S_n: qx p = g} \text{sgn}(q) \cdot f(x) = \text{sgn}(q) \cdot f(q^{-1} g p^{-1}),$$

kar lahko prepišemo v  $f(qgp) = \text{sgn}(q) \cdot f(g)$ . Od tod sledi  $f(qp) = \text{sgn}(q) \cdot f(1)$ . Na množici  $QP$  se torej do skalarja  $f(1)$  natančno funkcija  $f$  ujema z Youngovim simetrizatorjem  $\sigma_\lambda$ .

Preverimo še, da je izven množice  $QP$  funkcija  $f$  ničelna. V ta namen se spomnimo, da  $P$  in  $Q$  izhajata iz Youngovega tabloja  $T$ . Elementi  $S_n$  naravno delujejo s permutacijami na množici tablojev. Za  $g \in S_n$  naj bo  $g \cdot T$  rezultat tega delovanja z elementom  $g$ .

**Domača naloga.** Za vsak  $g \in S_n \setminus QP$  obstajata števili, ki sta zapisani v istem stolpcu  $T$  in isti vrstici  $g \cdot T$ .

Naj bo  $t$  transpozicija, ki zamenja ti dve števili. Zanj torej velja  $t \in Q$  in  $g^{-1}tg \in P$ . S tem je

$$f(g) = f(t \cdot g \cdot g^{-1}tg) = \text{sgn}(t) \cdot f(g) = -f(g),$$

zato je  $f(g) = 0$ . ✓

Dokazano uporabimo z elementom  $\sigma_\lambda * f * \sigma_\lambda$ , kjer je  $f$  poljubna funkcija. Vrednost  $\text{sgn} \cdot 1_Q * (\sigma_\lambda * f * \sigma_\lambda) * 1_P$  izračunamo kot

$$(\text{sgn} \cdot 1_Q * \text{sgn} \cdot 1_Q * 1_P) * f * (\text{sgn} \cdot 1_Q * 1_P * 1_P) = \sigma_\lambda * f * \sigma_\lambda,$$

od koder sledi zeleno

$$\widehat{\sigma_\lambda}(\rho_{\text{fun}}) \cdot (\sigma_\lambda * f) = \sigma_\lambda * f * \sigma_\lambda \in \mathbf{C} \cdot \sigma_\lambda.$$

2. Trdimo, da za vsako funkcijo  $f \in \text{fun}(S_n, \mathbf{C})$  velja enakost

$$1_{P_\mu} * f * (\text{sgn} \cdot 1_{Q_\lambda}) = 0.$$

Zaradi linearnosti te trditve lahko predpostavimo, da je  $f = 1_g$  za nek  $g \in G$ .

Naj bosta  $T_\lambda, T_\mu$  Youngova tabloja razčlenitev  $\lambda, \mu$ , s katerima smo dobili grupe  $P$  in  $Q$ . Tablo  $T_\lambda$  zamenjajmo s tablojem  $g \cdot T_\lambda$ ; ob tem se  $Q_\lambda$  zamenja s  $g^{-1}Q_\lambda g$ . Z novimi tabloji je

$$1_{P_\mu} * (\text{sgn} \cdot 1_{g^{-1}Q_\lambda g}) = 1_{P_\mu} * 1_{g^{-1}} * (\text{sgn} \cdot 1_{Q_\lambda}) * 1_g.$$

Če uspemo dokazati, da je leva stran ničelna, bo taka tudi desna, od koder po dodatni konvoluciji z  $1_{g^{-1}}$  z desne sledi zelena enakost.

Predpostavimo torej lahko, da je  $g = 1$ . Kot v dokazu prejšnje točke najdemo transpozicijo  $t \in Q_\lambda \cap P_\mu$ . Z njo velja

$$1_{P_\mu} * (\text{sgn} \cdot 1_{Q_\lambda}) = (1_{P_\mu} * 1_t) * (1_{t^{-1}} * (\text{sgn} \cdot 1_{Q_\lambda})).$$

Ker je  $1_{P_\mu} * 1_t = 1_{P_\mu}$  in  $1_{t^{-1}} * (\text{sgn} \cdot 1_{Q_\lambda}) = -(\text{sgn} \cdot 1_{Q_\lambda})$ , je zadnja konvolucija enaka svoji negativni vrednosti, torej je ničelna.

□

Tekom dokaza izreka smo premislili, da je  $\sigma_\lambda * \sigma_\lambda = n_\lambda \cdot \sigma_\lambda$  za nek  $n_\lambda \neq 0$ . Od tod sledi, da je  $V_\lambda$  slika *projektorske* spletične  $\mathcal{F}(\sigma_\lambda/n_\lambda)$ . Youngov simetrizator nam torej prek Fourierove transformacije izdaja nerazcepno upodobitev  $V_\lambda$ . Projektor  $\mathcal{F}(\sigma_\lambda/n_\lambda)$  lahko zapišemo z matriko z *racionalnimi* koeficienti, zato v prostoru  $V_\lambda$  lahko izberemo bazo, glede na katero ima delovanje vsakega elementa  $g \in G$  *racionalne* matrične koeficiente. Vsaka nerazcepna upodobitev  $\rho_\lambda$  je zato definirana nad poljem  $\mathbf{Q}$ .

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  končna grupa z upodobitvijo nad  $\mathbf{Q}$ . Dokaži, da obstaja baza vektorskega prostora, v kateri je dana upodobitev definirana nad  $\mathbf{Z}$ .

**Posledica.** Vsaka nerazcepna upodobitev simetrične grupe je definirana nad  $\mathbf{Z}$ .

Vsak Spechtov modul  $V_\lambda$  lahko z redukcijo po modulu  $p$  za poljubno praštevilo  $p$  reduciramo do vektorskega prostora nad končnim poljem  $\mathbf{F}_p$ . Na ta način dobimo mnogo modularnih upodobitev simetrične grupe. Kot smo videli že v primeru  $p = 3$ , te upodobitve niso nujno nerazcepne. V takih primerih obstaja enoličen *kvocient*  $D_\lambda$  reducirane upodobitve, ki je nerazcepen nad  $\mathbf{F}_p$ .<sup>5</sup> Izkaže se, da na ta način dobimo vse nerazcepne modularne upodobitve simetrične grupe. Modularni je mnogo bolj mističen od kompleksnega. Sodobna teorija upodobitev se povečini ukvarja s tem, kako *regularna* je kategorija upodobitev v odvisnosti od praštevila  $p$ .<sup>6</sup> V zvezi s tem obstaja mnogo odprtih problemov.

**Odprt problem.** Obravnavajmo modularne upodobitve nad  $\mathbf{F}_p$ , kjer je  $p \leq n$ . Naj bo  $\lambda$  razčlenitev  $n$ . Izračunaj večkratnosti nerazcepnih podupodobitev v redukciji  $V_\lambda$  po modulu  $p$ .

Ta problem je razrešen le za razčlenitve  $\lambda$  z največ dvema deloma, torej s  $k \leq 2$ . Za  $k = 3$  sodobna bilijardna domneva (Lusztig-Williamson 2018) predvideva, da se te večkratnosti obnašajo po zakonu nekega zakompliciranega *dinamičnega sistema*.

## Vrednosti karakterjev

Premislili smo že, da so vsi Spechtovi moduli definirani nad  $\mathbf{Z}$ , zato so vrednosti karakterjev simetrične grupe vselej cela števila. Poznamo pa celo dokaj preprost način, kako lahko eksplicitno določimo vse vrednosti karakterjev nerazcepnih upodobitev. Izrekli ga bomo v jeziku polinomskega kolobarja  $\mathbf{C}[\mathbf{x}] = \mathbf{C}[x_1, x_2, \dots, x_k]$ . Potrebovali bomo nekaj posebnih polinomov iz tega kolobarja, in sicer *diskriminanto*

$$\Delta(\mathbf{x}) = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (x_i - x_j)$$

ter *potenčne vsote*

$$P_j(\mathbf{x}) = x_1^j + x_2^j + \dots + x_k^j$$

za  $j \in \mathbf{N}$ . Za dan polinom  $P(\mathbf{x}) \in \mathbf{C}[\mathbf{x}]$  označimo s

$$[P(\mathbf{x})]_{(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)}$$

njegov koeficient pred monomom  $x_1^{\ell_1} x_2^{\ell_2} \dots x_k^{\ell_k}$ .

**Izrek** (Frobeniusova formula). Naj bo  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$  razčlenitev  $n$  in  $\chi_\lambda$  pripadajoči karakter. Naj bo  $\mathcal{C}_{1^{i_1} 2^{i_2} \dots n^{i_n}}$  konjugiranostni razred. Tedaj je

$$\chi_\lambda(\mathcal{C}_{1^{i_1} 2^{i_2} \dots n^{i_n}}) = [\Delta(\mathbf{x}) \cdot P_1(\mathbf{x})^{i_1} P_2(\mathbf{x})^{i_2} \dots P_n(\mathbf{x})^{i_n}]_{(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)},$$

kjer je

$$\ell_1 = \lambda_1 + k - 1, \quad \ell_2 = \lambda_2 + k - 2, \quad \dots, \quad \ell_k = \lambda_k.$$

Dokaz temelji na poznavanju osnov teorije simetričnih funkcij, ki jih študent-ka ponavadi spozna pri kombinatoričnih predmetih, zato ga brez prehude žalosti izpustimo. Poglejmo pa si nekaj primerov uporabe izreka.

<sup>5</sup>Pozor, za nekatere razčlenitve  $\lambda$  je  $D_\lambda = 0$ . Izkaže se, da je število modularnih upodobitev enako številu konjugiranostnih razredov elementov, katerih red je *tuj*  $p$ .

<sup>6</sup>Na primer, mnogo dela je osredotočenega na *Lusztigovo in Jamesovo domnevo*.

## Zgled.

- Naj bo  $n = 7$  in  $\lambda = (4, 3)$ . Izračunajmo vrednost karakterja v permutaciji  $(1\ 2)(3\ 4)$ . Velja  $i_1 = 3$ ,  $i_2 = 2$ ,  $\ell_1 = 5$ ,  $\ell_2 = 3$  in s tem

$$\chi_{(4,5)}(C_{1^3 2^2}) = [(x_1 - x_2) \cdot (x_1 + x_2)^3 (x_1^2 + x_2^2)^2]_{(5,3)} = 2.$$

- Izračunajmo vrednost poljubnega karakterja  $\chi_\lambda$  v dolgem ciklu  $(1\ 2 \cdots n) \in S_n$ . Konjugiranostni razred je torej  $C_{n^1}$  in izračunati moramo koeficient

$$[\Delta(\mathbf{x}) \cdot (x_1^n + x_2^n + \cdots + x_k^n)]_{(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)}.$$

Diskriminanta  $\Delta(\mathbf{x})$  je enaka Vandermondovi determinanti

$$\Delta(\mathbf{x}) = \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \cdot x_1^{\sigma(k)-1} x_2^{\sigma(k-1)-1} \cdots x_k^{\sigma(1)-1}.$$

Opazujemo potence spremenljivke  $x_1$ . Opazimo, da velja  $\ell_1 = \lambda_1 + k - 1 \geq k$ , zato iščemo monome, katerih potenca pri  $x_1$  je vsaj  $k$ . Edina možnost je, da ta monom izhaja iz produkta diskriminante in člena  $x_1^n$ . Iščemo torej člen

$$\left[ \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \cdot x_1^{\sigma(k)-1+n} x_2^{\sigma(k-1)-1} \cdots x_k^{\sigma(1)-1} \right]_{(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)}.$$

Oglejmo si zdaj spremenljivko  $x_2$ . Da bo obstajal kak relevanten monom, mora veljati  $\ell_2 = \sigma(k-1) - 1$ . Ker je  $\sigma(k-1) \leq k$ , sledi  $\ell_2 \leq k-1$  in od tod  $\lambda_2 \leq 1$ . Edina možnost, da je  $\chi_\lambda(C_{n^1}) \neq 0$ , je torej, da ima razčlenitev  $\lambda$  vse člene od drugega dalje enake 1 in je zato oblike

$$\lambda = (n-s, 1, 1, \dots, 1)$$

za nek  $0 \leq s \leq n-1$ . Taki razčlenitvi pravimo **kljuka**. Zanj je  $k = s+1$  in  $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k) = (n, k-1, k-2, \dots, 1)$ , od koder ni težko izračunati, da edini relevanten monom izhaja iz permutacije  $\sigma = (1\ 2 \cdots k)$ , zato je nazadnje

$$\chi_\lambda(C_{n^1}) = \text{sgn}(\sigma) = (-1)^s.$$

Vrednost karakterja v dolgem ciklu je torej neničelna le za kljuke, v katerih pa ima vrednost  $\pm 1$ .

S Frobeniusovo formulo lahko določimo stopnje nerazcepnih upodobitev simetrične grupe. Za to bomo potrebovali koncept kljuke, ki je malo splošnejši od tiste, ki smo jo videli v zadnjem zgledu. Opazujemo Youngov diagram razčlenitve  $\lambda$ . Za vsako celico  $(i, j)$  diagrama, kjer  $i$  predstavlja vrstico in  $j$  stopec, je **kljuka**  $H_\lambda(i, j)$  množica tistih celic, ki so desno ali pod celico  $(i, j)$ , vključivši celico  $(i, j)$ .<sup>7</sup> **Dolžina kljuke**  $H_\lambda(i, j)$  je enaka številu celic v kljuki, se pravi  $|H_\lambda(i, j)|$ .

**Posledica** (formula o dolžinah kljuk). *Naj bo  $\lambda$  razčlenitev  $n$ . Tedaj je*

$$\dim V_\lambda = \frac{n!}{\prod_{i,j} |H_\lambda(i, j)|}.$$

<sup>7</sup> $H_\lambda(i, j)$  torej sestoji iz tistih celic  $(a, b)$ , za katere je  $a = i$  in  $b \geq j$  ali  $b = j$  in  $a \geq i$ .

*Dokaz.* Velja

$$\dim V_\lambda = \chi_\lambda(C_{1^n}) = [\Delta(\mathbf{x}) \cdot (x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n]_{(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)}.$$

Diskriminanto razvijemo kot v zadnjem zgledu, drugi člen pa po binomski formuli kot

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n = \sum_{j_1 + j_2 + \dots + j_k = n} \frac{n!}{j_1! j_2! \dots j_k!} x_1^{j_1} x_2^{j_2} \dots x_k^{j_k}.$$

Ko razviti vsoti zmnožimo, dobimo člen  $x_1^{\ell_1} x_2^{\ell_2} \dots x_k^{\ell_k}$ , če in samo če za neko permutacijo  $\sigma \in S_n$  in nabor  $j_1, j_2, \dots, j_k$  velja  $\sigma(k-i+1) - 1 + j_i = \ell_i$ . Iskani koeficient je torej enak

$$\sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \frac{n!}{(\ell_1 - \sigma(k) + 1)! (\ell_2 - \sigma(k-1) + 1)! \dots (\ell_k - \sigma(1) + 1)!},$$

kjer seštevamo po tistih  $\sigma \in S_k$ , za katere velja  $\ell_i - \sigma(k-i+1) + 1 \geq 0$  za vsak  $i$ . To vsoto lahko prepišemo v

$$\frac{n!}{\ell_1! \ell_2! \dots \ell_k!} \cdot \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{j=1}^k \ell_j (\ell_j - 1) \dots (\ell_j - \sigma(k-j+1) + 2).$$

Zadnjo vsoto lahko seštevamo po vseh  $\sigma \in S_k$ , saj so členi, v katerih je  $\ell_i - \sigma(k-i+1) + 1 < 0$ , ničelni. To vsoto zato prepoznamo kot determinanto matrike razsežnosti  $k \times k$  z  $j$ -tim stolpcem

$$1, \ell_j, \ell_j(\ell_j - 1), \dots, \ell_j(\ell_j - 1) \dots (\ell_j - k + 2).$$

Ta determinanta je enaka Vandermondovi determinanti, zato je iskani koeficient enak

$$\frac{n!}{\ell_1! \ell_2! \dots \ell_k!} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\ell_i - \ell_j).$$

Če ima  $\lambda$  en sam stolpec in je torej  $\lambda = (1, 1, \dots, 1)$ , potem je  $k = n$  in  $\ell_i = n - i + 1$ , zato je zadnje število enako

$$\frac{n!}{n!(n-1)! \dots 1!} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i) = \frac{n!}{n!(n-1)! \dots 1!} \cdot \prod_{1 < j \leq n} (j-1)! = 1,$$

kot mora biti, saj že vemo, da je v tem primeru  $V_\lambda \cong \mathbf{1}$ . Dolžine kljuk so  $|H_\lambda(i, 1)| = n - i + 1$ , zato formula o kljukah za ta trivialen primer drži. Splošnega primera ni težko izpeljati z indukcijo.

**Domača naloga.** Z indukcijo na število stolpcev Youngovega diagrama  $\lambda$  dokaži, da je

$$\frac{n!}{\ell_1! \ell_2! \dots \ell_k!} \cdot \prod_{i < j} (\ell_i - \ell_j) = \frac{n!}{\prod_{i,j} |H_\lambda(i, j)|}.$$

S tem je formula o kljukah dokazana. □

**Zgled.** Iz formule o dolžinah kljuk takoj izračunamo stopnjo standardne upodobitve. Usteza ji razčlenitev  $(n-1, 1)$ , torej je njena stopnja enaka

$$\frac{n!}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot n \cdot 1} = n-1.$$



**Domača naloga.** Izračunaj vrednost poljubnega karakterja  $\chi_\lambda$  v konjugiranostnem razredu transpozicij.

V zvezi s tabelo karakterjev simetrične grupe omenimo še sodobnejši presenetljiv rezultat (Miller 2014), v katerem avtor dokaže, da so vrednosti skoraj vseh karakterjev v skoraj vseh grupnih elementih ničelne. Natančneje, če enakomerno naključno izberemo  $g \in S_n$  in  $\pi \in \text{Irr}(S_n)$ , potem je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}_{g,\pi}(\chi_\pi(g) = 0) = 1.$$

Avtor omeni analogno vprašanje glede same tabele karakterjev.

**Odprt problem.** Enakomerno naključno izberimo konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$  v  $S_n$  in  $\pi \in \text{Irr}(S_n)$ . Kaj lahko povemo o obnašanju zaporedja  $\mathbf{P}_{\mathcal{C},\pi}(\chi_\pi(\mathcal{C}) = 0)$ , ko gre  $n$  čez vse meje?

## Alternirajoče grupe

Oglejmo si, kako lahko iz tabele karakterjev simetrične grupe skoraj popolnoma določimo tabelo karakterjev alternirajoče grupe  $A_n$ .

Določimo najprej konjugiranostne razrede. Naj bo  $\mathcal{C} = \sigma^{A_n} \subseteq A_n$  konjugiranostni razred. Ta množica je torej zaprta za konjugiranje z vsemi sodimi permutacijami. Če velja tudi  $\sigma^{(1\ 2)} \in \mathcal{C}$ , potem je  $\mathcal{C}$  celo konjugiranostni razred v  $S_n$  in torej ustreza neki razčlenitvi števila  $n$ . Prav lahko pa se zgodi, da  $\mathcal{C}$  ni zaprt za konjugiranje z  $(1\ 2)$ . V tem primeru je množica  $\mathcal{C} \cup \mathcal{C}^{(1\ 2)}$  konjugiranostni razred permutacije  $\sigma$  v  $S_n$  in zato ustreza neki razčlenitvi števila  $n$ . Konjugiranostne razrede grupe  $A_n$  dobimo torej iz konjugiranostnih razredov sodih permutacij v  $S_n$ , in sicer določeni razredi v  $S_n$  ostanejo konjugiranostni razredi v  $A_n$ , drugi pa se razcepijo na dva konjugiranostna razreda v  $A_n$  enake velikosti. Ni težko prepoznati, kateri razredi se razcepijo.

**Domača naloga.** Naj bo  $\mathcal{C}$  konjugiranostni razred sode permutacije v  $S_n$ , ki ustreza razčlenitvi  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$ . Dokaži, da se  $\mathcal{C}$  razcepi v dva konjugiranostna razreda v  $A_n$ , če in samo če so vsi  $\lambda_i$  lihi in različni med sabo.

Poskusimo zdaj na podoben način razumeti še nerazcepne upodobitve grupe  $A_n$ . Naj bo  $\lambda$  razčlenitev  $n$ , ki ji pritiče nerazcepna upodobitev  $\rho_\lambda$  na prostoru  $V_\lambda$  s karakterjem  $\chi_\lambda$ . Opazujmo zožitev karakterja  $\chi_\lambda|_{A_n}$  na  $A_n$ . Po ortonormiranosti karakterjev v  $S_n$  velja

$$\langle \chi_\lambda|_{A_n}, \chi_\lambda|_{A_n} \rangle + \frac{1}{|A_n|} \sum_{\sigma \in S_n \setminus A_n} |\chi_\lambda(\sigma)|^2 = \frac{1}{|A_n|} \cdot |S_n| \langle \chi_\lambda, \chi_\lambda \rangle = 2.$$

Torej je  $\langle \chi_\lambda|_{A_n}, \chi_\lambda|_{A_n} \rangle \in \{1, 2\}$ , zato je  $\rho_\lambda|_{A_n}$  bodisi nerazcepna upodobitev bodisi vsota dveh neizomorfnihih nerazcepnih upodobitev. Drugi primer nastopi, če in samo če je  $\chi_\lambda|_{S_n \setminus A_n} = 0$ , kar je ekvivalentno izomorfizmu  $\rho_\lambda \cong \text{sgn} \otimes \rho_\lambda$ . Zadnja upodobitev je izomorfna  $\rho_{\lambda'}$ , zato se upodobitev  $\rho_\lambda$  razcepi na  $A_n$ , če in samo če je  $\lambda = \lambda'$ , se pravi da je  $\lambda$  simetrična razčlenitev. V tem primeru lahko zapišemo  $\chi_\lambda|_{A_n} = \alpha + \beta$ , kjer sta  $\alpha, \beta$  nerazcepna karakterja  $A_n$ . Ni se težko prepričati, da zanj velja  $\beta(\sigma) = \alpha(\sigma^{(1\ 2)})$  za vsak  $\sigma \in A_n$ , torej sta v posebnem upodobitvi, na katere razpade  $\rho_\lambda$ , enake razsežnosti. Konkretno vrednosti karakterjev  $\alpha$  in  $\beta$  lahko izračunamo s pomočjo ortogonalnosti karakterjev.

S štetjem konjugiranostnih razredov v  $A_n$  se ni težko prepričati, da na opisan način dobimo vse nerazcepne upodobitve alternirajoče grupe.

## 4.2 Splošne linearne grupe

Opazujemo **splošno linearno grupo**

$$G_p = \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_p) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbf{F}_p, ad - bc \neq 0 \right\}$$

obrnljivih matrik razsežnosti  $2 \times 2$  nad končnim poljem  $\mathbf{F}_p$ , kjer je  $p$  praštevilo. Njeno kategorijo upodobitev bomo obravnavali nad  $\mathbf{C}$ . Še pred tem pa moramo bolje spoznati to grupo.

### Osnovne poteze

Grupo  $G_p$  lahko razumemo s pomočjo njenih podgrup

$$\begin{aligned} B_p &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbf{F}_p^*, b \in \mathbf{F}_p \right\}, \\ D_p &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbf{F}_p^* \right\}, \\ U_p &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbf{F}_p \right\}. \end{aligned}$$

Grupa  $B_p$  je **Borelova podgrupa**, grupa  $U_p$  pa **unipotentna podgrupa**. Seveda je  $B_p/U_p = D_p$ . Grupa  $G_p$  ima torej vrsto podgrup

$$G_p \geq B_p \geq U_p \geq 1.$$

Borelova podgrupa *ni* edinka v  $G_p$ , ima pa kvocientna množica  $G_p/B_p$  odsekov vsekakor pomembno vlogo. Grupa  $G_p$  namreč deluje na ravnini  $\mathbf{F}_p^2$  z matričnim množenjem in za tem na množici premic v tej ravnini, se pravi

$$\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_p) = \{ \ell \leq \mathbf{F}_p^2 \mid \dim \ell = 1 \},$$

čemur pravimo **projektivna premica** nad  $\mathbf{F}_p$ . Grupa  $G_p$  deluje na tej premici tranzitivno in stabilizator premice  $e_1$  je ravno Borelova podgrupa  $B_p$ . Projektivno premico lahko zato enačimo z množico  $G_p/B_p$ . V posebnem tako dobimo homomorfizem

$$\Pi: G_p \rightarrow \mathrm{Sym}(\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_p)) = S_{p+1},$$

o katerem bomo več povedali nekoliko kasneje. Za zdaj ne spreglejmo, da od tod takoj izračunamo  $|G_p/B_p| = p+1$  in s tem

$$|G_p| = |G_p/B_p| \cdot |B_p/U_p| \cdot |U_p| = (p+1) \cdot (p-1)^2 \cdot p.$$

Grupa  $G_p$  je opremljena tudi z determinantnim homomorfizmom

$$\det: G_p \rightarrow \mathbf{F}_p^*.$$

Jedro tega homomorfizma je **specialna linearna grupa**

$$\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbf{F}_p, ad - bc = 1 \right\}.$$

Velja  $|\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)| = |G_p|/(p-1) = (p+1)p(p-1)$ . Izpostavimo dva posebna elementa te grupe,

$$S_+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Levo množenje s tema dvema elementoma ustreza izvajanju vrstičnih operacij na dani matriki,

$$S_+ \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}, \quad S_- \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c+a & d+b \end{pmatrix}$$

Ker lahko vsako matriko v  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$  z vrstičnimi operacijami pripeljemo do identitete, sklenemo, da elementa  $S_+, S_-$  generirata grupo  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ .

**Zgled.** Naj bo  $p = 2$ . Grupa  $G_2$  v tem primeru enaka  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_2)$  in je moči 6. Naravno deluje z matričnim množenjem na množici treh neničelnih vektorjev  $\mathbf{F}_2^2 \setminus \{0\} = \{e_1, e_2, e_1 + e_2\}$ . Na ta način dobimo homomorfizem

$$G_2 \rightarrow S_3, \quad S_+ \mapsto (2\ 3), \quad S_- \mapsto (1\ 3).$$

ki je surjektiven, ker zapisani transpoziciji generirata grupo  $S_3$ . Ker imata obe grupi enako moč, je celo izomorfizem, torej je  $G_2 \cong S_3$ .

**Trditev.** Za  $p > 2$  je  $[G_p, G_p] = \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ .

*Dokaz.* Ker je  $G_p/\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$  komutativna, je  $[G_p, G_p] \leq \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ . Za obratno neenakost upoštevamo račun

$$\left[ S_+^{-2^{-1}}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] = S_+^{2^{-1}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot S_+^{-2^{-1}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S_+$$

in sklenemo  $S_+ \in [G_p, G_p]$ . Sorodno dobimo  $S_- \in [G_p, G_p]$ . Ker  $S_+, S_-$  generirata  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ , dobimo še drugo vsebovanost.  $\square$

Nazadnje upoštevajmo oba posebna homomorfizma,  $\Pi$  in  $\det$ . Presek njunih jeder sestoji iz skalarnih matrik z determinanto 1, torej je enak  $\{I, -I\}$ . Ta podgrupa je edinka v  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ , zato lahko tvorimo kvocient

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p) = \frac{\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)}{\{I, -I\}}.$$

**Zgled.** Za  $p = 2$  je  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_2) = \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_2) \cong S_3$ . Za  $p = 3$  se grupa  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_3)$  prek delovanja  $\Pi$  vloži v simetrično grupo  $S_4$ . Ker je  $|\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_3)| = 12$ , je slika te vložitve podgrupa indeksa 2 v  $S_4$ , kar pomeni, da gre za alternirajočo podgrupo. Sledi  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_3) \cong A_4$ .

**Domača naloga.** Naj bo  $p = 5$ . Grupa  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5)$  je moči 60. Poišči njene 2-podgrupe Sylowa. Na množici teh podgrup grupa  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5)$  deluje tranzitivno. Iz tega delovanja izpelji, da je  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5) \cong A_5$ .

**Izrek** (Galois 1831). Za  $p > 3$  je grupa  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  enostavna.

Družina grup  $G_p$  za praštevila  $p$  je torej dobra prijateljica ene od fundamentalnih družin končnih enostavnih grup.

## Konjugiranostni razredi

Predpostavimo, da je  $p > 2$ . Konjugiranostni razredi v  $G_p$  so enaki podobnostnim razredom matrik. Te najlažje sistematično obravnavamo prek lastnosti njihovih karakterističnih polinomov, ki so stopnje 2. Bodisi je ta polinom razcepen (z eno dvojno ničlo ali dvema različnima v  $\mathbf{F}_p$ ) bodisi je nerazcepen. V primeru dvojnih ničel obravnavamo še možnost, da matrika morda ni diagonalizabilna. Na ta način dobimo naslednje konjugiranostne razrede.

1. **Skalarji.** Naj ima element  $g \in G_p$  karakteristični polinom z dvojno ničlo  $a \in \mathbf{F}_p^*$  in je hkrati diagonalizabilen. Tedaj je  $g$  skalarna matrika

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Vsak tak element je centralen v  $G_p$ , zato je njegov konjugiranostni razred velikosti 1. Vseh takih razredov je  $p - 1$ .

2. **Nediagonalizabilni elementi.** Naj ima element  $g \in G_p$  karakteristični polinom z dvojno ničlo  $a \in \mathbf{F}_p^*$  in hkrati *ni* diagonalizabilen. Tedaj je po Jordanovi formi  $g$  podoben matriki

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Centralizator vsakega takega elementa je enak

$$C_p = \left\{ \begin{pmatrix} x & t \\ 0 & x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbf{F}_p^*, t \in \mathbf{F}_p \right\} = S_p \times U_p,$$

kjer je  $S_p$  množica skalarnih matrik. Velja  $|C_p| = (p - 1)p$ . Konjugiranostni razred je torej velikosti  $p^2 - 1$ . Vseh takih razredov je  $p - 1$ .

3. **Razcepni polenostavni elementi.** Naj ima element  $g \in G_p$  karakteristični polinom z dvema različnima ničloma  $a, b \in \mathbf{F}_p^*$ . Tak element je diagonalizabilen in zato podoben

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Centralizator vsakega takega elementa je enak

$$T_r = D_p = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbf{F}_p^* \right\}.$$

in je zato moči  $(p - 1)^2$ . Konjugiranostni razred je torej velikosti  $p(p + 1)$ . Vseh takih razredov je  $\binom{p-1}{2} = (p - 1)(p - 2)/2$ .

4. **Nerazcepni polenostavni elementi.** Naj ima element  $g \in G_p$  nerazcepen karakteristični polinom. Ta polinom torej nima ničel v  $\mathbf{F}_p$ , ima pa ničle v razširitvi  $F$  tega polja z ničloma karakterističnega polinoma. Ker je  $p > 2$ , sta ti dve ničli različni.<sup>8</sup> Razširitev  $F/\mathbf{F}_p$  je stopnje 2, zato jo lahko predstavimo kot

$$F \cong \frac{\mathbf{F}_p[X]}{(X^2 - \epsilon)} = \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon}),$$

<sup>8</sup>Ponovljena ničla bi bila ničla odvoda karakterističnega polinoma, ki pa je linearen in ima vse ničle v  $\mathbf{F}_p$ .

kjer  $\epsilon \in \mathbf{F}_p^*$  ni kvadrat v  $\mathbf{F}_p$ . To polje je opremljeno z Galoisjevim avtomorfizmom  $\sigma: \sqrt{\epsilon} \mapsto -\sqrt{\epsilon}$  reda 2. Če je  $\lambda$  lastna vrednost  $g$ , je torej tudi  $\lambda^\sigma$  lastna vrednost in pripadajoča lastna vektorja sta  $v$  in  $v^\sigma$ . Zamenjajmo bazo v  $w_2 = v + v^\sigma$  in  $w_1 = (v - v^\sigma)/\sqrt{\epsilon}$ . Ta dva vektorja sta invariantna za avtomorfizem  $\sigma$ , zato imata obe komponenti v  $\mathbf{F}_p$ . V tej bazi ima element  $g$  matriko

$$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix},$$

kjer je  $a = (\lambda + \lambda^\sigma)/2 \in \mathbf{F}_p$  in  $b = \sqrt{\epsilon}(\lambda - \lambda^\sigma)/2 \in \mathbf{F}_p^*$ . Centralizator vsakega takega elementa je enak

$$T_{nr} = \left\{ \begin{pmatrix} x & \epsilon y \\ y & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbf{F}_p, (x, y) \neq (0, 0) \right\}.$$

Konjugiranostni razred je torej velikosti  $p(p-1)$ . Vseh takih razredov je  $p(p-1)/2$ .<sup>9</sup>

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
število razredov	$p-1$	$p-1$	$(p-1)(p-2)/2$	$p(p-1)/2$
velikost razreda	1	$p^2-1$	$p(p+1)$	$p(p-1)$

Tabela 4.1: Konjugiranostni razredi v  $G_p$ : njihov tip, število razredov določenega tipa in velikost razreda

Za velika praštevila  $p$  velja  $|G_p| \sim p^4$ . Hkrati iz izračunov števila razredov in njihovih velikosti vidimo, da je število polenostavnih elementov asimptotsko primerljivo s  $p^4$ , razdeljeno približno na polovico med razcepnimi in nerazcepnimi elementi. Generični elementi v  $G_p$  so za velika praštevila torej polenostavni.

Seštejemo število vseh konjugiranostnih razredov in dobimo

$$k(G_p) = p^2 - 1.$$

Grupa  $G_p$  ima torej  $p^2 - 1$  nerazcepnih kompleksnih upodobitev.

Preden nadaljujemo z natančnim določanjem teh upodobitev, se še enkrat ozrimo na klasifikacijo konjugiranostnih razredov. Tekom določanja velikosti razredov smo naleteli na dva posebna centralizatorja polenostavnih elementov, in sicer  $T_r$  in  $T_{nr}$ . Ta dva centralizatorja bosta igrala pomembno vlogo v teoriji upodobitev grupe  $G_p$ . Prvemu pravimo **razcepni torus**, drugemu pa **nerazcepni torus**. Za razcepni torus velja

$$T_r \cong \mathbf{F}_p^* \times \mathbf{F}_p^*,$$

nerazcepni torus pa identificiramo kot<sup>10</sup>

$$T_{nr} \cong \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^*, \quad \begin{pmatrix} x & \epsilon y \\ y & x \end{pmatrix} \mapsto x + \sqrt{\epsilon}y.$$

<sup>9</sup>Če zamenjamo v zgornji matriki  $b$  z  $-b$ , dobimo podobno matriko. To ravno ustreza delovanju  $\sigma$ .

<sup>10</sup>Element  $x + \sqrt{\epsilon}y$  deluje na  $\mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})$  z množenjem z leve. Če to grupo obravnavamo kot vektorski prostor nad  $\mathbf{F}_p$ , potem je matrika tega delovanja v bazi  $\{1, \sqrt{\epsilon}\}$  ravno ta, ki je prikazana.

## Tabela karakterjev, 1. del

Predpostavimo, da je  $p > 2$ . Določimo najprej enorazsežne upodobitve grupe  $G_p$ . Ker je  $[G_p, G_p] = \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p) = \ker(\det)$ , vse enorazsežne upodobitve dobimo tako, da najprej uporabimo determinanto  $\det: G_p \rightarrow \mathbf{F}_p^*$ , za tem pa poljubno upodobitev abelove grupe  $\mathbf{F}_p^*$ . Za vsak homomorfizem  $\chi: \mathbf{F}_p^* \rightarrow \mathbf{C}^*$  dobimo torej enorazsežno upodobitev  $\chi \circ \det$  grupe  $G_p$  in vse enorazsežne upodobitve so take oblike. Vseh teh upodobitev je  $|\mathbf{F}_p^*| = p - 1$ .

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\chi \circ \det$	$\chi(a)^2$	$\chi(a)^2$	$\chi(a)\chi(b)$	$\chi(a^2 - \epsilon b^2)$

Tabela 4.2: Enorazsežni karakterji  $G_p$

Nadaljujmo s pomočjo homomorfizma  $\Pi: G_p \rightarrow S_{p+1}$ , ki opisuje permutacijsko delovanje  $G_p$  na projektivni premici. Od tod dobimo permutacijsko upodobitev  $G_p$  na  $\mathbf{C}[\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_p)]$ . Kot smo videli že v primeru simetrične grupe, ta upodobitev *ni* nerazcepna, saj vedno vsebuje **1**. Naj bo  $\mathrm{St}$  komplement **1** v tej permutacijski upodobitvi. Ta komplement je do izomorfizma natakoma enolično določen in mu pravimo **Steinbergova upodobitev**.<sup>11</sup> Vrednosti karakterjev  $\mathrm{St}$  ni težko izračunati. Račun pokaže  $\langle \mathrm{St}, \mathrm{St} \rangle = 1$ , zato je  $\mathrm{St}$  nerazcepna upodobitev.

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\mathrm{St}$	$p$	$0$	$1$	$-1$

Tabela 4.3: Steinbergov karakter  $G_p$

Steinbergovo upodobitev lahko tenzoriramo s poljubno enorazsežno in dobimo  $\mathrm{St} \otimes (\chi \circ \det)$ , kar označimo krajše kot  $\mathrm{St}(\chi)$ . Za  $\chi = \mathbf{1}$  dobimo običajno Steinbergovo upodobitev. Vse te upodobitve so tudi nerazcepne.

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\mathrm{St}(\chi)$	$p\chi(a)^2$	$0$	$\chi(a)\chi(b)$	$-\chi(a^2 - \epsilon b^2)$

Tabela 4.4: Posplošeni Steinbergov karakter  $G_p$

Do zdaj smo našli  $2(p-1)$  nerazcepnih upodobitev, iščemo pa jih  $p^2 - 1$ . Še veliko jih manjka! Sledeč filozofiji Artina in Brauerja nadaljne nerazcepne upodobitve iščemo z indukcijo iz podgrup  $G_p$ . Opazujmo Borelovo podgrupo  $B_p$ . Ta grupa je opremljena s projekcijo na razcepni torus

$$B_p \rightarrow B_p/U_p = D_p = T_r = \mathbf{F}_p^* \times \mathbf{F}_p^*.$$

Nerazcepne upodobitve razcepnega torusa so ravno produkti  $\chi_1 \times \chi_2$ , kjer sta  $\chi_1, \chi_2$  nerazcepni upodobitvi prvega oziroma drugega faktorja torusa. Na ta način dobimo nerazcepne upodobitve Borelove podgrupe,

$$\rho(\chi_1, \chi_2): B_p \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mapsto \chi_1(a)\chi_2(d).$$

<sup>11</sup>Steinbergovo upodobitev dobimo torej tako, da  $\Pi$  podaljšamo s standardno upodobitvijo simetrične grupe  $S_{p+1}$ .

Vsako od teh upodobitev induciramo na grupo  $G_p$  in dobimo upodobitev

$$\pi(\chi_1, \chi_2) = \text{Ind}_{B_p}^{G_p}(\rho(\chi_1, \chi_2))$$

razsežnosti  $|G_p/B_p| = p + 1$ . Karakter take upodobitve lahko izračunamo s formulo za vrednosti karakterjev inducirane upodobitve.

**Domača naloga.** Izračunaj vrednosti karakterjev upodobitve  $\pi(\chi_1, \chi_2)$ .

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\pi(\chi_1, \chi_2)$	$\begin{pmatrix} p & \\ 1 & \chi_1(a)\chi_2(a) \end{pmatrix}$	$+$	$\chi_1(a)\chi_2(b) +$	$\begin{pmatrix} 0 & \\ \chi_2(a)\chi_1(b) & \end{pmatrix}$

Tabela 4.5: Karakter upodobitve  $\pi(\chi_1, \chi_2)$  grupe  $G_p$

Od tod po preprostem računu določimo normo karakterja kot

$$\|\chi_{\pi(\chi_1, \chi_2)}\|^2 = \begin{cases} 2 & \chi_1 = \chi_2, \\ 1 & \chi_1 \neq \chi_2. \end{cases}$$

Za  $\chi_1 \neq \chi_2$  je upodobitev  $\pi(\chi_1, \chi_2)$  torej nerazcepna. Iz karakterja opazimo, da je  $\rho$  simetrična v svojih argumentih, se pravi  $\pi(\chi_1, \chi_2) \cong \pi(\chi_2, \chi_1)$ . Na ta način torej dobimo  $\binom{p-1}{2} = (p-1)(p-2)/2$  nerazcepnih upodobitev grupe  $G_p$ . Tem upodobitvam pravimo **upodobitve glavne vrste**.<sup>12</sup> V primeru, ko je  $\chi_1 = \chi_2$ , iz vrednosti karakterjev opazimo izomorfizem  $\pi(\chi, \chi) \cong \text{St}(\chi) \oplus (\chi \circ \det)$ , torej tukaj ne najdemo nobenih novih nerazcepnih upodobitev.

## Tabela karakterjev, 2. del

Opazujmo zdaj še upodobitve, ki jih dobimo z indukcijo iz nerazcepnega torusa. Te so nekoliko bolj zapletene, zato bomo pristopili bolj previdno. Naj bo

$$\theta: T_{nr} \cong \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^* \rightarrow \mathbf{C}^*$$

poljubna enorazsežna upodobitev. Izračunajmo karakter indukcije upodobitve  $\theta$  nerazcepnega torusa. Uporabimo formulo za karakter inducirane upodobitve. Naj bo  $R$  množica predstavnikov desnih odsekov  $T_{nr}$  v  $G_p$ . Za  $g \in G_p$  je  $rg r^{-1} \in T_{nr}$  za nek  $r \in R$ , če in samo če je  $rg r^{-1}$  bodisi skalar bodisi nerazcepen polenostaven element, kar je enakovredno temu, da je  $g$  bodisi skalar bodisi nerazcepen polenostaven element. Za skalarje, ki jih interpretiramo kot elemente  $g = a \in \mathbf{F}_p^* \subseteq \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^*$ , velja

$$\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)(a) = |G_p : T_{nr}| \cdot \theta(a) = p(p-1)\theta(a).$$

Za nerazcepne polenostavne elemente, ki jih interpretiramo kot elemente  $g = a + \sqrt{\epsilon}b \in \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^*$ , pa velja  $g^{G_p} \cap T_{nr} = \{g, g^\sigma\}$ , zato sta v formuli za izračun inducirane karakterja relevantna le dva člena in dobimo

$$\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)(a + \sqrt{\epsilon}b) = \theta(a + \sqrt{\epsilon}b) + \theta(a - \sqrt{\epsilon}b).$$

Z avtomorfizmom  $\sigma \in \text{Gal}(\mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})/\mathbf{F}_p)$  lahko delujemo na upodobitvi s predpisom  $\theta^\sigma(x) = \theta(x^\sigma) = \theta(x^p)$ . Torej je zadnja vrednost karakterja enaka  $\theta(g) + \theta^\sigma(g)$ .

<sup>12</sup>Angleško *principal series representations*.

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)$	$p(p-1)\theta(a)$	0	0	$\theta(a + \sqrt{\epsilon}b) + \theta(a - \sqrt{\epsilon}b)$

Tabela 4.6: Karakter upodobitve  $\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)$  grupe  $G_p$

Iz vrednosti karakterjev lahko izračunamo normo inducirane karakterja. Vrednost  $\|\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)\|^2$  je enaka

$$\frac{1}{|G_p|} \left( \sum_{g \in \mathbf{F}_p^*} (p(p-1)|\theta(g)|)^2 + \sum_{g \in \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^* \setminus \mathbf{F}_p^*} \frac{p(p-1)}{2} \cdot |\theta(g) + \theta^\sigma(g)|^2 \right).$$

Zadnjo vsoto lahko po razvoju kvadrata zapišemo kot

$$\frac{p(p-1)}{2} \cdot \left( 2(p^2 - p) + 2\text{Re} \left( \sum_{g \in \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^*} \theta(g) \overline{\theta^\sigma(g)} - \sum_{g \in \mathbf{F}_p^*} |\theta(g)|^2 \right) \right).$$

Prvo notranjo vsoto prepoznamo kot skalarni produkt upodobitev  $\theta$  in  $\theta^\sigma$  v grupi  $\mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})$ , ki je enak bodisi 0 bodisi 1 po ortogonalnosti nerazcepnih karakterjev. S tem je norma  $\|\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)\|^2$  enaka

$$\frac{1}{|G_p|} (p^2(p-1)^3 + p^2(p-1)^2 + p(p-1) \cdot ((p^2-1)\langle \theta, \theta^\sigma \rangle - (p-1))),$$

kar se poenostavi do

$$\|\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)\|^2 = p-1 + \langle \theta, \theta^\sigma \rangle = \begin{cases} p & \theta = \theta^\sigma, \\ p-1 & \theta \neq \theta^\sigma. \end{cases}$$

Upodobitev  $\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)$  je torej daleč od nerazcepne.

Pred nadaljevanjem postojmo pri pogoju  $\theta = \theta^\sigma$ , ki razdeli inducirane upodobitve na dva naravna razreda. Ta pogoj lahko enakovredno zapišemo kot  $\theta(x) = \theta(x^p)$  za vsak  $x \in \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^*$ , kar je enakovredno  $\theta(x^{p-1}) = 1$ . Vrednost  $\theta$  je torej trivialna na množici  $\{x^{p-1} \mid x \in \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^*\}$ , ki jo prepoznamo ravno kot jedro determinante  $\ker(\det) = \{x \in \mathbf{F}_p(\sqrt{\epsilon})^* \mid x^{p+1} = 1\}$ . Pogoj  $\theta = \theta^\sigma$  je torej enakovreden temu, da se  $\theta$  faktorizira prek determinante, se pravi da je oblike  $\theta = \chi \circ \det$  za nek karakter  $\chi: \mathbf{F}_p^* \rightarrow \mathbf{C}^*$ . Vseh takih upodobitev je  $p-1$ . Upodobitve  $\theta$ , ki se ne faktorizirajo prek determinante, torej za katere velja  $\theta \neq \theta^\sigma$ , se imenujejo **regularne**. Regularne upodobitve prihajajo torej v parih  $(\theta, \theta^\sigma)$ . Število Galoisjevih orbit regularnih upodobitev je zato enako  $((p^2-1) - (p-1))/2 = p(p-1)/2$ .

Glede na to, da inducirana upodobitev iz nerazcepnega torusa ni nerazcepna, lahko poskusimo inducirati še iz kakšne druge podgrupe. Naravni kandidat, ki nam še preostane, je centralizator nediagonalizabilnega elementa, se pravi grupa  $C_p = S_p \times U_p$ . Ta sestoji iz vseh elementov v  $G_p$ , katerih karakteristični polinom ima dvojno ničlo v  $\mathbf{F}_p$ . Izberimo upodobitvi

$$\chi: S_p \cong \mathbf{F}_p^* \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad \psi: U_p \cong \mathbf{F}_p \rightarrow \mathbf{C}^*$$

in tvorimo produktno upodobitev  $\chi \times \psi$  grupe  $C_p$ . To upodobitev induciramo na grupo  $G_p$ . S formulo za izračun karakterjev inducirane upodobitve ni težko določiti njenega karakterja. Naj bo  $R$  množica predstavnikov desnih



odsekov  $C_p$  v  $G_p$ . Za  $g \in G_p$  je  $rg r^{-1} \in C_p$  za nek  $r \in R$ , če in samo če je  $g$  bodisi skalar bodisi nediagonalizabilen element. Za skalarje velja

$$\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi) \left( \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \right) = |G_p : C_p| \cdot \chi(a) = (p^2 - 1)\chi(a).$$

Za nediagonalizabilen element  $g$  pa velja  $g^{G_p} \cap C_p = gU_p \backslash S_p$ , zato je v formuli za inducirani karakter relevantnih le  $p - 1$  členov in dobimo

$$\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi) \left( \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \right) = \sum_{t \in \mathbf{F}_p^*} (\chi \times \psi) \left( \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \sum_{t \in \mathbf{F}_p^*} \chi(a) \psi(t).$$

Zadnjo vsoto lahko prepišemo kot

$$\chi(a) \cdot \left( \sum_{t \in \mathbf{F}_p} \psi(t) - 1 \right) = \chi(a) \cdot (p \cdot \langle \psi, \mathbf{1} \rangle - 1) = \begin{cases} (p-1)\chi(a) & \psi = \mathbf{1}, \\ -\chi(a) & \psi \neq \mathbf{1}. \end{cases}$$

Inducirani karakter je torej odvisen od  $\psi$  le preko veljavnosti enakosti  $\psi = \mathbf{1}$ .

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi)$	$(p^2 - 1)\chi(a)$	$(p \cdot \mathbf{1}_{\psi=\mathbf{1}} - 1)\chi(a)$	0	0

Tabela 4.7: Karakter upodobitve  $\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi)$  grupe  $G_p$

Iz vrednosti karakterjev izračunamo normo

$$\|\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi)\|^2 = \begin{cases} 2(p-1) & \psi = \mathbf{1}, \\ p & \psi \neq \mathbf{1}. \end{cases}$$

Upodobitev  $\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi)$  je torej spet daleč od nerazcepne.

Primerjajmo obe inducirani upodobitvi. Skalarni produkt njunih karakterjev lahko izračunamo tako, da seštejemo le prispevke po skalarnih elementih, saj so vsi ostali členi ničelni. Dobimo

$$\langle \text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta), \text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi) \rangle = \frac{1}{|G_p|} \sum_{a \in \mathbf{F}_p^*} p(p-1)\theta(a) \cdot (p^2 - 1)\overline{\chi(a)},$$

kar prepoznamo kot

$$(p-1) \cdot \langle \theta|_{S_p}, \chi \rangle = \begin{cases} 0 & \chi \neq \theta|_{S_p}, \\ p-1 & \chi = \theta|_{S_p}. \end{cases}$$

Če torej izberemo  $\chi = \theta|_{S_p}$ , je skalarni produkt med obema upodobitvama enak  $p - 1$ . Izračunali smo tudi že normi obeh upodobitev, obe sta blizu  $\sqrt{p}$ . V luči Cauchy-Schwartzove neenakosti sta karakterja obeh induciranih upodobitev kot vektorja torej zelo blizu temu, da bi bila *vzporedna* in s tem *enaka*. Najtesnejšo zvezo med njima dobimo, če minimiziramo normi obeh, torej če vzamemo za  $\theta$  regularen karakter in za  $\psi$  poljuben netrivialen karakter. S to izbiro opazujemo *virtualen* karakter

$$\zeta_\theta = \text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\theta|_{S_p} \times \psi) - \text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta) \in R(G_p).$$

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\zeta_\theta$	$(p-1)\theta(a)$	$-\theta(a)$	0	$-\theta(a+\sqrt{\epsilon}b)-\theta(a-\sqrt{\epsilon}b)$

Tabela 4.8: Karakter  $\zeta_\theta$  grupe  $G_p$

Po že opravljenih računih je norma tega virtualnega karakterja res minimalna,

$$\langle \zeta_\theta, \zeta_\theta \rangle = \|\text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\theta|_{S_p} \times \psi)\|^2 + \|\text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta)\|^2 - 2\langle \text{Ind}_{T_{nr}}^{G_p}(\theta), \text{Ind}_{C_p}^{G_p}(\chi \times \psi) \rangle = 1.$$

Torej je bodisi  $\zeta_\theta$  bodisi  $-\zeta_\theta$  nerazcepen karakter. Ker velja  $\zeta_\theta(1) = p-1$ , je  $\zeta_\theta$  nerazcepen karakter.

Na ta način za vsak regularen karakter  $\theta$  nerazcepne torusa dobimo nerazcepno upodobitev s karakterjem  $\zeta_\theta$ . Taki upodobitvi pravimo **ostna upodobitev**.<sup>13</sup> Z izračunom skalarnih produktov se ni težko prepričati, da sta dve taki upodobitvi izomorfni, če in samo če sta regularna karakterja v isti Galoisjevi orbiti. Število ostnih upodobitev je zato enako  $p(p-1)/2$ . Poudarimo, da smo ostne upodobitve konstruirali le implicitno prek indukcij. Z nekaj truda bi lahko izpeljali eksplicitno konstrukcijo teh upodobitev. Izkaže se, da ostnih upodobitev *ni* mogoče opisati kot neposredno induciranih iz podgrup  $G_p$ . Najpreprostejši znan opis je preko Weilove upodobitve (Bushnell-Henniart 2006).

Povzemimo. Skupaj smo našli naslednje upodobitve:

- linearne:  $p-1$  upodobitev stopnje 1,
- Steinbergove:  $p-1$  upodobitev stopnje  $p$ ,
- glavne vrste:  $(p-1)(p-2)/2$  upodobitev stopnje  $p+1$ ,
- ostne:  $p(p-1)/2$  upodobitev stopnje  $p-1$ .

S tem smo našli  $p^2-1$  nerazcepnih upodobitev in zatoorej vse nerazcepne upodobitve grupe  $G_p$ .

	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & \epsilon b \\ b & a \end{pmatrix}$
$\chi \circ \det$	$\chi(a)^2$	$\chi(a)^2$	$\chi(a)\chi(b)$	$\chi(a^2 - \epsilon b^2)$
$\text{St}(\chi)$	$p\chi(a)^2$	0	$\chi(a)\chi(b)$	$-\chi(a^2 - \epsilon b^2)$
$\pi(\chi_1, \chi_2)$	$(p + \chi_1(a)\chi_2(a))$	$\chi_1(a)\chi_2(a)$	$\chi_1(a)\chi_2(b) + \chi_2(a)\chi_1(b)$	0
$\zeta_\theta$	$(p-1)\theta(a)$	$-\theta(a)$	0	$-\theta(a+\sqrt{\epsilon}b)-\theta(a-\sqrt{\epsilon}b)$

Tabela 4.9: Tabela karakterjev  $G_p$

Izračunano tabelo karakterjev grupe  $G_p$  lahko uporabimo, da z njo določimo še tabelo karakterjev grupe  $\text{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ .

**Domača naloga.** Izračunaj tabelo karakterjev grupe  $\text{SL}(\mathbf{F}_p)$  in grupe  $\text{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ . S tabelo se prepričaj, da je grupa  $\text{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  enostavna za  $p > 3$ .

<sup>13</sup>Angleško *cuspidal representation*.

## Matrike višjih razsežnosti

Argumente, ki smo jih videli v tem razdelku, bi lahko posplošili na matrike večjih razsežnosti in tako (s precej več truda) izračunali generično tabelo karakterjev grupe  $\mathrm{GL}_n(\mathbf{F}_q)$ , kot je storil [\(Green 1955\)](#). Zopet dobimo glavno vrsto upodobitev, tokrat inducirano induktivno iz podgrup  $\mathrm{GL}_m(\mathbf{F}_q)$  za  $m < n$ . Pri tem je relevantno, da to lahko naredimo na več načinov, na primer za vsako razčlenitev števila  $n = m_1 + m_2 + \dots + m_k$  lahko v  $\mathrm{GL}_n(\mathbf{F}_q)$  vidimo bločnodiagonalni direktni produkt grup

$$\mathrm{GL}_{m_1}(\mathbf{F}_q) \times \mathrm{GL}_{m_2}(\mathbf{F}_q) \times \dots \times \mathrm{GL}_{m_k}(\mathbf{F}_q).$$

Teorija upodobitev  $\mathrm{GL}_n(\mathbf{F}_q)$  zato vključuje nekaj kompleksnosti teorije upodobitev simetrične grupe  $S_n$ . Tudi v splošnem primeru dobimo ostne upodobitve, in sicer s pomočjo indukcije iz Galoisjevih razredov regularnih upodobitev nerazcepne torusa, ki ga lahko predstavimo kot končno polje  $\mathbf{F}_{q^n}$ .

Ni pa tako enostavno pridobiti tudi tabele karakterjev družine enostavnih grup  $\mathrm{PSL}_n(\mathbf{F}_q)$  ali njene prijateljice  $E_8(\mathbf{F}_q)$ . Seveda lahko posamezne tabele za specifične vrednosti  $n$  in  $q$  izračunamo,<sup>14</sup> ampak končni cilj je imeti generične tabele karakterjev, kot smo to dosegli za  $G_p = \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_p)$ . Za razumevanje teorije upodobitev teh grup imamo na voljo matematično zahtevno [Deligne-Lusztigovo teorijo](#), ki upodobitve končnih grup sestavlja s pomočjo upodobitev prirejenih algebraičnih grup nad algebraično zaprtim poljem, na primer  $\mathrm{SL}_n(\overline{\mathbf{F}_p})$ , in sicer te upodobitve izhajajo iz delovanja na  $\ell$ -adičnih kohomoloških grupah prirejenih raznoterosti. Iz te teorije lahko razumemo *del* generične tabele karakterjev, na primer poznamo vse stopnje nerazcepnih upodobitev, ne poznamo pa vseh vrednosti vseh karakterjev.

<sup>14</sup>Računanje teh tabel specifičnih končnih enostavnih grup je zbrano v [ATLAS](#). Ti izračuni so močno pripomogli k dokazu izreka o [klasifikaciji končnih enostavnih grup](#).



## Poglavje 5

# Aplikacije

Avstralski matematik Geordie Williamson je na svojem [plenarnem predavanju](#) na Mednarodnem matematičnem kongresu leta 2018 opisal teorijo upodobitev na naslednji način.

*The idea is that groups in mathematics are everywhere, but groups are nonlinear objects and are rather complicated. We attempt to linearize in some way by taking, for example, actions on a space of functions. We understand what can happen in the linear world by representation theory. Then we hope to go back to our original problem.*

V tem poglavju si bomo pogledali nekaj konkretnih aplikacij teorije upodobitev, ki na prvi pogled nimajo nobene povezave z upodobitvami, nazadnje pa je za njihovo razumevanje ključna. Pričeli bomo z abelovimi grupami. V tem primeru aplikacijam teorije upodobitev ponavadi rečemo **harmonična analiza**. To zgodbo bomo potem razširili še v nekomutativen svet.

### 5.1 Aritmetična zaporedja

#### Aritmetična zaporedja v gostih množicah

Za poljuben  $n \in \mathbf{N}$  opazujemo množico celih števil  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Vsaki njeni podmnožici  $A$  lahko priredimo gostoto  $\delta = |A|/n$ . Kadar je  $A$  visoke gostote, pričakujemo, da bomo v njej lahko našli veliko vzorcev različnih vrst, ki upoštevajo strukturo seštevanja ali množenja v množici celih števil. Eden od temeljnih takih vzorcev v množici celih števil so **aritmetična zaporedja**, se pravi zaporedja oblike

$$x, x + y, x + 2y, \dots, x + (k - 1)y$$

za  $x, y \in \mathbf{Z}$ ,  $k \in \mathbf{N}$ . Število  $k$  je dolžina tega zaporedja in opazujemo seveda le zaporedja dolžine vsaj 3. Izkaže se, da je ta struktura vselej prisotna, neodvisno od izbire konkretne množice  $A$ , če je le  $n$  dovolj velik in gostota  $\delta$  pozitivna.

**Izrek** (Szemerédi 1974). *Naj bosta  $k \geq 3$  in  $\delta > 0$ . Tedaj za vse dovolj velike  $n \in \mathbf{N}$  velja, da vsaka podmnožica  $A \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  gostote vsaj  $\delta$  vsebuje aritmetično zaporedje dolžine  $k$ .*

Dokaz tega izreka je kombinatoričen in tehnično precej zahteven. Mi si bomo ogledali poseben primer za  $k = 3$ , torej za obstoj 3-členih aritmetičnih zaporedij. Za ta primer bomo izpeljali celo nekoliko močnejšo izjavo, katere dokaz bo slonel na teoriji upodobitev.

**Izrek (Roth 1953).** *Za neko konstanto  $C$  in za vse dovolj velike  $n \in \mathbf{N}$  velja, da vsaka podmnožica  $A \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  gostote vsaj  $C/\log \log n$  vsebuje aritmetično zaporedje dolžine 3.*

## Harmonična analiza

### Projekcija v $\mathbf{F}_p$

Rothov izrek se sicer tiče podmnožice celih števil, ampak ker to množico filtriramo s podmnožicami  $\{1, 2, \dots, n\}$ , lahko izberemo neko praštevilo  $p \geq n$  in dogajanje opazujemo v projekciji na kvocient  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z} = \mathbf{F}_p$ . Pri tem moramo biti nekoliko previdni, saj so aritmetična zaporedja v  $\mathbf{F}_p$  lahko nekoliko nenavadna.

**Zgled.** V  $\mathbf{F}_p$  tvori množica  $\{0, 1, (p+1)/2\}$  aritmetično zaporedje. Res, če vzamemo  $x = 0$ ,  $y = (p+1)/2$ , potem dobimo zaporedje z razliko  $y$  kot

$$x = 0, x + y = \frac{p+1}{2}, x + 2y = p + 1 = 1.$$

Če torej rešimo Rothov problem za podmnožice  $\mathbf{F}_p$  namesto za podmnožice  $\{1, 2, \dots, n\}$ , moramo biti previdni, saj dobljenega aritmetičnega zaporedja morda ne bomo mogli dvigniti iz  $\mathbf{F}_p$  v  $\mathbf{Z}$ . Tej težavi se lahko izognemo tako, da izberemo praštevilo  $p$  z lastnostjo  $p > 2n$ . Ni se težko prepričati, da v tem primeru vsako aritmetično zaporedje s 3 členi v  $\{1, 2, \dots, n\} \subseteq \mathbf{F}_p$  lahko dvignemo do aritmetičnega zaporedja v  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Poleg tega želimo, da se gostota množice  $A$  pri projekciji iz  $\{1, 2, \dots, n\}$  v  $\mathbf{F}_p$  ne spremeni preveč, zato praštevilo  $p$  ne sme biti preveliko. Optimalna izbira bo torej praštevilo  $p$  z lastnostjo  $2n < p < 4n$ , taka izbira pa tudi vselej obstaja po Bertrandovem postulatu.

Dogajanje smo na ta način predstavili v končno abelovo grupo  $\mathbf{F}_p$ . V njej opazujemo množico  $A \subseteq \mathbf{F}_p$ , ki je gostote  $\delta$ . Dokazati želimo, da za dovolj velik  $p$  obstajajo v  $A$  aritmetična zaporedja dolžine 3, če je le  $\delta > C/\log \log p$  za neko konstanto  $C$ .

### Izražanje problema v jeziku upodobitev

Rothov izrek v  $\mathbf{F}_p$  napadimo z močnimi orodji teorije upodobitev grupe  $\mathbf{F}_p$ . Problem bomo najprej izrazili v prostoru funkcij  $\text{fun}(\mathbf{F}_p, \mathbf{C})$ . Naj bo  $1_A$  karakteristična funkcija množice  $A$ . Vsako aritmetično zaporedje dolžine 3 je oblike  $x, z, y$ , pri čemer je  $z - x = y - z$ , kar je enakovredno  $x + y = 2z$ . Števila  $x, y$  in  $(x+y)/2$  morajo torej pripadati množici  $A$ . Število aritmetičnih zaporedij dolžine 3 v  $A$  lahko zato izrazimo kot

$$\sum_{x, y, z \in \mathbf{F}_p : x+y=2z} 1_A(x)1_A(y)1_A(z) = \sum_{z \in \mathbf{F}_p} (1_A * 1_A)(z)1_A(z/2)$$

Naj bo  $1_{2A}(z) = 1_A(z/2)$ . Zadnjo vsoto prepoznamo kot skalarni produkt

$$p \cdot \langle 1_A * 1_A, 1_{2A} \rangle,$$

kar lahko s Parsevalovim izrekom razvijemo kot

$$\frac{1}{p} \sum_{\chi \in \text{Irr}(\mathbf{F}_p)} \widehat{1_A * 1_A}(\chi) \overline{\widehat{1_{2A}}(\chi)}.$$

Trikrat globoko vdihnimo in premislamo vsako zadevo posebej.

1. Nerazcepne upodobitve oziroma karakterje grupe  $\mathbf{F}_p$  eksplicitno poznamo, enaki so

$$\chi_j: \mathbf{F}_p \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto \zeta^{jx}$$

za  $j \in \mathbf{F}_p$ , kjer je  $\zeta = e^{2\pi i/p}$ .

2. Povezavo med konvolucijo in Fourierovo transformacijo smo videli že pri spletičnah. Dokazali smo, da vse endospletične regularne upodobitve izhajajo iz uporabe Fourierove transformacije. Te lastnosti smo kasneje uporabili tudi pri simetrični grupi. Naj bo zdaj  $G$  poljubna grupa in  $F$  polje. Naj bosta  $f_1, f_2 \in \text{fun}(G, F)$  funkciji in  $\rho$  upodobitev grupe  $G$ . Kompozicija Fourierovih transformacij  $\widehat{f_1}(\rho) \cdot \widehat{f_2}(\rho)$  je enaka

$$\sum_{g_1, g_2 \in G} f_1(g_1) f_2(g_2) \rho(g_1^{-1} g_2^{-1}) = \sum_{g \in G} (f_2 * f_1)(g) \rho(g^{-1}).$$

Torej velja

$$\widehat{f_1}(\rho) \cdot \widehat{f_2}(\rho) = \widehat{f_2 * f_1}(\rho)$$

in Fourierova transformacija pretvarja konvolucijo funkcij v produkt linearnih preslikav, pri čemer moramo biti pozorni na vrstni red operacij zaradi morebitne nekomutativnosti grupe.

3. Velja

$$\widehat{1_{2A}}(\chi) = \sum_{g \in \mathbf{F}_p} 1_{2A}(g) \chi(-g) = \sum_{x \in \mathbf{F}_p} 1_A(x) \chi(-2x) = \widehat{1_A}(\chi^2).$$

Število iskanih aritmetičnih zaporedij je zato enako

$$\frac{1}{p} \sum_{j \in \mathbf{F}_p} \widehat{1_A}(\chi_j)^2 \widehat{1_A}(\chi_j^2) = \frac{1}{p} \sum_{j \in \mathbf{F}_p} \widehat{1_A}(\chi_j)^2 \widehat{1_A}(\chi_{-2j})$$

### Glavni del in prispevki netrivialnih karakterjev

Izolirajmo prispevek trivialne upodobitve. Velja  $\widehat{1_A}(\chi_0) = \widehat{1_A}(\mathbf{1}) = |A|$ , zato je število aritmetičnih zaporedij dolžine 3 v  $A$  enako

$$\frac{|A|^3}{p} + \frac{1}{p} \sum_{j \in \mathbf{F}_p^*} \widehat{1_A}(\chi_j)^2 \widehat{1_A}(\chi_{-2j}).$$

Glavni del rezultata je nekoliko nehomogen. To lahko popravimo z dodatno normalizacijo s  $p^2$ , ki ima pravzaprav zelo smiselno interpretacijo. Če namreč izberemo  $x, y, z \in \mathbf{F}_p$  enakomerno naključno, a pogojno na veljavnost  $x + y = 2z$ ,<sup>1</sup> potem je verjetnost, da so  $x, y, z$  vsi v  $A$ , enaka

$$\mathbf{P}_{x, y, z \in \mathbf{F}_p}(x, y, z \in A \mid x + y = 2z) = \delta^3 + \frac{1}{p^3} \sum_{j \in \mathbf{F}_p^*} \widehat{1_A}(\chi_j)^2 \widehat{1_A}(\chi_{-2j}).$$

Brez pogojne omejitve bi bila zgornja verjetnost seveda enaka  $\delta^3$ . Srčika pogoja aritmetičnega zaporedja dolžine 3 se torej skriva v prispevkih netrivialnih karakterjev. Splošna strategija harmonične analize je, da ti prispevki nikdar ne uspejo izničiti glavnega delta  $\delta^3$  in da v  $A$  torej res obstaja aritmetično zaporedje dolžine 3.

<sup>1</sup>Na ta način torej izbiramo aritmetična zaporedja v  $\mathbf{F}_p$  dolžine 3.

Za omejitev netrivialnih prispevkov najprej uporabimo trikotniško neenakost,

$$\left| \sum_{j \in \mathbf{F}_p^*} \widehat{1_A}(\chi_j)^2 \widehat{1_A}(\chi_{-2j}) \right| \leq \max_{j \in \mathbf{F}_p^*} |\widehat{1_A}(\chi_j)| \cdot \sum_{j \in \mathbf{F}_p^*} |\widehat{1_A}(\chi_j)| |\widehat{1_A}(\chi_{-2j})|.$$

Zadnjo vsoto ocenimo s Cauchy-Schwartzovo neenakostjo, tako da dobimo zgornjo mejo

$$\max_{j \in \mathbf{F}_p^*} |\widehat{1_A}(\chi_j)| \cdot \sqrt{\sum_{j \in \mathbf{F}_p} |\widehat{1_A}(\chi_j)|^2} \cdot \sqrt{\sum_{j \in \mathbf{F}_p} |\widehat{1_A}(\chi_{-2j})|^2}.$$

Vsota pod korenoma je v obeh primerih enaka, in sicer jo po Parsevalu lahko izrazimo kot

$$\sum_{j \in \mathbf{F}_p} |\widehat{1_A}(\chi_j)|^2 = \sum_{j \in \mathbf{F}_p} \langle \widehat{1_A}(\chi_j), \widehat{1_A}(\chi_j) \rangle_{\text{HS}} = p^2 \langle 1_A, 1_A \rangle = p|A|.$$

Od tod torej sklenemo

$$\mathbf{P}_{x,y,z \in \mathbf{F}_p}(x, y, z \in A \mid x + y = 2z) \geq \delta^3 - \delta \cdot \frac{1}{p} \max_{j \in \mathbf{F}_p^*} |\widehat{1_A}(\chi_j)|.$$

Kadar je Fourierova transformacija  $1_A$  v vseh netrivialnih karakterjih strogo manjša od  $p\delta^2$ , je verjetnost na levi strani strogo pozitivna, zato res najdemo aritmetično zaporedje dolžine 3 v  $A$ . Ko pa ima po drugi strani  $\widehat{1_A}$  kakšen velik netrivialen Fourierov koeficient, se pravi ko za nek  $j \in \mathbf{F}_p^*$  velja

$$|\widehat{1_A}(\chi_j)| \geq p\delta^2,$$

pa harmonična analiza odpove. V tem primeru moramo podrobneje raziskati pomen velikega Fourierovega koeficienta.

### Večanje gostote

Predpostavimo, da je  $|\widehat{1_A}(\chi_j)| \geq p\delta^2$  za nek  $j \in \mathbf{F}_p^*$ . Preden nadaljujemo, bomo funkcijo  $1_A$  projicirali na podprostor funkcij z ničelnim povprečjem. Naj bo  $f = 1_A - \delta \in \text{fun}(\mathbf{F}_p, \mathbf{C})$ . Velja

$$\widehat{f}(\chi_j) = \widehat{1_A}(\chi_j) - \delta \widehat{1}(\chi_j) = \widehat{1_A}(\chi_j) - \delta p \langle \mathbf{1}, \chi_j \rangle = \widehat{1_A}(\chi_j),$$

zato je

$$\left| \sum_{x \in \mathbf{F}_p} f(x) \zeta^{-jx} \right| = |\widehat{f}(\chi_j)| \geq p\delta^2.$$

Funkcija  $x \mapsto \zeta^{-jx}$  precej oscilira, ko  $x$  preteče ves  $\mathbf{F}_p$ . Če bi bila ta funkcija približno konstanta, bi lahko sklepali, da je vsota vrednosti  $f$  precej velika. Približno konstantnost te funkcije lahko dosežemo tako, da preidemo na neko podmnožico  $\mathbf{F}_p$ .<sup>2</sup>

**Domača naloga.** Obstaja konstanta  $c \in (0, \frac{1}{2})$ , za katero velja naslednje. Množico  $\mathbf{F}_p$  lahko razčlenimo kot disjunktno unijo množice podmnožic  $P_1, P_2, \dots, P_m$ , tako da je vsaka množica  $P_i$  aritmetično zaporedje dolžine med  $c\sqrt{p}$  in  $(1-c)\sqrt{p}$ , hkrati pa je  $|\zeta^{-jx} - \zeta^{-jy}| < c\delta^2$  za vsaka  $x, y \in P_i$ .

<sup>2</sup>Argument za to je konceptualno preprost, a poln tehničnih podrobnosti.



S pomočjo razčlenitve množice  $\mathbf{F}_p$  torej sklepamo

$$\left| \sum_{x \in \mathbf{F}_p} f(x) \zeta^{-jx} \right| \leq \sum_{i=1}^m \left| \sum_{x \in P_i} f(x) \zeta^{-jx} \right| = \sum_{i=1}^m \left| \sum_{x \in P_i} f(x) (\zeta^{-jx_0} + (\zeta^{-jx} - \zeta^{-jx_0})) \right|,$$

kjer smo v vsakem  $P_i$  izbrali nek element  $x_0$ . Po trikotniški neenakosti in upoštevanju približne konstantnosti funkcije  $x \mapsto \zeta^{-jx}$  na  $P_i$  lahko zadnjo vsoto omejimo navzgor kot

$$\sum_{i=1}^m \left| \sum_{x \in P_i} f(x) \right| + \sum_{i=1}^m \left| \sum_{x \in P_i} f(x) \right| c\delta^2 \leq \sum_{i=1}^m \left| \sum_{x \in P_i} f(x) \right| + cp\delta^2.$$

S tem nazadnje dobimo neenakost

$$\sum_{i=1}^m \left| \sum_{x \in P_i} f(x) \right| \geq (1-c)p\delta^2.$$

Po konstrukciji je povprečje funkcije  $f$  po  $\mathbf{F}_p$  enako 0. Vsote po zaporedjih  $P_i$  se torej seštevajo v 0, po absolutni vrednosti pa se seštevajo v vsaj  $(1-c)p\delta^2$ . Torej obstaja nek  $i$ , za katerega velja

$$\sum_{x \in P_i} f(x) + \left| \sum_{x \in P_i} f(x) \right| \geq \frac{1}{m}(1-c)p\delta^2.$$

Ker je  $|\mathbf{F}_p| = \sum_{i=1}^m |P_i|$ , dobimo neenakost  $p \geq mc\sqrt{p}$ . Hkrati za vsako realno število  $r$  velja  $r + |r| = 2\max(r, 0)$ , zato je

$$\max\left(\sum_{x \in P_i} f(x), 0\right) \geq \frac{c(1-c)}{2}\sqrt{p}\delta^2 \geq \frac{c}{2}|P_i|\delta^2.$$

Leva stran je zato strogo pozitivna in enaka vsoti  $f$  po  $P_i$ . Upoštevamo še  $f = 1_A - \delta$  in sklenemo

$$|A \cap P_i| \geq \frac{c}{2}|P_i|\delta^2 + |P_i|\delta$$

oziroma ekvivalentno

$$\frac{|A \cap P_i|}{|P_i|} \geq \delta + \frac{c}{2}\delta^2.$$

Množica  $A$  ima torej v aritmetičnem zaporedju  $P_i$  gostoto za  $\frac{c}{2}\delta^2$  večjo kot v  $\mathbf{F}_p$ .

## Iteracija

Povzemimo. Če množica  $A$  gostote  $\delta$  nima aritmetičnih zaporedij dolžine 3, potem smo našli aritmetično zaporedje  $P_i$ , v katerem ima  $A$  gostoto vsaj  $\delta + \frac{c}{2}\delta^2$ . Ta postopek zdaj iteriramo.<sup>3</sup> Če množica  $A \cap P_i$  nima aritmetičnih zaporedij dolžine 3, potem najdemo aritmetično zaporedje dolžine med  $c\sqrt{|P_i|}$  in  $(1-c)\sqrt{|P_i|}$ , v katerem ima  $A$  gostoto vsaj  $\delta + 2\frac{c}{2}\delta^2$ , in tako dalje. Ker gostota na nobeni točki ne more preseči vrednosti 1, se ta postopek gotovo ustavi po končno mnogo korakih. Na tej točki najdemo aritmetično zaporedje dolžine 3 v  $A$ , če je le velikost množice  $P_i$  do te točke dovolj velika. Iz podrobne analize večanja gostote in spreminjaja velikosti množic  $P_i$  se da izpeljati,<sup>4</sup> da ta argument res deluje, če je le  $\delta \geq C/\log\log p$  za neko konstanto  $C$ . S tem je Rothov izrek dokazan.

<sup>3</sup>Ne bomo preveč natančni glede iteracije. V grobem lahko iz aritmetičnega zaporedja  $P_i$  preidemo na ciklično grupo enake moči (morda ne več praštevilske) in potem ponovimo argument v tej ciklični grupi.

<sup>4</sup>Glej (Peluse 2022).

## Onkraj Rothovega izreka

Mnogo dela po Rothovem izreku je bilo posvečenega izboljšanju meje o gostoti, ki še zagotovi obstoj aritmetičnih zaporedij dolžine 3. Večina izboljšav spodnje meje je s sabo prinesla nove ideje, uporabne tudi za reševanje kakšnih drugih problemov. Najsodobnejši rezultat v zvezi s tem je prebojen članek (Bloom-Sisask 2020), kjer avtorja dokažeta, da obstajata konstanti  $C, c$ , tako da ima vsaka množica  $A \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  gostote vsaj  $C/(\log n)^{1+c}$  aritmetično zaporedje dolžine 3. Te meja se torej znebi dvojnega logaritma in uvede minimalen eksponent k logaritmu, zato je bistveno manjša restrikcija na gostoto.

Ta rezultat lahko uporabimo, na primer, z množico praštevil. Po izreku Čebiševa je število praštevil do  $n$  vsaj  $Cn/\log n$ , zato imajo praštevila v  $\{1, 2, \dots, n\}$  gostoto vsaj  $C/\log n$  in na njih lahko apliciramo posplošeni Rothov izrek. Ker lahko vselej tudi izpustimo prvih nekaj praštevil, torej sklepamo, da množica praštevil vsebuje neskončno mnogo aritmetičnih zaporedij dolžine 3. Poudarimo konceptualno pomembno dejstvo, da smo ta rezultat izpeljali zgolj zaradi same gostote praštevil in ne zaradi kakršne koli druge njihove lastnosti. Nenazadnje je slogan izvirnega Rothovega izreka ta, da lahko najdemo v vsaki dovolj gosti množici strukturo.

**Odprt problem.** Ali je mogoče z ustrezno posplošitvijo Rothovega izreka dokazati, da praštevila vsebujejo aritmetična zaporedja dolžine  $k$  za vsak  $k \geq 3$ ? Obstoj takih zaporedij je sicer znan iz (Green-Tao 2004), ki temelji na razširitvi Szemerédijevega izreka, a ne v smeri nižanja meje gostote, temveč v uporabi izreka na specifičnih redkih podmnožicah.

## 5.2 Podmnožice brez produktov

### Antipodgrupe

Naj bo  $G$  končna grupa in  $A \subseteq G$  njena podmnožica. Množica  $A$  je podgrupa, če in samo če je zaprta za množenje, se pravi  $A \cdot A \subseteq A$ . Skrajno diametralno tej strukturi se znajdemo, če predpostavimo, da produkt *nobenih* dveh elementov iz množice  $A$  ne pripada  $A$ , se pravi  $A \cdot A \cap A = \emptyset$ . Z drugimi besedami, enačba  $xy = z$  v množici  $A$  nima rešitev. V tem primeru rečemo, da je množica  $A$  **brez produktov**. Če smo v teoriji grup malodane obsedeni s strukturiranimi množicami, nas mora vsaj malo tudi zanimati tudi druga skrajnost.

Kadar množica  $A$  vsebuje kakšno podgrupo, seveda *ni* brez produktov, zato se morajo take množice čim bolj izogniti podgrupam. Osnovno vprašanje v zvezi z množicami brez produktov je, kako velike podmnožice brez produktov dana grupa vsebuje. Za začetek si oglejmo nekaj preprostih zgledov.

#### Zgled.

- Naj bo  $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  in  $A$  neka njena podmnožica. Množica  $A$  je brez produktov, če in samo če enačba  $x + y = z$  nima rešitve v  $A$ . To vprašanje je ravno obratno sorodni lastnosti, ki smo jo opazovali v prejšnjem razdelku. Tam smo reševali le malo drugačno enačbo  $x + y = 2z$  in dokazali, da ima vselej rešitve v podmnožicah pozitivne gostote. Zanimovo je, da je situacija precej drugačna za enačbo

$x + y = z$ .<sup>5</sup> Za množico  $A$  lahko vzamemo na primer vsa števila v  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ , ki so strogo med  $\frac{1}{3}n$  in  $\frac{2}{3}n$ . Ta množica je jasno brez produktov in je gostote približno  $\frac{1}{3}$  v  $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$  za velike vrednosti  $n$ .

To konstrukcijo lahko posplošimo na poljubno končno abelovo grupo. Ob tem se ni težko prepričati, da vselej obstaja podmnožica brez produktov gostote vsaj  $\frac{2}{7}$ .

- Simetrična grupa  $S_n$  vsebuje ogromno množico brez produktov, in sicer množico vseh lihih permutacij  $S_n \setminus A_n$ . Produkt dveh lihih permutacij je soda permutacija, zato je ta množica res brez produktov. Njena gostota je  $\frac{1}{2}$ .
- Naj bo  $G$  končna grupa s podgrupo  $H \leq G$ . Naj bo  $A = Hg$  za nek  $g \in G \setminus H$ . Tedaj za  $x = h_1g$  in  $y = h_2g$  velja  $Hxy = Hh_1gh_2g = Hgh_2g$ . Pri tem velja  $xy \in A$ , če in samo če je  $Hgh_2g = Hg$ , kar se poenostavi do  $gh_2 \in H$ , se pravi  $g \in H$ , kar je sprto s predpostavko. Množica  $A$  je zato brez produktov. Njena gostota v  $G$  je  $1/|G:H|$ . Ta primer posploši zadnjega, kjer smo obravnavali  $A_n \leq S_n$ .

Mnogo težje je najti podmnožice brez produktov pozitivne gostote v alternirajoči grupi  $A_n$  ali linearni grupi  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ . Dokazali bomo, da to težavo lahko pojasnimo s teorijo upodobitev.

**Izrek (Gowers 2008).** *Naj bo  $G$  končna grupa in naj bo  $m$  najmanjša stopnja netrivialne nerazcepne kompleksne upodobitve  $G$ . Tedaj je vsaka podmnožica brez produktov v  $G$  gostote kvečjemu  $m^{-1/3}$ .*

### Zgled.

- Iz rezultatov o upodobitvah simetričnih grup (natančneje, formule o kljukah) sledi, da ima  $S_n$  dve nerazcepni upodobitvi stopnje 1 (to sta **1** in  $\mathrm{sgn}$ ) in dve nerazcepni upodobitvi stopnje  $n-1$  (to sta  $\rho$  in  $\rho \otimes \mathrm{sgn}$ ), vse ostale nerazcepne upodobitve pa so višje stopnje (za  $n \geq 7$ ). Oba para upodobitev se zožita v izomorfni nerazcepni upodobitvi na  $A_n$ . Velja torej  $m \sim n$ . Po izreku v  $A_n$  zatorej *ni* podmnožic brez produktov pozitivne gostote, ko gre  $n$  čez vse meje. Še več, največja možna gostota je velikostnega reda  $m^{-1/3} \sim n^{-1/3}$ .
- Opazujmo grupo  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ . Iz njene tabele karakterjev razberemo, da zanjo velja  $m = (p-1)/2$ . Po izreku tudi ta grupa nima podmnožic brez produktov pozitivne gostote, ko gre  $p$  čez vse meje. Še več, največja možna gostota, ki jo dopušča izrek, je velikostnega reda  $m^{-1/3} \sim p^{-1/3} \sim |\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)|^{-1/9}$ , kar je celo mnogo manjše (relativno glede na velikost grupe) od zgornje meje, ki smo jo videli v primeru alternirajoče grupe.

## Harmonična analiza

Gowersov izrek bomo dokazali s pomočjo nekoliko močnejše trditve.

<sup>5</sup>Lahko bi naredili sicer enak razmislek kot v dokazu Rothovega izreka, a nam od tiste točke, ko harmonična analiza odpove, ne bi obstoj aritmetičnih zaporedij  $P_i$  koristil za reševanje enačbe  $x + y = z$ .

**Trditev.** Naj bo  $G$  končna grupa in naj bo  $m$  najmanjša stopnja netrivialne nerazcepne kompleksne upodobitve  $G$ . Naj bosta  $A, B \subseteq G$  podmnožici gostote  $\alpha, \beta$ . Tedaj velja

$$|\mathbf{P}_{x,y,z \in G}(x, y \in A, z \in B \mid xy = z) - \alpha^2 \beta| \leq m^{-1/2} \alpha \beta^{1/2}.$$

Iz trditve hitro izpeljemo Gowersov izrek. Uporabimo jo z  $A = B$ . Če je  $A$  brez produktov in gostote  $\alpha$ , potem velja  $\alpha^3 \leq m^{-1/2} \alpha^{3/2}$ , kar je enakovredno  $\alpha \leq m^{-1/3}$ .

*Dokaz trditve.* Verjetnost v trditvi je enaka

$$\frac{|\{(x, y, z) \in A \times A \times B \mid xy = z\}|}{|G|^2}.$$

Število rešitev enačbe  $xy = z$  za  $x, y \in A, z \in B$  lahko izrazimo kot

$$\sum_{x,y,z \in G: xy=z} 1_A(x) 1_A(y) 1_B(z) = \sum_{z \in G} (1_A * 1_A)(z) 1_B(z) = |G| \cdot \langle 1_A * 1_A, 1_B \rangle.$$

Skalarni produkt razvijemo s Parsevalovo formulo in dobimo

$$\frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \cdot \langle \widehat{1_A}(\pi)^2, \widehat{1_B}(\pi) \rangle_{\text{HS}}.$$

Prispevek trivialne upodobitve je enak

$$\langle \widehat{1_A}(1)^2, \widehat{1_B}(1) \rangle_{\text{HS}} / |G| = |A|^2 |B| / |G| = \alpha^2 \beta |G|^2.$$

Prispevke netrivialnih upodobitev lahko s trikotniško neenakostjo po absolutni vrednosti omejimo navzgor kot

$$\frac{1}{|G|} \sum_{1 \neq \pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) |\langle \widehat{1_A}(\pi)^2, \widehat{1_B}(\pi) \rangle_{\text{HS}}|,$$

kar je po Cauchy-Schwartzovi neenakosti kvečjemu

$$\frac{1}{|G|} \sum_{1 \neq \pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \|\widehat{1_A}(\pi)\|_{\text{HS}}^2 \|\widehat{1_B}(\pi)\|_{\text{HS}}.$$

V zadnji vsoti zadnjo normo omejimo z maksimumom, da dobimo zgornjo mejo

$$\max_{1 \neq \pi \in \text{Irr}(G)} \|\widehat{1_B}(\pi)\|_{\text{HS}} \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{1 \neq \pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \|\widehat{1_A}(\pi)\|_{\text{HS}}^2,$$

Prvi člen lahko omejimo z neenakostjo

$$m \cdot \max_{1 \neq \pi \in \text{Irr}(G)} \|\widehat{1_B}(\pi)\|_{\text{HS}}^2 \leq \sum_{1 \neq \pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \|\widehat{1_B}(\pi)\|_{\text{HS}}^2 \leq |G|^2 \|1_B\|^2 = |B| |G|$$

in zadnjo neenakost lahko uporabimo tudi za omejitev drugega člena. S tem dobimo zgornjo mejo

$$\sqrt{\frac{|B| |G|}{m}} \cdot |A| = m^{-1/2} \alpha \beta^{1/2} |G|^2$$

za prispevke netrivialnih upodobitev. Trditev je s tem dokazana.  $\square$

Iz Gowersovega izreka sledi nekoliko presenetljiva lastnost dovolj velikih podmnožic.

**Posledica** (Nikolov-Pyber 2011). Naj bo  $G$  končna grupa in naj bo  $m$  najmanjša stopnja netrivialne neracepne kompleksne upodobitve  $G$ . Če je  $A$  podmnožica  $G$  gostote strogo večje od  $m^{-1/3}$ , potem je  $A \cdot A \cdot A = G$ .

*Dokaz.* Naj bo  $g \in G$  in naj bo  $B = gA^{-1} \subseteq G$ . Množici  $A$  in  $B$  sta obe enake gostote, recimo  $\alpha$ . Velja  $\alpha^3 > m^{-1}$ , kar je enakovredno  $m^{-1/2}\alpha^{3/2} < \alpha^3$ . Iz trditve od tod sledi  $A \cdot A \cap B \neq \emptyset$ , zato je  $g \in A \cdot A \cdot A$ . Ker je bil  $g$  poljuben, je  $A \cdot A \cdot A = G$ .  $\square$

Ta lastnost velikih množic ima mnogo zelo relevantnih uporab v teoriji grup, na primer pri dokazovanju Babaijeve domeneve o premerih končnih enostavnih grup prek teorije približnih podgrup in pri raziskovanju slučajnih sprehodov,<sup>6</sup> kot je razloženo v (Breuillard 2013).

## Največja možna gostota

Z Gowersovo zgornjo mejo za dovoljeno gostoto množice brez produktov se seveda lahko vprašamo, kako optimalna je ta meja. Z drugimi besedami, konstruirati želimo čim večje podmnožice brez produktov. V grupah  $A_n$  in  $\text{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  te gotovo ne bodo pozitivne gostote, ko gredo moči grup čez vse meje.

**Zgled** (Kedlaya 1997). Opazujmo alternirajočo grupo  $A_n$ , ki deluje na množici točk  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Naj bo  $T \subseteq \{2, 3, \dots, n\}$  poljubna podmnožica velikosti  $t$ . Definirajmo množico permutacij

$$S = \{\sigma \in A_n \mid \sigma(1) \in T, \sigma(T) \cap T = \emptyset\}.$$

Vsaka permutacija v  $S \cdot S$  preslika 1 v  $T^c$ , zato je  $S \cap S \cdot S = \emptyset$  in množica  $S$  je brez produktov. Njena gostota v  $A_n$  je enaka

$$\frac{1}{n!/2} \cdot t \cdot \binom{n-t}{t} t! \cdot (n-t-1)! \cdot \frac{1}{2} = \frac{t(n-t)!(n-t-1)!}{n!(n-2t)!} = \frac{t}{n} \cdot \frac{\binom{n-t}{t}}{\binom{n-1}{t}}.$$

Z aproksimacijo  $\binom{n}{t} \sim \left(\frac{ne}{t}\right)^t e^{O(-t^2/2n)}$  za  $t = o(n)$  lahko zadnji izraz poenostavimo do

$$\frac{t}{n} e^{O(t^2/n)}.$$

Optimalno vrednost dosežemo z izbiro  $t \sim n^{1/2}$ , takrat je gostota množice  $S$  v  $A_n$  enaka  $\sim n^{-1/2}$ .

Gowersov izrek zagotavlja, da gostota množice brez produktov v  $A_n$  ne more biti večja od  $n^{-1/3}$ . Po drugi strani pa imamo zgled podmnožice brez produktov gostote  $n^{-1/2}$ . Katera od teh mej je bližje resnični največji možni gostoti podmnožice brez produktov v  $A_n$ ? To vprašanje je bilo razrešeno nedavno v (Keevash-Lifschitz-Minzer 2022), kjer avtorji dokažejo, da je konstrukcija v zadnjem zgledu v resnici optimalna: če je  $A \subseteq A_n$  brez produktov največje možne moči, potem je  $A$  ali  $A^{-1}$  enaka eni od množic iz zadnjega zgleda. Njihov dokaz temelji na ideji, ki smo jo videli v dokazu Rothovega izreka, in sicer bodisi s harmonično analizo dokažemo zeleno bodisi ima indikatorska funkcija visoko korelacijo z določenimi nelinearnimi karakterji in je zaradi tega prisotna neka struktura.

<sup>6</sup>Del tega si bomo ogledali nekoliko kasneje.

Konstrukcija Kedlaya, ki smo jo prikazali, je z nekoliko dodatnega truda<sup>7</sup> posplošljiva na vse podgrupe  $G \leq S_n$ , ki delujejo tranzitivno na množici  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Vsaka grupa, ki tranzitivno deluje na množici  $n$  točk, ima torej podmnožico brez produktov gostote  $\sim n^{-1/2}$ . V posebnem to velja za grupo  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ , ki deluje tranzitivno na projekтивni premici  $\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_p)$  s  $p+1$  točkami. Na ta način dobimo podmnožico v  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  brez produktov gostote  $\sim p^{-1/2}$ . Gowersov izrek nam tukaj daje zgornjo mejo  $\sim p^{-1/3}$  za gostoto množice brez produktov. V tem primeru optimalna ocena za gostoto ni znana.

**Odprt problem.** Kolikšna je gostota največje množice brez produktov v  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ , ko gre  $p$  čez vse meje?

## 5.3 Prepoznavanje komutatorjev

Oglejmo si še en čisto nekomutativen problem, ki na prvi pogled nima veliko skupnega s teorijo upodobitev, nazadnje pa se izkaže, da ga lahko popolnoma razrešimo, če le poznamo tabelo karakterjev grupe.

### Množica komutatorjev

Naj bo  $G$  končna grupa in  $K(G)$  njena podmnožica, ki sestoji iz elementov, ki so komutatorji<sup>8</sup> v  $G$ , se pravi

$$K(G) = \{[x, y] \mid x, y \in G\}.$$

Ta množica v splošnem *ni* podgrupa.

**Zgled.** V programskem okolju GAP se ni težko prepričati, da je najmanjša<sup>9</sup> grupa  $G$ , v kateri  $K(G)$  ne sovпада z izvedeno podgrupo  $[G, G] = \langle K(G) \rangle$ , moči 96. V GAP je ta grupa dostopna pod imenom `SmallGroup(96, 3)`. Podamo jo lahko v njeni permutacijski obliki kot podgrupo  $S_{12}$ , generirano s permutacijama

$$x = (1\ 3\ 5)(2\ 4\ 6)(7\ 11\ 9)(8\ 12\ 10), \quad y = (3\ 9\ 4\ 10)(5\ 7)(6\ 8)(11\ 12).$$

Hitro izračunamo, da je  $|K(G)| = 29$ , torej  $K(G)$  vsekakor ni podgrupa  $G$ . Izvedena podgrupa je le nekoliko večja,  $|[G, G]| = 32$ . Primer elementa v  $[G, G]$ , ki ni hkrati v  $K(G)$ , je permutacija  $(5\ 6)(7\ 8)$ .

V luči zgleda je teoriji grup vsekakor v interesu, da bi razumela, kdaj dan element  $g \in G$  pripada množici  $K(G)$ . Lahko smo celo bolj natančni in se vprašamo, na koliko načinov lahko  $g$  zapišemo kot komutator. V ta namen predpišimo funkcijo

$$N: G \rightarrow \mathbf{N}_0, \quad g \mapsto |\{(x, y) \in G \times G \mid g = [x, y]\}|.$$

Dokazali bomo naslednjo formulo za izračun funkcije  $N$  s pomočjo teorije upodobitev.

**Izrek (Frobenius).** Naj bo  $G$  končna grupa. Za vsak  $g \in G$  velja

$$N(g) = |G| \cdot \sum_{\pi \in \mathrm{Irr}(G)} \frac{\chi_\pi(g)}{\chi_\pi(1)}.$$

<sup>7</sup>Definicija množice  $S$  je enaka kot za primer  $A_n$ , dodaten trud je potreben le za oceno njene gostote.

<sup>8</sup>**Komutator** elementov  $x, y \in G$  je element  $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$ .

<sup>9</sup>Natančneje, obstajata dve taki neizomorfni grupi.

## Harmonična analiza

Funkcijo  $N$  obravnavajmo kot element prostora  $\text{fun}(G, \mathbf{C})$ . Ni se težko prepričati, da je  $N$  razredna funkcija. Za vsak  $z \in G$  namreč velja

$$[zxz^{-1}, zyz^{-1}] = z[x, y]z^{-1},$$

torej vsak par  $(x, y)$  z lastnostjo  $[x, y] = g$  rodi par  $(zxz^{-1}, zyz^{-1})$  z lastnostjo  $[zxz^{-1}, zyz^{-1}] = zgz^{-1}$ . S tem je  $N(g) = N(zgz^{-1})$ .

Funkcijo  $N$  bomo prepisali v malo bolj nenavadno obliko, ki pa nam bo dobro služila v nadaljevanju. Recimo, da za elementa  $x, y \in G$  velja  $[x, y] = g$ . To enakost interpretiramo kot  $x^{-1} \cdot y^{-1}xy = g$ , torej je  $g$  zapisan kot produkt elementa  $x^{-1}$  in elementa, ki je konjugiran  $x$ . Vsakemu takemu paru  $(x, y)$  lahko zato priredimo konjugiranostni razred  $\mathcal{C} = x^G$  in elementa  $a = x^{-1} \in \mathcal{C}^{-1}$  ter  $b = y^{-1}xy \in \mathcal{C}$ , za katera velja  $a \cdot b = g$ . S tem smo opisali prirejanje

$$\psi: \{(x, y) \in G \times G \mid g = [x, y]\} \rightarrow \{(\mathcal{C}, a, b) \mid \mathcal{C} = (a^{-1})^G, b \in \mathcal{C}, a \cdot b = g\}.$$

To prirejanje *ni* injektivno, saj s trojico  $(\mathcal{C}, a, b)$  element  $y$  ni enolično določen, pač pa le do odseka po centralizatorju  $C_G(a^{-1}) = C_G(a)$  natančno.<sup>10</sup> Torej je  $|\psi^{-1}(\mathcal{C}, a, b)| = |C_G(a)| = |G|/|\mathcal{C}|$ . S tem lahko izrazimo

$$N(g) = \sum_{\mathcal{C}} \frac{|G|}{|\mathcal{C}|} \cdot |\{(a, b) \in G \times G \mid a \in \mathcal{C}^{-1}, b \in \mathcal{C}, a \cdot b = g\}|,$$

kjer vsota teče po vseh konjugiranostnih razredih grupe  $G$ .

Dobljeni zapis funkcije  $N$  je priročen, ker je izražen le s konjugiranostnimi razredi in je neodvisen od izbire njihovih konkretnih predstavnikov. S tem je amenabilen za gnetenje s Fourierovo transformacijo. Najprej opazimo, da lahko drugi faktor zadnje vsote zapišemo kot

$$\sum_{a, b \in G, a \cdot b = g} 1_{\mathcal{C}^{-1}}(a) \cdot 1_{\mathcal{C}}(b) = (1_{\mathcal{C}^{-1}} * 1_{\mathcal{C}})(g),$$

zato je

$$N(g) = \sum_{\mathcal{C}} \frac{|G|}{|\mathcal{C}|} \cdot (1_{\mathcal{C}^{-1}} * 1_{\mathcal{C}})(g).$$

Konvolucijo lahko po Fourierovi inverziji razvijemo po karakterjih. Ker gre za karakteristične funkcije konjugiranostnih razredov, je ta razvoj še posebej preprost.

**Trditev.** *Naj bo  $G$  končna grupa in  $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$  konjugiranostna razreda v  $G$ . Velja*

$$1_{\mathcal{C}_1} * 1_{\mathcal{C}_2} = \frac{|\mathcal{C}_1| \cdot |\mathcal{C}_2|}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \frac{\overline{\chi_{\pi}(\mathcal{C}_1)} \cdot \overline{\chi_{\pi}(\mathcal{C}_2)}}{\chi_{\pi}(1)} \chi_{\pi}.$$

*Dokaz.* Uporabimo Fourierovo inverzijo za funkcijo  $1_{\mathcal{C}_1} * 1_{\mathcal{C}_2}$ . Za vsak  $g \in G$  dobimo

$$(1_{\mathcal{C}_1} * 1_{\mathcal{C}_2})(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \chi_{\pi}(1) \text{tr}(\widehat{1_{\mathcal{C}_1} * 1_{\mathcal{C}_2}}(\pi) \cdot \pi(g)).$$

Fourierova transformacija konvolucije je produkt Fourierovih transformacij, ki jih za dani karakteristični funkciji ni težko izračunati po lemi o

<sup>10</sup>Velja namreč zveza  $b = y^{-1}a^{-1}y$ .

	()	(5,6)(7,8)	$y$	$[x,y]$	$x$
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_2$	1	1	1	1	$\zeta$
$\chi_3$	1	1	1	1	$\zeta^2$
$\chi_4$	3	3	-1	-1	0
$\chi_5$	6	2	0	0	0
$\chi_6$	3	-1	1	$-1+2i$	0
$\chi_7$	3	-1	1	$-1-2i$	0
$\chi_8$	3	-1	$-1+2i$	1	0
$\chi_9$	3	-1	$-1-2i$	1	0
$\chi_{10}$	2	-2	0	0	-1
$\chi_{11}$	2	-2	0	0	$-\zeta^2$
$\chi_{12}$	2	-2	0	0	$-\zeta$

Tabela 5.1: Del tabele karakterjev  $\text{SmallGroup}(96, 3)$ , kjer je  $\zeta = e^{2\pi i/3}$

Fourierovi transformaciji razredne funkcije. Za vsako nerazcepno kompleksno upodobitev  $\pi$  na prostoru  $V$  velja

$$\widehat{1_{C_1} * 1_{C_2}}(\pi) = |C_1| \cdot |C_2| \cdot \frac{\overline{\chi_\pi(C_1)} \cdot \overline{\chi_\pi(C_2)}}{\chi_\pi(1)^2} \cdot \text{id}_V.$$

Trditev je s tem dokazana.  $\square$

Trditev uporabimo za razvoj funkcije  $N$  kot

$$N(g) = \sum_C \frac{|G|}{|C|} \cdot \frac{|C|^2}{|G|} \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \frac{|\chi_\pi(C)|^2}{\chi_\pi(1)} \chi_\pi(g) = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \frac{\chi_\pi(g)}{\chi_\pi(1)} \sum_C |C| \cdot |\chi_\pi(C)|^2.$$

Zadnja vsota je ravno enaka  $|G| \cdot \langle \chi_\pi, \chi_\pi \rangle = |G|$ , zato nazadnje sklenemo

$$N(g) = |G| \cdot \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \frac{\chi_\pi(g)}{\chi_\pi(1)}.$$

S tem smo izpeljali Frobeniusov izrek.

## Prepoznavanje komutatorjev

S Frobeniusovim izrekom lahko komutatorje v grupi prepoznavamo neposredno iz tabele karakterjev grupe.

**Posledica.** Naj bo  $G$  končna grupa. Za vsak  $g \in G$  velja

$$g \in K(G) \iff \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} \frac{\chi_\pi(g)}{\chi_\pi(1)} \neq 0.$$

**Zgled.** Naj bo  $G = \langle x, y \rangle$  grupa moči 96 iz zadnjega zgleda. S predstavljenim algoritmom lahko hitro izračunamo njeno tabelo karakterjev. Grupa ima sicer 12 razredov za konjugiranje, zato je njena tabela karakterjev kar velika.

Iz tabele lahko razberemo, da je element  $[x, y]$  res komutator, saj je

$$\sum_{i=1}^{12} \frac{\chi_i([x, y])}{\chi_i(1)} = 3 - \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{3} \neq 0.$$



Po drugi strani je element  $(5\ 6)(7\ 8)$  v jedru vseh linearnih upodobitev, zato pripada izvedeni podgrupi  $[G, G]$ . Hkrati pa ta element *ne* pripada  $K(G)$ , saj je

$$\sum_{i=1}^{12} \frac{\chi_i((5\ 6)(7\ 8))}{\chi_i(1)} = 3 + 1 + \frac{1}{3} - 4 \cdot \frac{1}{3} - 3 = 0.$$

Njegov konjugiranostni razred v  $G$  sestoji iz treh elementov. Ko te elemente dodamo množici  $K(G)$ , dobimo ravno  $[G, G]$ .

**Domača naloga.** Iz tabele karakterjev grupe  $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_p)$  razberi, da za  $p > 2$  velja

$$K(\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_p)) = \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p).$$

Iz tabele karakterjev grupe  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$  razberi, da za  $p > 3$  množica komutatorjev v  $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_p)$  vsebuje vse neskalarne elemente. Sklepaj, da je za  $p > 3$  vsak element grupe  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  komutator.

Nedavno razrešena Orejeva domneva iz leta 1951 je predvidevala, da je vsak element nekomutativne končne enostavne grupe komutator. Ta domneva je bila potrjena v (Liebeck-O'Brien-Shalev-Tiep 2010). Dokaz sloni na Frobeniusovi formuli za prepoznavanje komutatorjev. Avtorji z uporabo generičnih tabel karakterjev, Deligne-Lusztigove teorije in kar nekaj surove računske moči dokažejo, da prispevki nelinearnih karakterjev v Frobeniusovi formuli nikdar ne uspejo izničiti prispevka trivialnega karakterja.

Velika sestra Orejeve domneve je Thompsonova domneva.

**Odprt problem** (Thompsonova domneva). V vsaki nekomutativni končni enostavni grupi  $G$  obstaja konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$ , da je  $G = \mathcal{C} \cdot \mathcal{C}$ .

Thompsonova domneva implicira Orejevo domnevo. Če namreč najdemo tak konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$ , potem je v posebnem  $1 \in \mathcal{C} \cdot \mathcal{C}$ , zato je  $\mathcal{C} = \mathcal{C}^{-1}$ . Torej lahko vsak element  $g \in G$  zapišemo kot  $g = x^{-1}x^{g_2}$  za nek  $x \in \mathcal{C}$ , s čimer je  $g = [x, g_2]$ . Ker je bil  $g$  poljuben, je torej vsak element v  $G$  komutator, kar je ravno trditev Orejeve domneve.

Ta močnejša domneva je še vedno nerazrešena, je pa v zadnjih letih bilo kar nekaj aktivnosti v zvezi z njeno asimptotsko veljavnostjo. Ti rezultati večinoma temeljijo na teoriji karakterjev na naslednji način. Element  $g \in G$  pripada  $\mathcal{C} \cdot \mathcal{C}$ , če in samo če velja  $(1_{\mathcal{C}} * 1_{\mathcal{C}})(g) \neq 0$ , kar lahko s pomočjo Fourierove inverzije, kot smo videli v zadnji trditvi, zapišemo kot

$$\sum_{\pi \in \mathrm{Irr}(G)} \frac{\overline{\chi_{\pi}(\mathcal{C})}^2}{\chi_{\pi}(1)} \chi_{\pi}(g) \neq 0.$$

S pomočjo poznavanja karakterjev končnih enostavnih grup je domneva znana za mnogo primerov, odprtih pa je še nekaj neskončnih družin matričnih grup nad majhnimi polji, kot je zelo prijazno razloženo v Larsenovem predavanju [tukaj](#).

## 5.4 Slučajni sprehodi

Naj bo  $G$  končna grupa in  $S$  neka njena podmnožica, ki generira  $G$ . Vsak element v  $G$  lahko torej zapišemo kot produkt elementov iz množice  $S$ . V tem razdelku bomo raziskali, kaj se zgodi, če elementov iz množice  $S$  ne množimo s ciljem, da bi zapisali nek konkreten element, ampak jih namesto tega množimo kar naključno.

## Slučajni sprehod

Naj bo  $G$  grupa z generirajočo množico  $S$ . Enakomerno naključno izberimo element  $X_1 = s_1 \in S$ . Za tem še enkrat neodvisno izberimo  $s_2 \in S$  in izračunajmo  $X_2 = s_1 s_2 \in G$ . Ta postopek ponavljamo. Ko že imamo  $X_i \in G$ , enakomerno naključno izberemo element  $s_{i+1} \in S$  in izračunamo  $X_{i+1} = X_i s_{i+1}$ . Če smo torej po nekaj korakih že prišli do elementa  $g \in G$ , potem je verjetnost, da bomo po naslednjem koraku v elementu  $h \in G$ , enaka

$$p_S(g, h) = \begin{cases} 1/|S| & \exists s \in S: h = gs, \\ 0 & \text{sicer} \end{cases}$$

Po  $n$  korakih tega postopka dobimo element  $X_n \in G$ , ki je seveda odvisen od izbire vmesnih elementov  $s_i \in S$  na vsakem koraku. Temu procesu pravimo **slučajni sprehod** na grupi  $G$  z generirajočo množico  $S$ .

**Zgled.** Naj bo  $G = S_n$  in  $S$  množica transpozicij v  $S_n$ . Predstavljajmo si, da imamo pred sabo urejen kup kart. Enakomerno naključno izberemo dve različni karti v tem kupu, eno z levo roko in eno z desno, in ju zamenjamo. Ta postopek ponovimo  $n$ -krat. Menjava na vsakem koraku ustreza izbiri naključne transpozicije  $\sigma \in S$ , s katero pomnožimo trenutno permutacijo, ki opisuje stanje, v katerem je kup kart. Slučajni sprehod v tem primeru torej opisuje slučajno mešanje kupa kart.

Nekoliko bolj abstraktno bi lahko na slučajni sprehod gledali kot na zaporedje slučajnih spremenljivk  $X_1, X_2, \dots$  z vrednostmi v  $G$ , ki pa niso porazdeljene neodvisno, temveč zanje velja **lastnost Markova**, to je

$$\mathbf{P}(X_{i+1} = y \mid X_1 = x_1, \dots, X_i = x_i) = p_S(x_i, y)$$

za vsak  $i \geq 0$  in za vse  $x_1, x_2, \dots, x_i \in G$ . Ta lastnost je jasno izpolnjena za slučajni sprehod, kot smo ga opisali zgoraj. Po drugi strani je vsako zaporedje slučajnih spremenljivk z vrednostmi v  $G$ , ki zadošča lastnosti Markova, *uresničljivo* kot slučajni sprehod. Definiciji sta torej ekvivalentni.

Slučajna spremenljivka  $X_n$  nam pove, v katerem elementu se nahajamo po  $n$  korakih slučajnega sprehoda. Naš cilj je analizirati porazdelitev te slučajne spremenljivke v odvisnosti od  $n$  in še posebej v limiti, ko gre  $n$  čez vse meje. Kot bomo videli, je tudi ta problem izrazljiv v jeziku teorije upodobitev.

## Operator Markova

Po  $n$  korakih slučajnega sprehoda se znajdemo v nedoločenem elementu grupe  $G$ . Uvedimo funkcijo

$$\mu_n: G \rightarrow \mathbf{C}, \quad g \mapsto \mathbf{P}(X_n = g),$$

ki meri verjetnost, da smo v danem elementu. Ta funkcija torej ni nič drugega kot porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke  $X_n$ . Slučajni sprehod se prične v 1, zato je  $\mu_0 = 1_1$ .

Vrednosti funkcije  $\mu_n$  lahko izračunamo induktivno na  $n$ , upoštevajoč lastnost Markova. Velja

$$\mu_n(g) = \sum_{h \in G_p} \mathbf{P}(X_n = g \mid X_{n-1} = h) \mathbf{P}(X_{n-1} = h) = \sum_{h \in G_p} p_S(h, g) \cdot \mu_{n-1}(h).$$

Vrednosti  $p_S(h, g)$  so neničelne le, kadar je  $g \in hS$ . Dobimo torej

$$\mu_n(g) = \frac{1}{|S|} \sum_{h \in gS^{-1}} \mu_{n-1}(h) = \frac{1}{|S|} \sum_{x \in G_p} \mu_{n-1}(gx^{-1}) 1_S(x),$$

Zadnjo vsoto prepoznamo kot konvolucijo

$$\left( \mu_{n-1} * \frac{1_S}{|S|} \right)(g),$$

ki jo lahko zapišemo s pomočjo Fourierove transformacije in nazadnje dobimo

$$\mu_n = \frac{\widehat{1_S}}{|S|}(\rho_{\text{fun}}) \cdot \mu_{n-1}.$$

Rekurzivna zveza za izračun porazdelitvene funkcije  $\mu_n$  iz  $\mu_{n-1}$  je torej izrazljiva kot Fourierova transformacija normalizirane karakteristične funkcije generirajoče množice  $S$  v regularni upodobitvi. Tej linearni preslikavi pravimo **operator Markova** in jo označimo kot

$$M = \frac{\widehat{1_S}}{|S|}(\rho_{\text{fun}}) = \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} \rho_{\text{fun}}(x)^*.$$

Za poljubno funkcijo  $f \in \text{fun}(G, \mathbf{C})$  je

$$(M \cdot f)(g) = \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} f(gx^{-1}),$$

torej  $Mf$  v točki  $g \in G$  izračuna povprečje funkcije  $f$  po vseh elementih, ki v slučajnem prehodu lahko vodijo v  $g$ .

**Trditev.** Za slučajni prehod na grupi z operatorjem Markova  $M$  je

$$\mu_n = M^n \cdot 1_1.$$

Operator Markova lahko zapišemo v naravni bazi karakterističnih funkcij in s tem dobimo matriko razsežnosti  $|G| \times |G|$ , ki ima v vsakem stolpcu  $|S|$  neničelnih vrednosti, vsaka od njih je enaka  $1/|S|$ . Ob dodatnih predpostavkah na množico  $S$  dobimo dodatne lastnosti te matrike. Če je na primer množica  $S$  simetrična, kar pomeni, da je za vsak  $s \in S$  tudi  $s^{-1} \in S$ , potem je opisana matrika za  $M$  simetrična in zato nujno *diagonalizabilna* v ortonormirani bazi nad realnimi števili. V tem primeru ni težko izračunati visokih potenc  $M$  in s tem  $\mu_n$ .

**Zgled.** Opazujmo simetrično grupo  $S_3$  z generirajočo množico transpozicij  $S = \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}$ . Ta množica je simetrična. Elemente grupe  $S_3$  uredimo po vrsti kot

$$(), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2).$$

Operator Markova je v standardni bazi karakterističnih funkcij elementov grupe enak

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta matrika je simetrična. Njen karakteristični polinom je enak  $\lambda^6 - \lambda^4$ , zato dobimo lastne vrednosti  $(1, 0, 0, 0, 0, -1)$ . Lastni vektor lastne vrednosti 1 je konstantni vektor 1, ki ustreza konstantni funkciji na  $S_3$ . Lastni vektor lastne vrednosti  $-1$  je vektor  $\text{sgn}$ . Funkcijo  $1_1$  razvijemo po lastnih vektorjih kot

$$1_1 = \langle 1_1, 1 \rangle + \langle 1_1, \text{sgn} \rangle \text{sgn} + k,$$

kjer je  $k \in \ker M$ . Velja torej

$$1_1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \text{sgn} + k.$$

Za vsak  $n$  s tem dobimo

$$\mu_n = M^n \cdot 1_1 = \frac{1}{6} + \frac{(-1)^n}{6} \cdot \text{sgn} = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot 1_{A_3} & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ \frac{1}{3} \cdot 1_{S_3 \setminus A_3} & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

Porazdelitev po sodo mnogo korakih je torej enakomerna na sodih permutacijah  $A_3$ , po liho mnogo korakih pa enakomerna na lihih permutacijah  $S_3 \setminus A_3$ .

Enakomerno porazdelitev na množici  $A \subseteq G$  označimo z  $U_A$ . Velja  $U_A = 1/|A| \cdot 1_A$ . Enakomerna porazdelitev  $U_G$  je vselej lastni vektor operatorja Markova z lastno vrednostjo 1. Preostalih lastnih vrednosti pa v splošnem ni lahko določiti.

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  končna grupa z generirajočo množico  $S$  in operatorjem Markova  $M$ . Dokaži, da za vsako funkcijo  $f \in \text{fun}(G, \mathbb{C})$  velja  $\|Mf\| \leq \|f\|$ . Sklepaj, da so vse lastne vrednosti  $M$  po absolutni vrednosti kvečjemu 1. Kaj je lastni vektor za lastno vrednost 1? Kdaj je  $-1$  lastna vrednost in kaj je pripadajoči lastni vektor?

## Slučajni sprehod s konjugiranostnim razredom

Zelo dobro razumemo primer, ko je  $S$  konjugiranostni razred v  $G$ , saj lahko Fourierovo transformacijo razredne funkcije eksplicitno izračunamo v odvisnosti od karakterjev. V tem primeru lahko eksplicitno določimo tudi vse lastne vektorje, ki jih dobimo kot generatorje izotipičnih komponent nerazcepnih upodobitev, ko smo videli v predstavljenem algoritmu za izračun tabele karakterjev.

**Trditev.** Za slučajni sprehod na grupi  $G$  z generirajočo množico  $C$ , kjer je  $C$  konjugiranostni razred v  $G$ , je operator Markova diagonalizabilen z lastnimi vrednostmi

$$r_\pi(C) = \frac{\overline{\chi_\pi(C)}}{\chi_\pi(1)}$$

za vsako nerazcepno kompleksno upodobitev  $\pi \in \text{Irr}(G)$ , pri čemer je večkratnost vsake lastne vrednosti enaka  $\chi_\pi(1)^2$ .

Operator Markova  $M$  slučajnega sprehoda na  $G$  z generirajočo množico  $C$ , kjer je  $C$  konjugiranostni razred v  $G$ , deluje na vsaki od izotipičnih komponent regularne upodobitve kot skalarni večkratnik identitete z znanimi skalarji. Da lahko razumemo  $\mu_n = M^n \cdot 1_1$ , moramo najprej razviti funkcijo  $1_1$  po izotipičnih komponentah. To naredimo, kot smo že, s

pomočjo Fourierovih transformacij nerazcepnih karakterjev. Projekcija  $1_1$  na  $\pi$ -izotopično komponento je enaka

$$v_\pi = \frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \cdot \chi_\pi,$$

zato dobimo  $1_1 = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} v_\pi$ . Vektor  $v_\pi$  je lastni vektor za  $M$  z lastno vrednostjo  $r_\pi(C)$ . V tej množici lastnih vektorjev lahko torej funkcijo  $\mu_n$  razvijemo kot

$$\mu_n = M^n \cdot 1_1 = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G)} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi.$$

Za razumevanje asimptotskega obnašanja  $\mu_n$  je pomembno poznati  $|r_\pi(C)|$ . Če je namreč  $|r_\pi(C)| < 1$ , potem vrednosti  $r_\pi(C)^n$  konvergirajo k 0, ko gre  $n$  čez vse meje.

**Lema.** Za  $\pi \in \text{Irr}(G)$  drži  $|r_\pi(C)| \leq 1$ , pri čemer velja enakost natanko tedaj, ko je

$$C \ker \pi / \ker \pi \subseteq Z(G / \ker \pi).$$

*Dokaz.* Enakost velja natanko tedaj, ko je  $\pi(C)$  skalarna matrika. Taka matrika komutira z vsemi elementi  $\pi(g)$ , zato je  $\pi([g, C]) = 1$  za vsak  $g \in G$ . To pomeni, da je  $[G, C] \subseteq \ker \pi$ , kar je enakovredno trditvi.  $\square$

Zberimo prispevke z maksimalno vrednostjo  $r_\pi(C)$  v množico

$$X_C = \{\pi \in \text{Irr}(G) \mid |r_\pi(C)| = 1\}.$$

Velja torej

$$\mu_n - \sum_{\pi \in X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi = \sum_{\pi \in \text{Irr}(G) \setminus X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi.$$

Prispevki  $r_\pi(C)^n$  za  $\pi$  izven  $X_C$  konvergirajo k 0 za velike vrednosti  $n$  in zato dobimo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \mu_n - \sum_{\pi \in X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi \right) = 0.$$

Za konkretne grupe lahko s tabelo karakterjev ali upoštevanjem kakšnih dodatnih lastnosti eksplicitno izračunamo zadnjo vsoto in s tem določimo limitno porazdelitev  $\mu_n$ , če ta sploh obstaja.

**Domača naloga.** Naj bo  $G$  nekomutativna končna enostavna grupa. Pokaži, da vsak konjugiranostni razred  $C$  generira  $G$  in da velja  $X_C = \{1\}$ . Sklepaj, da je  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = U_G$ .

Napako pri aproksimaciji porazdelitev  $\mu_n$  in vsoto prispevkov po  $X_C$  izrazimo s pomočjo norme  $\|f\|_1 = \sum_{g \in G} |f(g)|$  za funkcijo  $f \in \text{fun}(G, \mathbb{C})$ .<sup>11</sup> Naj bo  $0 < \theta < 1$  konstanta. Čas mešanja<sup>12</sup>  $t_{\text{mix}}(\theta)$  je najmanjše število  $n$ , pri katerem je

$$\|\mu_n - \sum_{\pi \in X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi\|_1 \leq \theta.$$

<sup>11</sup>Za primerjavo porazdelitev ne uporabljamo standardne norme  $\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2}$ , ampak normo  $\|f\|_1$ . Razlog za to je naslednji. Opazujemo družino simetričnih grup  $S_n$ . Naj bo  $p$  enakomerna porazdelitev na  $A_n$ . Potem je  $\|p - 1/|S_n|\| = 1/|S_n|$ , kar konvergira k 0 za  $n \rightarrow \infty$ , čeprav sta porazdelitvi očitno različni. Norma  $\|\cdot\|_1$  nima te pomanjkljivosti.

<sup>12</sup>Rečemo tudi, da se slučajni sprehod **dobro premeša** po času  $t_{\text{mix}}(\theta)$ . Ta koncept je seveda odvisen od izbire konstante  $\theta$ , a ponavadi za  $\theta$  vzamemo kar neko majhno konstanto, na primer  $\theta = 10^{-2}$ .

Čas mešanja in s tem hitrost konvergence k limitni porazdelitvi lahko kvantitativno nadziramo, če dobro poznamo vrednosti  $r_\pi(C)$  za  $\pi$  izven  $X_C$ , saj velja

$$\|\mu_n - \sum_{\pi \in X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi\|_1 \leq \sum_{\pi \in \text{Irr}(G) \setminus X_C} |r_\pi(C)|^n \cdot \|v_\pi\|_1.$$

Normo baznih vektorjev  $v_\pi$  lahko omejimo s Cauchy-Schwartzovo neenakostjo kot

$$\|v_\pi\|_1 = \frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \sum_{g \in G} |\chi_\pi(g)| \leq \frac{\chi_\pi(1)}{|G|} \sqrt{|G| \cdot \sum_{g \in G} |\chi_\pi(g)|^2} = \chi_\pi(1).$$

S tem velja

$$\|\mu_n - \sum_{\pi \in X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi\|_1 \leq \left( \max_{\pi \in \text{Irr}(G) \setminus X_C} |r_\pi(C)| \right)^n \cdot \sum_{\pi \in \text{Irr}(G) \setminus X_C} \chi_\pi(1).$$

Če vsoto karakterjev zelo grobo navzgor ocenimo z  $|G|$  in upoštevamo, da je

$$\max_{\pi \in \text{Irr}(G) \setminus X_C} |r_\pi(C)| \leq 1 - \epsilon < 1$$

za nek  $\epsilon > 0$ , potem velja

$$\|\mu_n - \sum_{\pi \in X_C} r_\pi(C)^n \cdot v_\pi\|_1 \leq (1 - \epsilon)^n \cdot |G|.$$

Napaka med porazdelitvama pade pod konstanto  $\theta$ , če je le

$$n \sim (\log |G| - \log \theta) / (-\log(1 - \epsilon)) = O_{\epsilon, \theta}(\log |G|).$$

Takrat bo za majhno konstanto  $\theta$  slučajni sprehod zelo blizu svoje limitne porazdelitve, če ta sploh obstaja. Čas mešanja je torej logaritmichen v velikosti grupe.

## Naključno množenje podobnih matrik

Oglejmo si konkreten primer slučajnega sprehoda. Obravnavajmo grupo  $G_p = \text{GL}_2(\mathbf{F}_p)$  za  $p > 3$ , ki smo jo že dodobra spoznali. V njej za generirajočo množico izberimo konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$  regularnih polenostavnih elementov, ki so podobni matriki

$$A = \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

kjer je  $\delta$  generator ciklične grupe obrnljivih elementov končnega polja  $\mathbf{F}_p^*$ . Generirajoča množica sestoji torej iz vseh matrik, ki so v  $G_p$  podobne  $A$ .

### Generiranje grupe

Preverimo najprej, da množica  $\mathcal{C}$  res generira  $G_p$ . Ker je  $G_p$  končna grupa, velja  $A^{-1} \in \langle \mathcal{C} \rangle$  in zato je vsaka matrika, ki je podobna  $A^{-1}$ , tudi v  $\langle \mathcal{C} \rangle$ . S tem velja

$$[S_+, A] = (S_+^{-1} A^{-1} S_+) A = S_+^{\delta^{-1}+1} \in \langle \mathcal{C} \rangle.$$

Ker je  $p > 3$ , je  $\delta \neq \pm 1$ , zato dobimo  $S_+ \in \langle \mathcal{C} \rangle$ . Sorodno sklepamo za matriko  $S_-$ . S tem dobimo

$$\langle \mathcal{C} \rangle \geq \langle S_+, S_- \rangle = \text{SL}_2(\mathbf{F}_p).$$

Ker je  $\delta$  generator  $\mathbf{F}_p^*$ , grupa  $\langle \mathcal{C} \rangle$  vsebuje matrike z vsemi možnimi determinantami. Od tod sledi, da  $\mathcal{C}$  res generira grupo  $G_p$ .

## Limitna porazdelitev sprehoda

Za razumevanje limitnega obnašanja porazdelitve  $\mu_n$  moramo najprej določiti vrednosti  $r_\pi(\mathcal{C})$ . Tabela karakterjev grupe  $G_p$  v celoti poznamo.

	$\chi_\pi(1)$	$\overline{\chi_\pi(\mathcal{C})}$	$r_\pi(\mathcal{C})$	$ r_\pi(\mathcal{C}) $
$\chi \circ \det$	1	$\overline{\chi(\delta)}$	$\overline{\chi(\delta)}$	1
$\text{St}(\chi)$	$p$	$\overline{\chi(\delta)}$	$\overline{\chi(\delta)}/p$	$1/p$
$\pi(\chi_1, \chi_2)$	$(p+1)$	$\overline{\chi_1(\delta) + \chi_2(\delta)}$	$(\overline{\chi_1(\delta) + \chi_2(\delta)})/(p+1)$	$< 2/(p+1)$
$\zeta_\theta$	$p-1$	0	0	0

Tabela 5.2: Lastne vrednosti operatorja Markova grupe  $G_p$  z generirajočo množico  $\mathcal{C}$

Množica  $X_C$  v tem primeru sestoji iz linearnih upodobitev. Vsota prispevkov porazdelitev po  $X_C$  je zato enaka

$$\sum_{\pi \in X_C} r_\pi(\mathcal{C})^n \cdot v_\pi = \sum_{\chi \in \text{Irr}(\mathbf{F}_p^*)} \overline{\chi(\delta^n)} \cdot \frac{1}{|G_p|} \chi \circ \det.$$

Upoštevamo drugo ortogonalnostno relacijo in dobimo

$$\frac{1}{|G_p|} \cdot \left( g \mapsto \begin{cases} |\mathbf{F}_p^*| & \det g = \delta^n \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases} \right) = \frac{1}{|\text{SL}_2(\mathbf{F}_p)|} \cdot 1_{\det^{-1}(\rho^n)} = U_{\det^{-1}(\rho^n)}.$$

V tem primeru kandidat za limitno porazdelitev v resnici ne konvergira, saj za različne vrednosti  $n$  po modulu  $p-1$  dobimo bistveno različne porazdelitve. Ko je  $n$  deljiv s  $p-1$ , dobimo enakomerno porazdelitev na  $\text{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ .

## Hitrost konvergence

Pogovorimo se še o oceni napake pri aproksimaciji  $\mu_n$  s kandidatom za limitno porazdelitev. Za  $\pi$  izven  $X_C$  ocenimo

$$\max_{\pi \in \text{Irr}(G_p) \setminus X_C} |r_\pi(\mathcal{C})| < \frac{2}{p}, \quad \sum_{\pi \in \text{Irr}(G_p) \setminus X_C} \chi_\pi(1) < p^3.$$

Velja torej

$$\|\mu_n - U_{\det^{-1}(\rho^n)}\|_1 \leq \frac{2^n}{p^{n-3}}.$$

Napaka zelo hitro upade, pod  $\theta$  je že pri  $n = (3 \log p - \log \theta) / (\log p - \log 2) \sim 3$ .<sup>13</sup> Težava je le ta, da  $\mu_n$  v resnici ne konvergira. Da to popravimo, moramo opazovati obnašanje po aritmetičnih zaporedjih z razliko  $p-1$ . Za vse dovolj velike  $p$  tako dobimo zelo dobro aproksimacijo

$$p_{p-1} \approx U_{\text{SL}_2(\mathbf{F}_p)}.$$

Če torej v  $G_p$  naključno zmnožimo  $p-1$  matrik v  $\mathcal{C}$  za dovolj velik  $p$ , dobimo (skoraj) naključno matriko v  $\text{SL}_2(\mathbf{F}_p)$ . Napaka sicer pade ekstremno hitro, a linearni karakterji obremenijo sprehod do te mere, da ne moremo izkoristiti majhne napake že po 3 korakih, niti ne po  $\log |G_p| \sim \log p$  korakih, temveč šele po  $p-1 \sim |G_p|^{1/4}$  korakih.

<sup>13</sup>Tako hitra konvergenca je posledica dejstva, da je konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$  v  $G_p$  zelo velik,  $\log |\mathcal{C}| \sim \log |G_p|$ , in da imamo zelo dobre ocene za  $r_\pi(\mathcal{C})$ .

**Domača naloga.** Obravnavaj slučajni sprehod v  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  glede na nek konjugiranostni razred  $\mathcal{C}$ . V tem primeru bo  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n$  enakomerna porazdelitev na  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$ . S pomočjo tabele karakterjev oceni hitrost konvergence in pokaži, da dosežemo približno naključno matriko v  $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$  mnogo hitreje kot po  $p - 1$  korakih.

**Domača naloga** (Diaconis-Shashahani 1981). Obravnavaj slučajni sprehod v  $S_n$  glede na generirajočo množico  $S$ , ki sestoji iz transpozicij in enote  $()$ . To ni konjugiranostni razred, je pa unija dveh razredov. Premisli, kako lahko argumente posplošiš na to situacijo. Določi limitno porazdelitev in oceni hitrost konvergence.

## Konvergenca v družinah

Za vsako konkretno nekomutativno končno enostavno grupo  $G$  velja, da so vse lastne vrednosti operatorja  $M$  razen 1 po absolutni vrednosti večjemu  $1 - \epsilon$  za nek  $\epsilon = \epsilon(G) > 0$ . V tem primeru rečemo, da je grupa  $G$   **$\epsilon$ -ekspanzivna** glede na generirajočo množico  $S$ . Slučajni sprehod v taki grupi se dobro premeša po  $O_\epsilon(\log|G|)$  korakih. Težave nastopijo, ko skušamo ta argument uporabiti za celo družino grup, saj se lahko zgodi, da z večanjem parametra  $n$  vrednost ekspanzivnosti  $\epsilon = \epsilon_n$  nujno konvergira k 0. Ta fenomen vidimo v primeru družine  $A_n$  in konjugiranostnega razreda 3-ciklov.

**Domača naloga** (Helfgott-Seress-Zuk 2015). Obravnavaj slučajni sprehod v  $A_n$  glede na konjugiranostni razred 3-ciklov  $\mathcal{C}$ . Premisli, da je  $\max_{1 \neq \pi \in \mathrm{Irr}(A_n)} |r_\pi(\mathcal{C})| = 1 - 3/(n - 1)$  in s tem oceni hitrost konvergence.

V taki situaciji se slučajni sprehodi zmešajo dobro po  $O_\epsilon(\log|G|)$  korakih, kar je lahko bistveno večje od  $O(\log|G|)$  in torej asimptotsko gledano v resnici ni logaritmično v velikosti grupe.

Družini grup  $(G_i, S_i)_{i \in \mathbf{N}}$ , kjer je  $G_i = \langle S_i \rangle$ , pravimo **ekspanzivna družina**,<sup>14</sup> kadar obstaja konstanta  $\epsilon > 0$ , za katero je vsaka grupa  $G_i$   $\epsilon$ -ekspanzivna glede na  $S_i$ . V ekspanzivnih družinah se slučajni sprehodi enakomerno zelo hitro dobro premešajo.

Vsaka družina je ekspanzivna, če za generatorsko množico vzamemo kar  $S_i = G_i$  za vsak  $i$ . V tem primeru je namreč operator Markova enak povprečju  $\mathbf{E}(\rho_{\mathrm{fun}})$ , ki je projektor na trivialno podupodobitev regularne, zato so vse njegove netrivialne lastne vrednosti ničelne. Želimo si ekspanzivnih družin, v katerih je množica  $S_i$  čim manjša, po možnosti celo omejene velikosti v vseh članicah družine, na primer  $|S_i| \leq 100$  za vsak  $i$ . V takih ekspanzivnih družinah lahko enakomerno zelo hitro z zaporednim vzorčenjem v množici omejene velikosti dobimo približno enakomerno naključne elemente ogromnih grup.

S pomočjo teorije upodobitev in poznavanja določenih lastnosti karakterjev končnih enostavnih grup  $\mathrm{PSL}_n(\mathbf{F}_p)$  ni pretežko posplošiti zgleda iz zadnjega razdelka. Zanimivo je, da isti rezultat ne deluje za družino alternirajočih grup.

**Izrek.** Naj bo  $n \geq 2$  fiksno naravno število. Za vsak  $p \in \mathbf{P}$  naj bo  $\mathcal{C}_{n,p}$  netrivialen konjugiranostni razred v  $\mathrm{PSL}_n(\mathbf{F}_p)$ . Tedaj je družina grup  $(\mathrm{PSL}_n(\mathbf{F}_p), \mathcal{C}_{n,p})_{p \in \mathbf{P}}$  ekspanzivna.

<sup>14</sup>Angleško *expander family*. Ime izhaja iz alternativne karakterizacije teh družin v teoriji grafov.



Bistveno bolj netrivialen pa je dokaz naslednjega izreka, po katerem lahko vse nekomutativne končne enostavne grupe napravimo za ekspanzivne z generatorskimi množicami omejene velikosti.

**Izrek** (Kassabov 2007, Kassabov-Lubotzky-Nikolov 2006, Breuillard-Green-Tao 2011). *Obstaja konstanta  $C > 0$ , tako da je družina nekomutativnih končnih enostavnih grup ekspanzivna družina glede na generatorske množice velikosti kvečjemu  $C$ .*

Izrek nam zagotavlja obstoj neke ne prevelike generirajoče množice v končnih enostavnih grupah, glede na katere se slučajni sprehodi enakomerno zelo hitro dobro premešajo. Težko pa je povedati kaj bolj konkretnega o teh generirajočih množicah. Za primer  $A_n$  so te množice konstruirane v (Kassabov 2007) s pomočjo neke naključne metode. Dokaz omejitev absolutnih vrednosti lastnih vrednosti operatorja Markova sloni na teoriji upodobitev, a je precej bolj zahteven od tega, ki smo si ga ogledali mi, saj so te generatorske množice daleč od konjugiranostnih razredov.

Dokazi ekspanzivnosti za generatorske množice, ki niso konjugiranostni razredi, ponavadi potekajo na obraten način, kot bi pričakovali. Omejenost absolutnih vrednosti netrivialnih lastnih vrednosti operatorja Markova namreč lahko dokažemo, če premislimo, da se slučajni sprehodi enakomerno zelo hitro premešajo.<sup>15</sup> Primer uporabe te tehnike par excellence je naslednji rezultat, ki med drugim presenetljivo sloni na Gowersovem rezultatu o zgornji meji gostote množic brez produktov.

**Izrek** (Bourgain-Gamburd 2008, Breuillard-Green-Guralnick-Tao 2015). *Naj bo  $n$  fiksno naravno število. Za vsak  $p \in \mathbf{P}$  naj bo enakomerno naključno izberemo dva elementa  $x, y \in \text{PSL}_n(\mathbf{F}_p)$  in tvorimo množico  $S_{n,p,x,y} = \{x, x^{-1}, y, y^{-1}\}$ . Tedaj obstaja  $\epsilon = \epsilon(n)$ , da je*

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \mathbf{P}_{x,y}(\text{PSL}_n(\mathbf{F}_p) \text{ je } \epsilon\text{-ekspanzivna glede na } S_{n,p,x,y}) = 1.$$

Če sprostimo  $n$  in opazujemo matrike velikih razsežnosti, cel kup tehnik v dokazu propade. Za te matrike ni znano in med strokovnjaki niti ni jasnega konsenza, ali so asimptotsko gledano skoraj gotovo ekspanzivne. Preprost primer, ki bi verjetno odprl vrata v velike matrike, je družina alternirajočih grup.

**Odprt problem.** V vsaki alternirajoči grupi  $A_n$  enakomerno naključno izberemo dva elementa  $x, y \in A_n$  in tvorimo množico  $S_{n,x,y} = \{x, x^{-1}, y, y^{-1}\}$ . Ali obstaja absolutna konstanta  $\epsilon > 0$ , da je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}_{x,y}(A_n \text{ je } \epsilon\text{-ekspanzivna glede na } S_{n,x,y}) = 1?$$

<sup>15</sup>Ni težko premisliti, da sta ta dva koncepta ekvivalentna. Čas mešanja v vsaki članici družine  $G_i$  je  $O(\log |G_i|)$ , če in samo če je družina ekspanzivna.



## Poglavje 6

# Razširjeni zgledi – neskončni

V tem zaključnem poglavju si bomo pogledali nekaj zgledov iz teorije upodobitev neskončnih grup. Tukaj ni enotne teorije, s katero bi lahko obravnavali vsako grupo, obstajajo pa družine grup, znotraj katerih lahko razumemo upodobitve na enoten način. Tukaj ne bomo razvijali splošne teorije, temveč si bomo ogledali le konkretne predstavnike nekatere izmed pomembnih družin neskončnih grup.

### Ozaljšane upodobitve

V svetu neskončnih grup ponavadi ne obravnavamo čisto vseh abstraktnih upodobitev, ker na ta način dobimo preprosto *preveč* upodobitev, ki niti niso *smiselne*.

**Zgled.** Opazujmo grupo  $\mathbf{R}$ . Vemo že, da je vsaka njena končnorazsežna nerazcepna kompleksna upodobitev enorazsežna, torej oblike  $\chi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}^*$  za nek homomorfizem  $\chi$ . Premislimo, da je takih homomorfizmov *ogromno*. Grupa  $\mathbf{R}$  je kot abelova grupa izomorfna neskončni direktni vsoti kopij  $\mathbf{Z}$ . Za vsak nabor realnih števil  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , ki so  $\mathbf{Z}$ -linearne neodvisne, lahko izberemo poljuben nabor kompleksnih števil  $z_1, z_2, \dots, z_k$  in dobimo homomorfizem abelovih grup  $\chi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}^*$  z lastnostjo  $\chi(x_i) = z_i$  za vsak  $i$ .

To težavo zaobidemo tako, da ne opazujemo poljubnih upodobitev, temveč jih ozaljšamo z dodatnimi restrikcijami v odvisnosti od grupe, ki jo opazujemo.

### Zveznost

Grupa  $\mathbf{R}$  ni le abstraktna grupa, temveč je opremljena s topologijo. Abstraktnejše je **topološka grupa** množica, ki je hkrati grupa in topološki prostor, obe strukturi pa sta uglaseni s pogojem, da sta operaciji množenja in invertiranja zvezni. Končnorazsežna<sup>1</sup> kompleksna upodobitev  $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$  topološke grupe  $G$  je **zvezna**, kadar je zvezna kot preslikava, pri čemer prostor  $\mathrm{GL}_n(\mathbf{C}) \subseteq \mathbf{C}^{n^2}$  opremimo z inducirano topologijo.

<sup>1</sup>Če bi želeli obravnavati tudi neskončnorazsežne upodobitve na prostoru  $V$ , bi morali to definicijo nekoliko popraviti. Najprej bi morali zahtevati, da vsak element grupe  $G$  deluje kot zvezen linearen operator na  $V$ , kar ni avtomatično v neskončnorazsežnih vektorskih prostorih. Za tem bi morali namesto zveznosti preslikave  $\rho$  zahtevati, da je le *šibko zvezna*, kar pomeni, da je preslikava  $G \times V \rightarrow V$ ,  $(g, v) \mapsto \rho(g) \cdot v$  zvezna.

**Zgled.** Nore upodobitve grupe  $\mathbf{R}$ , ki smo jih konstruirali v zadnjem zgledu, povečini niso zvezne. So pa za vsak parameter  $\zeta \in \mathbf{C}$  zvezne upodobitve oblike

$$\chi_\zeta: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto e^{\zeta x}.$$

## Unitarnost

Pri raziskovanju teorije upodobitev končnih grup nam je marsikje prav prišlo dejstvo, da smo vektorske prostore opremili s skalarnim produktom, ki je bil invarianten glede na upodobitev. Z drugimi besedami, opazovali smo **unitarne** upodobitve, ki slikajo v grupo  $U(V) \leq GL(V)$ . Z metodo povprečenja smo dokazali, da je vsaka upodobitev končne grupe unitarizabilna in torej po ustrezni zamenjavi baze lahko predpostavimo, da je oblike  $\rho: G \rightarrow U_n(\mathbf{C})$ . Za neskončne grupe tega sklepa ne moremo napraviti in tudi zaključek v splošnem ne drži.

**Zgled.** Opazujmo grupo  $\mathbf{R}$  in njene upodobitve  $\chi_\zeta$ . Ta upodobitev je unitarna, če in samo če je njena slika vsebovana v  $U(\mathbf{C}) = S^1 = \{z \in \mathbf{C} \mid |z| = 1\}$ , kar se zgodi le za imaginarne parametre  $\zeta \in \mathbf{R} \cdot i$ .

Za neskončne topološke grupe najraje opazujemo zvezne unitarne upodobitve. O teh ponavadi lahko povemo največ, kot bomo videli v nadaljevanju.

## 6.1 Kompaktne grupe

Večino rezultatov iz končnih grup lahko prenesemo v svet kompaktnih topoloških grup in njihovih zveznih unitarnih upodobitev.

$$U_1(\mathbf{C})$$

Najenostavnejši primer neskončne kompaktne grupe je unitarna grupa  $U_1(\mathbf{C}) = S^1$  kompleksnih števil absolutne vrednosti 1. To topološko grupo lahko alternativno vidimo kot  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$  s kvocientno topologijo iz grupe  $\mathbf{R}$ .

### Nerazcepne upodobitve

Poznamo že nekaj upodobitev grupe  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ , ki jih ponuja grupa  $\mathbf{R}$ , in sicer za vsak parameter  $k \in \mathbf{Z}$  dobimo upodobitev

$$\chi_k: \mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{C}^*, \quad x \mapsto e^{2\pi i k x}.$$

Velja pa tudi obratno, iz vsake upodobitve  $\chi: \mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow U_1(\mathbf{C})$  z restrikcijo vzdolž  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}/\mathbf{Z}$  dobimo upodobitev  $\mathbf{R}$ . Te upodobitve lahko popolnoma opišemo s pomočjo elementarne analize.

**Trditev.** Vsaka zvezna upodobitev  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}^*$  je oblike  $\chi_\zeta$  za nek  $\zeta \in \mathbf{C}$ .

*Dokaz.* Naj bo  $\chi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}^*$  zvezna. Če je  $\chi$  celo odvedljiva, potem za vsak  $x \in \mathbf{R}$  velja

$$\chi'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\chi(x+t) - \chi(x)}{t} = \chi(x) \chi'(0).$$

Funkcija  $\chi$  torej reši diferencialno enačbo  $\chi' = \zeta\chi$ , kjer smo označili  $\zeta = \chi'(0)$ . Od tod sledi, da je  $\chi(x) = A \cdot e^{\zeta x}$  za neko konstanto  $A$ . Vstavimo  $x = 0$  in sklenemo  $A = 1$ , torej je res  $\chi = \chi_\zeta$ .

Prepričajmo se, da je  $\chi$  vselej odvedljiva, s čimer bo trditev dokazana. V ta namen jo najprej integrirajmo do odvedljive funkcije

$$X: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}, \quad x \mapsto \int_0^x \chi(t) dt.$$

Funkcija  $X$  sicer ni nujno homomorfizem, velja pa

$$X(x+y) = X(x) + \int_x^{x+y} \chi(t) dt = X(x) + \int_0^y \chi(t+x) dt = X(x) + \chi(x)X(y)$$

za vsaka  $x, y \in \mathbf{R}$ . Ker je  $X' = \chi$ , seveda obstaja  $y_0 \in \mathbf{R}$ , za katerega je  $X(y_0) \neq 0$ . Od tod lahko izrazimo  $\chi(x)$  kot

$$\chi(x) = \frac{X(x+y_0) - X(x)}{X(y_0)}.$$

Ker je funkcija na desni odvedljiva, velja enako tudi za funkcijo na levi.  $\square$

Iz trditve izpeljemo, da vsaka zvezna upodobitev  $\mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{C}^*$  izhaja iz upodobitve  $\chi_\zeta$  za nek  $\zeta$ . Pri tem mora biti  $\mathbf{Z} \leq \ker \chi_\zeta$ , od koder sledi  $\zeta = 2\pi k$  za nek  $k \in \mathbf{Z}$ . Upodobitve  $\chi_k$  torej izčrpajo vse končnorazsežne kompleksne upodobitve grupe  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ . Te upodobitve so vse tudi unitarne, kar ni naključje, kot bomo pojasnili nekoliko kasneje.

## Fourierova analiza

Klasična Fourierova analiza periodičnih funkcij se tesno prepleta s teorijo upodobitev grupe  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ . Kot vemo, lahko z upodobitvami  $\chi_k$  za  $k \in \mathbf{Z}$  aproksimiramo poljubno zvezno funkcijo na  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ . To naredimo na sledeč način. Prostor funkcij na grupi  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$  opremimo s skalarnim produktom

$$\langle f, h \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{h(t)} dt.$$

Fourierovi koeficienti funkcije  $f$  so

$$\langle f, \chi_k \rangle = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t} dt$$

za  $k \in \mathbf{Z}$ . Z njimi definiramo delne Fourierove vsote

$$f_N = \sum_{k \in \mathbf{Z}: |k| \leq N} \langle f, \chi_k \rangle \chi_k$$

za  $N \in \mathbf{N}$ . V splošnem delne vsote  $f_N$  ne konvergirajo po točkah,<sup>2</sup> je pa temu tako, če dodatno predpostavimo, da obravnavamo le kvadratno integrabilne funkcije  $f$ , se pravi

$$\int_0^1 |f(t)|^2 dt < \infty.$$

Za te funkcije po osnovnem izreku Fourierove analize velja konvergenca

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - f_N\| = 0,$$

<sup>2</sup>Lahko se celo zgodi, da  $f_N$  ne konvergira v nobeni točki.

torej lahko  $f$  razvijemo v Fourierovo vrsto.<sup>3</sup> Hkrati drži varianta Parsevalove formule

$$\|f\|^2 = \sum_{k \in \mathbf{Z}} |\langle f, \chi_k \rangle|^2.$$

Upodobitve  $\chi_k$  za  $k \in \mathbf{Z}$  torej tvorijo ortonormiran sistem funkcij, ki je gost v prostoru vseh dovolj lepih funkcij funkcij na  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ .

Fourierovo analizo lahko torej vidimo kot analog dekompozicije regularne upodobitve v primeru končnih grup za neskončno grupo  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ .

## Upodobitve kompaktnih grup

Izkaže se, da ima vse, kar smo videli za primer  $U_1(\mathbf{C})$ , ustrezno posplošitev za poljubno kompaktno grupo  $G$ . Za natančno obravnavo potrebujemo nekaj *teorije mere*, ki jo bomo prosto uporabili v tem podrazdelku.

V primeru grupe  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$  smo skalarni produkt na prostoru funkcij izrazili s pomočjo integrala. Izkaže se, da ima vsaka kompaktna grupa posebno verjetnostno mero  $\mu$ , ki jo imenujemo **Haarova mera**, glede na katero lahko definiramo integral vsake merljive funkcije  $f$  po tej meri. S pomočjo tega se nam odprejo vrata orodju povprečenja po grupi, ki ga lahko izkoristimo za različne namene.

**Trditev.** *Vsaka zvezna končnorazsežna kompleksna upodobitev kompaktne grupe je unitarizabilna.*

*Dokaz.* Naj bo  $\rho: G \rightarrow GL(V)$  upodobitev. Izberemo poljuben skalarni produkt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  na  $V$  in ga povprečimo do

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_0: V \times V \rightarrow \mathbf{C}, \quad \langle v, w \rangle_0 = \int_G \langle \rho(g) \cdot v, \rho(g) \cdot w \rangle d\mu(g).$$

Ni težko preveriti, da je  $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$  skalarni produkt na  $V$ , glede na katerega je  $\rho$  unitarna upodobitev.  $\square$

Kot v primeru  $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$  lahko vse upodobitve najdemo v ustreznem modelu regularne upodobitve. V splošnem opazujemo funkcije na kompaktni grupi  $G$ , pri čemer se omejimo na prostor kvadratno integrabilnih merljive funkcije in še te opazujemo le do ekvivalence *skoraj povesod* natančno. Prostor ekvivalenčnih razredov takih funkcij je  $L^2(G)$ . Na tem prostoru deluje grupa  $G$  kot regularna upodobitev,

$$\rho(g) \cdot f = x \mapsto f(xg).$$

Ta prostor je seveda neskončnorazsežen. Znameniti Peter-Weylov izrek razkrije dekompozicijo te upodobitve, ki je popolnoma analogna tisti iz sveta končnih grup.

**Izrek** (Peter-Weyl). *Naj bo  $G$  kompaktna grupa s Haarovo mero  $\mu$ . Regularna upodobitev  $G$  na  $L^2(G)$  je izomorfna ortogonalni direktni vsoti*

$$L^2(G) \cong \bigoplus_{\pi} \underbrace{\pi \oplus \pi \oplus \cdots \oplus \pi}_{\deg(\pi)},$$

ko  $\pi$  preteče vse končnorazsežne nerazcepne zvezne unitarne upodobitve grupe  $G$ .

<sup>3</sup>Pri tem moramo biti nekoliko previdni, saj opisana konvergenca ne implicira, da vrsta  $f_N$  v vseh točkah konvergira k  $f$ , temveč le *skoraj povesod*.

Kot v končnih grupah se s pomočjo matričnih koeficientov prepričamo, da je vsaka nerazcepna zvenza unitarna upodobitev vsebovana v regularni, zato je v posebnem vsaka zvezna unitarna upodobitev kompaktne grupe nujno *končnorazsežna*.

## 6.2 Zvezne linearne grupe

$SL_2(\mathbf{C})$

$SL_2(\mathbf{R})$

- obravnavamo kot Liejevo grupo - pokažemo povezavo z  $sl_2$  (if you have a lie group, you can also linearize the source:: lahko eksplicitno opišemo vse nerazcepne, pokažemo kako so bijektivno (!) povezane z gladkimi upodobitvami  $SL_2$ , glej Fulton-Harris) - naštejemo upodobitve  $SL_2$  - dokažemo, da so nerazcepne (potrebujemo izotopične komponente) - diferencial teh upodobitev nam da upodobitve  $sl_2$  - dokažemo, da so to vse upodobitve  $sl_2$  (Fulton-Harris) - zvezne upodobitve  $SL_2$ : te plus konjugiranke (samo rezultat, glej Example 2.7.41 za karakter) - abstraktne upodobitve: divji avtomorfizmi  $\mathbf{C}$  - dokažemo Clebsch-Gordan (najbrž izpustimo ..)

## 6.3 Diskretne linearne grupe

$SL_2(\mathbf{Z})$

-  $SL_2(\mathbf{Z})$ ? (-> <https://math.stackexchange.com/questions/786303/the-presentation-of-sl2-mathbbz>, glej zadnji odgovor, kjer poda prezentacijo, napiši na primer enačbe za raznoterost dvorazsežnih realnih upodobitev; ima ogromno končnih kvocientov – nima CSP (stran3 <https://arxiv.org/pdf/2203.15701.pdf>, lemma a.1 <https://arxiv.org/pdf/1201.6644.pdf>) - Theorem 2.6.7 Baumslag-Solitar grupa je končno prezentirana, ni pa linearna - random groups, model Gromova <https://arxiv.org/abs/1810.01529>

$SL_3(\mathbf{Z})$

- končno prezentirana (<https://mathoverflow.net/questions/122891/small-index-subgroups-of-sl3-z>), napiši enačbe za 2dim upodobitve, jih je BISTVENO manj kot za  $SL_2$  -  $SL_n(\mathbf{Z})$ ? (-> The representation theory of  $SL_n(\mathbf{Z})$ , Andrew Putman, povezano s  $p$ -adičnimi števili – Lubotzky)

$p$ -adične grupe. Omenimo lahko na primer rezultat Jaikin (representation growth) in Aizenbud-Avni (Representation Growth and Rational Singularities of the Moduli Space of Local Systems).

- ? lastnost  $(T)$ , dodaj referenco na TGP in expanderje -  $SL_2(\mathbf{R})$ : sorodna  $SU$  (imata enako kompleksifikacijo Liejevih algeber), ampak hkrati popolnoma drugačna kar se tiče unitarnih upodobitev.