

# Теорема Нётер

## для неэволюционных вариационных симметрий

М. С. Терехов

19 мая 2020 г.

### 1. Небольшое обобщение теоремы Нётер

Рассмотрим обобщённые векторные поля вида  $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \xi_i \partial_{x_i} + \tau \partial_t$ , где функции  $\xi_i$  зависят от  $(t, x, \dot{x})$ . Тогда, как уже было показано в работе [2],

$$\mathbf{pr}^{(1)} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \xi_i \partial_{x_i} + \tau \partial_t + \sum_{i=1}^n (\dot{\xi}_i - \dot{\tau} \dot{x}_i) \partial_{\dot{x}_i}, \quad (1)$$

Назовём его *полем обобщённой симметрии* лагранжевой задачи  $L[x] = \int L(t, x, \dot{x}) dt$ , если найдётся такая дифференциальная функция  $A$ , что

$$\mathbf{pr}^{(1)} \mathbf{v}(L) + L\dot{\tau} = \dot{A}. \quad (2)$$

В оправдание названия полей обобщённых симметрий мы (не строго) заметим, что отдельно изменение времени приводит к увеличению лагранжиана на  $\varepsilon \dot{\tau} L$  (забываем про  $o(\varepsilon)$ ) и отдельно увеличение лагранжиана происходит на  $\varepsilon(\dot{A} - L\dot{\tau})$ , их совместное действие добавляет ещё что-то  $o(\varepsilon)$ , таким образом добавка к функционалу будет зависеть лишь от значений  $x(t)$  на концах отрезка, что не повлияет на стационарные точки.

**Теорема** (А. Е. Noether ver2.0). Пусть  $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \xi_i \partial_{x_i} + \tau \partial_t$  — поле обобщённой симметрии лагранжевой задачи  $L$  и

$$I(t, x, \dot{x}) = \sum_{i=1}^n (\xi_i - \tau \dot{x}_i) \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - A + L\tau.$$

Тогда

$$\dot{I} = - \sum_{i=1}^n (\xi_i - \tau \dot{x}_i) \mathbf{E}_i(L). \quad (3)$$

*Доказательство.* Прежде чем приступить к доказательству, заметим, что эта теорема при  $\tau = 0$  даёт нам теорему из методички [1], тем самым обобщает её. Итак, прямые вычисления показывают нам, что

$$\dot{I} = \dot{\tau} L + \tau \dot{L} + \sum_{i=1}^n (\dot{\xi}_i - \dot{\tau} \dot{x}_i - \tau \ddot{x}_i) \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \dot{A} + \sum_{i=1}^n (\xi_i - \tau \dot{x}_i) \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}.$$

Теперь распишем (3), применив выражение для  $\mathbf{E}_i(L)$ , и применим (1)

$$\sum_{i=1}^n (\xi_i - \tau \dot{x}_i) \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i} \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^n (\xi_i - \tau \dot{x}_i) \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) + \sum_{i=1}^n \tau \dot{x}_i \frac{\partial L}{\partial x_i} + \tau \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_{i=1}^n (\dot{\xi}_i - \dot{\tau} \dot{x}_i) \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} + L\dot{t} - \dot{A},$$

учитывая, что

$$\dot{L} = \sum_{i=1}^n \ddot{x}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} + \sum_{i=1}^n \dot{x}_i \frac{\partial L}{\partial x_i} + \frac{\partial L}{\partial t},$$

приходим к утверждению теоремы.

□

Из теоремы непосредственно вытекает, что  $\dot{I} = 0 \bmod \mathbf{E}(L) = 0$ , и, следовательно,  $I$  является первым интегралом уравнений Эйлера — Лагранжа.

## Список литературы

[1] <http://mech.math.msu.su/~shvetz/coronavirus/Noether.pdf>.

[2] <http://mech.math.msu.su/~shvetz/coronavirus/Prolongation.pdf>.

[3] [http://alexandr4784.narod.ru/olwer/olw\\_gl5\\_3.pdf](http://alexandr4784.narod.ru/olwer/olw_gl5_3.pdf).