수리논술 기출

아주대 2026학년도 자연계열(오전) 논술 [문항 1] 완성 답안과 채점 포인트

곡선 위 네 점에서 그은 접선의 극한(1-1), 절댓값이 들어간 이차함수의 넓이와 **조건을 만족하는 직선의 개수**(1-2), 꺾인 직선으로 둘러싸인 넓이의 최솟값(1-3)을 묶은 50점 문항입니다. 소문항이 다섯 개라 **각 소문항의 경계 조건을 한 줄씩 남기는 것**이 점수를 지킵니다.

출제 범위	수학(방정식과 부등식, 도형의 방정식), 수학II(함수의 극한, 접선의 방정식, 넓이), 미적분(함수의 그래프) — 문항카드 기준
배점 · 시간	50점(1-1 20점 = 10 · 10, 1-2 18점 = 8 · 10, 1-3 12점) · 문항카드 예상 소요 60분
문항 출처	아주대학교 2026학년도 논술우수자전형 자연(오전) 대문항 1번, 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 문항카드

2027학년도 시험 정보. 자연계열 논술은 **2026년 12월 5일(토)**이며 **09:00** 공과대학·자연과학대학·자유전공학부(자연), **14:00** 첨단ICT융합대학·소프트웨어융합대학, **19:00** 의과대학, 약학대학은 **12월 6일(일) 14:00**입니다(세부 일정은 바뀔 수 있어 시험 전 입학처 공지 확인). **수리논술 2문항(문항별 세부문제)·120분**, 답안은 **문항별 A3 1페이지 이내**, 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 미적분**입니다. 선발은 **논술 80% + 학생부교과 20%**, 수능 최저는 **의학과·약학과를 빼면 없습니다**. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문항 요약

자연(오전) [문항 1] (50점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

(가) $x \geq -1$에서 $f(x) = x^2(x+1)$, $x < -1$에서 $f(x) = -x^2(x+1)$이다. 양수 t $(t \neq 1)$에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 x좌표가 $-1-t$, $-1+t$, $-t$, t인 점에서 그은 접선을 차례로 $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4$라 한다. ℓ_1과 ℓ_2의 교점의 x좌표를 $a(t)$, ℓ_3과 ℓ_4의 교점을 Q, ℓ_3과 ℓ_4의 x절편을 각각 R, V라 하고 삼각형 QVR의 넓이를 $S(t)$라 한다.


(나) 음이 아닌 정수 p, q에 대하여 $p-q < x < p+q$에서 $g(x) = q^2 - (x-p)^2$, 그 밖에서 $g(x) = (x-p)^2 - q^2$이다.

(다) $h(x)$는 $x < -2$에서 $-5x-10$, $-2 \leq x < 0$에서 $2x+4$, $0 \leq x < 2$에서 $-2x+4$, $x \geq 2$에서 $5x-10$이다.

1-1. (1) $\lim_{t\to\infty} a(t)$를 조사한다(10점). (2) $\lim_{t\to 0+} \dfrac{S(t)}{t^k}$가 0이 아닌 실수가 되는 k와 그 극한값을 구한다(10점).
1-2. (1) $p=3$, $q=4$일 때 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=20$으로 둘러싸인 넓이를 구한다(8점). (2) $p=10$, $q=5$일 때, 점 P$(6, 9)$를 지나고 곡선과 3개 이상의 점에서 만나며 그 교점 가운데 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점이 P를 포함해 2개 이상인 직선의 개수를 구한다(10점).
1-3. 양수 m $(0 < m < 5)$에 대하여 $y = m|x|$와 $y = h(x)$로 둘러싸인 넓이 $A(m)$이 최소가 되는 m을 구한다(12점).

문항 원문은 아주대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서」의 논술 문항카드(자연(오전) 대문항 1번)에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기



t = 0.3일 때 (가로·세로 눈금 비율은 다름)

1-1 (2) — 원점 가까이의 두 접선과 삼각형 QVR

핵심 관찰. 1-1은 접점이 -1을 중심으로 대칭$(-1 \pm t)$이거나 0을 중심으로 대칭$(\pm t)$이라, **$u = x+1$로 옮겨 쓰거나 두 접선의 식을 빼면** 계산이 짧아집니다. (2)에서 t가 작으면 $-t$와 t가 모두 $(-1, 1)$ 안이므로 $f(x) = x^3 + x^2$ 하나만 씁니다. 넓이 $S(t)$를 t의 식으로 끝까지 정리한 뒤, **가장 낮은 차수**를 보고 k를 정합니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

완성 답안

1-1 (1) 두 접선의 방정식

$x > -1$에서 $f(x) = x^3 + x^2$, $f'(x) = 3x^2 + 2x$이고, $x < -1$에서 $f(x) = -x^3 - x^2$, $f'(x) = -3x^2 - 2x$이다. $t > 0$이므로 $-1 - t < -1 < -1 + t$이다.

$f(-1-t) = t(t+1)^2$, $f'(-1-t) = -(t+1)(3t+1)$이고 $f(-1+t) = t(t-1)^2$, $f'(-1+t) = (t-1)(3t-1)$이므로, $u = x + 1$이라 하면

$$\ell_1 :\ y = -(t+1)\{(3t+1)u + 2t^2\}, \qquad \ell_2 :\ y = (t-1)\{(3t-1)u - 2t^2\}$$

1-1 (1) 교점의 x좌표와 극한

두 식을 같게 놓으면 $\{(t-1)(3t-1) + (t+1)(3t+1)\}u = -2t^2(t+1) + 2t^2(t-1)$, 즉 $(6t^2+2)u = -4t^2$이다. $6t^2 + 2 > 0$이므로 $u = -\dfrac{2t^2}{3t^2+1}$이고

$$a(t) = -1 - \frac{2t^2}{3t^2+1} = -\frac{5t^2+1}{3t^2+1}, \qquad \lim_{t\to\infty} a(t) = \lim_{t\to\infty}\left(-\frac{5+\frac{1}{t^2}}{3+\frac{1}{t^2}}\right) = -\frac{5}{3}$$

답: $\displaystyle\lim_{t\to\infty} a(t) = -\frac{5}{3}$

1-1 (2) 두 접선과 점 Q, R, V

$t \to 0+$이므로 $0 < t < \dfrac{1}{\sqrt{3}}$인 경우만 생각한다. 이때 $-t$, t는 모두 -1보다 크므로 $f(x) = x^3 + x^2$를 쓴다.

$$\ell_3 :\ y = (3t^2 - 2t)(x+t) - t^3 + t^2, \qquad \ell_4 :\ y = (3t^2 + 2t)(x-t) + t^3 + t^2$$

두 식을 빼면 $4tx - 4t^3 = 0$이므로 $x = t^2$이고, 이를 대입하면 $\mathrm{Q}\big(t^2,\ t^2(3t^2-1)\big)$이다. 또 $y = 0$을 대입하면

$$\mathrm{R}\left(-\frac{t(2t-1)}{3t-2},\ 0\right), \qquad \mathrm{V}\left(\frac{t(2t+1)}{3t+2},\ 0\right)$$

1-1 (2) 넓이 $S(t)$와 k

$\overline{\mathrm{RV}} = \dfrac{t(2t+1)}{3t+2} + \dfrac{t(2t-1)}{3t-2} = \dfrac{4t(1-3t^2)}{4-9t^2}$이고, $0 < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$에서 분자·분모가 모두 양수이다. Q의 y좌표는 음수이므로 높이는 $t^2(1-3t^2)$이고

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4t(1-3t^2)}{4-9t^2} \cdot t^2(1-3t^2) = \frac{2t^3(1-3t^2)^2}{4-9t^2}$$

따라서 $\dfrac{S(t)}{t^k} = t^{3-k} \cdot \dfrac{2(1-3t^2)^2}{4-9t^2}$이고, $t \to 0+$일 때 뒤의 분수는 $\frac{1}{2}$로 간다. $k < 3$이면 극한은 0, $k > 3$이면 양의 무한대로 발산하므로, 0이 아닌 실수가 되는 것은 $k = 3$일 때뿐이다.

답: $k = 3$, **극한값** $\dfrac{1}{2}$

1-2 (1) 넓이

$p = 3$, $q = 4$이면 $g(x) = |(x-3)^2 - 16|$이고, $-1 < x < 7$에서 $g(x) = 16 - (x-3)^2 \le 16 < 20$이다. $x \le -1$ 또는 $x \ge 7$에서 $(x-3)^2 - 16 = 20$이면 $x = -3$ 또는 $x = 9$이다. 따라서 구하는 넓이는

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\int_{-3}^{-1}\{36-(x-3)^2\}dx+\int_{-1}^{7}\{4+(x-3)^2\}dx+\int_{7}^{9}\{36-(x-3)^2\}dx=\frac{64}{3}+\frac{224}{3}+\frac{64}{3}$$

답: $\frac{352}{3}$

1-2 (2) 교점이 3개 이상인 직선의 기울기

$p=10, q=5$이면 $g(x)=|(x-10)^2-25|$이고, $g(6)=9$이므로 P는 $5<x<15$ 부분(위로 볼록한 부분) 위에 있다. 직선 $x=6$은 곡선과 한 점에서만 만나므로, P를 지나는 직선을 $y=s(x-6)+9$라 하자.

(i) $5<x<15$ 부분: $25-(x-10)^2=s(x-6)+9$를 정리하면 $(x-6)(x-14+s)=0$이므로 P 말고 $x=14-s$인 교점이 있고, 이 점이 $5<x<15$에 있을 조건은 $-1<s<9$이다.

(ii) $x\le 5$ 또는 $x\ge 15$ 부분: $r(x)=x^2-(20+s)x+66+6s=0$의 해이다. $r(4)=2s+2$, $r(5)=s-9$, $r(15)=-9(s+1)$, $r(24)=162-18s$이다.

• $-1<s<9$이면 $r(4)>0>r(5)$, $r(15)<0<r(24)$이므로 두 해가 $(4,5)$와 $(15,24)$에 하나씩 있다. 교점은 P를 포함해 4개이다($s=8$이면 (i)의 점이 P와 겹쳐 3개).
• $s=-1$이면 $r(x)=(x-4)(x-15)$이므로 교점은 $(4,11)$, P, $(15,0)$의 3개, $s=9$이면 $r(x)=(x-5)(x-24)$이므로 교점은 $(5,0)$, P, $(24,171)$의 3개이다.
• $s<-1$이면 $r(5)<0<r(15)$, $s>9$이면 $r(5)>0>r(15)$이므로 (ii)의 해 중 하나는 $(5,15)$ 안에 있어 교점이 아니고, (i)의 점도 없으므로 교점은 2개이다.

따라서 교점이 3개 이상인 직선은 $-1\le s\le 9$인 경우이다.

1-2 (2) 정수 교점과 개수

x가 정수이면 $g(x)$도 정수이므로, P가 아닌 교점의 x좌표가 정수이면 된다.

• $s=-1, s=9$: 위에서 구한 교점이 모두 정수 좌표이므로 조건을 만족한다. (2개)
• $-1<s<9$: $(4,5)$ 안의 교점은 정수 x좌표가 될 수 없다. (i)의 교점 $x=14-s$가 정수이면서 6이 아니려면 $s=0,1,\cdots,7$이고(8개, $s=8$이면 이 점이 P와 같다), $(15,24)$ 안의 교점이 $x=16,17,\cdots,23$이 되는 직선은 그 점과 P를 잇는 직선으로 하나씩 정해진다(8개).

뒤의 8개 직선의 기울기 $s=\dfrac{x^2-20x+66}{x-6}$은 차례로 $\frac{1}{5}, \frac{15}{11}, \frac{5}{2}, \frac{47}{13}, \frac{33}{7}, \frac{29}{5}, \frac{55}{8}, \frac{135}{17}$로 모두 정수가 아니므로, 앞의 8개와 겹치지 않는다. 따라서 직선의 개수는 $2+8+8$이다.

답: 18

1-3 교점과 넓이 $T(m)$

$h(-x)=h(x)$이므로 두 그래프는 모두 y축에 대하여 대칭이다. $x\ge 0$ 부분의 넓이를 $T(m)$이라 하면 $A(m)=2T(m)$이다. $0<m<5$에서 $y=mx$는 $y=-2x+4$와 $x_P=\dfrac{4}{m+2}(<2)$에서, $y=5x-10$과 $x_Q=\dfrac{10}{5-m}(>2)$에서 만난다.

$0\le x\le x_P$에서는 h가 위, $x_P\le x\le x_Q$에서는 $y=mx$가 위이다. C$(0,4)$, D$(2,0)$, P(x_P,mx_P), Q(x_Q,mx_Q)라 하면 $T(m)=(\triangle\mathrm{OCP})+(\triangle\mathrm{ODQ}-\triangle\mathrm{ODP})$이고

$$\triangle\mathrm{OCP}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot x_P=\frac{8}{m+2},\quad \triangle\mathrm{ODQ}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{10m}{5-m}=\frac{10m}{5-m},\quad \triangle\mathrm{ODP}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{4m}{m+2}=\frac{4m}{m+2}$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$T(m)=\frac{8-4m}{m+2}+\frac{10m}{5-m}=\frac{16}{m+2}+\frac{50}{5-m}-14$$


1-3 최솟값을 갖는 m

$$T'(m)=-\frac{16}{(m+2)^2}+\frac{50}{(5-m)^2}=\frac{50(m+2)^2-16(5-m)^2}{(m+2)^2(5-m)^2}=\frac{2(17m^2+180m-100)}{(m+2)^2(5-m)^2}$$

$0<m<5$에서 $m+2>0, 5-m>0$이므로 $T'(m)=0$은 $5(m+2)=2\sqrt{2}(5-m)$, 즉 $m_0=\dfrac{10\sqrt{2}-10}{5+2\sqrt{2}}=\dfrac{70\sqrt{2}-90}{17}$일 때이고 $0<m_0<5$이다. 분자 $17m^2+180m-100$은 $0<m<m_0$에서 음수, $m_0<m<5$에서 양수이므로 $T(m)$은 $m=m_0$에서 감소에서 증가로 바뀌어 최소가 되고, $A(m)=2T(m)$도 이때 최소이다.

답: $m=\dfrac{70\sqrt{2}-90}{17}$


그림으로 확인하기 — 1-2 (2)와 1-3



y = g(x) (p = 10, q = 5) — 세로는 0~62 부분만 그림

1-2 (2) — 기울기가 −1과 9인 직선은 교점이 세 개이고 모두 정수 좌표입니다

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요



y축 대칭 → A(m) = 2T(m)

x ≥ 0 쪽 넓이 T(m)
= 남색(0 ≤ x ≤ P의 x좌표)
+ 클레이(P ~ Q의 x좌표)

P의 x좌표 4/(m+2)
Q의 x좌표 10/(5−m)

그림은 넓이가 최소인 m ≈ 0.53

1-3 — 가운데(남색)는 h가 위, 양옆(클레이)은 $y = m|x|$가 위

다른 풀이

1-2 (1) 직사각형에서 빼기

구하는 넓이는 $-3 \le x \le 9, 0 \le y \le 20$인 직사각형(넓이 240)에서 곡선 $y = g(x)$ 아래의 넓이를 뺀 것입니다. $w = x - 3$으로 놓으면 $\int_{-3}^{9} g\,dx = 2\int_{4}^{6}(w^2 - 16)dw + \int_{-4}^{4}(16 - w^2)dw = \frac{112}{3} + \frac{256}{3} = \frac{368}{3}$이므로 넓이는 $240 - \frac{368}{3} = \frac{352}{3}$입니다. 대칭을 쓰면 적분이 두 종류로 줄어 계산 실수가 줄어듭니다.

1-3 넓이를 적분으로 바로 쓰기

삼각형으로 나누기 어렵다면 $T(m) = \int_{0}^{x_P}\{(4 - 2x) - mx\}dx + \int_{x_P}^{2}\{mx - (4 - 2x)\}dx + \int_{2}^{x_Q}\{mx - (5x - 10)\}dx$로 써도 같은 식이 나옵니다. 대학 예시답안은 $T(m) = 4 + \frac{10m}{5-m} - \frac{8m}{m+2}$ 꼴로 정리했는데, 위 답안의 $\frac{16}{m+2} + \frac{50}{5-m} - 14$와 같은 식입니다. 분자에 m이 없는 꼴로 바꾸면 미분이 한 줄로 끝납니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

아주대학교가 공개한 채점 기준은 다음과 같습니다. 1-1 (1) ℓ_1, ℓ_2의 방정식 **4**, 교점의 x좌표 **4**, 극한값 **2** · 1-1 (2) 점 R과 V의 좌표 **4**(채점 기준표에는 V가 T로 적혀 있음), $S(t)$ **2**, k와 극한값 **4** · 1-2 (1) $y = 20$과 곡선의 교점 **2**, 구간별 적분식 **3**, 각 적분 계산 **3** · 1-2 (2) 교점이 3개 이상인 상황(기울기) 관찰 **3**, $4 \le x < 6$ 또는 $6 < x \le 24$에서 조건을 만족할 수 있음 **3**, 중복된 직선을 빼고 개수 **4** · 1-3 두 그래프의 교점 **2**, $T(m)$ **3**, $T'(m)$ **3**, 최소가 되는 m **4**.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
1-1 (1)	접선 4 · 교점 4 · 극한 2	$x<-1$에서 $f'(x)=-3x^2-2x$로 **부호가 바뀐 식**을 쓰지 않기. ℓ_1의 접점 $-1-t$는 -1보다 작습니다.
1-1 (2)	R·V 좌표 4 · $S(t)$ 2 · k와 극한 4	넓이에 절댓값 없이 $\frac{1}{2}\times$밑변$\times(y$좌표$)$로 쓰기. Q의 y좌표가 음수이고, t가 작을 때 R은 x축의 음의 부분에 있습니다. "t가 충분히 작을 때"라는 범위를 한 줄로 밝히고, $k\neq 3$이면 왜 안 되는지도 적습니다.
1-2 (1)	교점 2 · 적분식 3 · 계산 3	$-1<x<7$에서 곡선의 최댓값 16이 20보다 작다는 확인을 빼기. 이 한 줄이 있어야 도형이 하나로 이어진다는 근거가 됩니다.
1-2 (2)	기울기 관찰 3 · 범위 3 · 중복 제외 4	기울기 -1과 9(교점이 딱 3개)를 빠뜨리거나, 정수 교점이 셋인 이 두 직선을 **두 번 세기**. 또 $s=8$이면 안쪽 교점이 P와 겹쳐 개수에서 빠집니다.
1-3	교점 2 · T 3 · T' 3 · m 4	$T'(m)=0$의 해 두 개 중 $0<m<5$인 것만 고르는 근거, 그리고 그 점에서 **감소→증가**로 바뀐다는 확인을 빼기. 극값이 하나라도 최소라는 근거를 적어야 합니다.

1 **대칭인 접점은 기준점으로 옮겨서**
$-1\pm t$는 $u=x+1$, $\pm t$는 두 식을 빼면 교점이 바로 나옵니다.

2 **k는 가장 낮은 차수로**
$S(t)=t^3\times$(0이 아닌 값으로 가는 식)으로 정리하면 k와 극한값이 한 번에 보입니다.

3 **교점 개수는 경계값 대입으로**
이차식에 $x=4,5,15,24$를 넣은 부호로 해가 어느 구간에 있는지 판단합니다.

4 **셀 때는 겹치는 것부터**
정수 교점이 셋인 직선은 어느 점을 기준으로 세도 다시 나옵니다. 세기 전에 한 번만 셀 규칙을 정합니다.

5 **최솟값은 범위와 증감까지**
도함수가 0인 점을 구한 뒤 범위 안인지, 앞뒤에서 부호가 어떻게 바뀌는지 한 줄씩 씁니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
1-1 (1)	ℓ_1, ℓ_2를 그대로 전개해 $a(t) = -\frac{5t^2+1}{3t^2+1}$, 극한 $-\frac{5}{3}$	같은 결과, $u = x + 1$로 옮겨 식을 짧게 정리
1-1 (2)	R, V, Q를 구해 $S(t) = \lvert\cdots\rvert = \frac{2t^3(3t^2-1)^2}{4-9t^2}$, $k = 3$, 극한 $\frac{1}{2}$	같은 결과, 절댓값 대신 $0 < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$에서 부호를 밝히고 $k \neq 3$인 경우도 적음
1-2 (1)	세 구간 적분, $\frac{352}{3}$	같은 결과(직사각형에서 빼는 방법은 다른 풀이로)
1-2 (2)	두 직선 $y = 9x - 45$, $y = -x + 15$를 경계로 $4 \le x < 6$, $6 < x \le 24$의 정수 x 20개에서 중복 2개를 빼 18	같은 결과, 교점 위치를 이차식의 부호로 밝히고 안쪽 8개 + 바깥 8개 + 양 끝 2개로 세어 겹침이 없음을 확인
1-3	$T(m) = 4 + \frac{10m}{5-m} - \frac{8m}{m+2}$, $17m^2 + 180m - 100 = 0$에서 $m = \frac{-90+70\sqrt{2}}{17}$	같은 결과, $T(m) = \frac{16}{m+2} + \frac{50}{5-m} - 14$로 바꿔 미분하고 증감 확인

최종 답 1-1 (1) $-\frac{5}{3}$, (2) $k = 3$·$\frac{1}{2}$, 1-2 (1) $\frac{352}{3}$, (2) 18, 1-3 $m = \frac{70\sqrt{2}-90}{17}$은 대학 예시답안과 같습니다(접선·교점·넓이 식을 기호 계산으로, $S(t)$를 $t = \frac{1}{4}$에서 좌표로 직접, 1-2 (2)는 정수 점을 지나는 직선을 하나씩 만들어 교점을 모두 구해 세는 방법으로, 1-3은 m 값을 촘촘히 넣어 넓이를 직접 비교하는 방법으로 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 아주대학교 입학처가 공개한 선행학습 영향평가 자체평가보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 아주대학교 2026학년도 논술우수자전형 자연(오전) 대문항 1번, 2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가보고서 문항카드 · 시험 정보: 아주대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 아주대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.