

โรงพยาบาลเชียงใหม่ประจักษ์ Chiangrai Prachanukroh Hospital

การดูแลตัวเองหลังขยายท่อปัสสาวะ (Urethral Dilation)

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังทำการขยายท่อปัสสาวะ



การดื่มน้ำและการรับประทานอาหาร

- ดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้ว ช่วยเจือจางปัสสาวะ ลดแสบขัด และขับตะกอน
- งดแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือคาเฟอีน ในช่วง 1-2 วันแรก
- เลี่ยงอาหารรสจัดหรือของหมักดอง เพราะกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะบ่อยหรือแสบมากขึ้น



อาการปกติที่อาจพบได้

- ปัสสาวะแสบขัด พบได้บ่อยในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรก
- ปัสสาวะมีเลือดปนสีชมพูจาง ๆ ได้ 1-2 ครั้งแรกหลังทำ จากผนังท่อปัสสาวะบอบช้ำ
- รู้สึกอยากปัสสาวะบ่อย หรือปวดหน่วงเล็กน้อย จะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง



การพักผ่อน

- พักผ่อนให้เพียงพอใน 1-2 วันแรก
- เลี่ยงการยกของหนัก ออกกำลังกายหักโหม ปั่นจักรยาน หรือกิจกรรมที่กระแทกบริเวณฝีเย็บ เพราะอาจทำให้การแสบขัดหายเป็นปกติ



การใช้ยาและการดูแลตัวเอง

- ทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- หากปวดแผลหรือแสบขัดมาก ทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ตามคำแนะนำแพทย์
- หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนาน เมื่อปวดควรปัสสาวะทันที



อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- ปัสสาวะไม่ออกเลย หรือปวดปัสสาวะมากแต่ขับออกไม่ได้ (ท่อปัสสาวะอาจบวมอุดตัน)
- เลือดออกมาก ปัสสาวะเป็นสีแดงสดตลอดเวลา หรือมีลิ่มเลือดก้อนใหญ่อุดตันทางเดินปัสสาวะ
- มีไข้สูง หนาวสั่น หรือปวดหลังส่วนล่าง/เอว
- ปวดหรือแสบขัดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ทุเลาลงแม้รับประทานยาแล้ว