



## โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Chiangrai Prachanukroh Hospital

### การดูแลตัวเองหลังทำหมันชาย (Vasectomy)

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำหมันชาย



#### การดูแลแผลและร่างกายระยะแรก

- พักผ่อนเต็มที่ นอนราบ ลดการเดินให้น้อยที่สุดใน 24 ชั่วโมงแรก
- งดอาบน้ำ 3 วันแรก ป้องกันการติดเชื้อ ใช้การเช็ดตัวแทน
- ประคบเย็นบริเวณถุงอัณฑะ 1-2 วันแรก และทานยาพาราเซตามอลแก้ปวด
- สวมกางเกงในกระชับหรือรัดรูป เพื่อพยุงถุงอัณฑะลดการระคายเคือง



#### การจำกัดกิจกรรม (1 สัปดาห์แรก)

- งดออกกำลังกายหนัก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือยกของหนัก
- งดกิจกรรมทางเพศและการช่วยตัวเอง อย่างน้อย 7 วัน



#### ข้อสำคัญที่สุด: หลังทำหมันยังไม่เป็นหมันทันที!

- ต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยางอนามัยทุกครั้งหลังผ่านสัปดาห์แรกไปแล้ว
- คุมกำเนิดต่อเนื่องอีกประมาณ 2-3 เดือน (หรือหลังประมาณ 20 ครั้ง) จนกว่าแพทย์จะยืนยันผลตรวจน้ำอสุจิว่าปลอดเชื้ออสุจิ 100%



#### อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- มีเลือดออกจนชุ่มผ้าก๊อช
- ถุงอัณฑะบวมโตขึ้นเรื่อยๆ หรือมีรอยเขียวคล้ำรุนแรง
- มีไข้สูง หรือมีหนองไหลออกจากแผล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 053-910600