

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Chiangrai Prachanukroh Hospital

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลาย คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Circumcision)



การดูแลแผลและความสะอาด

- ห้ามแผลโดนน้ำ 3-5 วันแรก หากเปียกให้ซับให้แห้งทันที
- หลังแพทย์อนุญาต ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ วันละ 2 ครั้ง แล้วซับให้แห้ง
- ทายาฆ่าเชื้อตามที่แพทย์สั่ง ห้ามโรยแป้งหรือใส่ยาเอง
- หมอจะลายเองภายใน 2-3 สัปดาห์ ไม่ต้องไปตัดไหม



เสื้อผ้าและการแต่งตัว

- ใส่กางเกงในหลวม หรือกางเกงบ็อกเซอร์ ในช่วงสัปดาห์แรก
- จัดอวัยวะเพศให้ชี้ขึ้นทางสะดือ ช่วยลดอาการบวมได้ดีขึ้น



อาหารและการใช้ยา

- ทานยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
- เลี่ยงยาแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เว้นแต่แพทย์สั่ง
- เลี่ยงของหมักดอง อาหารรสจัด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



กิจกรรมที่ต้องงดเว้น

- งดกิจกรรมทางเพศอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้แผลสมานตัวเต็มที่
- งดออกกำลังกายหนัก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ยกน้ำหนัก ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก
- หากแข็งตัวตอนเช้าแล้วเจ็บ ให้ลูกเดิน หรือประคบเย็นรอบๆ (ระวังอย่าให้แผลเปียก)



อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- เลือดไหลซึมไม่หยุด แม้มัดผ้าก๊อชแน่นนาน 3-5 นาทีแล้ว
- มีอาการบวมแดงมากผิดปกติ หรือมีหนองไหลออกจากแผล
- มีไข้สูง
- ปัสสาวะไม่ออก หรือปัสสาวะลำบากมาก