

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Chiangrai Prachanukroh Hospital

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัด/รักษาหูดอวัยวะเพศ

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังจี้ไฟฟ้า เลเซอร์ หรือตัดหูดอวัยวะเพศ (Condyloma)



การทำความสะอาดและการดูแลแผล

- อบน้ำทำความสะอาดได้ตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่อ่อน ๆ ซับแผลให้แห้งเบา ๆ ห้ามถูแรง
- หากแพทย์แนะนำ แช่น้ำอุ่น (Sitz Bath) ครั้งละ 10-15 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ช่วยลดบวมและแสบ
- ห้ามแกะ เกา หรือดึงสะเก็ดแผลออกเอง ปล่อยให้หลุดเองตามธรรมชาติ



การสวมใส่เสื้อผ้า

- สวมกางเกงชั้นในและกางเกงหลวมสบาย ระบายอากาศดี ไม่รัดแน่นจนเกินไป
- ช่วยลดการเสียดสีกับแผล



การใช้ยาและการทาแผล

- ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดทาหรือยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
- ห้ามทายาพื้นบ้าน ยาสมุนไพร หรือครีมอื่นที่แพทย์ไม่ได้สั่งลงบนแผล



กิจกรรมที่ต้องงดเว้น

- งดมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบ (รวมถึงใส่ถุงยางอนามัย) จนกว่าแผลจะหายสนิท ประมาณ 2-4 สัปดาห์ หรือจนแพทย์ประเมินว่าหายดี
- งดออกกำลังกายหนัก ปั่นจักรยาน หรือกิจกรรมที่เสียดสีจุดซ่อนเร้น ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก



อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- แผลบวม แดง ลามมากขึ้น ร้อน มีหนองไหล หรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรง
- มีไข้สูง หรือหนาวสั่นร่วมด้วย
- มีเลือดออกผิดปกติจากแผล และไม่ยอมหยุดไหล
- ปวดแผลรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ทุเลาลงเลยแม้รับประทานยาแก้ปวดแล้ว