

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Chiangrai Prachanukroh Hospital

การดูแลตัวเองหลังส่องกล้องตรวจทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังทำ Cystoscopy



การดื่มน้ำและการรับประทานอาหาร

- ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน ช่วยขับปัสสาวะและลดอาการแสบขัด
- งดคาเฟอีน แอลกอฮอล์ และอาหารรสจัด ในช่วง 1-2 วันแรก
- ทานอาหารมีกากใยตามปกติ ป้องกันท้องผูก ไม่ต้องแบ่งเวลาขับถ่าย



อาการปกติที่อาจพบได้

- ปัสสาวะแสบขัด พบได้บ่อยในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรก
- ปัสสาวะมีเลือดปนสีชมพูจาง ๆ อาจอยู่ได้นาน 1-2 สัปดาห์ หากมีการตัดหรือจี้เนื้อเยื่อ
- ปวดหน่วงท้องน้อย หรือปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ จะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง



การทำกิจกรรมและการพักผ่อน

- พักผ่อนให้เพียงพอในวันแรก
- งดออกกำลังกาย ออกกำลังกายหักโหม หรือกิจกรรมที่กระแทกแรง ในช่วง 2-3 วันแรก (หรือจนกว่าสีปัสสาวะจะกลับมาปกติ)
- สามารถอาบน้ำชำระร่างกายได้ตามปกติ



การใช้ยา

- ทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- หากปวดแผลหรือแสบขัด ทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ตามคำแนะนำแพทย์



อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- ปัสสาวะไม่ออกเลย หรือปวดปัสสาวะมากแต่ออกไม่ได้ ภายใน 6-8 ชั่วโมงหลังทำหัตถการ
- เลือดออกมาก ปัสสาวะเป็นสีแดงสดตลอดเวลา หรือมีลิ่มเลือดก้อนใหญ่จนอุดตัน
- มีไข้สูง หนาวสั่น หรือปวดหลังส่วนล่าง/เอวร่วมด้วย
- ปวดรุนแรงมาก และไม่ทุเลาลงแม้รับประทานยาแก้ปวดแล้ว