

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Chiangrai Prachanukroh Hospital

การดูแลตัวเองหลังเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (TRUS Biopsy)

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังเจาะตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทวารหนัก



การดื่มน้ำและอาหาร

- ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ปัสสาวะใสและช่วยชะล้างทางเดินปัสสาวะ
- ทานอาหารกากใยสูง ป้องกันท้องผูก ลดการเบ่งที่อาจทำให้แผลระคายเคืองและเลือดออกเพิ่ม



อาการปกติที่อาจพบได้ (3-7 วันแรก)

- ปัสสาวะเป็นเลือด สีชมพูหรือแดงจาง ๆ พบได้บ่อย
- อูจาะระอาจมีเลือดปนเล็กน้อย จากเข็มที่ผ่านผนังลำไส้
- น้ำอสุจิอาจมีสีน้ำตาลหรือแดงปน ต่อเนื่องได้นานถึง 4-6 สัปดาห์
- อาจเสบขัดเล็กน้อย หรือรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อย



การพักผ่อนและกิจกรรม

- พักผ่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังทำ
- งดยกของหนัก ออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยาน เป็นเวลา 3-7 วัน
- งดมีเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้แผลภายในหายดี



การรับประทานยา

- หากแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะ ต้องทานให้ครบตามกำหนด ห้ามหยุดยาเองเด็ดขาด
- ป้องกันการติดเชื้ในกระแสเลือดหรือทางเดินปัสสาวะ



อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- มีไข้สูง หนาวสั่น (สัญญาณของการติดเชื้อในกระแสเลือด ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน)
- ปัสสาวะไม่ออก หรือปวดปัสสาวะมากแต่ออกกะปริดกะปรอย
- เลือดออกรุนแรง ปัสสาวะแดงสดตลอดเวลา หรือมีลิ่มเลือดจำนวนมากจนอุดตัน
- ปวดท้องน้อยหรือทวารหนักรุนแรง ไม่ทุเลาลงแม้รับประทานยาแก้ปวดแล้ว

หมายเหตุ: หากรับประทานยาลายลิ่มเลือด (Aspirin, Warfarin, Clopidogrel) ควรแจ้งแพทย์ทราบก่อนทำหัตถการทุกครั้ง
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 053-910600