

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Chiangrai Prachanukroh Hospital

การดูแลตัวเองหลังใส่สายระบายไตผ่านผิวหนัง (PCN)

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีสาย PCN คอยอยู่



การทำความสะอาดแผลและดูแลสาย PCN

- ทำความสะอาดแผลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือทันทีที่ผ้าก๊อชเปียก เปื้อน หรือมีเลือดซึม
- ล้างมือให้สะอาด เช็ดเบตาดีนแล้วตามด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนปิดผ้าก๊อชปราศจากเชื้อ
- จัดตำแหน่งสายไม่ให้หักพับ และติดพลาสเตอร์ยึดสายกันดีจิ้ง
- แขนงถุงปัสสาวะให้ต่ำกว่าระดับเอวเสมอ ป้องกันปัสสาวะไหลย้อนกลับ



การดื่มน้ำและการอาบน้ำ

- ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน ช่วยชะล้างตะกอนและป้องกันสายอุดตัน
- อาบน้ำได้ตามปกติ แต่ห้ามแช่อ่างน้ำหรือลงสระว่ายน้ำ ระวังอย่าให้แผลเปียก
- หากผ้าก๊อชเปียกระหว่างอาบน้ำ ให้รีบทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าก๊อชใหม่ทันที



การเคลื่อนไหวและกิจกรรม

- ทำกิจวัตรประจำวันเบา ๆ ได้ตามปกติ
- งดออกกำลังกายหนัก ยกของหนัก หรือบิดตัวแรง ๆ ขณะมีสายคอยอยู่ เพื่อป้องกันสายเลื่อนหลุด



การสังเกตลักษณะปัสสาวะ

- ปัสสาวะอาจมีสีชมพูจาง ๆ ในช่วงแรก แล้วจะค่อย ๆ ใสขึ้น
- สังเกตว่าปัสสาวะไหลลงถุงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการรั่วซึมรอบแผล



อาการผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที

- สายหลุด เลื่อน หรือขยับออกจากตำแหน่งเดิม (ห้ามพยายามดันสายกลับเข้าไปเองเด็ดขาด)
- ปัสสาวะไม่ไหลเลย หรือไหลลดลงมาก ทั้งที่ดื่มน้ำปกติ (อาจเกิดจากสายอุดตันหรือพับงอ)
- ปัสสาวะแดงสดตลอดเวลา มีลิ่มเลือดก้อนใหญ่ ขุ่นข้น มีหนอง หรือกลิ่นเหม็นรุนแรง
- มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดหลัง/เอวรุนแรง หรือแผลบวมแดงร้อนมีหนองไหลซึม