

PISNI IZPIT – 18.4.2016

Podana so vprašanja z odgovori, ki se jih spomnimo. Odgovori so v realnosti večinoma daljši in bolj podrobni.

- 1) Uporaba digitalisa po uspešni reanimaciji
 - a) Uporablja se zelo redko
 - b) Uporabljam ga kot pozitivni inotrop
 - c) Je dober za uporabo pri AF s hitrim odgovorom prekatov
 - d) lahko povzroči VT
- 2) Torsade
 - a) Se pogosto spremenijo v nestabilno ventrikularno tahikardijo
 - b) Magnezijev sulfat je uspešna terapija
 - c) Lahko damo amiodaron
 - d) Za refraktarne je terapija lahko transvensko spodbujanje
- 3) Uspešnost Sellickovega manevra
 - a) Je odvisna od nazogastrične sonde
 - b) Je odvisna od intaktnosti/poškodbe? ščitastega hrustanca
 - c) Je odvisna od pritiska na telo vretenca
 - d) ?
- 4) Težka intubacija
 - a) Poškodba obraza
 - b) Opekline obraza
 - c) Poškodba torakalne hrbtenice
 - d) Nosečnica z ...
- 5) Prva energija na kg pri elektrokonverziji otroka
 - a) 1 J
 - b) 2 J
 - c) 3J
 - d) 4J
- 6) Kaj vsebuje termin oskrba dihalne poti pri otroku?
 - a) Intubacija
 - b) Nazofaringealni airway
 - c) Orofaringealni airway
 - d) Trojni maneuver
- 7) Ostre poškodbe trebuha v našem okolju so redke. Večjo pogostost imajo v urbanih okoljih.
 - a) P/P
 - b) N/N

- c) P/N
 - d) N/P.
- 8) Kaj ne povzroča sekundarne poškodbe možganov?
- a) Hiperkalemija
 - b) Hipotermija
 - c) Acidoza
 - d) Hipoksija
- 9) Pri katerih stanjih/poškodbah prsnega koša povoj nima smisla?
- a) Nestabilni prsni koš
 - b) Odprti pnevmotoraks
 - c) Raztrganina pljuč
 - d) Ventilni pnevmotoraks
- 10) Uporaba AED v bolnišnici
- a) Ne izboljša preživetja (?)
 - b) Se lahko uporablja tudi na otrocih
 - c) Ni potrebno znanje angleščine
 - d) Podaljša čas do defibrilacije
- 11) Kolikšen je odstotek preživetja pri defibrilaciji v 6. minuti (40%)
- 12) Kaj je najboljši kazalnik zadostne hidracije pri opečenju
- a) Diureza
 - b) Znižanje laktata
 - c) Znižanje srčne frekvence
 - d) Normalen centralni venski tlak
- 13) Oživljanje novorojenčka:
- a) Razmerje vpihov proti stiskom je 3 proti 1
 - b) Razmerje vpihov proti stiskom je 15 proti 2
 - c) Adrenalin lahko damo intratrahealno
 - d) Še neki
- 14) Rtg slika - pneumotoraks in podkošni emfizem, oboje desno
- a) Na sliki je hematopnevmotoraks
 - b) Na sliki je pnevmotoraks
 - c) Tipne so podkožne krepitacije levo
 - d) Pred intubacijo moramo narediti trakalno drenažo
- 15) Katera je najbolj primerna tekočina za opečenca
- a) 5% glukoza
 - b) HES

- c) 0,9% NaCl
- d) 40% glukoza

16) Pri poškodbi zaradi električnega toka

- a) Do rabdomiolize pride zaradi razpada hemoglobina
- b) Urin je temen zaradi hipovolemije
- c) Diureza 1 ml/kg/h je pokazatelj zadostne hidriranosti
- d) ?

17) 18-letna punca toži za bolečinami v epigastriju, je hipotenzivna in tahikardna. V trebuhu smo odkrili nekaj proste tekočine. S katero preiskavo potrdiš diagnozo?

- a) Beta-HCG
- b) Hemogram
- c) CT trebuha
- d) D-dimer

18) Bolnik s karcinomom pljuč pride k tebi in je hipotenziven, polne vratne vene, na EKG alternans, ima paradoksn pulz. Kakšna je diagnoza in primerna terapija?

- a) Tamponada srca - tekočine in perikardiocenteza
- b) Tamponada srca - čim prej torakotomija
- c) Pnevmotoraks
- d) ?

19) Katera zdravila dajemo pri kardiogenem šoku z infarktom desnega ventrikla

- a) diuretike
- b) tekočine
- c) beta blokerje
- d) če je prizadet tudi levi ventrikel, lahko damo še dobutamin

20) Nosečnica s srčnim zastojem

- a) če je opeklina več kot 50 %, je fetalna smrtnost 50%
- b) nagnemo jo za do 15°
- c) prvi simptom abrupcije placente so lahko krči
- d) poškodba lahko sproži prezgodnji porod

21) 23. Pacient s PSVT, dali smo mu 6 mg adenzina, ni izboljšanja. Kaj je naš naslednji ukrep?

- a) 6 mg adenzina
- b) 12 mg adenzina
- c) elektrokonzverzija
- d) amiodaron?

22) Prvi ukrep pri poškodbi prsnega koša:

- a) Kisik

- b) Torakalna drenaža
- c) PAAK
- d) ?

23) Kako dolgo traja prvi vpih pri novorojenčku?

- a) 1 s
- b) 1,5 s
- c) 2 s
- d) 3 s

24) Tekočine pri poškodbi glave.

- a) 5% glukoza
- b) RL
- c) 10% NaCl
- d) 0,9% NaCl

25) Kako naj se transportira bolnika, pri katerem sumiš na poškodbo trebušnih organov?

- a) Naj miruje
- b) Občasno naj napne trebušne mišice
- c) Polesedeč položaj s pokrčenimi nogami
- d) ?

26) Poškodovanec s hudo poškodbo glave na terenu:

- a) Sistolni tlak vzdržuješ na 120 mmHg
- b) etCO₂ vzdržuješ pod 4.66 kPa
- c) ...
- d) ...

27) Trditve o TPO:

- a) TPO ima prednost pred AED
- b) s takojšnjim TPO izboljšamo preživetje 2-4X
- c) s takojšnjim TPO izboljšamo preživetje za 6X
- d) ...

28) Spremembe v nosečnosti: (neka takšna kombinacija odgovorov)

- a) povečan minutni volumen srca
- b) povečan hematokrit
- c) povečan periferni upor
- d) povečan volumen krvi