

## PRELÚDIO

O texto que segue trata-se de um compêndio de resultados que acho relevantes, portanto, o texto reflete, e muito, minha subjetividade. Não obstante, este texto estará em construção contínua, de maneira que não haverá versão final enquanto as circunstâncias da vida sobrepujarem o meu ímpeto de colecionar tais e tais resultados. Alguns, resultados são de minha autoria, mas certamente estão enviesados por uma ou outra obra, de maneira que não descobri a roda, mas me sustentei sobre o trabalho de vários indivíduos perspicazes que pela primeira vez se depararam com o problema, e talvez, eles próprios tenham o resolvido. Saliento também que, muitos—a maioria—dos resultados não são meus, de forma que talvez eu já os tenha visto em determinado momento de minha vida, e simplesmente os reproduzi aqui. Além disso, é impossível colecionar todos os resultados interessantes, portanto, me ative aos que ao menos tive alguma ideia de demonstração, talvez inspirada por outros.

# 1

## CIÊNCIAS FORMAIS

### 1.1 LÓGICA

Para fins de nota parafraseio sem prova e duma maneira não formal o seguinte

**Teorema 1 (TEOREMA DA DEDUÇÃO OU LEI DA DEDUÇÃO DE TARSKI)** *Todo teorema de uma teoria dedutiva é satisfeito por qualquer modelo do sistema de axiomas desta teoria; além disso, a qualquer teorema corresponde uma sentença geral a qual pode ser formulada e provada dentro da estrutura da lógica e que estabelece o fato que o teorema em questão é satisfeito para um modelo qualquer do sistema de axiomas.*

■

**Definição 1 (SISTEMA DE AXIOMAS MUTUALMENTE INDEPENDENTE)** *Um sistema de axiomas é dito MUTUALMENTE INDEPENDENTE se nenhum axioma do sistema pode ser derivado dos outros por métodos de inferência lógica, i.e., da lógica proposicional e de disciplinas precedentes<sup>1</sup>.*

### 1.2 TEORIA DOS CONJUNTOS

Decidi abordar a construção dada no apêndice do livro *General Topology* de John L. Kelley (vide pp. 250–281). Conforme atestei, o sistema empregado por Kelley, é uma adaptação do sistema de A. P. Morse, como ele bem afirma em sua obra.

Nosso sistema axiomático constituirá além da lógica proposicional, de objetos indefinidos chamados **classes**, denotadas doravante por letras do alfabeto latino. Adicionalmente, com uma relação  $\in$ , chamada pertinência.

**Definição 2 (CONJUNTOS)**

$$\forall x(\zeta(x) \longleftrightarrow \exists y(x \in y)).$$

À cada classe  $x$  tal que  $\zeta(x)$ , daremos o nome de conjunto. Desta maneira  $\zeta(x)$  se, e somente se,  $x$  é um conjunto.

**Axioma 1 (AXIOMA-ESQUEMA DA CLASSIFICAÇÃO)** *Seja  $\phi$  uma função proposicional tendo como parâmetros as classes. Então*

$$\forall y(y \in \{x : \phi(x)\} \longleftrightarrow \zeta(y) \wedge \phi(y)).$$

---

<sup>1</sup>Isto está em conformidade segundo Tarski. Quais seriam estas disciplinas?

Enfatizo que os objetos da teoria de classes, resumem-se, como é esperado, às classes. Portanto, ‘ $\{x : \phi(x)\}$ ’ denota uma classe, daí o nome de *classifier* ou classificador.

**Definição 3**  $\langle \phi \rangle = \{x : \phi(x)\}$ .

**Axioma 2 (AEx : AXIOMA DA EXTENSÃO OU EXTENSIONALIDADE)**

$$\forall x, y (x = y \longleftrightarrow \forall z (z \in x \longleftrightarrow z \in y)).$$

Friso categoricamente que uma prova rigorosa da igualdade de classes, requer o uso explícito do axioma da extensionalidade **AEx**. Portanto, a rigor, uma cadeia de igualdades de classes dadas por classificadores, mesmo que óbvia para leitores maduros, não caracteriza, segundo minha visão, uma prova. Enfatizo este ponto, pois em estágios anteriores na confecção deste compêndio eu usei tais métodos.

**Teorema 2**

$$\forall x (x = \{y : y \in x\}).$$

*Prova.*

$$\forall z (z \in \{y : y \in x\} \longleftrightarrow z \in x).$$

■

**Definição 4**  $x \cup y = \{z : z \in x \vee z \in y\}$ .

**Definição 5**  $x \cap y = \{z : z \in x \wedge z \in y\}$ .

Aos símbolos  $x \cup y$  e  $x \cap y$ , dá-se o nome de união e intersecção de  $x$  com  $y$ , respectivamente.

**Teorema 3**

$$\forall x, y, z (x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z) \quad \wedge \quad x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$$

*Prova.* Vamos provar a segunda proposição. Sejam  $x, y$  e  $z$  classes, notemos que

$$\begin{aligned} \forall w (w \in x \cup (y \cap z) &\longleftrightarrow w \in x \vee w \in y \cap z \\ &\longleftrightarrow w \in x \vee (w \in y \wedge w \in z) \\ (1.1) \quad &\longleftrightarrow (w \in x \vee w \in y) \wedge (w \in x \vee w \in z) \\ &\longleftrightarrow w \in (x \cup y) \wedge w \in (x \cup z) \\ &\longleftrightarrow w \in (x \cup y) \cap (x \cup z)). \end{aligned}$$

A outra prova é inteiramente análoga. De fato, decorre das propriedades dos conectivos ‘ $\wedge$ ’ e ‘ $\vee$ ’, a conjunção e disjunção lógica, respectivamente.

■

**Definição 6**

$$\forall x, y (x \notin y \longleftrightarrow \neg(x \in y)).$$

**Definição 7**  $\neg x = \{y : y \notin x\}$ .

A classe  $\neg x$  chama-se complemento absoluto de  $x$ .

**Teorema 4** *Seja  $\phi$  uma função proposicional cujos parâmetros sejam classes. Então  $\neg\langle \phi \rangle = \langle \neg\phi \rangle$ .*

*Prova.*

$$\forall x (x \in \neg\langle\phi\rangle \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge \neg\phi(x) \longleftrightarrow x \in \langle\neg\phi\rangle).$$

**Teorema 5**

$$\forall x (\neg(\neg x) = x).$$

*Prova.*

$$(1.2) \quad \forall y (y \in \neg(\neg x) \longleftrightarrow \neg(y \in \neg x) \longleftrightarrow \neg(\neg(y \in x)) \longleftrightarrow y \in x)$$

**Teorema 6 (LEIS DE DE MORGAN)**

$$\forall x, y (\neg(x \cup y) = \neg x \cap \neg y \wedge \neg(x \cap y) = \neg x \cup \neg y)$$

*Prova.* A prova segue diretamente da definição de  $\cup$  e  $\cap$ , e das leis de De Morgan para os conectivos  $\vee$  e  $\wedge$ .

**Definição 8**  $x \neg y = x \cap \neg y$ .

Ao símbolo ' $x \neg y$ ' dá-se o nome de diferença de  $x$  e  $y$  ou complemento de  $y$  relativo a  $x$ .

**Teorema 7**

$$\forall x, y, z (x \cap (y \neg z) = (x \cap y) \neg z)$$

*Prova.* Provar.

**Definição 9** Seja  $\phi$  uma contradição qualquer. Definimos  $\emptyset = \langle\phi\rangle$ .

Observe que esta definição independe da contradição. Com efeito, temos o

**Teorema 8** Se  $\phi$  e  $\psi$  são duas contradições, então  $\langle\phi\rangle = \langle\psi\rangle$ .

*Prova.* Com efeito,

$$(1.3) \quad \forall x (x \in \langle\phi\rangle \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge \phi(x) \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge \psi(x) \longleftrightarrow x \in \langle\psi\rangle),$$

pois ambos os membros da bicondicional são falsos, logo a equivalência é válida e, consequentemente a quantificação é verdadeira.

A classe  $\emptyset$  é chamada de classe nula ou vazia.

**Teorema 9**

$$(1.4) \quad \forall x (x \notin \emptyset).$$

*Prova.*

$$(1.5) \quad \forall x(x \in \emptyset \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge x \neq x).$$

Como o lado direito é trivialmente falso pela definição de igualdade, decorre que  $\neg(x \in \emptyset)$ , ou equivalentemente  $x \notin \emptyset$  é verdadeira para todo  $x$ . ■

### Teorema 10

$$(1.6) \quad \forall x(x \cup \emptyset = x \wedge x \cap \emptyset = \emptyset).$$

*Prova.* Seja  $x$  uma classe, temos em conformidade

$$(1.7) \quad \forall y(y \in x \cup \emptyset \longleftrightarrow \zeta(y) \wedge (y \in x \vee y \in \emptyset) \longleftrightarrow \zeta(y) \wedge y \in x \longleftrightarrow y \in x)$$

o que segundo o **AEx** segue-se a identidade.

Analogamente,

$$(1.8) \quad \forall y(y \in x \cap \emptyset \longleftrightarrow \zeta(y) \wedge (y \in x \wedge y \in \emptyset) \longleftrightarrow \zeta(y) \wedge y \in \emptyset \longleftrightarrow y \in \emptyset)$$

novamente pelo **AEx** infere-se a igualdade. ■

### Definição 10

$$(1.9) \quad \mathcal{U} = \neg\emptyset$$

### Teorema 11

$$(1.10) \quad \forall x(x \in \mathcal{U} \longleftrightarrow \zeta(x)).$$

*Prova.*

$$(1.11) \quad \forall x(x \in \mathcal{U} \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge x \notin \emptyset \longleftrightarrow \zeta(x)).$$
■

**Teorema 12** *Seja  $\phi$  uma tautologia. Então  $\langle \phi \rangle = \mathcal{U}$ .*

*Prova.* Notemos que

$$(1.12) \quad \forall x(x \in \langle \phi \rangle \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge \phi(x) \longleftrightarrow \zeta(x) \longleftrightarrow x \in \mathcal{U}),$$

de **AEx** decorre o teorema. Outra maneira seria usar a hipótese que  $\neg\phi$  é uma contradição, e concluir de

$$(1.13) \quad \langle \phi \rangle = \neg\langle \neg\phi \rangle = \neg\emptyset = \mathcal{U}.$$
■

### Teorema 13

$$(1.14) \quad \forall x(x \cup \mathcal{U} = \mathcal{U} \wedge x \cap \mathcal{U} = x)$$

**Prova.**

$$(1.15) \quad \forall y (y \in x \cup \mathcal{U} \longleftrightarrow y \in x \vee y \in \mathcal{U} \longleftrightarrow y \in \mathcal{U})$$

segue pelo **AEx**.

Seguidamente,

$$(1.16) \quad \forall y (y \in x \cap \mathcal{U} \longleftrightarrow y \in x \wedge y \in \mathcal{U} \longleftrightarrow y \in x)$$

novamente decorre por **AEx**.

### Definição 11

$$(1.17) \quad \bigcap x = \{z : \forall y (y \in x \longrightarrow z \in y)\}.$$

### Definição 12

$$(1.18) \quad \bigcup x = \{z : \exists y (y \in x \wedge z \in y)\}.$$

A classe  $\bigcap x$  é a interseção dos membros de  $x$  e, a classe  $\bigcup x$  é a união dos membros de  $x$ .

### Teorema 14

$$(1.19) \quad \bigcap \emptyset = \mathcal{U} \wedge \bigcup \emptyset = \emptyset.$$

**Prova.**

$$(1.20) \quad \forall x \left( x \in \bigcap \emptyset \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge \forall y (y \in \emptyset \longleftrightarrow x \in y) \longleftrightarrow x \in \mathcal{U} \right),$$

pois  $\phi$  definida por

$$(1.21) \quad \phi(x) \longleftrightarrow \forall y (y \in \emptyset \longleftrightarrow x \in y)$$

é uma tautologia.

Em seguida,

$$(1.22) \quad \forall x (x \in \bigcup \emptyset \longleftrightarrow \zeta(x) \wedge \exists (y \in \emptyset \wedge x \in y) \longleftrightarrow x \in \emptyset),$$

porquanto,  $\psi$  definida por

$$(1.23) \quad \psi(x) \longleftrightarrow \exists y (y \in \emptyset \wedge x \in y)$$

é uma contradição.

### Definição 13

$$(1.24) \quad \forall x (x \subset y \longleftrightarrow \forall z (z \in x \longrightarrow z \in y)).$$

Uma classe  $x$  é uma subclasse de  $y$ , ou está contida em  $y$ , ou  $y$  contem  $x$ , se, e somente se,  $x \subset y$ .

### Teorema 15

$$(1.25) \quad \forall x (\emptyset \subset x \wedge x \subset \mathcal{U})$$

**Prova.** Seja  $x$  uma classe. Temos primeiramente

$$(1.26) \quad \forall y(y \in \emptyset \longrightarrow y \in x),$$

pois o antecedente da condicional é sempre falso. O que prova a primeira inclusão.

Por outro, lado temos

$$(1.27) \quad \forall y(y \in x \longrightarrow \zeta(y) \longrightarrow y \in \mathcal{U}).$$

o que conclui a prova. ■

### Teorema 16

$$(1.28) \quad \forall x, y(x = y \longleftrightarrow x \subset y \wedge y \subset x).$$

**Prova.** Sejam  $x$  e  $y$  classes quaisquer

$$(1.29) \quad \begin{aligned} x \subset y \wedge y \subset x &\longleftrightarrow \forall z((z \in x \longrightarrow z \in y) \wedge (z \in y \longrightarrow z \in x)) \\ &\longleftrightarrow \forall z(z \in x \longleftrightarrow z \in y) \\ &\longleftrightarrow x = y. \end{aligned}$$
■

### Teorema 17

$$(1.30) \quad \forall x, y, z(x \subset y \wedge y \subset z \longrightarrow x \subset z)$$

**Prova.** Sejam  $x, y, z$  classes quaisquer. Temos

$$(1.31) \quad \begin{aligned} (x \subset y \wedge y \subset z &\longrightarrow \forall w(w \in x \longrightarrow w \in y \wedge w \in y \longrightarrow w \in z) \\ &\longrightarrow \forall w(w \in x \longrightarrow w \in z) \\ &\longrightarrow x \subset z) \end{aligned}$$
■

### Teorema 18

$$(1.32) \quad \forall x, y, z(x \subset y \longrightarrow x \cap z \subset y \cap z \wedge x \cup z \subset y \cup z)$$

**Prova.** Sejam  $x, y, z$  classes quaisquer. Primeiramente,

$$(1.33) \quad \forall w(w \in x \cap z \longrightarrow w \in x \wedge w \in z \longrightarrow w \in y \wedge w \in z \longrightarrow w \in y \cap z).$$

Segundo e, por fim,

$$(1.34) \quad \forall w(w \in x \cup z \longrightarrow w \in x \vee w \in z \longrightarrow w \in y \vee w \in z \longrightarrow w \in y \cup z).$$
■

**Teorema 19**

$$(1.35) \quad \forall x, y (x \subset y \longleftrightarrow x \cup y = y)$$

*Prova.* Sejam  $x, y$  classes arbitrárias, segue-se

$$(1.36) \quad x \subset y \wedge y \subset x \cup y \longleftrightarrow x \cup y \subset y \wedge y \subset x \cup y \longleftrightarrow x \cup y = y.$$

**Teorema 20 (30 THEOREM)**

$$(1.37) \quad \forall x, y (x \subset y \longleftrightarrow x \cap y = x)$$

*Prova.* Dadas as classes  $x$  e  $y$ , temos

$$(1.38) \quad x \subset y \wedge x \cap y \subset x \longleftrightarrow x \subset x \cap y \wedge x \cap y \subset x \longleftrightarrow x \cap y = x.$$

**Teorema 21 (31 THEOREM)**

$$(1.39) \quad \forall x, y \left( x \subset y \longrightarrow \bigcup x \subset \bigcup y \wedge \bigcap y \subset \bigcap x \right).$$

*Prova.* Sejam  $x, y, z$  classes arbitrárias, tais que  $x \subset y$ . Primeiro temos

$$(1.40) \quad z \in \bigcup x \longrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w) \longrightarrow \exists w (w \in y \wedge z \in w) \longrightarrow z \in \bigcup y.$$

Segundo,

$$(1.41) \quad z \in \bigcap y \longrightarrow \forall w (w \in y \longrightarrow z \in w) \longrightarrow \exists w (w \in x \longrightarrow z \in w) \longrightarrow z \in \bigcap x.$$

**Teorema 22 (32 THEOREM)**

$$(1.42) \quad \forall x, y \left( x \in y \longrightarrow x \subset \bigcup y \wedge \bigcap \subset x \right)$$

*Prova.* Sejam  $x, y, z$ , classes aleatórias tais que  $x \in y$ . Inicialmente, temos

$$(1.43) \quad z \in x \longrightarrow \exists w (w \in y \wedge z \in w) \longrightarrow z \in \bigcup y.$$

Finalmente,

$$(1.44) \quad z \in \bigcap y \longrightarrow \forall w (w \in y \longrightarrow z \in w) \longrightarrow z \in x.$$