

MAKFLOR-25

Oral Liquid



Florfenicol 25%

The **Guardian Angel**
of **Poultry Farms!**



MAKFLOR-25

Oral Liquid

میک فلور - ۲۵

(اورل لیکوئیڈ)

COMPOSITION:

Each ml solution contains:

Florfenicol250 mg

(As per innovator's specifications)



ROLE OF FLORFENICOL

Florfenicol is a broad-spectrum antibiotic used to treat bacterial infections in poultry, particularly respiratory and enteric infections.

Makflor-25 Oral Liquid, containing florfenicol, that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S subunit of the bacterial ribosome, thus preventing peptide bond formation and ultimately leading to bacterial cell death.

INDICATIONS

Makflor-25 oral liquid is indicated to treat broad spectrum antibiotic covering gram +ve and gram-ve bacteria in respiratory and gastrointestinal infection in poultry including pneumonia, Mycoplasma, CRD, CCRD, fowl cholera, fowl typhoid, coryza, E-coli infection, necrotic enteritis, perihepatitis, pericarditis and endocarditis.



Hepatitis hydropericardium in poultry



Birds affected by the respiratory infections

Treatment Protocol with Makflor-25 Oral Liquid:

DOSAGE:

Prevention: 1 ml per 5 liters of drinking water for 3-5 days.

Treatment: 1 mL in 3 litres of drinking water (20mg/kg) body weight for 3- 5 days.

Precautions:

Use **Makflor-25** Oral Liquid under veterinary supervision only. Do not exceed the recommended dosage. Avoid use in birds with known hypersensitivity to florfenicol

Withdrawal Period:

Adhere to the specified withdrawal period before consuming animal products from treated animals, as directed by regulatory authorities. Always consult with a veterinarian for accurate diagnosis, proper treatment recommendations, and guidance on the use of **Makflor-25** Oral Liquid.

Packaging: **Makflor-25** available in 1Litre, 5Litre.

علامات:

میک فلور - ۲۵ اورل لیکوئیڈ مرغیوں میں سانس اور آنتوں کے انفیکشن میں پائے جانے والے گرام مثبت و منفی بیکٹیریا کے علاج کے ساتھ سانس کی دیگر بیماریوں مثلاً فاول ٹائیفائیڈ، فاول کالرا، ای کولائی، مائیکوپلازما، آر۔ ڈی، سی۔ آر۔ ڈی اور دل، جگر و پھیپھڑوں کی جھلی کی سوزش میں موثر علاج ہے۔

خوراک و طریقہ استعمال:

برائے تحفظ: ۱ ملی لیٹر فی ۵ لیٹر پینے کے پانی میں ۳ سے ۵ دن تک دیں۔

برائے علاج: ۱ ملی لیٹر فی لیٹر پینے کے پانی میں (۲۰ ملی گرام فی کلوگرام)

جسمانی وزن کے حساب سے ۳ سے ۵ دن تک دیں۔



Manufactured By:
M. A. Kamil Farma (Pvt.) Limited
Karachi, Pakistan.



M. A. Kamil Farma (Pvt.) Limited